

# 乞丐版量子场论

Probfa

## 目录

全文中我们采取自然单位制  $c = \hbar = 1$ 。度规  $g_{\mu,\nu}$  的符号是  $(+, -, -, -)$ ，且不特别说明时它都是闵可夫斯基度规  $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$ 。

## 1 准备工作

### 1.1 经典场论

在  $(D+1)$  维经典场论中，标量场  $\phi(t, \vec{x})$  的拉格朗日密度为  $\partial_\mu \phi$  和  $\phi$  的函数，其中  $\mu = 0, 1, \dots, D$ ，0 指标代表时间指标。 $\partial_\mu \phi$  这样的偏导数是一个矢量，第  $\mu$  个分量是对  $x_\mu$  求导的结果。其次，定义  $\partial^\mu \phi = g^{\mu\nu} \partial_\nu \phi$  为它对应的对偶矢量。作用量为

$$S[\phi] = \int \mathcal{L}(\partial_\mu \phi, \phi) dt d^D \vec{x} \quad (1)$$

这个作用量对应的拉格朗日方程可以由以前在理论力学里学过的拉格朗日方程推广而来，这里  $q$  对应  $\phi$ ， $t$  对应  $x^\mu$ ， $\dot{q}$  对应  $\partial_\mu \phi$ ，于是有

$$\partial_\mu \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = 0 \quad (2)$$

考虑二次型动能和二次势

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial^\mu \phi \partial_\mu \phi - \frac{1}{2} m^2 \phi^2 \quad (3)$$

代入拉格朗日方程就可以得到场的方程了。不过初学的时候很容易因为不知道这个带下标的偏导数的偏导数怎么求，就放弃学习了（我本人）。它是这样进行的，首先，我们要求的东西是

$$\frac{\partial(\partial^\mu \phi \partial_\mu \phi)}{\partial(\partial_\mu \phi)} \quad (4)$$

根据同一指标不出现三次的原则，把分子重新成  $\partial^\mu \phi \partial_\mu \phi = \partial^\sigma \phi \partial_\sigma \phi = g^{\rho\sigma} \partial_\rho \phi \partial_\sigma \phi$  再求导，注意到  $\partial_\mu \phi$  之间的独立性，有

$$\frac{\partial(\partial_\mu \phi)}{\partial(\partial_\nu \phi)} = \delta_\mu^\nu \quad (5)$$

再利用乘积的求导法则得到

$$\begin{aligned} & \frac{\partial(g^{\rho\sigma} \partial_\rho \phi \partial_\sigma \phi)}{\partial \partial(\partial_\mu \phi)} \\ &= g^{\rho\sigma} \partial_\rho \phi \delta_\sigma^\mu + g^{\rho\sigma} \delta_\rho^\mu \partial_\sigma \phi \\ &= g^{\rho\mu} \partial_\rho \phi + g^{\mu\sigma} \partial_\sigma \phi \\ & \quad (\partial^\mu \phi \text{ 的定义}) \\ &= 2\partial^\mu \phi \end{aligned} \quad (6)$$

于是这样的拉格朗日密度对应的拉格朗日方程是

$$\partial_\mu \partial^\mu \phi + m^2 \phi = 0 \quad (7)$$

引入记号  $\partial^2 \equiv \partial_\mu \partial^\mu = g^{\mu\nu} \partial_\mu \partial_\nu$ ，上式可以写成一个非常漂亮的形式

$$(\partial^2 + m^2)\phi = 0 \quad (8)$$

假设  $\phi(x^\mu) = Ae^{ik_\mu x^\mu}$ ， $k_\mu = (\omega, \vec{k})$ 。带入闵可夫斯基度规，就有

$$\vec{k}^2 + m^2 = \omega^2 \quad (9)$$

看，这不就是  $E^2 = m^2 + \vec{p}^2$  吗。

将时间维特殊化，记  $\dot{\phi} = \partial_0 \phi$ ，定义场的动量为

$$\pi = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} \quad (10)$$

定义哈密顿密度为

$$\mathcal{H} = \pi \dot{\phi} - \mathcal{L} \quad (11)$$

可以算出， $\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial^\mu \phi \partial_\mu \phi - \frac{1}{2} m^2 \phi^2$  的哈密顿密度为

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2} \dot{\phi}^2 + (\vec{\nabla} \phi)^2 + m^2 \phi^2 \quad (12)$$

## 1.2 高斯积分

我们对下面这个公式早已滚瓜烂熟倒背如流张口就来了

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi} \quad (13)$$

做一点简单的变量代换就得到

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{ax^2}{2}} dx = \sqrt{\frac{2\pi}{a}} \quad (14)$$

积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^{2n} e^{-\frac{ax^2}{2}} dx$$

可以由两种方法求得。第一种是??两边对  $a$  求  $n$  次导，第二种是利用  $\Gamma$  函数。结果是

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^{2n} e^{-\frac{ax^2}{2}} dx = \frac{(2n-1)(2n-3)\cdots 3\cdot 1}{a^n} \sqrt{\frac{2\pi}{a}} \quad (15)$$

如果指数上还有一个一次项，用初中学的配方法可以得到积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{ax^2}{2} + Jx} dx = e^{\frac{J^2}{2a}} \sqrt{\frac{2\pi}{a}} \quad (16)$$

现在将上面这个积分推广到  $n$  维。计算积分

$$\int e^{-\frac{1}{2} A_{ij} x^i x^j + J_k x^k} dx^1 dx^2 \cdots dx^n$$

结果是怎样呢?为了计算,将二次型对角化后,就可以拆成  $n$  个高斯积分的积了。设有一个正交矩阵  $R$  使得  $\vec{x} = R\vec{y}$ , 二次型化为  $\vec{x}^T A \vec{x} = \vec{y}^T R^{-1} A R \vec{y}$ , 其中  $P = R^{-1} A R$  是一个对角阵; 一次项为  $\vec{J}^T \cdot \vec{x} = \vec{J}^T R \vec{y}$ 。而且, 因为坐标变换矩阵是正交矩阵, 坐标变换的雅可比行列式为 1,  $d^n \vec{y} = d^n \vec{x}$ 。现在, 上面这个积分是

$$\int e^{-\frac{1}{2} P_{ii} (y^i)^2 + J_k R^k_i y^i} dy^1 dy^2 \cdots dy^n \quad (17)$$

现在这个积分就变成  $n$  个积分的积了。单个积分的结果为

$$\int e^{-\frac{1}{2} P_{ii} (y^i)^2 + J_k R^k_i y^i} dy^i = e^{\frac{(J_k R^k_i)^2}{2P_{ii}}} \sqrt{\frac{2\pi}{P_{ii}}} \quad (18)$$

指数上的分子就是  $R\vec{J}$  的第  $i$  个分量的平方。 $n$  个积分的积为

$$\left( \frac{2\pi}{\prod_i P_{ii}} \right)^{n/2} e^{\frac{1}{2} \sum_i (R\vec{J}_i)^2 / P_{ii}} \quad (19)$$

和式为

$$\sum_i (R\vec{J})_i^2 / P_{ii} = \frac{1}{\prod_i P_{ii}} \sum_i (R\vec{J})_i^2 M_{ii} \quad (20)$$

其中  $M_{ii} = \prod_{j \neq i} P_{jj}$  是对角阵  $P$  的代数余子式。而  $\prod_i P_{ii}$  就是  $P$  的行列式，于是  $\frac{M_{ii}}{\prod_i P_{ii}}$  就是  $P$  的逆矩阵的矩阵元  $P_{ii}^{-1}$ 。利用  $P = R^{-1}AR = R^T AR$ ，两边取逆得到  $P^{-1} = R^{-1}A^{-1}R = R^T A^{-1}R$ ，因而上式进一步化简为

$$\sum_i (R\vec{J})_i^2 / P_{ii} = (R\vec{J})^T P^{-1} (R\vec{J}) = \vec{J}^T A^{-1} \vec{J} \quad (21)$$

由于  $A$  和  $P$  相似， $\det A = \det P = \prod_i P_{ii}$  我们得到

$$\int e^{-\frac{1}{2}A_{ij}x^i x^j + J_k x^k} dx^1 dx^2 \cdots dx^n = \left(\frac{2\pi}{\det A}\right)^{n/2} e^{\frac{1}{2}\vec{J}^T A^{-1} \vec{J}} \quad (22)$$

### 1.3 谐振子的量子化

经典力学中的谐振子具有哈密顿函数

$$H = \frac{1}{2}p^2 + \frac{1}{2}\omega^2 q^2 \quad (23)$$

量子力学中，力学量用算符表示。谐振子的哈密顿算符可以用动量算符和坐标算符表示为

$$\hat{H} = \frac{1}{2}\hat{p}^2 + \frac{1}{2}\omega^2 \hat{q}^2 \quad (24)$$

设产生算符  $\hat{a}^\dagger$  和湮灭算符  $\hat{a}$  使得

$$\hat{q} = \frac{1}{\sqrt{2\omega}}(\hat{a}^\dagger + \hat{a}) \quad (25)$$

$$\hat{p} = -i\sqrt{\frac{\omega}{2}}(\hat{a}^\dagger - \hat{a}) \quad (26)$$

假设坐标算符和动量算符间满足对易关系  $[\hat{q}, \hat{p}] = i$  (由经典力学中坐标和动量的泊松括号推广而来)，可以算出

$$\begin{aligned} i &= [\hat{q}, \hat{p}] = \frac{-i}{2}[\hat{a}^\dagger + \hat{a}, \hat{a}^\dagger - \hat{a}] \\ &= \frac{-i}{2}([\hat{a}^\dagger, -\hat{a}] + [\hat{a}, \hat{a}^\dagger]) = i[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] \end{aligned} \quad (27)$$

于是我们得到产生湮灭算符间的对易关系为  $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$ 。

哈密顿算符用产生湮灭算符表示为

$$\hat{H} = \omega(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2}) \quad (28)$$

并可以定义粒子数算符

$$\hat{N} = \hat{a}^\dagger \hat{a} \quad (29)$$

它可以用哈密顿算符直接表示出来, 因此,  $\hat{H}$  与  $\hat{N}$  对易, 粒子数  $N$  为一个守恒量。此外可以验证以下事实

1.  $\hat{H}$  和  $\hat{N}$  都是厄米算符, 它们的本征值都是实数;
2. 如果  $\hat{N}|n\rangle = N|n\rangle$ , 则  $\hat{a}|n\rangle$  和  $\hat{a}^\dagger|n\rangle$  分别是  $\hat{N}$  的本征值为  $N-1$  和  $N+1$  的本征态;

定义谐振子的基态满足  $\hat{a}|0\rangle = 0|0\rangle$ , 即它不能再被湮灭算符湮灭。那么, 将这个条件带入哈密顿算符的表达式并利用产生算符的性质, 就可以得到谐振子的能级公式  $E_N = (N + \frac{1}{2})\omega$ 。

## 2 自由场的量子化

### 2.1 自由实标量场

#### 2.1.1 模式分解

我们已经指出, 拉格朗日密度  $\mathcal{L} = \frac{1}{2}\partial^\mu\phi\partial_\mu\phi - \frac{1}{2}m^2\phi^2$  对应的标量场满足运动方程

$$(\partial^2 + m^2)\phi = \ddot{\phi} - \vec{\nabla}^2\phi + m^2\phi = 0 \quad (30)$$

设振动模式  $\vec{p}$  对应的解是  $\phi_{\vec{p}}(t, \vec{x}) = e^{i\vec{p}\cdot\vec{x} - i\omega_{\vec{p}}t}$ , 带入运动方程就得到

$$\omega_{\vec{p}} = \sqrt{\vec{p}^2 + m^2} \quad (31)$$

在经典场论下, 每个振动模式  $\vec{p}$  的行为都像单个谐振子, 而对单个谐振子的量子化是容易的。类比地写出模式  $\vec{p}$  满足的产生湮灭算符满足

$$\hat{\phi}(\vec{x}) = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\vec{p}}}} (\hat{a}_{\vec{p}} e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} + \hat{a}_{\vec{p}}^\dagger e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}}) \quad (32)$$

$$\hat{\pi}(\vec{x}) = -i \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \sqrt{\frac{\omega_{\vec{p}}}{2}} (\hat{a}_{\vec{p}} e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} - \hat{a}_{\vec{p}}^\dagger e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}}) \quad (33)$$

其中  $\hat{\phi}$  和  $\hat{\pi}$  为场的场算符和动量算符。

可以证明下面两组对易关系等价

$$[\hat{\phi}(\vec{x}), \hat{\phi}(\vec{y})] = [\hat{\pi}(\vec{x}), \hat{\pi}(\vec{y})] = 0, [\hat{\phi}(\vec{x}), \hat{\pi}(\vec{y})] = i\delta^3(\vec{x} - \vec{y}) \quad (34)$$

$$[\hat{a}_{\vec{p}}, \hat{a}_{\vec{q}}] = [\hat{a}_{\vec{p}}^\dagger, \hat{a}_{\vec{q}}^\dagger] = 0, [\hat{a}_{\vec{p}}, \hat{a}_{\vec{q}}^\dagger] = (2\pi)^3 \delta^3(\vec{p} - \vec{q}) \quad (35)$$

这与谐振子的两组对易关系对应。

利用上面的对易关系和 KG 场哈密顿密度的定义，将对应的场和动量换成场算符和动量算符，化简得到哈密顿密度算符，再对哈密顿密度算符对全空间积分得到哈密顿算符

$$\hat{H} = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \omega_{\vec{p}} \left[ \hat{a}_{\vec{p}}^\dagger \hat{a}_{\vec{p}} + \frac{1}{2} (2\pi)^3 \delta^3(0) \right] \quad (36)$$

这里的  $\delta$  函数项与谐振子中的零点能  $\frac{1}{2}\omega$  对应，对全空间的积分使得该项发散。我们重新定义哈密顿量为减去零点能的哈密顿量，哈密顿算符就是

$$\hat{H} = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \omega_{\vec{p}} \hat{a}_{\vec{p}}^\dagger \hat{a}_{\vec{p}} \quad (37)$$

最后重申，这里的图像是，对每个振动模式  $\vec{p}$  的行为都类似谐振子，将每个模式量子化后再按模式的体积元  $\frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3}$  叠加得到整个场的量子化。

### 2.1.2 真空与粒子

定义场的真空态  $|0\rangle$ ，使得对于任意模式  $\vec{p}$  都有  $\hat{a}_{\vec{p}}|0\rangle = 0|0\rangle$ 。带入??得到  $\hat{H}|0\rangle = 0|0\rangle$ ，也即真空能量为 0。

定义粒子态

$$|\vec{p}_1, \vec{p}_2, \dots, \vec{p}_n\rangle = \hat{a}_{\vec{p}_1}^\dagger \hat{a}_{\vec{p}_2}^\dagger \dots \hat{a}_{\vec{p}_n}^\dagger |0\rangle \quad (38)$$

和粒子数算符

$$\hat{N} = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \hat{a}_{\vec{p}}^\dagger \hat{a}_{\vec{p}} \quad (39)$$

利用产生湮灭算符间的对易关系和真空态的定义可以验证

$$\hat{N}|\vec{p}_1, \vec{p}_2, \dots, \vec{p}_n\rangle = n|\vec{p}_1, \vec{p}_2, \dots, \vec{p}_n\rangle \quad (40)$$

也就是说，粒子态可以被诠释为具有一系列动量的  $n$  个粒子。而产生算符则用来产生这些粒子，因此我们说，粒子是场的激发态。此外有

$$|\vec{p}, \vec{q}\rangle = \hat{a}_{\vec{p}}^\dagger \hat{a}_{\vec{q}}^\dagger |0\rangle = \hat{a}_{\vec{q}}^\dagger \hat{a}_{\vec{p}}^\dagger |0\rangle = |\vec{q}, \vec{p}\rangle \quad (41)$$

中间一步我们利用了产生算符间的可交换性。上式表明，KG 场表征的粒子对交换算符的本征值为 1，为玻色子。

此外，粒子数算符和哈密顿算符对应，按量子力学，与哈密顿算符对易的算符表征的力学量为守恒量，于是我们得到了粒子数守恒的结论

## 2.2 复自由标量场

### 2.2.1 复自由场

定义复值场  $\psi$  的拉格朗日密度为

$$\mathcal{L} = \partial_\mu \psi \partial^\mu \psi^* - m^2 \psi \psi^* \quad (42)$$

它的运动方程为

$$\partial_\mu \partial^\mu \psi + m^2 \psi = 0 \quad (43)$$

$$\partial_\mu \partial^\mu \psi^* + m^2 \psi^* = 0 \quad (44)$$

同样的，场和它共轭分别各个模式  $\vec{p}$  下的行为类似谐振子，可以同样地进行量子化。不过，这里有两个方程，也就是有原来 2 倍的自由度。这迫使我们定义两种产生湮灭算符  $\hat{b}_{\vec{p}}^\dagger, \hat{c}_{\vec{p}}^\dagger, \hat{b}_{\vec{p}}$  和  $\hat{c}_{\vec{p}}$ 。同组产生湮灭算符内满足的对易关系与之前实标量场一致，并且增加它们之间的对易关系为  $[\hat{b}_{\vec{p}}, \hat{c}_{\vec{p}}^\dagger] = [\hat{c}_{\vec{p}}, \hat{b}_{\vec{p}}^\dagger] = 0$ 。写出场及其共轭的场算符和动量算符为

$$\hat{\psi}(\vec{x}) = \int \frac{d^3 \vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\vec{p}}}} (\hat{b}_{\vec{p}} e^{i\vec{p} \cdot \vec{x}} + \hat{c}_{\vec{p}}^\dagger e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}}) \quad (45)$$

$$\hat{\psi}^\dagger(\vec{x}) = \int \frac{d^3 \vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\vec{p}}}} (\hat{b}_{\vec{p}}^\dagger e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} + \hat{c}_{\vec{p}} e^{i\vec{p} \cdot \vec{x}}) \quad (46)$$

$$\hat{\pi}(\vec{x}) = i \int \frac{d^3 \vec{p}}{(2\pi)^3} \sqrt{\frac{\omega_{\vec{p}}}{2}} (\hat{b}_{\vec{p}}^\dagger e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} - \hat{c}_{\vec{p}} e^{i\vec{p} \cdot \vec{x}}) \quad (47)$$

$$\hat{\pi}(\vec{x}) = -i \int \frac{d^3 \vec{p}}{(2\pi)^3} \sqrt{\frac{\omega_{\vec{p}}}{2}} (\hat{b}_{\vec{p}} e^{i\vec{p} \cdot \vec{x}} - \hat{c}_{\vec{p}}^\dagger e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}}) \quad (48)$$

### 2.2.2 粒子与反粒子

采用与之前相当的真空定义，定义正粒子数算符

$$\hat{N}_b = \int \frac{d^3 \vec{p}}{(2\pi)^3} \hat{b}_{\vec{p}}^\dagger \hat{b}_{\vec{p}} \quad (49)$$

和反粒子数算符

$$\hat{N}_c = \int \frac{d^3 \vec{p}}{(2\pi)^3} \hat{c}_{\vec{p}}^\dagger \hat{c}_{\vec{p}} \quad (50)$$