

# 线性空间和张量

Probfa

## 目录

1	线性空间	1
2	对偶空间	2
3	变换基公式	3
4	张量和张量运算	4
5	度规张量和升降指标	6
6	张量的例子	7
7	坐标变换	7
8	张量计算练习	8

## 1 线性空间

我们熟悉的向量生活在线性空间中。所谓线性空间是一群向量的集合  $V$  连同同一个代数域  $\mathcal{F}$  形成的代数结构。这个域的作用是定义向量的数乘。向量空间有 8 大条公理，不过这里就不必一一叙述了，只需要记住最重要的一条：

**公理 1.1 (封闭性)** 设  $V$  是一个线性空间， $\mathcal{F}$  是它连通的域，则

$$\forall u, v \in V, u + v \in V \quad (1)$$

$$\forall v \in V, \forall \alpha \in \mathcal{F}, \alpha v \in V \quad (2)$$

我们熟悉的长度为  $n$  的数组就生活在空间  $\mathbb{R}^n$  中，它连通的域就是实数域  $\mathbb{R}$ ，如果让它连通的域是  $\mathbb{C}$  就会破坏第二条封闭性。数组只是向量的一个特例。

如果一个线性空间中的所有向量都可以用其中的  $n$  个向量线性表示出（只涉及数乘和加法运算），那么就称这个线性空间的维度为  $n$ ，记作  $\dim V = n$ 。这  $n$  个向量称为这个线性空间的一组基。下面的定理确真：

**定理 1.1 (向量在基下的表示)** 设  $V$  有一组基  $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ ，那么，

$$\forall v \in V, \exists!(v^1, v^2, \dots, v^n) \in \mathcal{F}^n, v = v^1 e_1 + v^2 e_2 + \dots + v^n e_n \quad (3)$$

即任意向量  $v$  在这组基下的线性表示唯一。

这个定理无聊爆了，唯一需要证明的是它的唯一性，不过这也无聊爆了，所以不证。各个域中的数  $v^i$  称为向量  $v$  在这组基下的坐标。采用爱因斯坦求和规则，上面这个式子可以用特别漂亮的方式写出

$$v = v^i e_i \quad (4)$$

讲一个稍微有意思一点的话题。将  $\mathbb{C}^n$  作为线性空间，它的域可以是  $\mathbb{C}$ ，也可以是  $\mathbb{R}$ 。假如让  $\mathbb{R}$  作为域的话，会有  $\dim \mathbb{C}^n = 2n$ 。你能一眼看出这个命题的证明吗？

## 2 对偶空间

考虑一个映射  $f$ ，它将线性空间  $V$  中的元素映到这个空间的域  $\mathcal{F}$  上。此外，我们要求这个映射满足线性条件：

$$\forall u, v \in V, \forall \alpha, \beta \in \mathcal{F}, f(\alpha u + \beta v) = \alpha f(u) + \beta f(v) \quad (5)$$

那么，这个映射就称为线性映射。我们定义线性映射  $f$  和  $g$  的加法为

$$(f + g) : V \rightarrow \mathcal{F}, \forall v \in V, (f + g)(v) = f(v) + g(v) \quad (6)$$

以及数乘

$$\alpha f : V \rightarrow \mathcal{F}, \forall v \in V, (\alpha f)(v) = \alpha f(v) \quad (7)$$

其中  $\alpha \in \mathcal{F}$ 。这也无聊爆了。还有一个更无聊的定理

**定理 2.1** 线性空间  $V$  上所有的线性映射连同  $V$  上原本的域  $\mathcal{F}$  构成另一个线性空间，记作  $V^*$ ，称为  $V$  的对偶空间。

既然  $V^*$  是一个线性空间，那么它必然具有自己的维数，是多少呢？猜都不用猜，肯定是  $\dim V^* = \dim V$ 。

我们先定义几个特殊的线性映射。若  $V$  有一组基  $\{e_i\}$ ，那么，定义线性映射  $e^j$ ，使得

$$e^j(e_i) = \delta_i^j \quad (8)$$

$e^j$  对  $V$  中的向量  $v$  的作用是

$$\begin{aligned} e^j(v) &= e^j(v^i e_i) \\ &= v^i e^j(e_i) \\ &= v^i \delta_i^j = v^j \end{aligned} \quad (9)$$

于是  $e^j$  也被称为求坐标函数。

引入这些无聊的函数是为了这个稍微不那么无聊一点的定理

**定理 2.2 (对偶空间的基)** 设找到  $V$  的一组基为  $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ ，那么， $\{e^1, e^2, \dots, e^n\}$  一定是  $V^*$  的一组基。

这个定理的证明就不给了，反正也没人在意，而且我们也没时间讲线性空间的一些证明技巧（套路）。对  $V^*$  中的任意元素  $f$ ，都有一个分解

$$f = f_j e^j \quad (10)$$

这个线性函数作用到  $V$  中的元素  $v$  上得到的结果就是

$$f(v) = (f_j e^j)(v^i e_i) = f_j v^i e^j(e_i) = f_i v^i \quad (11)$$

### 3 变换基公式

习惯上将  $V$  中的向量记作列向量，而将  $V^*$  中的向量记为行向量。即下标对应列，上标对应行。如果有一个满秩矩阵  $A = (a^i_j)$ ，它将  $V$  的基  $\{e_i\}$  变换到  $\{e'_i\}$  的方式如

$$e'_j = a^i_j e_i \quad (12)$$

也即

$$(e'_1, e'_2, \dots, e'_n) = (e_1, e_2, \dots, e_n)A \quad (13)$$

那么,  $V^*$  的基变换公式就是

$$(e'^1, e'^2, \dots, e'^m) = A^{-1}(e^1, e^2, \dots, e^n) \quad (14)$$

这个定理可以这样证明。设  $e'^j = b^j_k e^k$ ,  $B = b^j_k$ 。考虑  $e'^j$  对  $e'_i$  的作用, 有

$$\begin{aligned} \delta_i^j &= e'^j(e'_i) \\ &= e'^j(a^l_i e_l) \\ &= (b^j_k e^k)(a^l_i e_l) \\ &= b^j_k a^l_i \delta_l^k \\ &= b^j_k a^k_i \end{aligned} \quad (15)$$

$b^j_k a^k_i$  不是别的, 就是矩阵乘积  $BA$  的第  $i, j$  个元素, 它等于  $\delta_i^j$ 。这就是说  $BA = E$  或  $B = A^{-1}$ 。

因为一个向量的坐标就是去坐标函数对这个向量的作用, 因此,  $V$  中向量的坐标也会按  $V^*$  的基变换公式那样变换, 也就是

$$(v'^1, v'^2, \dots, v'^m) = A^{-1}(v^1, v^2, \dots, v^n) \quad (16)$$

或

$$v'^j = b^j_i v^i \quad (17)$$

## 4 张量和张量运算

有了对偶空间的基础, 我们现在终于可以考虑张量了。 $(s, t)$  阶张量的一般定义是一个映射:

$$T : \underbrace{V \times V \times \dots \times V}_{s \text{ 个}} \times \underbrace{V^* \times V^* \times \dots \times V^*}_{t \text{ 个}} \rightarrow \mathcal{F} \quad (18)$$

其中  $\times$  是集合的笛卡尔积。此外,  $T$  必须对每一个自变量是单线性的。

### 讲人话……

张量  $T$  是一个函数, 它接受  $s + t$  个自变量, 其中  $s$  个是在线性空间  $V$  上的向量;  $t$  个是在对偶空间  $V^*$  上的向量。它的输出结果是  $V$  的代数域 (同时也是  $V^*$  的代数域) 上的一个数。单线性是指, 对每个自变量, 都要有

$$T(\dots, \alpha u + \beta v, \dots) = \alpha T(\dots, u, \dots) + \beta T(\dots, v, \dots) \quad (19)$$

这和上课老师讲的不一样啊……

别急，我们先来看看  $(s, t) = (2, 0)$  的情况。假设  $V$  有一组基  $\{e_i\}$ ，设有两个向量  $u, v$ ，它们的坐标表示分别是  $u = u^i e_i$  和  $v = v^j e_j$ ，那么

$$\begin{aligned}
 T(u, v) &= T(u^1 e_1 + u^2 e_2 + \cdots + u^n e_n, v) \\
 &= u^1 T(e_1, v) + u^2 T(e_2, v) + \cdots + u^n T(e_n, v) \\
 &= u^1 T(e_1, v^1 e_1 + v^2 e_2 + \cdots + v^n e_n) + \\
 &\quad u^2 T(e_2, v^1 e_1 + v^2 e_2 + \cdots + v^n e_n) + \\
 &\quad \vdots \\
 &\quad u^n T(e_n, v^1 e_1 + v^2 e_2 + \cdots + v^n e_n) + \\
 &= u^1 v^1 T(e_1, e_1) + u^1 v^2 T(e_1, e_2) + \cdots + u^1 v^n T(e_1, e_n) \\
 &\quad u^2 v^1 T(e_2, e_1) + u^2 v^2 T(e_2, e_2) + \cdots + u^2 v^n T(e_2, e_n) + \\
 &\quad \cdots + \\
 &\quad u^n v^1 T(e_n, e_1) + u^n v^2 T(e_n, e_2) + \cdots + u^n v^n T(e_n, e_n)
 \end{aligned} \tag{20}$$

其实这么长而且这么丑陋无比的公式，用爱因斯坦求和规则写出来就是

$$T(u, v) = T(u^i e_i, v^j e_j) = u^i v^j T(e_i, e_j) \tag{21}$$

多么美观！

引入记号  $T_{ij} = T(e_i, e_j)$ ，就有

$$T(u, v) = T_{ij} u^i v^j \tag{22}$$

我们就回到了我们在课上学过的那种，和矩阵傻傻分不清的，带角标的张量了。

推广到  $(s, t)$  型张量，若第  $p$  个  $V$  中的向量的坐标表示是  $v_p = v_p^{i_p} e_{i_p}$ ，第  $q$  个  $V^*$  中的向量的坐标是  $f_q = f_{qj_q} e^{j_q}$ ，那么就有

$$\begin{aligned}
 T(v_1, \cdots, v_s; f_1, \cdots, f_t) &= T(v_1^{i_1} e_{i_1}, \cdots, v_s^{i_s} e_{i_s}, f_1^{j_1} e^{j_1}, \cdots, f_t^{j_t} e^{j_t}) \\
 &= v_1^{i_1} \cdots v_s^{i_s} f_1^{j_1} \cdots f_t^{j_t} T(e_{i_1}, \cdots, e_{i_s}, \cdots, e^{j_1}, \cdots, e^{j_t}) \\
 &= v_1^{i_1} \cdots v_s^{i_s} f_1^{j_1} \cdots f_t^{j_t} T_{i_1 \cdots i_s}^{j_1 \cdots j_t}
 \end{aligned} \tag{23}$$

再一次， $T_{i_1 \cdots i_s}^{j_1 \cdots j_t}$  就是我们一般知道的张量，或者说，它其实只是张量  $T$  的各个分量。这其实是所谓的张量的坐标表示。

如果对于张量  $T$ ，对换任意两个向量，都有  $T(\cdots, u, \cdots, v, \cdots) = T(\cdots, v, \cdots, u, \cdots)$ ，就说这个张量是对称的，如果反过来，对任意两个向量，都有  $T(\cdots, u, \cdots, v, \cdots) = -T(\cdots, v, \cdots, u, \cdots)$ ，就说这个张量是反称的。反称张量的一个著名例子是行列式张量：考虑  $n$  个  $n$  维列向量构成的矩阵的行列式

$$D(v_1, v_2, \cdots, v_n) \quad (24)$$

它显然符合张量的一般定义，而且是反称的。你也很容易想到，行列式张量的坐标表示就是  $\varepsilon_{i_1 i_2 \cdots i_n}$ 。

对  $(p, q)$  张量  $T$  和  $(s, t)$  张量  $U$ ，它们的代数乘积显然也是一个张量。

$$T(v_1, \cdots, v_p; f_1 \cdots, f_q) U(u_1, \cdots, u_s; g_1, \cdots, g_t) \quad (25)$$

对每个自变量都呈单线性，于是这个乘积的行为和张量的一般定义一致，它就是一个张量（著名谚语：If it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck, then it's a duck）。乘积的坐标表示是

$$(TU)_{i_1 \cdots i_p k_1 \cdots k_s}^{j_1 \cdots j_q l_1 \cdots l_t} = T_{i_1 \cdots i_p}^{j_1 \cdots j_q} U_{k_1 \cdots k_s}^{l_1 \cdots l_t} \quad (26)$$

$(s, t)$  张量可以定义缩并运算得到一个  $(s-1, t-1)$  张量。这个定义如下：

$$T(v_1, \cdots, v_p, \cdots, v_s; f_1, \cdots, f_q, \cdots, f_t) \rightarrow T(v_1, \cdots, e_k, \cdots, v_s; f_1, \cdots, e^k, \cdots, f_t) \quad (27)$$

注意这里需要对所有的  $(e_k, e^k)$  对求和。缩并后的张量对每一个自变量依然是单线性的，所以它还是一个张量。它的坐标表示很容易求得

$$\begin{aligned} & T(e_{i_1}, \cdots, e_i, \cdots, e_{i_s}, \cdots, e^{j_1}, \cdots, e^i, \cdots, e^{j_t}) \\ &= T_{i_1 \cdots k \cdots i_s}^{j_1 \cdots k \cdots j_t} \end{aligned} \quad (28)$$

注意这里也是要对所有的  $k$  求和。

如果你理解不了乘积和缩并运算，举两个例子。考虑  $\mathbb{R}^n$  的  $(1, 0)$  张量（向量，列向量） $a$  和  $(0, 1)$  张量（对偶向量，行向量） $b^T$  间的乘积运算

$$ab^T \quad (29)$$

它的结果显然是一个  $n$  阶方阵， $n$  阶方阵是  $(1, 1)$  张量的坐标表示。每个坐标分量是

$$(ab^T)_i^j = a_i b^j \quad (30)$$

缩并运算就是让两个指标相等并求和，它就是矩阵  $ab^T$  的迹，而且就是  $a$  和  $b$  的内积。

## 5 度规张量和升降指标

欧几里得空间是一个定义了内积的线性空间。内积是用一个  $(2, 0)$  型对称张量（度规） $g(, )$  定义的，它还满足正定性，也就是

$$\forall x \neq 0, g(x, x) > 0 \quad (31)$$

显然像对一般张量的处理方式一样把  $g$  写成坐标形式，为  $g_{ij}$ 。

向量  $x$  的范数定义为  $\|x\| = \sqrt{g(x, x)}$ ，显然，用坐标形式写出来就是

$$\|x\| = \sqrt{g_{ij}x^ix^j} \quad (32)$$

一定存在一组基使得  $g_{ij} = \delta_{ij}$ ，这组基称为  $V$  的单位正交基。

度规可以让本体空间中的向量变到对偶空间去。考虑这样的映射

$$f_v : V \rightarrow \mathcal{F}, f_v(u) = g(v, u) \quad (33)$$

对每个选定的向量  $v$ ， $f_v$  都是  $V^*$  中的元素（对  $u$  的线性映射）。

度规张量和它的逆可以用来提升和下放一个张量的指标。张量指标的上升和下降操作定义为乘以度规的逆或者度规本身。但在平直的欧式空间中，只要好好选取坐标系，度规张量就是一个单位张量，于是，升降一个张量的指标不会带来数值上的区别，在这种情况下就可以把张量的所有角标全部写在下面。

## 6 张量的例子

我们最先接受的张量是转动惯量张量，它其实是一个二次型（对应一个  $(2, 0)$  对称张量），接受两个角速度，返回一个动能值

$$T = I(\vec{\omega}, \vec{\omega}) \quad (34)$$

其中  $\vec{\omega}$  是角速度矢量。而

$$\vec{J} = I(\vec{\omega}, ) \quad (35)$$

将角速度变到对应的角动量（由本体空间变到对偶空间，或者用微分几何的语言，由切空间变到余切空间。二班的同学应该对这两个名字还有印象）。

我们后来又遇到了应力张量，它是一个对称张量，接受两个方向，返回以其中一个方向为法向的面上朝另一个方向的应力分量

$$P = P(\vec{n}_1, \vec{n}_2) \quad (36)$$

张量的映射定义比基变换定义更为自然,这也说明,如果一个带几个角标的量可以代表一个实实在在的物理量,那它通常就是一个张量。

## 7 坐标变换

考虑一个  $(s, t)$  张量  $T(\cdots, v, \cdots; \cdots, f, \cdots)$ , 它在基  $\{e_i\}$  下的坐标表示为  $T_{\cdots i \cdots}^{\cdots j \cdots}$ , 那么当我们选取一组新基  $\{e'_i\}$  时, 张量的坐标表示又会变成什么样子呢?

回忆一下, 旧基下, 张量本身和它的坐标表示的关系为

$$\begin{aligned} T(\cdots, v, \cdots; \cdots, f, \cdots) &= \cdots v^i \cdots f_j \cdots T(\cdots, e_i, \cdots; \cdots, e^j, \cdots) \\ &\equiv \cdots v^i \cdots f_j \cdots T_{\cdots i \cdots}^{\cdots j \cdots} \end{aligned} \quad (37)$$

在新基下, 有  $e'_j = a^i_j e_i$  和  $e'^j = b^j_k e^k$ , 于是

$$\begin{aligned} T(\cdots, v, \cdots; \cdots, f, \cdots) &= T(\cdots, v'^i e'_i, \cdots; \cdots, f'_j e'^j, \cdots) \\ &= \cdots v'^i \cdots f'_j \cdots T(\cdots, e'_i, \cdots; \cdots, e'^j, \cdots) \\ &= \cdots v'^i f'_j \cdots a^k_i \cdots b^j_l \cdots T(\cdots, e_k, \cdots; \cdots, e^l, \cdots) \\ &= v'^i f'_j a^k_i b^j_l T_{\cdots k \cdots}^{\cdots l \cdots} \cdots \end{aligned} \quad (38)$$

于是有

$$T_{\cdots i \cdots}^{\cdots j \cdots} = \cdots a^k_i b^j_l T_{\cdots k \cdots}^{\cdots l \cdots} \quad (39)$$

也就是说, 张量上标按坐标变换规则变换  $b^j_l = \frac{\partial x'^j}{\partial x^l}$ , 下标按基底变换规则

变换 (坐标变换规则的逆)  $a^k_i = \frac{\partial e'_i}{\partial e^k} = \frac{\partial x^k}{\partial x'^i}$ 。这和课上讲的所谓张量识别定理是一样的。

## 8 张量计算练习

张量说着简单算着难, 你可以体验一下。

$\mathbb{R}^3$  内有单位双曲面  $\vec{x}(u, v) = (\cosh u \cos v, \cosh u \sin v, \sinh u)$ ,

1. 计算度规张量, 它的定义是  $(u, v)$  发生微小变化时,  $\vec{x}$  微小变化的长

度, 也即  $g_{ij} = \frac{\partial \vec{x}}{\partial u^i} \cdot \frac{\partial \vec{x}}{\partial u^j}$ 。其中  $(u^1, u^2) = (u, v)$ 。



2. 计算度规张量的逆  $g^{kl}$ 。
3. 计算仿射联络  $\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2}g^{lk}(\frac{\partial g_{il}}{\partial u^j} + \frac{\partial g_{jl}}{\partial u^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial u^l})$  (一共 8 个分量)。
4. 写出测地线方程  $\frac{d^2 u^k}{ds^2} + \Gamma_{ij}^k \frac{du^i}{ds} \frac{du^j}{ds} = 0$  (2 个方程)。
5. 计算黎曼曲率张量  $R_{ijk}^l = \partial_k \Gamma_{ij}^l - \partial_j \Gamma_{ik}^l + \Gamma_{ij}^m \Gamma_{km}^l - \Gamma_{ik}^m \Gamma_{jm}^l$  (give it up, for life is short.)。