

**Aufgabe 1: Gleichverteilung – Startverzögerung eines Batch-Jobs**

In einem Rechenzentrum startet ein nächtlicher ETL-Batch-Job wegen Scheduler-Jitter nicht exakt um 02:00, sondern mit einer zufälligen Verzögerung  $X$  (in Minuten). Man modelliert:

$$X \sim U(0, 12)$$

also gleichverteilt zwischen 0 und 12 Minuten.

Zusätzlich verursacht jede Verzögerungsminute im Reportingprozess Opportunitätskosten von **40 € pro Minute**.  
Definiere die Kosten  $C = 40X$ .

1. Berechne  $P(X \leq 5)$ .
2. Berechne  $E[X]$ ,  $\text{Var}(X)$  und die Standardabweichung  $s_X$ .
3. Bestimme ein 95%-Quantil  $q_{0,95}$ , so dass  $P(X \leq q_{0,95}) = 0,95$ . (Interpretation: so viel Puffer, dass der Job in 95% der Nächte gestartet ist.)
4. Berechne den Erwartungswert der Kosten  $E[C]$ .
5. Berechne  $P(C > 300)$ .

**Aufgabe 4: Poisson-Verteilung – Anzahl kritischer Incidents pro Woche**

Ein IT-Service-Team beobachtet kritische Incidents (Severity 1). Im Mittel treten

$$\lambda = 2,5$$

Incidents pro Woche auf. Modell:

$$X \sim \text{Pois}(2,5)$$

1. Berechne  $P(X = 0)$ .
2. Berechne  $P(X \leq 2)$ .
3. Berechne  $P(X \geq 5)$ .
4. Bestimme  $E[X]$  und  $\text{Var}(X)$ .
5. Ein Incident verursacht im Mittel 800 € Aufwand. Bestimme den erwarteten Wochenaufwand.

**Aufgabe 2: Normalverteilung – API-Antwortzeit und SLA**

Die Antwortzeit  $X$  (in ms) eines zentralen API-Endpoints wird während Peak-Last näherungsweise normalverteilt modelliert:

$$X \sim \mathcal{N}(220, 40^2)$$

Also:  $\mu = 220$  ms,  $\sigma = 40$  ms.

1. Berechne  $P(X > 300)$  (SLA-Verstoß bei 300 ms).
2. Berechne  $P(200 \leq X \leq 260)$ .
3. Bestimme den Wert  $t$ , so dass 95% der Antwortzeiten unter  $t$  liegen (95%-Quantil).
4. Ein SLA fordert: „Mindestens 95% der Requests müssen unter 280 ms sein.“ Prüfe, ob das Modell dies erfüllt.

Hinweis: Standardnormalwerte (typisch aus Tabelle/Excel):  
 $\Phi(2,00) = 0,9772$ ,  $\Phi(1,00) = 0,8413$ ,  $\Phi(0,50) = 0,6915$ ,  $\Phi(1,50) = 0,9332$ ,  $z_{0,95} = 1,645$   
und  $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$ .

**Aufgabe 5: Exponentialverteilung – Zeit bis zum nächsten Incident**

Ein Monitoring-System registriert kritische Incidents. Im Mittel treten **2 Incidents pro Stunde** auf. Die Wartezeit  $T$  bis zum nächsten Incident wird modelliert als exponentialverteilt mit Rate

$$\lambda = 2 \text{ pro Stunde}$$

also:

$$T \sim \text{Exp}(2)$$

1. Berechne  $E[T]$  (in Minuten).
2. Berechne  $P(T \leq 15 \text{ Minuten})$ .
3. Berechne  $P(T > 60 \text{ Minuten})$ .
4. Gedächtnislosigkeit: Berechne  $P(T > 50 \text{ Minuten} \mid T > 20 \text{ Minuten})$ .
5. Bestimme die Median-Wartezeit  $t_{0,5}$ , so dass  $P(T \leq t_{0,5}) = 0,5$ .

**Aufgabe 3: Binomialverteilung – Fehler in Datenimport (ETL/ERP)**

Beim Import von Datensätzen ins ERP sind einzelne Datensätze mit Wahrscheinlichkeit  $p = 0,08$  fehlerhaft (unabhängig voneinander).  
Es werden  $n = 12$  Datensätze stichprobenartig geprüft.

Sei  $X$  = Anzahl fehlerhafter Datensätze in der Stichprobe.

$$X \sim \text{Bin}(n = 12, p = 0,08)$$

1. Berechne  $P(X = 0)$ .
2. Berechne  $P(X \leq 1)$  (Qualitätsregel: „maximal 1 Fehler erlaubt“).
3. Berechne  $P(X \geq 3)$  (Alarmregel: „mindestens 3 Fehler“).
4. Berechne  $E[X]$  und  $\text{Var}(X)$  und interpretiere sie.

1. 
$$P(X \leq x) = \frac{x-a}{b-a} = \frac{x-0}{12-0} = \frac{x}{12} \quad P(X \leq 5) = \frac{5}{12} = 0,42$$

$$E[X] = \frac{a+b}{2} = \frac{12}{2} = 6 \quad \text{Var}[X] = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{144}{12} = 12 \quad \sigma(X) = \sqrt{12} = 3,46$$
$$P(X \leq 9,95) = 0,95 = \frac{x}{12} \rightarrow x_{0,95} = 12 \cdot 0,95 = 11,4 \text{ Minuten}$$
$$E(C) = E[40 \cdot X] = 40 \cdot E[X] = 40 \cdot 6 = 240 \text{ €}$$
$$P(C > 300) = P(40X > 300) = P(X > \frac{300}{40}) = P(X > 7,5) = \frac{12-7,5}{12} = 0,37$$

2. 
$$Z = \frac{x-\mu}{\sigma} = \frac{x-220}{40} \sim N(0,1)$$

$$P(X > 300) = P\left(Z > \frac{300-220}{40}\right) = P(Z > 2) = 1 - P(Z < 2) = 0,0228$$
$$P(200 < X < 260) = P\left(\frac{200-220}{40} < Z < \frac{260-220}{40}\right) = P(-0,5 < Z < 1) =$$
$$= P(Z < 1) - P(Z < -0,5) = 0,5328$$

Tabelle

$$P(Z < Z_{0.95}) = 0.95 \rightarrow Z_{0.95} = 1.645 = \frac{x - 220}{40} \rightarrow x = 286$$

75 ms

FORDERUNG

$$P(X \leq 280) > 0.95 \rightarrow P\left(Z \leq \frac{280 - 220}{40}\right) = 0.933 < 0.95$$

Das Modell erfüllt die Anforderung nicht.

3. 
$$P(X = k) = \binom{12}{k} (0.08)^k (1 - 0.08)^{12-k}$$

$$P(X=0) = \underbrace{\binom{12}{0}}_1 \underbrace{(0.08)^0}_1 (0.92)^{12} = 0.3677$$

$$P(X \leq 1) = P(X=0) + P(X=1) = 0.3677 + \binom{12}{1} (0.08)^1 (0.92)^{11} = 0.75$$

$$\begin{aligned} P(X > 3) &= 1 - P(X < 3) = 1 - [P(X=0) + P(X=1) + P(X=2)] = \\ &= 1 - \left[ 0.75 + \binom{12}{2} (0.08)^2 (0.92)^{10} \right] = 0.065 \end{aligned}$$

$$E(X) = n \cdot p = 12 \cdot 0.08 = 0.96$$

$$VAR(X) = n \cdot p \cdot (1-p) = 12 \cdot 0.08 \cdot 0.92 = 0.883$$

4. 
$$P(X = k) = e^{-2.5} \cdot \frac{2.5^k}{k!}$$

$$P(X=0) = e^{-2.5} \cdot \frac{2.5^0}{0!} = 0.082$$

$$\begin{aligned} P(X \leq 2) &= P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) = 0.082 + e^{-2.5} \cdot \frac{2.5^1}{1!} + e^{-2.5} \cdot \frac{2.5^2}{2!} \\ &= 0.544 \end{aligned}$$

$$P(X > 5) = 1 - P(X \leq 4) = 1 - \left[ 0.544 + P(X=3) + P(X=4) \right] =$$

$$= 1 - \left[ 0.544 + e^{-2.5} \cdot \frac{2.5^3}{3!} + e^{-2.5} \cdot \frac{2.5^4}{4!} \right] = 0.11$$

$$E(X) = \text{VAR}(X) = \lambda = 2.5$$

$$E(\text{KOSTEN}) = E(800X) = 800 \cdot E(X) = 800 \cdot \lambda = 2000 \text{ €}$$

5.  $\lambda = 2 \text{ pro Stunde} \rightarrow \begin{cases} 15 \text{ Min} \rightarrow \lambda_{15}^* = 0.5 \\ 20 \text{ Min} \rightarrow \lambda_{20}^* = \frac{2}{3} \\ 50 \text{ Min} \rightarrow \lambda_{50}^* = \frac{5}{6} \cdot 2 = \frac{5}{3} \end{cases}$

$$E[T] = \frac{1}{\lambda} = 0.5 \text{ Std} = 30 \text{ Minuten}$$

$$P(T \leq t) = 1 - e^{-\lambda t} = 1 - e^{-2t}$$

$$P(T \leq 0.25) = 1 - e^{-2 \cdot 0.25} = 0.39$$

$$P(T > t) = 1 - [1 - e^{-\lambda t}] = e^{-\lambda t}$$

$$P(T > 60) = e^{-2 \cdot 1} = e^{-2} = 0.135$$

Gedächtnislosigkeit:  $P(T > s+t | T > s) = P(T > t)$

$$P(T > 50 | T > 20) = P(t = 50 - 20 = 30) = P(T > 0.5 \text{ h}) =$$

$$= e^{-2 \cdot 0.5} = e^{-1} = 0.368$$

Interpretation: auch wenn schon 20 Min nichts passiert ist, bleibt die Restwartezeitverteilung gleich.

$$P(T < t_{0.5}) = 0.5 = 1 - e^{-2 \cdot t_{0.5}} \rightarrow e^{-2 \cdot t_{0.5}} = 0.5 \rightarrow$$

$$\rightarrow -2 \cdot t_{0.5} = \ln 0.5 \rightarrow t_{0.5} = \frac{\ln 0.5}{-2} = 0.3466 \text{ h} \approx 20.8 \text{ Minuten}$$

