

Cálculo Diferencial

Tecnológico Nacional de México

Carlos E. Martínez Rodríguez

Índice

1. Números reales	2
1.1. Subtemas	2
2. Funciones	3
2.1. Subtemas	3
3. Límites y continuidad	3
3.1. Subtemas	4
4. Derivadas	4
4.1. Subtemas	4
5. Aplicaciones de la derivada	5
5.1. Subtemas	5
6. Planeación	5
7. Criterios generales de evaluación	5
8. Bibliografía básica	6
9. El conjunto de los números reales	7

Información del Curso

- **Asignatura:** Cálculo Diferencial.
- **Clave:** ACF-0901.
- **Horas teoría-práctica-créditos:** 3-2-5.



Escanea el código QR para consultar el temario del curso.

Objetivo general del curso

El curso tiene como propósito que el/la estudiante **plantee y resuelva problemas utilizando las definiciones de límite y derivada de funciones de una variable para la elaboración de modelos matemáticos aplicados.**

1. Números reales

Objetivos: Aplicar las propiedades de los números reales, las desigualdades de primer y segundo grado con una incógnita y las desigualdades con valor absoluto, representando sus soluciones de manera gráfica y analítica.

1.1. Subtemas

1. Propiedades de los números reales.
2. Ecuaciones y desigualdades en los números reales.

3. Desigualdades lineales.
4. Desigualdades cuadráticas.
5. Desigualdades con valor absoluto.
6. Interpretación geométrica de desigualdades del tipo $|x - a| < b$.
7. Planteamiento y resolución de problemas mediante desigualdades.
8. Distinción entre números racionales y números reales mediante el axioma del supremo.

Tiempo previsto: La planeación considera **13 horas** para esta unidad: una hora para presentación y evaluación diagnóstica y 12 horas efectivas de clase.

2. Funciones

Objetivos: Analizar la definición de función real e identificar distintos tipos de funciones y sus representaciones gráficas para plantear modelos.

2.1. Subtemas

1. Concepto de función real.
2. Evaluación de funciones.
3. Representación gráfica de funciones.
4. Identificación y distinción de diferentes tipos de funciones.
5. Operaciones con funciones.
6. Obtención de funciones a partir del planteamiento de problemas simples.
7. Uso de funciones para la construcción de modelos elementales.

Tiempo previsto: La planeación considera **19 horas** para esta unidad: 18 horas de clase efectiva y una hora de examen escrito.

3. Límites y continuidad

Objetivos: Utilizar la definición de límite de funciones para determinar analíticamente la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, así como mostrar gráficamente diferentes tipos de discontinuidad.

3.1. Subtemas

1. Concepto de límite de una función.
2. Interpretación gráfica del límite.
3. Aplicación de la definición de límite a funciones lineales y cuadráticas.
4. Cálculo de límites de funciones elementales mediante teoremas.
5. Uso del límite para determinar el comportamiento de una función.
6. Concepto de continuidad en un punto y en un intervalo.
7. Identificación de discontinuidades mediante la definición.
8. Representación gráfica de diferentes tipos de discontinuidad.

Tiempo previsto: La planeación considera **13 horas** para esta unidad: 12 horas de clase efectiva y una hora para examen escrito.

4. Derivadas

Objetivos: Utilizar la definición de derivada para el análisis de funciones y el cálculo de derivadas.

4.1. Subtemas

1. Concepto de derivada.
2. Cálculo de derivadas mediante la definición.
3. Interpretación geométrica de la derivada.
4. Interpretación física de la derivada.
5. Propiedades y teoremas de la derivada.
6. Cálculo de derivadas utilizando reglas y propiedades.
7. Derivación de funciones compuestas.
8. Derivación implícita.

Tiempo previsto: La planeación contempla **17 horas** para esta unidad: 16 horas de clase efectiva y una hora para examen escrito.

5. Aplicaciones de la derivada

Objetivos: Aplicar la derivada en la solución de problemas de optimización y de variación de funciones, y utilizar diferenciales en problemas que requieren aproximaciones.

5.1. Subtemas

1. Teorema del valor medio.
2. Aplicación de la derivada a problemas.
3. Análisis de la variación de una función.
4. Análisis e interpretación de la gráfica de una función mediante derivadas.
5. Problemas de optimización.
6. Concepto de diferencial.
7. Aplicación de diferenciales a problemas de aproximación.

Tiempo previsto: La planeación considera **18 horas** para esta unidad: 16 horas de clase efectiva y dos horas destinadas a evaluaciones escritas, una correspondiente al tema de derivadas y otra al tema de aplicaciones de la derivada.

6. Planeación

Unidad	Horas previstas
1. Números reales	13
2. Funciones	19
3. Límites y continuidad	13
4. Derivadas	17
5. Aplicaciones de la derivada	18
Total	80

7. Criterios generales de evaluación

En cada unidad se establece, de manera general, la siguiente ponderación:

- **70 %:** evaluación temática.
- **30 %:** actividades de aprendizaje a criterio del docente.

Las actividades de enseñanza y aprendizaje contemplan la participación activa en clase, trabajo extra-clase, resolución de ejercicios, atención de dudas y evaluación escrita.

8. Bibliografía básica

- Larson, Hostetler, Edwards, Cálculo I, Pirámide, 2002, 7a.
- Hughes-Hallett, Gleason et al., Cálculo aplicado, CECSA, 2003, 1a.
- Leithold, El cálculo, Oxford, 2003, 7a.
- Thomas, Finney, Cálculo. Una variable, Addison Wesley Longman, 1999, 9na.
- Stewart, Cálculo. Trascendentes tempranas, Thomson, 2002, 4ta.
- Swokowski, Cálculo con Geometría Analítica, Iberoamérica, 1989, 2da.

9. El conjunto de los números reales



Escanea el código QR para acceder a las notas del curso.

Notas para el curso de Cálculo Diferencial

Unidad 1: El Conjunto de los Números Reales

Carlos Ernesto Martínez

Índice

1. Los números reales	4
1.1. Campos	4
1.2. Orden de los números reales	8
1.3. Campo ordenado	10
2. Pre-requisitos	10
2.1. Ecuaciones de la forma $ax + b = cx + d$	10
3. Desigualdades	13
3.1. Elementos básicos	13
3.2. Solución de desigualdades de primer grado	21
3.2.1. Solución de desigualdades del tipo: $ax + b > c$	21
3.2.2. Solución de desigualdades del tipo: $ax + b > c$, con coeficientes fraccionarios	22
3.2.3. Solución de desigualdades del tipo: $ax + b < c$	23
3.2.4. Solución de desigualdades del tipo: $ax + b < c$ con coeficientes fraccionarios	23
3.2.5. Solución de desigualdades del tipo: $ax + b \geq c$	24
3.2.6. Solución de desigualdades del tipo: $ax + b \geq c$, con coeficientes fraccionarios	25
3.2.7. Solución de desigualdades del tipo: $ax + b \leq c$	25
3.2.8. Solución de desigualdades del tipo: $ax + b \leq c$ con coeficientes fraccionarios.	26

3.3. Solución de desigualdades con doble desigualdad.	27
3.3.1. Solución de desigualdades del tipo: $c < ax + b < d$	27
3.3.2. Solución de desigualdades del tipo: $c < ax + b \leq d$	27
3.3.3. Solución de desigualdades del tipo: $c \leq ax + b < d$	28
3.3.4. Solución de desigualdades del tipo: $c \leq ax + b \leq d$	29
3.4. Solución de desigualdades con valor absoluto	29
3.4.1. Solución de desigualdades del tipo: $ ax + b < d$	29
3.4.2. Solución de desigualdades del tipo: $ ax + b \leq d$	30
3.4.3. Solución de desigualdades del tipo: $ ax + b > d$	31
3.4.4. Solución de desigualdades del tipo: $ ax + b \geq d$	32
3.5. Ejercicios adicionales	32
3.6. Solución de desigualdades de segundo grado	35
3.6.1. Solución de desigualdades del tipo $ax^2 + bx + c > 0$	35
3.6.2. Solución de desigualdades del tipo $ax^2 + bx + c \geq 0$	36
3.6.3. Solución de desigualdades del tipo $ax^2 + bx + c < 0$	36
3.6.4. Solución de desigualdades del tipo $ax^2 + bx + c \leq 0$	37
3.7. Ejercicios adicionales	38
4. Tarea 1	40
5. Completitud de los números reales	47
5.1. Conjuntos acotados	48
5.2. Máximo y mínimo	48
5.3. Supremo	49
5.4. Ínfimo	50
5.5. Axioma de completitud	50
5.6. ¿Por qué los racionales no son completos?	51
6. Apéndice: Ecuación general de segundo grado	51
6.1. Factorización	51
6.1.1. Factorización simple	52
6.1.2. Factorización por binomios conjugados	52

6.1.3. Ejercicios varios	53
6.1.4. Factorización por trinomio cuadrado perfecto	53
6.1.5. Método de factorización simple	54
6.1.6. Método de Binomio Conjugado	54
6.1.7. Método de trinomio cuadrado perfecto	54
6.2. Método de Fórmula general	55



Escanea el código QR para acceder a las notas de esta unidad.

1. Los números reales

El Cálculo Diferencial se desarrolla fundamentalmente sobre el conjunto de los números reales, que se denotan por

$$\mathbb{R}.$$

Antes de estudiar funciones, límites, continuidad y derivadas, es conveniente recordar las propiedades algebraicas fundamentales de este conjunto.

Los números reales contienen, entre otros, a los números naturales, enteros y racionales:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

Desde el punto de vista algebraico, una de las propiedades fundamentales de $\mathbb{R}$ es que constituye un *campo*. Esto significa que en $\mathbb{R}$ están definidas dos operaciones, la suma y el producto, que satisfacen ciertas propiedades llamadas *axiomas de campo*.

1.1. Campos

Definición. Un conjunto no vacío F , equipado con dos operaciones

$$+: F \times F \longrightarrow F, \quad \cdot: F \times F \longrightarrow F,$$

se denomina *campo* si las operaciones de suma y producto satisfacen los siguientes axiomas.

Axiomas de la suma

Para cualesquiera $a, b, c \in F$ se cumplen las siguientes propiedades.

A1. Cerradura de la suma.

$$a + b \in F.$$

A2. Asociatividad de la suma.

$$(a + b) + c = a + (b + c).$$

A3. Conmutatividad de la suma.

$$a + b = b + a.$$

A4. Existencia del elemento neutro aditivo.

Existe un elemento $0 \in F$ tal que

$$a + 0 = 0 + a = a$$

para todo $a \in F$.

A5. Existencia del inverso aditivo.

Para cada $a \in F$ existe un elemento $-a \in F$ tal que

$$a + (-a) = (-a) + a = 0.$$

El elemento $-a$ recibe el nombre de *inverso aditivo* u *opuesto* de a .

Axiomas del producto

Para cualesquiera $a, b, c \in F$ se cumplen las siguientes propiedades.

M1. Cerradura del producto.

$$ab \in F.$$

M2. Asociatividad del producto.

$$(ab)c = a(bc).$$

M3. Conmutatividad del producto.

$$ab = ba.$$

M4. Existencia del elemento neutro multiplicativo.

Existe un elemento $1 \in F$, con $1 \neq 0$, tal que

$$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$$

para todo $a \in F$.

M5. Existencia del inverso multiplicativo.

Para cada $a \in F$, con $a \neq 0$, existe un elemento $a^{-1} \in F$ tal que

$$aa^{-1} = a^{-1}a = 1.$$

El elemento a^{-1} también se denota por

$$\frac{1}{a}.$$

Por esta razón, para $a, b \in F$ con $b \neq 0$, la división puede definirse mediante

$$\frac{a}{b} = ab^{-1}.$$

Axioma distributivo

Las operaciones de suma y producto no son independientes. Se relacionan mediante la propiedad distributiva.

Para cualesquiera $a, b, c \in F$,

$$a(b + c) = ab + ac.$$

Por la conmutatividad del producto también se obtiene

$$(a + b)c = ac + bc.$$

Esta propiedad establece la relación fundamental entre la estructura aditiva y la estructura multiplicativa del campo.

Los números reales como campo

El conjunto de los números reales $\mathbb{R}$, equipado con las operaciones usuales de suma y multiplicación, satisface todos los axiomas anteriores. Por lo tanto,

$\mathbb{R}$ es un campo.

Esto significa, entre otras cosas, que si $a, b \in \mathbb{R}$, entonces podemos sumar, restar y multiplicar estos números sin abandonar $\mathbb{R}$; además, podemos dividirlos siempre que el divisor sea distinto de cero.

En efecto, las operaciones de resta y división no necesitan introducirse como operaciones independientes, pues pueden definirse a partir de la suma, el producto y los inversos:

$$a - b = a + (-b),$$

y, si $b \neq 0$,

$$\frac{a}{b} = ab^{-1}.$$

Propiedades de los números reales

A partir de los axiomas anteriores pueden demostrarse muchas de las reglas algebraicas que utilizamos habitualmente. Es importante señalar que estas reglas no constituyen nuevos axiomas: son consecuencias lógicas de los axiomas de campo.

Por ejemplo, para cualesquiera $a, b \in F$:

$$\begin{aligned}a \cdot 0 &= 0, \\ (-a)b &= -(ab), \\ (-a)(-b) &= ab, \\ a(-b) &= -(ab).\end{aligned}$$

Asimismo, si

$$ab = 0,$$

entonces necesariamente

$$a = 0 \quad \text{o} \quad b = 0.$$

Esta última propiedad se conoce como la *propiedad del producto cero*.

Otros ejemplos de campos

Los números reales no son el único ejemplo de campo. El conjunto de los números racionales

$$\mathbb{Q}$$

también constituye un campo con las operaciones usuales.

De manera similar, el conjunto de los números complejos

$$\mathbb{C}$$

es un campo.

En consecuencia,

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C},$$

y cada uno de estos conjuntos posee una estructura de campo.

En cambio, los conjuntos $\mathbb{N}$ y $\mathbb{Z}$ no son campos. Por ejemplo, en $\mathbb{Z}$ un elemento distinto de cero no necesariamente posee inverso multiplicativo dentro de $\mathbb{Z}$. Si consideramos $2 \in \mathbb{Z}$, su inverso multiplicativo sería

$$\frac{1}{2},$$

pero

$$\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}.$$

Por tanto, $\mathbb{Z}$ no satisface todos los axiomas de campo.

1.2. Orden de los números reales

La estructura de campo describe las propiedades algebraicas de los números reales, pero no permite, por sí sola, comparar sus elementos. Para ello es necesario introducir una relación de orden.

En $\mathbb{R}$ consideramos la relación

$$\leq,$$

que permite comparar dos números reales. Si $a, b \in \mathbb{R}$, la expresión

$$a \leq b$$

se interpreta como “ a es menor o igual que b ”.

La relación de orden satisface los siguientes axiomas.

Axiomas de orden

Para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{R}$:

O1. Reflexividad.

$$a \leq a.$$

O2. Antisimetría.

Si

$$a \leq b \quad \text{y} \quad b \leq a,$$

entonces

$$a = b.$$

O3. Transitividad.

Si

$$a \leq b \quad \text{y} \quad b \leq c,$$

entonces

$$a \leq c.$$

O4. Orden total.

Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$,

$$a \leq b \quad \text{o} \quad b \leq a.$$

La última propiedad significa que cualesquiera dos números reales pueden compararse.

Definimos además el orden estricto mediante

$$a < b$$

si y sólo si

$$a \leq b \quad \text{y} \quad a \neq b.$$

Compatibilidad del orden con las operaciones

Para que el orden sea compatible con la estructura algebraica del campo, debe relacionarse adecuadamente con la suma y el producto.

Compatibilidad con la suma

Si

$$a \leq b,$$

entonces, para todo $c \in \mathbb{R}$,

$$a + c \leq b + c.$$

Es decir, sumar el mismo número a ambos miembros de una desigualdad preserva el orden.

En particular,

$$a \leq b \implies a - b \leq 0.$$

También,

$$a \leq b \implies -a \geq -b.$$

Por tanto, al multiplicar una desigualdad por -1 , el sentido de la desigualdad se invierte.

Compatibilidad con el producto

Si

$$a \leq b \quad \text{y} \quad 0 \leq c,$$

entonces

$$ac \leq bc.$$

Por tanto, multiplicar una desigualdad por un número positivo preserva el orden.

En cambio, si

$$a \leq b \quad \text{y} \quad c < 0,$$

entonces

$$ac \geq bc.$$

Es decir, multiplicar una desigualdad por un número negativo invierte el sentido de la desigualdad.

Estas propiedades serán fundamentales cuando estudiemos desigualdades.

1.3. Campo ordenado

Definición. Un campo F equipado con una relación de orden total $\leq$ compatible con las operaciones de suma y producto se denomina un *campo ordenado*.

El conjunto de los números reales satisface estas propiedades. Por tanto,

$\mathbb{R}$ es un campo ordenado.

El conjunto de los números racionales $\mathbb{Q}$ también es un campo ordenado.

Por consiguiente, la propiedad de ser un campo ordenado todavía no permite distinguir esencialmente a $\mathbb{R}$ de $\mathbb{Q}$.

Para encontrar la propiedad fundamental que los distingue necesitamos introducir el concepto de completitud.

Caracterización de los números reales

Las propiedades estudiadas pueden resumirse diciendo que el sistema de los números reales posee tres estructuras fundamentales:

1. una estructura algebraica dada por los axiomas de campo;
2. una estructura de orden compatible con las operaciones del campo;
3. una propiedad de completitud expresada mediante el axioma del supremo.

En este sentido, podemos caracterizar a los números reales como un *campo ordenado completo*:

$\mathbb{R}$ es un campo ordenado completo.

Esta propiedad constituye uno de los fundamentos del Cálculo y permitirá, más adelante, justificar rigurosamente conceptos como convergencia, límites, continuidad y derivación.

2. Pre-requisitos

2.1. Ecuaciones de la forma $ax + b = cx + d$

1. Resuelve las siguientes ecuaciones

I. $2x + 3 = 4x - 1$

II. $-5x - 2 = 3x + 7$

- III. $8x + 6 = -2x - 4$
- IV. $-4x + 9 = 2x + 1$
- V. $6x - 5 = -3x + 2$
- VI. $-7x + 10 = 5x - 8$
- VII. $9x - 12 = -6x + 15$
- VIII. $-3x + 4 = 7x + 2$
- IX. $11x + 13 = -9x - 15$
- X. $-2x - 1 = 4x + 6$
- XI. $12x - 8 = -10x + 14$
- XII. $-6x + 7 = 8x - 9$
- XIII. $5x - 3 = -7x + 11$
- XIV. $-13x + 16 = 15x - 18$
- XV. $14x + 20 = -16x - 22$

2. Resuelve las siguientes ecuaciones de la forma $\frac{a}{b}x + \frac{c}{d} = \frac{e}{f}$

- I. $\frac{2}{3}x - \frac{5}{4} = \frac{7}{6}$
- II. $-\frac{1}{2}x + \frac{3}{5} = -\frac{4}{7}$
- III. $\frac{7}{8}x + \frac{9}{10} = -\frac{11}{12}$
- IV. $-\frac{3}{4}x - \frac{6}{7} = \frac{9}{10}$
- V. $\frac{4}{5}x - \frac{2}{3} = -\frac{1}{6}$
- VI. $-\frac{5}{6}x + \frac{8}{9} = \frac{11}{12}$
- VII. $\frac{6}{7}x + \frac{1}{2} = -\frac{4}{9}$
- VIII. $-\frac{9}{10}x - \frac{7}{8} = \frac{5}{6}$
- IX. $\frac{11}{12}x + \frac{10}{11} = -\frac{9}{10}$
- X. $-\frac{2}{3}x - \frac{5}{6} = \frac{7}{8}$
- XI. $\frac{3}{4}x - \frac{4}{5} = -\frac{1}{2}$
- XII. $-\frac{5}{6}x + \frac{7}{8} = \frac{9}{10}$
- XIII. $\frac{6}{7}x + \frac{8}{9} = -\frac{10}{11}$
- XIV. $-\frac{4}{5}x - \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$
- XV. $\frac{9}{10}x + \frac{1}{3} = -\frac{5}{6}$

3. Resuelve las siguientes ecuaciones de la forma $\frac{a}{b}x + \frac{c}{d} = \frac{e}{f}x + \frac{g}{h}$

- I. $\frac{3}{5}x - \frac{4}{7} = \frac{8}{9}x + \frac{2}{3}$
- II. $-\frac{7}{8}x + \frac{6}{11} = -\frac{5}{6}x - \frac{3}{4}$

- III. $\frac{9}{10}x + \frac{7}{12} = -\frac{4}{5}x + \frac{1}{3}$
 IV. $-\frac{5}{6}x - \frac{2}{3} = \frac{3}{4}x - \frac{1}{2}$
 V. $\frac{4}{7}x - \frac{5}{8} = -\frac{6}{9}x + \frac{7}{10}$
 VI. $-\frac{11}{12}x + \frac{8}{9} = \frac{7}{10}x - \frac{6}{7}$
 VII. $\frac{2}{3}x + \frac{9}{11} = -\frac{1}{2}x + \frac{4}{5}$
 VIII. $-\frac{7}{8}x - \frac{6}{7} = \frac{5}{6}x - \frac{3}{5}$
 IX. $\frac{5}{6}x + \frac{4}{5} = -\frac{3}{4}x + \frac{2}{3}$
 X. $-\frac{1}{2}x - \frac{3}{4} = \frac{5}{6}x - \frac{7}{8}$
 XI. $\frac{9}{10}x - \frac{8}{9} = -\frac{7}{8}x + \frac{6}{7}$
 XII. $-\frac{4}{5}x + \frac{3}{4} = \frac{2}{3}x - \frac{1}{2}$
 XIII. $\frac{1}{3}x + \frac{5}{7} = -\frac{9}{10}x + \frac{8}{9}$
 XIV. $-\frac{6}{7}x - \frac{4}{5} = \frac{2}{3}x - \frac{1}{2}$
 XV. $\frac{7}{8}x + \frac{6}{11} = -\frac{5}{6}x + \frac{3}{4}$

4. Resuelve las siguientes ecuaciones de la forma $\frac{a}{b} + \left\{ \frac{c}{d} \left[\frac{e}{f} \left(\frac{i}{j} + \frac{k}{l} \right) + \frac{g}{h} \left(\frac{m}{n} + \frac{o}{p} \right) + \frac{q}{r} \right] \right\} = \frac{s}{t} \left(\frac{u}{v} + \frac{w}{x} \right) + \frac{y}{z}$

- I. $\frac{3}{4} + \left\{ \frac{2}{5} \left[\frac{5}{6} \left(\frac{2}{3}x + \frac{4}{5} \right) + \frac{7}{8} \left(\frac{3}{4}x + \frac{5}{6} \right) + \frac{1}{2} \right] \right\} = \frac{9}{10} \left(\frac{4}{5}x + \frac{6}{7} \right) + \frac{1}{3} + \frac{4}{5}x$
 II. $\frac{5}{6} - \left\{ -\frac{3}{4} \left[-\frac{4}{5} \left(-\frac{2}{3}x - \frac{5}{6} \right) - \frac{6}{7} \left(-\frac{3}{4}x + \frac{7}{8} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = -\frac{8}{9} \left(-\frac{4}{5}x + \frac{9}{10} \right) - \frac{1}{4} - \frac{5}{6}x$
 III. $-\frac{4}{5} + \left\{ \frac{7}{8} \left[\frac{2}{3} \left(\frac{5}{6}x - \frac{3}{4} \right) + \frac{4}{5} \left(\frac{6}{7}x + \frac{8}{9} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = \frac{3}{4} \left(\frac{4}{5}x + \frac{7}{8} \right) - \frac{5}{6} - \frac{2}{3}x$
 IV. $\frac{3}{4} - \left\{ \frac{6}{7} \left[\frac{5}{6} \left(\frac{3}{4}x - \frac{4}{5} \right) + \frac{7}{8} \left(\frac{2}{3}x - \frac{5}{6} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = \frac{9}{10} \left(\frac{4}{5}x + \frac{6}{7} \right) - \frac{1}{3} + \frac{4}{5}x$
 V. $-\frac{6}{7} + \left\{ \frac{2}{3} \left[-\frac{4}{5} \left(\frac{5}{6}x + \frac{6}{7} \right) - \frac{7}{8} \left(\frac{3}{4}x + \frac{4}{5} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = -\frac{8}{9} \left(\frac{2}{3}x - \frac{6}{7} \right) - \frac{1}{4} - \frac{3}{5}x$
 VI. $\frac{7}{8} - \left\{ \frac{5}{6} \left[\frac{3}{4} \left(\frac{2}{3}x - \frac{5}{6} \right) - \frac{6}{7} \left(-\frac{5}{6}x + \frac{3}{4} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = -\frac{4}{5} \left(\frac{3}{4}x + \frac{8}{9} \right) - \frac{2}{3} + \frac{7}{8}x$
 VII. $-\frac{4}{5} + \left\{ \frac{7}{8} \left[\frac{5}{6} \left(\frac{3}{4}x - \frac{2}{3} \right) + \frac{4}{5} \left(\frac{6}{7}x - \frac{5}{6} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = \frac{3}{4} \left(\frac{2}{3}x + \frac{7}{8} \right) - \frac{1}{6} - \frac{2}{5}x$
 VIII. $\frac{3}{4} - \left\{ \frac{2}{3} \left[\frac{5}{6} \left(\frac{4}{5}x - \frac{7}{8} \right) + \frac{7}{8} \left(\frac{5}{6}x + \frac{4}{5} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = \frac{9}{10} \left(\frac{5}{6}x + \frac{6}{7} \right) + \frac{1}{4} - \frac{4}{5}x$
 IX. $-\frac{6}{7} + \left\{ \frac{4}{5} \left[\frac{2}{3} \left(\frac{5}{6}x + \frac{7}{8} \right) + \frac{7}{8} \left(\frac{4}{5}x - \frac{2}{3} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = \frac{8}{9} \left(\frac{3}{4}x - \frac{6}{7} \right) - \frac{1}{5} - \frac{5}{6}x$
 X. $\frac{7}{8} + \left\{ -\frac{5}{6} \left[\frac{3}{4} \left(\frac{4}{5}x - \frac{6}{7} \right) + \frac{6}{7} \left(\frac{5}{6}x + \frac{3}{4} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = -\frac{4}{5} \left(\frac{4}{5}x + \frac{5}{6} \right) - \frac{2}{3} + \frac{7}{8}x$
 XI. $-\frac{4}{5} - \left\{ \frac{7}{8} \left[\frac{2}{3} \left(-\frac{5}{6}x - \frac{7}{8} \right) + \frac{4}{5} \left(\frac{6}{7}x - \frac{5}{6} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = -\frac{3}{4} \left(\frac{5}{6}x - \frac{7}{8} \right) - \frac{1}{7} - \frac{6}{7}x$
 XII. $-\frac{3}{4} + \left\{ -\frac{2}{3} \left[\frac{5}{6} \left(\frac{4}{5}x + \frac{7}{8} \right) + \frac{7}{8} \left(\frac{5}{6}x - \frac{4}{5} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = \frac{9}{10} \left(-\frac{5}{6}x + \frac{4}{5} \right) - \frac{1}{8} + \frac{7}{8}x$
 XIII. $-\frac{6}{7} - \left\{ \frac{4}{5} \left[\frac{2}{3} \left(\frac{5}{6}x - \frac{2}{3} \right) + \frac{7}{8} \left(\frac{4}{5}x + \frac{7}{8} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = -\frac{8}{9} \left(\frac{6}{7}x + \frac{4}{5} \right) - \frac{1}{9} - \frac{8}{9}x$
 XIV. $-\frac{7}{8} + \left\{ \frac{5}{6} \left[\frac{3}{4} \left(-\frac{4}{5}x - \frac{6}{7} \right) - \frac{6}{7} \left(\frac{5}{6}x + \frac{4}{5} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = -\frac{4}{5} \left(\frac{4}{5}x + \frac{6}{7} \right) + \frac{2}{3} - \frac{7}{8}x$
 XV. $-\frac{4}{5} + \left\{ \frac{7}{8} \left[-\frac{2}{3} \left(\frac{5}{6}x - \frac{7}{8} \right) - \frac{4}{5} \left(\frac{6}{7}x + \frac{2}{3} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = -\frac{3}{4} \left(\frac{5}{6}x + \frac{7}{8} \right) - \frac{1}{10} - \frac{2}{3}x$

5. Resuelve los ejercicios de la forma $\frac{\frac{a}{b}x + \frac{c}{d}}{\frac{e}{f}} + \frac{g}{h} = \frac{\frac{i}{j}x + \frac{k}{l}}{m}$

- I. $\frac{-\frac{3}{4}x + \frac{5}{6}}{-\frac{7}{8}} + \frac{1}{2} = -\frac{\frac{9}{10}x + \frac{11}{12}}{13}$

$$\begin{aligned}
\text{II. } & -\frac{-\frac{2}{3}x+\frac{4}{5}}{-\frac{6}{7}} + \frac{1}{2} = -\frac{\frac{8}{9}x+\frac{10}{11}}{12} \\
\text{III. } & \frac{\frac{5}{6}x-\frac{7}{8}}{\frac{9}{10}} - \frac{3}{4} = -\frac{\frac{11}{12}x+\frac{13}{14}}{15} \\
\text{IV. } & \frac{\frac{7}{8}x+\frac{9}{10}}{\frac{11}{12}} + \frac{5}{6} = -\frac{\frac{15}{16}x+\frac{17}{18}}{19} \\
\text{V. } & \frac{\frac{4}{5}x+\frac{6}{7}}{\frac{8}{9}} + \frac{2}{3} = \frac{\frac{10}{11}x+\frac{12}{13}}{14} \\
\text{VI. } & \frac{\frac{6}{7}x-\frac{8}{9}}{\frac{10}{11}} + \frac{3}{4} = \frac{\frac{14}{15}x+\frac{16}{17}}{18} \\
\text{VII. } & -\frac{\frac{1}{2}x+\frac{3}{4}}{\frac{5}{6}} - \frac{4}{5} = -\frac{\frac{7}{8}x-\frac{9}{10}}{11} \\
\text{VIII. } & \frac{-\frac{8}{9}x-\frac{10}{11}}{-\frac{12}{13}} + \frac{6}{7} = \frac{\frac{16}{17}x+\frac{18}{19}}{20} \\
\text{IX. } & \frac{-\frac{2}{3}x+\frac{4}{5}}{\frac{6}{7}} - \frac{1}{2} = -\frac{\frac{8}{9}x+\frac{10}{11}}{12} \\
\text{X. } & -\frac{\frac{5}{6}x-\frac{7}{8}}{\frac{9}{10}} + \frac{3}{4} = -\frac{\frac{11}{12}x-\frac{13}{14}}{15} \\
\text{XI. } & \frac{\frac{3}{4}x+\frac{5}{6}}{\frac{7}{8}} - \frac{2}{3} = -\frac{\frac{9}{10}x+\frac{11}{12}}{13} \\
\text{XII. } & -\frac{-\frac{6}{7}x+\frac{8}{9}}{\frac{10}{11}} + \frac{4}{5} = -\frac{\frac{14}{15}x-\frac{16}{17}}{18} \\
\text{XIII. } & \frac{\frac{4}{5}x+\frac{6}{7}}{-\frac{8}{9}} - \frac{3}{4} = \frac{\frac{10}{11}x-\frac{12}{13}}{14} \\
\text{XIV. } & \frac{-\frac{1}{2}x-\frac{3}{4}}{\frac{5}{6}} + \frac{5}{6} = \frac{\frac{7}{8}x+\frac{9}{10}}{11} \\
\text{XV. } & \frac{\frac{8}{9}x-\frac{10}{11}}{-\frac{12}{13}} - \frac{6}{7} = \frac{\frac{16}{17}x-\frac{18}{19}}{20}
\end{aligned}$$

3. Desigualdades

3.1. Elementos básicos

Una desigualdad es una inecuación, es decir, es una ecuación que se resuelve de igual manera que una ecuación de primer y con valor absoluto, con la diferencia de que en lugar de considerar el signo de igualdas se utilizan cualesquiera de los siguientes s'imbolos: $>$, $<$, $\geq$, $\leq$. Más adelante se abordarán las desigualdades de segundo orden.

Se tienen los siguientes tipos de desigualdades tanto de primer orden como de valor absoluto:

1. Desigualdades de primer grado

- a. $ax + b > c$
- b. $ax + b \geq c$
- c. $ax + b < c$

- d. $ax + b \leq c$
- e. $c < ax + b < d$
- f. $c < ax + b \leq d$
- g. $c \leq ax + b < d$
- h. $c \leq ax + b \leq d$

2. Desigualdades de valor absoluto

- a. $|ax + b| > c$
- b. $|ax + b| \geq c$
- c. $|ax + b| < c$
- d. $|ax + b| \leq c$


Para resolver las desigualdades de primer orden se procede de la siguiente manera:

Ejemplo. Supongamos se tiene la desigualdad $ax + b > 0$, con $a \neq 0$:

$$\begin{aligned}
 ax + b &> c \\
 ax + b - b &> c - b \\
 ax &> c - b \\
 \left(\frac{1}{a}\right) ax &> \left(\frac{1}{a}\right) (c - b) \\
 \left(\frac{1}{a} \times a\right) x &> \frac{c - b}{a} \\
 \left(\frac{a}{a}\right) x &> \frac{c - b}{a} \\
 (1) x &> \frac{c - b}{a} \\
 x &> \frac{c - b}{a}
 \end{aligned}$$

■

Ejemplo. Supongamos se tiene la desigualdad $ax + b \leq c$, con $a \neq 0$:



$$\begin{aligned}
ax + b &\leq c \\
ax + b - b &\leq c - b \\
ax &\leq c - b \\
\left(\frac{1}{a}\right) ax &\leq \left(\frac{1}{a}\right) (c - b) \\
\left(\frac{1}{a} \times a\right) x &\leq \frac{c - b}{a} \\
\left(\frac{a}{a}\right) x &\leq \frac{c - b}{a} \\
(1) x &\leq \frac{c - b}{a} \\
x &\leq \frac{c - b}{a}
\end{aligned}$$

■


Ejemplo. Supongamos se tiene la desigualdad $c \leq ax + b \leq d$, con $a \neq 0$:

$$\begin{aligned}
c &\leq ax + b < d \\
c - b &\leq ax + b - b < d - b \\
c - b &\leq ax + 0 < d - b \\
c - b &\leq ax < d - b \\
\left(\frac{1}{a}\right) c - b &\leq \left(\frac{1}{a}\right) ax < \left(\frac{1}{a}\right) d - b \\
\left(\frac{c - b}{a}\right) &\leq \left(\frac{a}{a}\right) x < \left(\frac{d - b}{a}\right) \\
\left(\frac{c - b}{a}\right) &\leq x < \left(\frac{d - b}{a}\right)
\end{aligned}$$

■

Ejemplo. Supongamos se tiene la desigualdad $|ax + b| \leq c$, con $a \neq 0$, recordemos que $|a| = b$, sí y sólo si $a = b$ o $a = -b$, entonces






$$\begin{aligned}
|ax + b| &\leq c \\
-c &\leq ax + b \leq c \\
-c - b &\leq ax + b - b \leq c - b \\
-c - b &\leq ax + 0 < c - b \\
-c - b &\leq ax < c - b \\
\left(\frac{1}{a}\right) c - b &\leq \left(\frac{1}{a}\right) ax < \left(\frac{1}{a}\right) c - b \\
\left(\frac{-c - b}{a}\right) &\leq \left(\frac{a}{a}\right) x < \left(\frac{c - b}{a}\right) \\
\left(\frac{-c - b}{a}\right) &\leq x < \left(\frac{c - b}{a}\right) \\
-\left(\frac{c + b}{a}\right) &\leq x < \left(\frac{c - b}{a}\right)
\end{aligned}$$

■

Ejemplo. Supongamos se tiene la desigualdad $|ax + b| \geq c$, con $a \neq 0$, recordemos que $|a| \geq b$ sí y sólo sí, $a \geq b$ o $a \leq -b$, entonces tenemos dos casos

Caso 1:

$$\begin{aligned}
ax + b &\geq c \\
ax + b - b &\geq c - b \\
ax + 0 &\geq c - b \\
ax &\geq c - b \\
\left(\frac{1}{a}\right) ax &\geq \left(\frac{1}{a}\right) c - b \\
\left(\frac{a}{a}\right) ax &\geq \left(\frac{1}{a}\right) c - b \\
(1) x &\geq \left(\frac{c - b}{a}\right) \\
x &\geq \left(\frac{c - b}{a}\right)
\end{aligned}$$



Caso 2:

$$\begin{aligned}ax + b &\leq -c \\ax + b - b &\leq -c - b \\ax + 0 &\leq -c - b \\ax &\leq -c - b \\ \left(\frac{1}{a}\right) ax &\leq \left(\frac{1}{a}\right) (-c - b) \\ \left(\frac{a}{a}\right) ax &\leq \left(\frac{1}{a}\right) (-c - b) \\ (1)x &\leq -\left(\frac{c + b}{a}\right) \\ x &\leq -\left(\frac{c + b}{a}\right)\end{aligned}$$

■

3.2. Solución de desigualdades de primer grado

3.2.1. Solución de desigualdades del tipo: $ax + b > c$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $2x + 3 > 7$
2. $-5x + 2 > 9$
3. $4x - 1 > 3$
4. $-3x + 5 > 8$
5. $2x + 1 > 3x - 2$
6. $3x - 2 > 2x + 4$
7. $4x + 1 > 2x + 5$
8. $-2x - 3 > 4x - 7$
9. $5x - 2 > 3x + 4$
10. $2x + 4 > 6x - 8$

11. $-4x + 3 > 5x - 2$

12. $3x - 1 > 4x - 3$

13. $2x - 5 > x - 3$

14. $3x + 2 > 2x - 5$

15. $-2x + 1 > 5x - 8$

3.2.2. Solución de desigualdades del tipo: $ax+b > c$, con coeficientes fraccionarios

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} > 1$

2. $-\frac{2}{3}x + \frac{4}{5} > 3$

3. $\frac{3}{4}x - \frac{1}{2} > \frac{5}{6}$

4. $-\frac{2}{5}x + \frac{1}{3} > -\frac{1}{15}$

5. $\frac{2}{3}x + \frac{1}{4} > \frac{5}{6}x - \frac{1}{2}$

6. $\frac{1}{2}x - \frac{1}{3} > -\frac{2}{5}x + \frac{7}{15}$

7. $-\frac{3}{4}x + \frac{1}{2} > \frac{2}{3}x - \frac{1}{4}$

8. $\frac{1}{3}x - \frac{2}{5} > \frac{2}{7}x - \frac{1}{7}$

9. $\frac{2}{5}x + \frac{1}{6} \geq \frac{1}{3}x + \frac{5}{6}$

10. $\frac{3}{4}x + \frac{1}{5} > \frac{1}{2}x + \frac{3}{10}$

11. $-\frac{1}{2}x + \frac{1}{3} > -\frac{3}{4}x - \frac{1}{6}$

12. $\frac{1}{4}x - \frac{1}{2} > \frac{2}{3}x - \frac{4}{6}$

13. $\frac{2}{3}x - \frac{1}{4} > \frac{3}{4}x - \frac{2}{3}$

14. $-\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} > \frac{3}{5}x + \frac{1}{10}$

15. $\frac{2}{5}x - \frac{1}{4} > -\frac{1}{2}x + \frac{3}{8}$

3.2.3. Solución de desigualdades del tipo: $ax + b < c$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $2x + 3 < 7$
2. $-5x + 2 < -9$
3. $4x - 1 < 3$
4. $-3x + 5 < 8$
5. $2x + 1 < 3x - 2$
6. $3x - 2 < 2x + 4$
7. $4x + 1 < 2x + 5$
8. $-2x - 3 < 4x - 7$
9. $5x - 2 < 3x + 4$
10. $2x + 4 < 6x - 8$
11. $-4x + 3 < 5x - 2$
12. $3x - 1 < 4x - 3$
13. $2x - 5 < x - 3$
14. $3x + 2 < 2x - 5$
15. $-2x + 1 < 5x - 8$

3.2.4. Solución de desigualdades del tipo: $ax + b < c$ con coeficientes fraccionarios

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} < \frac{5}{8}$
2. $-\frac{2}{3}x + \frac{4}{5} < \frac{1}{2}$
3. $\frac{3}{4}x - \frac{1}{2} < \frac{5}{6}$
4. $-\frac{2}{5}x + \frac{1}{3} < -\frac{1}{15}$
5. $\frac{2}{3}x + \frac{1}{4} < \frac{5}{6}x - \frac{1}{2}$

6. $\frac{1}{2}x - \frac{1}{3} < \frac{2}{5}x - \frac{7}{15}$
7. $-\frac{3}{4}x + \frac{1}{2} < \frac{2}{3}x - \frac{1}{4}$
8. $\frac{1}{3}x - \frac{2}{5} < \frac{2}{7}x - \frac{1}{7}$
9. $\frac{2}{5}x + \frac{1}{6} < \frac{1}{3}x + \frac{5}{6}$
10. $\frac{3}{4}x + \frac{1}{5} < \frac{1}{2}x + \frac{3}{10}$
11. $-\frac{1}{2}x + \frac{1}{3} < -\frac{3}{4}x - \frac{1}{6}$
12. $\frac{1}{4}x - \frac{1}{2} < \frac{2}{3}x - \frac{4}{6}$
13. $\frac{2}{3}x - \frac{1}{4} < \frac{3}{4}x - \frac{2}{3}$
14. $-\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} < \frac{3}{5}x + \frac{1}{10}$
15. $\frac{2}{5}x - \frac{1}{4} < -\frac{1}{2}x + \frac{3}{8}$

3.2.5. Solución de desigualdades del tipo: $ax + b \geq c$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $2x + 3 \geq 5$
2. $-4x + 2 \geq -10$
3. $5x - 4 \geq 6$
4. $-3x + 7 \geq 4$
5. $2x - 3 \geq x + 2$
6. $3x + 2 \geq 2x - 1$
7. $4x - 1 \geq x + 5$
8. $-2x - 3 \geq -6x - 1$
9. $5x - 2 \geq 2x + 8$
10. $2x + 4 \geq 4x - 2$
11. $-4x + 3 \geq 3x - 2$
12. $3x - 1 \geq 2x + 1$
13. $2x - 5 \geq x - 1$
14. $3x + 2 \geq 2x - 4$
15. $-2x + 1 \geq -5x + 4$

3.2.6. Solución de desigualdades del tipo: $ax+b \geq c$, con coeficientes fraccionarios

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \geq \frac{5}{8}$

2. $-\frac{2}{3}x + \frac{4}{5} \geq \frac{1}{2}$

3. $\frac{3}{4}x - \frac{1}{2} \geq \frac{5}{6}$

4. $-\frac{2}{5}x + \frac{1}{3} \geq -\frac{1}{15}$

5. $\frac{2}{3}x + \frac{1}{4} \geq \frac{5}{6}x - \frac{1}{2}$

6. $\frac{1}{2}x - \frac{1}{3} \geq \frac{2}{5}x - \frac{7}{15}$

7. $-\frac{3}{4}x + \frac{1}{2} \geq \frac{2}{3}x - \frac{1}{4}$

8. $\frac{1}{3}x - \frac{2}{5} \geq \frac{2}{7}x - \frac{1}{7}$

9. $\frac{2}{5}x + \frac{1}{6} \geq \frac{1}{3}x + \frac{5}{6}$

10. $\frac{3}{4}x + \frac{1}{5} \geq \frac{1}{2}x + \frac{3}{10}$

11. $-\frac{1}{2}x + \frac{1}{3} \geq -\frac{3}{4}x - \frac{1}{6}$

12. $\frac{1}{4}x - \frac{1}{2} \geq \frac{2}{3}x - \frac{4}{6}$

13. $\frac{2}{3}x - \frac{1}{4} \geq \frac{3}{4}x - \frac{2}{3}$

14. $-\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \geq \frac{3}{5}x + \frac{1}{10}$

15. $\frac{2}{5}x - \frac{1}{4} \geq -\frac{1}{2}x + \frac{3}{8}$

3.2.7. Solución de desigualdades del tipo: $ax + b \leq c$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $2x + 3 \leq 7$

2. $-3x + 4 \leq 5$

3. $4x - 2 \leq 6$

4. $-5x + 3 \leq 2$

5. $2x + 1 \leq 5x - 2$

6. $3x - 1 \leq 5x + 2$
7. $-4x + 2 \leq 3x + 1$
8. $3x - 5 \leq 7x - 2$
9. $5x + 1 \leq 3x + 4$
10. $4x + 1 \leq 6x - 3$
11. $-2x + 3 \leq -4x - 1$
12. $x - 2 \leq 2x + 1$
13. $3x - 4 \leq 4x - 2$
14. $-2x + 4 \leq 5x + 1$
15. $2x - 1 \leq -3x + 4$

3.2.8. Solución de desigualdades del tipo: $ax+b \leq c$ con coeficientes fraccionarios.

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \leq \frac{5}{8}$
2. $-\frac{2}{3}x + \frac{4}{5} \leq \frac{1}{2}$
3. $\frac{3}{4}x - \frac{1}{2} \leq \frac{5}{6}$
4. $-\frac{2}{5}x + \frac{1}{3} \leq -\frac{1}{15}$
5. $\frac{2}{3}x + \frac{1}{4} \leq \frac{5}{6}x - \frac{1}{2}$
6. $\frac{1}{2}x - \frac{1}{3} \leq \frac{2}{5}x - \frac{7}{15}$
7. $-\frac{3}{4}x + \frac{1}{2} \leq \frac{2}{3}x - \frac{1}{4}$
8. $\frac{1}{3}x - \frac{2}{5} \leq \frac{2}{7}x - \frac{1}{7}$
9. $\frac{2}{5}x + \frac{1}{6} \leq \frac{1}{3}x + \frac{5}{6}$
10. $\frac{3}{4}x + \frac{1}{5} \leq \frac{1}{2}x + \frac{3}{10}$
11. $-\frac{1}{2}x + \frac{1}{3} \leq -\frac{3}{4}x - \frac{1}{6}$
12. $\frac{1}{4}x - \frac{1}{2} \leq \frac{2}{3}x - \frac{4}{6}$
13. $\frac{2}{3}x - \frac{1}{4} \leq \frac{3}{4}x - \frac{2}{3}$
14. $-\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \leq \frac{3}{5}x + \frac{1}{10}$
15. $\frac{2}{5}x - \frac{1}{4} \leq -\frac{1}{2}x + \frac{3}{8}$

3.3. Solución de desigualdades con doble desigualdad.

3.3.1. Solución de desigualdades del tipo: $c < ax + b < d$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $2 < x + 3 < 5$
2. $-1 < 2x - 1 < 1$
3. $-\frac{1}{2} < \frac{3}{4}x + \frac{1}{2} < \frac{1}{2}$
4. $-3 < 2x + 7 < -1$
5. $1 < \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} < 2$
6. $-5 < -\frac{1}{3}x + \frac{5}{6} < 1$
7. $-5 < 5x - 1 < 8$
8. $-2 < \frac{2}{3}x + 1 < 12$
9. $2 < -\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} < 3$
10. $-3 < \frac{1}{2}x - \frac{1}{3} < 18$
11. $-4 < -3x + 5 < 3$
12. $1 < \frac{1}{2}x + \frac{1}{3} < 2$
13. $-2 < 4x - 1 < 2$
14. $-\frac{3}{4} < \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} < \frac{3}{4}$
15. $-1 < \frac{3}{2}x + 1 < 2$

3.3.2. Solución de desigualdades del tipo: $c < ax + b \leq d$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $-2 < 3x + 1 \leq 5$
2. $-\frac{4}{5} < \frac{1}{2}x - \frac{3}{4} \leq 2$
3. $-1 < 2x - 1 \leq 1$
4. $-3 < \frac{1}{2}x + \frac{1}{3} \leq \frac{8}{5}$

5. $-\frac{3}{4} < \frac{1}{2}x + \frac{1}{4} \leq \frac{3}{4}$
6. $-2 < \frac{3}{2}x - 1 \leq 1$
7. $-1 < \frac{2}{3}x + 1 \leq \frac{8}{3}$
8. $1 < \frac{1}{2}x + \frac{1}{3} \leq 2$
9. $-3 < -2x + 5 \leq 3$
10. $-\frac{1}{2} < \frac{3}{4}x + \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}$
11. $-5 < 5x - 1 \leq 9$
12. $1 < \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} \leq 2$
13. $-3 < 2x + 7 \leq -1$
14. $-1 < -\frac{1}{2}x + \frac{1}{4} \leq 2$
15. $2 < -\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \leq 3$

3.3.3. Solución de desigualdades del tipo: $c \leq ax + b < d$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $-2 \leq 3x + 1 < 5$
2. $-\frac{4}{5} \leq \frac{1}{2}x - \frac{3}{4} < 2$
3. $-1 \leq 2x - 1 < 1$
4. $-3 \leq \frac{1}{2}x + \frac{1}{3} < \frac{7}{9}$
5. $-\frac{3}{4} \leq \frac{1}{2}x + \frac{1}{4} < \frac{3}{4}$
6. $-2 \leq \frac{3}{2}x - 1 < 1$
7. $-1 \leq \frac{2}{3}x + 1 < \frac{9}{4}$
8. $1 \leq \frac{1}{2}x + \frac{1}{3} < 2$
9. $-\frac{4}{3} \leq -2x + 5 < 3$
10. $-\frac{1}{2} \leq \frac{3}{4}x + \frac{1}{2} < \frac{1}{2}$
11. $-5 \leq 5x - 1 < \frac{15}{6}$
12. $1 \leq \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} < 2$

13. $-3 \leq 2x + 7 < -1$

14. $-1 \leq -\frac{1}{2}x + \frac{1}{4} < 2$

15. $2 \leq -\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} < 3$

3.3.4. Solución de desigualdades del tipo: $c \leq ax + b \leq d$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $-1 \leq x \leq 2$

2. $-\frac{3}{4} \leq \frac{1}{2}x + \frac{1}{4} \leq \frac{5}{8}$

3. $2 \leq 3x - 1 \leq 7$

4. $-\frac{1}{3} \leq \frac{1}{6}x + \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}$

5. $-1 \leq -x + 3 \leq 2$

6. $-2 \leq \frac{1}{2}x + 1 \leq 3$

7. $2 \leq \frac{3}{2}x + 1 \leq 5$

8. $-\frac{3}{4} \leq -\frac{1}{2}x + \frac{1}{4} \leq \frac{1}{4}$

9. $-4 \leq 2x + 1 \leq 7$

10. $-\frac{1}{2} \leq -\frac{3}{4}x + \frac{1}{2} \leq 1$

11. $-\frac{5}{2} \leq \frac{1}{4}x + 1 \leq 1$

12. $1 \leq -\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \leq 3$

13. $-\frac{5}{6} \leq \frac{1}{3}x + \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}$

14. $-1 \leq \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} \leq 3$

15. $-2 \leq \frac{1}{4}x + \frac{1}{2} \leq 3$

3.4. Solución de desigualdades con valor absoluto**3.4.1. Solución de desigualdades del tipo: $|ax + b| < d$**

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $|2x + 1| < 5$
2. $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| < 2$
3. $|3x - 1| < 7$
4. $|\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}| < 1$
5. $|x - 2| < 4$
6. $|\frac{1}{2}x + 1| < 3$
7. $|\frac{3}{2}x + 1| < 5$
8. $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| < \frac{3}{4}$
9. $|2x + 1| < 6$
10. $|\frac{3}{4}x - \frac{1}{2}| < 1$
11. $|\frac{1}{4}x + 1| < \frac{7}{2}$
12. $|\frac{1}{2}x + \frac{3}{4}| < 2$
13. $|\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}| < \frac{5}{6}$
14. $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| < 3$
15. $|\frac{1}{4}x + \frac{1}{2}| < \frac{7}{4}$

3.4.2. Solución de desigualdades del tipo: $|ax + b| \leq d$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $|3x - 1| \leq 6$
2. $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| \leq 1$
3. $|2x + 1| \leq 5$
4. $|\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}| \leq \frac{4}{3}$
5. $|x - 2| \leq 3$
6. $|\frac{1}{2}x + 1| \leq 4$
7. $|\frac{3}{2}x + 1| \leq 5$
8. $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| \leq \frac{5}{4}$

9. $|2x + 1| \leq 7$
10. $|\frac{3}{4}x - \frac{1}{2}| \leq 2$
11. $|\frac{1}{4}x + 1| \leq 3$
12. $|- \frac{1}{2}x + \frac{3}{4}| \leq 2$
13. $|\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}| \leq 1$

3.4.3. Solución de desigualdades del tipo: $|ax + b| > d$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $|3x - 1| > 4$
2. $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| > \frac{1}{2}$
3. $|2x + 1| > 3$
4. $|\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}| > \frac{5}{6}$
5. $|x - 2| > 1$
6. $|\frac{1}{2}x + 1| > \frac{3}{4}$
7. $|\frac{3}{2}x + 1| > \frac{7}{2}$
8. $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| > \frac{3}{4}$
9. $|2x + 1| > \frac{9}{2}$
10. $|\frac{3}{4}x - \frac{1}{2}| > \frac{5}{4}$
11. $|\frac{1}{4}x + 1| > 1$
12. $|- \frac{1}{2}x + \frac{3}{4}| > \frac{1}{2}$
13. $|\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}| > \frac{2}{3}$
14. $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| > \frac{5}{4}$
15. $|\frac{1}{4}x + \frac{1}{2}| > 1$

3.4.4. Solución de desigualdades del tipo: $|ax + b| \geq d$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $|3x - 1| \geq 4$
2. $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| \geq \frac{1}{2}$
3. $|2x + 1| \geq 3$
4. $|\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}| \geq \frac{5}{6}$
5. $|x - 2| \geq 1$
6. $|\frac{1}{2}x + 1| \geq \frac{3}{4}$
7. $|\frac{3}{2}x + 1| \geq \frac{7}{2}$
8. $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| \geq \frac{3}{4}$
9. $|2x + 1| \geq \frac{9}{2}$
10. $|\frac{3}{4}x - \frac{1}{2}| \geq \frac{5}{4}$
11. $|\frac{1}{4}x + 1| \geq 1$
12. $|- \frac{1}{2}x + \frac{3}{4}| \geq \frac{1}{2}$
13. $|\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}| \geq \frac{2}{3}$
14. $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| \geq \frac{5}{4}$
15. $|\frac{1}{4}x + \frac{1}{2}| \geq 1$

3.5. Ejercicios adicionales

1. Resuelve los ejercicios siguientes, encuentra el intervalo solución y proporciona su gráfica

- I. $|- \frac{1}{2}x + \frac{2}{3}| \leq \frac{4}{3}$
- II. $|- \frac{2}{7}x - \frac{3}{4}| \leq \frac{3}{3}$
- III. $|\frac{5}{8}x - \frac{1}{6}| \leq \frac{7}{8}$
- IV. $|\frac{3}{10}x + \frac{2}{9}| \leq \frac{1}{2}$
- V. $|- \frac{4}{11}x + \frac{5}{7}| \leq \frac{3}{4}$
- VI. $|- \frac{2}{5}x - \frac{1}{3}| \leq \frac{2}{5}$
- VII. $|\frac{1}{6}x + \frac{7}{9}| \leq \frac{1}{3}$
- VIII. $|\frac{7}{9}x - \frac{4}{11}| \leq \frac{5}{6}$
- IX. $|- \frac{5}{8}x + \frac{3}{10}| \leq \frac{2}{7}$

$$\begin{array}{ll}
\text{X.} & \left| -\frac{1}{4}x - \frac{1}{8} \right| \leq \frac{3}{4} \\
\text{XI.} & \left| \frac{3}{7}x + \frac{5}{6} \right| \leq \frac{1}{5} \\
\text{XII.} & \left| -\frac{4}{9}x + \frac{2}{11} \right| \leq \frac{4}{9} \\
\text{XIII.} & \left| -\frac{3}{5}x - \frac{7}{8} \right| \leq \frac{2}{3} \\
\text{XIV.} & \left| \frac{5}{11}x + \frac{1}{7} \right| \leq \frac{5}{11} \\
\text{XV.} & \left| \frac{3}{8}x - \frac{2}{9} \right| \leq \frac{3}{4}
\end{array}$$

2. Realiza lo mismo para los siguientes ejercicios

$$\begin{array}{ll}
\text{I.} & \left| -\frac{2}{5}x + \frac{3}{4} \right| \leq \frac{1}{2} \\
\text{II.} & \left| \frac{3}{7}x + \frac{1}{8} \right| \leq \frac{2}{7} \\
\text{III.} & \left| -\frac{5}{6}x - \frac{4}{9} \right| \leq \frac{5}{6} \\
\text{IV.} & \left| -\frac{4}{9}x + \frac{2}{11} \right| \leq \frac{3}{4} \\
\text{V.} & \left| -\frac{1}{3}x - \frac{2}{7} \right| \leq \frac{3}{5} \\
\text{VI.} & \left| \frac{3}{8}x - \frac{1}{6} \right| \leq \frac{2}{5} \\
\text{VII.} & \left| -\frac{2}{7}x + \frac{5}{8} \right| \leq \frac{3}{7} \\
\text{VIII.} & \left| \frac{5}{11}x + \frac{1}{3} \right| \leq \frac{4}{11} \\
\text{IX.} & \left| -\frac{4}{5}x - \frac{3}{10} \right| \leq \frac{1}{4} \\
\text{X.} & \left| -\frac{1}{4}x + \frac{5}{9} \right| \leq \frac{5}{8} \\
\text{XI.} & \left| -\frac{2}{9}x - \frac{5}{7} \right| \leq \frac{1}{9} \\
\text{XII.} & \left| -\frac{3}{10}x + \frac{2}{7} \right| \leq \frac{4}{9} \\
\text{XIII.} & \left| \frac{5}{8}x - \frac{1}{3} \right| \leq \frac{3}{8} \\
\text{XIV.} & \left| \frac{4}{11}x + \frac{5}{6} \right| \leq \frac{2}{5} \\
\text{XV.} & \left| -\frac{2}{5}x - \frac{3}{8} \right| \leq \frac{5}{6} \\
\text{XVI.} & \left| \frac{1}{6}x - \frac{2}{9} \right| \leq \frac{1}{4} \\
\text{XVII.} & \left| -\frac{5}{9}x + \frac{4}{11} \right| \leq \frac{2}{3} \\
\text{XVIII.} & \left| -\frac{3}{8}x + \frac{1}{7} \right| \leq \frac{3}{8} \\
\text{XIX.} & \left| -\frac{4}{7}x - \frac{3}{10} \right| \leq \frac{1}{7} \\
\text{XX.} & \left| -\frac{2}{11}x + \frac{5}{8} \right| \leq \frac{3}{10}
\end{array}$$

3. Finalmente realiza lo mismo para la siguiente lista:

$$\begin{array}{ll}
\text{I.} & \left| -\frac{4}{9}x + \frac{5}{8} \right| \geq \frac{1}{5} \\
\text{II.} & \left| -\frac{1}{6}x - \frac{2}{7} \right| \geq \frac{3}{5} \\
\text{III.} & \left| \frac{7}{11}x + \frac{1}{8} \right| \leq \frac{3}{7} \\
\text{IV.} & \left| -\frac{3}{8}x + \frac{4}{9} \right| \leq \frac{5}{8} \\
\text{V.} & \left| -\frac{5}{6}x + \frac{3}{10} \right| \geq \frac{2}{3} \\
\text{VI.} & \left| -\frac{2}{7}x - \frac{1}{4} \right| \leq \frac{5}{7} \\
\text{VII.} & \left| -\frac{1}{3}x + \frac{5}{9} \right| \geq \frac{1}{7} \\
\text{VIII.} & \left| \frac{4}{11}x - \frac{3}{8} \right| \leq \frac{1}{5} \\
\text{IX.} & \left| -\frac{2}{9}x + \frac{1}{7} \right| \geq \frac{3}{4} \\
\text{X.} & \left| -\frac{5}{8}x + \frac{2}{11} \right| \leq \frac{4}{9} \\
\text{XI.} & \left| \frac{1}{4}x + \frac{7}{9} \right| \leq \frac{2}{7} \\
\text{XII.} & \left| -\frac{3}{10}x - \frac{5}{6} \right| \geq \frac{1}{3} \\
\text{XIII.} & \left| -\frac{4}{5}x + \frac{1}{6} \right| \geq \frac{2}{5}
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
\text{XIV.} & \left| -\frac{3}{7}x + \frac{4}{9} \right| < \frac{3}{7} \\
\text{XV.} & \left| \frac{5}{11}x - \frac{2}{8} \right| \leq \frac{4}{11} \\
\text{XVI.} & \left| -\frac{2}{11}x - \frac{3}{8} \right| > \frac{1}{6} \\
\text{XVII.} & \left| -\frac{5}{9}x + \frac{2}{7} \right| \geq \frac{3}{4} \\
\text{XVIII.} & \left| -\frac{3}{8}x - \frac{1}{6} \right| < \frac{5}{11} \\
\text{XIX.} & \left| \frac{4}{7}x + \frac{1}{5} \right| \leq \frac{3}{10} \\
\text{XX.} & \left| -\frac{1}{5}x + \frac{6}{11} \right| > \frac{2}{9}
\end{array}$$

4. Un poco más de ejercicios finales

$$\begin{array}{ll}
\text{I.} & \left| \frac{3x+2}{5} \right| \geq \frac{1}{4} \\
\text{II.} & \left| -\frac{6x-1}{2} \right| \leq \frac{3}{5} \\
\text{III.} & \left| \frac{-2x+9}{7} \right| > \frac{4}{9} \\
\text{IV.} & \left| -\frac{-5x-3}{4} \right| \geq \frac{2}{7} \\
\text{V.} & \left| \frac{4x+7}{3} \right| < \frac{5}{6} \\
\text{VI.} & \left| -\frac{9x-2}{8} \right| \leq \frac{7}{10} \\
\text{VII.} & \left| \frac{-8x+3}{6} \right| > \frac{1}{5} \\
\text{VIII.} & \left| \frac{-7x-5}{9} \right| \geq \frac{2}{11} \\
\text{IX.} & \left| -\frac{12x+4}{11} \right| < \frac{3}{8} \\
\text{X.} & \left| \frac{11x-6}{10} \right| \leq \frac{5}{9} \\
\text{XI.} & \left| \frac{-15x+2}{13} \right| > \frac{4}{11} \\
\text{XII.} & \left| -\frac{-14x-7}{8} \right| \geq \frac{3}{7} \\
\text{XIII.} & \left| \frac{17x+1}{9} \right| < \frac{2}{5} \\
\text{XIV.} & \left| -\frac{18x-9}{5} \right| \leq \frac{7}{12} \\
\text{XV.} & \left| \frac{-21x+5}{4} \right| > \frac{1}{3} \\
\text{XVI.} & \left| -\frac{-23x-2}{7} \right| \geq \frac{4}{9} \\
\text{XVII.} & \left| \frac{25x+8}{6} \right| < \frac{2}{7} \\
\text{XVIII.} & \left| -\frac{27x-3}{10} \right| \leq \frac{5}{11} \\
\text{XIX.} & \left| \frac{-29x+6}{11} \right| > \frac{3}{8} \\
\text{XX.} & \left| -\frac{-31x-4}{9} \right| \geq \frac{1}{5}
\end{array}$$

5. Ejercicios finales

$$\begin{array}{ll}
\text{I.} & \left| \frac{2x+3}{4} - \frac{5}{6} \right| \geq \frac{7}{8} \\
\text{II.} & \left| -\frac{3x-1}{2} + \frac{4}{5} \right| \leq \frac{6}{7} \\
\text{III.} & \left| \frac{-7x+11}{9} - \frac{13}{14} \right| > \frac{15}{16} \\
\text{IV.} & \left| \frac{-4x-9}{5} + \frac{2}{3} \right| \geq \frac{8}{9} \\
\text{V.} & \left| -\frac{5x+7}{8} - \frac{10}{11} \right| < \frac{12}{13} \\
\text{VI.} & \left| \frac{6x-5}{4} + \frac{8}{7} \right| \leq \frac{9}{10} \\
\text{VII.} & \left| \frac{-9x+2}{11} - \frac{13}{15} \right| > \frac{17}{18} \\
\text{VIII.} & \left| -\frac{2x-1}{10} + \frac{14}{13} \right| \geq \frac{16}{17} \\
\text{IX.} & \left| -\frac{8x+3}{6} - \frac{7}{9} \right| < \frac{5}{8} \\
\text{X.} & \left| \frac{11x-4}{7} + \frac{9}{12} \right| \leq \frac{13}{14} \\
\text{XI.} & \left| -\frac{-14x+5}{15} - \frac{17}{18} \right| > \frac{19}{20} \\
\text{XII.} & \left| \frac{-10x-7}{13} + \frac{12}{11} \right| \geq \frac{16}{15}
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
\text{XIII.} & \left| \frac{13x+9}{8} - \frac{14}{15} \right| < \frac{7}{9} \\
\text{XIV.} & \left| -\frac{15x-2}{11} + \frac{10}{9} \right| \leq \frac{4}{5} \\
\text{XV.} & \left| \frac{-17x+6}{5} - \frac{8}{7} \right| > \frac{3}{4} \\
\text{XVI.} & \left| -\frac{-19x-8}{4} + \frac{12}{11} \right| \geq \frac{5}{6} \\
\text{XVII.} & \left| \frac{21x+4}{3} - \frac{10}{9} \right| < \frac{13}{14} \\
\text{XVIII.} & \left| -\frac{23x-5}{2} + \frac{14}{15} \right| \leq \frac{16}{17} \\
\text{XIX.} & \left| \frac{-16x+7}{9} - \frac{11}{10} \right| > \frac{8}{9} \\
\text{XX.} & \left| -\frac{-18x-3}{7} + \frac{9}{6} \right| \geq \frac{14}{13}
\end{array}$$

3.6. Solución de desigualdades de segundo grado

3.6.1. Solución de desigualdades del tipo $ax^2 + bx + c > 0$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $x^2 - 3x + 2 > 0$
2. $2x^2 - 5x + 2 > 0$
3. $3x^2 + 2x - 1 > 0$
4. $x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{2} > 0$
5. $\frac{1}{2}x^2 - 2x + 2 > 0$
6. $x^2 + 2x + 1 > 0$
7. $\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}x + 1 > 0$
8. $\frac{1}{3}x^2 - \frac{4}{3}x + 1 > 0$
9. $4x^2 - 12x + 9 > 0$
10. $\frac{3}{2}x^2 - 5x + 2 > 0$
11. $2x^2 - 7x + 6 > 0$
12. $\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - 1 > 0$
13. $\frac{1}{5}x^2 - \frac{2}{5}x + \frac{1}{2} > 0$
14. $x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} > 0$
15. $3x^2 - 10x + 6 > 0$

3.6.2. Solución de desigualdades del tipo $ax^2 + bx + c \geq 0$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $x^2 - 4x + 3 \geq 0$
2. $2x^2 - 6x + 4 \geq 0$
3. $3x^2 + 2x + 1 \geq 0$
4. $x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{2} \geq 0$
5. $\frac{1}{2}x^2 - 2x + 2 \geq 0$
6. $x^2 + 2x + 1 \geq 0$
7. $\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}x + 1 \geq 0$
8. $\frac{1}{3}x^2 - \frac{4}{3}x + 1 \geq 0$
9. $4x^2 - 12x + 9 \geq 0$
10. $\frac{3}{2}x^2 - 5x + 2 \geq 0$
11. $2x^2 - 7x + 6 \geq 0$
12. $\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - 1 \geq 0$
13. $\frac{1}{5}x^2 - \frac{2}{5}x + \frac{1}{2} \geq 0$
14. $x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} \geq 0$
15. $3x^2 - 10x + 6 \geq 0$

3.6.3. Solución de desigualdades del tipo $ax^2 + bx + c < 0$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $x^2 - 4x + 3 < 0$
2. $2x^2 - 5x - 3 < 0$
3. $\frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{2}x + 1 < 0$
4. $3x^2 - 7x + 2 < 0$
5. $-x^2 + 6x - 9 < 0$

6. $\frac{1}{3}x^2 + \frac{5}{3}x + 1 < 0$
7. $2x^2 + 5x + 2 < 0$
8. $-4x^2 + 16x - 12 < 0$
9. $\frac{1}{4}x^2 - \frac{5}{2}x + 4 < 0$
10. $x^2 - 9 < 0$
11. $4x^2 - 12x + 8 < 0$
12. $-2x^2 + 3x + 1 < 0$
13. $3x^2 - 2x - 1 < 0$
14. $-x^2 + x + 12 < 0$
15. $\frac{3}{2}x^2 - \frac{5}{2}x - 1 < 0$

3.6.4. Solución de desigualdades del tipo $ax^2 + bx + c \leq 0$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $x^2 - 2x + 1 \leq 0$
2. $-3x^2 + 4x + 1 \leq 0$
3. $\frac{1}{2}x^2 - 2x + 2 \leq 0$
4. $2x^2 - 7x + 3 \leq 0$
5. $-x^2 + 4x - 4 \leq 0$
6. $\frac{1}{4}x^2 + \frac{5}{2}x + 5 \leq 0$
7. $3x^2 + 4x + 1 \leq 0$
8. $-4x^2 + 4x + 4 \leq 0$
9. $\frac{1}{3}x^2 + \frac{5}{3}x + 2 \leq 0$
10. $x^2 - 16 \leq 0$
11. $2x^2 - 8x + 8 \leq 0$
12. $-x^2 + 3x + 6 \leq 0$
13. $3x^2 - 2x - 2 \leq 0$
14. $-2x^2 + 3x + 3 \leq 0$
15. $\frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{2}x + 2 \leq 0$

3.7. Ejercicios adicionales

a. Resuelve las siguientes desigualdades de segundo orden proporcionando su conjunto solución y su gráfica

1. $3x^2 - 2x + 1 \geq 0$
2. $-2x^2 + 5x - 3 \leq 0$
3. $x^2 + 4x + 2 \geq 0$
4. $4x^2 - 6x + 3 \leq 0$
5. $-x^2 + 3x - 2 \geq 0$
6. $2x^2 - 7x + 4 \leq 0$
7. $-3x^2 + 2x + 5 \geq 0$
8. $x^2 - 4x + 5 \leq 0$
9. $-2x^2 + 3x - 1 \geq 0$
10. $5x^2 - 2x + 2 \leq 0$
11. $-x^2 + 6x - 5 \geq 0$
12. $3x^2 + 5x + 6 \leq 0$
13. $-4x^2 - 3x + 7 \geq 0$
14. $2x^2 + x - 3 \leq 0$
15. $-x^2 - 2x + 4 \geq 0$

b. Resuelve las siguientes desigualdades de segundo orden proporcionando su conjunto solución y su gráfica

1. $-\frac{2}{7}x^2 + \frac{6}{5}x - \frac{5}{6} \leq 0$
2. $\frac{7}{8}x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{2}{5} \geq 0$
3. $-\frac{3}{4}x^2 + \frac{5}{6}x - \frac{1}{3} \leq 0$
4. $\frac{4}{5}x^2 - \frac{1}{7}x + \frac{3}{4} \geq 0$
5. $-\frac{1}{6}x^2 + \frac{2}{9}x - \frac{4}{11} \leq 0$
6. $\frac{5}{9}x^2 - \frac{3}{8}x + \frac{7}{10} \geq 0$
7. $-\frac{2}{11}x^2 + \frac{4}{5}x - \frac{1}{6} \leq 0$
8. $\frac{3}{4}x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{5}{7} \geq 0$
9. $-\frac{4}{5}x^2 + \frac{2}{7}x - \frac{3}{8} \leq 0$
10. $\frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{9}x + \frac{4}{7} \geq 0$
11. $-\frac{5}{6}x^2 + \frac{3}{4}x - \frac{2}{5} \leq 0$
12. $\frac{2}{7}x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{5}{8} \geq 0$
13. $-\frac{3}{8}x^2 + \frac{2}{5}x - \frac{4}{7} \leq 0$
14. $\frac{4}{9}x^2 - \frac{3}{7}x + \frac{1}{5} \geq 0$
15. $-\frac{1}{5}x^2 + \frac{4}{11}x - \frac{2}{9} \leq 0$

c. Resuelve las siguientes desigualdades de segundo orden proporcionando su conjunto solución y su gráfica

1. $-\frac{5}{11}x^2 + \frac{3}{8}x - \frac{2}{6} \leq 0$

2. $\frac{2}{5}x^2 - \frac{1}{6}x + \frac{4}{11} \geq 0$
3. $-\frac{3}{4}x^2 + \frac{2}{5}x - \frac{1}{7} \leq 0$
4. $\frac{4}{7}x^2 - \frac{3}{8}x + \frac{2}{9} \geq 0$
5. $-\frac{1}{9}x^2 + \frac{4}{11}x - \frac{3}{10} \leq 0$
6. $\frac{3}{2}x^2 - \frac{5}{4}x + \frac{1}{3} \geq 0$
7. $-\frac{1}{3}x^2 + \frac{4}{5}x - \frac{2}{7} \leq 0$
8. $\frac{2}{5}x^2 + \frac{3}{4}x + \frac{7}{8} \geq 0$
9. $-\frac{4}{9}x^2 + \frac{2}{7}x - \frac{3}{5} < 0$
10. $\frac{5}{6}x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{4}{9} > 0$
11. $-\frac{2}{7}x^2 + \frac{6}{5}x - \frac{5}{6} \leq 0$
12. $\frac{7}{8}x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{2}{5} \geq 0$
13. $-\frac{3}{4}x^2 + \frac{5}{6}x - \frac{1}{3} \leq 0$
14. $\frac{4}{5}x^2 - \frac{1}{7}x + \frac{3}{4} > 0$
15. $-\frac{1}{6}x^2 + \frac{2}{9}x - \frac{4}{11} \geq 0$

d. Resuelve las siguientes desigualdades de segundo orden proporcionando su conjunto solución y su gráfica

1. $-\frac{5}{6}x^2 + \frac{3}{4}x - \frac{2}{5} \geq 0$
2. $\frac{2}{7}x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{5}{8} \leq 0$
3. $-\frac{3}{8}x^2 + \frac{2}{5}x - \frac{4}{7} > 0$
4. $\frac{4}{9}x^2 - \frac{3}{7}x + \frac{1}{5} \geq 0$
5. $-\frac{1}{5}x^2 + \frac{4}{11}x - \frac{2}{9} < 0$
6. $\frac{5}{6}x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{4}{9} \leq 0$
7. $-\frac{2}{9}x^2 + \frac{6}{7}x - \frac{5}{8} \geq 0$
8. $\frac{3}{8}x^2 - \frac{5}{6}x + \frac{2}{5} < 0$
9. $-\frac{4}{7}x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{1}{4} \leq 0$
10. $\frac{1}{4}x^2 - \frac{5}{9}x + \frac{3}{7} \geq 0$
11. $-\frac{5}{11}x^2 + \frac{3}{8}x - \frac{2}{6} < 0$
12. $\frac{2}{5}x^2 - \frac{1}{6}x + \frac{4}{11} \leq 0$
13. $-\frac{3}{4}x^2 + \frac{2}{5}x - \frac{1}{7} \geq 0$
14. $\frac{4}{7}x^2 - \frac{3}{8}x + \frac{2}{9} < 0$
15. $-\frac{1}{9}x^2 + \frac{4}{11}x - \frac{3}{10} \geq 0$

e. Resuelve las siguientes desigualdades de segundo orden proporcionando su conjunto solución y su gráfica

1. $\frac{5}{6}x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{4}{9} \geq 0$
2. $-\frac{2}{9}x^2 + \frac{6}{7}x - \frac{5}{8} \leq 0$
3. $\frac{3}{8}x^2 - \frac{5}{6}x + \frac{2}{5} \geq 0$
4. $-\frac{4}{7}x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{1}{4} \leq 0$
5. $\frac{1}{4}x^2 - \frac{5}{9}x + \frac{3}{7} \geq 0$
6. $\frac{5}{9}x^2 - \frac{3}{8}x + \frac{7}{10} \leq 0$
7. $-\frac{2}{11}x^2 + \frac{4}{5}x - \frac{1}{6} < 0$

8. $\frac{3}{4}x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{5}{7} \geq 0$
9. $-\frac{4}{5}x^2 + \frac{2}{7}x - \frac{3}{8} \leq 0$
10. $\frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{9}x + \frac{4}{7} < 0$
11. $\frac{3}{2}x^2 - \frac{5}{4}x + \frac{1}{3} \geq 0$
12. $-\frac{1}{3}x^2 + \frac{4}{5}x - \frac{2}{7} \leq 0$
13. $\frac{2}{5}x^2 + \frac{3}{4}x + \frac{7}{8} \geq 0$
14. $-\frac{4}{9}x^2 + \frac{2}{7}x - \frac{3}{5} \leq 0$
15. $\frac{5}{6}x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{4}{9} \geq 0$

4. Tarea 1

A partir de los ejercicios anteriores se extraen varios para generar la primera tarea, de la cuál se tomarán varios ejercicios para la primera evaluación parcial.

1. Resuelve las siguientes ecuaciones

- I. $2x + 3 = 4x - 1$
- II. $8x + 6 = -2x - 4$
- III. $6x - 5 = -3x + 2$
- IV. $-3x + 4 = 7x + 2$
- V. $12x - 8 = -10x + 14$
- VI. $-6x + 7 = 8x - 9$
- VII. $-13x + 16 = 15x - 18$
- VIII. $14x + 20 = -16x - 22$

2. Resuelve las siguientes ecuaciones de la forma

- I. $\frac{2}{3}x - \frac{5}{4} = \frac{7}{6}$
- II. $\frac{4}{5}x - \frac{2}{3} = -\frac{1}{6}$
- III. $\frac{11}{12}x + \frac{10}{11} = -\frac{9}{10}$
- IV. $\frac{3}{4}x - \frac{4}{5} = -\frac{1}{2}$
- V. $\frac{6}{7}x + \frac{8}{9} = -\frac{10}{11}$
- VI. $\frac{9}{10}x + \frac{1}{3} = -\frac{5}{6}$

3. Resuelve las siguientes ecuaciones de la forma

- III. $\frac{9}{10}x + \frac{7}{12} = -\frac{4}{5}x + \frac{1}{3}$
- IV. $-\frac{11}{12}x + \frac{8}{9} = \frac{7}{10}x - \frac{6}{7}$
- V. $-\frac{7}{8}x - \frac{6}{7} = \frac{5}{6}x - \frac{3}{5}$

$$\begin{aligned}\text{VI. } \frac{5}{6}x + \frac{4}{5} &= -\frac{3}{4}x + \frac{2}{3} \\ \text{VII. } -\frac{4}{5}x + \frac{3}{4} &= \frac{2}{3}x - \frac{1}{2} \\ \text{VIII. } \frac{1}{3}x + \frac{5}{7} &= -\frac{9}{10}x + \frac{8}{9}\end{aligned}$$

4. Resuelve las siguientes ecuaciones de la forma

$$\begin{aligned}\text{I. } \frac{3}{4} + \left\{ \frac{2}{5} \left[\frac{5}{6} \left(\frac{2}{3}x + \frac{4}{5} \right) + \frac{7}{8} \left(\frac{3}{4}x + \frac{5}{6} \right) + \frac{1}{2} \right] \right\} &= \frac{9}{10} \left(\frac{4}{5}x + \frac{6}{7} \right) + \frac{1}{3} + \frac{4}{5}x \\ \text{II. } \frac{3}{4} - \left\{ \frac{6}{7} \left[\frac{5}{6} \left(\frac{3}{4}x - \frac{4}{5} \right) + \frac{7}{8} \left(\frac{2}{3}x - \frac{5}{6} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} &= \frac{9}{10} \left(\frac{4}{5}x + \frac{6}{7} \right) - \frac{1}{3} + \frac{4}{5}x \\ \text{III. } -\frac{4}{5} + \left\{ \frac{7}{8} \left[\frac{5}{6} \left(\frac{3}{4}x - \frac{2}{3} \right) + \frac{4}{5} \left(\frac{6}{7}x - \frac{5}{6} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} &= \frac{3}{4} \left(\frac{2}{3}x + \frac{7}{8} \right) - \frac{1}{6} - \frac{2}{5}x \\ \text{IV. } \frac{7}{8} + \left\{ -\frac{5}{6} \left[\frac{3}{4} \left(\frac{4}{5}x - \frac{6}{7} \right) + \frac{6}{7} \left(\frac{5}{6}x + \frac{3}{4} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} &= -\frac{4}{5} \left(\frac{4}{5}x + \frac{5}{6} \right) - \frac{2}{3} + \frac{7}{8}x \\ \text{V. } -\frac{6}{7} - \left\{ \frac{4}{5} \left[\frac{2}{3} \left(\frac{5}{6}x - \frac{2}{3} \right) + \frac{7}{8} \left(\frac{4}{5}x + \frac{7}{8} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} &= -\frac{8}{9} \left(\frac{6}{7}x + \frac{4}{5} \right) - \frac{1}{9} - \frac{8}{9}x \\ \text{VI. } -\frac{4}{5} + \left\{ \frac{7}{8} \left[-\frac{2}{3} \left(\frac{5}{6}x - \frac{7}{8} \right) - \frac{4}{5} \left(\frac{6}{7}x + \frac{2}{3} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} &= -\frac{3}{4} \left(\frac{5}{6}x + \frac{7}{8} \right) - \frac{1}{10} - \frac{2}{3}x\end{aligned}$$

5. Resuelve los ejercicios de la forma

$$\begin{aligned}\text{III. } \frac{\frac{5x-7}{9}}{\frac{10}{10}} - \frac{3}{4} &= -\frac{\frac{11x+13}{12}}{\frac{15}{15}} \\ \text{IV. } \frac{\frac{6x-8}{7}}{\frac{10}{11}} + \frac{3}{4} &= \frac{\frac{14x+16}{15}}{\frac{17}{18}} \\ \text{V. } \frac{-\frac{2x+4}{3}}{\frac{6}{7}} - \frac{1}{2} &= -\frac{\frac{8x+10}{9}}{\frac{12}{12}} \\ \text{VI. } -\frac{-\frac{6x+8}{7}}{\frac{10}{11}} + \frac{4}{5} &= -\frac{\frac{14x-16}{15}}{\frac{17}{18}} \\ \text{VII. } \frac{\frac{8x-10}{9}}{-\frac{12}{13}} - \frac{6}{7} &= \frac{\frac{16x-18}{17}}{\frac{20}{20}}\end{aligned}$$

6. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $2x + 3 > 7$
2. $3x - 2 > 2x + 4$
3. $5x - 2 > 3x + 4$
4. $3x - 1 > 4x - 3$
5. $3x + 2 > 2x - 5$
6. $-2x + 1 > 5x - 8$

7. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} > 1$
2. $\frac{2}{3}x + \frac{1}{4} > \frac{5}{6}x - \frac{1}{2}$
3. $\frac{1}{3}x - \frac{2}{5} > \frac{2}{7}x - \frac{1}{7}$

4. $-\frac{1}{2}x + \frac{1}{3} > -\frac{3}{4}x - \frac{1}{6}$

5. $-\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} > \frac{3}{5}x + \frac{1}{10}$

6. $\frac{2}{5}x - \frac{1}{4} > -\frac{1}{2}x + \frac{3}{8}$

8. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $2x + 3 < 7$

2. $2x + 1 < 3x - 2$

3. $5x - 2 < 3x + 4$

4. $2x + 4 < 6x - 8$

5. $2x - 5 < x - 3$

6. $-2x + 1 < 5x - 8$

9. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} < \frac{5}{8}$

2. $-\frac{2}{3}x + \frac{4}{5} < \frac{1}{2}$

3. $-\frac{2}{5}x + \frac{1}{3} < -\frac{1}{15}$

4. $\frac{1}{3}x - \frac{2}{5} < \frac{2}{7}x - \frac{1}{7}$

5. $-\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} < \frac{3}{5}x + \frac{1}{10}$

6. $\frac{2}{5}x - \frac{1}{4} < -\frac{1}{2}x + \frac{3}{8}$

10. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $2x + 3 \geq 5$

2. $2x - 3 \geq x + 2$

3. $4x - 1 \geq x + 5$

4. $2x + 4 \geq 4x - 2$

5. $2x - 5 \geq x - 1$

6. $-2x + 1 \geq -5x + 4$

11. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \geq \frac{5}{8}$

2. $\frac{2}{3}x + \frac{1}{4} \geq \frac{5}{6}x - \frac{1}{2}$

3. $\frac{1}{3}x - \frac{2}{5} \geq \frac{2}{7}x - \frac{1}{7}$

4. $-\frac{1}{2}x + \frac{1}{3} \geq -\frac{3}{4}x - \frac{1}{6}$

5. $\frac{1}{4}x - \frac{1}{2} \geq \frac{2}{3}x - \frac{4}{6}$

6. $\frac{2}{5}x - \frac{1}{4} \geq -\frac{1}{2}x + \frac{3}{8}$

12. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

2. $-3x + 4 \leq 5$

3. $-5x + 3 \leq 2$

4. $2x + 1 \leq 5x - 2$

5. $3x - 1 \leq 5x + 2$

6. $-2x + 3 \leq -4x - 1$

7. $-2x + 4 \leq 5x + 1$

13. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \leq \frac{5}{8}$

2. $-\frac{2}{5}x + \frac{1}{3} \leq -\frac{1}{15}$

3. $\frac{1}{2}x - \frac{1}{3} \leq \frac{2}{5}x - \frac{7}{15}$

4. $-\frac{3}{4}x + \frac{1}{2} \leq \frac{2}{3}x - \frac{1}{4}$

5. $-\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \leq \frac{3}{5}x + \frac{1}{10}$

6. $\frac{2}{5}x - \frac{1}{4} \leq -\frac{1}{2}x + \frac{3}{8}$

14. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $2 < x + 3 < 5$

2. $-1 < 2x - 1 < 1$

3. $-\frac{1}{2} < \frac{3}{4}x + \frac{1}{2} < \frac{1}{2}$

4. $-4 < -3x + 5 < 3$

5. $1 < \frac{1}{2}x + \frac{1}{3} < 2$

6. $-\frac{3}{4} < \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} < \frac{3}{4}$

15. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $-2 < 3x + 1 \leq 5$

2. $-\frac{4}{5} < \frac{1}{2}x - \frac{3}{4} \leq 2$

3. $1 < \frac{1}{2}x + \frac{1}{3} \leq 2$

4. $-3 < -2x + 5 \leq 3$
 5. $1 < \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} \leq 2$
 6. $2 < -\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \leq 3$
16. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma
2. $-\frac{4}{5} \leq \frac{1}{2}x - \frac{3}{4} < 2$
 3. $-2 \leq \frac{3}{2}x - 1 < 1$
 4. $-\frac{1}{2} \leq \frac{3}{4}x + \frac{1}{2} < \frac{1}{2}$
 5. $1 \leq \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} < 2$
 6. $-3 \leq 2x + 7 < -1$
 7. $2 \leq -\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} < 3$
17. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma
1. $-1 \leq x \leq 2$
 2. $-\frac{1}{3} \leq \frac{1}{6}x + \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}$
 3. $-\frac{3}{4} \leq -\frac{1}{2}x + \frac{1}{4} \leq \frac{1}{4}$
 4. $1 \leq -\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \leq 3$
 5. $-1 \leq \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} \leq 3$
 6. $-2 \leq \frac{1}{4}x + \frac{1}{2} \leq 3$
18. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma
3. $|3x - 1| < 7$
 4. $|x - 2| < 4$
 5. $|\frac{3}{2}x + 1| < 5$
 6. $|2x + 1| < 6$
 7. $|\frac{1}{4}x + 1| < \frac{7}{2}$
 8. $|\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}| < \frac{5}{6}$
19. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma**
4. $|\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}| \leq \frac{4}{3}$
 5. $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| \leq \frac{5}{4}$
 6. $|2x + 1| \leq 7$

7. $|- \frac{1}{2}x + \frac{3}{4}| \leq 2$
8. $|\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}| \leq 1$
9. $|\frac{1}{4}x + \frac{1}{2}| \leq \frac{5}{4}$
20. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $|3x - 1| > 4$
2. $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| > \frac{1}{2}$
3. $|\frac{1}{2}x + 1| > \frac{3}{4}$
4. $|\frac{3}{2}x + 1| > \frac{7}{2}$
5. $|\frac{1}{4}x + 1| > 1$
6. $|- \frac{1}{2}x + \frac{3}{4}| > \frac{1}{2}$

21. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $|3x - 1| \geq 4$
2. $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| \geq \frac{1}{2}$
3. $|x - 2| \geq 1$
4. $|\frac{1}{2}x + 1| \geq \frac{3}{4}$
5. $|\frac{1}{4}x + 1| \geq 1$
6. $|\frac{1}{4}x + \frac{1}{2}| \geq 1$

22. Resuelve los ejercicios siguientes, encuentra el intervalo solución y proporciona su gráfica

- I. $|- \frac{1}{3}x + \frac{2}{5}| \leq \frac{4}{5}$
II. $|- \frac{2}{5}x - \frac{1}{3}| \leq \frac{2}{5}$
III. $|- \frac{1}{4}x - \frac{1}{8}| \leq \frac{3}{4}$
IV. $|- \frac{2}{5}x - \frac{7}{8}| \leq \frac{2}{3}$
V. $|\frac{5}{11}x + \frac{1}{7}| \leq \frac{5}{11}$
VI. $|\frac{3}{8}x - \frac{2}{9}| \leq \frac{3}{4}$

23. Realiza lo mismo para los siguientes ejercicios

- I. $|- \frac{2}{5}x + \frac{3}{4}| \leq \frac{1}{2}$
II. $|\frac{3}{8}x - \frac{1}{6}| \leq \frac{2}{5}$
III. $|- \frac{1}{4}x + \frac{7}{9}| \leq \frac{5}{8}$
IV. $|\frac{5}{8}x - \frac{1}{3}| \leq \frac{3}{8}$

$$\text{V. } \left| \frac{1}{6}x - \frac{2}{9} \right| \leq \frac{1}{4}$$

$$\text{VI. } \left| -\frac{4}{7}x - \frac{3}{10} \right| \leq \frac{1}{7}$$

24. Finalmente realiza lo mismo para la siguiente lista:

$$\text{I. } \left| -\frac{4}{9}x + \frac{5}{8} \right| \geq \frac{1}{3}$$

$$\text{II. } \left| -\frac{5}{6}x + \frac{3}{10} \right| \geq \frac{2}{3}$$

$$\text{III. } \left| \frac{4}{11}x - \frac{3}{8} \right| \leq \frac{1}{5}$$

$$\text{IV. } \left| \frac{1}{4}x + \frac{7}{9} \right| \leq \frac{2}{7}$$

$$\text{V. } \left| \frac{5}{11}x - \frac{2}{8} \right| \leq \frac{4}{11}$$

$$\text{VI. } \left| -\frac{1}{5}x + \frac{6}{11} \right| > \frac{2}{9}$$

25. Un poco más de ejercicios finales

$$\text{III. } \left| \frac{-2x+9}{7} \right| > \frac{4}{9}$$

$$\text{IV. } \left| \frac{-8x+3}{6} \right| > \frac{1}{5}$$

$$\text{V. } \left| \frac{11x-6}{10} \right| \leq \frac{5}{9}$$

$$\text{VI. } \left| -\frac{18x-9}{5} \right| \leq \frac{7}{12}$$

$$\text{VII. } \left| \frac{25x+8}{6} \right| < \frac{2}{7}$$

$$\text{VIII. } \left| -\frac{-31x-4}{9} \right| \geq \frac{1}{5}$$

26. Ejercicios finales

$$\text{IV. } \left| \frac{-4x-9}{5} + \frac{2}{3} \right| \geq \frac{8}{9}$$

$$\text{V. } \left| -\frac{-2x-1}{10} + \frac{14}{13} \right| \geq \frac{16}{17}$$

$$\text{VI. } \left| \frac{-10x-7}{13} + \frac{12}{11} \right| \geq \frac{16}{15}$$

$$\text{VII. } \left| \frac{-17x+6}{5} - \frac{8}{7} \right| > \frac{3}{4}$$

$$\text{VIII. } \left| -\frac{23x-5}{2} + \frac{14}{15} \right| \leq \frac{16}{17}$$

$$\text{IX. } \left| \frac{-16x+7}{9} - \frac{11}{10} \right| > \frac{8}{9}$$

27. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

$$1. x^2 - 3x + 2 > 0$$

$$2. x^2 + 2x + 1 > 0$$

$$3. 2x^2 - 7x + 6 > 0$$

$$4. \frac{1}{5}x^2 - \frac{2}{5}x + \frac{1}{2} > 0$$

$$5. x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} > 0$$

$$6. 3x^2 - 10x + 6 > 0$$

28. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $x^2 - 4x + 3 \geq 0$
2. $x^2 + 2x + 1 \geq 0$
3. $4x^2 - 12x + 9 \geq 0$
4. $\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - 1 \geq 0$
5. $x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} \geq 0$
6. $3x^2 - 10x + 6 \geq 0$

29. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $x^2 - 4x + 3 < 0$
2. $2x^2 - 5x - 3 < 0$
3. $-x^2 + 6x - 9 < 0$
4. $-4x^2 + 16x - 12 < 0$
5. $-x^2 + x + 12 < 0$
6. $\frac{3}{2}x^2 - \frac{5}{2}x - 1 < 0$

30. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $x^2 - 2x + 1 \leq 0$
2. $-x^2 + 4x - 4 \leq 0$
3. $\frac{1}{3}x^2 + \frac{5}{3}x + 2 \leq 0$
4. $-x^2 + 3x + 6 \leq 0$
5. $3x^2 - 2x - 2 \leq 0$
6. $\frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{2}x + 2 \leq 0$

5. Completitud de los números reales

La completitud constituye una de las propiedades fundamentales de $\mathbb{R}$ y es la que permite desarrollar rigurosamente gran parte del Cálculo.

Antes de formularla necesitamos introducir los conceptos de cota superior, cota inferior, supremo e ínfimo.

5.1. Conjuntos acotados

Sea

$$A \subseteq \mathbb{R}, \quad A \neq \emptyset.$$

Definición. Un número $M \in \mathbb{R}$ se denomina *cota superior* de A si

$$x \leq M$$

para todo $x \in A$.

Equivalentemente,

$$M \text{ es cota superior de } A \iff (\forall x \in A)(x \leq M).$$

Si A posee al menos una cota superior, decimos que A está *acotado superiormente*.

Ejemplo. Consideremos

$$A = (0, 1).$$

El número 1 es una cota superior de A , pues

$$x < 1$$

para todo $x \in A$.

Sin embargo, 2, 3 y 100 también son cotas superiores de A .

De manera análoga:

Definición. Un número $m \in \mathbb{R}$ se denomina *cota inferior* de A si

$$m \leq x$$

para todo $x \in A$.

Si A posee una cota inferior, decimos que está *acotado inferiormente*.

Finalmente, un conjunto se denomina *acotado* si está acotado tanto superior como inferiormente.

5.2. Máximo y mínimo

Es importante distinguir entre una cota y un elemento perteneciente al conjunto.

Definición. Un elemento $M \in A$ se denomina *máximo* de A si

$$x \leq M$$

para todo $x \in A$.

En tal caso escribimos

$$M = \text{máx } A.$$

Análogamente, $m \in A$ es el *mínimo* de A si

$$m \leq x$$

para todo $x \in A$, y escribimos

$$m = \text{mín } A.$$

Por ejemplo, si

$$A = (0, 1),$$

entonces A no tiene máximo ni mínimo, pues

$$0 \notin A \quad \text{y} \quad 1 \notin A.$$

En cambio, si

$$B = [0, 1],$$

entonces

$$\text{mín } B = 0, \quad \text{máx } B = 1.$$

5.3. Supremo

La existencia de una cota superior no implica que exista un máximo. Esto conduce al concepto de supremo.

Definición. Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ un conjunto no vacío y acotado superiormente. Un número $s \in \mathbb{R}$ se denomina *supremo* de A si:

1. s es una cota superior de A , es decir,

$$x \leq s \quad \text{para todo } x \in A;$$

2. s es la menor de todas las cotas superiores de A .

Escribimos

$$s = \sup A.$$

En otras palabras,

$\sup A = \text{la menor cota superior de } A.$

Ejemplo. Sea

$$A = (0, 1).$$

Tenemos

$$\sup A = 1.$$

Obsérvese que

$$1 \notin A.$$

Por tanto, el supremo de un conjunto no necesariamente pertenece al conjunto.

Si el supremo pertenece al conjunto, entonces coincide con su máximo:

$$\sup A \in A \implies \sup A = \max A.$$

5.4. Ínfimo

El concepto dual al supremo es el ínfimo.

Definición. Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ un conjunto no vacío y acotado inferiormente. Un número $r \in \mathbb{R}$ se denomina *ínfimo* de A si:

1. r es una cota inferior de A ;
2. r es la mayor de todas las cotas inferiores de A .

Escribamos

$$r = \inf A.$$

Por tanto,

$$\boxed{\inf A = \text{la mayor cota inferior de } A.}$$

Por ejemplo, si

$$A = (0, 1),$$

entonces

$$\inf A = 0, \quad \sup A = 1,$$

aunque ninguno de estos dos números pertenece a A .

5.5. Axioma de completitud

Ya podemos introducir la propiedad que distingue fundamentalmente a $\mathbb{R}$ de $\mathbb{Q}$.

Axioma de completitud o propiedad del supremo.

Todo subconjunto no vacío de $\mathbb{R}$ que esté acotado superiormente posee un supremo en $\mathbb{R}$.

En símbolos, si

$$A \subseteq \mathbb{R}, \quad A \neq \emptyset,$$

y existe $M \in \mathbb{R}$ tal que

$$x \leq M \quad \text{para todo } x \in A,$$

entonces existe $s \in \mathbb{R}$ tal que

$$s = \sup A.$$

Podemos resumirlo mediante

$$A \neq \emptyset \quad \text{y} \quad A \text{ acotado superiormente} \implies \sup A \in \mathbb{R}.$$

Esta propiedad recibe el nombre de *completitud de los números reales*.

5.6. ¿Por qué los racionales no son completos?

La diferencia fundamental entre $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R}$ puede observarse considerando el conjunto

$$A = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\}.$$

Este conjunto es no vacío y está acotado superiormente en $\mathbb{Q}$. Sin embargo, no posee un supremo que pertenezca a $\mathbb{Q}$.

Intuitivamente, el número que debería ocupar esa posición es

$$\sqrt{2},$$

pero sabemos que

$$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}.$$

En cambio,

$$\sqrt{2} \in \mathbb{R}.$$

Así, considerado como subconjunto de $\mathbb{R}$,

$$\sup A = \sqrt{2}.$$

Este ejemplo exhibe una “laguna” en los números racionales que no está presente en los números reales.

Por esta razón,

$$\mathbb{Q} \text{ es un campo ordenado, pero no es completo.}$$

mientras que

$$\mathbb{R} \text{ es un campo ordenado completo.}$$

6. Apéndice: Ecuación general de segundo grado

6.1. Factorización

Realiza las siguientes factorizaciones

1. $x^2 + 5x + 6$
2. $3x^2 - 7x - 6$
3. $2x^2 + 5x - 3$
4. $4x^2 - 4x - 3$
5. $5x^2 + 13x + 6$
6. $3x^2 + 14x + 8$
7. $x^2 + 10x + 21$
8. $2x^2 - 5x - 12$
9. $6x^2 - 11x - 10$
10. $8x^2 + 12x + 4$
11. $9x^2 - 30x + 25$
12. $4x^3 - 12x^2 - 8x$
13. $3x^3 + 12x^2 + 12x$
14. $2x^3 + 2x^2 - 8x$
15. $5x^3 - 125$
16. $27x^3 + 1$
17. $x^3 + 8y^3$
18. $4x^3 - 25y^3$
19. $3x^2 - 27y^2$

6.1.1. Factorización simple

1. $x^2 + 4x + 4$
2. $2x^2 + 5x + 2$
3. $3x^2 - 7x + 2$
4. $4x^2 + 12x + 9$
5. $x^2 + 8x + 16$
6. $2x^2 - 3x - 2$
7. $3x^2 + 10x + 8$
8. $4x^2 - 16x + 16$
9. $x^2 - 6x + 9$
10. $2x^2 + x - 6$
11. $3x^2 - 2x - 1$
12. $4x^2 - 8x - 3$
13. $x^2 - 5x + 6$
14. $2x^2 - 5x - 3$
15. $3x^2 + 4x - 4$

6.1.2. Factorización por binomios conjugados

1. $x^2 - 2x + 1$
2. $4x^2 - 9$
3. $9x^2 - 25$
4. $16x^2 - 25$
5. $x^2 + 4x + 4$
6. $2x^2 - 8x + 8$
7. $3x^2 + 6x + 3$
8. $4x^2 + 20x + 25$
9. $x^2 + 6x + 9$
10. $2x^2 - 2x - 4$
11. $3x^2 + 2x - 1$
12. $x^2 - 6x + 13$
13. $4x^2 - 4x + 1$
14. $2x^2 + 5x - 3$
15. $5x^2 + 7x + 2$

6.1.3. Ejercicios varios

1. $x^2 + 6x + 9$
2. $x^2 - 4x + 4$
3. $4x^2 - 12x + 9$
4. $3x^2 - 18x + 27$
5. $x^2 - 8x + 16$
6. $x^2 + 2x + 1$
7. $2x^2 + 5x - 3$
8. $3x^2 - 2x - 1$
9. $2x^2 - 3x - 9$
10. $4x^2 - 16x + 15$
11. $3x^2 + 4x - 2$
12. $5x^2 - 4x - 1$
13. $2x^2 + 7x + 3$
14. $4x^2 + 7x + 2$
15. $x^2 + 4x - 5$
16. $x^2 - 2x + 1$
17. $4x^2 - 16x + 16$
18. $x^2 + 8x + 16$
19. $2x^2 - 6x + 2$
20. $9x^2 - 12x + 4$
21. $x^2 - 2x + 4$
22. $2x^2 - 4x - 2$
23. $x^2 - 6x - 10$
24. $3x^2 + 4x - 10$
25. $5x^2 - 10x - 7$
26. $-x^2 + 4x + 9$
27. $-4x^2 - 20x + 25$
28. $x^2 - 10x - 29$
29. $-2x^2 + 8x + 13$
30. $3x^2 - 2x - 1$
31. $(1/2)x^2 - 5/2x + 25/16$
32. $(3/4)x^2 + (1/2)x - 1/16$
33. $-(2/3)x^2 - 8/3x + 32/27$
34. $(1/2)x^2 + 5/2x + 25/16$
35. $(5/3)x^2 + (2/3)x + 1/9$

6.1.4. Factorización por trinomio cuadrado perfecto

1. $x^2 + 6x + 9$
2. $9x^2 - 30x + 25$
3. $16x^2 - 56x + 49$
4. $4x^2 - 20x + 25$
5. $25x^2 + 20x + 4$
6. $36x^2 + 72x + 36$
7. $9x^2 + 24x + 16$
8. $64x^2 - 16x + 1$
9. $121x^2 + 22x + 1$
10. $25x^2 + 10x + 1$
11. $16x^2 - 32x + 16$
12. $4x^2 + 8x + 4$
13. $9x^2 - 42x + 49$
14. $49x^2 - 14x + 1$
15. $36x^2 - 24x + 4$
16. $121x^2 - 22x + 1$

17. $25x^2 - 60x + 36$

19. $100x^2 + 20x + 1$

18. $81x^2 - 36x + 4$

6.1.5. Método de factorización simple

1. $x^2 + 5x + 6 = 0$

9. $x^2 + 7x + 12 = 0$

2. $2x^2 - 7x - 15 = 0$

10. $4x^2 + 8x + 3 = 0$

3. $3x^2 + 4x + 1 = 0$

11. $2x^2 + 5x + 3 = 0$

4. $x^2 - 6x + 8 = 0$

12. $5x^2 - 12x + 3 = 0$

5. $5x^2 + 8x + 3 = 0$

13. $3x^2 + 5x - 2 = 0$

6. $2x^2 + 3x - 2 = 0$

14. $x^2 + 6x + 8 = 0$

7. $x^2 + 4x + 3 = 0$

15. $6x^2 + 5x - 6 = 0$

8. $3x^2 - 2x - 1 = 0$

6.1.6. Método de Binomio Conjugado

1. $x^2 + 2x + 1 = 0$

9. $x^2 + 6x + 9 = 0$

2. $2x^2 + 6x + 4 = 0$

10. $4x^2 + 4x - 1 = 0$

3. $3x^2 - 12x + 9 = 0$

11. $2x^2 + x + 1 = 0$

4. $x^2 - 10x + 25 = 0$

12. $5x^2 + 4x - 3 = 0$

5. $4x^2 + 12x + 9 = 0$

13. $3x^2 - 10x + 7 = 0$

6. $2x^2 - 5x + 2 = 0$

14. $x^2 - 5x + 6 = 0$

7. $x^2 - 8x + 16 = 0$

15. $6x^2 - 5x + 1 = 0$

8. $3x^2 - 4x - 1 = 0$

6.1.7. Método de trinomio cuadrado perfecto

1. $x^2 - 10x + 21 = 0$

6. $3x^2 + 10x - 8 = 0$

2. $x^2 + 6x + 9 = 0$

7. $4x^2 - 4x + 1 = 0$

3. $x^2 - 12x + 27 = 0$

8. $x^2 + 2x - 15 = 0$

4. $x^2 - 8x + 12 = 0$

9. $x^2 + 6x - 27 = 0$

5. $x^2 - 4x - 12 = 0$

10. $2x^2 - 12x + 18 = 0$

11. $x^2 + 7x + 12 = 0$

14. $x^2 - 2x - 15 = 0$

12. $x^2 - 7x + 10 = 0$

15. $x^2 + 10x + 21 = 0$

13. $2x^2 + 5x - 3 = 0$

6.2. Método de Fórmula general

1. $x^2 - 2x - 3 = 0$

9. $3x^2 + 10x + 3 = 0$

2. $x^2 + 4x + 3 = 0$

10. $x^2 + 8x + 16 = 0$

3. $2x^2 - 8x - 6 = 0$

11. $5x^2 - 3x - 7 = 0$

4. $3x^2 + 6x + 3 = 0$

12. $4x^2 - 4x + 1 = 0$

5. $4x^2 - 12x + 9 = 0$

13. $6x^2 - 7x - 3 = 0$

6. $x^2 + 6x - 16 = 0$

14. $x^2 + 10x + 29 = 0$

7. $2x^2 + 7x + 5 = 0$

15. $2x^2 + 3x - 2 = 0$

8. $x^2 - 7x + 10 = 0$