

Resumen Matemático Ampliado: *Logistic Regression in Data Analysis: An Overview* (Maalouf, 2011)

Carlos – Compilado con ayuda de ChatGPT

Modelo de regresión logística

Para una variable binaria $y_i \in \{0, 1\}$, el modelo de regresión logística predice la probabilidad:

$$p_i = \frac{1}{1 + e^{-x_i\beta}}$$

Función de verosimilitud

$$L(\beta) = \prod_{i=1}^n p_i^{y_i} (1 - p_i)^{1-y_i}$$

Log-verosimilitud

$$\ell(\beta) = \sum_{i=1}^n [y_i \ln(p_i) + (1 - y_i) \ln(1 - p_i)]$$

Usando que $p_i = \frac{1}{1+e^{-x_i\beta}}$, entonces:

$$\ell(\beta) = \sum_{i=1}^n [y_i x_i \beta - \ln(1 + e^{x_i \beta})]$$

Derivadas: Gradiente y Hessiano

Gradiente

Partimos de:

$$\ell(\beta) = \sum_{i=1}^n [y_i x_i \beta - \ln(1 + e^{x_i \beta})]$$

Derivando con respecto a β_j :

$$\frac{\partial \ell(\beta)}{\partial \beta_j} = \sum_{i=1}^n \left[y_i x_{ij} - \frac{e^{x_i \beta}}{1 + e^{x_i \beta}} x_{ij} \right] = \sum_{i=1}^n x_{ij} (y_i - p_i)$$

Forma vectorial del gradiente:

$$\nabla_{\beta} \ell(\beta) = X^{\top}(\mathbf{y} - \mathbf{p})$$

Hessiano

La derivada del gradiente es:

$$\frac{\partial^2 \ell(\beta)}{\partial \beta_j \partial \beta_k} = - \sum_{i=1}^n x_{ij} x_{ik} p_i (1 - p_i)$$

Forma matricial:

$$\nabla_{\beta}^2 \ell(\beta) = -X^{\top} V X, \quad \text{donde } V = \text{diag}(p_i(1 - p_i))$$

Regularización Ridge (L2)

Penalización L2 añadida a la log-verosimilitud:

$$\ell_{\lambda}(\beta) = \ell(\beta) - \frac{\lambda}{2} \|\beta\|^2$$

Gradiente regularizado:

$$\nabla_{\beta} \ell_{\lambda}(\beta) = X^{\top}(\mathbf{y} - \mathbf{p}) - \lambda \beta$$

Hessiano regularizado:

$$\nabla_{\beta}^2 \ell_{\lambda}(\beta) = -X^{\top} V X - \lambda I$$

TR-IRLS (Trust Region IRLS)

Actualización de Newton truncado:

$$\beta^{(k+1)} = \beta^{(k)} + s$$

Donde s resuelve:

$$(X^{\top} V X + \lambda I) s = X^{\top} V z - \lambda \beta$$

Eventos raros y correcciones

Ajuste del intercepto (King & Zeng)

$$\tilde{\beta}_0 = \hat{\beta}_0 - \ln \left[\left(\frac{1 - \tau}{\tau} \right) \left(\frac{\hat{y}}{1 - \hat{y}} \right) \right]$$

Muestreo estratificado y ponderación

Peso para observación i :

$$w_i = \frac{Q_i}{H_i}$$

Verosimilitud ponderada:

$$\ell_w(\beta) = \sum_{i=1}^n w_i \ln \left(\frac{e^{x_i \beta}}{1 + e^{x_i \beta}} \right)$$

Corrección de Firth

Log-verosimilitud penalizada (ajuste de Jeffreys):

$$\ell^*(\beta) = \ell(\beta) + \frac{1}{2} \log |I(\beta)|$$

Regla de decisión

$$\hat{y}_i = \begin{cases} 1 & \text{si } p_i \geq c \\ 0 & \text{si } p_i < c \end{cases}, \quad \text{con } c = 0.5$$