

# Manipuler les vecteurs du plan

Laurent Garnier

19 décembre 2025



# Table des matières

<b>I</b>	<b>Introduction</b>	<b>11</b>
1	À qui s'adresse ce livre	13
2	Organisation de l'ouvrage	15
<b>II</b>	<b>Contenus</b>	<b>17</b>
3	Contenu 1	21
3.1	Objectifs pédagogiques . . . . .	21
3.2	Exercice 1 . . . . .	22
3.3	Exercice 2 . . . . .	23
3.4	Programme 1 . . . . .	23
3.5	QCM d'auto-évaluation . . . . .	23
4	Contenu 2	25
4.1	Objectifs pédagogiques . . . . .	25
4.2	Exercice 3 . . . . .	25
4.3	Programme 2 . . . . .	26
4.4	QCM d'auto-évaluation . . . . .	27
5	Contenu 3	29
5.1	Objectifs pédagogiques . . . . .	29

5.2	Exercice 4 . . . . .	29
5.3	Programme 3 . . . . .	30
5.4	QCM d'auto-évaluation . . . . .	30
<b>6</b>	<b>Contenu 4</b>	<b>33</b>
6.1	Objectifs pédagogiques . . . . .	33
6.2	Exercice 5 . . . . .	33
6.3	Exercice 5 bis . . . . .	34
6.4	Exercice 5 ter . . . . .	35
6.5	Programme 4 . . . . .	35
6.6	QCM d'auto-évaluation . . . . .	36
<b>7</b>	<b>Contenu 5</b>	<b>39</b>
7.1	Objectifs pédagogiques . . . . .	39
7.2	Exercice 6 . . . . .	39
7.3	Programme 5 . . . . .	40
7.4	QCM d'auto-évaluation . . . . .	40
<b>8</b>	<b>Contenu 6</b>	<b>43</b>
8.1	Objectifs pédagogiques . . . . .	43
8.2	Exercice 7 . . . . .	43
8.3	Programme 6 . . . . .	44
8.4	QCM d'auto-évaluation . . . . .	45
<b>9</b>	<b>Contenu 7</b>	<b>47</b>
9.1	Objectifs pédagogiques . . . . .	47
9.2	Exercice 8 . . . . .	47
9.3	Programme 7 . . . . .	49
9.4	QCM d'auto-évaluation . . . . .	49

<b>III Capacités attendues</b>	<b>51</b>
<b>10 Capacité attendue 1</b>	<b>55</b>
10.1 Objectifs pédagogiques . . . . .	55
10.2 Exercice 9 . . . . .	55
10.3 QCM d'auto-évaluation . . . . .	56
<b>11 Capacité attendue 2</b>	<b>59</b>
11.1 Objectifs pédagogiques . . . . .	59
11.2 Exercice 10 . . . . .	59
11.3 QCM d'auto-évaluation . . . . .	60
<b>12 Capacité attendue 3</b>	<b>63</b>
12.1 Objectifs pédagogiques . . . . .	63
12.2 Exercice 11 . . . . .	63
12.3 QCM d'auto-évaluation . . . . .	64
<b>13 Capacité attendue 4</b>	<b>67</b>
13.1 Objectifs pédagogiques . . . . .	67
13.2 Exercice 12 . . . . .	67
13.3 QCM d'auto-évaluation . . . . .	68
<b>14 Capacité attendue 5</b>	<b>71</b>
14.1 Objectifs pédagogiques . . . . .	71
14.2 Exercice 13 . . . . .	71
14.3 QCM d'auto-évaluation . . . . .	72
<b>15 Capacité attendue 6</b>	<b>75</b>
15.1 Objectifs pédagogiques . . . . .	75
15.2 Exercice 14 . . . . .	75
15.3 QCM d'auto-évaluation . . . . .	76

<b>16 Capacité attendue 7</b>	<b>79</b>
16.1 Objectifs pédagogiques . . . . .	79
16.2 Exercice 15 . . . . .	79
16.3 Programme . . . . .	80
16.4 QCM d'auto-évaluation . . . . .	80
<b>IV Exercices complémentaires</b>	<b>87</b>
<b>17 Pour s'exercer davantage</b>	<b>89</b>
17.1 Exercice 16 . . . . .	89
17.2 Exercice 17 . . . . .	91
17.3 Exercice 18 . . . . .	92
17.4 Exercice 19 . . . . .	92
17.5 Exercice 20 . . . . .	93
17.6 Exercice 21 . . . . .	94
17.7 Exercice 22 . . . . .	95
17.8 Exercice 23 . . . . .	96
17.9 Exercice 24 . . . . .	97
17.10 Exercice 25 . . . . .	98
17.11 Exercice 26 . . . . .	99
<b>V Exercices de synthèse</b>	<b>101</b>
<b>18 Représentation par coordonnées (dans un repère)</b>	<b>103</b>
18.1 Exercice 27 . . . . .	103
<b>19 Représentation géométrique (sans repère)</b>	<b>105</b>
19.1 Exercice 28 . . . . .	105
19.2 Exercice 29 . . . . .	106

<b>20 Colinéarité et alignement</b>	<b>107</b>
20.1 Exercice 30 . . . . .	107
20.2 Exercice 31 . . . . .	107
<b>VI Démonstrations</b>	<b>109</b>
<b>21 Démonstrations</b>	<b>111</b>
21.1 Exercice 32 . . . . .	111
21.2 Exercice 32bis . . . . .	111
21.3 Exercice 32ter . . . . .	111
<b>VII Exercices divers</b>	<b>113</b>
<b>22 Alphabet</b>	<b>115</b>
22.1 Introduction . . . . .	115
22.2 Exercice 33 . . . . .	116
22.3 Exercice 34 . . . . .	116
22.4 Exercice 35 . . . . .	117
22.5 Exercice 36 . . . . .	118
22.6 Exercice 37 . . . . .	119
22.7 Exercice 38 . . . . .	119
22.8 Exercice 39 . . . . .	119
22.9 Exercice 40 . . . . .	120
22.10 Exercice 41 . . . . .	120
22.11 Exercice 42 . . . . .	121
22.12 Exercice 43 . . . . .	122
22.13 Exercice 44 . . . . .	122
22.14 Exercice 45 . . . . .	122
22.15 Exercice 46 . . . . .	123
22.16 Exercice 47 . . . . .	123

22.17 Exercice 48 . . . . .	123
22.18 Exercice 49 . . . . .	124
22.19 Exercice 50 . . . . .	124
22.20 Exercice 51 . . . . .	125
22.21 Exercice 52 . . . . .	125
22.22 Exercice 53 . . . . .	125
22.23 Exercice 54 . . . . .	126
22.24 Exercice 55 . . . . .	126
22.25 Exercice 56 . . . . .	127
22.26 Exercice 57 . . . . .	127
22.27 Exercice 58 . . . . .	128
 <b>23 Applications des vecteurs dans la vie réelle</b>	 <b>129</b>
23.1 Exercice 59 . . . . .	129
23.2 Exercice 60 . . . . .	129
23.3 Exercice 61 . . . . .	132
23.4 Exercice 62 : Images vectorielles vs images bitmap	133
23.5 Exercice 63 : Décoder un fichier SVG . . . . .	134
23.6 Exercice 64 : Pourquoi les PDF sont-ils vectoriels ?	136
23.7 Exercice 65 : Bitmap vs Vectoriel - Étude comparative . . . . .	137
23.8 Exercice 66 : Créer une icône vectorielle (Projet) .	139
 <b>24 Chiffres</b>	 <b>141</b>
24.1 Introduction . . . . .	141
24.2 Exercice 67 . . . . .	142
24.3 Exercice 68 . . . . .	142
24.4 Exercice 69 . . . . .	143
24.5 Exercice 70 . . . . .	143
24.6 Exercice 71 . . . . .	144
24.7 Exercice 72 . . . . .	145

24.8 Exercice 73 . . . . .	145
24.9 Exercice 74 . . . . .	146
24.10 Exercice 75 . . . . .	146
24.11 Exercice 76 . . . . .	147
<b>25 Paradoxe de Simpson</b>	<b>149</b>
25.1 Exercice 77 . . . . .	149
<b>26 Arithmétique</b>	<b>151</b>
26.1 Exercice 78 . . . . .	151
26.2 Exercice 79 . . . . .	152
26.3 Exercice 80 . . . . .	153
<b>27 Trigonométrie</b>	<b>155</b>
27.1 Exercice 81 . . . . .	155
<b>VIII Erreurs fréquentes à éviter</b>	<b>157</b>
<b>28 Erreur 1 : Confondre vecteur et longueur</b>	<b>159</b>
<b>29 Erreur 2 : Oublier le sens dans la relation de Chasles</b>	<b>161</b>
<b>30 Erreur 3 : Confondre coordonnées de point et de vecteur</b>	<b>163</b>
<b>IX Comment obtenir les solutions ?</b>	<b>165</b>
<b>X Remerciements et feedback</b>	<b>169</b>



## **Première partie**

### **Introduction**



# **Chapitre 1**

## **À qui s'adresse ce livre**

Ce livre constitue une mise en oeuvre concrète et pratique de la rubrique intitulée "Manipuler les vecteurs du plan" pages 8 et 9 du programme officiel de mathématiques pour la classe de seconde accessible à cette URL : [https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/95/7/spe631\\_annexe\\_1062957.pdf](https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/95/7/spe631_annexe_1062957.pdf)

Par conséquent, il intéressera :

- les élèves de fin de collège souhaitant prendre de l'avance et préparer au mieux leur entrée au lycée
- bien entendu les élèves de seconde qui sont les premiers concernés
- les élèves de premières, terminales, et même du supérieur, qui pourront (re)voir des notions pas toujours bien maîtrisées alors que cet aspect fondamental des mathématiques modernes est crucial
- enfin, toutes les personnes, amatrices ou professionnelles, soucieuses d'apprendre ou de ré-apprendre à des fins per-

sonnelles et/ou d'aide de personnes tierces (de façon bénévole ou rémunérée)

À l'heure où les deux lettres IA (pour Intelligence Artificielle) sont sur toutes les lèvres il me semble important de bien faire comprendre (ou de rappeler pour ceux qui l'avaient oublié) que les modèles de langage tels que ChatGPT, ClaudeAI, DeepSeek, Gemini, Grok, Kimi, Mistral et consort ne font que manipuler des vecteurs à chaque prompt que vous leur écrivez ou dictez.

Oui, vous m'avez bien lu, les fameuses IAs supposément magiciennes et "aptes" à "nous remplacer" selon certains (oui je pense très fort à Laurent Alexandre), elles ne font QUE du calcul vectoriel.

L'espace dédié à cette introduction, et même le cadre global de cet ouvrage, ne se prête pas aux explications générales et totales du pourquoi et du comment mais je vous livre tout de même une ressource très pédagogique qui vous permettra de mieux comprendre tous les détails par vous même : la chaîne 3blue1brown (meilleure chaîne de mathématiques au monde) a consacré une série de vidéos pour expliquer précisément comment les modèles de langage fonctionnent, voici l'URL : <https://youtu.be/LPZh9B0jkQs?si=QMzyEqxItcq7ZIR7>

En conclusion de cette introduction, je dirais donc qu'il n'a jamais été aussi important de comprendre comment fonctionne le concept de vecteur car une très grande partie de cette technologie qui apparaît comme de la magie repose, expose et manipule quasi-exclusivement ce concept si fécond.

Alors, cessez d'être spectateurs, devenez acteurs !

## Chapitre 2

# Organisation de l'ouvrage

Comme indiqué précédemment, cet ouvrage se base sur le programme officiel de mathématiques en classe de seconde dans le système scolaire français auquel vous pouvez accéder via cette URL: [https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/95/7/spe631\\_annexe\\_1062957.pdf](https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/95/7/spe631_annexe_1062957.pdf)

Ainsi, les 7 contenus sont listés dans le même ordre avec un ou deux exercices d'illustration à chaque fois et un QCM d'auto-évaluation.

Ensuite viennent les 7 capacités attendues également illustrées par au moins un exercice par capacité ainsi qu'un QCM d'auto-évaluation.

Viennent ensuite des exercices de synthèse, puis quelques démonstrations et enfin des exercices divers.

Les exercices divers se veulent (beaucoup) plus originaux (par exemple analyse des déplacements du fou sur un échiquier) et concrets.

Subséquemment vient une partie sur les erreurs fréquentes à éviter.

Par suite vous obtiendrez des explications sur la façon d'obtenir les solutions qui ont volontairement été séparées de l'ouvrage afin de limiter la tentation de recourir à la solution avant d'avoir cherché à résoudre les exercices.

On ne le dira jamais assez mais c'est durant la phase de recherche que vous évaluez votre niveau réel et que vous solidifiez les apprentissages.

Enfin une dernière partie est consacrée aux remerciements et feedback.

Bonne lecture, mais surtout, bonne action !

## **Deuxième partie**

## **Contenus**



- $C_1$  : Vecteur  $\overrightarrow{MM'}$  associé à la translation qui transforme M en M'. Direction, sens et norme.
- $C_2$  : Égalité de deux vecteurs. Notation  $\vec{u}$ . Vecteur nul.
- $C_3$  : Somme de deux vecteurs en lien avec l'enchaînement des translations. Relation de Chasles.
- $C_4$  : Base orthonormée. Coordonnées d'un vecteur. Expression de la norme d'un vecteur.
- $C_5$  : Expression des coordonnées de  $\overrightarrow{AB}$  en fonction de celles de A et de B.
- $C_6$  : Produit d'un vecteur par un nombre réel. Colinéarité de deux vecteurs.
- $C_7$  : Déterminant de deux vecteurs dans une base orthonormée, critère de colinéarité. Application à l'alignement, au parallélisme.



# Chapitre 3

## Contenu 1

### 3.1 Objectifs pédagogiques

Dans cette partie les exercices ont pour but de mettre en application le contenu 1.

- $C_1$  : Vecteur  $\overrightarrow{MM'}$  associé à la translation qui transforme  $M$  en  $M'$ . Direction, sens et norme.


Direction : la droite  $(MM')$

Norme : la longueur  $MM'$

Sens : de  $M$  vers  $M'$

$$M' = t_{\vec{u}}(M)$$

$$\vec{u} = \overrightarrow{MM'}$$


$$B = t_{\vec{u}}(A)$$

$$\vec{u} = \overrightarrow{AB}$$


### 3.2 Exercice 1

Soit les points A, B, C tels que :

- $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$

- $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$

Voir la figure :



1. Quelle est l'image du point B par la translation de vecteur  $\vec{v}$  c'est-à-dire qui transforme A en C ? On appellera D le point image.
2. Quelle est l'image du point C par la translation de vecteur  $\vec{u}$  c'est-à-dire qui transforme A en B ? On appellera E le point image.
3. Que peut-on déduire ?
4. Quelle est la nature du quadrilatère ABDC ?

### 3.3 Exercice 2

Soient A et B deux points distincts dans le plan.

1. On considère le point C image de B par la translation de vecteur  $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ . Quelle est la direction du vecteur  $\overrightarrow{BC}$ ? Quelle est son sens? Quelle est sa norme?
2. Que représente le point B pour le segment [AC]?
3. Comparer les vecteurs  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{BC}$  entre eux et avec le vecteur  $\overrightarrow{AC}$ .

### 3.4 Programme 1

Écrire un programme Python qui rappelle qu'un vecteur est défini par 3 caractéristiques fondamentales :

1. Direction
2. Norme
3. Sens

### 3.5 QCM d'auto-évaluation

Parmi les réponses proposées au moins une est la bonne.  
Cela signifie qu'il peut y avoir *plusieurs bonnes réponses*.

Lorsqu'on parle du vecteur  $\overrightarrow{MM'}$  associé à la translation qui transforme M en M'.

1. Quelle est la direction?
  - a. Toute droite parallèle à l'axe des abscisses.
  - b. Uniquement la droite (MM').

- c. Toute droite parallèle à l'axe des ordonnées.
  - d. Toute droite parallèle à la droite  $(MM')$ .
2. Quelle est le sens ?
    - a. De O à M.
    - b. De M à  $M'$ .
    - c. De  $M'$  à M.
    - d. De M à O.
  3. Quelle est la norme ?
    - a. La distance OM.
    - b. La distance  $OM'$ .
    - c. La distance  $MM'$ .
    - d. La distance  $M'M$ .

# **Chapitre 4**

## **Contenu 2**


### **4.1 Objectifs pédagogiques**

Dans cette partie les exercices ont pour but de mettre en application le contenu 2.

- $C_2$  : Égalité de deux vecteurs. Notation  $\vec{u}$ . Vecteur nul.

### **4.2 Exercice 3**

On reprend la figure de l'exercice 1 :



Soit D l'image du point C par la translation de vecteur  $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ .

1. Comparer les vecteurs  $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{CD}$ .

2. Soit le vecteur  $\vec{w} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC}$ .

Que remarquez-vous ?

3. Soit E l'image de D par la translation de vecteur

$$\vec{v} = \overrightarrow{AC}$$

Calculer

$$\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{ED}$$

### 4.3 Programme 2

Écrire un programme Python qui :

- demande à l'utilisateur si les vecteurs sont égaux

- ensuite demande s'ils sont alignés
- indique les déductions en fonction des réponses

**Indication :** réfléchir aux différents cas possibles.

## 4.4 QCM d'auto-évaluation

**Parmi les réponses proposées au moins une est la bonne.**  
**Cela signifie qu'il peut y avoir *plusieurs* bonnes réponses.**

- Deux vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont égaux si :
  - Ils ont la même direction.
  - Ils ont la même direction et le même sens.
  - Ils ont la même direction et la même norme.
  - Ils ont la même direction, le même sens et la même norme.
- On dit qu'un vecteur est nul si :
  - Sa direction est horizontale.
  - Sa direction est verticale.
  - Il va dans un sens puis dans l'autre.
  - Sa norme vaut zéro.



# **Chapitre 5**

## **Contenu 3**


### **5.1 Objectifs pédagogiques**

Dans cette partie les exercices ont pour but de mettre en application le contenu 3.

- $C_3$  : Somme de deux vecteurs en lien avec l'enchaînement des translations. Relation de Chasles.

### **5.2 Exercice 4**

On reprend la figure de l'exercice 1 :



1. Calculer  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ .

**Indication :** utiliser la relation de Chasles.

2. Construire le point D tel que  $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ .
3. Soit O l'intersection entre les segments [AD] et [BC]. Ecrire le vecteur  $\overrightarrow{AO}$  comme la somme de deux vecteurs.
4. Calculer  $\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{BO} + \overrightarrow{CO} + \overrightarrow{DO}$ .

### 5.3 Programme 3

Écrire un programme Python qui rappelle la relation de Chasles.

### 5.4 QCM d'auto-évaluation

Parmi les réponses proposées au moins une est la bonne.  
Cela signifie qu'il peut y avoir *plusieurs* bonnes réponses.

1. Ajouter deux vecteurs revient à :

- a. enchaîner deux translations successives
  - b. faire une rotation
  - c. faire une symétrie
  - d. faire une homothétie
2. La relation de Chasles :
- a. augmente la norme d'un vecteur
  - b. décompose un vecteur en sommes de vecteurs
  - c. consiste à passer un coup de fil à Michel
  - d. revient à faire une transformation géométrique sur un vecteur



# **Chapitre 6**

## **Contenu 4**


### **6.1 Objectifs pédagogiques**

Dans cette partie les exercices ont pour but de mettre en application le contenu 4.

- $C_4$  : Base orthonormée. Coordonnées d'un vecteur. Expression de la norme d'un vecteur.

### **6.2 Exercice 5**

On considère le carré ABCD sur la figure :



1. Vérifier que les vecteurs  $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$  et  $\vec{v} = \overrightarrow{AD}$  forment bien une base orthonormée.
2. Déterminer les coordonnées des 4 points A, B, C, D dans la base  $(\vec{u}; \vec{v})$ .
3. Calculer la norme du vecteur  $\overrightarrow{AC}$ .

### 6.3 Exercice 5 bis

On se place dans le plan muni repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ .

Avec :

$$\vec{i} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{j} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Calculer les normes des vecteurs suivants :

$$1. n_1 = \|\vec{i} + \vec{j}\|$$

$$2. n_2 = \|\vec{i} - \vec{j}\|$$

$$3. n_3 = ||3\vec{i}||$$

$$4. n_4 = ||3\vec{i} + 4\vec{j}||$$

$$5. n_5 = ||-5\vec{j}||$$

## 6.4 Exercice 5 ter

On se place dans le plan muni repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ .

Avec :

$$\vec{i} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \vec{j} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Calculer et comparer les normes ajoutées séparément

$$s = ||\vec{u}|| + ||\vec{v}||$$

avec celles des vecteurs sommes

$$e = ||\vec{u} + \vec{v}||$$

$$1. (\vec{u}, \vec{v}) = (\vec{i}, \vec{j})$$

$$2. (\vec{u}, \vec{v}) = (\vec{i} + \vec{j}, \vec{i} - \vec{j})$$

$$3. (\vec{u}, \vec{v}) = (a\vec{i} + b\vec{j}, c\vec{i} + d\vec{j})$$

## 6.5 Programme 4

Écrire un programme Python qui rappelle :

1. la définition d'une base orthonormée.
2. la relation vectorielle entre les coordonnées d'un vecteur et les vecteurs de la base.

3. la formule de calcul de la norme d'un vecteur et qui effectue le calcul.

## 6.6 QCM d'auto-évaluation

**Parmi les réponses proposées au moins une est la bonne. Cela signifie qu'il peut y avoir plusieurs bonnes réponses.**

1. Une base orthonormée du plan est :
  - a. une station de lancement de fusée
  - b. un couple de vecteurs ayant des directions distinctes
  - c. un couple de vecteurs ayant des directions orthogonales et la même norme
  - d. un couple de vecteurs ayant la même direction et la même norme
2. Quelles sont les coordonnées d'un vecteur  $\vec{u}$  dans une base orthonormée  $(\vec{i}, \vec{j})$ ?
  - a. Le couple de nombres  $(a; b)$  tel que  $\vec{u} = a\vec{i} + b\vec{j}$ .
  - b. Les coordonnées du point M obtenu par la translation de vecteur  $\vec{u}$  à partir du point O.
  - c. La somme de celles des vecteurs  $\vec{i}$  et  $\vec{j}$ .
  - d. Les coefficients de toute combinaison linéaire des vecteurs de la base.
3. Considérons le vecteur  $\vec{u} = a\vec{i} + b\vec{j}$  alors l'expression de sa norme est :
  - a.  $||\vec{u}|| = a + b$
  - b.  $||\vec{u}|| = a^2 - b^2$

- c.  $||\vec{u}|| = a^2 + b^2$
- d.  $||\vec{u}|| = \sqrt{a^2 + b^2}$



# Chapitre 7

## Contenu 5

### 7.1 Objectifs pédagogiques

Dans cette partie les exercices ont pour but de mettre en application le contenu 5.

- $C_5$  : Expression des coordonnées de  $\overrightarrow{AB}$  en fonction de celles de A et de B.

### 7.2 Exercice 6

On se place dans le plan muni repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ .

Avec :

$$\vec{i} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{j} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Soient les points  $A(x_A; y_A)$  et  $B(x_B; y_B)$  deux points distincts dans le plan.

1. Exprimer le vecteur  $\overrightarrow{OA}$  en fonction des vecteurs de la base.

2. Exprimer le vecteur  $\overrightarrow{OB}$  en fonction des vecteurs de la base.
3. Exprimer le vecteur  $\overrightarrow{AB}$  en fonction des vecteurs  $\overrightarrow{OA}$  et  $\overrightarrow{OB}$ .
4. En déduire l'expression du vecteur  $\overrightarrow{AB}$  en fonction des vecteurs de la base.
5. En déduire l'expression des coordonnées du vecteur  $\overrightarrow{AB}$  en fonction de celles de A et de B.

### 7.3 Programme 5

Écrire un programme Python qui rappelle l'expression des coordonnées du vecteur  $\overrightarrow{AB}$  en fonction de celles de A et B et qui les calcule.

### 7.4 QCM d'auto-évaluation

**Parmi les réponses proposées au moins une est la bonne.  
Cela signifie qu'il peut y avoir plusieurs bonnes réponses.**

On considère le vecteur  $\overrightarrow{AB}$  dans le plan muni du repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

1. En utilisant Chasles on peut écrire :
  - a.  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$
  - b.  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}$
  - c.  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{BO}$
  - d.  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB}$
2. En utilisant les coordonnées des points A et B on a :

- a.  $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_A + x_B \\ y_A + y_B \end{pmatrix}$
- b.  $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_A - x_B \\ y_A - y_B \end{pmatrix}$
- c.  $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$
- d.  $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_A \times x_B \\ y_A \times y_B \end{pmatrix}$



# **Chapitre 8**

## **Contenu 6**

### **8.1 Objectifs pédagogiques**

Dans cette partie les exercices ont pour but de mettre en application le contenu 6.


- $C_6$  : Produit d'un vecteur par un nombre réel. Colinéarité de deux vecteurs.

### **8.2 Exercice 7**

On se place dans le plan muni repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ .  
Avec :

$$\begin{aligned}\vec{i} &\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} & \vec{j} &\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \vec{u} &= 3\vec{i} + 2\vec{j} & \vec{v} &= 2\vec{i} + 3\vec{j}\end{aligned}$$

Voir figure :



1. Construire les points A, B, C et D tels que :

$$\begin{array}{ll} \overrightarrow{OA} = 2\vec{i} & \overrightarrow{OB} = 3\vec{i} \\ \overrightarrow{OC} = 2\vec{j} & \overrightarrow{OD} = 3\vec{j} \end{array}$$

2. Vérifier que les vecteurs  $\overrightarrow{OA}$  et  $\overrightarrow{OB}$  sont colinéaires.

3. Vérifier que les vecteurs  $\overrightarrow{OC}$  et  $\overrightarrow{OD}$  sont colinéaires.

4. Construire les points E et F tels que :

$$\overrightarrow{OE} = \vec{u} \qquad \overrightarrow{OF} = \vec{v}$$

5. Vérifier que les vecteurs  $\overrightarrow{DE}$  et  $\overrightarrow{CF}$  sont colinéaires.

### 8.3 Programme 6

Écrire un programme Python indique si deux vecteurs sont colinéaires ou pas.

## 8.4 QCM d'auto-évaluation

**Parmi les réponses proposées au moins une est la bonne.**  
**Cela signifie qu'il peut y avoir *plusieurs bonnes réponses*.**

1. Si on multiplie un vecteur par un nombre réel supérieur à 1 alors :
  - a. Le vecteur change de direction.
  - b. Le vecteur augmente sa norme.
  - c. Le vecteur change de sens.
  - d. Le vecteur reste identique.
2. Si on multiplie un vecteur par un nombre réel inférieur à -1 alors :
  - a. Le vecteur change de direction.
  - b. Le vecteur augmente sa norme.
  - c. Le vecteur change de sens.
  - d. Le vecteur reste identique.
3. Si on multiplie un vecteur par un nombre réel supérieur à -1 et inférieur à 1 alors :
  - a. Le vecteur change de direction.
  - b. Le vecteur diminue sa norme.
  - c. Le vecteur change de sens.
  - d. Le vecteur reste identique.
4. Si on multiplie un vecteur par un nombre réel alors :
  - a. Le vecteur obtenu n'est pas colinéaire au vecteur initial.
  - b. Le vecteur obtenu est colinéaire au vecteur initial.



# **Chapitre 9**

## **Contenu 7**

### **9.1 Objectifs pédagogiques**


Dans cette partie les exercices ont pour but de mettre en application le contenu 7.

- $C_7$  : Déterminant de deux vecteurs dans une base orthonormée, critère de colinéarité. Application à l’alignement, au parallélisme.

### **9.2 Exercice 8**

On reprend la configuration finale de l’exercice 7.

Voir figure :



1. Calculer les déterminants suivants :

$$d_1 = \det(\vec{i}, \vec{j})$$

$$d_2 = \det(\vec{u}, \vec{v})$$

$$d_3 = \det(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB})$$

$$d_4 = \det(\overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OD})$$

$$d_5 = \det(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC})$$

$$d_6 = \det(\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OD})$$

2. En utilisant le déterminant montrer que les vecteurs  $\overrightarrow{DF}$  et  $\overrightarrow{CE}$  sont colinéaires. En déduire la nature du quadrilatère DCEF.
3. Même question pour  $\overrightarrow{AF}$  et  $\overrightarrow{BE}$  et le quadrilatère ABEF.
4. Calculer les normes des vecteurs  $\overrightarrow{IF}$  et  $\overrightarrow{JE}$ .
5. Comparer les vecteurs  $\overrightarrow{IJ}$  et  $\overrightarrow{EF}$ . En déduire la nature du quadrilatère IEFJ.
6. On nommera G l'intersection des segments [IF] et [JE]. Déterminer ses coordonnées. En déduire celle du point H tel que  $\overrightarrow{OG} = \overrightarrow{GH}$ . En déduire la nature du quadrilatère OBHD.

7. Quelle est la nature du triangle OFE ?
8. Quelle est l'image du point G par la translation de vecteur  $\overrightarrow{BG}$  ?
9. Déterminer les coordonnées du point K tel que  $\overrightarrow{BK} = \vec{j}$ .
10. Déterminer les coordonnées du point L tel que  $\overrightarrow{DL} = \vec{i}$ .

### 9.3 Programme 7

Écrire un programme Python qui indique si 3 points sont alignés ou pas.

### 9.4 QCM d'auto-évaluation

**Parmi les réponses proposées au moins une est la bonne.  
Cela signifie qu'il peut y avoir plusieurs bonnes réponses.**

1. Considérons les vecteurs

$$\vec{u}_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$$

et

$$\vec{u}_2 \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

alors :

a.

$$\det(\vec{u}_1, \vec{u}_2) = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} = x_1x_2 + y_1y_2$$

b.

$$\det(\vec{u}_1, \vec{u}_2) = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} = x_1x_2 - y_1y_2$$

c.

$$\det(\vec{u}_1, \vec{u}_2) = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} = x_1y_2 + y_1x_2$$

d.

$$\det(\vec{u}_1, \vec{u}_2) = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} = x_1y_2 - y_1x_2$$

2. Considérons les mêmes vecteurs que précédemment.

On dira que  $\vec{u}_1$  et  $\vec{u}_2$  sont colinéaires si :

a.  $\det(\vec{u}_1, \vec{u}_2) = 1$

b.  $\det(\vec{u}_1, \vec{u}_2) = 0$

c. il existe un réel  $k$  tel que  $x_1 = kx_2$  et  $y_1 = ky_2$

d.  $\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2}$

# **Troisième partie**

# **Capacités attendues**



- $Ca_1$  : Représenter géométriquement des vecteurs.
- $Ca_2$  : Construire géométriquement la somme de deux vecteurs.
- $Ca_3$  : Représenter un vecteur dont on connaît les coordonnées. Lire les coordonnées d'un vecteur.
- $Ca_4$  : Calculer les coordonnées d'une somme de vecteurs, d'un produit d'un vecteur par un nombre réel.
- $Ca_5$  : Calculer la distance entre deux points. Calculer les coordonnées du milieu d'un segment.
- $Ca_6$  : Caractériser alignement et parallélisme par la colinéarité de vecteurs.
- $Ca_7$  : Résoudre des problèmes en utilisant la représentation la plus adaptée des vecteurs.



# **Chapitre 10**

## **Capacité attendue 1**


### **10.1 Objectifs pédagogiques**

Dans cette partie le but est de mettre en application la capacité attendue 1.

- $Ca_1$  : Représenter géométriquement des vecteurs.

### **10.2 Exercice 9**

On considère le triangle ABC représenté sur la figure avec le quadrillage :



1. Construire le point D tel que  $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AB}$ .
2. Construire le point E tel que  $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{AB}$ .
3. Comparer les vecteurs  $\overrightarrow{BE}$  et  $\overrightarrow{AC}$ .

### 10.3 QCM d'auto-évaluation

Parmi les réponses proposées au moins une est la bonne.  
Cela signifie qu'il peut y avoir *plusieurs* bonnes réponses.

1. Un vecteur est caractérisé par :
  - a. Sa longueur uniquement
  - b. Sa direction et son sens uniquement
  - c. Sa direction, son sens et sa norme
  - d. Son origine et son extrémité
2. Les vecteurs  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{CD}$  sont égaux si :
  - a. A = C et B = D

- b. ABDC est un parallélogramme
- c. AB = CD (distances égales)
- d. Les segments [AB] et [CD] sont parallèles



# **Chapitre 11**

## **Capacité attendue 2**


### **11.1 Objectifs pédagogiques**

Dans cette partie le but est de mettre en application la capacité attendue 2.

- *Ca<sub>2</sub>* : Construire géométriquement la somme de deux vecteurs.

### **11.2 Exercice 10**

On considère la configuration initiale de l'exercice 9 voir figure :



1. Construire le point D tel que  $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BA}$ .
2. En déduire la nature du quadrilatère ABCD.
3. Construire le point E tel que  $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ .
4. En déduire la nature du quadrilatère ABEC.

### 11.3 QCM d'auto-évaluation

**Parmi les réponses proposées au moins une est la bonne.**  
**Cela signifie qu'il peut y avoir plusieurs bonnes réponses.**

Considérons deux vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$ .

1. Pour construire géométriquement la somme il faut :
  - a. partir de l'origine du vecteur  $\vec{u}$  puis, arrivé à son extrémité appliquer le vecteur  $\vec{v}$
  - b. partir de l'origine du vecteur  $\vec{v}$  puis, arrivé à son extrémité appliquer le vecteur  $\vec{u}$

- c. les deux propositions précédentes aboutissent au même résultat
2. Si  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  ne sont pas colinéaires alors  $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$  :
- a. est un vecteur ayant même direction que  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$
  - b. représente la diagonale du parallélogramme obtenu en faisant partir  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  de la même origine



# Chapitre 12

## Capacité attendue 3

### 12.1 Objectifs pédagogiques

Dans cette partie le but est de mettre en application la capacité attendue 3.

- *Ca<sub>3</sub>* : Représenter un vecteur dont on connaît les coordonnées. Lire les coordonnées d'un vecteur.

### 12.2 Exercice 11


On se place dans le plan muni repère orthonormé ( $O; \vec{i}; \vec{j}$ ).

Avec :

$$\vec{i} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \vec{j} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

1. Représenter le vecteur  $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$ .

2. Lire les coordonnées du vecteur  $\vec{v}$  sur la figure :



### 12.3 QCM d'auto-évaluation

**Parmi les réponses proposées au moins une est la bonne.**  
**Cela signifie qu'il peut y avoir plusieurs bonnes réponses.**

Considérons le vecteur  $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ . Alors :

1. Pour le représenter dans le repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  :
  - a. on se place au point M de coordonnées  $(a; b)$  et on trace le vecteur en se déplaçant de  $a$  unités sur l'axe horizontal et  $b$  unités sur l'axe vertical.
  - b. partant de l'origine du repère on se déplace de  $a$  unités sur l'axe horizontal et  $b$  unités sur l'axe vertical.
  
2. Pour lire les coordonnées d'un vecteur  $\vec{v}$  :
  - a. on se place à son origine et on reporte les coordonnées du point

- b. on trace un représentant du vecteur en partant de l'origine du repère et on lit les coordonnées de son extrémité



# Chapitre 13

## Capacité attendue 4

### 13.1 Objectifs pédagogiques

Dans cette partie le but est de mettre en application la capacité attendue 4.

- $Ca_4$  : Calculer les coordonnées d'une somme de vecteurs, d'un produit d'un vecteur par un nombre réel.

### 13.2 Exercice 12

On se place dans le plan muni repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ .

Avec :

$$\vec{i} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \vec{j} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Calculer les coordonnées des vecteurs :

$$\vec{s} = \vec{i} + \vec{j}$$

$$\vec{d} = \vec{i} - \vec{j}$$

$$\vec{p} = 3\vec{d}$$

$$\vec{c} = 2\vec{s} - 5\vec{d}$$

### 13.3 QCM d'auto-évaluation

Parmi les réponses proposées au moins une est la bonne.  
Cela signifie qu'il peut y avoir *plusieurs bonnes réponses*.

1. Soient

$$\vec{u}_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$$

et

$$\vec{u}_2 \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

deux vecteurs alors

$$\vec{u}_3 = \vec{u}_1 + \vec{u}_2$$

a pour coordonnées :

a.  $\vec{u}_3 \begin{pmatrix} x_1 x_2 \\ y_1 y_2 \end{pmatrix}$

b.  $\vec{u}_3 \begin{pmatrix} x_1 - x_2 \\ y_1 - y_2 \end{pmatrix}$

c.  $\vec{u}_3 \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{pmatrix}$

d.  $\vec{u}_3 \begin{pmatrix} \frac{x_1}{y_1} \\ \frac{x_2}{y_2} \end{pmatrix}$

2. Soient un vecteur  $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  et un réel k alors  $\vec{v} = ku$  vérifie :

a.  $\vec{v} \begin{pmatrix} kx \\ y \end{pmatrix}$

b.  $\vec{v} \begin{pmatrix} x \\ ky \end{pmatrix}$

c.  $\vec{v} \begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix}$

d.  $\vec{v} \begin{pmatrix} \frac{1}{k}x \\ \frac{1}{k}y \end{pmatrix}$



# **Chapitre 14**

## **Capacité attendue 5**

### **14.1 Objectifs pédagogiques**

Dans cette partie le but est de mettre en application la capacité attendue 5.

- *Ca<sub>5</sub>* : Calculer la distance entre deux points. Calculer les coordonnées du milieu d'un segment.


### **14.2 Exercice 13**

On se place dans le plan muni repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ .

Avec :

$$\vec{i} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \vec{j} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

On considère les points A(2 ; 3), B(-3 ; 2), C(-2 ; -3) et D(3 ; -2) tels que sur la figure :



1. Calculer les distances AB, AC, AD, BC, BD, CD.
2. Calculer les coordonnées des milieux des segments [AB], [AC], [AD], [BC], [BD], [CD].

### 14.3 QCM d'auto-évaluation

**Parmi les réponses proposées au moins une est la bonne.  
Cela signifie qu'il peut y avoir plusieurs bonnes réponses.**

1. La distance entre  $A(x_A; y_A)$  et  $B(x_B; y_B)$  vaut :

- a.  $AB = x_A x_B + y_A y_B$
- b.  $AB = (x_A + x_B)^2 + (y_A + y_B)^2$
- c.  $AB = (x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2$
- d.  $AB = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2}$

2. Le milieu  $M(x_M; y_M)$  du segment [AB] vérifie :

- a.  $(x_M; y_M) = \left( \frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2} \right)$

b.  $(x_M; y_M) = \left( \frac{x_A - x_B}{2}; \frac{y_A - y_B}{2} \right)$

c.  $(x_M; y_M) = \left( \frac{x_A \times x_B}{2}; \frac{y_A \times y_B}{2} \right)$

d.  $(x_M; y_M) = \left( \frac{x_A \div x_B}{2}; \frac{y_A \div y_B}{2} \right)$



# **Chapitre 15**

## **Capacité attendue 6**

### **15.1 Objectifs pédagogiques**


Dans cette partie le but est de mettre en application la capacité attendue 6.

- $Ca_6$  : Caractériser alignement et parallélisme par la colinéarité de vecteurs.

### **15.2 Exercice 14**

On reprend la configuration de l'exercice précédent.

Voir la figure :



1. Les points A, O et C sont-ils alignés ?
2. Calculer OA et OC. Qu'en déduisez-vous ?
3. Calculer le déterminant  $\det(\overrightarrow{OD}, \overrightarrow{OB})$ . Quelle interprétation géométrique en déduisez-vous ?
4. Comparer OB et OD. Qu'en déduisez-vous ?
5. Les vecteurs  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{CD}$  sont-ils colinéaires ?
6. Comparer AB et AD.
7. Quelle est la nature du quadrilatère ABCD ?

### 15.3 QCM d'auto-évaluation

Parmi les réponses proposées au moins une est la bonne.  
Cela signifie qu'il peut y avoir *plusieurs bonnes réponses*.

1. Pour montrer que A, B et C sont alignés il faut :

- a. que  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC}$
  - b. qu'il existe un réel  $k$  tel que  $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{AC}$
  - c. vérifier que  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$
  - d. vérifier que  $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$
2. Pour montrer que les droites (AB) et (CD) sont parallèles il faut :
- a. montrer que les vecteurs  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{CD}$  sont colinéaires
  - b. vérifier que  $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = 0$
  - c. montrer que  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$
  - d. vérifier que  $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) \neq 0$



# **Chapitre 16**

## **Capacité attendue 7**

### **16.1 Objectifs pédagogiques**

Dans cette partie le but est de mettre en application la capacité attendue 7.

- *Ca<sub>7</sub>* : Résoudre des problèmes en utilisant la représentation la plus adaptée des vecteurs.

### **16.2 Exercice 15**

Pour chacune des situations suivantes, indiquez comment la résoudre selon la représentation vectorielle parmi :

- Analytique (coordonnées, calculs algébriques)
  - Colinéarité (proportionnalité, déterminant)
  - Géométrique (relation de Chasles, parallélogramme)
1. Démontrer que les points A, B, C sont alignés
  2. Calculer la distance entre deux points A(2;3) et B(5 ;7)

3. Montrer que ABCD est un parallélogramme

4. Trouver les coordonnées du point M tel que :

$$\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC}$$

5. Vérifier si deux droites (AB) et (CD) sont parallèles

### 16.3 Programme

Écrire un programme Python qui résout le problème

$$\overrightarrow{AM} = a\overrightarrow{AB} + b\overrightarrow{AC}$$

C'est-à-dire un programme qui permet d'exprimer les coordonnées du point M en fonction des paramètres a et b et des coordonnées des points déjà existants A, B, et C.

### 16.4 QCM d'auto-évaluation

**Parmi les réponses proposées au moins une est la bonne.  
Cela signifie qu'il peut y avoir plusieurs bonnes réponses.**

1. Si ABC est un triangle et que D est un 4ème point qui vérifie l'égalité

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$$

alors on peut en déduire que :

- a.  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$
- b. ABCD est un parallélogramme
- c. ABDC est un parallélogramme

- d.  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$  et  $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$  les deux égalités sont vraies
- e.  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$  ou  $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$  une seule des deux égalités est vraie
- f.  $\overrightarrow{AB} \neq \overrightarrow{CD}$  et  $\overrightarrow{AC} \neq \overrightarrow{BD}$  aucune des égalités n'est vraie
- g. le point D est à l'intérieur du triangle ABC
- h. le point D est l'image du point A par la symétrie de centre le milieu du segment [BC]
- i. le point D est à l'extérieur du triangle ABC
- j. le point D est l'image du point I par la translation de vecteur  $\overrightarrow{AI}$  où I est le milieu du segment [BC]
2. Si ABCD est un carré alors :
- Les vecteurs  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{AC}$  forment une base orthonormée
  - Les vecteurs  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{AD}$  forment une base orthonormée
  - $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 1$
  - $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) = 0$
  - $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 1$
  - $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$
  - $AC^2 = AB^2 + BC^2$
  - $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = 2\overrightarrow{AB}$
  - $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \vec{0}$
  - Le centre O du carré vérifie

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$$

3. Si ABCD est un rectangle et O l'intersection des droites (AC) et (BD) alors :

- a.  $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$
- b.  $\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{OC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$
- c.  $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 1$
- d.  $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) = 0$
- e.  $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) = 1$
- f.  $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$
- g.  $AC > AB + BC$
- h.  $AC < AB + AD$
- i.  $AC = BD$
- j.  $AC \neq BD$

4. Soient A et B deux points distincts du plan. Si C est l'image de B par la translation de vecteur  $\overrightarrow{AB}$  alors :

- a. B est le milieu du segment [AC]
- b.  $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AB}$
- c.  $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OB}$
- d. les coordonnées de C vérifient :

$$x_C = 2x_B - x_A$$

$$y_C = 2y_B - y_A$$

e. les coordonnées de C vérifient :

$$x_C = 2x_B + x_A$$

$$y_C = 2y_B + y_A$$

- f. C est l'image de A par la symétrie de centre B.
- g. C est le milieu du segment [AB].
- h.  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}$
- i.  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{AB}$
- j.  $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$
5. Si on a  $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) \neq 0$  et  $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DC}) = 0$  alors :
- ABCD ou ABDC est un trapèze.
  - Si  $AB = DC$  alors ABCD ou ABDC est un parallélogramme.
  - Si  $AB = AD = DC$  alors ABCD est un losange.
  - Si  $AB = AC = CD$  alors ABDC est un losange.
  - Si  $AB = DC$  et  $CA = BD$  alors ABDC est un rectangle.
  - Si  $AB = DC$  et  $AD = BC$  alors ABDC est un rectangle.
  - Si  $AB = DC$  et  $AC = BD$  alors ABCD est un rectangle.
  - Si  $AB = DC$  et  $AD = BC$  alors ABCD est un rectangle.
  - Si  $AB = DC$  et  $AC = BD$  alors ABCD est un losange.
  - Si  $AB = DC$  et  $AD = BC$  alors ABCD est un losange.
6. Soient  $\vec{u}$ ,  $\vec{v}$  et  $\vec{w}$  trois vecteurs tels que  $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$ .
- Si  $\|\vec{u}\| + \|\vec{v}\| = \|\vec{w}\|$  alors les trois vecteurs sont colinéaires.
  - Il est impossible que les trois vecteurs soient colinéaires.
  - Si  $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$  alors les trois vecteurs sont colinéaires.
  - Si  $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$  alors  $\det(\vec{v}, \vec{w}) = 0$ .
  - Si  $\det(\vec{w}, \vec{u}) = 0$  alors  $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$ .

- f.  $||\vec{u}|| + ||\vec{v}|| > ||\vec{w}||$   
 g.  $||\vec{u}|| + ||\vec{v}|| < ||\vec{w}||$   
 h. Si  $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$  alors soit  $\vec{u} = \vec{0}$  soit  $\vec{v} = \vec{0}$   
 i. Si  $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$  alors soit  $\vec{w} = \vec{u}$  soit  $\vec{w} = \vec{v}$   
 j. Si  $\det(\vec{w}, \vec{u}) = 0$  alors soit  $\vec{u} = -\vec{v}$  soit  $\vec{w} = \vec{0}$

7. Soit un vecteur  $\vec{u}$  de norme  $||\vec{u}|| = 5$ .

- a. Si  $x_{\vec{u}} = 3$  alors  $y_{\vec{u}} = 4$ .  
 b. Si  $x_{\vec{u}} = 3$  alors  $y_{\vec{u}} = -4$ .  
 c. Si  $x_{\vec{u}} = -3$  alors  $y_{\vec{u}} = -4$ .  
 d. Si  $x_{\vec{u}} = -3$  alors  $y_{\vec{u}} = 4$ .  
 e. Si  $x_{\vec{u}} = \pm 3$  alors  $y_{\vec{u}} = \pm 4$ .  
 f. Si  $x_{\vec{u}} = -4$  alors  $y_{\vec{u}} = 3$ .  
 g. Si  $x_{\vec{u}} = -4$  alors  $y_{\vec{u}} = -3$ .  
 h. Si  $x_{\vec{u}} = 4$  alors  $y_{\vec{u}} = -3$ .  
 i. Si  $x_{\vec{u}} = 4$  alors  $y_{\vec{u}} = 3$ .  
 j. Si  $x_{\vec{u}} = \pm 4$  alors  $y_{\vec{u}} = \pm 3$ .

8. Dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  on considère les points A(3 ; 2), B(3 ; -2), C(-3 ; -2), D(3 ; -1), E(-3 ; -1), F(-1 ; -1), G(1 ; 1), H(1 ; 2), I(-1 ; 2).

- a. Les vecteurs  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{AC}$  sont colinéaires car

$$\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$$

- b. Les vecteurs  $\overrightarrow{AH}$  et  $\overrightarrow{AI}$  sont colinéaires car

$$\det(\overrightarrow{AH}, \overrightarrow{AI}) = 0$$

- c. Les points A, B et C sont alignés.
  - d. Les points D, E et F sont alignés.
  - e. ABC est un triangle rectangle en B.
  - f. ABD est un triangle rectangle en B.
  - g. GDF est un triangle rectangle en G.
  - h. GDF est un triangle isocèle en G.
  - i. BCHA est un trapèze.
  - j. Les vecteurs  $\overrightarrow{BC}$  et  $\overrightarrow{AH}$  sont colinéaires.
9. Dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  on considère les points A(2 ; 3), B(-3 ; 2), C(-2 ; -3) ; D(3 ; -2).
- a. Le triangle BOA est isocèle en A.
  - b. Le triangle BOA est isocèle en B.
  - c. Le triangle BOA est isocèle en O.
  - d. Le triangle BOA est rectangle en A.
  - e. Le triangle BOA est rectangle en B.
  - f. Le triangle BOA est rectangle en O.
  - g. C est l'image de O par la translation de vecteur  $\overrightarrow{AO}$ .
  - h. D est l'image de O par la translation de vecteur  $\overrightarrow{BO}$ .
  - i. ABDC est un carré.
  - j. ABCD est un carré.



**Quatrième partie**

**Exercices**

**complémentaires**



# Chapitre 17

## Pour s'exercer davantage

### 17.1 Exercice 16

On se place dans le plan muni du repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

1. Placer les points  $O(0 ; 0)$ ,  $I(1 ; 0)$ ,  $J(0 ; 1)$  et  $A$  tel que

$$\overrightarrow{OA} = \vec{i} + \vec{j}$$

Quelle est la nature du triangle OIA ?

2. Placer le point  $B$  tel que

$$\overrightarrow{AB} = \vec{j} - \vec{i}$$

Trouver une égalité vectorielle plus simple pour placer le point  $B$ . Comparer  $OA$ ,  $AB$  et  $OB$ . En déduire la nature du triangle OAB.

3. Placer le point  $C$  tel que

$$\overrightarrow{OC} = 2\overrightarrow{AB}$$

Trouver une égalité vectorielle plus simple pour placer le point C. Comparer OB, BC et OC. En déduire la nature du triangle OBC.

4. Placer le point D tel que

$$\overrightarrow{OD} = -4\vec{i}$$

Quelle est la nature du triangle COD ?

5. Placer le point E tel que

$$\overrightarrow{DE} = -4\vec{j}$$

Quelle est la nature du triangle ODE ? Les vecteurs  $\overrightarrow{OA}$  et  $\overrightarrow{OE}$  sont-ils colinéaires ?

6. Placer le point F tel que

$$\overrightarrow{OF} = -4\overrightarrow{OB}$$

Quelle est la nature du triangle EOF ?

7. Placer le point G tel que

$$\overrightarrow{FG} = 8\vec{i}$$

Quelle est la nature du triangle FOG ?

8. Calculer les coordonnées des points H, K, L, M, N, P milieux respectifs des segments [OA], [OC], [OD], [OE], [OF], [OG].

**Rappel** : le point J est le milieu du segment [OB].

9. Tracer les segments [HJ], [JK], [KL], [LM], [MN] et [NP].

10. Tracer les cercles de centres H, J, K, L, M, N, P de rayons respectifs HJ, JK, KL, LM, MN, NP. Que remarquez-vous ?

## 17.2 Exercice 17

On se place dans le plan muni du repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ . Pour la suite de l'exercice on considère les points  $I(1; 0)$  et  $J(0; 1)$  ainsi que le vecteur

$$\vec{u} = 2\vec{j} - 3\vec{i}$$

1. Quel est l'ensemble des points  $M(x; y)$  du plan tels que  $\det(\vec{i}, \overrightarrow{OM}) = 0$  ?
2. Quel est l'ensemble des points  $M(x; y)$  du plan tels que  $\det(\vec{j}, \overrightarrow{OM}) = 0$  ?
3. Quel est l'ensemble des points  $M(x; y)$  du plan tels que  $\det(\overrightarrow{OM}, \vec{u}) = 0$  ?
4. Quel est l'ensemble des points  $M(x; y)$  du plan tels que  $\det(\vec{i}, \overrightarrow{IM}) = 0$  ?
5. Quel est l'ensemble des points  $M(x; y)$  du plan tels que  $\det(\vec{j}, \overrightarrow{JM}) = 0$  ?
6. Quel est l'ensemble des points  $M(x; y)$  du plan tels que  $\det(\vec{i}, \overrightarrow{JM}) = 0$  ?
7. Quel est l'ensemble des points  $M(x; y)$  du plan tels que  $\det(\vec{j}, \overrightarrow{IM}) = 0$  ?
8. Quel est l'ensemble des points  $M(x; y)$  du plan tels que  $\det(\overrightarrow{IM}, \vec{u}) = 0$  ?

9. Quel est l'ensemble des points  $M(x; y)$  du plan tels que  $\det(\overrightarrow{JM}, \vec{u}) = 0$  ?
10. Soient un point  $P(x_P; y_P)$  et un vecteur  $\vec{v} = a\vec{j} - b\vec{i}$ . Quel est l'ensemble des points  $M(x; y)$  du plan tels que  $\det(\vec{v}, \overrightarrow{PM}) = 0$  ?

### 17.3 Exercice 18

Soient A et B deux points distincts dans le plan.

Déterminer l'ensemble des points M tels que  $MA = MB$ .

### 17.4 Exercice 19

On considère deux points A et B distincts.

1. On souhaite étudier les configurations possibles pour ajouter un troisième point C de sorte qu'ils soient tous les trois alignés. En l'absence de repère, quelle égalité vectorielle doit être vérifiée pour que les trois points soient alignés ?

**Rappel** : sans repère vous ne pouvez *pas* utiliser de coordonnées.

2. Combien existe-t-il de configurations différentes pour que les points A, B et C soient alignés ?

**Indication** : faire des dessins.

3. Désormais on ajoute un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  et par conséquent les points ont les coordonnées respectives :

$$A(x_A; y_A), B(x_B; y_B), C(x_C; y_C)$$

Comment déterminer si les points sont alignés ou pas ?

4. Écrire un programme Python qui permet de déterminer si 3 points sont alignés ou non connaissant leurs coordonnées. Dans le cas où les points sont alignés il indiquera la nature de la configuration.

## 17.5 Exercice 20

On se place dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

1. Construire le vecteur

$$\vec{u} = 3\vec{i} + 4\vec{j}$$

et placer le point A tel que

$$\overrightarrow{OA} = \vec{u}$$

2. Placer le point H tel que

$$\overrightarrow{OH} = 3\vec{i}$$

et le point K tel que

$$\overrightarrow{OK} = 4\vec{j}$$

En déduire une égalité vectorielle liant  $\overrightarrow{OA}$ ,  $\overrightarrow{OH}$  et  $\overrightarrow{OK}$ .

3. Quelle est la nature du triangle AHO ? AHI ?
4. Soit M un point quelconque sur l'axe des abscisses. Comparer AM et AH. Est-il possible de trouver un point M tel que  $AM < AH$  ?

5. Quel est le point M de l'axe des abscisses tel que la distance AM soit minimale ? On appellera cette distance entre A et l'axe des abscisses :

$$d(A; (OI)) = \min_{M \in (OI)} (AM)$$

En déduire sa valeur.

6. Quelle est la nature du triangle AKO ? AKJ ?
7. Soit N un point quelconque sur l'axe des ordonnées. Comparer AN et AK. Est-il possible de trouver un point N tel que AN < AK ?
8. Quel est le point N de l'axe des ordonnées tel que la distance AN soit minimale ? On appellera cette distance entre A et l'axe des ordonnées :

$$d(A; (OJ)) = \min_{N \in (OJ)} (AN)$$

En déduire sa valeur.

## 17.6 Exercice 21

On se place dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

1. Placer les points I, J et K tels que :

$$OI = \vec{i}$$

$$OJ = \vec{j}$$

$$OK = \vec{u} = \vec{i} + \vec{j}$$

Calculer les coordonnées du point L milieu du segment [OK].

En déduire la nature des triangles LOI et JOL.

2. Comparer IK et IL. En déduire la distance entre le point I et la droite (OK).
3. Comparer JK et JL. En déduire la distance entre le point J et la droite (OK).
4. Construire les points A et B tels que :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{IA} &= \vec{u} \\ \overrightarrow{JB} &= \vec{u}\end{aligned}$$

En déduire la nature du quadrilatère IABJ.

5. Quelle est la distance entre le point A et la droite (IJ) ?

## 17.7 Exercice 22

Soit ABC un triangle. Le point G vérifie :

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$$

1. Exprimer le vecteur  $\overrightarrow{AG}$  en fonction des vecteurs  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{AC}$ .
2. Exprimer le vecteur  $\overrightarrow{BG}$  en fonction des vecteurs  $\overrightarrow{BA}$  et  $\overrightarrow{BC}$ .
3. Exprimer le vecteur  $\overrightarrow{CG}$  en fonction des vecteurs  $\overrightarrow{CB}$  et  $\overrightarrow{CA}$ .
4. Déterminer les coordonnées des points I, J et K milieux respectifs des segments [AB], [BC] et [CA].

5. Exprimer le vecteur  $\overrightarrow{AJ}$  en fonction des vecteurs  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{AC}$ .  
En déduire une comparaison avec  $\overrightarrow{AG}$ .
  6. Exprimer le vecteur  $\overrightarrow{BK}$  en fonction des vecteurs  $\overrightarrow{BA}$  et  $\overrightarrow{BC}$ . En déduire une comparaison avec  $\overrightarrow{BG}$ .
  7. Exprimer le vecteur  $\overrightarrow{CI}$  en fonction des vecteurs  $\overrightarrow{CA}$  et  $\overrightarrow{CB}$ .  
En déduire une comparaison avec  $\overrightarrow{CG}$ .
  8. En utilisant les éléments précédents (sélectionnez les informations nécessaires) établir le calcul des coordonnées du point G en fonction de celles des points A, B, C.
  9. En utilisant les éléments précédents (sélectionnez les informations nécessaires) établir le calcul des coordonnées du point G en fonction de celles des points I, J, K.
  10. Appliquons les résultats précédents dans un cas concret.  
Dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  placer les points  $A(-4; 4)$ ,  $B(5; 4)$ ,  $C(-$
- Tracer le triangle, calculer les coordonnées des milieux I, J, K, les placer, tracer les médianes, calculer les coordonnées du point G. Que remarquez-vous ?

## 17.8 Exercice 23

On considère la transformation qui à tout point M associe le point M' tel que :

$$\overrightarrow{OM'} = 2\overrightarrow{OM} + \vec{u}$$

où  $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$

1. Approche analytique : Si  $M(x; y)$ , exprimer les coordonnées de  $M'(x'; y')$

2. Cas particulier : Trouver le(s) point(s) invariant(s) par cette transformation
3. Interprétation géométrique : Décrire cette transformation en termes simples.  
**Indication :** on commencera par déterminer l'image des points O, I, J.
4. Trouver la transformation réciproque.

## 17.9 Exercice 24

On se place dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  :

1. Quelle est la nature du triangle OIJ ?
2. Soit A le milieu du segment [IJ]. Exprimer le vecteur  $\overrightarrow{OA}$  en fonction de  $\vec{i}$  et  $\vec{j}$ .
3. Soit B l'image de A par la translation de vecteur  $\overrightarrow{OA}$ . Calculer OB.
4. Quelle est la nature du quadrilatère OIBJ ?
5. Soit C le point tel que  $\overrightarrow{IC} = \vec{i}$ . Quelle est la nature du triangle OCB ?
6. Soit K le point tel que  $\overrightarrow{JK} = \vec{i} + \vec{j}$  et L le point tel que  $\overrightarrow{IL} = \overrightarrow{OB}$ .
7. Soit D le point tel que  $\overrightarrow{IC} = -\vec{j}$ . Quelle est la nature du quadrilatère OBCD ?

## 17.10 Exercice 25

On se place dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ :

1. Placer I' image de I par la translation de vecteur  $-2\vec{i}$  et J' image de J par la translation de vecteur  $-2\vec{j}$ . Quel est le point commun entre les vecteurs  $\vec{i}, \vec{j}, \overrightarrow{OI'}, \overrightarrow{OJ'}$  ?
2. Quel est l'ensemble des points  $M(x; y)$  du plan tels que  $\|\overrightarrow{OM}\| = \|\vec{i}\|$  ?
3. Tracer le cercle  $C_1$  de centre O et de rayon 1. Puis tracer le cercle  $C_2$  de centre I passant par I' et celui  $C_3$  de centre I' passant par I. Ces deux derniers cercles ( $C_2$  et  $C_3$ ) se coupent deux fois. Appelons A le point d'intersection d'ordonnée positive. Calculer IA.
4. Quelle est la nature du triangle IAI' ? On appellera B l'intersection du segment [I'A] avec le cercle  $C_1$  et C l'intersection du segment [IA] avec le cercle  $C_1$ . Quelle est la nature du triangle OCB ? Et celle de COI ? En déduire celle du quadrilatère OICB.
5. Exprimer le vecteur  $\overrightarrow{AB}$  en fonction du vecteur  $\overrightarrow{AI'}$ . Qu'en déduire pour B par rapport au segment [AI'] ?
6. Exprimer le vecteur  $\overrightarrow{AC}$  en fonction du vecteur  $\overrightarrow{AI}$ . Qu'en déduire pour C par rapport au segment [AI] ?
7. Placer C' image de C par la translation de vecteur  $2\overrightarrow{CO}$  et B' image de B par la translation de vecteur  $2\overrightarrow{BO}$ . Quelle est la nature du polygone ICBI'C'B' ?

## 17.11 Exercice 26

On se place dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ .

Posons

$$\vec{u} = \vec{i} + \vec{j}$$

pour la suite de l'exercice.

1. Placer le point A tel que  $\overrightarrow{IA} = \vec{i}$ . Placer le point B tel que  $\overrightarrow{AB} = \vec{j}$ . Placer le point C tel que  $\overrightarrow{JC} = \vec{i}$ . Vérifier que le quadrilatère IABC est un carré.
2. Placer le point D tel que

$$\overrightarrow{ID} = \frac{IB}{2}(\vec{i} + \vec{j})$$

en déduire ses coordonnées.

3. Placer le point E tel que  $\overrightarrow{DE} = \vec{j}$ . En déduire ses coordonnées.
4. Placer le point F tel que

$$\overrightarrow{EF} = \frac{||\vec{u}||}{2}(\vec{j} - \vec{i})$$

en déduire ses coordonnées.

5. Placer le point G tel que  $\overrightarrow{FG} = -\vec{i}$ .
6. Placer le point H tel que

$$\overrightarrow{GH} = -\frac{||\vec{u}||}{2}(\vec{u})$$

en déduire ses coordonnées.

7. Placer le point L tel que  $\overrightarrow{HL} = -\vec{j}$  en déduire ses coordonnées.
8. Tracer les vecteurs  $\vec{i}, \overrightarrow{ID}, \overrightarrow{DE}, \overrightarrow{EF}, \overrightarrow{FG}, \overrightarrow{GH}, \overrightarrow{HL}, \overrightarrow{LO}$ .  
Vérifier que vous avez bien obtenu le polygone obtenu est un octogone régulier de côté 1.
9. Pour compléter la figure tracer  $\vec{j}, \overrightarrow{JC}, \overrightarrow{CI}$  et vérifier que OICJ est bien un carré.
10. Pour ajouter une touche finale tracer les vecteurs :

$$\begin{array}{ll} \overrightarrow{OM} = \vec{j} - \vec{i} & \overrightarrow{MN} = -\vec{u} \\ \overrightarrow{NP} = \vec{i} - \vec{j} & \overrightarrow{PO} = \vec{u} \\ \overrightarrow{IB} = \vec{u} & \overrightarrow{BQ} = \vec{i} - \vec{j} \\ \overrightarrow{QR} = -\vec{u} & \overrightarrow{RI} = \vec{j} - \vec{i} \end{array}$$

Vérifier que vous obtenez bien les carrés OMNP et OBQR.

**Remarque :** avec un peu d'imagination les deux carrés OMNP et OBQR représenteraient des moteurs, le carré OICJ l'entrée et le polygone OIDEFGHL le vaisseau.

# **Cinquième partie**

# **Exercices de synthèse**



# Chapitre 18

## Représentation par coordonnées (dans un repère)

### 18.1 Exercice 27

Dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ , on donne les points A(2,3), B(-1, 4), et C(5,-2).

1. Déterminer les coordonnées des vecteurs  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{AC}$ .
2. Montrer que les points A, B, et C ne sont pas alignés en utilisant les vecteurs.
3. Trouver les coordonnées du point D tel que

$$\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$$

Objectif : Utiliser les coordonnées pour calculer des vecteurs, vérifier l'alignement, et résoudre des équations vectorielles.

CHAPITRE 18. REPRÉSENTATION PAR COORDONNÉES  
(DANS UN REPÈRE)

---

# Chapitre 19

## Représentation géométrique (sans repère)

### 19.1 Exercice 28

Soit un parallélogramme ABCD de centre O.

1. Exprimer  $\overrightarrow{AO}$  en fonction de  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{AD}$ .
2. Montrer que pour tout point M du plan, on a :

$$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MD}$$

3. En déduire l'ensemble des points M tels que

$$\|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC}\| = 6$$

Objectif : Manipuler les vecteurs avec des relations géométriques (parallélogramme, milieu) et utiliser la norme pour caractériser l'ensemble des points M.

tériser un ensemble de points.

## 19.2 Exercice 29

Soit ABCD un carré de centre O.

Déterminer l'ensemble des points M(x, y) du plan tels que OM = OA.

# Chapitre 20

## Colinéarité et alignement

### 20.1 Exercice 30

Soit les vecteurs  $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} -6 \\ 4 \end{pmatrix}$ .

- Montrer que  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont colinéaires.
- Trouver tous les points  $M(x,y)$  tels que le vecteur  $\overrightarrow{OM}$  soit colinéaire à  $\vec{u}$ .
- Les points  $A(1,0)$ ,  $B(4,-2)$ , et  $C(-2,1)$  sont-ils alignés ? Justifier avec les vecteurs.

Objectif : Utiliser la colinéarité pour caractériser l'alignement ou trouver des ensembles de points.

### 20.2 Exercice 31

Dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  :

- Déterminer l'ensemble des points  $M(x; y)$  tels que  $\overrightarrow{OM} = k\vec{i}$  avec  $k \in \mathbb{R}$ .

2. Déterminer l'ensemble des points  $M(x; y)$  tels que  $\overrightarrow{OM} = k\vec{j}$  avec  $k \in \mathbb{R}$ .
3. Posons  $\vec{u} = \vec{i} + \vec{j}$ . Déterminer l'ensemble des points  $M(x; y)$  tels que  $\overrightarrow{OM} = k\vec{u}$  avec  $k \in \mathbb{R}$ .
4. Posons  $\vec{v} = \vec{i} - \vec{j}$ . Déterminer l'ensemble des points  $M(x; y)$  tels que  $\overrightarrow{OM} = k\vec{v}$  avec  $k \in \mathbb{R}$ .
5. Posons  $\vec{w} = -\vec{i} - \vec{j}$ . Déterminer l'ensemble des points  $M(x; y)$  tels que  $\overrightarrow{OM} = k\vec{w}$  avec  $k \in \mathbb{R}$ .

## **Sixième partie**

## **Démonstrations**



# **Chapitre 21**

## **Démonstrations**

### **21.1 Exercice 32**

Démontrer que deux vecteurs sont colinéaires si et seulement si leur déterminant est nul.

### **21.2 Exercice 32bis**

Démontrer que pour tous points A, B, C :  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$

### **21.3 Exercice 32ter**

Démontrer que si I est le milieu de [AB], alors :  $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$



## **Septième partie**

### **Exercices divers**



# Chapitre 22

## Alphabet

### 22.1 Introduction

Dans cette section, vous allez apprendre à maîtriser les vecteurs en traçant toutes les lettres de l'alphabet latin. Chaque lettre est une construction géométrique précise utilisant les opérations vectorielles.

**Objectifs :**

- Renforcer la manipulation des vecteurs de base  $\vec{i}$  et  $\vec{j}$
- Visualiser concrètement les combinaisons linéaires
- Développer la précision du tracé géométrique
- S'amuser avec les mathématiques !

**Consignes générales :**

1. Utilisez une règle et un compas pour les tracés
2. Respectez scrupuleusement l'échelle (1 carreau = 1 unité recommandé)

3. Vérifiez visuellement que vous obtenez bien la lettre attendue
4. Si nécessaire, recommencez le tracé pour gagner en précision

## 22.2 Exercice 33

Dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$  :

1. Placer le point A tel que  $\overrightarrow{OA} = 2\vec{i} + 3\vec{j}$
2. Construire l'image A' du point A par la translation de vecteur  $\vec{v} = 2\vec{i} - 3\vec{j}$ .
3. Déterminer les coordonnées de milieux des segments [OA] et [AA'] qu'on nommera H et H' respectivement.
4. Exprimer le vecteur  $\overrightarrow{HH'}$  en fonction des vecteurs de la base.
5. À quelle lettre de l'alphabet latin peut-on penser lorsqu'on relie O, A, A' puis H et H' ?

## 22.3 Exercice 34

Dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$  :

1. Construire le point A tel que  $\overrightarrow{OA} = -3\vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point A.
2. Construire le point B tel que  $\overrightarrow{AB} = 2\vec{i}$ . En déduire les coordonnées du point B.

3. Construire le point C tel que  $\overrightarrow{BC} = \vec{i} + \vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point C.
4. Construire le point D tel que  $\overrightarrow{CD} = \vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point D.
5. Construire le point E tel que  $\overrightarrow{DE} = \vec{j} - \vec{i}$ . En déduire les coordonnées du point E.
6. Construire le point F tel que  $\overrightarrow{EF} = \vec{i} + \vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point F.
7. Construire le point G tel que  $\overrightarrow{FG} = \vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point G.
8. Construire le point H tel que  $\overrightarrow{GH} = \vec{j} - \vec{i}$ . En déduire les coordonnées du point H.
9. Construire le point K tel que  $\overrightarrow{HK} = -2\vec{i}$ . En déduire les coordonnées du point K.
10. Tracer les vecteurs  $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{DE}, \overrightarrow{EF}, \overrightarrow{FG}, \overrightarrow{GH}, \overrightarrow{HK}, \overrightarrow{KO}, \overrightarrow{OE}$  et vérifier que vous avez bien obtenu la lettre B.

## 22.4 Exercice 35

Dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  :

1. Construire le point A tel que  $\overrightarrow{OA} = -\vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point A.
2. Construire le point B tel que  $\overrightarrow{AB} = \vec{i} - \vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point B.
3. Construire le point C tel que  $\overrightarrow{BC} = \vec{i}$ . En déduire les coordonnées du point C.

4. Construire le point B' tel que  $\overrightarrow{JB'} = \vec{i} + \vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point B'.
5. Construire le point C' tel que  $\overrightarrow{B'C'} = \vec{i}$ . En déduire les coordonnées du point C'.
6. Tracer les vecteurs  $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{OJ}, \overrightarrow{JB'}, \overrightarrow{B'C'}$  et vérifier que vous avez bien obtenu la lettre C.

## 22.5 Exercice 36

Dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$  :

1. Construire le point A tel que  $\overrightarrow{OA} = -3\vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point A.
2. Construire le point B tel que  $\overrightarrow{AB} = 2\vec{i}$ . En déduire les coordonnées du point B.
3. Construire le point C tel que  $\overrightarrow{BC} = \vec{i} + \vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point C.
4. Construire le point D tel que  $\overrightarrow{CD} = 4\vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point D.
5. Construire le point E tel que  $\overrightarrow{DE} = \vec{j} - \vec{i}$ . En déduire les coordonnées du point E.
6. Construire le point F tel que  $\overrightarrow{EF} = -2\vec{i}$ . En déduire les coordonnées du point F.
7. Tracer les vecteurs  $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{DE}, \overrightarrow{EF}, \overrightarrow{FO}$  et vérifier que vous avez bien obtenu la lettre D.

## 22.6 Exercice 37

Dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$  :

1. Construire le point A tel que  $\overrightarrow{OA} = -\vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point A.
2. Construire le point B tel que  $\overrightarrow{AB} = \vec{i}$ . En déduire les coordonnées du point B.
3. Construire le point B' tel que  $\overrightarrow{JB'} = \vec{i}$ . En déduire les coordonnées du point B'.
4. Tracer les vecteurs  $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{OJ}, \overrightarrow{JB'}$  et vérifier que vous avez bien obtenu la lettre E.

## 22.7 Exercice 38

Dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$  :

1. Construire le point A tel que  $\overrightarrow{OA} = -\vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point A.
2. Construire le point B tel que  $\overrightarrow{JB} = \vec{i}$ . En déduire les coordonnées du point B.
3. Tracer les vecteurs  $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OJ}, \overrightarrow{JB}$  et vérifier que vous avez bien obtenu la lettre F.

## 22.8 Exercice 39

Dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$  :

1. Construire le point A tel que  $\overrightarrow{IA} = \vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point A.

2. Construire le point B tel que  $\overrightarrow{AB} = -\frac{1}{2}\vec{i}$ . En déduire les coordonnées du point B.
3. Construire le point C tel que  $\overrightarrow{JC} = \vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point C.
4. Construire le point D tel que  $\overrightarrow{JD} = \vec{i}$ . En déduire les coordonnées du point D.
5. Construire le point E tel que  $\overrightarrow{DE} = -\frac{1}{2}\vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point E.
6. Tracer les vecteurs  $\overrightarrow{OI}, \overrightarrow{IA}, \overrightarrow{OJ}, \overrightarrow{JC}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{DE}$  et vérifier que vous avez bien obtenu la lettre G.

## 22.9 Exercice 40

Dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$  :

1. Construire le point A tel que  $\overrightarrow{OA} = -\vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point A.
2. Construire le point B tel que  $\overrightarrow{IB} = -\vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point B.
3. Construire le point C tel que  $\overrightarrow{IC} = \vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point C.
4. Tracer les vecteurs  $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OI}, \overrightarrow{IB}, \overrightarrow{IC}, \overrightarrow{OJ}$  et vérifier que vous avez bien obtenu la lettre H.

## 22.10 Exercice 41

Dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$  :

1. Construire le point A tel que  $\overrightarrow{OA} = -\vec{i}$ . En déduire les coordonnées du point A.
2. Construire le point B tel que  $\overrightarrow{JB} = \vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point B.
3. Construire le point C tel que  $\overrightarrow{BC} = -\vec{i}$ . En déduire les coordonnées du point C.
4. Construire le point D tel que  $\overrightarrow{BD} = \vec{i}$ . En déduire les coordonnées du point D.
5. Tracer les vecteurs  $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OJ}, \overrightarrow{JB}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD}$  et vérifier que vous avez bien obtenu la lettre I.

## 22.11 Exercice 42

Dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$  :

1. Construire le point A tel que  $\overrightarrow{OA} = -\vec{i}$ . En déduire les coordonnées du point A.
2. Construire le point B tel que  $\overrightarrow{JB} = \vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point B.
3. Construire le point C tel que  $\overrightarrow{BC} = -\vec{i}$ . En déduire les coordonnées du point C.
4. Construire le point D tel que  $\overrightarrow{BD} = \vec{i}$ . En déduire les coordonnées du point D.
5. Tracer les vecteurs  $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OJ}, \overrightarrow{JB}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD}$  et vérifier que vous avez bien obtenu la lettre J.

**22.12 Exercice 43**

Dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$  :

1. Construire le point A tel que  $\overrightarrow{JA} = \vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point A.
2. Construire le point B tel que  $\overrightarrow{JB} = \vec{i} + \vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point B.
3. Construire le point C tel que  $\overrightarrow{JC} = \vec{i} - \vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point C.
4. Tracer les vecteurs  $\overrightarrow{OJ}, \overrightarrow{JC}, \overrightarrow{JB}, \overrightarrow{JA}$  et vérifier que vous avez bien obtenu la lettre K.

**22.13 Exercice 44**

Dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$  :

1. En partant de O tracer le vecteur  $\vec{i}$ , on nommera I son extrémité.
2. En partant de O tracer le vecteur  $\vec{j}$ , on nommera J son extrémité.
3. Vérifier que l'enchaînement  $\overrightarrow{OI}$  puis  $\overrightarrow{OJ}$  donne bien la lettre L.

**22.14 Exercice 45**

Dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$  :

1. Construire le point A tel que  $\overrightarrow{JA} = \frac{1}{2}(\vec{i} - \vec{j})$ . En déduire les coordonnées du point A.

2. Construire le point B tel que  $\overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}(\vec{i} + \vec{j})$ . En déduire les coordonnées du point B.
3. Tracer les vecteurs  $\overrightarrow{OJ}, \overrightarrow{JA}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BI}$  et vérifier que vous avez bien obtenu la lettre M.

## 22.15 Exercice 46

Dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ .

1. Construire le point A tel que  $\overrightarrow{IA} = \vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point A.
2. Tracer les vecteurs  $\overrightarrow{OJ}, \overrightarrow{JI}, \overrightarrow{IA}$  et vérifier que vous avez bien obtenu la lettre N.

## 22.16 Exercice 47

Dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ .

1. Construire le point A tel que  $\overrightarrow{OA} = \vec{i} + \vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point A.
2. Tracer les vecteurs  $\overrightarrow{OJ}, \overrightarrow{OI}, \overrightarrow{IA}, \overrightarrow{AJ}$  et vérifier que vous avez bien obtenu la lettre O.

## 22.17 Exercice 48

Dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ .

1. Construire le point A tel que  $\overrightarrow{OA} = \vec{i} + \vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point A.

2. Construire le point B tel que  $\overrightarrow{OB} = -\vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point B.
3. Tracer les vecteurs  $\overrightarrow{OJ}, \overrightarrow{OI}, \overrightarrow{IA}, \overrightarrow{AJ}, \overrightarrow{OB}$  et vérifier que vous avez bien obtenu la lettre P.

**22.18 Exercice 49**

Dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$  :

1. Construire le point A tel que  $\overrightarrow{OA} = \vec{i} + \vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point A.
2. Construire le point B tel que  $\overrightarrow{IB} = -\vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point B.
3. Tracer les vecteurs  $\overrightarrow{OJ}, \overrightarrow{OI}, \overrightarrow{IA}, \overrightarrow{AJ}, \overrightarrow{IB}$  et vérifier que vous avez bien obtenu la lettre Q.

**22.19 Exercice 50**

Dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$  :

1. Construire le point A tel que  $\overrightarrow{OA} = \vec{i} + \vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point A.
2. Construire le point B tel que  $\overrightarrow{IB} = -\vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point B.
3. Construire le point C tel que  $\overrightarrow{OC} = -\vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point C.
4. Tracer les vecteurs  $\overrightarrow{OJ}, \overrightarrow{OI}, \overrightarrow{IA}, \overrightarrow{AJ}, \overrightarrow{JB}, \overrightarrow{JC}$  et vérifier que vous avez bien obtenu la lettre R.

**22.20 Exercice 51**

Dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$  :

1. Construire le point A tel que  $\overrightarrow{OA} = \vec{i} + \vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point A.
2. Construire le point B tel que  $\overrightarrow{IB} = -\vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point B.
3. Construire le point C tel que  $\overrightarrow{OC} = -\vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point C.
4. Tracer les vecteurs  $\overrightarrow{OI}, \overrightarrow{IB}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{OJ}, \overrightarrow{JA}$  et vérifier que vous avez bien obtenu la lettre S.

**22.21 Exercice 52**

Dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ .

1. Construire le point A tel que  $\overrightarrow{OA} = \vec{i} + \vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point A.
2. Construire le point B tel que  $\overrightarrow{JB} = -\vec{u}$ . En déduire les coordonnées du point B.
3. Construire le point C tel que  $\overrightarrow{OC} = -\vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point C.
4. Tracer les vecteurs  $\overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OJ}, \overrightarrow{JA}, \overrightarrow{JB}$  et vérifier que vous avez bien obtenu la lettre T.

**22.22 Exercice 53**

Dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$  :

1. Construire le point A tel que  $\overrightarrow{OA} = \vec{i} + \vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point A.
2. Tracer les vecteurs  $\overrightarrow{OJ}, \overrightarrow{OI}, \overrightarrow{IA}$  et vérifier que vous avez bien obtenu la lettre U.

**22.23 Exercice 54**

Dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$

1. Construire le point A tel que  $\overrightarrow{OA} = \frac{1}{2}\vec{i} + \vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point A.
2. Construire le point B tel que  $\overrightarrow{OB} = \vec{j} - \frac{1}{2}\vec{i}$ . En déduire les coordonnées du point B.
3. Tracer les vecteurs  $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$  et vérifier que vous avez bien obtenu la lettre V.

**22.24 Exercice 55**

Dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$  :

1. Construire le point A tel que  $\overrightarrow{OA} = \frac{1}{2}\vec{i} + \vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point A.
2. Construire le point B tel que  $\overrightarrow{OB} = \vec{j} - \frac{1}{2}\vec{i}$ . En déduire les coordonnées du point B.
3. Construire le point C tel que  $\overrightarrow{IC} = \frac{1}{2}\vec{i} + \vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point C.
4. Tracer les vecteurs  $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{IA}, \overrightarrow{IC}$  et vérifier que vous avez bien obtenu la lettre W.

## 22.25 Exercice 56

Dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$

1. Construire le point A tel que  $\overrightarrow{OA} = \frac{1}{2}\vec{i} + \vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point A.
2. Construire le point B tel que  $\overrightarrow{OB} = \vec{j} - \frac{1}{2}\vec{i}$ . En déduire les coordonnées du point B.
3. Construire le point C tel que  $\overrightarrow{OC} = -\frac{1}{2}\vec{i} - \vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point C.
4. Construire le point D tel que  $\overrightarrow{OD} = \frac{1}{2}\vec{i} - \vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point D.
5. Tracer les vecteurs  $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OD}$  et vérifier que vous avez bien obtenu la lettre X.

## 22.26 Exercice 57

Dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ . Veiller à NE PAS tracer le vecteur  $\vec{i}$ .

1. Construire le point A tel que  $\overrightarrow{OA} = \frac{1}{2}\vec{i} + \vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point A.
2. Construire le point B tel que  $\overrightarrow{OB} = \vec{j} - \frac{1}{2}\vec{i}$ . En déduire les coordonnées du point B.
3. Construire le point C tel que  $\overrightarrow{OC} = -\vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point C.
4. Tracer les vecteurs  $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}$  et vérifier que vous avez bien obtenu la lettre Y.

**22.27 Exercice 58**

Dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ .

1. Construire le point A tel que  $\overrightarrow{OA} = \vec{i} + \vec{j}$ . En déduire les coordonnées du point A.
2. Tracer les vecteurs  $\overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{AJ}$  et vérifier que vous avez bien obtenu la lettre Z.

## **Chapitre 23**

# **Applications des vecteurs dans la vie réelle**

### **23.1 Exercice 59**

Un drone se déplace selon les vecteurs successifs :

$$\vec{v}_1 \begin{pmatrix} 100 \\ 50 \end{pmatrix}$$
$$\vec{v}_2 \begin{pmatrix} -30 \\ 80 \end{pmatrix}$$
$$\vec{v}_3 \begin{pmatrix} -20 \\ -100 \end{pmatrix}$$

Calculer sa position finale et la distance parcourue au total.

### **23.2 Exercice 60**

On considère un échiquier standard comme celui sur la figure ci-dessous :



L'échiquier est traditionnellement codé avec les lettres de a à h pour indiquer la position horizontale et les nombres de 1 à 8 pour indiquer la position verticale.


De cette façon le codage a1 correspond à la case en bas à gauche et le codage h8 à la case en haut à droite.

Afin de rendre cette représentation utilisable dans le cadre vectoriel conforme à la classe de seconde on va considérer que l'origine du repère sera la case a1 qu'on identifiera à O.

De même, le vecteur  $\vec{i}$  est identifié à la translation de a1 vers b1 et le vecteur  $\vec{j}$  à celle de a1 vers a2.

Considérons les déplacements possibles du fou blanc comme indiqué sur la photo ci-dessous :

### Déplacements du **fou** de cases blanches



- Quelles sont les coordonnées du vecteur  $\vec{v}_1$  indiquant le déplacement de la case h1 vers la case a8 (appelée aussi anti-diagonale ou seconde diagonale) ?
- Calculer la norme de ce vecteur  $\|\vec{v}_1\|$ .
- Mêmes questions pour le fou noir et la diagonale a1 vers h8 représentée par le vecteur  $\vec{v}_2$ .
- Mêmes questions pour la sur-diagonale du fou blanc débutant à la case a2 et finissant à la case g8, on nommera le vecteur  $\vec{v}_3$ .
- Mêmes questions pour la sur-diagonale du fou noir débutant à la case a3 et finissant à la case f8, on nommera le vecteur  $\vec{v}_4$ .
- Idem pour  $\vec{v}_5$  qui part de a4 et termine en e8.

7. Idem pour  $\vec{v}_6$  qui part de a5 et termine en d8.
8. Idem pour  $\vec{v}_7$  qui commence en a6 et finit en c8.
9. Idem pour  $\vec{v}_8$  qui commence en a7 et finit en b8.
10. Idem pour  $\vec{v}_9$  qui commence en a8 et finit en a8.
11. Si on souhaite généraliser les déplacements du fou en programmant un seul vecteur du type :  $\vec{v} = a\vec{i} + b\vec{j}$  avec

$$\vec{i} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

et

$$\vec{j} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

les vecteurs de la base canonique, alors quelles sont les valeurs possibles pour les nombres  $a$  et  $b$ ?

### 23.3 Exercice 61

Un projectile est lancé depuis O(0 ; 0) avec une vitesse initiale  $\vec{v}_0$  de coordonnées  $\begin{pmatrix} 20 \\ 30 \end{pmatrix}$  m/s.

La gravité exerce une accélération constante  $\vec{g} \begin{pmatrix} 0 \\ -10 \end{pmatrix}$  m/s<sup>2</sup>.


Après 1 seconde, la vitesse devient  $\vec{v}_1 = \vec{v}_0 + \vec{g}$ .

1. Calculer les coordonnées de  $\vec{v}_1$
2. Calculer la norme de  $\vec{v}_1$  (vitesse en m/s)
3. La position après 1s est  $\vec{p}_1 = \vec{v}_0 + \frac{1}{2}\vec{g}$ . Calculer les coordonnées du point P<sub>1</sub>.

4. Après combien de temps le projectile retombe-t-il au sol ( $y=0$ )?


## 23.4 Exercice 62 : Images vectorielles vs images bitmap

Image Bitmap (PNG)



40 000 pixels pour  $200 \times 200$

Image Vectorielle (SVG)



3 points + 2 vecteurs

FIG. 23.1 : Différence entre image bitmap et image vectorielle

Les images numériques peuvent être de deux types : **bitmap** (aussi appelées matricielles ou raster) ou **vectorielles**.

- Une image bitmap (JPEG, PNG, GIF) est constituée d'une grille de pixels. Chaque pixel a une couleur définie. Si on agrandit l'image, elle devient floue et pixelisée.
- Une image vectorielle (SVG, PDF vectoriel) est constituée de formules mathématiques décrivant des formes géométriques (lignes, courbes, polygones). On peut l'agrandir infiniment sans perte de qualité.

**Questions :**

1. Dans un logiciel de dessin vectoriel, on trace un segment de A(100 ; 150) à B(300 ; 450). Quelles sont les coordonnées du vecteur  $\overrightarrow{AB}$  ?
2. Pour afficher ce segment à l'écran, l'ordinateur calcule sa longueur. Quelle est-elle (en pixels) ?
3. L'utilisateur applique un zoom  $\times 2$  (homothétie de rapport 2 centrée à l'origine). Quelles sont les nouvelles coordonnées de A' et B' ?
4. Le vecteur  $\overrightarrow{A'B'}$  est-il colinéaire à  $\overrightarrow{AB}$ ? Justifier.
5. Quelle est la longueur du segment [A'B'] après le zoom ?
6. **Question de réflexion :** Pourquoi dit-on qu'une image vectorielle peut être agrandie "infiniment" sans perte de qualité, contrairement à une image bitmap ?

**Note :** Les formats SVG (Scalable Vector Graphics) et PDF utilisent exactement ces principes mathématiques. C'est pourquoi les logos d'entreprises, icônes d'applications, et schémas techniques sont toujours créés en vectoriel !

### 23.5 Exercice 63 : Décoder un fichier SVG

Le format SVG (Scalable Vector Graphics) est un format d'image vectorielle basé sur du code XML. Voici un extrait simplifié d'un fichier SVG :

```
<svg
  width="500"
  height="400">
<line
```

```
    x1="50"  y1="100"
    x2="200" y2="250"
    stroke="blue" />
<line
    x1="200" y1="250"
    x2="350" y2="100"
    stroke="red" />
<circle
    cx="200" cy="175"
    r="80" fill="none"
    stroke="green" />
</svg>
```

Ce code décrit :

- Une ligne bleue du point A(50 ; 100) au point B(200 ; 250)
- Une ligne rouge du point B(200 ; 250) au point C(350 ; 100)
- Un cercle vert de centre O(200 ; 175) et de rayon 80 pixels

**Attention :** En SVG, l'axe des ordonnées est **inversé** par rapport au repère mathématique classique (l'origine est en haut à gauche, y augmente vers le bas).

**Questions :**

1. Calculer les coordonnées des vecteurs  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{BC}$  dans le repère SVG.
2. Les points A, B, C sont-ils alignés ? Justifier avec le déterminant.
3. Quelle est la nature du triangle ABC ?

4. Le centre O du cercle appartient-il au segment [AC] ? Justifier.
5. **Défi :** Écrire le code SVG d'un carré DEFG de côté 100 pixels avec D(100 ; 100) comme sommet en haut à gauche.

**Pour aller plus loin :** Ouvrez un fichier .svg avec un éditeur de texte (Bloc-notes, TextEdit) et observez le code. Vous verrez des vecteurs partout !

## 23.6 Exercice 64 : Pourquoi les PDF sont-ils vectoriels ?

Un fichier PDF peut contenir du texte, des images et des graphiques. Le texte et les graphiques sont généralement stockés sous forme **vectorielle**.

Prenons l'exemple de la lettre "A" :

- Dans une image bitmap (photo), le "A" est une grille de pixels noirs et blancs
- Dans un PDF vectoriel, le "A" est décrit par ses contours : deux segments obliques et un segment horizontal

**Situation :** Un *designer* (graphiste en bon français) crée un logo avec la lettre "V" formée par deux segments :

- Segment 1 : de O(0 ; 100) à M(50 ; 0)
- Segment 2 : de M(50 ; 0) à N(100 ; 100)

**Questions :**

1. Quelles sont les coordonnées des vecteurs  $\overrightarrow{OM}$  et  $\overrightarrow{MN}$  ?

2. Ces deux vecteurs sont-ils colinéaires ? Que peut-on en déduire sur la forme de la lettre "V" ?
3. Calculer les normes  $\|\overrightarrow{OM}\|$ ,  $\|\overrightarrow{MN}\|$  et  $\|\overrightarrow{ON}\|$ . La lettre "V" est-elle symétrique ?
4. Le *designer* (graphiste en bon français) applique une transformation : tous les points sont multipliés par 2. Quelles sont les nouvelles coordonnées de O', M', N' ?
5. Les segments [O'M'] et [M'N'] conservent-ils les mêmes angles que [OM] et [MN] ? Pourquoi ?
6. **Application** : Expliquez pourquoi un PDF contenant du texte reste net même quand on zoom à 400%, alors qu'une photo devient floue.

**À retenir :** Quand vous convertissez un document Word en PDF, tout le texte est transformé en vecteurs. C'est pour ça qu'on peut zoomer sans pixelisation !

## 23.7 Exercice 65 : Bitmap vs Vectoriel - Étude comparative

On souhaite créer un logo carré de  $200 \times 200$  pixels pour une application mobile.

### Méthode 1 : Image bitmap (PNG)

- Le logo est une grille de  $200 \times 200 = 40\,000$  pixels
- Chaque pixel stocke sa couleur (3 octets RGB)
- Taille du fichier :  $\approx 120$  Ko (avec compression)

- Si on agrandit à  $400 \times 400$ , il faut recalculer 160 000 pixels par interpolation → image floue

### Méthode 2 : Image vectorielle (SVG)

- Le logo est décrit par 4 segments formant un carré
- Stockage : 4 vecteurs avec leurs coordonnées
- Taille du fichier :  $\approx 1 \text{ Ko}$
- Si on agrandit, on multiplie simplement les coordonnées par 2 → image parfaitement nette

### Questions :

1. Un carré vectoriel a pour sommets A(0 ;0), B(200 ;0), C(200 ;200), D(0;200). Donner les coordonnées des 4 vecteurs  $\overrightarrow{AB}$ ,  $\overrightarrow{BC}$ ,  $\overrightarrow{CD}$ ,  $\overrightarrow{DA}$ .
2. On applique un zoom  $\times 3$ . Quelles sont les nouvelles coordonnées des 4 sommets ?
3. Calculer le périmètre du carré initial et du carré agrandi. Vérifier que le rapport est bien 3.
4. **Calcul de taille :** a) Bitmap : Combien de pixels dans l'image agrandie ( $600 \times 600$ ) ? b) Vectoriel : Combien de vecteurs dans l'image agrandie ?

**Conclusion :** Les vecteurs que vous apprenez en seconde sont utilisés quotidiennement par des millions d'ordinateurs, smartphones et imprimantes pour afficher des textes, logos, icônes et graphiques !

## 23.8 Exercice 66 : Créer une icône vectorielle (Projet)

Les icônes d'applications sur smartphone sont toujours créées en vectoriel pour s'adapter aux différentes tailles d'écran (iPhone, iPad, etc.).

**Projet :** Crée l'icône ☺ (éclair) en utilisant uniquement des vecteurs.

**Étape 1 : Conception** On dessine l'éclair avec 7 points :

- A(100 ; 0) [sommet haut]
- B(60 ; 80)
- C(80 ; 80)
- D(40 ; 200) [sommet bas]
- E(80 ; 120)
- F(60 ; 120)
- G(100 ; 0) [retour au début]

**Questions :**

1. Calculer les vecteurs  $\overrightarrow{AB}$ ,  $\overrightarrow{BC}$ ,  $\overrightarrow{CD}$ ,  $\overrightarrow{DE}$ ,  $\overrightarrow{EF}$ ,  $\overrightarrow{FG}$ .
2. Vérifier que  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FG} = \vec{0}$ . Que signifie ce résultat ?
3. L'icône doit être affichée en 3 tailles :  $32 \times 32$ ,  $64 \times 64$ ,  $128 \times 128$  pixels. Pour chaque taille, donner le facteur d'homothétie à appliquer sachant que le dessin initial fait  $200 \times 200$ .

**Pour aller plus loin :** Les *designer* (graphiste en bon français) utilisent des logiciels comme Adobe Illustrator, Inkscape (gratuit), ou Figma pour créer des images vectorielles. Tous ces outils manipulent des vecteurs mathématiques en arrière-plan !

# Chapitre 24

## Chiffres

### 24.1 Introduction

Dans cette section, vous allez apprendre à maîtriser les vecteurs en traçant tous les chiffres indo-arabes du système décimal. Chaque chiffre est une construction géométrique précise utilisant les opérations vectorielles.

**Objectifs :**

- Renforcer la manipulation des vecteurs de base  $\vec{i}$  et  $\vec{j}$
- Visualiser concrètement les combinaisons linéaires
- Développer la précision du tracé géométrique
- S'amuser avec les mathématiques !

**Consignes générales :**

1. Utilisez une règle et un compas pour les tracés
2. Respectez scrupuleusement l'échelle (1 carreau = 1 unité recommandé)

3. Vérifiez visuellement que vous obtenez bien la lettre attendue
4. Si nécessaire, recommencez le tracé pour gagner en précision

## 24.2 Exercice 67

Dans le plan muni du repère orthonormé canonique

$$(O; \vec{i}; \vec{j})$$

1. Placer le point A tel que  $\overrightarrow{OA} = -\vec{i}$ . En déduire ses coordonnées.
2. Placer le point B tel que  $\overrightarrow{JB} = \vec{j}$ . En déduire ses coordonnées.
3. Placer le point C tel que  $\overrightarrow{BC} = -\vec{i} - \vec{j}$ . En déduire ses coordonnées.
4. Tracer les vecteurs  $\overrightarrow{OA}, \vec{i}, \vec{j}, \overrightarrow{JB}, \overrightarrow{BC}$ .

Vérifier que vous avez bien obtenu le chiffre 1.

## 24.3 Exercice 68

Dans le plan muni du repère orthonormé canonique

$$(O; \vec{i}; \vec{j})$$

1. Placer le point A tel que  $\overrightarrow{JA} = \vec{i}$ . En déduire ses coordonnées.

2. Placer le point B tel que  $\overrightarrow{AB} = \vec{j}$ . En déduire ses coordonnées.
3. Placer le point C tel que  $\overrightarrow{BC} = -\vec{i}$ . En déduire ses coordonnées.
4. Tracer les vecteurs  $\vec{i}, \vec{j}, \overrightarrow{JA}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}$ .

Vérifier que vous avez bien obtenu le chiffre 2.

## 24.4 Exercice 69

Dans le plan muni du repère orthonormé canonique

$$(O; \vec{i}; \vec{j})$$

1. Placer le point A tel que  $\overrightarrow{IA} = \vec{j}$ . En déduire ses coordonnées.
2. Placer le point B tel que  $\overrightarrow{AB} = \vec{j}$ . En déduire ses coordonnées.
3. Placer le point C tel que  $\overrightarrow{BC} = -\vec{i}$ . En déduire ses coordonnées.
4. Tracer les vecteurs  $\vec{i}, \overrightarrow{IA}, \overrightarrow{AJ}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}$ .

Vérifier que vous avez bien obtenu le chiffre 3.

## 24.5 Exercice 70

Dans le plan muni du repère orthonormé canonique

$$(O; \vec{i}; \vec{j})$$

1. Placer le point A tel que  $\overrightarrow{IA} = \vec{j}$ . En déduire ses coordonnées.
2. Placer le point B tel que  $\overrightarrow{AB} = \vec{j}$ . En déduire ses coordonnées.
3. Placer le point C tel que  $\overrightarrow{JC} = \vec{j}$ . En déduire ses coordonnées.
4. Tracer les vecteurs  $\overrightarrow{IA}, \overrightarrow{AJ}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{JC}$ .

Vérifier que vous avez bien obtenu le chiffre 4.

## 24.6 Exercice 71

Dans le plan muni du repère orthonormé canonique

$$(O; \vec{i}; \vec{j})$$

1. Placer le point A tel que  $\overrightarrow{IA} = \vec{j}$ . En déduire ses coordonnées.
2. Placer le point B tel que  $\overrightarrow{JB} = \vec{j}$ . En déduire ses coordonnées.
3. Placer le point C tel que  $\overrightarrow{BC} = \vec{i}$ . En déduire ses coordonnées.
4. Tracer les vecteurs  $\vec{i}, \overrightarrow{IA}, \overrightarrow{AJ}, \overrightarrow{JB}, \overrightarrow{BC}$ .

Vérifier que vous avez bien obtenu le chiffre 5.

## 24.7 Exercice 72

Dans le plan muni du repère orthonormé canonique

$$(O; \vec{i}; \vec{j})$$

1. Placer le point A tel que  $\overrightarrow{IA} = \vec{j}$ . En déduire ses coordonnées.
2. Placer le point B tel que  $\overrightarrow{JB} = \vec{j}$ . En déduire ses coordonnées.
3. Placer le point C tel que  $\overrightarrow{BC} = \vec{i}$ . En déduire ses coordonnées.
4. Tracer les vecteurs  $\vec{i}, \vec{j}, \overrightarrow{IA}, \overrightarrow{AJ}, \overrightarrow{JB}, \overrightarrow{BC}$ .

Vérifier que vous avez bien obtenu le chiffre 6.

## 24.8 Exercice 73

Dans le plan muni du repère orthonormé canonique

$$(O; \vec{i}; \vec{j})$$

1. Placer le point A tel que  $\overrightarrow{OA} = \vec{i} + 2\vec{j}$ . En déduire ses coordonnées.
2. Placer le point B tel que  $\overrightarrow{AB} = -\vec{i}$ . En déduire ses coordonnées.
3. Tracer les vecteurs  $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{AB}$ .

Vérifier que vous avez bien obtenu le chiffre 7.

**24.9 Exercice 74**

Dans le plan muni du repère orthonormé canonique

$$(O; \vec{i}; \vec{j})$$

1. Placer le point A tel que  $\overrightarrow{IA} = \vec{j}$ . En déduire ses coordonnées.
2. Placer le point B tel que  $\overrightarrow{AB} = \vec{j}$ . En déduire ses coordonnées.
3. Placer le point C tel que  $\overrightarrow{BC} = -\vec{i}$ . En déduire ses coordonnées.
4. Tracer les vecteurs  $\vec{i}, \vec{j}, \overrightarrow{IA}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CJ}, \overrightarrow{JA}$ .

Vérifier que vous avez bien obtenu le chiffre 8.

**24.10 Exercice 75**

Dans le plan muni du repère orthonormé canonique

$$(O; \vec{i}; \vec{j})$$

1. Placer le point A tel que  $\overrightarrow{IA} = \vec{j}$ . En déduire ses coordonnées.
2. Placer le point B tel que  $\overrightarrow{AB} = \vec{j}$ . En déduire ses coordonnées.
3. Placer le point C tel que  $\overrightarrow{BC} = -\vec{i}$ . En déduire ses coordonnées.
4. Tracer les vecteurs  $\vec{i}, \overrightarrow{IA}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CJ}, \overrightarrow{JA}$ .

Vérifier que vous avez bien obtenu le chiffre 9.

## 24.11 Exercice 76

Dans le plan muni du repère orthonormé canonique

$$(O; \vec{i}; \vec{j})$$

1. Placer le point A tel que  $\overrightarrow{IA} = \vec{j}$ . En déduire ses coordonnées.
2. Placer le point B tel que  $\overrightarrow{AB} = \vec{j}$ . En déduire ses coordonnées.
3. Placer le point C tel que  $\overrightarrow{BC} = -\vec{i}$ . En déduire ses coordonnées.
4. Tracer les vecteurs  $\vec{i}, \vec{j}, \overrightarrow{IA}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CJ}$ .

Vérifier que vous avez bien obtenu le chiffre 0.



# Chapitre 25

## Paradoxe de Simpson

### 25.1 Exercice 77

1. Placer les points  $O(0; 0)$  et  $A(1; 0)$  et tracer le vecteur

$$\vec{u}_1 = \overrightarrow{OA}$$

en bleu.

2. Placer le point  $B(3; 1)$  et tracer le vecteur

$$\vec{v}_1 = \overrightarrow{OB}$$

en rouge.

3. Placer les points  $C(0; 3)$  et  $D(2; 7)$  et tracer le vecteur

$$\vec{u}_2 = \overrightarrow{CD}$$

en bleu.

4. Placer le point E(0 ; 4) et tracer le vecteur

$$\vec{v}_2 = \overrightarrow{CE}$$

en rouge.

5. Vérifier que la pente de  $\vec{u}_1$  est inférieure à celle de  $\vec{v}_1$ .

6. Vérifier que la pente de  $\vec{u}_2$  est inférieure à celle de  $\vec{v}_2$ .

7. Placer les points F(4 ; 2) et G(7 ; 4) et tracer le vecteur

$$\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2 = \overrightarrow{FG}$$

en rouge.

8. Placer le point H(7 ; 6) et tracer le vecteur

$$\vec{u} = \vec{u}_1 + \vec{u}_2 = \overrightarrow{FH}$$

en bleu.

9. Comparer les pentes des vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$ . Que remarquez-vous ?

# Chapitre 26

## Arithmétique

### 26.1 Exercice 78

On se place dans le plan muni d'un repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  avec  $(\vec{i}, \vec{j})$  la base canonique.

1. Pour  $n \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$  tracer les 6 vecteurs
$$\vec{u}_n \begin{pmatrix} n \\ 6 \end{pmatrix}$$
2. Calculer leurs pentes respectives  $p_n$ .
3. Lesquelles sont des nombres entiers ?
4. Qu'en déduisez-vous pour les abscisses des vecteurs dont la pente est un entier ?
5. Tracer les 6 vecteurs

$$\vec{v}_n \begin{pmatrix} 6 \\ n \end{pmatrix}$$

Que remarquez-vous pour  $\vec{v}_6$  ?

6. Calculer les pentes respectives  $q_n$ .
7. Avez-vous eu besoin de les calculer à partir de zéro ou alors y avait-il un moyen de les obtenir à partir des  $p_n$  ?
8. Quelle est la relation entre les  $p_n$  et les  $q_n$  ?
9. Combien y a-t-il de vecteurs du plan dans le quadrant supérieur droit de coordonnées entières tels que leur produit vaut 6 ?
10. Tracer tous les vecteurs à coordonnées entières vérifiant les conditions de la question précédente.

## 26.2 Exercice 79

On se place dans le plan muni d'un repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  avec  $(\vec{i}, \vec{j})$  la base canonique.

1. Pour  $n \in \{1, 2, \dots, 12\}$  tracer les 12 vecteurs
 
$$\vec{u}_n \begin{pmatrix} n \\ 12 \end{pmatrix}$$
2. Calculer leurs pentes respectives  $p_n$ .
3. Lesquelles sont des nombres entiers ?
4. Qu'en déduisez-vous pour les abscisses des vecteurs dont la pente est un entier ?
5. Tracer les 12 vecteurs

$$\vec{v}_n \begin{pmatrix} 12 \\ n \end{pmatrix}$$

Que remarquez-vous pour  $\vec{v}_1 \cdot 2$  ?

6. Calculer les pentes respectives  $q_n$ .
7. Avez-vous eu besoin de les calculer à partir de zéro ou alors y avait-il un moyen de les obtenir à partir des  $p_n$  ?
8. Quelle est la relation entre les  $p_n$  et les  $q_n$  ?
9. Combien y a-t-il de vecteurs du plan dans le quadrant supérieur droit de coordonnées entières tels que leur produit vaut 12 ?
10. Tracer tous les vecteurs à coordonnées entières vérifiant les conditions de la question précédente.

### 26.3 Exercice 80

On poursuit la même logique que les deux exercices précédents.

Mais cette fois on va calculer sans représenter les vecteurs parce qu'on va prendre  $n = 60$ .

1. Pour  $n \in \{1, 2, \dots, 60\}$  quels sont les vecteurs

$$\vec{u}_n \begin{pmatrix} n \\ 60 \end{pmatrix}$$

qui ont une pente entière ?

2. Qu'en déduisez-vous pour les abscisses des vecteurs dont la pente est un entier ?
3. Combien y a-t-il de vecteurs du plan dans le quadrant supérieur droit de coordonnées entières tels que leur produit vaut 60 ?



# Chapitre 27

## Trigonométrie

### 27.1 Exercice 81

Dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$

1. Placer le point A tel que  $\overrightarrow{OA} = \vec{u} = 3\vec{i}$ . Placer le point B tel que  $\overrightarrow{OB} = 3(\vec{i} + \vec{j})$ . Placer le point C tel que  $\overrightarrow{OC} = 3\vec{i} + 4\vec{j}$ . Placer le point D tel que  $\overrightarrow{OD} = 4(\vec{i} + \vec{j})$ . Comparer les triangles OIJ et BCD.
2. En géométrie classique l'angle AOB peut se lire dans les deux sens avec la même valeur, c'est ce qu'on appelle l'angle géométrique. Grâce aux vecteurs on peut définir un sens et donc faire la différence entre un angle positif et un angle négatif. On appelle sens positif (on dit aussi direct ou encore trigonométrique) le sens inverse des aiguilles d'une montre (on dit aussi anti-horaire) c'est-à-dire lorsqu'on parcours un chemin de façon à ce que ce soit la main gauche qui tienne la "rampe". Par exemple, l'angle orienté  $(\vec{i}; \vec{j})$  est dans le

sens direct donc on notera :

$$(\vec{i}; \vec{j}) = 90$$

alors que l'angle  $(\vec{j}; \vec{i})$  est dans le sens indirect (ou négatif)  
et on le notera :

$$(\vec{j}; \vec{i}) = -90$$

Exprimer le cosinus de l'angle  $(\overrightarrow{OA}, OB)$

3.

## **Huitième partie**

# **Erreurs fréquentes à éviter**



## **Chapitre 28**

### **Erreur 1 : Confondre vecteur et longueur**

$\boxtimes \overrightarrow{AB} = 5 \boxtimes ||\overrightarrow{AB}|| = 5$  ou  $AB = 5$



## **Chapitre 29**

# **Erreur 2 : Oublier le sens dans la relation de Chasles**

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CB} \quad \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$



## **Chapitre 30**

# **Erreur 3 : Confondre coordonnées de point et de vecteur**

Si A(2;3) et B(5;7), alors :  $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix}$   $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$

CHAPITRE 30. ERREUR 3 : CONFONDRE COORDONNÉES DE  
164 POINT ET DE VECTEUR

---

## **Neuvième partie**

# **Comment obtenir les solutions ?**



Les solutions détaillées de tous les exercices sont disponibles en téléchargement sur notre site web :

**<https://votresite.com/solutions-vecteurs>**

Indiquez simplement votre adresse email pour recevoir le PDF complet des corrigés.



# **Dixième partie**

# **Remerciements et**

# **feedback**



Merci d'avoir choisi ce livre ! Vos retours sont précieux pour améliorer les prochaines éditions.

Contactez-moi : laurent.garnier@votreemail.com Site web :  
[www.votresite.com](http://www.votresite.com)

Si ce livre vous a aidé, n'hésitez pas à le recommander !