

# ARITMETICA - ALGEBRA

Fila A

1. Hallar el valor de "p" para que la división de:  $P(x) = px^4 - (1 + 2p)x^3 - (1 + 3p)x^2 + px + 3$  entre  $Q(x) = x - 3$  sea exacta.

Aplicando el teorema del resto:

$$\begin{aligned} P(3) &= p3^4 - (1 + 2p)3^3 - (1 + 3p)3^2 + p3 + 3 \\ &= 81p - 27 - 54p - 9 - 27p + 3p + 3 = 3p - 33 \\ &= 3p - 33 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 3p - 33 = 0 \Leftrightarrow p = \frac{33}{3} = 11 \quad \text{la respuesta correcta es } \boxed{\text{b}}$$

2. Para la ecuación:  $x^2 - nx + 36 = 0$  que tiene como raíces a  $x_1$  y  $x_2$ . Determinar el valor de "n" tal que cumpla:  $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{5}{12}$ .

$$\text{Sabendo que, para la ecuación: } ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow \begin{cases} S = x_1 + x_2 = \frac{-b}{a} \\ P = x_1 * x_2 = \frac{c}{a} \end{cases}$$

La condición impuesta por el problema:

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 * x_2} = \frac{S}{P} = \frac{5}{12} \Rightarrow \frac{n}{36} = \frac{5}{12}$$

$$\Rightarrow n = \frac{5*36}{12} = 15 \quad \text{la respuesta correcta es } \boxed{\text{d}}$$

3. Calcular el valor de "y" que satisface el siguiente sistema: 
$$\begin{cases} \frac{20}{x} - \frac{12}{y} + \frac{15}{z} = 6 \\ \frac{15}{x} + \frac{20}{y} + \frac{6}{z} = 10 \\ \frac{10}{x} + \frac{8}{y} - \frac{9}{z} = 1 \end{cases}$$

Resolviendo el sistema:

$$\begin{cases} \frac{20}{x} - \frac{12}{y} + \frac{15}{z} = 6 & (1) \\ \frac{15}{x} + \frac{20}{y} + \frac{6}{z} = 10 & (2) \\ \frac{10}{x} + \frac{8}{y} - \frac{9}{z} = 1 & (3) \end{cases}$$

Haciendo  $(1)*3 + (2)*(-4)$ , se tiene:

$$\begin{cases} \frac{60}{x} - \frac{36}{y} + \frac{45}{z} = 18 & (1) \\ \frac{-60}{x} - \frac{80}{y} - \frac{24}{z} = -40 & (2) \end{cases} \Rightarrow -\frac{116}{y} + \frac{21}{z} = -22 \quad (4)$$

Haciendo  $(1)*(-1) + (3)*2$ , se tiene:

$$\begin{cases} \frac{-20}{x} + \frac{12}{y} - \frac{15}{z} = -6 & (1) \\ \frac{20}{x} + \frac{16}{y} - \frac{18}{z} = 2 & (3) \end{cases} \Rightarrow \frac{28}{y} - \frac{33}{z} = -4 \quad (5)$$

Haciendo  $(4)*(11) + (5)*(7)$ , se tiene:

$$\begin{cases} \frac{-1276}{y} + \frac{231}{z} = -242 \\ \frac{196}{y} - \frac{231}{z} = -28 \end{cases} \Rightarrow -\frac{1080}{y} = -270 \Rightarrow y = \frac{1080}{270} = 4$$

la respuesta correcta es  $\boxed{\text{c}}$

4. A un terreno de forma rectangular de 3696 metros de largo y 1056 metros de ancho se le quiere cercar con alambre sujeto a postes equidistantes de manera que disten de 20 a 30 metros y que corresponda un poste en cada vértice y otros en cada uno de los puntos medios de los lados del rectángulo. ¿cuantos postes se requieren?.

Descomponiendo en factores primos:

3696 2	1056 2
1848 2	528 2
924 2	264 2
462 2	132 2
231 3	66 2
77 7	33 3
11 11	11 11


$$\begin{matrix} 3696 = 2^4 \times 3 \times 7 \times 11 \\ 1056 = 2^5 \times 3 \times 11 \end{matrix} \implies \begin{cases} MCD(3696, 1056) = 2^4 \times 3 \times 11 = 528 \\ MCM(3696, 1056) = 2^5 \times 3 \times 7 \times 11 = 7392 \end{cases}$$

Por tanto, Se requieren 528 postes.

la respuesta correcta es

Geometria Trigonometria  
Fila A.

1. Desde un punto del suelo se ve el punto más alto de una torre formando un ángulo de  $30^\circ$  con la horizontal. Si nos aproximamos 10 metros hacia su base, éste ángulo es de  $60^\circ$ . La altura de la torre es:  
SOLUCION:



$$\begin{aligned}\tan 60 &= \sqrt{3} = \frac{h}{x} \Rightarrow h = \sqrt{3}x & (1) \\ \tan 30 &= \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{h}{x+10} \Rightarrow h = \frac{\sqrt{3}}{3}(x+10) & (2) \\ \text{Igualando (1) = (2)} \\ \sqrt{3}x &= \frac{\sqrt{3}}{3}(x+10) \Rightarrow x = 5 \\ \text{De donde, } h &= \sqrt{3}x = 5\sqrt{3} = \sqrt{25 \cdot 3} = \sqrt{75}\end{aligned}$$

Por tanto, la respuesta correcta es b

2. Si  $\cot x = \frac{8}{15}$ , determinar el valor de la siguiente expresión:  $E = \frac{\frac{1}{3} \sin x - \frac{1}{2} \cos x}{\frac{1}{17}(\sec x + \tan x)}$

SOLUCION:

$$\cot x = \frac{\text{cat}_{\text{ady}}}{\text{cat}_{\text{op}}} = \frac{8}{15} \Rightarrow \begin{cases} \text{Cat}_{\text{Adyacente}} = 8 \\ \text{Cat}_{\text{Opuesto}} = 15 \end{cases}$$

Aplicando pitagoras: Hipotenusa =  $\sqrt{8^2 + 15^2} = \sqrt{289} = 17$

Por definición:  $\sin x = \frac{\text{Cat}_{\text{Op}}}{\text{Hipot}} = \frac{15}{17} \Rightarrow \csc x = \frac{1}{\sin x} = \frac{17}{15}$

$\cos x = \frac{\text{Cat}_{\text{Ady}}}{\text{Hipot}} = \frac{8}{17} \Rightarrow \sec x = \frac{1}{\cos x} = \frac{17}{8}$

$\tan x = \frac{\text{Cat}_{\text{Op}}}{\text{Cat}_{\text{Ady}}} = \frac{15}{8}$

de donde,

$$\frac{\frac{1}{3} \sin x - \frac{1}{2} \cos x}{\frac{1}{17}(\sec x + \tan x)} = \frac{(\frac{1}{3})(\frac{15}{17}) - (\frac{1}{2})(\frac{8}{17})}{\frac{1}{17}(\frac{17}{8} + \frac{15}{8})} = \frac{1}{4}$$

Por tanto, la respuesta correcta es b

3. El valor de  $E = \tan^2 x(1 + \cos 2x) - 2 \cos^2 x$  es igual a:

SOLUCION:

Reemplazando por sus equivalentes en términos de  $\sin x$  y  $\cos x$ , se tiene:

$$\tan^2 x(1 + \cos 2x) - 2 \cos^2 x = \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}(1 + \cos^2 x - \sin^2 x) - 2 \cos^2 x$$

$$= \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}(2 \cos^2 x) - 2 \cos^2 x$$


$$= 2 \sin^2 x - 2 \cos^2 x = -2(\cos^2 x - \sin^2 x)$$

$$= -2 \cos 2x$$

Por tanto, la respuesta correcta es c

4. En un terreno rectangular un lado es el doble que el otro. Si el lado largo se aumenta en 40 metros y el otro en 6 metros; se tiene que el área se duplica. Hallar el perímetro del terreno rectangular.

SOLUCION:



Area del rectángulo inicial  $\Rightarrow A_1 = x(2x) = 2x^2$

Area del rectángulo final:  $\Rightarrow A_2 = (x + 6)(2x + 40)$

Aplicando la condición del problema:  $A_2 = 2A_1$

$$(x + 6)(2x + 40) = 4x^2 \Rightarrow 2x^2 + 52x + 240 = 4x^2$$

$$\Rightarrow 2x^2 - 52x - 240 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 26x - 120 = 0$$

$$x = \frac{26 \pm \sqrt{26^2 - 4(1)(-120)}}{2} = \frac{26 \pm \sqrt{1156}}{2} = \frac{26 \pm 34}{2}$$


$$x = \begin{cases} \frac{26+34}{2} = 30 \\ \frac{26-34}{2} = -4 \end{cases}$$

de donde, el perímetro  $= 6x = 6 * 30 = 180$  m.

Por tanto, la respuesta correcta es d

# Fila 1

F9



$$x = vt$$

$$\rightarrow v = \frac{x}{t}$$

$$0 = y - 5t^2$$

$$\rightarrow t = \sqrt{\frac{y}{5}}$$

$$v = \frac{x}{t} = x \sqrt{\frac{5}{y}}$$

$$v = \sqrt{5} \frac{x}{\sqrt{y}}$$


$$v = \sqrt{5} \frac{120}{\sqrt{5} \sqrt{9}} = \frac{120}{3} = 40$$

$$v = 40 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Rta. (d)


# Fila 1

**F10**



$$F_1 - P = m_A a$$

$$a = \frac{F_1 - P}{m_A}$$



$$P - F_2 \cos 60^\circ = m_B a$$

$$a = \frac{P - F_2 \cos 60^\circ}{m_B}$$

$$\frac{F_1 - P}{m_A} = \frac{P - F_2 \cos 60^\circ}{m_B}$$

$$F_1 m_B - P m_B = P m_A - F_2 \cos 60^\circ m_A$$

$$P(m_A + m_B) = F_1 m_B + F_2 \cos 60^\circ m_A$$

$$P = \frac{4F_1 + F_2}{6}$$

$$F_1 = 10 \text{ N}$$

$$F_2 = 8 \text{ N}$$

$$P = \frac{4(10) + 8}{6} = \frac{48}{6} = 8$$

$$P = 8 \text{ [N]} //$$

**Rta. (b)**

F11

Fila 1



$$v = r \omega$$

$$[\omega] = \text{rpm}$$

$$\omega = 150 \text{ rpm} = 150 \cancel{\frac{\text{rev}}{\text{min}}} * \frac{2\pi}{1 \cancel{\text{rev}}} * \frac{1 \text{ min}}{60} = 5\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$r = 2 \text{ m}$$


$$v = 5\pi(2) = 10\pi$$

$$\boxed{v = 10\pi \frac{\text{m}}{\text{s}}}$$

Rta.(b)

# Fila 1

F12



$$m = 1\text{g}; d = 12.5\text{m}; \mu = 0.1$$

$$mV = (m+M)V$$

$$-\mu(m+M)gd = -\frac{1}{2}(m+M)V^2$$

$$V = \sqrt{2gd\mu}$$

$$V = \left(\frac{m+M}{m}\right)V = \frac{m+M}{m} \sqrt{2gd\mu}$$

$$V = (1+M) \sqrt{2(1)(12.5) \frac{1}{10}} = (1+M)5$$

$$V = 5(1+M)$$

$$M = 9\text{g}$$

$$V = 5(10) = 50$$

$$V = 50 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Rta. (c)



Q13.- Calcular los cuatro números cuánticos del último electrón del catión manganeso  $3+$ .  
(Considere  $\uparrow s = +1/2$ )

- A) **3,2,1,+1/2**      B) 3,2,2,+1/2      C) 3,2,0,+1/2      D) 3,2,-1,+1/2      E) Ninguno

**Solución:**

La configuración electrónica es:  $_{25}\text{Mn}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^5$  para  $\text{Mn}^{3+}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^4$   
Por lo tanto los números cuánticos que se piden son para el electrón  $3d^4$ : **3,2,1,+1/2**

Q14.- Cuántos gramos de carbonato de calcio ( $\text{CaCO}_3$ ) estarán presentes en 200 ml de solución de carbonato de calcio de concentración 1 M.

- A) 40      **B) 20**      C) 50      D) 10      E) Ninguno

**Solución:**  $200 \text{ ml soln. } \text{CaCO}_3 \left( \frac{1 \text{ mol } \text{CaCO}_3}{1000 \text{ ml soln. } \text{CaCO}_3} \right) \left( \frac{100 \text{ g } \text{CaCO}_3}{1 \text{ mol } \text{CaCO}_3} \right) = 20 \text{ g } \text{CaCO}_3$

Q15.- Escriba los símbolos nucleares de tres tipos de isótopos de Molibdeno ( $Z=42$ ) en los que hay 53, 54 y 56 neutrones, respectivamente.

- A)  $_{53}^{95}\text{Mo}$   $_{54}^{96}\text{Mo}$   $_{56}^{98}\text{Mo}$       B)  $_{42}^{91}\text{Mo}$   $_{42}^{92}\text{Mo}$   $_{42}^{94}\text{Mo}$       C)  $_{42}^{53}\text{Mo}$   $_{42}^{54}\text{Mo}$   $_{42}^{56}\text{Mo}$   
D)  $_{42}^{95}\text{Mo}$   $_{42}^{96}\text{Mo}$   $_{42}^{98}\text{Mo}$       E) Ninguno

**Solución:** Isótopos son átomos de un elemento que tiene el mismo número atómico (protones) y diferente número de neutrones. Por lo tanto el conjunto que cumple con ( $Z=42$ ) en los que hay 53, 54 y 56 neutrones es:  $_{42}^{95}\text{Mo}$   $_{42}^{96}\text{Mo}$   $_{42}^{98}\text{Mo}$

Q16.- Señale la muestra que tenga la mayor masa.

- A) 2 moles de átomos de oxígeno  
B)  $6,023 \times 10^{23}$  átomos de azufre  
C) 11,2 litros de  $\text{H}_2$  en C.N. de presión y temperatura.  
**D)  $6,023 \times 10^{23}$  moléculas de  $\text{CaCO}_3$**   
E) Todos tienen igual masa

**Solución:**

$$\text{A) } 2 \text{ moles } O \left( \frac{16 \text{ g } O}{1 \text{ mol } O} \right) = 32 \text{ g } O$$

$$\text{B) } 6,023 \times 10^{23} \text{ át. } S \times \frac{1 \text{ mol } S}{6,023 \times 10^{23} \text{ át. } S} \times \frac{32 \text{ g } S}{1 \text{ mol } S} = 32 \text{ g } S$$

$$\text{C) } 11,2 \text{ L } H_2 \times \frac{1 \text{ mol } H_2}{22,4 \text{ L } H_2} \times \frac{2 \text{ g } H_2}{1 \text{ mol } H_2} = 1 \text{ g } H_2$$

$$\text{D) } 6,023 \times 10^{23} \text{ moléc. } \text{CaCO}_3 \times \frac{1 \text{ mol } \text{CaCO}_3}{6,023 \times 10^{23} \text{ moléc. } \text{CaCO}_3} \times \frac{100 \text{ g } \text{CaCO}_3}{1 \text{ mol } \text{CaCO}_3} = 100 \text{ g } \text{CaCO}_3$$