

Solución del examen de ingreso Matemáticas segunda opción 2017, fila 1

A1. Una persona hace las $\frac{3}{5}$ partes de un viaje en tren, los $\frac{7}{8}$ del resto en coche y los 26 Km. que quedan en bicicleta. ¿Cuántos kilómetros ha recorrido?

- (A) 518 (B) 519 (C) 520 (D) 521 (E) Ninguno

Solución:

Sea x la distancia que la persona recorre, entonces

$$x = \frac{3}{5}x + \frac{7}{8}\left(x - \frac{3}{5}x\right) + 26$$

resolviendo $x = 520$.

A2. Un estudiante se propone el primer día de un mes de 31 días, repasar matemáticas durante todo ese mes, resolviendo cada día 2 ejercicios más que el día anterior. Si el décimo día resolvió 22 ejercicios, ¿cuántos ejercicios habrá resuelto en total y al cabo del mes?

- (A) 1052 (B) 1053 (C) 1054 (D) 1055 (E) Ninguno

Solución:

Sea $a_{10} = a_1 + 9 \times 2 = 22$, de donde $a_1 = 4$ y así $a_{31} = 4 + 30 \times 2 = 64$ luego $S_{31} = \frac{1}{2}(4 + 64)31 = 1054$

A3. Pedro pensando en lo rápido que pasa el tiempo, reflexiona como sigue, dentro de 11 años, mi edad será la mitad del cuadrado de la edad que tenía hace 13 años. Halle la suma de los dígitos del año en que nació Pedro. Esta reflexión la hace Pedro en el presente año.

- (A) 24 (B) 25 (C) 26 (D) 27 (E) Ninguno

Solución:

Sea x la edad actual de Pedro, entonces:

$$x + 11 = \frac{1}{2}(x - 13)^2$$

resolviendo $x = 21$, y $x = 7$, la última solución se descarta, entonces Pedro nació en $2017 - 21 = 1996$ y la suma de los dígitos de ese año es: 25

A4. Dada la ecuación:

$$3 - \log(125) = (x^2 - 5x + 9) \log(2)$$

entonces la suma de las raíces de esta ecuación es:

- (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) Ninguno

Solución:

$$3 - \log(125) = \log 10^3 - \log(125) = \log\left(\frac{10^3}{5^3}\right) = 3 \log(2)$$

entonces

$$3 \log(2) = (x^2 - 5x + 9) \log(2), \quad 3 = x^2 - 5x + 9$$


simplificando y resolviendo tenemos $x = 3$ y $x = 2$, de donde la suma de las raíces es 5.

G5. En un triángulo rectángulo de lados: 5, 12 y 13, se traza un cuadrado como en la figura, entonces el área del triángulo sombreado es igual a:

- (A) $\frac{4319}{289}$ (B) $\frac{4320}{289}$ (C) $\frac{4321}{289}$ (D) $\frac{4322}{289}$ (E) Ninguno

Solución:

Sea x la longitud del cuadrado, del gráfico se tiene la siguiente proporción



$$\frac{5}{x} = \frac{12}{12 - x}, \quad x = \frac{60}{17}$$

entonces el área buscada es igual a: $\frac{1}{2}\left(12 - \frac{60}{17}\right)\frac{60}{17} = \frac{4320}{289}$


G6. Un cuadrado se inscribe en una circunferencia de diámetro 10, y en este cuadrado se inscribe una circunferencia y luego el cociente entre las áreas de la circunferencia mayor y la circunferencia menor es igual a:

- (A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9 (E) Ninguno

Solución:

Sea l el lado del cuadrado entonces $10^2 = 2l^2$, $l = \sqrt{50}$ de donde el radio de la segunda circunferencia inscrita en este cuadrado es $r = \frac{\sqrt{50}}{2}$, así el cociente entre las áreas de la circunferencia mayor y la circunferencia menor es igual a

$$\frac{\pi 5^2}{\pi \left(\frac{\sqrt{50}}{2}\right)^2} = 2$$





G7. En un triángulo equilátero de lado 6, se sombrea un triángulo con lados 3 y 4, ver figura, entonces el área de este triángulo sombreado es igual a:

- (A) $\frac{3}{2}\sqrt{3}$ (B) $\frac{1}{2}\sqrt{3}$ (C) $3\sqrt{3}$ (D) $2\sqrt{3}$ (E) Ninguno

Solución:

De la figura se tiene



$$\sin(60) = \frac{h}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad h = 2\sqrt{3}$$

luego el área buscada es $\frac{1}{2}(3)(2\sqrt{3}) = 3\sqrt{3}$.

G8. Sea x un ángulo del tercer cuadrante tal que $\cos(x) = -2/3$ entonces simplificando la expresión

$$Z = \frac{\cot^2(3\pi + x) - \cos(x - 2\pi)}{\tan^2(18\pi + x)}$$

se obtiene:

- (A) $Z = \frac{86}{75}$ (B) $Z = \frac{88}{75}$ (C) $Z = \frac{89}{75}$ (D) $Z = \frac{91}{75}$ (E) Ninguno

Solución:

Simplificando

$$\begin{aligned} \tan(18\pi + x) &= \frac{\tan(18\pi) + \tan(x)}{1 - \tan(18\pi)\tan(x)} = \tan(x) \\ \cot(3\pi + x) &= \frac{1 - \tan(3\pi)\tan(x)}{\tan(3\pi) + \tan(x)} = \frac{1}{\tan(x)} = \cot(x) \\ \cos(x - 2\pi) &= \cos(x)\cos(2\pi) + \sin(x)\sin(2\pi) = \cos(x) \end{aligned}$$

reemplazando


$$Z = \frac{\cot^2(3\pi + x) - \cos(x - 2\pi)}{\tan^2(18\pi + x)} = \frac{\cot^2(x) - \cos(x)}{\tan^2(x)}$$

y como $\cos(x) = -2/3$, entonces $\tan(x) = \frac{\sqrt{5}}{2}$ y $\cot(x) = \frac{2}{\sqrt{5}}$, de donde

$$Z = \frac{\cot^2(x) - \cos(x)}{\tan^2(x)} = \frac{\frac{4}{5} + \frac{2}{3}}{\frac{5}{4}} = \frac{88}{75}$$

≠ 9


Fila 1



$$\Rightarrow \mu_e mg = m R \omega^2$$

$$\hookrightarrow R = \frac{\mu_e g}{\omega^2} = 4[m] \quad \textcircled{a}$$

F 10



$$\Rightarrow T - mg = ma$$

$$\hookrightarrow T = m(a + g) = 1200[N] \quad \textcircled{c}$$

≠ 11

$$m_A v_A - m_B v_B = m_A v'_A \rightarrow v'_A = \frac{m_A v_A - m_B v_B}{m_A} = -2[m/s]$$

$$\Rightarrow \text{La rapidez } |v'_A| = 2[m/s] \quad \textcircled{b}$$

$$e(-v_B - v_A) = v'_A - v'_B \rightarrow e = \frac{v'_A}{-v_B - v_A} = \frac{2}{7} \Rightarrow \text{No es elástico} \quad \textcircled{b}$$

≠ 12





$$v_s = \frac{\Delta S_s}{\Delta t} = \frac{2d - x}{4} = \frac{2d - 20}{4} \Rightarrow v_s = 340[m/s] \quad \textcircled{b}$$

$$v_p = \frac{\Delta S_p}{\Delta t} = \frac{x}{4} \rightarrow x = 20[m]$$

Química 1

Q13:- $C_1 = 1,84 \frac{g}{ml} \cdot \frac{48g H_2SO_4}{100g} \cdot \frac{1mol H_2SO_4}{48g} \cdot \frac{1000ml}{1l} = 18,4 M$





$[V_1 = V_2 \cdot \frac{C_2}{C_1} = 100ml \cdot \frac{1,84M}{18,4M} = 10ml Acid] \Rightarrow (A)$



$\Rightarrow (C)$

Q15:- $11,2l CO_2 \cdot \frac{1mol}{22,4l} \cdot \frac{2at-g O}{1mol CO_2} \cdot \frac{6,023 \cdot 10^{23} atoms}{1at-g O} = 6,023 \cdot 10^{23} atoms \Rightarrow (D)$

Q16-



$\Rightarrow (D)$