



GEOMETRIA - TRIGONOMETRIA

G1. Si $L_1 \parallel L_2$ encontrar el valor de $2x + s$:



- a) 200°
- b) 180°
- c) 215°
- d) 230°
- e) Ninguno


G2. Si $\overline{OT} \parallel \overline{RQ}$ calcular el valor de $6x$:



- a) $\frac{27}{11}$
- b) $\frac{81}{11}$
- c) $\frac{27}{22}$
- d) $\frac{16}{9}$
- e) Ninguno


G3. Encuentra el área sombreada de la siguiente figura: los centros de C_1 y C_2 son los puntos medios de los lados $\overline{AC}$ y $\overline{BC}$ respectivamente, $\overline{AB}$ es diámetro de C_3 y tiene una longitud de 10 cm, el lado $\overline{AC} = 8$ cm.

- a) 84 cm^2
- b) $2\pi\text{ cm}^2$
- c) 24 cm^2
- d) 18 cm^2
- e) Ninguno



G4. En la figura, los lados $\overline{AI}$ y $\overline{BJ}$ están divididos en 4 partes iguales. Encuentra la longitud de $\overline{IJ}$, si $\overline{CD} = \frac{3a+b}{4}$ y $\overline{EF} = \frac{a+b}{2}$

- a) $\overline{IJ} = a$
- b) $\overline{IJ} = 2$
- c) $\overline{IJ} = 4$
- d) $\overline{IJ} = b$
- e) Ninguno



G5. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa es igual a m y la mediana de uno de los ángulos agudos es igual a $\frac{m\sqrt{3}}{3}$. Determina la magnitud de los catetos.

- a) $\frac{2\sqrt{2}}{3}m$; $\frac{2m}{3}$
- b) $\frac{\sqrt{2}}{3}m$; $\frac{m}{3}$
- c) $\frac{2\sqrt{2}}{3}m$; $\frac{m}{3}$
- d) $\frac{2\sqrt{2}}{3}m$; $\frac{4m}{3}$
- e) Ninguno