Caimito

Chrysophyllum cainito L.

IUCN Status: LC — Preocupación menor

Descripción e Información

Árbol frutal perennifolio de tamaño mediano a grande. Aunque es originario de las Antillas Mayores, se ha cultivado y naturalizado desde hace siglos en toda Centroamérica por el exquisito sabor de su fruto y el espectacular contraste bicolor de su denso follaje.

Descripción Botánica

Altura y Copa: Alcanza generalmente entre 10 y 25 metros de altura. Su copa es densa, redondeada y de follaje muy abundante, proporcionando una sombra pesada y fresca.

Tronco y Corteza: Tronco recto y cilíndrico, con una corteza de color grisáceo a marrón, fisurada en ejemplares maduros. Al igual que otras sapotáceas, todas las partes del árbol (tronco, ramas, hojas y frutos inmaduros) exudan un abundante látex blanco y pegajoso al ser cortadas.

Hojas: Simples, alternas y de forma elíptica (de 5 a 15 cm de largo). Son el principal atractivo ornamental del árbol: el haz

Clasificación Taxonómica

Reino: Plantae

Filo / División: Tracheophyta

Clase: Equisetopsida

Orden: Ericales

Familia: Sapotaceae

Género: Chrysophyllum

Especie: cainito

Autoridad: L.

Estado de Conservación

Categoría oficial según la Lista Roja de la IUCN:

LC — Preocupación menor

(parte superior) es de un color verde oscuro brillante, mientras que el envés (parte inferior) está cubierto por una densa pubescencia sedosa de un deslumbrante color dorado o cobrizo (*Chrysophyllum* = "hoja de oro").

Flores: Pequeñas, de color blanco amarillento o violáceo, agrupadas en pequeños racimos (fascículos) en las axilas de las hojas.

Fruto: Una baya globosa (5 a 8 cm de diámetro) de cáscara lisa, que puede ser de color verde claro o púrpura oscuro al madurar, dependiendo de la variedad. La pulpa es blanquecina, jugosa, dulce y mucilaginosa. Cuando el fruto se corta transversalmente, las semillas oscuras forman un patrón de estrella perfecto (razón por la cual en inglés se le conoce como "Star Apple").

Ecología y Distribución

Ampliamente distribuido y cultivado en los trópicos americanos. En Nicaragua es un árbol muy común en patios de casas, fincas y huertos familiares de las zonas cálidas y húmedas.

* **Hábito:** Requiere climas tropicales cálidos y es sensible a sequías muy prolongadas o fríos extremos.
* **Suelos:** Prefiere suelos profundos, fértiles y bien drenados, prosperando excelentemente en terrenos de origen volcánico o aluvial.

Usos Principales

Alimenticio: El fruto se consume fresco como postre. Es importante consumirlo solo cuando está completamente maduro, ya que el látex de la cáscara en frutos inmaduros es extremadamente astringente y pegajoso.

Ornamental: Su denso follaje bicolor (verde y oro) que brilla con el viento lo convierte en un árbol de sombra de primer nivel para paisajismo, parques y avenidas.

Medicinal: En la medicina folclórica mesoamericana, el cocimiento de las hojas se ha utilizado tradicionalmente para tratar la diabetes y el reumatismo. El látex del árbol se ha usado para extraer parásitos o tratar abscesos de la piel.

Maderable: Su madera es dura, pesada y resistente; se utiliza en construcción rural y carpintería, aunque la tala del árbol es poco común debido al gran valor de sus frutos.

Fuentes de Referencia:

* Clasificación Taxonómica y Autoridad: Tropicos.org - Missouri Botanical Garden
* Datos Ecológicos y Botánicos: Universidad Nacional Agraria (UNA), Nicaragua y Osa Arboretum
* Estado de Conservación Global: Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN