# Esquijoche (Limoncillo)

*Samyda spinulosa* Vent.

IUCN Status: LC — Preocupación menor

## Descripción e Información

Arbusto o árbol pequeño perennifolio, nativo de las regiones tropicales de Mesoamérica y las Antillas. En Nicaragua es una especie característica del sotobosque y zonas de transición, apreciada localmente tanto por su resistencia como por sus propiedades medicinales tradicionales.

Descripción Botánica

**Altura y Copa:** Generalmente alcanza entre 3 y 8 metros de altura. Su copa es irregular y algo abierta, con ramas delgadas que a menudo presentan pequeñas protuberancias o espinas incipientes.

**Tronco y Corteza:** El tronco es cilíndrico y delgado, con una corteza de color grisáceo a pardo claro, generalmente lisa o finamente fisurada en la base.

**Hojas:** Simples, alternas y de forma elíptica a oblonga. Tienen una textura ligeramente coriácea y bordes finamente

### Clasificación Taxonómica

**Reino:** Plantae

**Filo / División:** Tracheophyta

**Clase:** Equisetopsida

**Orden:** Malpighiales

**Familia:** Salicaceae

**Género:** Samyda

**Especie:** spinulosa

**Autoridad:** Vent.

### Estado de Conservación

Categoría oficial según la Lista Roja de la IUCN:

**LC — Preocupación menor**

aserrados o dentados. Una característica clave es la presencia de puntos translúcidos (glándulas) visibles al trasluz.

**Flores:** Pequeñas, de color blanco o crema, muy fragantes. Crecen de forma solitaria o en pequeños grupos en las axilas de las hojas. Sus sépalos son persistentes y protegen el desarrollo del fruto.

**Fruto:** Una cápsula globosa u ovoidal de aproximadamente 1 a 2 cm de diámetro. Al madurar, se torna de un color amarillento o anaranjado y se abre en valvas para exponer semillas rodeadas por un arilo carnoso y rojizo.

Ecología y Distribución

Se distribuye desde México hasta Panamá y el Caribe. En Nicaragua se encuentra frecuentemente en los departamentos del Pacífico (como León y Chinandega), habitando en matorrales, bosques secos y áreas disturbadas.

* **Hábito:** Es una especie muy resistente al calor y a la sequía estacional. Prefiere sitios con buena iluminación, aunque tolera la sombra parcial en el sotobosque.

* **Dispersión:** Sus frutos atraen a diversas especies de aves pequeñas que se alimentan del arilo carnoso, facilitando la dispersión de las semillas en el entorno universitario.

Usos Principales

**Medicinal (Etnobotánica):** Según la "Flora Útil de Nicaragua" de Grijalva, esta planta tiene aplicaciones en la medicina popular nicaragüense. Se utiliza tradicionalmente en infusiones para tratar problemas respiratorios (tos) y afecciones estomacales. Las hojas trituradas se han empleado de forma tópica para tratar llagas o afecciones cutáneas.

**Cercas y Leña:** Debido a su hábito de crecimiento ramificado, se utiliza ocasionalmente en la formación de cercas vivas y como fuente de leña de uso doméstico en comunidades rurales.

**Ornamental:** Por su fragancia floral y follaje denso, es una opción interesante para el paisajismo de bajo mantenimiento en climas secos.

---

**Fuentes de Referencia:**

* Clasificación Taxonómica y Autoridad: Tropicos.org - Missouri Botanical Garden

* Etnobotánica Local: Flora Útil de Nicaragua (Alfredo Grijalva) - Bio-Nica.info
* Estado de Conservación Global: Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN

---

Clasificación taxonómica basada en el sistema de nomenclatura binomial establecido por Carl Linnaeus y regulado por los Códigos Internacionales de Nomenclatura (ICN / ICZN).

El estado de conservación sigue las Categorías y Criterios de la Lista Roja de la IUCN, Versión 3.1.

Documento generado/actualizado 2026-03-05 17:43:13