Sardinillo (Vainillo)

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth

IUCN Status: LC — Preocupación menor

Descripción e Información

Arbusto o árbol pequeño de follaje persistente o caducifolio, nativo de las Américas. Es ampliamente reconocido por sus densos racimos de flores amarillas brillantes y su gran capacidad para atraer polinizadores, siendo una de las especies más versátiles para la restauración de suelos y el paisajismo en zonas secas.

Descripción Botánica

Altura y Copa: Generalmente crece como un arbusto de 3 a 5 metros, aunque puede alcanzar porte de árbol hasta los 10 metros. Su copa es irregular y muy ramificada desde la base.

Tronco y Corteza: Tronco delgado con corteza de color gris claro a pardo, que se vuelve áspera y agrietada con el tiempo.

Hojas: Opuestas y compuestas imparipinnadas (con un folíolo terminal). Los folíolos (generalmente de 5 a 13) son de forma lanceolada con bordes marcadamente aserrados

Clasificación Taxonómica

Reino: Plantae

Filo / División: Tracheophyta

Clase: Equisetopsida

Orden: Lamiales

Familia: Bignoniaceae

Género: Tecoma

Especie: stans

Autoridad: (L.) Juss. ex Kunth

Estado de Conservación

Categoría oficial según la Lista Roja de la IUCN:

(como una sierra), un rasgo clave para diferenciarlo del Cortez.

Flores: Grandes, vistosas y con forma de trompeta o campana. Son de un color amarillo limón intenso, a menudo con líneas rojizas en la garganta para guiar a los polinizadores. Crecen en racimos terminales muy fragantes.

Fruto: Una cápsula alargada y estrecha (de 10 a 20 cm), similar a una vaina verde que se torna café al madurar. Contiene numerosas semillas planas y aladas que el viento dispersa fácilmente.

Ecología y Distribución

Se distribuye naturalmente desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina. En Nicaragua es sumamente común en los departamentos de León, Chinandega y Managua, creciendo espontáneamente en orillas de caminos y terrenos baldíos.

* **Resistencia:** Es una especie extremadamente rústica que tolera sequías prolongadas, altas temperaturas y suelos pobres o perturbados.

* **Interacción Biológica:** Es una de las mejores especies para atraer biodiversidad al campus; sus flores son ricas en néctar y atraen constantemente a colibríes, abejas, mariposas y otros insectos beneficiosos.

Usos Principales

Ornamental: Muy utilizado en jardines y parques por su floración espectacular y casi continua bajo manejo.

Medicinal (Dato Clave UNA): En Nicaragua, el Sardinillo es famoso en la medicina popular. La infusión de sus hojas y raíces se utiliza tradicionalmente como un potente auxiliar en el tratamiento de la diabetes (hipoglucemiante), además de usarse para tratar afecciones gástricas y como diurético.

Restauración Ecológica: Debido a su rápido crecimiento y adaptabilidad, es ideal para proyectos de reforestación de cuencas degradadas y para el control de la erosión en taludes.

Fuentes de Referencia:

* Clasificación Taxonómica y Autoridad: Tropicos.org - Missouri Botanical Garden

* Identidad y Usos Locales: Universidad Nacional Agraria (UNA),

LC — Preocupación menor

Nicaragua

* Estado de Conservación Global: Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN

Clasificación taxonómica basada en el sistema de nomenclatura binomial establecido por Carl Linnaeus y regulado por los Códigos Internacionales de Nomenclatura (ICN / ICZN).

El estado de conservación sigue las Categorías y Criterios de la Lista Roja de la IUCN, Versión 3.1.

Documento generado/actualizado 2026-03-05 17:37:49