

## Ficha Institucional de Especie Botánica

LC · PREOCUPACIÓN MENOR

### Esquijoche (Limoncillo)

*Samyda spinulosa* Vent.

Registro institucional orientado a la divulgación científica, la educación ambiental y la conservación del patrimonio natural universitario.



#### DESCRIPCIÓN

### Información botánica

Arbusto o árbol pequeño perennifolio, nativo de las regiones tropicales de Mesoamérica y las Antillas. En Nicaragua es una especie característica del sotobosque y zonas de transición, apreciada localmente tanto por su resistencia como por sus propiedades medicinales tradicionales.

#### Descripción Botánica

- **Altura y Copa:** Generalmente alcanza entre 3 y 8 metros de altura. Su copa es irregular y algo abierta, con ramas delgadas que a menudo presentan pequeñas protuberancias o espinas incipientes.
- **Tronco y Corteza:** El tronco es cilíndrico y delgado, con una corteza de color grisáceo a pardo claro, generalmente lisa o finamente fisurada en la base.
- **Hojas:** Simples, alternas y de forma elíptica a oblonga. Tienen una textura ligeramente coriácea y bordes finamente aserrados o dentados. Una característica clave es la presencia de puntos translúcidos (glándulas) visibles al trasluz.
- **Flores:** Pequeñas, de color blanco o crema, muy fragantes. Crecen de forma solitaria o en pequeños grupos en las axilas de las hojas. Sus sépalos son persistentes y protegen el desarrollo del fruto.
- **Fruto:** Una cápsula globosa u ovoidal de aproximadamente 1 a 2 cm de diámetro. Al madurar, se torna de un color amarillento o anaranjado y se abre en valvas para exponer semillas rodeadas por un arilo carnoso y rojizo.

#### TAXONOMÍA

### Clasificación científica

REINO

Plantae

FILO / DIVISIÓN

Tracheophyta

CLASE

Equisetopsida

ORDEN

Malpighiales

FAMILIA

Salicaceae

GÉNERO

Samyda

ESPECIE

spinulosa

AUTORIDAD

Vent.

### Ecología y Distribución

Se distribuye desde México hasta Panamá y el Caribe. En Nicaragua se encuentra frecuentemente en los departamentos del Pacífico (como León y Chinandega), habitando en matorrales, bosques secos y áreas disturbadas.

\* **Hábito:** Es una especie muy resistente al calor y a la sequía estacional. Prefiere sitios con buena iluminación, aunque tolera la sombra parcial en el sotobosque.

\* **Dispersión:** Sus frutos atraen a diversas especies de aves pequeñas que se alimentan del arilo carnoso, facilitando la dispersión de las semillas en el entorno universitario.

### Usos Principales

- **Medicinal (Etnobotánica):** Según la "Flora Útil de Nicaragua" de Grijalva, esta planta tiene aplicaciones en la medicina popular nicaragüense. Se utiliza tradicionalmente en infusiones para tratar problemas respiratorios (tos) y afecciones estomacales. Las hojas trituradas se han empleado de forma tópica para tratar llagas o afecciones cutáneas.
- **Cercas y Leña:** Debido a su hábito de crecimiento ramificado, se utiliza ocasionalmente en la formación de cercas vivas y como fuente de leña de uso doméstico en comunidades rurales.
- **Ornamental:** Por su fragancia floral y follaje denso, es una opción interesante para el paisajismo de bajo mantenimiento en climas secos.

#### Fuentes de Referencia:

- \* Clasificación Taxonómica y Autoridad: [Tropicos.org - Missouri Botanical Garden](#)
- \* Etnobotánica Local: [Flora Útil de Nicaragua \(Alfredo Grijalva\) - Bio-Nica.info](#)
- \* Estado de Conservación Global: [Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN](#)

### CONSERVACIÓN

## Referencia IUCN

### LC — PREOCUPACIÓN MENOR

Categoría interpretada según la Lista Roja de la IUCN y utilizada como referencia para esta ficha institucional.

Este documento promueve el conocimiento científico y la educación ambiental dentro del campus, fortaleciendo la conservación del patrimonio botánico universitario.