

Ficha Institucional de Especie Botánica

LC · PREOCUPACIÓN MENOR

Caimito

Chrysophyllum cainito L.

Registro institucional orientado a la divulgación científica, la educación ambiental y la conservación del patrimonio natural universitario.



DESCRIPCIÓN

Información botánica

Árbol frutal perennifolio de tamaño mediano a grande. Aunque es originario de las Antillas Mayores, se ha cultivado y naturalizado desde hace siglos en toda Centroamérica por el exquisito sabor de su fruto y el espectacular contraste bicolor de su denso follaje.

Descripción Botánica

- **Altura y Copa:** Alcanza generalmente entre 10 y 25 metros de altura. Su copa es densa, redondeada y de follaje muy abundante, proporcionando una sombra pesada y fresca.
- **Tronco y Corteza:** Tronco recto y cilíndrico, con una corteza de color grisáceo a marrón, fisurada en ejemplares maduros. Al igual que otras sapotáceas, todas las partes del árbol (tronco, ramas, hojas y frutos inmaduros) exudan un abundante látex blanco y pegajoso al ser cortadas.
- **Hojas:** Simples, alternas y de forma elíptica (de 5 a 15 cm de largo). Son el principal atractivo ornamental del árbol: el haz (parte superior) es de un color verde oscuro brillante, mientras que el envés (parte inferior) está cubierto por una densa pubescencia sedosa de un deslumbrante color dorado o cobrizo (*Chrysophyllum* = "hoja de oro").
- **Flores:** Pequeñas, de color blanco amarillento o violáceo, agrupadas en pequeños racimos (fascículos) en las axilas de las hojas.
- **Fruto:** Una baya globosa (5 a 8 cm de diámetro) de cáscara lisa, que puede ser de color verde claro o púrpura oscuro al madurar, dependiendo de la variedad. La pulpa es blanquecina, jugosa,

TAXONOMÍA

Clasificación científica

REINO	Plantae
FILO / DIVISIÓN	Tracheophyta
CLASE	Equisetopsida
ORDEN	Ericales
FAMILIA	Sapotaceae
GÉNERO	Chrysophyllum
ESPECIE	cainito
AUTORIDAD	L.

dulce y mucilaginoso. Cuando el fruto se corta transversalmente, las semillas oscuras forman un patrón de estrella perfecto (razón por la cual en inglés se le conoce como "Star Apple").

Ecología y Distribución

Ampliamente distribuido y cultivado en los trópicos americanos. En Nicaragua es un árbol muy común en patios de casas, fincas y huertos familiares de las zonas cálidas y húmedas.

* **Hábito:** Requiere climas tropicales cálidos y es sensible a sequías muy prolongadas o fríos extremos.

* **Suelos:** Prefiere suelos profundos, fértiles y bien drenados, prosperando excelentemente en terrenos de origen volcánico o aluvial.

Usos Principales

- **Alimenticio:** El fruto se consume fresco como postre. Es importante consumirlo solo cuando está completamente maduro, ya que el látex de la cáscara en frutos inmaduros es extremadamente astringente y pegajoso.
- **Ornamental:** Su denso follaje bicolor (verde y oro) que brilla con el viento lo convierte en un árbol de sombra de primer nivel para paisajismo, parques y avenidas.
- **Medicinal:** En la medicina folclórica mesoamericana, el cocimiento de las hojas se ha utilizado tradicionalmente para tratar la diabetes y el reumatismo. El látex del árbol se ha usado para extraer parásitos o tratar abscesos de la piel.
- **Maderable:** Su madera es dura, pesada y resistente; se utiliza en construcción rural y carpintería, aunque la tala del árbol es poco común debido al gran valor de sus frutos.

Fuentes de Referencia:

* Clasificación Taxonómica y Autoridad: [Tropicos.org - Missouri Botanical Garden](#)

* Datos Ecológicos y Botánicos: [Universidad Nacional Agraria \(UNA\), Nicaragua](#) y [Osa Arboretum](#)

* Estado de Conservación Global: [Lista Roja de Especies Amenazadas de la IUCN](#)

CONSERVACIÓN

Referencia IUCN

LC — PREOCUPACIÓN MENOR

Categoría interpretada según la Lista Roja de la IUCN y utilizada como referencia para esta ficha institucional.

Este documento promueve el conocimiento científico y la educación ambiental dentro del campus, fortaleciendo la conservación del patrimonio botánico universitario.