

Ficha Institucional de Especie Botánica

LC · PREOCUPACIÓN MENOR

Sardinillo (Vainillo)

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth

Registro institucional orientado a la divulgación científica, la educación ambiental y la conservación del patrimonio natural universitario.



DESCRIPCIÓN

Información botánica

Arbusto o árbol pequeño de follaje persistente o caducifolio, nativo de las Américas. Es ampliamente reconocido por sus densos racimos de flores amarillas brillantes y su gran capacidad para atraer polinizadores, siendo una de las especies más versátiles para la restauración de suelos y el paisajismo en zonas secas.

Descripción Botánica

- **Altura y Copa:** Generalmente crece como un arbusto de 3 a 5 metros, aunque puede alcanzar porte de árbol hasta los 10 metros. Su copa es irregular y muy ramificada desde la base.
- **Tronco y Corteza:** Tronco delgado con corteza de color gris claro a pardo, que se vuelve áspera y agrietada con el tiempo.
- **Hojas:** Opuestas y compuestas imparipinnadas (con un folíolo terminal). Los folíolos (generalmente de 5 a 13) son de forma lanceolada con bordes marcadamente aserrados (como una sierra), un rasgo clave para diferenciarlo del Cortez.
- **Flores:** Grandes, vistosas y con forma de trompeta o campana. Son de un color amarillo limón intenso, a menudo con líneas rojizas en la garganta para guiar a los polinizadores. Crecen en racimos terminales muy fragantes.
- **Fruto:** Una cápsula alargada y estrecha (de 10 a 20 cm), similar a una vaina verde que se torna café al madurar. Contiene numerosas semillas planas y aladas que el viento dispersa fácilmente.

TAXONOMÍA

Clasificación científica

REINO Plantae

FILO / DIVISIÓN Tracheophyta

CLASE Equisetopsida

ORDEN Lamiales

FAMILIA Bignoniaceae

GÉNERO Tecoma

ESPECIE stans

AUTORIDAD (L.) Juss. ex Kunth

Ecología y Distribución

Se distribuye naturalmente desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina. En Nicaragua es sumamente común en los departamentos de León, Chinandega y Managua, creciendo espontáneamente en orillas de caminos y terrenos baldíos.

* **Resistencia:** Es una especie extremadamente rústica que tolera sequías prolongadas, altas temperaturas y suelos pobres o perturbados.

* **Interacción Biológica:** Es una de las mejores especies para atraer biodiversidad al campus; sus flores son ricas en néctar y atraen constantemente a colibríes, abejas, mariposas y otros insectos beneficiosos.

Usos Principales

- **Ornamental:** Muy utilizado en jardines y parques por su floración espectacular y casi continua bajo manejo.
- **Medicinal (Dato Clave UNA):** En Nicaragua, el Sardinillo es famoso en la medicina popular. La infusión de sus hojas y raíces se utiliza tradicionalmente como un potente auxiliar en el tratamiento de la diabetes (hipoglucemiante), además de usarse para tratar afecciones gástricas y como diurético.
- **Restauración Ecológica:** Debido a su rápido crecimiento y adaptabilidad, es ideal para proyectos de reforestación de cuencas degradadas y para el control de la erosión en taludes.

Fuentes de Referencia:

- * Clasificación Taxonómica y Autoridad: [Tropicos.org](https://tropicos.org/) - [Missouri Botanical Garden](#)
- * Identidad y Usos Locales: [Universidad Nacional Agraria \(UNA\)](#), [Nicaragua](#)
- * Estado de Conservación Global: [Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN](#)

CONSERVACIÓN

Referencia IUCN

LC — PREOCUPACIÓN MENOR

Categoría interpretada según la Lista Roja de la IUCN y utilizada como referencia para esta ficha institucional.

Este documento promueve el conocimiento científico y la educación ambiental dentro del campus, fortaleciendo la conservación del patrimonio botánico universitario.