

# Модуль числа

## Определение модуля числа

Модуль (или абсолютная величина) действительного числа  $a$ :

а) это само заданное число, если оно больше или равно нулю

$$|a| = a, \text{ если } a \geq 0;$$

б) это противоположное заданному число, если оно меньше нуля

$$|a| = -a, a < 0.$$

## Свойства модуля числа

1)  $|a| \geq 0, a \in R$

Пример:  $|2| \geq 0$

$$|-2| \geq 0$$

2)  $|a| \geq a, a \in R$

Пример:  $2 \geq 0$ , значит,  $2 \geq 2$

$$-2 \leq 0, \text{ значит, } |-2| > -2$$

3)  $|-a| = |a|, a \in R$

Пример:  $|-7| = |7|$

Следствие:  $|a - b| = |b - a|$

Пример:  $|7 - 4| = |4 - 7|$

$$|3| = |-3|$$

4)  $|a^n| = |a|^n, a \in R, n \in Z$

Пример:  $|3^3| = |3|^3$

5)  $|a|^{2n} = a^{2n}, a \in R$

Пример:  $|-7|^2 = (-7)^2 = 49$

6)  $|a * b| = |a| * |b|, a \in R, b \in R$

Пример:  $|7 * 3| = |7| * |3| = 21$

$$|(-7) * 3| = |-7| * |3| = 21$$

$$|(-7) * (-3)| = |-7| * |-3| = 21$$

$$7) \left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}, \quad a \in R, b \neq 0$$

$$\text{Пример: } \left| \frac{6}{3} \right| = \frac{|6|}{|3|} = |2| = 2$$

$$\left| \frac{-6}{3} \right| = \frac{|-6|}{|3|} = |-2| = 2$$

$$8) |a| = |b| \Leftrightarrow a^2 = b^2$$

$$\text{Пример: } |7| = |-7| \Leftrightarrow 7^2 = (-7)^2$$

$$7 = 7 \Leftrightarrow 49 = 49$$

$$9) |a| = |b|$$

$$\begin{cases} a=b \\ a=-b \end{cases}$$

$$10) \sqrt[n]{a^{2n}} = |a|, \quad a \in R, n \in R$$

$$\text{Пример: } \sqrt{4^2} = |4|$$

$$11) |a| + |b| \geq |a + b|, \quad a \in R, b \in R$$

$$\text{Пример 1: } |7| + |3| \geq |7 + 3|$$

$$10 \geq 10$$

$$\text{Пример 2: } |-7| + |3| \geq |-7 + 3|$$

$$10 \geq 4$$

$$\text{Пример 3: } |-7| + |-3| \geq |-7 + (-3)|$$

$$10 \geq 10$$

$$\text{Следствие I: } |a| + |b| \geq |a - b|, \quad a \in R, n \in R$$

$$\text{Пример 1: } |7| + |3| \geq |7 - 3|$$

$$10 \geq 4$$

$$\text{Пример 2: } |-7| + |3| \geq |-7 - 3|$$

$$10 \geq 10$$

$$\text{Пример 3: } |7| + |-3| \geq |7 - (-3)|$$

$$10 \geq 10$$

$$\text{Пример 4: } |-7| + |-3| \geq |-7 - (-3)|$$


$$10 \geq 4$$

$$\text{Следствие II: } |a_1| + |a_2| + \dots + |a_n| \geq |a_1 + a_2 + \dots + a_n|, \quad a \in R, n \geq 2$$

## Геометрический смысл модуля числа

Модуль числа  $a = |a|$  – расстояние от начала отсчета до точки, соответствующей числу  $a$ .

Пример:  $|a| = 3$ , значит, на числовой оси имеются 2 точки, удаленные на расстояние три единицы от 0:  $a_1 = 3$ ,  $a_2 = -3$ .



Расстояние между двумя действительными числами – модуль разности между этими числами.

$$d(a; b) = |a - b| = |b - a|$$

$$\text{Пример: } d(3; 7) = |3 - 7| = |-4| = 4$$

$$d(3; 7) = |7 - 3| = |4| = 4$$

## Виды уравнений, содержащих переменную под знаком модуля

$$* |f(x)| = a;$$

$$* |f(x)| = g(x);$$

$$* |f(x)| = |g(x)|;$$

$$* |f_1(x)| + |f_2(x)| + |f_3(x)| + \dots + |f_n(x)| = g(x).$$

# Методы решения уравнений, содержащих переменную под знаком модуля

## 1. Метод решения уравнений по определению модуля

$$|f(x)| = a:$$

если  $a < 0$ , то решений нет;

если  $a = 0$ , то  $f(x) = 0$ ;

если  $a > 0$ , то  $|f(x)| = a \Rightarrow \begin{cases} f(x) = a \\ f(x) = -a \end{cases}$

Пример 1: решить уравнение  $|4x + 7| = 3$

Решение:  $|4x + 7| = 3$

$$\begin{cases} 4x + 7 = 3 \\ 4x + 7 = -3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4x = -4 \\ 4x = -10 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = -1 \\ x = -2,5 \end{cases}$$

Ответ:  $-2,5; -1$ .

Пример 2: решить уравнение  $|x^2 - 2x| = 3$

Решение:  $|x^2 - 2x| = 3$

$$\begin{cases} x^2 - 2x = 3 & (2.1.) \\ x^2 - 2x = -3 & (2.2.) \end{cases}$$

Решение уравнения 2.1.

$$x^2 - 2x = 3$$

$$x^2 - 2x - 3 = 0$$

$$a + c = b$$

$$1 - 3 = 2, \text{ значит, } x_1 = -1$$

Решение уравнения 2.2.

$$x^2 - 2x = -3$$

$$x^2 - 2x + 3 = 0$$

$$D = 4 - 4 * 3, D = -8$$

$D < 0$ , значит, действительных

$$x_2 = \frac{c}{a}, x_2 = 3$$

корней нет

Ответ: -1; 3.

Пример 3: найти сумму корней уравнения  $|2x^2 - 5x| = 3$

Решение:  $|2x^2 - 5x| = 3$

$$\begin{cases} 2x^2 - 5x = 3 \\ 2x^2 - 5x = -3 \end{cases}$$

Решение уравнения 3.1.

$$2x^2 - 5x = 3$$

$$2x^2 - 5x - 3 = 0$$

$$D = 5^2 + 4 * 3 * 2, D = 49$$

$$x = \frac{-(b) \pm \sqrt{D}}{2a}, x = \frac{5 \pm \sqrt{49}}{4}$$

$$x_1 = \frac{5+7}{4}, x_1 = 3$$

$$x_2 = \frac{5-7}{4}, x_2 = -\frac{1}{2}$$

Решение уравнения 3.2.

$$2x^2 - 5x = -3$$

$$2x^2 - 5x + 3 = 0$$

$$a + b + c = 0, 2 - 5 + 3 = 0$$

значит,  $x_3 = 1$

$$x_4 = \frac{c}{a}, x_4 = \frac{3}{2}$$

Сумма корней:  $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 3 - \frac{1}{2} + 1 + \frac{3}{2} = 5$

Ответ: 5.

Пример 4: решить уравнение  $x^2 - 6|x| + 8 = 0$

Решение:

Случай 1

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ x^2 - 6x + 8 = 0 \end{cases}$$

$$x^2 - 6x + 8 = 0$$

$$\begin{cases} x=2 \\ x=4 \end{cases}$$

Неравенство

$$x \geq 0$$

выполняется при  $x = 2$  и  $x = 4$ ,

значит,  $x = 2$  и  $x = 4$  являются

решениями данной системы.

Случай 2

$$\begin{cases} x < 0 \\ x^2 + 6x + 8 = 0 \end{cases}$$

$$x^2 + 6x + 8 = 0$$

$$\begin{cases} x=-4 \\ x=-2 \end{cases}$$

Неравенство

$$x < 0$$

выполняется при  $x = -2$  и

$x = -4$ , значит,  $x = -2$  и  $x = -4$

являются решениями данной системы.

Ответ: -4; -2; 2; 4.

Пример 5: решить уравнение  $|10 - |7 + |x||| = 5$

Решение:  $|10 - |7 + |x||| = 5$

Случай 1:  $|10 - |7 + |x||| = 5$

$$|7 + |x|| = 5$$

$$7 + |x| = 5 \quad \text{или} \quad 7 + |x| = -5$$

$$|x| \neq -2 \quad |x| \neq -12$$

Невозможно, т.к.  $f(x) < 0$ , значит, решений нет.

Случай 2:  $|10 - |7 + |x||| = -5$

$$|7 + |x|| = 15$$

$$7 + |x| = 15 \quad \text{или} \quad 7 + |x| = -15$$

$$|x| = 8 \quad |x| \neq -22$$

$$\begin{matrix} x=8 \\ x=-8 \end{matrix} \quad \text{Невозможно, т.к. } f(x) < 0, \text{ значит, решений нет.}$$

Ответ:  $-8; 8$ .

Пример 6: Найти произведение наименьшего и наибольшего корней уравнения  $|9 + |5x - |x^2||| = 15$

Решение: По свойству модуля  $|x^2| = x^2$

$$|9 + |5x - |x^2||| = 15$$

$$|9 + |5x - x^2|| = 15 \quad (6.1.)$$

$$|9 + |5x - x^2|| = -15 \quad (6.2.)$$

Решение уравнения 6.1.

$$|5x - x^2| = 6$$

$$5x - x^2 = 6 \quad (6.1.1.)$$

$$5x - x^2 = -6 \quad (6.1.2.)$$

Решение уравнения 6.2.

$|5x - x^2| = -24$  – невозможно, так как  $f(x) < 0$ , решений нет.

6.1.1.

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

$$\begin{cases} x=2 \\ x=3 \end{cases}$$

6.1.2.

$$x^2 - 5x - 6 = 0$$

$$\begin{cases} x=-1 \\ x=6 \end{cases}$$

$$x_{\text{наим}} = -1, x_{\text{наиб}} = 6$$

$$x_{\text{наим}} * x_{\text{наиб}} = -1 * 6 = -6$$

Ответ: -6.

Пример 7: решить уравнение  $|x| - 3|x + 2| = 7$

Решение: данное уравнение равносильно совокупности трех систем

$\begin{cases} x < -2 \\ -x + 3x + 6 = 7 \\ x < -2 \\ 2x = 1 \\ x < -2 \\ x = \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} > -2 \Rightarrow \text{решений нет} \end{cases}$	$\begin{cases} -2 \leq x < 0 \\ -x - 3x - 6 = 7 \\ -2 \leq x < 0 \\ -4x = 13 \\ -2 \leq x < 0 \\ x = -\frac{13}{4} \\ -\frac{13}{4} < -2 \Rightarrow \text{решений нет} \end{cases}$	$\begin{cases} x \geq 0 \\ x - 3x - 6 = 7 \\ x \geq 0 \\ -2x = 13 \\ x \geq 0 \\ x = -6,5 \\ -6,5 < 0 \Rightarrow \text{решений нет} \end{cases}$
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ответ: решений нет.

Пример 8: решить уравнение  $|x^2 + 3x - 4| = |x - 1|$

Решение:

Упрощение левой части  $|x^2 + 3x - 4| = |(x - 1)(x + 4)| = |x - 1||x + 4|$

$$|x - 1||x + 4| = |x - 1|$$

$$|x - 1||x + 4| - |x - 1| = 0$$

$$|x - 1|(|x + 4| - 1) = 0$$

$$|x - 1| = 0$$

или

$$|x + 4| - 1 = 0$$

$$x - 1 = 0$$

$$|x + 4| = 1$$

$$x = 1$$

$$\begin{cases} x+4=1 \\ x+4=-2 \end{cases}$$

$$x = -3, x = -5$$

Ответ: -5; -3; 1.

## 2. Метод решения уравнений: замена данного уравнения равносильным

Способ решения 1: Уравнение вида  $|f(x)| = |g(x)|$  равносильно совокупности уравнений:

$$\begin{cases} f(x) = g(x) \\ f(x) = -g(x) \end{cases}$$

Способ решения 2:

$$|f(x)| = |g(x)|$$

$$f^2(x) = g^2(x)$$

$$|f(x)| - |g(x)| = 0$$

$$(f(x) - g(x))(f(x) + g(x)) = 0$$

Пример 1: решить уравнение  $|x^2 - 2x| = |6 - 3x|$

Решение:

$$\begin{cases} x^2 - 2x = 6 - 3x & (1.1.) \\ x^2 - 2x = -(6 - 3x) & (1.2.) \end{cases}$$

Решение уравнения 1.1.

$$x^2 - 2x = 6 - 3x$$

$$x^2 + x - 6 = 0$$

$$\begin{cases} x = -3 \\ x = 2 \end{cases}$$

Решение уравнения 1.2.

$$x^2 - 2x = -(6 - 3x)$$

$$x^2 - 2x = -6 + 3x$$

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

$$\begin{cases} x = 2 \\ x = 3 \end{cases}$$

Ответ:  $-3; 2; 3$ .

Пример 2: найти сумму корней уравнения  $|x^2 - 5| = |x^2 + 3|$

Решение: уравнение вида  $|f(x)| = |g(x)|$  равносильно уравнению  $f^2(x) = g^2(x)$ . Значит,  $|x^2 - 5| = |x^2 + 3|$

$$(x^2 - 5)^2 = (x^2 + 3)^2$$

$$x^4 - 10x^2 + 25 = x^4 + 6x^2 + 9$$

$$16x^2 = 16$$

$$x_1 = 1; x_2 = -1$$

$$x_1 + x_2 = 1 + (-1) = 0$$

Ответ: 0.



Пример 3: решить уравнение  $|x^2 - 3x - |5x + 2|| = |x^2 - 4x + 2|$

Решение:  $\begin{cases} x^2 - 3x - |5x + 2| = x^2 - 4x + 2 & (3.1.) \\ x^2 - 3x - |5x + 2| = -(x^2 - 4x + 2) & (3.2.) \end{cases}$

Решение уравнения 3.1.

$$x^2 - 3x - |5x + 2| = x^2 - 4x + 2$$

$$|5x + 2| = x - 2$$

Решение уравнения 3.1.1.

$$\begin{cases} 5x + 2 \geq 0 \\ 5x + 2 = x - 2 \\ x - 2 \geq 0 \\ x \geq -0,4 \\ x = -1 \\ x \geq 2 \end{cases}$$

Решений нет

Решение уравнения 3.2.

$$x^2 - 3x - |5x + 2| = -(x^2 - 4x + 2)$$

$$2x^2 - 7x + 2 = |5x + 2|$$

Решение уравнения 3.2.1.

$$\begin{cases} 5x + 2 \geq 0 \\ 5x + 2 = 2x^2 - 7x + 2 \\ 2x^2 - 7x + 2 \geq 0 \\ x \geq -0,4 \\ 2x^2 - 12x = 0 \\ x \leq \frac{7 - \sqrt{33}}{4} \\ x \geq \frac{7 + \sqrt{33}}{4} \\ x \geq -0,4 \\ x(x - 6) = 0 \\ x \leq \frac{7 - \sqrt{33}}{4} \\ x \geq \frac{7 + \sqrt{33}}{4} \end{cases}$$

$$x_1 = 0; x_2 = 6$$

Ответ: 0; 6.

Решение уравнения 3.1.2.

$$\begin{cases} 5x + 2 < 0 \\ 5x + 2 = -(x - 2) \\ x - 2 \geq 0 \\ x < -0,4 \\ x = 0 \\ x \geq 2 \end{cases}$$

Решений нет

Решение уравнения 3.2.2.

$$\begin{cases} 5x + 2 < 0 \\ 5x + 2 = -(2x^2 - 7x + 2) \\ 2x^2 - 7x + 2 \geq 0 \\ x < -0,4 \\ x^2 - x + 2 = 0 \\ 2x^2 - 7x + 2 \geq 0 \\ x^2 - x + 2 = 0 \\ D = (-1)^2 - 4 * 2 * 1 = -7 \\ D < 0, \text{ значит, нет} \\ \text{действительных корней} \\ \text{Решений нет} \end{cases}$$

Способ решения 1:

Уравнение вида  $|f(x)| = g(x)$  равносильно совокупности двух систем

$$\left[ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} f(x) \geq 0 \\ f(x) = g(x) \end{array} \right. \\ \left\{ \begin{array}{l} f(x) < 0 \\ f(x) = -g(x) \end{array} \right. \end{array} \right.$$

Способ решения 2:

Уравнение вида  $|f(x)| = g(x)$  возможно привести к следующей системе

$$\begin{cases} f^2(x) - g^2(x) = 0, \\ g(x) \geq 0 \end{cases};$$

Также можно вычислить корни через уравнение  $f^2(x) - g^2(x) = 0$  и потом их проверить.

Пример : решить уравнение  $|x^2 - 10x + 16| = 4x - 8$ , пользуясь способом 1.

Решение:  $|x^2 - 10x + 16| = 4x - 8$

$$\left[ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} x^2 - 10x + 16 \geq 0 \\ x^2 - 10x + 16 = 4x - 8 \end{array} \right. \quad (\text{система 1}) \\ \left\{ \begin{array}{l} x^2 - 10x + 16 < 0 \\ x^2 - 10x + 16 = -(4x - 8) \end{array} \right. \quad (\text{система 2}) \end{array} \right.$$

Решим систему 1:

$$\begin{cases} x^2 - 10x + 16 \geq 0 \\ x^2 - 10x + 16 = 4x - 8 \\ x^2 - 10x + 16 - 4x + 8 = 0 \\ x^2 - 14x + 24 = 0 \end{cases}$$

$$\left[ \begin{array}{l} x=2 \\ x=12 \end{array} \right.$$

Неравенство  $x^2 - 10x + 16 \geq 0$  выполняется при  $x = 2$  и  $x = 12$ , значит,  $x = 2$  и  $x = 12$  являются решениями данной системы

Решим систему 2:

$$\begin{cases} x^2 - 10x + 16 < 0 \\ x^2 - 10x + 16 = -(4x - 8) \\ x^2 - 10x + 16 + 4x - 8 = 0 \\ x^2 - 6x + 8 = 0 \end{cases}$$

$$\left[ \begin{array}{l} x=4 \\ x=2 \end{array} \right.$$

Неравенство  $x^2 - 10x + 16 < 0$  выполняется при  $x = 4$ , значит,  $x = 4$  является решением данной системы.

Неравенство  $x^2 - 10x + 16 < 0$  не выполняется при  $x = 2$ , значит,  $x = 2$  не является решением данной системы.

Ответ: 2;4;12.

Пример 2: решить уравнение  $|x^2 + 7x - 8| = x^2 - 2x + 10$ , используя способ 2.

Решение:  $(x^2 + 7x - 8)^2 = (x^2 - 2x + 10)^2$

$$18x^3 + 9x^2 - 72x - 36 = 0$$

$$(2x + 1) * (x^2 - 4) = 0$$

$$2x + 1 = 0 \quad \text{или} \quad x^2 - 4 = 0$$

$$x = -\frac{1}{2} \quad \left[ \begin{array}{l} x=2 \\ x=-2 \end{array} \right.$$

Проверка:  $x^2 - 2x + 10 \geq 0$

$$\frac{1}{4} - 2 * \frac{1}{2} + 10 \geq 0 \quad 4 - 2 * 2 + 10 \geq 0 \quad 4 - 2 * (-2) + 10 \geq 0$$

$-\frac{1}{2}$  – является корнем      2 – является корнем      (-2) – является корнем

Ответ: -2;  $-\frac{1}{2}$ ; 2.

#### 4. Решение уравнений вида $|f_1(x)| + |f_2(x)| + \dots + |f_n(x)| = g(x)$


Уравнения вида  $|f_1(x)| + |f_2(x)| + \dots + |f_n(x)| = g(x)$  принято решать по следующему алгоритму:

- 1) на числовой прямой выделить нули подмодульных выражений;
- 2) определить знак каждого из подмодульных выражений на каждом промежутке;
- 3) раскрыть модули на каждом промежутке и решить полученное уравнение;
- 4) выбрать решение, принадлежащее этому промежутку;
- 5) объединить решения.

Пример 1: решить уравнение  $|x - 3| + |x + 1| = 6$

Решение:  $|x - 3| + |x + 1| = 6$

Выражения под модулем обращаются в нуль в точках  $x = 3, x = -1$



Эти числа разбивают координатную прямую на 3 промежутка, значит, для решения уравнения необходимо составить 3 системы.


- I)  $\begin{cases} x < -1 \\ -(x-3) - (x+1) = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x < -1 \\ x = -2 \end{cases}$   
 $-2 < -1$ ,  $-2$  является корнем уравнения
- II)  $\begin{cases} -1 \leq x < 3 \\ -(x-3) + (x+1) = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -1 \leq x < 3 \\ -x+3+x+1=6 \end{cases}$   
 решений нет
- III)  $\begin{cases} x \geq 3 \\ (x-3) + (x+1) = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq 3 \\ x = 4 \end{cases}$   
 $4 \geq 3$ ,  $4$  является корнем уравнения

Ответ:  $-2; 4$ .

Пример 2: Решить уравнение  $|x+5| + 2|x-1| - 4|x+3| = 7$

Решение:  $|x+5| + 2|x-1| - 4|x+3| = 7$

Выражения под модулем обращаются в ноль при  $x = -5$ ,  $x = 1$  и  $x = -3$ .



Эти числа разбивают координатную плоскость на 4 промежутка, значит, для решения уравнения необходимо составить 4 системы.

- I)  $\begin{cases} x < -5 \\ -(x+5) - 2(x-1) + 4(x+3) = 7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x < -5 \\ x = -2 \end{cases}$   
 $-2 > -5$ ,  $-2$  не является корнем уравнения.
- II)  $\begin{cases} -5 \leq x < -3 \\ (x+5) - 2(x-1) + 4(x+3) = 7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -5 \leq x < -3 \\ x = -4 \end{cases}$   
 $-5 \leq -4 < -3$ ,  $-4$  является корнем уравнения.
- III)  $\begin{cases} -3 \leq x < 1 \\ (x+5) - 2(x-1) - 4(x+3) = 7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -3 \leq x < 1 \\ x = -2,4 \end{cases}$   
 $-3 \leq -2,4 < 1$ ,  $-2,4$  является корнем уравнения.
- IV)  $\begin{cases} x \geq 1 \\ (x+5) + 2(x-1) - 4(x+3) = 7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq 1 \\ x = -16 \end{cases}$   
 $-16 < 1$ ,  $-16$  не является корнем уравнения.

$$(-4) \cdot (-2,4) = 9,6$$

Ответ:  $9,6$ .

Пример 3: решить уравнение  $|x^2 - x| + |x - 4| = x^2 - 4$

Решение:  $|x^2 - x| + |x - 4| = x^2 - 4$

Выражения под модулем обращаются в ноль при  $x = 0, x = 1, x = 4$ .

Эти числа разбивают координатную прямую на 4 промежутка, значит, для решения уравнения необходимо составить 4 системы.

- I)  $\begin{cases} x < 0 \\ (x^2 - x) - (x - 4) = x^2 - 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x < 0 \\ x = 4 \end{cases}$   
 $4 > 0$ , решений нет
- II)  $\begin{cases} 0 \leq x < 1 \\ -(x^2 - x) - (x - 4) = x^2 - 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq x < 1 \\ x^2 = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq x < 1 \\ x = \pm 2 \end{cases}$   
 $2 > 1, -2 < 0$ , решений нет
- III)  $\begin{cases} 1 \leq x < 4 \\ (x^2 - x) - (x - 4) = x^2 - 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 \leq x < 4 \\ x = 4 \end{cases}$   
 $4 < 4$ , решений нет
- IV)  $\begin{cases} x \geq 4 \\ (x^2 - x) + (x - 4) = x^2 - 4 \end{cases} \Rightarrow x \geq 4$

Ответ:  $[4; +\infty)$ .

## 5. Решение уравнений с модулем и параметром. Аналитический способ

Пример 1: решить уравнение  $|x - a| = a - 4$

Решение  $|x - a| = a - 4$

Случай 1:

$$a - 4 < 0$$

$$a < 4$$

При  $a < 4$

решений нет

Случай 2:

$$a - 4 = 0$$

$$a = 4$$

$$x - a = 0$$

$$x - 4 = 0$$

$$x = 4$$

Случай 3:

$$a - 4 > 0$$

$$a > 4$$

$$x - a = a - 4 \text{ или } x - a = -(a - 4)$$

$$x = 2a - 4$$

$$x = 4$$

Ответ: при  $a < 4$  корней нет; при  $a = 4$   $x = 4$ ; при  $a > 4$   $x = 2a - 4$  и  $x = 4$ .

Пример 2: решить уравнение  $|x - 3| = 2ax - 6$

Решение:  $|x - 3| = 2ax - 6$

Случай 1:  $x \geq 3$

$$x - 3 = 2ax - 6, x = \frac{3}{2a-1}$$
$$\frac{3}{2a-1} \geq 3, \frac{3-6a+3}{2a-1} \geq 0, \frac{a-1}{a-1/2} \leq 0$$

Случай 2:  $x < 3$

$$-x + 3 = 2ax - 6, x = \frac{9}{2a+1}$$
$$\frac{9}{2a+1} < 3, \frac{9-6a-3}{2a+1} < 0, \frac{a-1}{a+1/2} > 0$$

При  $x \geq 3$   $a \in \left(\frac{1}{2}; 1\right]$ .

При  $x \leq 3$   $a \in \left(-\infty; -\frac{1}{2}\right) \cup (1; +\infty)$ .


	$(-\infty; -\frac{1}{2})$	$-\frac{1}{2}$	$(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2})$	$\frac{1}{2}$	$(\frac{1}{2}; 1)$	1	$(1; +\infty)$
$\frac{3}{2a-1}$	-	-	-	-	+	+	-
$\frac{9}{2a+1}$	+	-	-	-	-	-	+

Ответ: при  $a \in (-\infty; -\frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2}; +\infty)$  уравнение имеет один корень; при  $a \in [-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}]$  уравнение не имеет корней.

## 1. Построение некоторых видов графиков


1)  $y = |x|$

$$y = \begin{cases} x, & \text{при } x \geq 0 \\ -x, & \text{при } x < 0 \end{cases}$$




2)  $y = |x - 3|$

Параллельный перенос  $y = |x|$  на 3 единицы вправо.




3)  $y = |x| - 3$

Параллельный перенос  $y = |x|$  на 3 единицы вниз.



4)  $y = |x - 3| - 3$

Параллельный перенос  $y = |x|$  на 3 единицы вправо и на 3 единицы влево.




5)  $y = 3 - |x|$

1.  $y = -x$

$$y = \begin{cases} x, & \text{при } x < 0 \\ -x, & \text{при } x \geq 0 \end{cases}$$

2. Параллельный перенос  $y = -x$  на 3 единицы вверх




6)  $y = x^2 - 5x + 3$

Квадратичная функция, график – парабола, ветви вверх.

1. Вершина:  $\left(\frac{5}{2}; -\frac{13}{4}\right)$ .

2. Построение по точкам

x	-1	0	1	2	$\frac{5}{2}$	3	4	5	6
y	9	3	-1	-3	$-\frac{13}{4}$	-3	-1	3	9




7)  $y = x^2 - 5|x| + 3$

1. Построить график  $y = x^2 - 5x + 3$ ;




2. Часть графика, находящегося левее оси  $y$ , убрать, оставшуюся часть зеркально отобразить относительно оси  $y$ .




8)  $y = |x^2 - 5x + 3|$

1. Построить график  $y = x^2 - 5x + 3$ ;
2. Часть графика, находящегося ниже оси  $x$ , зеркально отобразить относительно оси  $x$ .




9)  $y = |x^2 - 5|x| + 3|$

1. Построить график  $y = x^2 - 5x + 3$ ;
2. Часть графика, находящегося левее оси  $y$ , убрать, оставшуюся часть зеркально отобразить относительно оси  $y$ ;
3. Часть графика, находящегося ниже оси  $x$ , зеркально отобразить относительно оси  $x$ .




10)  $y = \frac{1}{x}$

Обратная пропорциональность, график – гипербола,  $x \neq 0$  (по условию существования дроби).




11)  $y = \frac{1}{|x|}$

1. Построить график функции  $y = \frac{1}{x}$ ;
2. Часть графика, находящегося ниже оси  $x$ , зеркально отобразить относительно оси  $x$ .




12)  $y = -\frac{1}{|x|}$

1. Построить график функции  $y = -\frac{1}{x}$ ;
2. Часть графика, находящуюся выше оси  $x$ , зеркально отобразить относительно оси  $x$ .




13)  $y = \frac{1}{x+1}$

1. Построить график функции  $y = \frac{1}{x}$ ;
2. Параллельный перенос графика на одну единицу влево.



$$14 \ y = \frac{1}{|x+1|}$$

1. Построить график функции  $y = \frac{1}{x}$ ;
2. Параллельный перенос графика на одну единицу влево.
3. Часть графика, находящегося ниже оси  $x$ , зеркально отобразить относительно оси  $x$ .



## 2. Построение сложных графиков

Пример 1:  $y = |x + 2| + |x - 2|$

Решение:  $x = -2$  и  $x = 2$  разбивают числовую прямую на три промежутка:  $(-\infty; -2) \cup [-2; 2) \cup [2; +\infty)$ .

I)  $y = |x + 2| + |x - 2|$ , при  $x \in (-\infty; -2)$ ,  $x < -2$

$x$	-3	-2
$y$	6	4

$(-2; 4)$  – точка выкола


II)  $y = |x + 2| + |x - 2|$ , при  $x \in [-2; 2)$ ,  $-2 \leq x < 2$

$x$	-2	2
$y$	4	4

$(2; 4)$  – точка выкола

III)  $y = |x + 2| + |x - 2|$ , при  $x \in [2; +\infty)$ ,  $x \geq 2$

x	2	3
y	4	6



Пример 2:  $y = |x - 1| - |x + 2| + |x + 3|$

Решение:  $x = -3$ ,  $x = -2$ ,  $x = 1$  разбивают числовую прямую на четыре промежутка:  $(-\infty; -3) \cup [-3; -2) \cup [-2; 1) \cup [1; +\infty)$ .

I)  $y = |x - 1| - |x + 2| + |x + 3|$ ,  $x \in (-\infty; -3)$ ,  $x < -3$

x	-4	-3
y	4	3

$(-3; 3)$  – точка выкола

II)  $y = |x - 1| - |x + 2| + |x + 3|$ ,  $x \in [-3; -2)$ ,  $-3 \leq x < -2$

x	-3	-2
y	3	4

$(-2; 4)$  – точка выкола


III)  $y = |x - 1| - |x + 2| + |x + 3|$ ,  $x \in [-2; 1)$ ,  $-2 \leq x < 1$

x	-2	1
y	4	1

$(1; 1)$  – точка выкола

IV)  $y = |x - 1| - |x + 2| + |x + 3|$ ,  $x \in [1; +\infty)$ ,  $x \geq 1$

x	1	2
y	1	2



### 3. Решение уравнений

Пример 1: Решить уравнение:  $\frac{1}{|x|} = 2|x| + 1$ .

Решение: в одной координатной плоскости необходимо построить графики:  $y = \frac{1}{|x|}$  и  $y = 2|x| + 1$ .

Из рисунка видно, что графики пересекаются в двух точках  $(-\frac{1}{2}; 2)$  и  $(\frac{1}{2}; 2)$ , значит, уравнение имеет два корня:  $x_1 = -\frac{1}{2}, x_2 = \frac{1}{2}$ .

Ответ:  $-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}$ .





Рисунок 17.

Пример 2: Решить уравнение  $|x^2 - 2|x|| = |x - 1| + |x + 1|$ .

Решение: в одной координатной плоскости необходимо построить графики:  $y = |x^2 - 2|x||$  и  $y = |x - 1| + |x + 1|$ .

Из рисунка видно, что графики пересекаются в двух точках  $(-4; 8)$  и  $(4; 8)$ , значит, уравнение имеет два корня:  $x_1 = -4$  и  $x_2 = 4$ .

Ответ:  $-4; 4$ .



#### 4. Решение уравнений с параметром

Пример 1: Определить число корней уравнения:  $|x + 1| + |x - 4| = a$ , для всех значений  $a$ .


Решение: 1. Необходимо построить график  $y = |x + 1| + |x - 4|$ ;

2.  $y = a$  – уравнение прямой, параллельной оси  $x$  или совпадающей с ней.

Ответ: 1) при  $a < 5$  решений нет;

2) при  $a = 5$  – бесконечно много решений,  $x \in [-1; -4]$ ;

3) при  $a > 5$  два решения.



Пример 2: Определить число корней уравнения  $a = ||x + 2| - 4|$ .

Решение: 1. Необходимо построить график  $y = ||x + 2| - 4|$ ;

2.  $y = a$  – уравнение прямой, параллельной оси  $x$  или совпадающей с ней.

Ответ: 1) при  $a < 0$  решений нет;

2) при  $a = 0$  уравнение имеет два решения:  $x_1 = 2$ ;  $x_2 = -6$

3) при  $0 < a < 4$  уравнение имеет четыре решения;

4) при  $a = 4$  уравнение имеет три решения:  $x_1 = -10$ ,  $x_2 = -2$ ,  $x_3 = 6$ ;

5) при  $a > 4$  уравнение имеет два решения.

