War der Urknall ein Phasenübergang?

War der Urknall ein Phasenübergang?

Stephan Reuvekamp

Stand: November 2026

Stephan Reuvekamp
War der Urknall ein Phasenübergang?

Stand: November 2026

© 2026 Stephan Reuvekamp. Alle Rechte vorbehalten.

ISBN: **[PLATZHALTER – ISBN noch nicht vergeben]**
DOI: **[PLATZHALTER – DOI noch nicht vergeben]**

Satz: LaTeX (KOMA-Script `scrbook`), Schrift DejaVu Serif.
Format: 170 mm × 240 mm.

Die zitierten Messwerte stammen aus den im Literaturverzeichnis genannten Veröffentlichungen. Die Rechnungen sind in den Anhängen dokumentiert.

Kurzfassung

Dieses Buch untersucht, ob sich der Urknall als Phasenübergang eines einzigen Mediums beschreiben lässt. Masse, Strahlung, Photonen, Elektronen und das Gitter werden als Zustände dieses einen Mediums behandelt. Methodisch gilt die Messung zuerst: Jede Aussage wird an veröffentlichten Messwerten geprüft, und das Modell soll erklären, warum die Messung so ausfällt.

Lokal gilt für das Medium $\Delta p = c^2 \Delta \rho$, das Gesetz eines Mediums aus Strahlung. Mit $\mathrm{d}p = -\rho\,\mathrm{d}\Phi$ folgt daraus die Brechzahl $n = \exp(2GM/rc^2)$. Sie ergibt die PPN-Parameter $\beta = \gamma = 1$ und damit die gemessene Lichtablenkung sowie die Periheldrehung des Merkur von $42{,}98''$ pro Jahrhundert. Dasselbe Gesetz gilt im ganzen Medium, auch in seinen dichten Phasen; ein früher angesetztes zweites Gesetz für die dichte Phase ist fallen gelassen. Schwarze Löcher und Sterne erscheinen als zwei Zustände desselben Objekts; der Trichter ist das beobachtbare Universum.

Auf atomarer Ebene werden Orbitale als stehende Wellen im Medium beschrieben: $n - \ell - 1$ radiale Knoten und ℓ Winkelknoten, geprüft an Zeeman-Aufspaltung und Knotenwinkeln. Eine Nahtlinie auf der Kugel zeigt den Unterschied zwischen Zeichnungswinkel und Flächenwinkel: Die umschlossene Fläche hat die Winkelsumme $540°$, auf acht Richtungen verteilt $67{,}5° = 1{,}5 \times 45°$. Daraus folgt die Vorzeichenregel -1 nach $360°$ und $+1$ nach $720°$, das Muster des Spins $\frac{1}{2}$ [F]. Dass das Elektron so aufgebaut ist, ist ein Postulat [P], gestützt durch die Neutroneninterferometrie von 1975. Die Massenverhältnisse der Leptonen sind gemessen und werden Strukturen des Mediums zugeordnet, nicht hergeleitet.

Jede Aussage ist als Postulat [P], Folgerung [F] oder Vorhersage [V] gekennzeichnet. Die Fragen stehen mit ihren Antworten in einem eigenen Kapitel, die Rechnungen in den Anhängen A bis J.

Vorwort

Dieses Buch folgt einer festen Reihenfolge: Messung, Geometrie, Physik. Am Anfang steht jeweils ein veröffentlichter Messwert, etwa ein Winkel, eine Spektrallinie oder eine Bahnverschiebung. Aus der Messung wird ein geometrisches Bild gelesen, zum Beispiel eine Knotenfläche, eine geschlossene Bahn oder ein Winkelverhältnis. Erst danach wird dieses Bild in physikalische Gleichungen übersetzt. Die Formel ist die Übersetzung der Zeichnung, nicht ihr Ersatz.

Diese Arbeitsweise stammt aus der graphischen Statik, in der Kräfte und Gleichgewichte zuerst als Figuren konstruiert und erst danach als Gleichungen geschrieben werden. Aus diesem Hintergrund des Autors erklärt sich, dass viele Abschnitte von einer Zeichnung, einem Kugelmodell oder einer Projektion ausgehen.

Damit erkennbar bleibt, welchen Rang eine Aussage hat, trägt jede Aussage eine von drei Kennzeichnungen: [P] für ein Postulat oder eine Grundannahme des Autors, [F] für eine Folgerung aus den Postulaten oder aus Messungen, [V] für eine Vorhersage, die sich durch Messung prüfen lässt. Die Fragen, die sich beim Prüfen ergeben haben, stehen mit ihren Antworten im Text und gesammelt in Kapitel 11. Die Rechnungen stehen in den Anhängen A bis J. Der folgende Lesehinweis erläutert die Kennzeichnungen im Einzelnen.

Stephan Reuvekamp, November 2026

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung **v**

Vorwort **vii**

Lesehinweis **1**

Zusammenfassung **3**

1 Grundannahmen **5**
1.1 Messung → Geometrie → Physik 6

2 Schwerkraft, Licht und Uhren im Medium **39**
2.1 Schwerkraft als Dichtegefälle 39
2.2 Zähigkeit ohne Reibung 55
2.3 Gezeiten 59
2.4 Lagrange-Punkte 59
2.5 Licht und Uhren 59
2.6 Ladungen als Dichtezonen 75
2.7 Gravitationswellen 78
2.8 Das Druckgesetz und die lokalen Messungen 79
2.9 Medium, Strahlung und Masse 79
2.10 Konzentration, Druck und Dichteumgebung 80
2.11 Dichte, räumliche Ordnung und Lichtausbreitung 82
2.12 Uhren und die gemessene Lichtgeschwindigkeit 85
2.13 Lichtablenkung, Shapiro-Verzögerung und Rotverschiebung . 86
2.13.1 Die Lichtablenkung am Sonnenrand 86
2.13.2 Die Shapiro-Laufzeitverzögerung 87
2.13.3 Die gravitative Rotverschiebung 87
2.14 Materiebewegung und die Periheldrehung Merkurs 88
2.15 Lokale Konzentrationen und der Hintergrund 90
2.16 Strömung, Druckgrenzen und die Heliopause 91
2.16.1 Die Voyager-Messungen 91
2.16.2 Warum die Fläche gerade dort steht 92

3 Schwarze Löcher und Sterne: zwei Zustände desselben Objekts **95**
3.1 Das Kriterium: Umfangsgeschwindigkeit am Äquator 95
3.2 Masse, Volumen und Drehimpuls hängen zusammen 97
3.3 Die Form der Hülle hängt von der Drehung ab 99
3.4 Zusammensetzung 99
3.5 Schwarze Löcher, die wie Sterne aussehen 115

4 Der Kreislauf **119**
4.1 Sterne verlieren Masse 119
4.2 Sterne entstehen durch Verdichtung, nicht durch Anziehung 119
4.3 Schwere Elemente 120
4.4 Entropie 121
4.5 Erkennungszeichen des Umschlags: ein Neutrinoblitz 121
4.6 Wärmestrahlung als Information 121

5 Der Urknall als Phasenübergang **123**
5.1 Ablauf 123
5.2 Masse und der Trichter 124
5.2.1 Der Trichter ist das beobachtbare Universum 128
5.2.2 Volumen des Trichters und Teilchenzahl 128
5.2.3 Jeder Beobachter sitzt im Zentrum seines Trichters . . 130
5.2.4 Dichte, Licht und Uhren im Trichter 131
5.2.5 Rotverschiebung längs der Achse 131
5.2.6 Warum Galaxis und Kosmos die lokalen $43''$ nicht verschieben 132
5.3 Hyperstern und Supernova 133
5.3.1 Die Dauer bis zur Durchsichtigkeit 133
5.4 Die Hintergrundstrahlung 139
5.5 Das Dunkle Zeitalter 140
5.5.1 Die Energiebilanz der Hintergrundstrahlung 140
5.6 Schwarze Löcher und die ersten Galaxien 142
5.7 Leere, Voids und Ausgleich 145
5.8 Phasenübergang und Arbeitsbilanz: die Rechnungen 146
5.9 Phasenübergang, kompakte Objekte und kosmische Entwicklung 146
5.9.1 Ein Gesetz für das ganze Medium 147
5.9.2 Arbeitsbilanz und Existenzschranke 147
5.9.3 Kompakte Objekte ohne Horizont 149
5.9.4 Gravitationswellen als Querwellen des geordneten Mediums 149
5.9.5 Das Photonenbudget der Hintergrundstrahlung 150
5.9.6 Leichte Elemente, Ausdehnung und der Hintergrund . 150

6 Dunkle Energie, Dunkle Materie und Planet 9 **153**
6.1 Dunkle Energie 153
6.2 Dunkle Materie 154
6.3 Kein Planet 9 154
6.3.1 Warum $v^4 = Ga_0M$ gilt 154

7 Atomebene: geschlossene Strömungen, Eigenmoden und Verschränkung **157**
7.1 Modellversuch: hüpfende Öltropfen 164
7.2 Verschränkung 168

7.3 Spin: zwei Drehungen bis zur Ausgangslage 171
7.3.1 Welche Bell-Bedingung sich ändert 171
7.4 Teilchen, Bindung und Spektren: die Rechnungen 175
7.5 Teilchen, Bindung und Spektren 175
7.5.1 Die Elektron-Zone 175
7.5.2 Das Wirkungsquantum 176
7.5.3 Wellenleiter, Coulomb-artiges Spektrum und Wasserstoffknoten 177
7.5.4 Gradientenspannung und die Dichte am Kern 178
7.5.5 Die Coulomb-Kraft 179
7.5.6 Magnetismus als orientierte Zirkulation 180
7.5.7 Teilchengröße, Massenverhältnisse und das Periodensystem 181
7.5.8 Bindung, Fusion, Spaltung und Zerfall 182
7.5.9 Selbstgewählte Größe und Druckstab 183
7.5.10 Die drei Leptonenmassen 183

8 Einordnung: Vorläufer und verwandte Arbeiten 185

9 Prüfbare Vorhersagen 193

10 Transparenz: was geändert wurde 223

Quellen 243

11 Fragen und ihre Antworten 281

Anhänge 337

A Existenzschranke für Zwei-Phasen-Gleichgewichte 339
A.1 Einleitung 340
A.2 Modell 342
A.2.1 Physikalischer Ausgangspunkt 342
A.2.2 Dimensionslose Gleichungen 342
A.2.3 Vakuumpotential 343
A.2.4 Randbedingungen und regulärer Start 343
A.2.5 $\mathbb{Z}_2$-Symmetrie 344
A.3 Analytische Ergebnisse 344
A.3.1 Drucktensor und hydrostatisches Gleichgewicht 344
A.3.2 Arbeitsbilanz 345
A.3.3 Existenzschranke für den positiven Zwei-Phasen-Zweig 345
A.4 Numerisches Verfahren 346
A.4.1 Schießverfahren 346
A.4.2 Qualitätsklassen 347
A.4.3 Verifikation 348
A.5 Ergebnisse 348
A.5.1 Regulärer negativer Zweig 348

A.5.2 Nicht konvergente Trajektorien mit Residuum $R \approx 2{,}28$ 349
A.5.3 Reguläre Zweige auf einem kleinen Parametergitter . . 350
A.5.4 Ausschluss des positiven Zweigs bei starker Kopplung 351
A.5.5 Zwei-Phasen-Lösungen im erlaubten Fenster 351
A.5.6 $\mathbb{Z}_2$-Test 353
A.6 Schwach-relativistische Erweiterung 354
A.6.1 Konform flacher Ansatz 354
A.6.2 Newton-Grenze und ε-Sequenz 355
A.6.3 Positiver Zweig bei starker Kopplung 355
A.7 Starkes Feld: Außenlösung und kritische Lichtbahn 356
A.7.1 Kritische Lichtbahn 357
A.8 Tensorielle Erweiterung des Mediums 359
A.8.1 Die tensorielle Mode ist die Querscherung des Mediums 359
A.8.2 TT-Projektion einer Querscherwelle 360
A.8.3 Kopplung an ein Interferometer 360
A.9 Diskussion und Grenzen 361
A.10 Schluss 363
A.11 Taylor-Koeffizienten am Zentrum 364
A.12 Hinweise zur Reproduzierbarkeit 364
Erklärung zur Nutzung von KI-Werkzeugen 364

B Der $1/r$-Dichtehof aus dem Strahlungsgleichgewicht 367
B.1 Der Hof aus $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ 367
B.1.1 Frühere Fassung mit $p = K\rho^2$ (historische Notiz) 368
B.2 Gleichungen 369
B.3 Ergebnisse: Kern, Magnetismus und Atomwetter 370
B.3.1 Stabiler Gleichgewichtsradius aus Innendruck 370
B.3.2 Rotierender Kern und magnetisches Analogon 373
B.3.3 Wirbelstürme, Unterdruckaugen und Atomwetter . . . 374
B.4 Warum der Hof nicht aus der Strömung folgt 375
B.4.1 Die Bernoulli-Schranke 377
B.4.2 Fernfeld ohne Volumenkraft 377
B.4.3 Zustrom, Drehung und Grenzfläche 378
B.4.4 Das Flussmodell 380
B.4.5 Der Innendruck erzeugt keinen Außenhof 381
B.4.6 Umströmung einer Kugel und zwei Körper im gemeinsamen Strom 382
B.4.7 Druck gegen Trägheit und Fahrtwind 384
B.4.8 Magnetismus und Wirbelschale tragen den Hof nicht . 386
B.4.9 Was einen Überschuss $\propto +1/r$ trägt 386
B.4.10 Frage: Woher kommt der Hof? 387
B.5 Schluss 387

C Wirbelringe, Torusknoten und stehende Wellen 391
C.1 Fragestellung 392
C.2 Gleichungen 392

C.3 Der dünne Wirbelring . . . 393
C.3.1 Kelvin-Geschwindigkeit, Impuls und Energie . . . 393
C.3.2 Kompressibilität des Mediums . . . 394
C.4 Kelvin-Wellen und das Spektrum . . . 394
C.4.1 Dispersion auf dem Ring . . . 394
C.4.2 Widnall-Stabilität . . . 395
C.5 Torusknoten und ihre Schatten . . . 397
C.5.1 Metastabilität . . . 397
C.5.2 Projektionen und Lappenzahl . . . 398
C.5.3 Quantitatives Ähnlichkeitsmaß . . . 398
C.5.4 Was die Abbildung nicht liefert . . . 400
C.6 Stehende Wellen und die Bohr-Energien . . . 400
C.7 Radiale Knoten . . . 404
C.7.1 Atmosphäre der Schleife und überlappende Hüllen . . . 404
C.8 Der Hillsche Kugelwirbel als s-Kandidat . . . 405
C.8.1 Konstruktion . . . 405
C.8.2 Druck- und Dichtefeld im Medium . . . 407
C.8.3 Kompressibilität . . . 408
C.8.4 Ist der Radius quantisiert? . . . 408
C.8.5 Translation und Kern . . . 409
C.8.6 Stabilität . . . 409
C.9 Gegenläufige Ringpaare . . . 411
C.9.1 Dynamik zweier koaxialer Ringe . . . 411
C.9.2 Zusätzliches Druckfeld eines Kerns . . . 411
C.9.3 Konzentrische, gegenläufige Ringe in einer Ebene . . . 412
C.9.4 Bezug zu den radialen Knoten $n-\ell-1$ . . . 412
C.10 Kugelsymmetrie, $2\ell+1$ und rundere Bahnen . . . 414
C.10.1 Rundheit einer einzelnen Schleife . . . 414
C.10.2 Kugelsymmetrische Gesamtdichte und Edelgase . . . 415
C.11 Nahtlinie auf der Kugel: Zeichnungswinkel und Flächenwinkel 416
C.11.1 Drei Nähte: zwei Hyperbeln und eine Sinusnaht . . . 418
C.12 Das Innenleben: ein Pumpkreislauf zwischen Kern und Hülle 418
C.12.1 Begriffe . . . 418
C.12.2 Kern dreht, Medium ruht (Vergleichsfall) . . . 420
C.12.3 Medium dreht, Kern ruht: der Fall des Buchs . . . 421
C.12.4 Von oben gesehen: die Spirale . . . 422
C.12.5 Energie: wohin die Leistung geht . . . 424
C.13 Übersicht . . . 424
C.14 Schluss . . . 427

D Wirbelabstoßung im Medium 431
D.1 Fragestellung . . . 432
D.2 Leitbild . . . 433
D.3 Gleichungen . . . 433
D.4 Linienwirbel . . . 435
D.5 Wirbelringe . . . 436

D.6 Kompressibilität . . . 438
D.7 Nichtkreuzen und der Schatten . . . 438
D.8 (p, q)-Torusknoten . . . 440
D.9 Möbiusband und die Zerlegung $Sl = Wr + Tw$ . . . 440
D.10 Satz vom Igel . . . 442
D.11 Zeitmittel der Schalen-Rosette . . . 443
D.12 Isotopieverschiebung als Test . . . 444
D.13 Druck geht auf die Fläche . . . 445
D.14 Kandidat für Coulomb: getriebene Bjerknes-Kraft . . . 446
D.15 Übersicht . . . 450
D.16 Schluss . . . 453

E Grenzfrequenz durch Wirbelwände 457
E.1 Fragestellung . . . 457
E.2 Grenzfrequenz zwischen Wänden . . . 458
E.2.1 Akustik im Medium . . . 458
E.2.2 Ebene Wände . . . 459
E.2.3 Dispersion und Kugelschale . . . 460
E.3 Von der Grenzfrequenz zur Wasserstoffgleichung . . . 461
E.3.1 Radiale Gleichung . . . 461
E.3.2 Die Bedingung für Wasserstoff . . . 462
E.3.3 Schwellenentwicklung . . . 463
E.4 Das verlangte Wandabstandsprofil . . . 463
E.4.1 Form von $d(r)$ . . . 463
E.4.2 Passt das zu Wirbelschalen? . . . 464
E.5 Knotenlagen und der Fall ohne Grenzfrequenz . . . 466
E.5.1 Kontrollfall ohne Grenzfrequenz . . . 467
E.6 Übersicht . . . 467
E.7 Schluss . . . 469

F Bjerknes-Kräfte im Medium 471
F.1 Fragestellung . . . 471
F.2 Gleichungen . . . 472
F.3 Vorzeichen . . . 473
F.4 Abstandsgesetz . . . 474
F.5 Kippt die Kraft im Nahfeld? . . . 474
F.6 Strahlungsverlust . . . 476
F.7 Anschluss I: das Coulomb-Analog . . . 477
F.8 Anschluss II: das Bindungsanalog . . . 478
F.9 Gleichgewicht der Blase im Hof . . . 478
F.10 Übersicht . . . 479
F.11 Schluss . . . 481

G Massenverhältnisse der geladenen Leptonen 485
G.1 Fragestellung . . . 485
G.2 Masse als Wirbelenergie . . . 486
G.3 Kelvin-Ringe . . . 487

G.4 Torusknoten . . . 488
G.5 Kelvin-Wellen . . . 490
G.6 Zur Koide-Relation . . . 491
G.7 Vergleich . . . 492
G.8 Übersicht . . . 493
G.9 Schluss . . . 496
G.10 Leptonen als Moden des Vakuum-Wellenleiters . . . 497
G.11 Gleichzeitige Drehungen, (p, q)-Moden und Rosetten . . . 498
G.11.1 Zusammensetzung und der Faktor $\sqrt{2}$ . . . 499
G.11.2 Drei Bilder: gleichzeitig, nacheinander, Torus . . . 500
G.11.3 (p, q)-Moden . . . 501
G.11.4 Gleichlauf und Gegenlauf . . . 502
G.11.5 Präzedierende Ellipsen . . . 503
G.11.6 Massenverhältnisse . . . 506

H Die strömungsfreie Zone als Elektron 509
H.1 Fragestellung . . . 510
H.2 Begriffe . . . 510
H.3 Zitterbewegung und Hohlraummode . . . 511
H.3.1 Was gemessen und was eingegeben ist . . . 511
H.3.2 Eigenfrequenzen einer Kugelhöhle . . . 511
H.3.3 Welcher Radius zur gemessenen Frequenz gehört . . . 512
H.4 Die Wirbelwand . . . 513
H.4.1 Druck einer hohlen Wirbelschicht . . . 513
H.4.2 Druckvergleich mit der Vibration . . . 513
H.4.3 Stabilität . . . 514
H.5 Energie, Dichte und Druck . . . 515
H.6 c als Reaktionsgeschwindigkeit . . . 516
H.7 Transurane: Tröpfchen und Knoten . . . 517
H.7.1 Fissilität nach Bohr und Wheeler . . . 517
H.7.2 Was der Knoten tut, wenn der Kern flüssig wird . . . 518
H.7.3 Spitzen und Radioaktivität . . . 520
H.8 Übersicht . . . 520
H.9 Schluss . . . 522

I Rotierendes Medium mit $\Delta p = c^2 \Delta \rho$ 525
I.1 Fragestellung . . . 525
I.2 Zyklostrophische Balance in Zylindergeometrie . . . 526
I.2.1 Geometrie und Vorzeichen . . . 526
I.2.2 Potenzgesetz und Rankine-Profil . . . 526
I.3 Was „effektive Anziehung“ heißen kann . . . 527
I.4 Übersicht der Mechanismen . . . 528
I.5 Was die Rolle der Ladung spielen würde . . . 528
I.6 Schluss . . . 529

J Radialgitter, PPN und Hofmasse 533
J.1 Radialgitter und PPN (γ = 1, β = 1) . . . 533

J.2 Hintergrundkompression und Mach-Effekt 534
J.3 Hofmasse und Merkurperihel 535

Literatur **537**

Register **541**

Lesehinweis

Dieser Entwurf gibt nur die Aussagen des Autors wieder. Jede Präzisierung, Rechnung oder Literaturangabe von Claude steht gesammelt im letzten Abschnitt, damit nichts unbemerkt hinzukommt. Grundsatz des Autors: Es wird nichts erfunden, nur damit es passt. Passt etwas nicht, liegt es an den Überlegungen oder der Wortwahl des Autors, und das wird so benannt.

Jede Aussage trägt eine Kennzeichnung:

P Postulat bzw. Aussage des Autors: Grundlage sind ein Postulat, das dritte Newtonsche Axiom und eine Folgerung (Kapitel 1), Leitgedanke ist, dass alles auch von der Dichte abhängt, aber nicht nur von ihr. Der Autor schließt dabei von beobachtbaren Größen auf ihre Ursache; die Herleitung der übrigen [P]-Aussagen ist in den folgenden Kapiteln aus den Messungen hergeleitet.

F Folgerung: folgt aus den Postulaten oder aus Beobachtungen.

V Vorhersage: lässt sich mit Messungen prüfen.

- Frage: jede Frage steht im Text und in Kapitel 10 zusammen mit ihrer Antwort. Die Messung gilt zuerst; das Modell erklärt, warum sie so ausfällt.

Zusammenfassung

Diese Arbeit untersucht, ob sich der Urknall als Phasenübergang in einem unendlichen, unveränderlichen Raum beschreiben lässt: als Übergang eines extrem massereichen Schwarzen Lochs über ein Quark-Gluon-Plasma in einen Hyperstern, dessen Supernova nach rund 380.000 Jahren mit der Epoche zusammenfällt, die das kosmologische Standardmodell (ΛCDM) als Rekombination deutet. Dieses Modell beschreibt dagegen die Entwicklung aus einem heißen, dichten Anfangszustand in einem sich ausdehnenden Raum und braucht dafür Dunkle Materie und Dunkle Energie, die zusammen etwa 95 % des Energieinhalts ausmachen. Eine Anfangssingularität setzt es nicht voraus: Sie ergibt sich nur, wenn man die klassische Allgemeine Relativitätstheorie bis zum Anfang zurückrechnet, und gilt meist als Grenze der Theorie, nicht als beobachteter Zustand.

Grundlage sind ein Postulat, alles besteht aus einem einzigen Elementarteilchen, und das dritte Newtonsche Axiom, nach dem zwei gleich große Kräfte sich abstoßen (1); Leitgedanke ist, dass alles auch von der Dichte abhängt, aber nicht nur von ihr; Drehung, Druck, Temperatur, Zustrom und Struktur wirken mit. Raum und Zeit sind vier lineare, überall gleiche Dimensionen; der Raum an sich ist leer und flach, und die Zeit läuft nur vorwärts. Eine Dichte hat nur das physikalische Medium, eine Flüssigkeit unter Druck, die den Raum erfüllt. Masse ist verdichtetes Medium. Das Vakuummedium, vom Autor Feldenergie genannt, ist dünn, aber so groß, dass es insgesamt die größte Masse hat; sie wirkt nicht, weil sie gleichmäßig verteilt ist. Schwerkraft ist darin kein Sog, sondern ein Druck im Sinn eines Dichtegefälles; das Medium drückt dabei nicht gegen einen fremden Körper: Im dichteren Medium laufen Licht und Uhren langsamer, und Bahnen biegen sich zur höheren Dichte hin wie Licht in Glas. Licht selbst läuft nur durch die leeren Stellen zwischen den Teilchen des Mediums, entsteht mit den Gravitationswellen und läuft mit ihnen; eine Anziehung gibt es außer dem Magnetismus und dem Verschmelzen von Tropfen nicht. Schwarze Löcher und Sterne sind zwei Zustände desselben Objekts; über den Zustand entscheidet die Umfangsgeschwindigkeit am Äquator; die Schwelle dort, √(GM/R), folgt aus Masse und Radius, die Winkelgeschwindigkeit an der Schwelle aus der mittleren Dichte; wie schnell sich ein Objekt tatsächlich dreht und wann es kollabiert, hängt nach dem Autor zudem von Zustrom, Volumen und Drehimpuls ab (Frage 10, Frage 65). Beide Zustände wechseln in einem Kreislauf, der mit jedem Durchgang Masse verliert.

Die Arbeit leitet die Folgerungen her und prüft sie an Beobachtungen. Die kosmische Hintergrundstrahlung erscheint als um den Faktor 1100 gedehntes Leuchten einer etwa 3000 K heißen Gashülle. Sternentstehung im Schweif des Schwarzen Lochs RBH-1, sternartig erscheinende Schwarze

Löcher (Little Red Dots) und ein Leerraum, von dem sich die Milchstraße entfernt (Dipole Repeller), lassen sich in das Modell einordnen. Zwei Abschätzungen grenzen den Hyperstern ein: Ein Stern ohne Drehung, der seinen Brennstoff an der Eddington-Grenze verbraucht, lebt mindestens etwa 2 bis 3 Millionen Jahre; ein drehender Hyperstern verliert dagegen Masse über den Äquator und kann früher enden (Frage 17). Und selbst wenn der Hyperstern ein Viertel seiner Masse zu Helium verbrennt, liefert die Kernfusion rund 700-mal zu wenig Energie für die Hintergrundstrahlung; deren Wärme muss aus dem Umschlag selbst stammen.

Mit den geprüften Messungen ist die Hypothese nur unter sechs Bedingungen vereinbar. Die Energie der Explosion muss umgewandelt sein, bevor das Gas durchsichtig wird (höchstens etwa $6 \cdot 10^{-5}$ der Strahlungsenergie). Große Dichteunterschiede dürfen erst danach entstehen (Anisotropie 10^{-5}). Der Umschlag muss etwa 1,6 Milliarden Photonen pro Kernteilchen liefern und die gemessenen Anteile von Wasserstoff, Helium und Deuterium erzeugen. Das Dichtegefälle muss auf jede Masse gleich wirken (Äquivalenzprinzip, geprüft auf 10^{-15}). Die Zähigkeit des Mediums darf Bewegung nicht bremsen und Farben nicht trennen. Und seine Wellen müssen sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten (GW170817).

Die Dichte um einen Knoten fällt so ab, dass Lichtablenkung und Uhren die gemessenen Werte zeigen, weil das Medium aus Strahlung besteht und deshalb Delta p = c^2 Delta rho gilt; daraus folgt n = exp(2GM/rc^2) (Frage 1). Die 380 000 Jahre bis zur Durchsichtigkeit folgen aus der gemessenen Hintergrundtemperatur, der Rotverschiebung z_* = 1089,80 und dem Integral Delta t = integral dz/((1+z)H(z)) über die gemessene Ausdehnungsrate (Frage 17). Das Medium trägt Gravitationswellen als Querwellen, weil die geordnete Phase eine Schersteifigkeit gleich der Energiedichte hat; GW170817 und GW170814 messen das (Frage 69). Die Korrelationen verschränkter Teilchen sind Umordnungen derselben Mediumanregung; das Bild ändert die lokale Faktorisierung, nicht die Messwahlunabhängigkeit, und die gemessene CHSH-Grenze ist 2 sqrt(2) (Frage 27). Unterscheidende Vorhersagen sind Sternspuren Schwarzer Löcher ohne Ursprungsgalaxie, Galaxien entlang solcher Spuren mit dem Drehsinn des Schwarzen Lochs, das die Spur zieht, Little Red Dots im Übergang zum Stern, Spuren superschwerer Elemente in isolierten massereichen Sternen und Licht bei jeder Verschmelzung Schwarzer Löcher (V19).

1 Grundannahmen

Die Theorie hat einen Leitgedanken; Grundlage sind das Postulat, das dritte Newtonsche Axiom und die Folgerung des Autors (unten). Die Grundaussagen P1 bis P5 beschreiben den Rahmen.

Leitgedanke [P]. Alles hängt auch von der Dichte ab, aber nicht nur von ihr. In einem unendlichen Universum ist die Zahl der Teilchen bedeutungslos: Wie in Hilberts Hotel, das trotz unendlich vieler Gäste immer noch Platz hat, ändert Hinzufügen oder Wegnehmen nichts an „unendlich“. Physikalisch bedeutsam ist deshalb nicht die Zahl der Teilchen, sondern ihre Dichte, also wie viele Teilchen auf einen Raumbereich kommen.

Nachtrag vom 6. November 2026 [P]: Natürlich hängt alles von der Dichte ab. Das darf aber nicht so klingen, als würde alles nur von der Dichte abhängen; das stimmt nicht.

Was außer der Dichte mitwirkt, hat der Autor selbst genannt [F]: die Drehung, die über Stern oder Schwarzes Loch entscheidet (3.1); Zustrom, Volumen und Drehimpuls für die Schwelle zum Kollaps (5.3); die Temperatur, die die Dichte ändert, und hohe Drücke, die den Unterschied erhöhen (unten); die Struktur, von der neben der Dichte das Mischen und die Lichtgeschwindigkeit abhängen (Frage 75); und der Satz, dass nie eine Kraft allein wirkt (7.1).

Die Grundlage des Autors [P]. Der Autor fasst seine Grundlage in einem Postulat, dem dritten Newtonschen Axiom und einer Folgerung zusammen (Wortlaut vom 4. November 2026; am 6. November 2026 präzisiert: Postulat 1 ist das dritte Newtonsche Axiom, kein Postulat [P]):

- Drittes Newtonsches Axiom (bis 6. November 2026 Postulat 1): Zwei gleich große Kräfte stoßen sich ab.
- Postulat (bis 6. November 2026 Postulat 2): Alles besteht aus einem einzigen Elementarteilchen, das die gleichen Kräfte hat wie seine Geschwister.
- Folgerung 1: Erst wenn sie sich sehr nahe kommen, werden sie flüssig und verschmelzen. Das ist nachgewiesen.

Vorgehen des Autors [P] (Nachtrag vom 6. November 2026): Er schließt von beobachtbaren Größen auf ihre Ursache und postuliert nicht frei; die Postulate fassen solche Schlüsse zusammen. Geprüft wird ein solcher Schluss an Messungen, die nicht in ihn eingegangen sind, und an den Vorhersagen [F]. Beim Faktor 2 der Brechzahl heißt das: Er muss aus Eigenschaften des Mediums folgen, die an anderen Messungen bestimmt sind (Frage 1).

Begriffe vor dem ersten Gebrauch. Vier Wörter tragen das ganze Buch; sie stehen deshalb hier.

- Exkluon: das kleinste Teilchen des Mediums [P]. Aus Exkluonen besteht alles (Postulat oben). Der Name stammt vom Autor; in der Physik ist er nicht belegt (2.1).
- Elektronenwolke: ein Sturm aus Exkluonen, ein Wirbel wie ein Wirbelsturm, mit stillem Auge in der Mitte [P].
- Elektron: dieser Sturm als Ganzes. Er trägt die Ladung e, den Spin ½ und zwei Pole wie ein kleiner Magnet [P]. Wo das Buch das Elektron das Auge des Sturms nennt (2.6, Frage 75), ist dasselbe Gebilde gemeint: Das Auge gehört zum Sturm und kommt ohne ihn nicht vor. Ladung, Spin und magnetisches Moment des Elektrons sind gemessen (Gerlach und Stern, 1922; Fan und Kollegen, 2023) [F].
- Ein Wasserstoffatom hat genau ein Elektron [F]: Es lässt sich genau einmal ionisieren, mit 13,6 eV; danach bleibt nur der Kern (NIST Atomic Spectra Database).

Warum der Sturm nur als Ganzes vorkommt, zeigt ein Magnet [F]. Bricht man einen Stabmagneten durch, entstehen zwei kleinere Magnete mit je zwei Polen, nie ein einzelner Pol. Nach einzelnen Polen wurde gezielt gesucht, gefunden wurde keiner (MoEDAL, 2016; MoEDAL, 2022). In einer Flüssigkeit gilt dasselbe für Wirbel: Eine Wirbellinie kann im Inneren nicht enden (Helmholtz, 1858), und ihre Umlaufmenge bleibt erhalten, solange keine Reibung wirkt (Kelvin, 1868). Teilt sich ein Wirbel in suprafluidem Helium, entstehen zwei ganze Wirbel, keine halben (Bewley und Kollegen, 2008). Dass sich das Elektron ebenso nur als Ganzes zeigt, ist die Lesart des Autors [P].

1.1 Messung → Geometrie → Physik

Die Arbeit folgt einer festen Reihenfolge. Zuerst steht die Messung: Winkel, Spektrallinien, Aufspaltungen, Bahnverschiebungen. Aus der Messung wird ein geometrisches Bild gelesen — Knotenflächen, Knotenlinien, geschlossene Bahnen, Verhältnisse wie $\sqrt{2}$. Erst danach wird das Bild in Physik übersetzt. Die Formel ist die Übersetzung der Zeichnung, nicht ihr Ersatz; das entspricht der graphischen Statik, in der Kräfte und Gleichgewichte zuerst als Figuren gelesen und erst danach als Gleichungen geschrieben werden. Masse, Strahlung, Photonen, Elektronen und Gitter bleiben dabei ein und dasselbe Medium in verschiedenen Anregungsformen; sie werden nirgends als getrennte Stoffe behandelt.

Orbitale sind stehende Wellen in diesem einen Medium. Das Bild ist die schwingende Saite: ein Bauch, zwei Bäuche, drei Bäuche — also der Grundton und seine Obertöne. An der Kugel hat die Schwingung zwei Richtungen.

Nach außen, radial, zählen die kugelschalenförmigen Knoten; ihre Zahl ist $n-\ell-1$ und gehört zum Laguerre-Anteil der Mode. Um die Kugel herum zählen die Winkelknoten; ihre Zahl ist ℓ und gehört zu den Kugelflächenfunktionen. Die Familien s, p, d und f unterscheiden sich genau in dieser Winkelknotenzahl: $\ell = 0, 1, 2, 3$. Mehr Winkelknoten heißt eine andere Obertonfamilie, nicht bloß eine andere Blickrichtung auf dieselbe Schwingung.

Innerhalb einer Familie ist es dieselbe Schwingung, nur gedreht. Dreht man das Orbital d_{xy} um $45°$ um die z-Achse, entsteht genau $d_{x^2-y^2}$. Die vier Orbitale d_{xy}, d_{xz}, d_{yz} und $d_{x^2-y^2}$ sind dasselbe Kleeblatt. Das Orbital d_{z^2} ist die Überlagerung zweier gekippter Kleeblätter, $d_{z^2} \propto (z^2-x^2)+(z^2-y^2)$. Weil es dieselbe Schwingung in verschiedenen Richtungen ist, haben diese fünf d-Orbitale in einem Zentralfeld dieselbe Energie; die Entartung folgt aus der Drehung, nicht aus einer zusätzlichen Annahme.

Was die Familien trennt, misst der Zeeman-Effekt. Im Magnetfeld spaltet eine Linie in $2\ell+1$ Komponenten auf: beim p-Orbital drei, beim d-Orbital fünf, beim f-Orbital sieben. Drehen ändert diese Zahl nie; eine bloße Blickrichtung kann aus drei Linien keine fünf machen [F]. Bei den Energien ist zu unterscheiden. Im Wasserstoff sind s, p und d derselben Schale nahezu entartet; die sichtbaren Unterschiede sind die Feinstruktur und die Lamb-Verschiebung, für den Abstand $2s$–$2p$ rund $4{,}4\,\mu$eV. Bei Atomen mit mehreren Elektronen weichen die Energien derselben Schale dagegen klar voneinander ab. Der Satz, s, p und d hätten immer verschiedene Energien, gilt also nicht; er gilt für die Viel-Elektronen-Atome und nicht für den Wasserstoff in führender Ordnung.

Geometrische Brücke. Die Knotenkegel des Orbitals d_{z^2} stehen unter $54{,}7°$ zur Achse. Dort gilt $\cos^2\theta = 1/3$, also $\tan\theta = \sqrt{2}$. Denselben Winkel schließt die Raumdiagonale eines Würfels mit einer Kante ein, und dasselbe Verhältnis $\sqrt{2}$ steht in der $\sqrt{2}$-Zeichnung des Autors als $c/a = \sqrt{2}$ (halbes Quadrat mit Diagonale). Messung, Würfel und Zeichnung treffen sich in einer Zahl [F].

Skaleninvarianz. Im Wasserstoff haben s, p und d einer Schale dieselbe Energie nur deshalb, weil die Kraft genau wie $1/r^2$ abfällt. Dasselbe reine Gesetz schließt die Kepler-Ellipsen und lässt sie nicht vorwandern. Eine winzige Abweichung vom reinen Gesetz wirkt auf beiden Skalen gleichartig: im Atom spalten Feinstruktur und Lamb-Verschiebung s, p und d leicht auf; beim Merkur wandert das Perihel um $43''$ pro Jahrhundert (Abschnitt 2.14). Beide Effekte sind gemessen [F].

Der Autor zählt sie als P1, P2 und F1. Die Grundannahmen P1 bis P5 unten beschreiben den Rahmen des Modells; ihre Nummern bleiben vorerst, damit die Verweise im Text stimmen.

Abgleich mit Messungen. Zu Folgerung 1 gibt es mehrere Messungen [F]: Atomkerne stoßen sich elektrisch ab und verschmelzen erst, wenn sie sich sehr nahe kommen (Kernfusion, 2.1); Kernmaterie verhält sich wie ein

Flüssigkeitstropfen (Weizsäcker, 1935); und stoßen schwere Kerne mit sehr hoher Energie zusammen, entsteht ein Quark-Gluon-Plasma, das fast reibungsfrei fließt wie eine Flüssigkeit, nicht wie ein Gas (PHENIX und Kollegen, 2005). Zum dritten Newtonschen Axiom [F]: Es ist kein neues Postulat, sondern seit Newton (1687) Grundlage der Mechanik, und es ist gemessen, für die Schwerkraft besonders genau: Aluminium und Eisen üben Schwerkraft im selben Verhältnis aus, wie sie sie erfahren, auf $3{,}9 \cdot 10^{-14}$ genau (Singh und Kollegen, 2023). Gleichnamige Ladungen und gleichnamige Magnetpole stoßen sich mit gleich großen Kräften ab; gleiche Teilchen mit halbzahligem Spin, etwa Elektronen oder Neutronen, meiden einander, und dieser Druck trägt Weiße Zwerge und Neutronensterne; Kernteilchen stoßen sich auf Abständen unter etwa einem Femtometer ab (Jastrow, 1951). Die früher als Gegenbeispiele genannten Fälle widersprechen dem Axiom nicht, denn auch beim Annähern sind Kraft und Gegenkraft gleich groß: gleich gerichtete Ströme (Ampère, 1820) und gleichtaktig pulsierende Kugeln in Wasser (Bjerknes, Frage 8); das gehäufte Eintreffen von Helium-4-Atomen ist keine Kraft, sondern eine Korrelation (Jeltes und Kollegen, 2007) (Frage 62). Zum Postulat [F]: Bisher zeigt keine Messung eine innere Struktur von Quarks und Elektronen. Seltene Zerfälle ziehen dafür eine Grenze: Der Zerfall $B^0 \to \mu^+\mu^-$ stimmt mit dem Standardmodell überein, und solche Messungen reichen bis zu Energien von 100 TeV (LHCb-Kollaboration, 2026), entsprechend etwa $2 \cdot 10^{-21}$ m (Rechnung von Claude), dem Bereich, den

Physiker das Zeptoversum nennen (Lenz, 2026). Eine innere Struktur aus Exkluonen, die solche Zerfälle merklich verändert, muss also kleiner sein. Ein Vorläufer ist Heisenbergs Versuch, alle Teilchen aus einer einzigen Feldgleichung abzuleiten (Dürr, Heisenberg, Mitter, Schlieder und Yamazaki, 1959).

Unterschiedliche Dichte stößt sich ab, gleiche Dichte verschmilzt. Temperatur ändert die Dichte und umgekehrt; hohe Drücke erhöhen den Unterschied. Alles, was existiert, besteht aus einem einzigen Elementarteilchen mit gleicher Ladung. Wären im Raum alle Teilchen gleichmäßig verteilt, hätten alle Teilchen exakt denselben Abstand zum nächsten, und es würde sich nichts bewegen. Eine kleine Schwingung würde aber ausreichen, um ein totales Chaos anzurichten; es würde sofort Panik ausbrechen. Je näher sich Teilchen kommen, desto stärker stoßen sie sich ab. Sie können sich aber auch wie ein Vogelschwarm verhalten und organisieren sich deshalb stellenweise [P]. (Nachtrag vom 5. November 2026, zu Bildern von Feldlinien, Orbitalen, Strömungen um Körper, Laniakea und Öl und Wasser auf der Raumstation.)

Auf der Ebene der Teilchen passt das zum dritten Newtonschen Axiom und zu Folgerung 1 [F]: Gleichnamige Ladungen stoßen sich mit gleich großen Kräften ab, umso stärker, je näher sie sich kommen, und erst sehr nahe verschmelzen sie, wie Kerne bei der Fusion (2.1). Dass alle Teilchen gleich geladen sind, verlangt, dass positive und negative Ladung als Dichtezonen entstehen, wie in 2.6.

Bei Stoffen entscheidet gemessen nicht die Masse pro Volumen, ob sie sich mischen [F]. Alkohol (0,79 g/cm³) und Wasser (1,00 g/cm³) sind verschieden dicht und mischen sich in jedem Verhältnis. Umgekehrt bleibt ein Öltropfen in einem Gemisch aus Alkohol und Wasser, das genau so dicht ist wie er, ein eigener Tropfen (Plateau, 1873; nachgebaut nach Boys). Entscheidend ist die Art der Teilchen: Gleiches löst sich in Gleichem. Meint »Dichte« im Satz des Autors die Struktur des Mediums in den Stoffen, wie nach dem Leitgedanken alles auch von der Dichte abhängt, passt der Satz; als Masse pro Volumen widerspricht er den Messungen. Im Großen passt er zum Dipole Repeller: Die Milchstraße entfernt sich von einem Leerraum und bewegt sich auf dichte Haufen zu (5.7).

Dass Temperatur die Dichte ändert und umgekehrt, ist gemessen [F]: Erwärmte Stoffe dehnen sich aus, und zusammengedrückte Luft wird warm (Joule, 1845). Dass ein stärkerer Druck den Unterschied stärker wirken lässt, zeigt das Video von der Raumstation: Ohne Gewicht sortieren sich Öl und Wasser nicht von selbst; erst die Drehung erzeugt ein Druckgefälle, und dann trennen sie sich nach ihrer Dichte. Die Geschwindigkeit dieser Trennung wächst mit dem Dichteunterschied und mit der Stärke des Gefälles (Stokes, 1851); Zentrifugen trennen deshalb umso schneller, je schneller sie drehen. Für das Trennen zählt also die Masse pro Volumen, für das Mischen die Art der Teilchen.

Eine gleichmäßige Anordnung gleich geladener Teilchen ist gemessen [F]: Gekühlte Ionen in einer Falle ordnen sich zu einem Kristall mit festen Abständen. Kleine Schwingungen zerstören ihn nicht; die Ionen schwingen um ihre Plätze. Erst wenn weniger gekühlt wird, also mehr Energie im System ist, geht der Kristall in eine ungeordnete Wolke über (Diedrich und Kollegen, 1987). Eine kleine Schwingung reicht also nur dann für ein Chaos, wenn die Ordnung instabil ist oder ständig Energie nachkommt (Frage 76).

Dass sich Teilchen, die sich nur abstoßen, stellenweise organisieren, ist gemessen, wenn sie sich selbst antreiben [F]. Selbst angetriebene Kolloidteilchen bilden Haufen und trennen sich bei höherer Dichte in dichte Bereiche und ein dünnes Gas; Rechnungen mit Teilchen, die sich nur abstoßen und sich nicht nach ihren Nachbarn ausrichten, zeigen dasselbe (Buttinoni und Kollegen, 2013). Die Teilchen geraten in einen

Stau, aus dem sie sich mit ihrem eigenen Antrieb nicht schnell genug befreien, ähnlich wie ein Schwarm. Im Modell könnte der Energiefluss (7.1) diesen Antrieb liefern.

Ladungen sind Druckzonen; ein Elektron im Atom ist das Auge eines Wirbelsturms mit der Unterdruckzone, also mit extrem geringer Dichte [P]. (Nachtrag vom 5. November 2026, zu Frage 75.) Damit gilt der erste Satz auch für Ladungen [F]: Kern und Elektron stoßen sich ab, weil ihre Dichte verschieden ist, und verschmelzen deshalb nicht; zusammengeschoben werden sie vom Dichtegefälle der Umgebung, und die Drehung hält das Gleichgewicht, wie im Wirbelsturm, in dem der Druckunterschied zwischen Umgebung und Auge der Drehung die Waage hält (3.4). Dass sich ungleiche

Ladungen nähern, ist dann kein Ziehen, sondern ein Schieben von außen bis zu dem Abstand, an dem die Abstoßung überwiegt. Gleiche Ladungen sind gleich große Kräfte und stoßen sich nach dem dritten Newtonschen Axiom ab, wie gemessen; sehr nahe verschmelzen sie nach Folgerung 1, wie Kernteilchen bei der Fusion (Frage 46). Dazu passt eine Messung, die die klassische Physik nicht erklären konnte [F]: Ein kreisendes Elektron müsste nach Maxwell strahlen und im Wasserstoffatom in etwa $1{,}6 \cdot 10^{-11}$ Sekunden in den Kern stürzen (Rechnung von Claude nach der Larmor-Formel; Larmor, 1897); gemessen sind Atome stabil. Ein Prüfstein bleibt : Im Grundzustand ist die Aufenthaltsdichte des Elektrons am Kern am größten (Schrödinger, 1926), und manche Kerne fangen ein inneres Elektron ein, wobei aus Proton und Elektron ein Neutron wird (Alvarez, 1937). Bei Beryllium-7 hängt die Halbwertszeit dieses Einfangs um 0,9 % davon ab, ob es in einem Metall oder einem Isolator sitzt (Wang und Kollegen, 2006); die Umgebung wirkt also mit, wie es das Dichtegefälle von außen verlangt. Dieses Verschmelzen folgt aus Folgerung 1; nach der Antwort des Autors zu Frage 75 verschmelzen Teilchen erst sehr nahe (Folgerung 1), Frage 75 ist damit beantwortet.

Das Mischen muss dann wie bei der Lichtgeschwindigkeit ebenfalls etwas mit der Dichte und der Struktur zusammenhängen [P]. Das mit der Schwingung muss etwas mit dem Mpemba-Effekt zu tun haben und damit, dass es sich irgendwie immer wieder aufschaukelt [P]. (Antwort des Autors vom 5. November 2026 auf Frage 75 und Frage 76, mit einem Artikel zum Mpemba-Effekt.)

Für das Licht ist das gemessen [F]: Die Brechzahl eines Stoffes hängt von seiner Dichte und von der Polarisierbarkeit seiner Teilchen ab, also von ihrer Struktur (Lorentz-Lorenz-Beziehung; Lorentz, 1880; Lorenz, 1880). Olivenöl schwimmt auf Wasser, ist also weniger dicht, bremst Licht aber stärker: Seine Brechzahl ist 1,47, die von Wasser 1,33 und die von Alkohol 1,36. Für die Lichtgeschwindigkeit zählt also wie für das Mischen nicht die Masse pro Volumen allein. Damit ist der Teil von Frage 75 zu den Stoffen beantwortet; den Teil zu den Ladungen beantwortet der Autor in Frage 75: Ladungen sind Druckzonen, und Kern und Elektron verschmelzen nicht, weil ihre Dichte verschieden ist.

Aufschaukeln ist gemessen, und zwar zusammen mit einem Schwarmverhalten [F]. Kurz nachdem die Millennium Bridge in London eröffnet war, begann sie seitlich zu schwanken: Viele Fußgänger fielen von selbst in den Takt der Brücke und verstärkten das Schwanken, und ab einer kritischen Zahl von Menschen setzten Schwanken und Gleichschritt gemeinsam ein (Strogatz und Kollegen, 2005). Bei gefangenen Ionen ist der Übergang zwischen geordnetem Kristall und chaotischer Wolke beobachtet (Blümel und Kollegen, 1988); er lässt sich über die Leistung des Kühllasers oder die Spannung des schwingenden Fallenfeldes auslösen (Diedrich und Kollegen, 1987). Aufschaukeln braucht also eine Energiequelle, die im Takt nachliefert, und eine Rückkopplung, die viele Teilchen in denselben Takt bringt. Im Modell könnten die Druckwellen des Mediums diese Quelle sein (Frage

76).

Zum Mpemba-Effekt [F]: Bei Wasser ist er umstritten; Burridge und Linden (2016) fanden weder in früheren Arbeiten noch in eigenen, sorgfältigen Versuchen einen Beleg. Eindeutig gemessen ist er in

einem kontrollierten Versuch: Ein Kolloidteilchen in Wasser kühlte bei passend gewählten Bedingungen von einem heißeren Start exponentiell schneller ab (Kumar und Bechhoefer, 2020). Erklärt wird das über Eigenmoden: Das Abklingen setzt sich aus Formen zusammen, die verschieden schnell abklingen; ein heißerer Start kann von der langsamsten Form weniger enthalten und deshalb früher ankommen, und umgekehrt kann ein kalter Körper schneller warm werden (Lu und Raz, 2017). Das passt zu den Eigenmoden in Kapitel 7. Der Effekt beschreibt allerdings ein schnelleres Ordnen, nicht ein Aufschaukeln.

Vorschlag zur Prüfung: Der Mpemba-Effekt könnte zu Frage 72 passen. Ein heißerer Anfangszustand kann schneller zu einer Ordnung finden als ein kälterer; ob das schnelle Verdichten nach der Rekombination so etwas ist, müsste eine Rechnung mit den Eigenmoden des Mediums zeigen.

Sehr viele Fragen lassen sich damit beantworten, dass es, abgesehen vom Magnetismus und der Verbindung von Tröpfchen zur Verringerung der Oberflächenspannung, keine Anziehungskraft gibt [P]. (Nachtrag vom 4. November 2026, zur Durchsicht der Fragen.)

Mehrere gemessene »Anziehungen« lassen sich tatsächlich als Druck von außen beschreiben [F]. Die Casimir-Kraft zwischen zwei Metallplatten entsteht nach dieser Deutung, weil zwischen den Platten weniger Schwingungen des Vakuums Platz haben und der Strahlungsdruck von außen überwiegt (Milonni, Cook und Goggin, 1988; gemessen von Lamoreaux, 1997). Im Taschenmodell der Kernteilchen schließt der Druck des umgebenden Vakuums die Quarks ein (Chodos und Kollegen, 1974). Gleichtaktig pulsierende Kugeln nähern sich in Wasser, weil das Druckfeld der einen Kugel auf das schwingende Volumen der anderen wirkt (Bjerknes, 1906). Neutronensterne hält nicht die Kernkraft zusammen, denn reine Neutronen sind nicht gebunden, sondern die Schwerkraft (Oppenheimer und Volkoff, 1939), im Modell also der Druck der Gravitation. Und das Verschmelzen von Tropfen verkleinert die Oberfläche: Im Tröpfchenmodell der Kerne steigt die Bindungsenergie pro Kernteilchen bis zum Eisen, weil der Anteil der Oberfläche sinkt (Weizsäcker, 1935); deshalb setzen auch gleiche Kerne beim Verschmelzen Energie frei (Frage 46).

Zwei Prüfsteine bleiben . Erstens beschreiben Faraday und Maxwell die Kraft zwischen ungleichen Ladungen als Zug längs der Feldlinien (Maxwell, 1873); das Modell muss diesen Zug als Druckunterschied darstellen (Frage 8). Zweitens gehen elektrische und magnetische Kraft mit der Bewegung ineinander über: Die Anziehung zweier gleich gerichteter Ströme erscheint für einen Beobachter, der mit den Elektronen mitfliegt, als elektrische Kraft (Purcell, 1965). Ist der Magnetismus eine echte Anziehung, die elektrische Kraft aber nicht, muss das Modell erklären, warum dieselbe Wirkung je nach Bewegung des Beobachters als Anziehung oder als Druck erscheint

(Frage 62).

Zwei gegenläufige Kräfte müssen sich ausgleichen. Das geht nur durch Rotation [P]. (Nachtrag des Autors vom 4. November 2026.)

Für Strömungen ist das genau so [F]: Gleichen sich Zustrom und Abstrom an einem Punkt aus, bleiben nach der Mathematik der Strömungen nur zwei Formen übrig, ein Zentrum mit geschlossenen, kreisenden Bahnen oder ein Sattel, an dem die Strömung nach zwei Seiten wegläuft und der nicht stabil ist (Strogatz, 1994). Ein dauerhafter Ausgleich gelingt also nur mit Drehung. Gemessene Beispiele sind die Bahnen von Planeten, Wirbelstürme, in denen Druckunterschied und Drehung sich die Waage halten (3.4), und Elektronenpaare, die sich ein Orbital nur mit entgegengesetztem Spin teilen und deren Drehimpulse sich dann aufheben (Pauli, 1925). Ein Prüfstein (Frage 65) : In der Sonne trägt die Drehung als Ganzes nur etwa ein Fünfzigtausendstel des Gleichgewichts, bei der Erde etwa ein Dreihundertstel

(Rechnung von Claude); überwiegend halten sich dort Druck von innen und Schwerkraft ohne Drehung des Körpers die Waage. Im Modell müsste die nötige Rotation dann in den Wirbeln der Materie selbst stecken, nicht in der Drehung des ganzen Körpers.

Beides: Jeder Himmelskörper hat eine Eigendrehung, die Sonne, die Erde, der Mond, das Sonnensystem, die Milchstraße, aber natürlich auch jedes Atom [P]. (Antwort des Autors vom 4. November 2026 auf Frage 65.)

Das ist gemessen [F]. Die Sonne dreht sich am Äquator in etwa 25 Tagen, die Erde in knapp 24 Stunden, der Mond in 27,3 Tagen, so dass er uns stets dieselbe Seite zeigt; die Planeten umlaufen die Sonne alle im selben Sinn, und die Sonne umrundet das Zentrum der Milchstraße mit etwa 230 km/s. Im Atom hat jedes Elektron, Proton und Neutron einen Eigendrehimpuls, den Spin ½ (Stern und Gerlach, 1922; Uhlenbeck und Goudsmit, 1925). Wo ein Atom insgesamt keinen Drehimpuls hat, etwa Helium, gleichen sich gegenläufig drehende Paare aus (oben). Die Rotation, die das Gleichgewicht der Sonne trägt, steckt im Modell also vor allem in den Wirbeln ihrer Materie; die Drehung des ganzen Körpers kommt hinzu. Ein Prüfstein für die größte Stufe (Frage 65) : Für das beobachtbare Universum als Ganzes ist keine Drehung nachgewiesen; die Hintergrundstrahlung begrenzt die dazugehörige Verformung der Ausdehnung auf weniger als $4{,}7 \cdot 10^{-11}$ der Ausdehnungsrate (Saadeh und Kollegen, 2016). Gemessen dreht sich das Versum (P5) als Ganzes nicht messbar, unter $4{,}7 \cdot 10^{-11}$ der Ausdehnungsrate; ein vom Hyperstern (5.6) geerbter Drehsinn steckt deshalb in den einzelnen Wirbeln, wie ihn die gleiche Drehrichtung früher Galaxien zeigt (V8).

Auch die Verbiegung am Rand der Milchstraßenscheibe dreht sich [F]: Sie läuft in Drehrichtung der Sterne um, einmal in rund 600 Millionen Jahren (Poggio und Kollegen, 2020; Einzelheiten in 6.2).

Das ganze Versum ist so gigantisch groß und hatte schon nach dem Urknall extrem an Rotationsgeschwindigkeit verloren. Das Versum dehnt sich nahezu linear aus, wie eine Supernova-Explosion [P]. (Antwort des Autors

vom 4. November 2026 auf Frage 65.)

Zur Drehung passt das [F]: Weil der Drehimpuls erhalten bleibt, dreht sich ein Körper langsamer, wenn er sich ausdehnt (3.2), und die Hintergrundstrahlung, die nach 5.3 kurz nach dem Urknall des Modells entstand, zeigt schon keine messbare Drehung mehr (oben). Zur Ausdehnung gibt es ein Vorbild: Milne zeigte 1935, dass Teilchen, die von einem Punkt aus mit festen Geschwindigkeiten auseinanderfliegen, genau Hubbles Gesetz ergeben; jeder Abstand wächst gleichmäßig mit der Zeit, und weiter entfernte Teilchen sind im selben Verhältnis schneller (Milne, 1935). So verhalten sich gemessen auch Supernovae: Nach den ersten Tagen fliegen ihre Trümmer gleichmäßig auseinander, und aus den Bewegungen der äußeren Knoten von Cassiopeia A lässt sich das Jahr der Explosion zurückrechnen, um 1671 bis 1680 (Thorstensen, Fesen und van den Bergh, 2001). Auch im Mittel passt »nahezu linear«: Das Produkt aus heutiger Ausdehnungsrate und Alter liegt bei 0,96, fast genau bei 1, dem Wert einer gleichmäßigen Ausdehnung (Avelino und Kirshner, 2016).

Im Einzelnen ist die gemessene Ausdehnung aber nicht gleichmäßig (Frage 66) : Sie wurde zuerst langsamer und wird seit einer Rotverschiebung von etwa 0,5 schneller (Riess und Kollegen, 2004). Mit einer streng gleichmäßigen Ausdehnung passen die Supernovae und die Abstände der Schallwellen im Galaxienmuster zusammen deutlich schlechter als im Standardmodell (Shafer, 2015). Dass sich Abbremsen und Beschleunigen heute fast genau zu 1 ausgleichen, nennen Avelino und Kirshner ein Rätsel unserer Zeit. Im Modell soll die spätere Beschleunigung aus dem Ausgleich der Dichteunterschiede kommen (5.7, 6.1).

Bei der Rekombination hat sich die Dichte im Raum vollständig aufgeteilt, in Raum und Materie. Diese Materieklumpen waren extrem schwer und träge; es benötigte sehr viel Energie über lange Zeiträume, um diese Masse zu beschleunigen. Aber sie wird ständig weiter beschleunigt, deshalb wird sie immer schneller [P]. (Nachtrag vom 4. November 2026, zu Frage 66.)

Dass die Ausdehnung heute immer schneller wird, ist gemessen (Riess und Kollegen, 1998; Perlmutter und Kollegen, 1999) [F]. Die Trägheit der Klumpen passt zur Aussage in 5.6, dass die Schwarzen Löcher unverhältnismäßig träger waren als die Gaswolken. Und solange der Schub anhält, nimmt die Geschwindigkeit zu, auch wenn er nach 6.1 mit dem Ausgleich der Dichteunterschiede schwächer wird.

Gemessen ist vor der Beschleunigung aber eine lange Phase der Abbremsung : Bis vor etwa fünf bis sechs Milliarden Jahren wurde die Ausdehnung langsamer (Riess und Kollegen, 2004). Ein ständiger Schub auf träge Masse ergäbe eine kleine, aber von Anfang an positive Beschleunigung, keine Abbremsung; es braucht also zusätzlich etwas, das anfangs bremst (Frage 66). Vorschlag zur Prüfung: Im Modell käme dafür das Dichtegefälle zwischen den Klumpen in Frage, also die Schwerkraft, die mit dem Auseinanderlaufen schwächer wird, während der Schub bleibt; so wechselt auch im Standardmodell die Abbremsung in Beschleunigung. Beantwortet in Frage 66. Außerdem muss die Aufteilung in Raum und Materie zur gemessenen

Gleichmäßigkeit beim Durchsichtigwerden passen, 1 zu 100.000 (5.5).

Da der Hyperstern 380.000 Jahre lang Masse ausgeworfen hat, könnten diese Gaswolken, die schon weit entfernt waren, die Ausdehnung wieder gebremst haben. Auch diese Gaswolken würden dann zu Sternen zusammengedrückt [P]. (Antwort des Autors vom 4. November 2026 auf Frage 66.)

Das hat ein gemessenes Vorbild im Kleinen [F]: Trifft das Explosionsmaterial einer Supernova auf früher ausgeworfenes Gas, wird es abgebremst, wie bei SN 1987A, deren Trümmer seit Ende der 1990er-Jahre auf den Gasring treffen (5.3). Hat eine Druckwelle etwa so viel Gas aufgesammelt, wie sie selbst mitbringt, geht die freie Ausdehnung in eine gebremste über (Taylor, 1950; Sedov, 1959). Dass Druckwellen von Supernovae Gaswolken zu Sternen zusammendrücken, wird auch für die Entstehung des Sonnensystems angenommen (Cameron und Truran, 1977). So gelesen bremsen die Wolken, bis sie zu Sternen verdichtet sind, und danach überwiegt der Schub. Zeitlich passt dazu, dass die Sternentstehung im Universum etwa 3,5 Milliarden Jahre nach dem Urknall am stärksten war und seither stark abnimmt (Madau und Dickinson, 2014); der Wechsel zur Beschleunigung folgte rund fünf Milliarden Jahre später.

Zwei Prüfsteine bleiben (Frage 66) . Eine Hülle, die der Hyperstern in 380.000 Jahren ausgeworfen hat, reicht höchstens 380.000 Lichtjahre weit (Rechnung von Claude); die gemessene Abbremsung dauerte aber Milliarden Jahre und betrifft Galaxien in Milliarden Lichtjahren Abstand. Die Bremse müsste also mit nach außen wandern. Und heute stecken nur etwa 6 % der normalen Materie in Sternen und ihren Überresten (Fukugita und Peebles, 2004), der große Rest ist noch Gas; werden die Wolken zu Sternen, verschwindet ihre Bremswirkung also nur zu einem kleinen Teil.

Natürlich wird die Grenze mit verschoben; die Wolken sind ja nirgendwo fest. Es könnte sein, dass die Wolken auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden müssen, um zu verschmelzen [P]. (Antwort des Autors vom 4. November 2026 auf Frage 66.)

Damit entfällt der erste Prüfstein oben [F]: Wandert die Hülle mit nach außen, holt das Explosionsmaterial sie nur langsam ein, und die Bremse wirkt entsprechend lange; die Dauer hängt vom

Unterschied der Geschwindigkeiten ab, nicht von der Größe der Hülle. Für das Verschmelzen von Atomkernen ist nahezu Lichtgeschwindigkeit tatsächlich nötig: Am RHIC und am LHC werden Kerne auf mehr als 99,99 % der Lichtgeschwindigkeit gebracht, damit sie beim Zusammenstoß zum Quark-Gluon-Plasma verschmelzen (PHENIX und Kollegen, 2005; Folgerung 1).

Für Gaswolken, die zu Sternen werden, ist dagegen das Gegenteil gemessen : Sterne entstehen in kalten, dichten Wolken von etwa 10 Kelvin (Bergin und Tafalla, 2007), auch ausgelöst durch Zusammenstöße von Wolken (Fukui und Kollegen, 2021), die etwa in W3 mit wenigen Kilometern pro Sekunde aufeinandertreffen (Yamada und Kollegen, 2021; Geschwindigkeitsunterschied gerechnet von Claude). Bei nahezu Lichtgeschwindigkeit

würde das Gas beim Zusammenstoß auf Billionen Grad erhitzt (Rechnung von Claude) und könnte erst nach langem Abkühlen Sterne bilden. Gemeint ist beides (nächster Absatz).

Wieder eine Kombination aus beidem. Die Druckwellen müssen aber deutlich schneller sein als die Gaswolken. Das ist, als ob ein Lkw mit 200 km/h hinten auf eine Schlange Autos auffährt, die nur 50 km/h schnell fahren: Der Lkw schiebt die Autos aufgrund ihrer Trägheit trotzdem zusammen [P]. (Antwort des Autors vom 4. November 2026 auf Frage 66.)

Das Bild hat ein Gegenstück in der Astronomie [F]: Dass eine schnelle Front langsameres Gas vor sich zu einer dichten Schale zusammenschiebt, in der neue Sterne entstehen, erklärt die beobachtete Altersfolge benachbarter Sterngruppen (Elmegreen und Lada, 1977). In Gas, das ein Schwarzes Loch aus seiner Galaxie bläst, wurden neu entstehende Sterne beobachtet (Maiolino und Kollegen, 2017). Weil Gravitationswellen mit Lichtgeschwindigkeit laufen (GW170817), Druckwellen in einem Gas aus Teilchen sogar nur mit höchstens etwa 58 % davon (Frage 7), folgt aus »deutlich schneller« [F]: Die Gaswolken bleiben klar unter der Lichtgeschwindigkeit, im Verhältnis des Beispiels, 50 zu 200, bei einem Viertel der Wellengeschwindigkeit. Nahezu lichtschnell sind dann die Kerne, die in den Druckspitzen verschmelzen, nicht die Wolken selbst. Die Rechnung dazu steht direkt im folgenden Absatz: Stoßfronten von 5 bis 70 km/s lösen den Kollaps aus, schnellere nicht (Boss und Kollegen, 2010); nach der Front trägt das eigene Dichtegefälle der Wolke den Kollaps weiter (Jeans-Masse; Abschnitt zur Sternentstehung). Der Autor hat diese Einordnung am 4. November 2026 bestätigt [P].

Frage des Autors vom 6. November 2026: Kann das Modell quantitativ erklären, warum eine verdichtete Gaswolke weiter kollabiert, nachdem die äußere Druckwelle vorübergezogen ist? Antwort [F]: Ja, im schwachen Feld mit denselben Zahlen wie die Standardphysik. Ist die Front vorbei, drückt das eigene Dichtegefälle der Wolke im Medium das Gas weiter nach innen; mit der Brechzahl $\exp(2GM/(rc^2))$ ergibt es an jeder Stelle genau die Beschleunigung $GM(r)/r^2$ nach innen (Dicke, 1957; Puthoff, 2002; oben). Für eine Wolke von 10 Sonnenmassen und 0,1 Parsec ist $GM/(rc^2)$ nur etwa $5 \cdot 10^{-12}$, ein Unterschied zu Newton also nicht messbar (Rechnung von Claude). Dagegen steht der Gasdruck. Welche Seite gewinnt, sagt das Kriterium von Jeans (1902): Ist die Masse einer Wolke größer als die Jeans-Masse, die mit T^(3/2)/√ρ wächst, fällt sie von selbst weiter zusammen, in der Freifallzeit $\sqrt{(3\pi/(32G\rho))}$. Die Druckwelle wirkt über die Dichte: Eine Stoßfront, hinter der das Gas seine Wärme abstrahlt und kalt bleibt, verdichtet es um das Quadrat der Mach-Zahl (Czekala, Vorlesung Fluids and Shocks). Rechenbeispiel (Rechnung von Claude) für eine kalte Wolke bei 10 K, wie sie gemessen sind (Bergin und Tafalla, 2007): Bei 100 Teilchen pro Kubikzentimeter liegt die Jeans-Masse bei etwa 54 Sonnenmassen, eine Wolke von 10 Sonnenmassen bleibt stabil. Eine Front mit 10 km/s ist bei einer Schallgeschwindigkeit von 0,19 km/s etwa Mach 53 und verdichtet das Gas um etwa das 2800-Fache; die Jeans-Masse sinkt um den Faktor 53

auf etwa eine Sonnenmasse. Die Wolke ist dann zehnmal schwerer als ihre Jeans-Masse und fällt in etwa 60.000 Jahren weiter zusammen, auch nachdem die Front vorübergezogen ist. Dazu passt die Grenze nach oben: Fronten über etwa 70 km/s lösen keinen anhaltenden Kollaps aus (Boss und Kollegen, 2010). Dass das Gas seine Kompressionswärme abstrahlt, passt zum Satz des Autors, dass Licht bei Zusammenstößen entsteht (1). Damit beantwortet das Modell die Frage quantitativ und besteht an dieser Stelle den Vergleich mit dem Standardmodell; dass es dieselben Zahlen liefert, ist der Prüfstein. Die gravitative Instabilität fehlt im Modell nicht, sie hat eine andere Ursache: Was im Standardmodell Anziehung heißt, ist hier das Dichtegefälle des Mediums. Auslöser und Fortsetzung des Kollapses sind zwei Wirkungen desselben Mediums, die Front als Druckwelle im Gas, der weitere Kollaps als Dichtegefälle. Eine Voraussetzung erfüllt das lokale Gesetz $\Delta p = c^2 \Delta \rho$ mit dem Gewicht des Mediums (Anhang B): Die Dichteanomalie jedes Gasteils fällt wie 1/r ab, wie es der Satz von Gauß für einen gleichmäßigen Fluss verlangt (Frage 42); dass sich die Anomalien vieler Gasteile dann addieren, folgt im schwachen Feld von selbst, weil das Medium auf so kleine Änderungen linear antwortet (Frage 42).

P1 Raum und Zeit [P]. Nur etwas mit Dichte kann sich krümmen, dehnen oder fließen. Dichte hat nur das Medium (P2); Raum und Zeit haben keine. Es gibt vier Dimensionen, drei des Raums und eine der Zeit; ihre Anzahl entnimmt das Modell der Beobachtung. Alle vier sind unendlich, immer und überall gleich und linear. Sie krümmen sich nicht, dehnen sich nicht aus und fließen nicht; sie sind nur die Bühne. Uhren können verschieden schnell gehen, die Zeit selbst vergeht überall gleich.

P2 Medium [P]. Wenn alles auch von der Dichte abhängt, muss es etwas geben, das eine Dichte hat: Der Raum ist von einem physikalischen Medium mit realer Masse erfüllt. Seine Grundbestandteile haben ein unveränderliches Eigenvolumen v_0; veränderlich ist nur ihre Packungsdichte. Das sogenannte Vakuum ist dieses Medium: Es steht unter Druck und speichert potenzielle Energie. Es ist eher als Feld zu verstehen denn als Gas.

- Nach dem Postulat des Autors [P] besteht das Medium aus einem einzigen Elementarteilchen. Alle Quarks, Leptonen und Bosonen sind nur Erscheinung, die aus der Wechselwirkung entstehen.

Die Lichtgeschwindigkeit ist die Reaktionsgeschwindigkeit des Mediums, mit der es einen Impuls übertragen kann. Ändert sich die Dichte des Mediums, ändert sich die Lichtgeschwindigkeit [V].

Vorschlag zur Prüfung: Das Medium ist ein vorgespanntes, fast dichtest gepacktes Feld, und freie Neutrinos sind Anregungen dieses Feldes, kein dünnes Gas (Frage 7). Prüfstein: In einem festen, elastischen Stoff laufen Längswellen immer mindestens 1,15-mal schneller als Querwellen. Laufen Licht und Gravitationswellen als Querwellen mit c, sind Längswellen schneller als c (Frage 29; Anhang A). Beantwortet dort.

Die Masse des Vakuums [P]. Die Masse hängt von der Dichte des Mediums ab. Das Vakuum hat zwar die kleinste Dichte, aber unverhältnismäßig mehr

Volumen; deshalb ist seine Gesamtmasse höher als die jedes lokalen Knotens. Die Gesamtmasse des Universums bleibt gleich; nur ihre Verteilung ändert sich lokal. Das Medium ist Masse: Durch Druck wird es unterschiedlich verteilt, in niederviskose und hochviskose Bereiche und das Spektrum dazwischen.

Das Vakuum ist dünn, weil es die geringste Dichte hat; weil es so groß ist, hat es trotzdem die größte Masse [P]. Dass diese Masse nichts anzieht, folgt aus P3: Gleichmäßige Dichte lenkt nichts ab, wirksam ist nur ein Gefälle [F]. In Newtons Theorie ist eine unendlich ausgedehnte, gleichmäßige Masse dagegen

ein bekanntes Problem, das Jeans 1902 nur mit einem Kunstgriff umging. Die Dunkle Energie ist nicht diese Masse, sondern die Energie der Unterschiede (6.1). Dass die Gesamtmasse gleich bleibt, passt zur Laser-Entfernungsmessung zum Mond: Die Stärke der Schwerkraft ändert sich um höchstens etwa 10^{-13} pro Jahr (Hofmann und Müller, 2018) [F].

Eine Präzisierung ist nötig [F]. In einem unendlichen Universum (P5) ist die Gesamtmasse unendlich; „bleibt gleich“ lässt sich dann nicht als Summe prüfen, und „mehr Masse als jeder Knoten“ ist von selbst erfüllt. Prüfbar wird die Aussage, wenn sie sich auf die mittlere Dichte bezieht: Masse geht nirgends verloren und entsteht nirgends neu, sie fließt nur um, was eine Erhaltungsgleichung für die Dichte ausdrückt (Kontinuitätsgleichung). Oder sie bezieht sich auf ein endliches Versum (P5). Die erste Fassung passt zum Leitgedanken, nach dem in einem unendlichen Universum nicht die Zahl der Teilchen zählt, sondern ihre Dichte (Frage 40).

Das Vakuum ist auch unterschiedlich dicht. Ein vollkommenes Vakuum kennen wir nicht; wir können es weder erzeugen noch messen [P]. Das deckt sich mit den Messungen [F]: Selbst das beste Vakuum im Labor enthält noch Hunderte bis Tausende Gasteilchen pro Kubikzentimeter, der Raum zwischen den Galaxien im Mittel etwa ein Atom auf vier Kubikmeter, und jeder Kubikzentimeter des Weltraums enthält rund 411 Photonen der Hintergrundstrahlung. Zusammen mit P2 heißt das: Das Vakuum ist der dünnste Bereich, aber nicht überall gleich dünn [F].

Damit widerspricht das Modell der Quantenfeldtheorie [F]. Sie sagt für das Vakuum eine Energiedichte voraus, die die gemessene Dunkle Energie um rund 120 Zehnerpotenzen übersteigt; schon mit der Energieskala der Kernkräfte gerechnet wäre das Vakuum so dicht wie ein Atomkern. Diese Lücke heißt Vakuumkatastrophe. Im Modell ist nicht das Vakuum dicht, sondern die Abschätzung falsch. Das muss das Modell begründen: Gesucht ist, warum die Schwingungen des Vakuums so viel weniger Masse tragen, als die Quantenfeldtheorie zählt (Frage 32).

Zwei Messungen passen zu diesem Bild [F]. Beim Casimir-Effekt entsteht zwischen zwei Metallplatten im Vakuum eine Kraft, weil zwischen ihnen weniger Schwingungen des Vakuums Platz haben als außen; messbar ist nur dieser Unterschied (Lamoreaux, 1997). Die Kraft lässt sich allerdings auch ohne Vakuumenergie herleiten (Jaffe, 2005). Und Vakuumbeiträge zur Masse von Atomkernen fallen in Fallversuchen genauso wie jede andere Masse

(Polchinski, 2006); im Modell passt das, wenn diese Anteile zum Knoten gehören und nicht zum gleichmäßigen Hintergrund.

Ein Atomkern ist eine Mischung aus beidem: sehr dicht und zugleich dünn [P]. Das deckt sich mit den Messungen [F]. Kernmaterie hat etwa 2×10^{17} kg pro Kubikmeter, aber die Quarks darin sind punktförmig, und nur etwa 1 % der Masse eines Protons stammt von ihren eigenen Massen; rund 99 % sind Energie der Bewegung und des Feldes (Dürr und Kollegen, 2008). Zugleich ist Kernmaterie fast nicht zusammendrückbar: Alle Atomkerne, ob leicht oder schwer, haben nahezu dieselbe Dichte.

Die Schwierigkeit liegt darin, dass man sich nicht vorstellen kann, dass etwas so Dünnes so extrem hart sein kann [P]. Die Physik der Wellen gibt dem eine Zahl [F], wobei zwei Arten von Härte zu unterscheiden sind: die Härte gegen Scherung, die die Querwellen bestimmt, und die Härte gegen Zusammendrücken, die die Längswellen bestimmt. Wie schnell eine Welle läuft, hängt vom Verhältnis der jeweiligen Härte zur Dichte ab. Laufen Licht und Gravitationswellen als Querwellen mit Lichtgeschwindigkeit, muss die Scherhärte im Verhältnis zur Dichte c^2 betragen, rund 9×10^{16} m²/s²; Stahl kommt auf etwa 3×10^{7}. Im

Verhältnis zu seiner Dichte muss das Medium also rund drei Milliarden Mal härter sein als Stahl; seine Scherhärte ist dann genau ρc^2, seine Ruheenergie pro Kubikmeter.

Nach den Antworten des Autors vom 5. November 2026 ist das Medium eine Flüssigkeit unter Druck, und Licht läuft nur im Nichts (1, Frage 69) [F]. Die Härte gilt dann gegen Zusammendrücken, nicht gegen Scherung, denn eine Flüssigkeit hat keine Scherhärte; das passt zum Satz, dass nur Querwellen Energie forttragen, weil sich im Zusammendrücken kaum Energie speichern lässt (unten). Die Rechnung mit der Scherhärte gilt damit nicht mehr für Licht. Wie die Flüssigkeit die Gravitationswellen als Querwellen trägt, ist Frage 69.

Der Raum ist hart, weil er unbiegsam ist. Das Medium im Raum ist biegsam, weil sich die Abstände zwischen den Elementarteilchen verändern (Dichte). Licht reist nur durch leeren Raum, wo die Dichte am niedrigsten oder wenigstens geordnet ist [P]. (Nachtrag vom 5. November 2026.)

Damit gehört die Härte aus dem Satz oben, dass etwas so Dünnes so extrem hart sein kann, zum Raum und nicht zum Medium [F]. »Unbiegsam« heißt flach, und das ist gemessen: Die Krümmung des Raums ist mit null verträglich (Planck-Kollaboration, 2020; 1). Wellen trägt der Raum dagegen nicht, denn er hat keine Dichte (P1); jede Welle, auch eine Gravitationswelle, braucht das biegsame Medium. Was die Allgemeine Relativitätstheorie Krümmung nennt, ist im Modell die veränderliche Dichte des Mediums (2.1, 2.5).

Ein Vorläufer ist Sacharows induzierte Schwerkraft (1967) [F]: Die Schwerkraft erscheint dort als „metrische Elastizität“ des Raums, die wie die Steifigkeit eines Festkörpers aus den Wechselwirkungen von etwas Darunterliegendem entsteht, bei Sacharow aus den Quantenschwankungen des Vakuums. Anders als im Modell bleibt bei Sacharow die gekrümmte

Raumzeit erhalten (P1).

Das Vakuum ist extrem steif [P].

Zur Wortwahl [F]: In der Physik heißt „elastisch“, dass ein Stoff nach einer Verformung verlustfrei zurückfedert, und „unelastisch“, dass dabei Energie verloren geht. Wie stark sich ein Stoff gegen Verformung wehrt, heißt Steifigkeit. Gegen Zusammendrücken ist Wasser etwa 15.000-mal steifer als Luft ($2{,}2 \times 10^9$ Pa gegenüber $1{,}4 \times 10^5$ Pa). Im Verhältnis zur Dichte muss das Vakuum gegen Scherung noch rund 4×10^{10}-mal steifer sein als Wasser gegen Zusammendrücken (siehe oben). Zugleich darf es bei der Weitergabe von Licht keine Energie verlieren (Kapitel 1, Werkzeuge der Theorie). In der Fachsprache muss das Vakuum also sehr steif und zugleich sehr elastisch sein, wie Stahl, der fast verlustfrei zurückfedert. Der Autor hat „steif“ statt „relativ unelastisch“ übernommen.

Licht bewegt sich durch Wasser langsamer als durch Luft [P]. Das stimmt [F]: Gemessen läuft Licht in Wasser rund 25 % langsamer (Foucault, 1850); genau deshalb wird es an der Wasseroberfläche gebrochen. Mit der Steifigkeit hängt das nicht zusammen, denn Wasser ist viel steifer als Luft. Zwischen den Molekülen läuft das Feld nach der Optik zwar mit c, die Gesamtwelle wird aber durch die Überlagerung mit den Wellen der Moleküle langsamer (Feynman, Leighton und Sands, 1963, Band I, Kapitel 31).

Es muss immer zwei Gegenteile geben, die ähnliche Auswirkungen haben, wie bei der Energie [P]. Schall breitet sich in Stahl schneller aus als in Luft, im Vakuum aber gar nicht. Licht breitet sich im Vakuum schneller aus als in Luft, im Stahl aber gar nicht [P].

Die Messwerte bestätigen beides [F]: Schall läuft in Luft mit 343 m/s, in Stahl mit rund 5.900 m/s, im leeren Raum gar nicht. Licht läuft im Vakuum mit c und in Luft um den Faktor 1,0003 langsamer; in Stahl dringt sichtbares Licht nur rund zehn bis zwanzig Nanometer tief ein. Das liegt aber nicht an der Steifigkeit, sondern an den frei beweglichen Elektronen des Metalls, die das Licht zurückwerfen oder schlucken: Diamant ist steifer als Stahl und trotzdem durchsichtig, und Röntgenstrahlen durchdringen Stahl. Im Modell passt die Gegenüberstellung zu P2: Schall ist eine Welle der Materie, Licht eine Welle des Mediums, und jede läuft dort am schnellsten, wo ihr Träger im Verhältnis zu seiner Dichte am steifsten ist.

Beim Gegensatz von steif und elastisch hilft eine Unterscheidung [F]: Es sind zwei verschiedene Paare. Steif oder weich sagt, wie stark sich ein Stoff gegen Verformung wehrt; elastisch oder unelastisch sagt, ob er ohne Verlust zurückfedert. Gummi ist weich und elastisch, Stahl steif und elastisch, Knete weich und unelastisch. Zu den zwei Gegenteilen mit ähnlicher Wirkung passt die Formänderungsarbeit einer Feder: Sie beträgt $\tfrac{1}{2} \cdot k \cdot x^2$ und ist beim Zusammendrücken und beim Auseinanderziehen gleich groß und positiv, so wie die Energie von Über- und Unterdruck (2.6).

Ein gemessenes Beispiel für zwei Gegenteile mit ähnlicher Wirkung ist das Wasser [F]: Es ist bei etwa 4 °C am dichtesten und dehnt sich aus, wenn man es erwärmt, aber auch, wenn man es unter 4 °C abkühlt (Kell, 1975); beim Gefrieren nimmt sein Volumen noch einmal um etwa 9 % zu.

Deshalb friert ein See von oben zu.

Es kommt auf die Viskosität an; alles ist Materie mit unterschiedlicher Dichte. Das härteste Material ist Diamant, aber es ist zäh. Deshalb muss es noch ein Material geben, das genauso hart, aber nicht zäh, sondern flexibel ist [P]. (Nachtrag vom 4. November 2026.)

Zur Wortwahl [F]: In der Werkstoffkunde gilt Diamant als hart und steif, aber spröde; zäh heißt dort, dass ein Stoff vor dem Bruch viel Energie aufnimmt. Gemeint ist hier vermutlich: hart, aber nicht biegsam. Ein solches zweites Material gibt es, aus demselben Kohlenstoff: Graphen ist in seiner Ebene so steif wie Diamant, mit einem Elastizitätsmodul um 1 Terapascal, und zugleich biegsam (Lee und Kollegen, 2008). Selbst Diamant wird biegsam, wenn er klein genug ist: Nadeln von 300 nm lassen sich um bis zu 9 % dehnen und federn zurück, gewöhnlicher Diamant schafft weniger als 1 % (Banerjee und Kollegen, 2018). Das stützt das Bild eines Mediums, das zugleich extrem steif und elastisch ist (P2).

Das ist wie im Knickfall von Euler [P]: Am Anfang ist es sehr schwer, den Stab zu biegen. Je stärker er geknickt ist, desto geringer muss die Kraft sein, um das Gleichgewicht zu halten oder ihn weiter zu biegen. Ebenso beim O-Ring: Knickt der Ring ein, kollabiert das System [P].

Die Mechanik bestätigt das teilweise [F]. Ein Stab bleibt bis zu einer kritischen Last gerade, $F = \pi^2 \cdot E \cdot I / l^2$ (Euler, 1744), und weicht dann seitlich aus. Bei einem idealen elastischen Stab bleibt die nötige Kraft danach fast gleich. Deutlich sinken kann sie bei dünnwandigen Schalen und bei Bauteilen mit kleinen Fehlern: Eine Getränkedose hält zunächst viel aus und knickt dann plötzlich ein (Koiter, 1945). Ein verdrehter elastischer Ring bleibt bis zu einer kritischen Verdrillung flach und springt dann aus der Ebene, bis hin zur Acht wie auf den Fotos des Autors (Michell, 1890; Goriely, 2006). In beiden Fällen schlägt ein steifer Zustand ab einer Schwelle in einen nachgiebigen um. Der Autor setzt dieses Bild für die Strings ein (nächste Absätze): Der verdrillte Stab, der ab einer Schwelle zur Schleife umschlägt, ist der geschlossene String, der Masse trägt.

Genau das meint der Autor [P]: Weil der Stab nicht fest eingespannt ist und der Druck aus allen Richtungen kommt, beginnt er beim seitlichen Ausweichen um zwei Achsen zu rotieren, und es bildet sich eine Schleife. Weil er elastisch ist, will er sich wieder ausstrecken.

Beides ist aus der Mechanik bekannt [F]. Ein verdrillter Stab, der seitlich ausweicht, wandelt die Drehung um die eigene Achse in Schleifen um; die Summe aus Verdrillung und Schleifenbildung bleibt dabei erhalten (Călugăreanu, 1959; White, 1969; Fuller, 1971). So bilden Telefonkabel und DNA-Stränge Schleifen; an einzelnen DNA-Molekülen ist das gemessen (Strick und Kollegen, 1996). Eine Schleife, auf die ringsum Druck wirkt, hält, solange ihre Biegesteifigkeit den Druck trägt; oberhalb von $p = 3 \cdot E \cdot I / R^3$ knickt ein Ring ein (Timoshenko und Gere, 1961). Ein Vorbild aus der Feldtheorie sind stabile verknotete Ringe, die eine Verdrillung tragen und sich mit der Hopf-Faserung beschreiben lassen (Faddeev und Niemi, 1997; 7.3). Was im Modell der Stab ist, sagt der Autor im nächsten Absatz: ein String.

Die Größe der Schleife legt die gemessene Masse fest: Läuft in ihr eine Welle mit c um, ist $R = \hbar/(mc)$, beim Elektron $3{,}86 \cdot 10^{-13}$ m, die reduzierte Compton-Wellenlänge (Frage 49).

Der Stab ist ein String [P]: Es gibt nicht geschlossene und geschlossene Strings. Geschlossene Strings sind stabil und haben Masse. Nicht geschlossene Strings sind Impulsübertragungen.

Die Mechanik stützt diese Unterscheidung [F]: Nur bei einer geschlossenen Schleife bleibt die Summe aus Verdrillung und Schleifenbildung erhalten (siehe oben); bei einem Strang mit freien Enden kann die Verdrillung an den Enden abwandern. Eine geschlossene Schleife kann ihre Verdrillung also dauerhaft speichern, ein Strang mit freien Enden gibt sie weiter. Dass Licht Impuls überträgt, ist gemessen: Photonen stoßen Elektronen an wie Billardkugeln (Compton, 1923).

Zur Wortwahl [F]: „String“ bezeichnet in der Physik meist die Stringtheorie. Dort tragen geschlossene Strings die Schwerkraft, und zwar als masseloses Teilchen, das Graviton (Scherk und Schwarz, 1974); Strings mit freien Enden tragen die übrigen Kräfte (Polchinski, 1995). Die Stringtheorie braucht zehn Dimensionen, was P1 widerspricht, und ist bisher durch keine Messung bestätigt. Verwandt, aber keine Schleifen, sind die Flussschläuche der starken Kraft: Zwischen Quark und Antiquark spannt sich ein Strang mit zwei Enden, dessen Energie mit der Länge wächst; deshalb lassen sich Quarks nicht trennen (2.6), und Masse und Drehimpuls von Mesonen liegen auf geraden Linien (Regge-Trajektorien; Chew und Frautschi, 1962). Welches Bild der Autor meint, sagt er im nächsten Absatz: Das Confinement sind Flussröhrchen, die Schleifen sind die Strings (Frage 49).

Der Autor dazu [P]: Das Confinement sind Flussröhrchen, keine Schleifen. Die Flussröhrchen werden optisch wie Wurmlöcher dargestellt. Eine nicht geschlossene Schleife hat keine Masse, sondern Impulsenergie. Eine geschlossene Schleife ist das, was die Stringtheorie mit den Gravitonen beschreibt.

Dass eine nicht geschlossene Schleife keine Masse, aber Impulsenergie trägt, entspricht dem Photon [F]: Es hat keine messbare Ruhemasse (Obergrenze etwa 10^{-18} eV) und trägt Impuls $p = E/c$ (Compton, 1923). Die Ähnlichkeit der Flussröhrchen mit Wurmlöchern ist zunächst eine des Bildes. Eine theoretische Verbindung gibt es in der Stringtheorie: Ein verschränktes Quark-Antiquark-Paar, verbunden durch einen String, entspricht dort einem Wurmloch in einer zusätzlichen Dimension (Jensen und Karch, 2013); geprüft ist das nicht.

Der Autor dazu [P]: Natürlich hat das Graviton keine Masse. Man stelle es sich wie einen Eisenbahnwagen vor: Viele Wagen ohne Kupplung fahren in dieselbe Richtung im Kreis, jeder wird im Windschatten des vorherigen mitgezogen, und die Reibung ist fast null. Masse ist eine Auswirkung der Wechselwirkung; ein Elementarteilchen kann keine Masse haben. Quarks, Leptonen und Bosonen entstehen durch die Wechselwirkung des Elementarteilchens (P2).

Damit ist die geschlossene Schleife kein einzelnes Graviton, sondern vie-

le masselose Teile auf einer Kreisbahn, und der Widerspruch zur Messung entfällt [F]. Das Graviton ist masselos, wie gemessen (Obergrenze $1{,}3 \times 10^{-23}$ eV; LIGO, Virgo und KAGRA, 2021). Masselose Teile, die auf einer geschlossenen Bahn umlaufen, ergeben zusammen eine Masse, denn ihre Impulse heben sich auf, ihre Energie aber bleibt, und Masse ist Energie geteilt durch c^2 (Einstein, 1905). Gemessen ist das am Proton: Rund 99 % seiner Masse sind Bewegungs- und Feldenergie, getragen unter anderem von masselosen Gluonen (Dürr und Kollegen, 2008). Auch im Standardmodell entsteht die Masse der Elementarteilchen durch eine Wechselwirkung, die mit dem Higgs-Feld; gemessen ist, dass deren Stärke mit der Masse wächst (ATLAS, 2022; CMS, 2022). Vorbilder für Masse aus umlaufenden Wellen sind Wheelers Geonen (2.7) und das Elektron als doppelt umlaufendes Licht nach Williamson und van der Mark (7.3). Die Größe ergibt sich aus der gemessenen Masse, $R = \hbar/(mc)$, beim Elektron $3{,}86 \cdot 10^{-13}$ m (Frage 49). Messbar ist diese Ausdehnung nicht, weil ein Stoß sie nur auflösen kann, wenn er mehr als $2mc^2$ überträgt, und dann entstehen Paare; das freie Elektron erscheint deshalb gemessen punktartig, unter 10^{-18} m (Frage 45; Zitterbewegung in Anhang H).

Nicht geschlossene Strings strömen in eine Richtung, geschlossene im Kreislauf. Der allseitige Druck hält sie auf der Kreisbahn. Unterschiedliche Drücke ergeben unterschiedliche Frequenzen und damit unterschiedliche Elemente; so entsteht das Periodensystem [P].

Dass Spannung oder Druck die Frequenz bestimmt, ist aus der Mechanik bekannt [F]: Eine Saite schwingt umso höher, je stärker sie gespannt ist. Für die Elemente ist gemessen, dass jedes seine eigene Frequenz hat: Die Wurzel der Frequenz seiner Röntgenstrahlung wächst gleichmäßig mit der Ordnungszahl (Moseley, 1913). Im Standardmodell ist die Ordnungszahl die Zahl der Protonen im Kern. Daraus ergeben sich drei Prüfsteine (Frage 51) : Die Elemente bilden ganzzahlige Stufen ohne Zwischenstufen; die Perioden des Periodensystems haben 2, 8, 8, 18, 18, 32 und 32 Elemente, nach der Regel $2n^2$ für die Schalen; und Isotope desselben Elements haben verschiedene Massen, aber fast dieselben Frequenzen und dieselbe Chemie.

Der Autor hatte Wasserstoff und Deuterium früher als verschiedene Schleifenformen gezeichnet, hält das aber inzwischen für falsch. Die Schleife kann nur in Stufen umschlagen; möglicherweise ist jede Atomschale eine zusätzliche Schleife [P].

Beides hat Entsprechungen in Mechanik und Messung [F]. Ein Stab knickt nur in bestimmten Formen aus, mit einer, zwei oder drei Ausbuchtungen, und die dafür nötige Last wächst mit dem Quadrat ihrer Zahl, $F = n^2 \cdot \pi^2 \cdot E \cdot I / l^2$ (Euler, 1744); ein Ring unter Außendruck knickt zuerst zum Oval und bei höherem Druck zu Formen mit drei, vier und mehr Ausbuchtungen (Timoshenko und Gere, 1961). Atome nehmen Energie ebenfalls nur in Stufen auf, sichtbar als einzelne Spektrallinien. Dass die Zeichnung für Deuterium so nicht stimmt, bestätigt die Messung: Die Spektrallinien von Deuterium liegen nur rund 0,03 % neben denen des Wasserstoffs; an dieser

kleinen Verschiebung wurde Deuterium entdeckt (Urey, Brickwedde und Murphy, 1932). Die Hülle ist bei Isotopen also fast gleich, der Unterschied sitzt im Kern. Soll jede Schale eine zusätzliche Schleife sein, muss das Modell erklären, warum die Schalen 2, 8, 18 und 32 Elektronen aufnehmen, nach der Regel $2n^2$ (Frage 51).

Daraus folgt ein bewusster Bruch mit der Relativitätstheorie [F]. In jedem festen, elastischen Stoff laufen Längswellen mindestens 1,15-mal schneller als Querwellen. Laufen die Querwellen mit c, laufen die Längswellen also schneller als Licht. Nach Zel'dovich (1961) erlaubt die Relativitätstheorie aber höchstens eine Härte gegen Zusammendrücken, bei der Schall gerade mit c läuft. Das Modell muss diese Grenze für Längswellen überschreiten. Das passt zur absoluten Gleichzeitigkeit und zum ausgezeichneten Ruhesystem (P1, P4), heißt aber, dass die Relativitätstheorie im Modell nur für Licht und Querwellen gilt (Frage 29).

Dass nur Querwellen Energie forttragen, folgt im Modell aus der Härte [P]: Die Energie kommt von hinten, wird nach vorne abgebremst und muss zwingend zur Seite ausweichen. Das entspricht einem bekannten Ergebnis [F]: In einem Medium, das sich kaum zusammendrücken lässt, laufen Längswellen sehr schnell, tragen aber fast keine Energie, weil sich im Zusammendrücken kaum Energie speichern lässt; die Energie geht in Querwellen. George Green nutzte das 1838, um zu erklären, warum Licht nur quer schwingt. Gemessen ist dazu: Die Bahn des Doppelpulsars PSR B1913+16 schrumpft auf 0,2 % genau so, wie es reine Querwellen verlangen, und die Messung von GW170814 bevorzugt reine Querschwingung (2.7). Ein Anteil von Längswellen muss also klein sein, unter etwa 0,2 % der abgestrahlten Energie (V17, Frage 29). Ein so hartes Medium bildet die Dichteunterschiede, aus denen das Modell die Schwerkraft herleitet, nach dem lokalen Gesetz $\Delta p = c^2 \Delta \rho$ (Anhang B): Ein Dichtegefälle verlangt dann sehr große Druckunterschiede, die das Medium tragen muss; dazu passt, dass es nach P2 unter Druck steht.

P3 Schwerkraft ist ein Dichtegefälle [P]. Es gibt keine Anziehung, und das Medium kann nicht gegen Materie drücken. Masse und Medium sind dasselbe: Materie ist verdichtetes Medium. Schwerkraft ist eine reine Dichtefluktuation des Mediums [P]. Wo das Medium dichter ist, laufen Licht, Uhren und alle Vorgänge langsamer, und Bewegung biegt sich zur höheren Dichte hin, auf dem Weg des geringsten Widerstands (2.1). Ein Schwarzes Loch zieht nichts an; es ist ein Bereich höchster Dichte, den seine Drehung im Gleichgewicht hält (3.1).

- Wirksam sind nur Unterschiede: Gleichmäßige Dichte lenkt nichts ab, erst ein Dichtegefälle.
- Anders als Auftrieb wirkt das Gefälle auf jede Masse gleich, denn im Vakuum fallen alle Körper gleich schnell. Das folgt, weil Masse und Medium dasselbe sind (2.1) [F].

P4 Mitführung [P]. Das Medium führt Galaxien, Sonnensysteme und Planeten mit: Jeder Körper trägt seine Verdichtung des Mediums mit sich,

und alle bewegen sich mit dem Medium ihrer Umgebung. Deshalb ist kein „Wind“ des Mediums messbar. Weil die Zeit überall gleich vergeht (P1), gibt es dennoch ein ausgezeichnetes Ruhesystem; ein Kandidat ist das System, in dem die Hintergrundstrahlung ringsum gleich warm ist. Die Sonne bewegt sich darin mit etwa 370 km/s [F].

Zwei Lesarten von P4 führen zu verschiedenen Vorhersagen . In der ersten bewegen sich Körper und Medium gemeinsam; so dachte Stokes (1845), bei dem allerdings die Erde den Äther mitschleppte. Dann müsste das Medium an der Erde mit ihr ruhen. Gemessen sind aber die jährliche Aberration des Sternlichts von bis zu 20,5 Bogensekunden und die nur teilweise Mitnahme von Licht in strömendem Wasser (Fizeau, 1851; Frage 5). In der zweiten ruht das Medium, und ein Körper ist ein Knoten, der wie eine Welle durch das Medium läuft, ohne es mitzunehmen. Weil Maßstäbe und Uhren selbst aus dem Medium bestehen, verkürzen sie sich in Bewegungsrichtung und gehen langsamer, sodass keine Messung im Labor einen Wind zeigt; das ist der Weg von FitzGerald (1889) und Lorentz (1895), dargestellt bei Brown (2001). Diese Lesart ist mit Aberration und Fizeau-Versuch vereinbar und passt zum ausgezeichneten Ruhesystem der Hintergrundstrahlung oben und zum Gegenwind in 2.2, der bei gleichförmiger Bewegung keine Kraft kostet. Für Anregungen in einer Flüssigkeit ist sie durchgerechnet: In supraflüssigem Helium-3 folgen sie bei kleinen Energien einer eigenen Lorentz-Symmetrie und einer eigenen Geometrie von Raum und Zeit (Volovik, 2003). Der Autor meint eine Mischung aus beiden (nächster Absatz). (Hinweis aus einer Prüfung durch Gemini.)

Es ist eine Mischung aus beiden: Jeder Körper strömt mit dem Medium. Und zusätzlich: Wer in einem geschlossenen System ist, kann keinen Ätherwind messen; man müsste ein Fenster öffnen, aber es gibt

keine Fenster. Die Voyager-Sonden haben den Ätherwind gemessen; die NASA nennt es Firewall [P]. (Antwort des Autors vom 4. November 2026 auf Frage 5.)

Beide Teile greifen ineinander [F]: Das Mitströmen beschreibt, wie die Körper mit dem Medium strömen; die Verkürzung von Maßstäben und Uhren aus der zweiten Lesart erklärt, warum im Inneren kein Wind messbar ist. Am Rand des Sonnensystems haben die Voyager-Sonden den Übergang vom Sonnenwind zum Gas zwischen den Sternen durchflogen, Voyager 1 im Jahr 2012 in 121,6 Astronomischen Einheiten, Voyager 2 im Jahr 2018 in 119; jenseits der Grenze ist das Plasma 30.000 bis 50.000 Kelvin heiß, wärmer als erwartet (Richardson und Kollegen, 2019). »Feuerwand« ist allerdings eine Bezeichnung von Medien, nicht der NASA. Den Wind selbst misst die Sonde IBEX an einströmendem neutralem Helium: Das Gas zwischen den Sternen strömt mit etwa 25 km/s an der Sonne vorbei (McComas und Kollegen, 2015), und vor der Heliosphäre bildet es eine Bugwelle, keinen Stoß (McComas und Kollegen, 2012). Das ist der Gegenwind aus 2.2 im Großen, wie bei der Bugwelle von RBH-1 (5.6).

Ein Prüfstein bleibt : Gemessen ist dort der Wind von Gas und Plasma, also von Materie. Ob auch das Medium, das das Licht trägt, an dieser Gren-

ze seine Bewegung wechselt, zeigt die Messung nicht (Frage 5). Der Autor hat darauf geantwortet (unten).

Vorschlag zur Prüfung: Gilt Fizeaus Gesetz auch für das Medium selbst, nimmt es Licht wegen seiner Brechzahl nahe 1 praktisch nicht mit: Der Anteil $1 - 1/n^2$ beträgt mit $n = 1 + 2GM/(rc^2)$ an der Erdoberfläche etwa $3 \cdot 10^{-9}$, an der Sonnenoberfläche etwa 10^{-5} (Rechnung von Claude). Dann vertragen sich Mitströmen, Aberration und Nullresultat. Ob das Gesetz für das Medium gilt, ist eine Annahme.

Materie ist relativ! Das Vakuum ist auch Materie, aber seine Dichte ist sehr gering. Licht wird von Teilchen abgelenkt oder absorbiert. Licht kann sich nur da ausbreiten, wo ausreichend leerer Raum übrig ist oder die Gitterstruktur so geordnet ist, dass das Licht relativ ungehindert durchkommt [P]. (Antwort des Autors vom 4. November 2026 auf Frage 5.)

Vakuum = materielles Gitter, Potenzial ∞ geladen. Masse = eine lokale, stationäre »Verspannung« oder Potenzialsenke im Gitter. Energie = die Veränderung der Geometrie des Gitters. Mikrokosmos und Makrokosmos: alles das gleiche [P]. (Notizbuch des Autors, Fotos vom 5. November 2026.)

Die Sätze fügen sich in das bisherige Bild [F]. Masse als stationäre Verspannung entspricht der Dichteanomalie aus 2.1. Ist Energie die Veränderung der Geometrie, dann ist Masse die gespeicherte Energie einer Verspannung, die sich nicht verändert, wie es $E = mc^2$ verlangt (Einstein, 1905). Ein unendlich geladenes Potenzial passt zu P3, solange es gleichmäßig ist: Wirksam ist nur ein Gefälle. Gemessen wirkt auf die Ausdehnung des Weltalls auch nur eine sehr kleine Energiedichte des Vakuums, viele Zehnerpotenzen unter den Schätzungen der Feldtheorie (Weinberg, 1989; 6.1).

Zwei Lesarten führen beim Gitter zu verschiedenen Vorhersagen (Frage 69) . Bisher beschreibt der Entwurf ein Medium, das strömt, Wirbel bildet und fast reibungsfrei ist (1, 2.2); im Notizbuch steht dazu »Superfluid«. Ein festes Gitter trägt dagegen Querwellen, und Licht ist eine Querwelle; das passt zum Vorschlag eines vorgespannten, fast dichtest gepackten Feldes (oben) und dessen Prüfstein aus Längsund Querwellen. Ein Gitter hat aber Vorzugsrichtungen, und die Lichtgeschwindigkeit hängt gemessen auf etwa 10^{-18} genau nicht von der Richtung ab (Nagel und Kollegen, 2015). Ob das Vakuum ein festes Gitter, eine Flüssigkeit oder beides zugleich ist, entscheidet, welche Wellen es tragen kann.

Das Vakuum (der Raum oder das Gitter) ist leer und flach. In diesem Raum ist eine Flüssigkeit mit unterschiedlichen Dichten. Aber alles steht unter Druck. Das Medium wurde vor dem Urknall sehr stark verdichtet, bis es flüssig geworden ist. Und seit dem Urknall dehnt sich die Flüssigkeit wieder aus [P]. (Antwort des Autors vom 5. November 2026 auf Frage 69.)

Damit sind zwei Dinge zu trennen [F]: der Raum, auch Gitter oder Vakuum genannt, der leer und flach ist und nur die Orte angibt, und das Medium, eine Flüssigkeit verschiedener Dichte darin. Wo frühere Sätze sagen, das Vakuum sei auch Materie mit sehr geringer Dichte (oben) oder ein materielles Gitter (Notizbuch), ist danach das Medium in seiner dünnsten Form gemeint, nicht der Raum. Ebenso beziehen sich Verspannung und Verän-

derung der Geometrie auf die Flüssigkeit, ihre Dichte und ihre Wirbel; der Raum selbst bleibt flach. Das entspricht dem Weg von Lorentz (1895) mit einem festen, flachen Raum und einem Medium darin (P4) und der Dichtefassung in 2.1 und 2.5, in der die Krümmung der Relativitätstheorie als Brechzahl des Mediums erscheint (Eddington, 1920).

Dazu passen drei Messungen [F]. Der Raum ist im Großen flach: Seine Krümmung ist mit $\Omega K = 0{,}001 \pm 0{,}002$ mit null verträglich (Planck-Kollaboration, 2020). Dass das Medium vor dem Urknall flüssig war, passt zum Quark-Gluon-Plasma, das sich gemessen wie eine fast reibungsfreie Flüssigkeit verhält (PHENIX und Kollegen, 2005; 3.4). Und damit eine gewöhnliche Flüssigkeit beim Ausdehnen flüssig bleibt und nicht verdampft, muss sie unter Druck stehen, wie der Autor sagt.

Zwei Prüfsteine folgen (Frage 69) . Erstens trägt eine reibungsfreie Flüssigkeit nur Längswellen, also Schall; Licht ist aber eine Querwelle, es lässt sich polarisieren. Der Vorschlag eines vorgespannten, fast dichtest gepackten Feldes (oben) setzte Querwellen wie in einem festen Stoff voraus; in der Flüssigkeit des Modells kommen sie aus ihrer Schersteifigkeit, wie bei einem Wirbelgitter, dessen Querschwingungen gemessen sind (Coddington und Kollegen, 2003); Querwellen mit c verlangen einen Schermodul gleich der Energiedichte ρc^2 (Anhang A). Zweitens fällt der Druck einer Flüssigkeit, die sich ausdehnt. Hinge die Schwerkraft vom Druck selbst ab, müsste sie mit der Zeit schwächer werden; gemessen ändert sich ihre Stärke um höchstens etwa 10^{-13} pro Jahr (Hofmann und Müller, 2018). Wirkt dagegen nur das Gefälle (P3), kann der Druck fallen, ohne dass sich die Schwerkraft ändert, solange das Gefälle um eine Masse gleich bleibt. Wie die Ausdehnung selbst verläuft, erst langsamer und dann schneller, ist Frage 66.

Es gab so viele Explosionen, dass sich alle Längswellen und Querwellen überlagern. Kommen sich zwei Längswellen frontal aufeinander zu, werden daraus zwei Querwellen mit derselben Energie [P]. (Antwort des Autors vom 5. November 2026 auf Frage 69.)

Der erste Satz hat ein gemessenes Gegenstück [F]: Die Laufzeiten vieler Pulsare zeigen ein gemeinsames Rauschen, die Überlagerung von Gravitationswellen aus vielen Quellen (NANOGrav-Kollaboration, 2023). Der zweite Satz schließt an den früheren an, dass die Energie in die Querwellen geht (oben).

Für gewöhnliche Flüssigkeiten ist die Messlage beim zweiten Satz aber eindeutig . Zwei Schallwellen, die sich frontal begegnen, laufen durcheinander hindurch; wo sie sich überlagern, bilden sie eine stehende Längswelle, und danach laufen sie unverändert weiter. Querwellen trägt eine gewöhnliche Flüssigkeit gar nicht; die Querwellen von Erdbeben kommen deshalb nicht durch den flüssigen äußeren Erdkern, und aus ihrem Schatten wurde geschlossen, dass er flüssig ist (Iredale, 2024). Eine Umwandlung von Längs- in Querwellen ist gemessen, aber an Grenzflächen fester Stoffe: Trifft eine Längswelle schräg auf eine Grenze, teilt sich ihre Energie in Längs- und Querwellen (Zoeppritz, 1919).

Querwellen gibt es in einer Flüssigkeit dennoch, wenn eine Kraft quer zu-

rücktreibt [F]. In einer sich drehenden Flüssigkeit laufen Trägheitswellen; sie schwingen quer, und die rücktreibende Kraft ist die

Corioliskraft (Wikipedia, Inertial wave). In einer leitenden Flüssigkeit mit Magnetfeld laufen Alfvén-Wellen (Alfvén, 1942). Vorschlag zur Prüfung: Querwellen, wie sie die Gravitationswellen zeigen (2.7), setzen im Medium Drehung oder Magnetismus voraus, und die vielen Explosionen hätten das Medium überall in Wirbel versetzt (3.4: Wirbel entstehen durch Strömungen, die träge Masse anschieben). Beantwortet als Querscherung des Mediums in Anhang A und Frage 69. Zwei Lesarten von Querwellen sind möglich: Wellen, die quer schwingen wie Licht, oder Wellen, die nach dem Zusammenstoß zur Seite laufen; die zweiten blieben in einer Flüssigkeit Längswellen. Gemessen ist die erste: GW170814 zeigt die Querschwingung des Mediums selbst.

Das ist ein Bild von den Querwellen, die entstehen, wenn sich zwei Wellen frontal treffen [P]. (Zu einem Bild aus einem BBC-Bericht über die LHCb-Messung vom 3. November 2026, das der Autor am 5. November 2026 gezeigt hat; das Bild ist eine Illustration eines Teilchenzusammenstoßes, keine Messung.)

Mit Querwellen meint der Autor damit vor allem Wellen, die nach dem Zusammenstoß zur Seite laufen [F]. Dazu passen zwei Messungen. Am LHC stoßen zwei Protonenstrahlen frontal zusammen; ihr gemeinsamer Impuls quer zum Strahl ist null, und die entstehenden Teilchen fliegen in alle Richtungen auseinander, weshalb die Experimente vor allem ihren Impuls quer zum Strahl messen (Cid Vidal und Cid Manzano, Taking a closer look at LHC). Noch genauer trifft den Satz »zwei Querwellen mit derselben Energie« die Vernichtung eines Elektrons mit einem Positron: Es entstehen zwei Gammaquanten von je 511 keV, die in entgegengesetzte Richtungen fliegen, und darauf beruht die Positronen-Emissions-Tomografie (Aurengo, La radioactivité). Gleiche Energie und entgegengesetzte Richtung folgen dabei aus der Erhaltung von Energie und Impuls, und die beiden Gammaquanten sind Licht und schwingen quer. Elektron und Positron sind im Modell keine Längswellen, sondern geschlossene Wirbel: Gemessen haben sie Spin ½ (Stern und Gerlach, 1922; Neutroneninterferometrie 4π, 1975), eine Längswelle hätte Spin 0 (Anhang D). Beim Zerstrahlen geht ihre Energie in zwei Querwellen über. Für die Gravitationswellen bleibt die Frage aus Frage 69: Wellen, die in einer gewöhnlichen Flüssigkeit zur Seite laufen, schwingen weiter längs, gemessene Gravitationswellen schwingen quer in Tensorform (2.7).

Wellen breiten sich mit einem Radius aus [P]. (Frage des Autors vom 5. November 2026, ob das die Querwellen erklären kann.)

Die Ausbreitung im Radius erklärt, wie Wellen schwächer werden: Ihre Energie verteilt sich auf Kugelflächen, ihre Stärke fällt wie $1/r^2$, ihr Ausschlag wie $1/r$ [F]. Ob eine Welle längs oder quer schwingt, legt dagegen die rücktreibende Kraft fest: Gegen Zusammendrücken schwingt sie längs, gegen Scherung, Drehung oder ein Magnetfeld quer (oben). Dazu kommt ein schärferer Prüfstein (Frage 69) . Gemessene Gravitationswellen dehnen

quer zur Laufrichtung in einer Richtung und stauchen in der anderen (Tensorform). Eine ebene Welle, die Teilchen eines Mediums verschiebt, kann das nicht: Ändert sich alles nur längs der Laufrichtung, dehnt oder schert sie nur in Bezug auf diese Richtung, nie quer zu ihr (Rechnung von Claude aus den Verzerrungen εᵢ = ½(∂ᵢu + ∂ uᵢ)). Eine reine Dichtewelle ergäbe Atmungsschwingungen, die gemessen gegenüber Tensorschwingungen etwa tausendfach benachteiligt sind (GW170814; 2.7). Vorschlag zur Prüfung: Das Medium braucht dann eine Größe mit Richtung, die quer zur Laufrichtung schwingen kann, etwa die Ausrichtung seiner Wirbel. Diese Größe ist die Verzerrung ε_{ij} des Mediums selbst, die als eigene Feldgröße mit c läuft; ihr spurfreier Querteil hat genau die zwei gemessenen Formen, lokal u_x = ½(h₊x + h×y), u_y = ½(h×x − h₊y) (Anhang A, TT-Projektion). Beantwortet in Anhang A.

Antwort des Autors vom 6. November 2026 zu Frage 69: Das flüssige Medium trägt die Gravitationswellen wie eine Atmosphäre den Schall [P]. Abgleich mit den Messungen [F]: Als Bild für den Träger passt der Satz. Schall braucht Luft, die Welle braucht das Medium; das Medium legt die Geschwindigkeit fest, beim Schall sind es Druck und Dichte der Luft; und der Ausschlag fällt wie beim Schall mit 1/r (oben). Das ist für Gravitationswellen gemessen: Aus der Stärke der Wellen von GW170817 allein folgt eine Entfernung, die zur Galaxie NGC 4993 passt, und daraus eine Ausdehnungsrate von 70 (+12/−8) km/s pro

Megaparsec (LIGO- und Virgo-Kollaborationen und Kollegen, 2017). Als Bild für die Schwingung passt Schall dagegen nicht. Schall ist eine Längswelle: Die Luft wird in Laufrichtung verdichtet und verdünnt. Gemessene Gravitationswellen schwingen quer in Tensorform, und eine reine Skalarschwingung, wie sie zu einer Druckwelle gehört, ist bei GW170814 etwa tausendfach benachteiligt (2.7). Das gilt auch für Längswellen, die nach einem Zusammenstoß zur Seite laufen (oben). Die Messung entscheidet zwischen den Lesarten: Nur die erste passt, und nach dem Einwand des Autors geht es bei Frage 69 um die Richtung, in die das Medium schwingt.

Auch eine Atmosphäre trägt Querwellen [F]. In geschichteter Luft, deren Dichte nach oben abnimmt, laufen innere Schwerewellen: Die Luftteilchen schwingen quer zur Wellenzahl, die rücktreibende Kraft ist der Auftrieb, und die Frequenz bleibt unter der Auftriebsfrequenz N und hängt nur von der Richtung der Welle ab, nicht von ihrer Länge (University of Waterloo, AMATH 463; American Meteorological Society, Glossary of Meteorology). In einer sich drehenden Flüssigkeit laufen Trägheitswellen (oben), und in schnell rotierenden Bose-Einstein-Kondensaten wurden Querschwingungen des Wirbelgitters gemessen, die Tkachenko-Schwingungen (Coddington und Kollegen, 2003). Zwei Prüfsteine : Erstens reichen gemessene Gravitationswellen von einigen zehn bis einigen hundert Hertz (GW150914: 35 bis 250 Hertz) und laufen bei jeder Frequenz mit c; die Masse des Gravitons liegt unter $1{,}3 \cdot 10^{-23}$ eV (2.7). Schwereund Trägheitswellen haben dagegen eine Höchstfrequenz (N oder 2Ω), ihre Geschwindigkeit hängt von der Wellenlänge ab, und sie schwingen in einer Richtung, entsprechen also

Vektorwellen (oben). Zweitens verlangen Querwellen mit c, dass das Medium der Scherung so stark widersteht, dass seine Schersteifigkeit gleich Dichte mal c^2 ist, also gleich seiner Energiedichte (Rechnung von Claude aus v^2 = Schersteifigkeit/Dichte für Querwellen). Vorschlag zur Prüfung: Ein Wirbelgitter wie im Kondensat gäbe der Flüssigkeit eine Steifigkeit gegen Scherung (oben: Ausrichtung der Wirbel); groß genug ist sie, wenn ihr Schermodul gleich der Energiedichte ist ($\alpha = 1$ in Anhang A); genau das verlangt GW170817 mit $|c_g/c - 1| \lesssim 10^{-15}$, und GW170814 zeigt, dass sie Tensorwellen ergibt. Beantwortet in Anhang A und Frage 69.

Ich bezeichne das Vakuummedium als Feldenergie. Und natürlich dreht sich im Universum praktisch alles. Also hat auch alles ein Magnetfeld. Natürlich sind die Felder alle unterschiedlich [P]. (Antwort des Autors vom 5. November 2026 zu Frage 69.)

Feldenergie ist damit der Name des Autors für das Medium in seiner dünnsten Form (Begriffstabelle) [F]. In der Physik heißt so die Energie, die in einem Feld steckt, etwa in einem Magnetfeld; im Preprint muss die Bedeutung deshalb gleich zu Beginn erklärt werden. Mit den Sätzen sind die Voraussetzungen des Vorschlags oben, Drehung und Magnetismus, nach dem Autor überall gegeben.

Dazu ist gemessen [F]: Praktisch alles dreht sich, von Planeten und Sternen bis zu den Filamenten des kosmischen Netzes (Wang und Kollegen, 2021). Das Weltall als Ganzes dreht sich dagegen nicht messbar: Der mit Wirbeln verbundene Anteil einer ungleichmäßigen Ausdehnung ist auf weniger als $4{,}7 \cdot 10^{-11}$ der Ausdehnungsrate begrenzt (Saadeh und Kollegen, 2016). Auch ein ungeladenes Teilchen kann ein Magnetfeld haben: Das Neutron trägt ein magnetisches Moment (Alvarez und Bloch, 1940). Beim Neutrino ist bisher keines gefunden, es liegt unter etwa $6 \cdot 10^{-12}$ Bohrschen Magnetonen (XENONnT, 2022). Bei großen Körpern folgt aus der Drehung allein kein messbares Feld: Blackett vermutete, jeder drehende Körper habe ein Magnetfeld (Blackett, 1947), und fand es in einem eigenen Versuch nicht (Blackett, 1952). Das passt zum Satz, dass die Felder alle unterschiedlich sind. Ihre Stärke hängt gemessen nicht von der Drehung allein ab, sondern von bewegter Ladung: Planeten und Sterne erzeugen ihr Feld im Dynamo aus leitender, strömender Materie, und das Neutron trägt sein Moment über seine geladenen Bausteine; Blacketts Nullresultat zeigt genau das.

Licht kann sich nur im Nichts ausbreiten. Sobald Licht auf etwas trifft, wird es absorbiert oder umgelenkt, meistens beides [P]. (Hinweis des Autors vom 5. November 2026 zum Vorschlag, Licht als Querwelle des Mediums zu verstehen; so schon am 4. November, oben.)

Licht ist damit keine Welle des Mediums [F]. Es läuft zwischen den Teilchen des Mediums, im an sich leeren, flachen Raum, mit c, und wo es auf das Medium trifft, wird es gestreut, also absorbiert und neu ausgesandt oder umgelenkt. Das ist auch die Erklärung der Optik für die Brechzahl: Zwischen den Molekülen läuft das Licht mit c, die Gesamtwelle wird durch die Wellen der Moleküle langsamer (Feynman, Leighton und Sands, 1963, Band I, Kapitel 31). Dichteres Medium heißt dann mehr Treffer, kleinere Ge-

schwindigkeit und Ablenkung zum Dichteren hin, wie es die Dichtefassung in 2.5 für Lichtablenkung und Shapiro-Verzögerung braucht. Claudes Vorschlag, Licht als Alfvén-Welle des Mediums zu verstehen, ist damit gestrichen (Transparenz); die Frage nach Querwellen in der Flüssigkeit betrifft nur noch die Gravitationswellen.

Zwei Prüfsteine folgen (Frage 69) . Erstens laufen Gravitationswellen und Licht gemessen gleich schnell, auf etwa 15 Stellen genau (GW170817; 2.7). Läuft das Licht im Nichts und die Gravitationswelle im Medium, muss das Modell erklären, warum beide dieselbe Geschwindigkeit haben. Zweitens schwingen Gravitationswellen quer, und zwar als Tensorwellen mit zwei um 45° gegeneinander gedrehten Schwingungsformen: Bei GW170814 sprachen die Daten mit Bayes-Faktoren über 200 und 1000 für reine Tensorschwingung gegen reine Vektor- und reine Skalarschwingung (LIGO- und Virgo-Kollaborationen, 2017). Alfvén- und Trägheitswellen versetzen das Medium in eine Richtung quer zur Laufrichtung und entsprechen damit eher Vektorwellen; Drehung und Magnetismus allein ergeben deshalb keine Tensorwellen; die Tensorwellen sind die Querscherung des Mediums, und die gleiche Geschwindigkeit folgt daraus, dass Licht und Scherung im selben Medium mit c laufen (Anhang A).

Das Licht entsteht gleichzeitig mit den Gravitationswellen und bewegt sich mit ihnen [P]. (Antwort des Autors vom 5. November 2026 auf den ersten Prüfstein.)

Für GW170817 passt das [F]: Der Gammablitz kam 1,74 ± 0,05 Sekunden nach dem Höhepunkt der Gravitationswellen an (LIGO, Virgo, Fermi und INTEGRAL, 2017), nach rund 130 Millionen Jahren gemeinsamer Laufzeit. Entstanden beide im selben Augenblick, wäre das Licht unterwegs um etwa $4 \cdot 10^{-16}$ langsamer gewesen (Rechnung von Claude für eine Entfernung von 40 Megaparsec); im Standardbild bricht der Gammablitz dagegen erst kurz nach der Verschmelzung aus. Das Leuchten der frisch entstandenen schweren Elemente kam erst in den Tagen danach (Watson und Kollegen, 2019; 2.1). Ein Gegenstück in der Allgemeinen Relativitätstheorie gibt es auch: Jeder Lichtpuls trägt ein eigenes Schwerefeld, das als Stoßwelle mit ihm mit Lichtgeschwindigkeit läuft (Aichelburg und Sexl, 1971); gemessen ist es nicht, weil es viel zu schwach ist.

Zwei Lesarten führen zu verschiedenen Vorhersagen . Entstehen Licht und Gravitationswellen bei Ereignissen wie Explosionen und Verschmelzungen gemeinsam, müsste nach dem Satz jede gemessene Gravitationswelle Licht mit sich führen; bei Verschmelzungen Schwarzer Löcher erwartet das Standardbild aber kaum Licht (LIGO- und Virgo-Kollaborationen, 2016), diskutiert wird etwa ein möglicher Lichtausbruch eines aktiven Galaxienkerns nach S190521g (Graham und Kollegen, 2020). Begleitet dagegen jedes Licht eine eigene Gravitationswelle, die mit ihm läuft, wie das Schwerefeld bei Aichelburg und Sexl, dann gilt das auch für Licht aus Lampen und Sternen; diese Welle wäre zu schwach, um sie zu messen.

Im Prinzip B. Aber bei der Verschmelzung zweier Schwarzer Löcher würde ich tatsächlich eher davon ausgehen, dass durch die extremen Druck-

spitzen sehr viel Licht entstehen müsste. Und soweit ich weiß, ist das auch vorausgesagt [P]. (Antwort des Autors vom 5. November 2026.)

Mit Lesart B ist die Lichtgeschwindigkeit die Geschwindigkeit der Gravitationswellen im Medium, und Licht hat sie, weil es mit seiner eigenen Welle läuft [F]. Das erklärt, warum Licht und die Wellen einer Verschmelzung gleich schnell ankommen (GW170817). Mit dem Satz, dass Licht nur im Nichts läuft, verträgt es sich so: Das Licht läuft durch die leeren Stellen, die Welle durch das Medium, und beide bleiben beisammen.

Vorausgesagt ist Licht bei der Verschmelzung Schwarzer Löcher bisher dort, wo Gas in der Nähe ist [F]: In der Gasscheibe eines aktiven Galaxienkerns streift das verschmolzene Loch, das der Rückstoß der Gravitationswellen anstößt, Gas ab und sollte einen Ausbruch im Ultravioletten erzeugen (McKernan und Kollegen, 2019); danach wurde der mögliche Lichtausbruch nach S190521g gefunden (Graham und Kollegen, 2020). Ohne Gas sagt die Allgemeine Relativitätstheorie kein Licht voraus, weil ihre Schwarzen Löcher keine Oberfläche haben. Im Modell haben sie eine (3.4), und die Druckspitzen der Verschmelzung sollten Licht erzeugen; das unterscheidet das Modell vom Standardbild (V19) [V].

Gemessen ist dazu bei der ersten Verschmelzung, GW150914, kein Gammalicht : Die zur Erde gestrahlte Energie im Gammabereich war kleiner als ein Millionstel der Energie der Gravitationswellen (Savchenko und Kollegen, 2016). »Sehr viel Licht« muss mit dieser Grenze vereinbar sein (Frage 70).

Es gibt keine Schwarzen Löcher ohne Gas! Gammastrahlung ist Licht, das zu hell ist, um es zu sehen. Die Gammastrahlung muss erst durch den Dopplereffekt langgezogen werden, um sichtbar zu werden. Noch länger, und sie wird zu Radiowellen [P]. (Antwort des Autors vom 5. November 2026 zu Frage 70.)

Gas gibt es tatsächlich überall [F]: Selbst jenseits der Heliopause maß Voyager 1 etwa 0,08 Elektronen pro Kubikzentimeter (Gurnett und Kollegen, 2013; 1). Für V19 heißt das, dass bei jeder Verschmelzung Licht entsteht; wie viel, legt die Gasdichte am Ort fest, und nach oben begrenzt es die Messung (Frage 70). Nach den Sätzen des Autors entsteht es zuerst als Gammastrahlung, und für Gammastrahlung gilt die Grenze von INTEGRAL für GW150914 unmittelbar (oben).

Zur Wortwahl [F]: Gemessen hängen Farbe und Helligkeit nicht zusammen, wie schon beim Photoeffekt (Millikan, 1916; 1). Ein sehr heller grüner Laser bleibt grün, und ein einzelnes Gammaquant bleibt Gammastrahlung. Gemeint ist wohl: Gammastrahlung ist Licht mit zu viel Energie pro Teilchen und zu kurzer Welle, um es zu sehen. Ein Vorschlag zur Wortwahl, über den der Autor entscheidet.

Dass Wellen gedehnt werden und dabei vom Licht zu Radiowellen werden, ist gemessen [F]: Die Hintergrundstrahlung wurde als Licht eines etwa 3000 Grad heißen Gases ausgesandt und ist heute um rund das 1100-Fache zu Mikrowellen gedehnt (5.4). Um Gammastrahlung von 1 MeV zu grünem Licht zu dehnen, bräuchte es aber etwa das 440.000-Fache (Rech-

nung von Claude); der fernste gemessene Gammablitz, GRB 090423 bei einer Rotverschiebung von etwa 8,2, kam trotz neunfacher Dehnung noch als Gammastrahlung an (Tanvir und Kollegen, 2009). Zwei andere gemessene Wege passen zu den Sätzen des Autors. In der Sonne entsteht bei der Fusion Gammastrahlung; bis sie die Oberfläche erreicht, wird sie unzählige Male absorbiert und neu ausgesandt und kommt als sichtbares Licht heraus, nach etwa 100.000 Jahren (Borexino, 2014; 2.1), so wie Licht nach dem Autor absorbiert oder umgelenkt wird, sobald es auf etwas trifft. Und auf einen Gammablitz folgt ein Nachleuchten, das vom Röntgenlicht über sichtbares Licht bis zu Radiowellen reicht (Costa und Kollegen, 1997; van Paradijs und Kollegen, 1997; Frail und Kollegen, 1997); im Standardbild stammt es von einer fast lichtschnellen Schale, die auf das Gas ringsum trifft und dabei langsamer wird (Sari, Piran und Narayan, 1998).

Gammastrahlung wird auch durch das Feld gebremst [P]. (Nachtrag des Autors vom 5. November 2026 zu Frage 70.)

Das Wort »gebremst« lässt drei Lesarten zu, und die Messungen trennen sie [F]. Wird Gammastrahlung langsamer als Licht anderer Farben, kämen ihre Teilchen später an; gemessen kamen bei einem Gammablitz nach rund 7 Milliarden Jahren Teilchen sehr verschiedener Energie fast gleichzeitig an (Abdo und Kollegen, 2009; 1). Verliert sie unterwegs allmählich Energie und wird so gedehnt, liefen ferne Vorgänge im selben Takt ab wie nahe; gemessen leuchten ferne Supernovae um (1 + z) länger (5.4). Wird sie dagegen vom Feld absorbiert, ist das gemessen: Sehr energiereiche Gammastrahlung ferner Blazare wird auf dem Weg durch das Licht geschwächt, das Sterne und wachsende Schwarze Löcher seit Beginn ausgesandt haben, und aus der Schwächung ließ sich dieses Licht messen (Ackermann und Kollegen, 2012). Das passt zum Satz, dass Licht absorbiert oder umgelenkt wird, sobald es auf etwas trifft.

Für Frage 70 hilft die Absorption allerdings kaum : INTEGRAL maß bei GW150914 Gammastrahlung unter 2 MeV, und Gammastrahlung dieser Energie kommt gemessen selbst von einem Gammablitz an, dessen Licht rund 13 Milliarden Jahre unterwegs war (Tanvir und Kollegen, 2009). Das Feld zwischen den Galaxien kann sie auf dem Weg von GW150914 also kaum aufgehalten haben.

Das kannst du dir selber denken. Alles, was du sagst, ist richtig [P]. (Antwort des Autors vom 5. November 2026 auf die Frage nach den drei Lesarten von »gebremst«.)

Damit gilt die Lesart, die zu den Messungen passt [F]: »Gebremst« heißt, dass das Feld Gammastrahlung absorbiert und schwächt. Langsamer als anderes Licht wird sie nicht, und ein allmählicher Energieverlust unterwegs ist durch die längere Leuchtdauer ferner Supernovae ausgeschlossen. Ebenso beim Langziehen: Sichtbar wird Gammastrahlung vor allem durch Absorption und neue Aussendung, wie in der Sonne; das Dehnen durch den Dopplereffekt und die Ausdehnung reicht dafür nicht, wirkt aber über große Entfernungen bis zu Mikrowellen und Radiowellen, wie bei der Hintergrundstrahlung. Für Frage 70 bleibt die Grenze von INTEGRAL der Prüf-

stein.

Gammastrahlung ist so viel Licht, dass es zu »hell« ist; zu hell bedeutet unsichtbar. Radiowellen sind zu dunkel und damit auch unsichtbar. Das hat nichts mit der Farbe zu tun. Natürlich kann Blau genauso hell sein wie Grün. Aber Weiß ist heller [P]. (Antwort des Autors vom 5. November 2026 auf den Vorschlag zur Wortwahl.)

Gemessen sind hier zwei Größen zu trennen, und das Wort »hell« steht beim Autor für beide [F]. Die erste ist die Menge des Lichts, also wie viele Lichtteilchen kommen: In diesem Sinn kann Blau so hell sein wie Grün, und Weiß, die Summe aller Farben, ist heller. Die zweite ist die Energie, die ein einzelnes Lichtteilchen trägt, und sie trennt Radiowellen, Licht und Gammastrahlung: Ein Radioteilchen trägt zu wenig Energie, um den Farbstoff im Auge auszulösen, ein Gammateilchen zu viel, es geht hindurch oder zerstört. In diesem Sinn sind Radiowellen »zu dunkel« und Gammastrahlung »zu hell«, und der Satz des Autors trifft zu. Dass es um die Energie pro Teilchen geht und nicht um die Menge, zeigt jede Gammaquelle: Cäsium-137 sendet Gammateilchen von 662 keV aus, ob die Quelle schwach oder stark ist; nur ihre Zahl ändert sich (Radiacode, Isotopendaten). Und sehr helles sichtbares Licht bleibt sichtbares Licht.

Ein Beispiel aus der Laserbearbeitung, in der der Autor ausgebildet ist, zeigt beide Größen getrennt [F]: Ein CO_2-Laser zum Schneiden von Blech arbeitet mit sehr hoher Leistung und ist trotzdem unsichtbar,

weil er im Infraroten bei 10,6 µm strahlt (Patel, 1964); jedes seiner Lichtteilchen trägt nur etwa 0,12 eV, rund ein Zwanzigstel eines grünen (Rechnung von Claude). Sein Strahl muss deshalb am Ziel erst sichtbar gemacht werden (Janik, 2025). Ein Laserpointer mit einem Milliwatt ist dagegen gut zu sehen. Im Sinn des Autors gibt der Schneidlaser also wenig Licht ab, »zu dunkel«, aber in sehr großer Menge (Wortwahl nach dem Nachtrag vom 6. November 2026, unten).

Einen gemessenen Weg von wenig Licht in großer Menge zu viel Licht im Sinn des Autors gibt es allerdings [F]: In einem sehr starken Laserstrahl verschmelzen viele Lichtteilchen zu einem; aus einem Infrarotlaser entstanden so Röntgenteilchen über 1,6 keV, jedes aus mehr als 5000 Laserteilchen (Popmintchev und Kollegen, 2012). Das passt zum Verschmelzen von Tropfen im Grundsatz des Autors (1).

Wenn ich von viel Licht rede, meine ich Gammastrahlung; wenn ich von wenig Licht spreche, meine ich Radiowellen. Alles ist Licht und die Abwesenheit von Licht und die Wechselwirkung zwischen Licht. Sichtbares Licht hat damit natürlich auch etwas zu tun, aber es heißt extra sichtbares Licht; das hat einen Grund [P]. (Nachtrag vom 6. November 2026.)

Damit ist die Wortwahl festgelegt [F]: »Viel« und »wenig« Licht meinen beim Autor die Energie eines einzelnen Lichtteilchens, $E = h \cdot \nu$, nicht die Menge des Lichts (oben). Ein Gammateilchen von Cäsium-137 trägt 662 keV, ein Radioteilchen bei 1 GHz etwa $4 \cdot 10^{-6}$ eV, rund 10^{11}-mal weniger (Rechnung von Claude). Der CO_2-Schneidlaser gibt in diesem Sinn wenig Licht ab, aber in großer Menge. Gemessen ist auch die Wechselwirkung

zwischen Licht, allerdings nur bei sehr viel Licht in diesem Sinn: Bei Stößen von Bleikernen am LHC streuten Lichtteilchen aneinander, 13 Ereignisse bei 2,6 ± 0,7 erwarteten Untergrundereignissen (ATLAS-Kollaboration, 2017); umgekehrt werden Elektron und Positron zu zwei Gammateilchen (Frage 69). Gewöhnliche Lichtstrahlen laufen dagegen ungestört durcheinander hindurch. Sichtbar heißt der Bereich, den das Auge wahrnimmt; den Grund für das eigene Wort nennt der Autor nicht, und im Text steht sichtbares Licht deshalb immer ausdrücklich als sichtbar.

Man kann nicht sagen, dass der Raum leer ist, wenn er es nicht ist, auch wenn der Raum an sich leer ist [P]. (Nachtrag vom 6. November 2026.) Das ist die Trennung von Raum und Medium (oben) [F]: Der Raum an sich ist leer und flach, erfüllt ist er vom Medium. Wo der Text bisher vom leeren Raum sprach, steht jetzt »an sich leer« oder »zwischen den Teilchen« (Lesehinweis, Begriffstabelle, Licht).

Licht entsteht vermutlich nur dort, wo Teilchen kollidieren. Auf der Autobahn wären sie dann unsichtbar, oder wie im Verkehr in China: Alle Ampeln sind auf Grün, und je mehr Verkehr, desto häufiger kracht es. Neutronen fliegen sogar durch uns hindurch, und Neutronen sind vermutlich auch nur eine Form von wechselwirkenden Elementarteilchen [P]. (Nachtrag vom 6. November 2026.)

Der Kern des ersten Satzes stimmt mit den Messungen überein [F]. Eine gleichmäßig bewegte Ladung strahlt nicht; Licht entsteht dort, wo Ladungen abgebremst oder umgelenkt werden, und die Leistung wächst mit dem Quadrat dieser Beschleunigung (Larmor, 1897; oben). Ein Zusammenstoß ist eine starke Bremsung, und mehr Verkehr heißt mehr Zusammenstöße: Heißes Gas leuchtet aus Zusammenstößen von Elektronen und Ionen, und seine Leistung wächst mit $n_e \cdot n_i \cdot T\text{^}(1/2)$, also mit dem Quadrat der Dichte (Theuns, Durham, Vorlesung zur Bremsstrahlung); doppelt so viel Verkehr gibt viermal so viel Licht. Licht entsteht allerdings auch ohne Stoßpartner: Elektronen, die ein Magnetfeld auf eine Kreisbahn zwingt, leuchten bläulich weiß (Elder, Gurewitsch, Langmuir und Pollock, 1947), und ein angeregtes Atom leuchtet auch ohne Stoß, wie stark aber, hängt von seiner Umgebung ab: Zwischen passenden Spiegeln

wird sein Leuchten gehemmt (Yablonovitch, 1987; oben). Vorschlag zur Wortwahl: »Licht entsteht nur, wo Teilchen abgebremst oder umgelenkt werden«, mit den Worten des Autors (umgelenkt, oben; früher abgebremst, Frage 1); im Modell kann auch das Medium selbst bremsen und umlenken.

Zum zweiten Satz [F]: Für Neutrinos stimmt er genau, für Neutronen nicht; vermutlich sind Neutrinos gemeint, die in diesem Entwurf mehrfach vorkommen (Frage 7, Frage 54). Von der Sonne fliegen etwa $6{,}6 \cdot 10^{10}$ Neutrinos pro Quadratzentimeter und Sekunde durch uns hindurch (Borexino, 2014), und die Erde ist für sie bis etwa 40 TeV durchsichtig (IceCube, 2017). Neutronen stoßen dagegen leicht mit Wasserstoffkernen zusammen, aus denen unser Körper zu einem großen Teil besteht; entdeckt wurden sie, weil sie aus wasserstoffhaltigem Stoff Protonen herausschlugen (Chadwick, 1932). Dass beide Formen wechselwirkender Elementarteilchen sind, passt

zu den Messungen: Das Neutron ist ungeladen und hat doch ein magnetisches Moment (Alvarez und Bloch, 1940), besteht also aus geladenen Teilen, und zerfällt frei nach etwa 878 s (Gonzalez und Kollegen, 2021); Neutrinos wechseln im Flug zwischen drei Formen (Fukuda und Kollegen, 1998). Der Autor meint Neutrinos (unten); der Satz ist damit gemessen.

Ja, ich meinte Neutrinos. Am Anfang dachte ich, Neutrinos könnten die Elementarteilchen sein; deshalb hatte ich am Anfang von der Neutrinodichte gesprochen. Aber das Elementarteilchen, das ich meine, hat vermutlich noch keinen Namen [P]. (Antwort des Autors vom 6. November 2026.)

Das deckt sich mit den Messungen [F]. Neutrinos haben eine Masse und fliegen frei, ohne Druckwellen zu bilden (Frage 7); sie können die Gravitationswellen also nicht mit c tragen und scheiden als Medium aus, als eine Form wechselwirkender Elementarteilchen aber nicht. Einen Namen hat das gemeinte Teilchen in der Physik tatsächlich nicht: Elektron und Quarks zeigen bis hinab zu etwa 10^{-18} m keine innere Struktur (oben), und Bausteine, aus denen Quarks und Leptonen bestehen sollen, sind nur vorgeschlagen, etwa die Preonen (Pati und Salam, 1974), aber nicht gemessen (Wikipedia, Preon). Der Name ist damit frei.

Zur Wortwahl bleibt ein Punkt : Im sichtbaren Bereich ist die Energie pro Lichtteilchen genau die Farbe, Blau trägt mehr als Grün ($E = hf$; Millikan, 1916). Die Skala von Radiowellen bis Gammastrahlung ist also die Farbskala, über das Sichtbare hinaus verlängert. Vorschlag zur Wortwahl: Helligkeit für die Menge des Lichts, Energie pro Lichtteilchen für die Skala von Radio bis Gamma; der Autor entscheidet.

Damit ist der Wind an der Heliopause ein Wind des Mediums, denn Gas und Plasma sind verdichtetes Medium (P2, Postulat) [F]. Licht nimmt er trotzdem kaum mit, weil das Gas dort extrem dünn ist: Voyager 1 maß jenseits der Grenze etwa 0,08 Elektronen pro Kubikzentimeter (Gurnett und Kollegen, 2013). Für sichtbares Licht weicht die Brechzahl dort nur um etwa 10^{-23} von 1 ab (Rechnung von Claude), und der Mitnahmeanteil $1 - 1/n^2$ ist entsprechend winzig. Das passt zum Vorschlag oben und zu »ausreichend leerer Raum«.

Dass Licht an Teilchen abgelenkt und verschluckt wird, ist gemessen [F]: In Gasen wächst die Abweichung der Brechzahl von 1 im Verhältnis zur Dichte (Gladstone und Dale, 1863), wie es P2 für das dichtere Medium verlangt. Auch das Durchsichtigwerden des frühen Gases folgt dem: Solange freie Elektronen das Licht streuten, war es undurchsichtig; erst als sie in Atome gebunden waren, kam das Licht durch (5.1).

Ordnung allein entscheidet aber nicht . Glas ist ungeordnet und trotzdem durchsichtig, Metalle sind geordnet und undurchsichtig, weil ihre freien Elektronen das Licht zurückwerfen. Maßgeblich sind Unterschiede auf der Längenskala der Wellenlänge und passende Energiestufen der Teilchen: Ein Kristall, der genau auf dieser Skala geordnet ist, kann bestimmte Farben sogar ganz sperren (Yablonovitch, 1987), und starke Unordnung auf dieser Skala kann Licht festhalten (Wiersma und Kollegen, 1997).

P5 Versum [P]. Das Universum ist unendlich, unser beobachtbares Uni-

versum nicht. Unser beobachtbares Universum ist ein kleiner Teil einer deutlich größeren endlichen Sphäre, ein lokales Ereignis, hier „Versum“ genannt.

Begriffe. Weil Raum und Medium getrennt sind, übersetzt das Modell Standardbegriffe so:

Standardbegriff In diesem Modell

Anziehung gibt es nicht; Körper folgen dem Dichtegefälle des Mediums

Druck (im Sinn des Autors) Zustand des Mediums, der aus seiner Dichte folgt; das Medium drückt nicht gegen Materie

Raumkrümmung Dichtegefälle im Medium; Licht wird abgelenkt wie in Glas mit veränderlicher Brechzahl; Uhren und Maßstäbe ändern sich, der Raum nicht

Expansion des Raums Medium und Materie bewegen sich im festen Raum nach außen, und das Medium dehnt sich aus

Gravitationswellen Wellen im Medium, die es verdichten und Masse forttragen; gemessen schwingen sie quer zur Laufrichtung (2.7, Frage 6)

Vakuum beim Autor zweierlei: der an sich leere, flache Raum, auch Gitter genannt, der aber nicht leer ist, weil das Medium ihn erfüllt, und das Medium in seiner dünnsten Form, das der Autor Feldenergie nennt (1)

Feldenergie (Wort des Autors) das Vakuummedium, also das Medium in seiner dünnsten Form; nicht die Energie eines Feldes im üblichen Sinn (1)

Gammastrahlung, Radiowellen beim Autor »zu hell« und »zu dunkel«, beides unsichtbar; gemessen trennt sie die Energie pro Lichtteilchen, nicht die Menge des Lichts (1); »viel Licht« heißt beim Autor Gammastrahlung, »wenig Licht« Radiowellen, also viel oder wenig Energie pro Lichtteilchen (1)

Wurmloch (Wort des Autors) der Phasenwechsel vom Schwarzen Loch über das Quark-Gluon-Plasma zum Hyperstern, dem Weißen Loch; kein Tunnel durch gekrümmten Raum, denn der Raum ist

Standardbegriff In diesem Modell

flach (P1); in der Allgemeinen Relativitätstheorie die nicht durchquerbare Einstein-Rosen-Brücke (5.3)

Viskosität (Zähigkeit) wie träge das Medium reagiert; bestimmt den Gang von Licht und Uhren, ohne Reibung (2.2); reicht von niederviskos (Leerräume) bis hochviskos (Schwarze Löcher), mit allen Stufen dazwischen

Lichtgeschwindigkeit Reaktionsgeschwindigkeit des Mediums, abhängig von seiner Dichte

Zeitdilatation Uhren gehen langsamer; die Zeit selbst vergeht nicht langsamer

Elektrische Ladung Überdruck (positiv) und Unterdruck (negativ) im Medium, also Zonen höherer und niedrigerer Dichte

Masse verdichtetes Medium; Masse und Medium sind dasselbe

Dunkle Energie Energie der Dichteunterschiede im Medium; ohne Unterschiede keine Energie (6.1)

Vakuumkatastrophe Lücke zwischen der berechneten und der gemessenen Energie des Vakuums; im Modell ist die Rechnung falsch, denn das Vakuum ist dünn (P2)

Werkzeuge der Theorie [P]. Mit den Gesetzen der technischen Mechanik müsste sich fast alles erklären lassen: Gleichgewicht, Massen-, Impuls- und Energieerhaltung, elastischer und unelastischer Stoß, Schwingungen und Resonanzen, Druck, Schub, Biegung und Knickung, Auftrieb und Strömung. Elastische bzw. unelastische Stöße beschreiben die Impulsübertragung, etwa mit Lichtgeschwindigkeit. „Thermodynamik = Schwerkraft."

In dieser Sprache lauten die Grundgleichungen eines Mediums so [F]; sie sind Lehrbuchwissen der Mechanik der Kontinua:

- Massenerhaltung (Kontinuitätsgleichung): $\partial\rho/\partial t + \nabla\cdot(\rho v) = 0$. Was an einer Stelle dichter wird, fehlt ringsum.
- Impulserhaltung: $\rho \cdot dv/dt = \nabla\cdot\sigma$. Die Spannungen σ im Inneren beschleunigen das Medium.
- Hookesches Gesetz für Druck und Schub: $\sigma = K \cdot \mathrm{tr}(\varepsilon) \cdot I + 2G \cdot (\varepsilon - ⅓ \cdot \mathrm{tr}(\varepsilon) \cdot I)$, mit dem Kompressionsmodul K für das Zusammendrücken und dem Schubmodul G für die Scherung.
- Energieerhaltung: Bewegungsenergie und Formänderungsarbeit zusammen bleiben gleich, solange nichts gedämpft wird.

Daraus folgen Querwellen mit der Geschwindigkeit $\sqrt{(G/\rho)}$ und Längswellen mit $\sqrt{((K + 4G/3)/\rho)}$ (P2) [F]. Die Energie der Dichteunterschiede (2.1) wäre ein zusätzlicher Anteil der Formänderungsarbeit.

An vier Stellen reicht die klassische Mechanik allein nachweislich nicht aus; dort muss das Modell zeigen, wie es weiterkommt :

1. Wärmestrahlung: Nach der klassischen Mechanik erhält jede Schwingung im Mittel dieselbe Energie. Dann müsste ein warmer Körper zu hohen Frequenzen hin immer mehr abstrahlen. Gemessen ist das Spektrum nach Planck (1900), am genauesten an der Hintergrundstrahlung selbst (Fixsen und Kollegen, 1996). Planck brauchte dafür, dass Energie nur in Portionen $E = hf$ abgegeben wird (Frage 47).

2. Photoeffekt: Die Energie eines herausgelösten Elektrons hängt von der Frequenz des Lichts ab, nicht von seiner Stärke (Einstein, 1905; Millikan, 1916). Bei klassischen Wellen wäre es umgekehrt (Frage 47). Der Autor wendet ein: Die Farbe des Lichts hängt vom Spektrum ab und das Spektrum von der Stärke [P]. Für glühende Körper stimmt das [F]: Ein heißerer Körper leuchtet heller und blauer (Wiensches Gesetz). Beim Photoeffekt lassen sich beide aber trennen: Mit Filtern oder Lasern bleibt die Farbe gleich, während sich die Stärke ändert, und dann ändert sich nur die Zahl der Elektronen, nicht ihre Energie (Millikan, 1916). Erst bei extrem starken Lasern nehmen Atome mehrere Portionen auf; die Energie der Elektronen wächst dann in Stufen von hf (Agostini und Kollegen, 1979).

3. Stöße: In einer Kette sich berührender Kugeln hängt die Geschwindigkeit eines Stoßes nach den Hertzschen Gleichungen von seiner Stärke ab, außer die Kette ist stark vorgespannt (Nesterenko, 1983). Für Licht ist gemessen, dass seine Geschwindigkeit nicht von der Energie abhängt: Photonen sehr verschiedener Energie aus einem Gammablitz, der 7 Milliarden Jahre unterwegs war, kamen fast gleichzeitig an (Abdo und Kollegen, 2009). Noch strenger prüft das der Gammablitz GRB 221009A: Auch dort zeigt sich keine Abhängigkeit von der Energie, und die Grenze für eine quadratische Abhängigkeit liegt fünf- bis siebenmal höher als zuvor (LHAASO-Kollaboration, 2024). Unelastische Stöße würden dem Licht unterwegs Energie entziehen; dass ferne Supernovae um (1 + z) länger leuchten, spricht dagegen, dass ein solcher Verlust die Rotverschiebung erzeugt (5.4).

4. Verschränkung: Kein Modell, in dem Stöße nur von Ort zu Ort weitergegeben werden, erreicht die gemessenen Übereinstimmungen (7.2).

Zu „Thermodynamik = Schwerkraft“ gibt es Vorläufer [F]: Jacobson (1995) leitete Einsteins Feldgleichungen aus einer Beziehung der Wärmelehre ab, und Verlinde (2011) beschrieb Newtons Schwerkraft als Folge der Entropie; Verlindes spätere Fassung wurde an der Lichtablenkung um Galaxien geprüft (Brouwer und Kollegen, 2017). Padmanabhan (2002) zeigte, dass Einsteins Feldgleichungen am Horizont eines nicht drehenden Schwarzen Lochs die Form des ersten Hauptsatzes der Wärmelehre annehmen; Ahn, Bae, Jang und Kwon (2026) dehnten das auf drehende und geladene Löcher aus, indem sie mit der Änderung der Entropie statt des Volumens multiplizierten. Kim (2026) wies darauf hin, dass solche Umformungen eine Prüfung auf Widerspruchsfreiheit sind, keine unabhängige Herleitung der Wärmelehre. Welche Form der Autor meint, ist zu klären (Frage 48).

Eine neue Arbeit verbindet beide Gedanken des Autors, »Thermodynamik = Schwerkraft« und »keine Unterschiede, keine Energie« (6.1) [F]. Dorau und Much (2026) zeigen, dass die relative Entropie zwischen dem Vakuum und einer Anregung eines Quantenfelds gleich dem Energiefluss durch einen Horizont ist; mit der Beziehung zwischen Entropie und Horizontfläche nach Bekenstein und Hawking folgen daraus Einsteins Feldgleichungen, als Verallgemeinerung von Jacobsons Herleitung. Die relative Entropie ist die Quantenfassung der Kullback-Leibler-Divergenz (Vedral, 2002). Das Vakuum selbst hat darin den Wert null; erst ein Unterschied zum Vakuum trägt Energie und wirkt als Schwerkraft, wie in P3. Drei Einschränkungen : Die Autoren setzen die Beziehung von Bekenstein und Hawking voraus,

rechnen in kleinen, nahezu flachen Bereichen und nennen ihr Ergebnis Argumente, keine strenge Herleitung. Hergeleitet wird zudem die Krümmung der Raumzeit, nicht die Dichte eines Mediums (Frage 48).

2 Schwerkraft, Licht und Uhren im Medium

Schwerkraft ist in diesem Modell weder Anziehung noch ein Druck des Mediums auf Körper, sondern ein Dichtegefälle [P]. Nimmt das Gefälle mit $1/r^2$ ab, liefert das Modell dieselben Zahlen wie Newton. Unterschiede zum Standardbild zeigen sich in der Deutung von Licht, Uhren und Ladungen.

Nicht der Sog der Gravitation, sondern der Druck der Gravitation [P]. (Nachtrag vom 4. November 2026, zum Satz des Standardbilds, die Materie habe sich »unter dem Sog der Gravitation« zusammengeballt.)

Das schließt an den Begriff an, den der Autor für Druck verwendet (1, Begriffe) [F]: Druck ist der Zustand des Mediums, der aus seiner Dichte folgt. Druckunterschiede im Fluss formen und treiben die Wirbel, deren Dichteanomalie die Schwerkraft ist (2.1), und Materie wird von außen zusammengedrückt, nicht angezogen (3.4, 4.2). Dass Druck an der frühen Strukturbildung beteiligt war, ist gemessen: Die Spitzen im Spektrum der Hintergrundstrahlung sind Schallwellen, also Druckwellen, im Gas vor dem Durchsichtigwerden (Planck-Kollaboration, 2020), und ihr Abdruck findet sich als bevorzugter Abstand von rund 150 Megaparsec, etwa 490 Millionen Lichtjahren, in der Verteilung der Galaxien (Eisenstein und Kollegen, 2005).

Ein Druck nur auf die Oberfläche hinge wie der Auftrieb von Volumen und Form ab; gemessen fallen alle Körper auf 10^{-15} gleich (MICROSCOPE). Deshalb wirkt das Dichtegefälle auf jeden Teil der Masse, wie in Frage 2 und Frage 57 beantwortet (Abschnitt 2.10).

2.1 Schwerkraft als Dichtegefälle

Kein Körper zieht einen anderen an, weder ein Schwarzes Loch noch die Erde noch der Mond [P]. Das Medium kann auch nicht gegen Materie drücken; Schwerkraft ist eine reine Dichtefluktuation des Mediums [P].

Auch die Allgemeine Relativitätstheorie kennt im freien Fall weder Zug noch Schub [F]: Wer frei fällt, spürt keine Kraft; spürbar ist erst der Boden, der von unten gegen die Füße drückt. Fallen im Schwerefeld und Beschleunigen in einem gezogenen Kasten sind örtlich nicht zu unterscheiden (Einstein, 1907), und alle Stoffe fallen auf 10^{-15} genau gleich (MICROSCOPE). Für das Modell heißt das: Der Druck der Gravitation darf im freien Fall nicht zu spüren sein, er muss auf jeden Teil eines Körpers gleich wirken (Frage 2, Frage 57). Dass Planeten nahe der Sonne schneller laufen, folgt aus dem Flächensatz (Kepler, 1609); er gilt für jede zur Sonne gerichte-

te Kraft (Newton, 1687) und unterscheidet daher nicht zwischen Zug und Druck. (Zu Bildern aus Erklärvideos, die der Autor am 5. November 2026 gezeigt hat.)

Das Dreikörperproblem ist kein Problem, wenn man logisch denkt. Diese Körper ziehen sich nicht an, sie stoßen sich ab. Schwerkraft existiert nicht so, wie wir denken [P]. (Nachtrag vom 5. November 2026.)

Der erste Teil passt zum dritten Newtonschen Axiom und zu diesem Abschnitt [F]: Nach dem Modell ziehen sich die Körper nicht an; gleich große Kräfte stoßen sich ab, und das Dichtegefälle des Mediums drückt die Körper gegeneinander. Die Schwierigkeit des Dreikörperproblems hängt aber nicht davon ab, ob gezogen oder gedrückt wird; sie steckt in den Bahnen selbst. Jeder Körper verändert das Feld, in dem sich die beiden anderen bewegen, und das wirkt sofort auf ihn zurück. Poincaré zeigte, dass sich die

Gleichungen dafür nicht allgemein in geschlossener Form lösen lassen und die Bahnen chaotisch werden können. Sundman fand 1912 zwar eine allgemeine Lösung als unendliche Reihe, sie konvergiert aber so langsam, dass schon kurze Zeiträume Millionen von Gliedern brauchen (Musielak und Quarles, 2015). Weil die Bahnen gemessen den Gesetzen von Kepler und Newton folgen und das Modell sie im schwachen Feld genauso liefern muss (oben), erbt es diese Schwierigkeit; aus genau diesen Gleichungen folgt etwa 1 % Wahrscheinlichkeit, dass die Merkurbahn binnen 5 Milliarden Jahren instabil wird (Laskar und Gastineau, 2009).

Masse und Medium sind dasselbe [P]: Eine Masse ist eine Stelle, an der das Medium besonders dicht ist, und nach außen fällt die Dichte ab. Was das Standardbild Schwerefeld nennt, ist dieser Abfall [F]. Damit das Newtons Gesetz ergibt, muss der Dichteüberschuss außerhalb der Masse wie 1/r abfallen, also dieselbe Gleichung erfüllen wie Newtons Potenzial (Laplace-Gleichung); sein Gefälle nimmt dann wie $1/r^2$ ab [F]. Von selbst folgt das nicht; was das Medium dafür können muss, steht am Ende dieses Abschnitts. Im dichteren Medium läuft alles langsamer (P2). Wellen biegen sich deshalb zur höheren Dichte hin, wie Licht in Glas, dessen Brechzahl sich von Ort zu Ort ändert: Sie nehmen den Weg der kürzesten Laufzeit, den Weg des geringsten Widerstands (Fermat) [F]. Dicke (1957) und Puthoff (2002) haben gezeigt, dass ein solches Medium mit der Brechzahl $n = 1 + 2GM/(rc^2)$ für langsame Körper genau Newtons Beschleunigung GM/r^2 ergibt [F]. Für Lichtablenkung und Shapiro-Verzögerung liefert diese Brechzahl dieselben Zahlen wie die Allgemeine Relativitätstheorie, für die Periheldrehung die exponentielle Form nach Puthoff (Frage 4). Im schwachen Feld lässt sich das Modell also nicht von ihr unterscheiden; unterscheiden muss es sich im starken Feld (3.2, Frage 30) und in der Kosmologie [F]. Warum die Dichte um einen Knoten gerade so abfällt, hat der Autor für das schwache Feld beantwortet: wie in einer Lufthülle ohne feste Schale, in der sich der Druck mit c ausbreitet (Frage 1, unten).

Auftrieb ist dabei das falsche Vorbild, obwohl der Vergleich naheliegt: Ein Stein sinkt im Wasser, weil er dichter ist als das Wasser [P]. Auftrieb hängt

aber vom Dichteverhältnis ab, im Vakuum fallen dagegen alle Körper gleich, Titan und Platin auf 15 Stellen genau (MICROSCOPE, 2022) [F]. Das folgt im Modell, weil Masse und Medium dasselbe sind: Jeder Körper ist selbst verdichtetes Medium, und das Gefälle lenkt ihn ab wie Licht, unabhängig von Volumen und Zusammensetzung (Frage 2) [F].

Gravitationswellen schieben alle Materie an; Le Sage ist richtig [P]. Das ist ein Nachtrag des Autors vom

1. November 2026; früher hatte er klargestellt, dass das Medium nicht gegen Materie drücken kann (P3).

Für die Schwerkraft hat der Autor das am selben Tag geklärt: Sie ist die Dichtedifferenz (unten, Frage 54).

Dass Gravitationswellen Materie bewegen, ist gemessen [F]: Sie dehnen und stauchen die Messstrecken von LIGO, und ein verschmolzenes Schwarzes Loch kann durch die abgestrahlten Wellen einen Rückstoss von über 1000 km/s erhalten (Varma und Kollegen, 2022). Als Ursache der Schwerkraft muss Le Sages Bild aber drei bekannte Prüfsteine bestehen (Frage 54). Erstens entsteht ein Schatten nur, wenn die Teilchen oder Wellen von der Materie verschluckt werden; prallen sie elastisch ab, füllt sich der Schatten wieder auf, und es bleibt keine Kraft. Verschluckte Energie würde die Körper aber aufheizen (Maxwell, 1875; Poincaré, 1908). Zweitens müssten Körper einander abschirmen; bei Sonnenfinsternissen müsste der Mond die Schwerkraft der Sonne schwächen. Die Laser-Entfernungsmessung zum Mond begrenzt diese Abschirmung auf weniger als 10^{-22} m² pro Kilogramm (Eckhardt, 1990). Mit dieser Grenze müsste jedes Kilogramm Materie mindestens etwa 10^{21} Watt aufnehmen, damit die gemessene Schwerkraft herauskommt (Rechnung von Claude: Leistung pro Kilogramm $\approx 4\pi Gc$ geteilt durch die Abschirmung);

die Sonne erzeugt pro Kilogramm etwa 0,0002 Watt. Drittens ist Materie für Gravitationswellen fast völlig durchsichtig und wirft für sie kaum einen Schatten.

Zum ersten Prüfstein (»Verschluckte Energie würde die Körper aber aufheizen«) schreibt der Autor: »Das nennt man Kernfusion!« [P] (Nachtrag vom 4. November 2026).

Zwei Arten von Erwärmung sind hier zu trennen [F]. Die erste ist gemessen und passt: Ein Körper, den die Schwerkraft zusammendrückt, heizt sich auf; im Kern der Sonne reicht das für etwa 15 Millionen Grad, und erst dann zündet die Fusion. Das folgt aus der gemessenen Stärke der Schwerkraft, gleich wie man sie deutet. Die zweite ist die Erwärmung, die Le Sages Bild verlangt: Weil die Kraft mit der Masse wächst, müsste jedes Kilogramm Materie die Energie aufnehmen, auch ein kalter Stein, und zwar mindestens etwa $2{,}5 \cdot 10^{21}$ Watt (Rechnung von Claude, siehe oben). Gemessen ist viel weniger. Die Sonne strahlt $3{,}828 \cdot 10^{26}$ Watt ab (IAU, 2015), das sind etwa 0,0002 Watt pro Kilogramm und damit etwa 10^{25}-mal zu wenig. Aus der Erde fließen rund 44 Billionen Watt Wärme, etwa 0,000000000007 Watt pro Kilogramm, und knapp die Hälfte davon stammt aus dem radioaktiven

Zerfall von Uran und Thorium, gemessen über Geoneutrinos (KamLAND, 2011). Nach Le Sage müsste die Erde etwa $1{,}5 \cdot 10^{46}$ Watt abgeben, rund 10^{20}-mal so viel, wie die Sonne abstrahlt. In Steinen und im Erdinneren findet keine Fusion statt. Die Fusion in der Sonne ist außerdem direkt gemessen: Borexino hat die Neutrinos aus der Verschmelzung zweier Protonen nachgewiesen, und die Leistung, die sie heute anzeigen, stimmt mit dem Licht überein, das vor etwa 100.000 Jahren im Kern entstand (Borexino, 2014). Die Fusion setzt dabei Energie aus der Masse der Kerne selbst frei, bei vier Protonen zu Helium etwa 0,7 % der Masse; bis zum Eisen wird bei der Fusion Energie frei, erst schwerere Kerne binden Energie. Der Autor hat klargestellt, dass er mit der Kernfusion die erste Art meint (nächster Absatz).

Für die Fusion muss ein bestimmter Druckpunkt überschritten werden [P]. Die Erwärmung kommt daher, dass die Atome Energie aufnehmen und in Bewegung umwandeln; mehr Bewegung, mehr Hitze [P]. Bei der Kernfusion werden zwei Energiefelder so nah zusammengebracht, dass ein Teil davon gefangen und ein Teil abgestrahlt wird [P].

Alle drei Aussagen stimmen mit den Messungen überein [F]. Wärme ist die Bewegung der Teilchen; Clausius nannte seine Arbeit von 1857 »Ueber die Art der Bewegung, welche wir Wärme nennen«. Für Fusionsreaktoren ist die Schwelle als Lawson-Kriterium bekannt: Dichte, Temperatur und Einschlusszeit müssen zusammen einen Mindestwert übersteigen (Lawson, 1957). Die Kerne müssen dabei so nah zusammenkommen, dass ihre elektrische Abstoßung überwunden wird. Nach der klassischen Mechanik bräuchte das rund zehn Milliarden Grad; der Sonnenkern hat nur etwa 15 Millionen Grad. Die Kerne kommen trotzdem zusammen, weil sie durch die Abstoßung hindurchtunneln, eine Folge der Quantenmechanik (Gamow, 1928; Atkinson und Houtermans, 1929); das gehört zu den Grenzen der klassischen Mechanik (Frage 47). Beim Verschmelzen bleibt ein Teil der Energie im neuen Kern gebunden, der Rest wird als Strahlung, als Neutrinos und als Bewegung der Teilchen abgegeben; der Heliumkern aus vier Protonen ist etwa 0,7 % leichter als die vier Protonen (Bethe, 1939). Für Le Sage folgt aus der zweiten Aussage aber [F]: Wenn Atome verschluckte Energie in Bewegung umwandeln, wird sie zu Wärme, so wie Maxwell und Poincaré es beschrieben haben. Wohin die mindestens $2{,}5 \cdot 10^{21}$ Watt pro Kilogramm gehen, die Le Sages Bild verlangt, beantwortet die Messung: Sie gehen nirgends hin, denn kein Körper erwärmt sich so; die Erde gibt gemessen rund 47 Terawatt Wärme ab (Davies und Davies, 2010), nicht 10^{46} Watt. Le Sages Stoßbild scheidet als Ursache der Schwerkraft daher aus; im Modell ist die Schwerkraft das Dichtegefälle, das keine Leistung aufnimmt (Frage 54).

Le Sage bezieht sich auf extreme Druckspitzen, sehr intensiv, aber kurzfristig [P]. In der Sonne herrscht ein statischer Druck [P]. Nur durch Druckwellen können Elemente wie Gold entstehen; in der Sonne funktioniert das nicht [P]. (Nachtrag vom 4. November 2026.)

Le Sage selbst beschrieb einen gleichmäßigen Strom sehr schneller Teilchen aus allen Richtungen (Le Sage, 1784) [F]. Jeder einzelne Stoß ist kurz;

ihre Summe wirkt wie ein gleichmäßiger Druck, so wie der Gasdruck aus sehr vielen Stößen der Moleküle entsteht. Seltene, starke Druckspitzen sind daher eine Erweiterung des Autors. Für die Prüfsteine zählt der Mittelwert [F]: Die gemessene Schwerkraft ist der Mittelwert aller Stöße, und die aufgenommene Leistung ist es ebenso. Kurze, starke Spitzen senken die nötigen mindestens $2{,}5 \cdot 10^{21}$ Watt pro Kilogramm daher nicht. Zwischen seltenen Spitzen schwankt die Schwerkraft nicht, gemessen ist sie zeitlich konstant auf etwa 10^{-13} pro Jahr (Hofmann und Müller, 2018); nach der Klärung des Autors ist die Schwerkraft eine Dichteanomalie in einem geschlossenen Wirbel, und die Druckwellen erzeugen nur die Wirbel (Frage 54, beantwortet).

Dass in der Sonne kein Gold entsteht, stimmt mit den Messungen überein [F]: Die Sonne verschmilzt heute Wasserstoff zu Helium (Borexino, 2014). Ihr Druck ist im Mittel statisch; schwache Druckwellen gibt es auch in ihr, die Fünf-Minuten-Schwingungen ihrer Oberfläche (Leighton, Noyes und Simon, 1962). Elemente schwerer als Eisen entstehen, wenn Kerne Neutronen einfangen; Neutronen sind ungeladen und müssen keine elektrische Abstoßung überwinden (Burbidge, Burbidge, Fowler und Hoyle, 1957). Der schnelle Weg, der r-Prozess, braucht heftige, kurze Ereignisse wie die Verschmelzung zweier Neutronensterne. Bei GW170817 wurden 2017 erst die Gravitationswellen der Verschmelzung gemessen und danach im Licht frisch entstandene schwere Elemente, darunter Strontium (Watson und Kollegen, 2019). Gold stammt überwiegend aus diesem Weg, Europium zu etwa 94 % (Serminato und Kollegen, 2009). Der langsame Weg, der s-Prozess, läuft dagegen über Jahrtausende im Inneren alter Riesensterne ab. Merrill fand 1952 Technetium in solchen Sternen; es hat keine stabile Form und zerfällt innerhalb weniger Millionen Jahre, muss also im Stern selbst entstanden sein. Aus diesem langsamen Weg stammen etwa 78 % des Bariums und 84 % des Bleis (Serminato und Kollegen, 2009). Für Gold trifft »nur durch Druckwellen« damit weitgehend zu, für alle schweren Elemente aber nicht (Frage 55).

Gravitationswellen übertragen sich durch das Neutrinomedium [P]. Je höher der Druck der Druckwelle, desto höher die Dichte an Neutrinos [P]. Die Neutrinos sind der Ätherwind [P]. (Nachtrag vom 4. November 2026.)

Ein Teil davon passt zu den Messungen [F]. Wo Materie am stärksten zusammengedrückt wird, entstehen die meisten Neutrinos: Bei SN 1987A gingen 99 % der Energie als Neutrinos weg (4.5). Bei der Verschmelzung zweier Neutronensterne wird das herausgeschleuderte Material von Stoßwellen aufgeheizt und von Neutrinos durchstrahlt; nach Modellrechnungen legen die Neutrinos damit fest, wie neutronenreich es ist, und so entsteht die ganze Reihe schwerer Kerne bis über Gold hinaus (Wanajo und Kollegen, 2014). Das schließt an die frühere Aussage des Autors an, dass schwere Elemente wie Gold durch Druckspitzen in expandierender Materie entstehen. Zu unterscheiden sind dabei Neutronen und Neutrinos: Gold wird aus Neutronen aufgebaut, die fast so schwer sind wie Protonen. Neutrinos wiegen weniger als 0,45 eV, mehr als eine Million Mal weniger als ein Elektron

(KATRIN, 2025); sie verwandeln Neutronen in Protonen und umgekehrt, werden aber nicht in die Kerne eingebaut.

Als Medium der Gravitationswellen und als Teilchen nach Le Sage müssen die Neutrinos drei Prüfsteine bestehen (Frage 7, Frage 54). Erstens die Geschwindigkeit: Gravitationswellen laufen auf 15 Stellen genau mit Lichtgeschwindigkeit (GW170817) und schwingen quer, Druckwellen dagegen längs (GW170814; 2.7). Neutrinos haben eine Masse, das zeigen ihre Oszillationen (Fukuda und Kollegen, 1998), und sind daher langsamer als Licht. Eine Druckwelle in einem Gas aus Teilchen läuft langsamer als die Teilchen selbst, auch bei fast lichtschnellen Teilchen nur mit etwa 58 % von c. Zudem stoßen Neutrinos fast nie

aneinander: Die Neutrinos aus dem frühen Universum fliegen frei, ohne Druckwellen zu bilden; das zeigt eine gemessene Verschiebung der Schwingungen in der Hintergrundstrahlung (Follin und Kollegen, 2015). Zweitens die Stärke: Damit Le Sages Schub die Schwerkraft ergibt, braucht der Teilchenstrom bei der gemessenen Abschirmgrenze mindestens etwa $8 \cdot 10^{34}$ Joule pro Kubikmeter (Rechnung von Claude: $4\pi G$ geteilt durch das Quadrat der Abschirmung). Die Sonnenneutrinos bringen an der Erde rund 10^{-7} Joule pro Kubikmeter mit (Rechnung von Claude aus den gemessenen Flüssen; Borexino, 2014), etwa 10^{42}-mal zu wenig. Umgekehrt müsste Materie die Neutrinos dann so stark verschlucken, dass schon etwa 1 cm Wasser zwei Drittel aufhält; gemessen ist die Erde für Neutrinos bis zu Energien von etwa 40 TeV durchsichtig (IceCube, 2017). Drittens der Ätherwind: Einen Strom von Neutrinos gibt es, etwa von der Sonne nach außen. Licht wird von ihm aber nicht mitgenommen; Michelson und Morley fanden 1887 keinen Ätherwind für Licht (Einordnung). Ob die Neutrinos das Medium selbst sind oder ein Strom durch das Medium, hat der Autor beantwortet (nächster Absatz).

Die Neutrinos sind sowohl das Medium selbst als auch ein Strom durch das Medium [P]. Die Gravitation hat mit Le Sages Druckwellen nur wenig zu tun; Schwerkraft ist die Dichtedifferenz [P]. (Nachtrag vom 4. November 2026.)

Damit bleibt die Schwerkraft beim Dichtegefälle aus diesem Abschnitt, das im schwachen Feld dieselben Ergebnisse liefert wie die Allgemeine Relativitätstheorie [F]. Die Prüfsteine für Le Sage als Ursache der Schwerkraft, Erwärmung und Abschirmung, treffen das Modell dann nicht. Ein kleiner Anteil von Le Sage an der Schwerkraft müsste sie im kleineren Maßstab bestehen, denn die nötige Erwärmung wächst mit dem Anteil. Dass Gravitationswellen Materie anschieben, bleibt gemessen; ihre Energie ist an der Erde aber winzig (2.7). Sind die Neutrinos Anregungen des Mediums, wie in P2 vorgeschlagen, laufen die Gravitationswellen durch das Medium selbst und nicht über Stöße der Neutrinos untereinander [F]. Dann gilt die Grenze von etwa 58 % der Lichtgeschwindigkeit für ein Gas nicht, wohl aber die Prüfsteine für ein hartes Medium aus P2: Längswellen schneller als c, die kaum Energie forttragen dürfen (Frage 29). Neutrinomedium und Dichtemedium sind ein Medium: Die Neutrinos sind nicht der Grundbestandteil,

sondern ein Strom von Anregungen im selben Medium (2.1); gemessen tragen sie Energie und Impuls und laufen fast mit c, bei SN 1987A auf etwa 2 · 10⁻⁹ (Frage 7).

Gravitationswellen übertragen sich vermutlich über Neutrinos [P]. Daraus könnte folgen, dass die Neutrinos auch Atome mit Energie versorgen; mehr Energie bedeutet mehr Masse [P]. Wenn ein Körper Energie aufnimmt, muss er entweder schneller drehen, oder er wird warm, weil sich die Atome schneller bewegen und mehr Reibung entsteht [P]. (Nachtrag vom 5. November 2026.)

Die erste Aussage hat der Autor schon am 4. November gemacht; für sie gelten die drei Prüfsteine oben (Frage 7) [F]. Berechnet ist eine Verbindung in umgekehrter Richtung: Die frei fliegenden Neutrinos des frühen Universums tragen Gravitationswellen nicht weiter, sondern schwächen sie. Nach Weinberg (2004) verringern sie die Stärke aller Gravitationswellen, die schon schwangen, als Strahlung das Universum beherrschte, um 35,6 %; bei den längsten Wellen sind es etwa 10 %. Die Neutrinos nehmen dabei einen Teil der Wellenenergie auf. Das passt dazu, dass Neutrinos Energie aufnehmen und abgeben, aber nicht dazu, dass sie die Wellen tragen.

Dass aufgenommene Energie die Masse erhöht, ist gemessen [F]. Rainville und Kollegen (2005) verglichen die Massen von Silizium- und Schwefelatomen vor und nach dem Einfang eines Neutrons in einer Ionenfalle mit der Wellenlänge der dabei ausgesandten Gammastrahlung; $E = mc^2$ stimmte auf mindestens 0,00004 %. Dass Neutrinos Materie Energie geben, ist ebenfalls gemessen, denn nur so lassen sie sich nachweisen: Borexino sieht die Elektronen, die von Sonnenneutrinos angestoßen werden (Borexino, 2014).

Die Menge ist allerdings winzig [F]. Von den Sonnenneutrinos, die die Erde durchqueren, nimmt sie insgesamt nur etwa 7 Kilowatt auf (Rechnung von Claude, Größenordnung, aus den gemessenen Flüssen und der Streuung an Elektronen). Das entspricht rund 2 Milligramm Masse pro Jahr und etwa einem Zehnmilliardstel der Wärme aus dem Erdinneren (oben: rund 44 Billionen Watt). Fast alle Neutrinos fliegen ungehindert hindurch; die Erde ist für sie bis etwa 40 TeV durchsichtig (IceCube, 2017). Ginge die ganze aufgenommene Energie in die Drehung der Erde, würde der Tag um etwa 4 · 10⁻¹² Sekunden pro Jahrhundert kürzer (Rechnung von Claude); gemessen wird er um 1,8 Millisekunden pro Jahrhundert länger (Tageslänge, unten). Für die Frage, welche Strömung die Erde anschiebt, scheiden die Sonnenneutrinos damit aus.

Dass ein Körper durch aufgenommene Energie schneller dreht oder warm wird, ist beides gemessen [F]. Warm wird er fast immer, denn Wärme ist die ungeordnete Bewegung der Atome selbst (oben, Clausius 1857). Reibung ist dabei nicht die Ursache der Wärme, sondern der Vorgang, der geordnete Bewegung in ungeordnete umwandelt, etwa beim Bremsen. Schneller drehen kann ein Körper nur, wenn zur Energie ein Drehimpuls kommt, also ein Drehmoment wirkt. Beim Asteroiden (54509) 2000 PH5 ist das gemessen: Sonnenlicht erwärmt ihn, er strahlt die Wärme ungleichmäßig wieder

ab, und der Rückstoß verkürzt seine Drehdauer um 1 Millisekunde pro Jahr (YORP-Effekt; Lowry und Kollegen, 2007). Der größte Teil der Energie geht dabei als Wärme wieder fort; nur der ungleichmäßige Teil des Rückstoßes dreht ihn. Daneben gibt es weitere Wege: Schmelzendes Eis nimmt 334 Kilojoule pro Kilogramm auf und bleibt dabei bei 0 °C; Energie kann in chemische Bindungen gehen, als Licht wieder abgestrahlt werden oder den Körper als Ganzes anschieben. In jedem dieser Fälle wächst die Masse um E/c^2, auch durch die Drehung [F].

Vorschlag zur Prüfung: »Nimmt ein Körper Energie auf, wird sie meist zu ungeordneter Bewegung seiner Atome, also zu Wärme. Schneller drehen kann er nur, wenn zugleich ein Drehmoment wirkt. Reibung wandelt geordnete Bewegung in Wärme um.« Beantwortet im Zusammenhang von Frage 56.

Schwerkraft ist eine Dichteanomalie in einem geschlossenen System, in einem Wirbel [P]. Die Druckwellen erzeugen diese Wirbel [P]. (Nachtrag vom 4. November 2026.) Damit ist die Rolle der Druckwellen geklärt: Sie tragen die Schwerkraft nicht selbst, sondern erzeugen die Wirbel, deren Dichteanomalie die Schwerkraft ist. Das passt zu P3 und zu den geschlossenen Strings, die stabil sind und Masse haben (Frage 49).

Beide Aussagen haben Vorbilder in der Strömungslehre [F]. Wo eine Druckwelle durch einen Dichteunterschied läuft, erzeugt sie Wirbel, weil Druck- und Dichtegefälle dann in verschiedene Richtungen zeigen; gemessen ist das als Richtmyer-Meshkov-Instabilität (Richtmyer, 1960; Meshkov, 1969). Ein kurzer Druckstoß durch eine Öffnung formt einen Wirbelring, wie einen Rauchring (Gharib, Rambod und Shariff, 1998). In einem reibungsfreien Medium können Wirbellinien nicht einfach enden; sie schließen sich zu Ringen, und ihre Stärke bleibt erhalten (Helmholtz, 1858; Kelvin, 1869). Ein geschlossener Wirbel ist also ein dauerhaftes, in sich geschlossenes System. Anders als bei Descartes tragen die Wirbel hier nicht die Planeten; Newtons Einwand, Descartes’ Wirbel ergeben nicht Keplers drittes Gesetz (Principia, Buch II), trifft das Modell daher nicht, denn die Bahnen folgen aus dem Dichtegefälle (3.1).

Zwei Prüfsteine bleiben (Frage 56) . Erstens der Abfall: Um einen geschlossenen Wirbelring fällt die Strömung in großem Abstand wie $1/r^3$ ab, wie bei einem Dipol, ihr Unterdruck daher wie $1/r^6$ (Batchelor, 1967). Für Newtons Gesetz muss die Dichteanomalie aber wie $1/r$ abfallen (2.1). Dieser Abfall kommt nicht aus dem einzelnen Wirbel, sondern aus dem Gewicht des Mediums: Hydrostatik mit $\Delta p = c^2 \Delta \rho$ gibt um jede Masse den Hof $\rho/\rho_\infty = \exp(GM/(rc^2))$, in erster Ordnung $1 + GM/(rc^2)$, also $1/r$ (Anhang B; Frage 42). Zweitens die Richtung: Die Schwerkraft eines Körpers hängt gemessen nur von seiner Masse ab, alle Stoffe fallen auf 10^{-15} genau gleich (MICROSCOPE). Einen kleinen Wirbelanteil gibt es: Die Erde dreht sich mit dem Medium, und das Medium dreht auch Kreisel in der Umlaufbahn ein wenig; Gravity Probe B maß 37,2 ± 7,2 Millibogensekunden pro Jahr, vorhergesagt waren 39,2 (Everitt und Kollegen, 2011). In einem Körper müssen sich die Drehrichtungen der vielen Wirbel also ausgleichen, während sich ihre

Dichteanomalien addieren.

Gefragt ist nicht, wie stark die Erde ihr Medium mitzieht, sondern wie stark die Erde vom Medium gedrückt wird [P]. Die Erde dreht sich mit dem Medium, nicht das Medium mit der Erde [P]. (Korrekturen der Wortwahl vom 4. November 2026.)

Gravity Probe B misst beide Teile dieser Frage [F]. Den ruhenden Teil, den Druck der Dichteanomalie, zeigt die geodätische Drehung der Kreisel: gemessen 6601,8 ± 18,3 Millibogensekunden pro Jahr, vorhergesagt 6606,1. Den drehenden Teil zeigt die zusätzliche Drehung von 37,2 ± 7,2, vorhergesagt 39,2 (Everitt und Kollegen, 2011). Das Medium in Bahnhöhe dreht einen Kreisel also nur mit etwa einem Zehnmilliardstel der Erddrehung (rund $8 \cdot 10^{-11}$, Rechnung von Claude). Die Messung legt fest, wie stark der Druck und sein drehender Anteil sein müssen.

Zwei Lesarten führen hier zu verschiedenen Vorhersagen . In der ersten dreht sich das Medium rings um die Erde wie ein fester Block, und die Erde dreht sich darin mit. Dann müsste das Medium einen Kreisel in Bahnhöhe etwa zehn Milliarden Mal stärker drehen als gemessen. In der zweiten ist die Erde der sich drehende Kern eines Wirbels: Außen kreist das Medium um die Erde, seine Geschwindigkeit nimmt nach außen ab, und es kreist dort ohne eigene Drehung, wie beim Rankine-Wirbel der Strömungslehre. Ein kleiner Körper wird dann herumgeführt, aber nicht gedreht, wie eine Gondel am Riesenrad. Diese Lesart erklärt, warum die Kreiseldrehung so klein ist. Den gemessenen Rest von 37,2 liefert $\gamma = 1$: Die Mitführung beträgt $(1 + \gamma)/2$ des Einstein-Werts, also 39,2 Millibogensekunden pro Jahr, gemessen 37,2 ± 7,2 (Everitt und Kollegen, 2011). Sie ist ein Vorschlag zur Prüfung: Fällt die Geschwindigkeit wie bei einem Wirbelfaden mit dem Abstand ab, strömt das Medium in Bahnhöhe über dem Äquator mit etwa 420 m/s ostwärts (Rechnung von Claude); messen lässt sich diese Strömung mit Kreiseln und Satellitenbahnen in Erdnähe: Gravity Probe B und die Laserbahnen von LAGEOS (Ciufolini und Pavlis, 2004) messen die Mitführung, und sie entspricht dem Wert aus $\gamma = 1$. Beantwortet mit $\gamma = 1$ in Abschnitt 2.14.

Eine dritte Lesart folgt aus dem Nachtrag in 3.4, dass Wirbel durch Strömungen entstehen, die träge Masse anschieben [F]. Wie das Wasser im Hof des Strömungsversuchs wird die Erde von einer vorbeiströmenden Strömung angeschoben und dreht sich; außerhalb ihrer Wände strömt das Medium vorbei, ohne mit ihr zu kreisen, so wie im Versuch die Hauptströmung am Hof vorbeiläuft. Das passt zur kleinen Kreiseldrehung in Bahnhöhe; den Rest von 37,2 liefert auch hier $\gamma = 1$ (oben). Die erste Lesart scheidet damit aus: Sie widerspricht der Messung und passt nicht zum Nachtrag. Welche Strömung die Erde anschiebt, zeigt die Tageslänge: Nach historischen Finsternisberichten und neueren Messungen von 720 v. Chr. bis 2015 wird der Tag im Mittel um 1,8 Millisekunden pro Jahrhundert länger; die Gezeitenreibung allein ergäbe 2,3, die Abweichung schreibt man der Hebung des Bodens nach der Eiszeit und der Kopplung von Erdkern und Mantel zu (Stephenson, Morrison und Hohenkerk, 2016). Ein Antrieb durch eine Strömung muss in diese Bilanz passen.

Warum die Herleitung der Schwerkraft fehlt, und zwei Wege dahin [F]. (Zur Frage des Autors vom 5. November 2026, warum die Herleitung fehlt, obwohl es genug Formeln der Wärmelehre gibt; Stand 5. November, seit dem 6. November ist die Brechzahl für das schwache Feld aus der Lufthülle des Autors hergeleitet, Frage 1, unten.) Die Brechzahl $n = 1 + 2GM/(rc^2)$ ist bisher übernommen, nicht hergeleitet (Frage 1). Dazu fehlen zwei Angaben über das Medium: wie sein Druck von der Dichte abhängt und wie ein Wirbel,

also Materie, die Dichte ringsum verändert. Die beiden naheliegenden Bilder scheitern: Ein fester elastischer Stoff bildet keinen Dichtehof (Frage 42), und um einen Wirbelring fällt die Strömung wie $1/r^3$ ab (oben). Die Herleitungen aus der Wärmelehre von Jacobson (1995), Verlinde (2011) sowie Dorau und Much (2026) setzen die Entropie eines Horizonts und eine Temperatur voraus und ergeben die Krümmung der Raumzeit, nicht die Dichte eines Mediums im flachen Raum; sie sind ein Vorbild, keine Herleitung aus dem Medium.

Vorschlag zur Prüfung, erster Weg: Fließt etwas, das erhalten bleibt, gleichmäßig durch den dreidimensionalen Raum zu einem Körper hin oder von ihm weg, verteilt es sich auf Kugelflächen der Größe $4\pi r^2$. Der 1/r-Hof folgt im Modell aus Anhang B; Der Fluss pro Fläche fällt dann wie $1/r^2$ und das zugehörige Gefälle wie 1/r; so verteilt sich die Wärme um eine Quelle, die gleichmäßig heizt, und genau diese Form hat Newtons Gesetz (Gaußscher Satz; Rechnung von Claude). Der Abfall wie 1/r folgt dann aus der Geometrie allein, wie es der Satz des Autors meint, dass sich Wellen mit einem Radius ausbreiten (2.7). Prüfsteine: Was fließt, muss genau mit der Masse wachsen (MICROSCOPE), und die Körper dürfen dabei weder an Masse zunehmen noch sich erwärmen (Le Sage, oben); Zu- und Abstrom müssen sich also ausgleichen, wie es der Autor für die Drehung sagt (3.4).

Seifenblasen und die Tafelskizzen des Autors (6. November 2026). Zum ersten Weg: So entstehen doch Seifenblasen; wenn Seifenblasen schnell rotieren, sind sie stabiler, weil die Flüssigkeit nicht herunterlaufen kann, sondern durch die Fliehkraft erhalten bleibt [P]. Abgleich [F]: Eine Blase ist kugelförmig, weil die Oberflächenspannung bei gegebenem Volumen die kleinste Fläche sucht (Plateau, 1873). Ihre Flüssigkeit bleibt erhalten und verteilt sich auf $4\pi r^2$; die Haut wird beim Aufblasen wie $1/r^2$ dünner (Rechnung von Claude). Für Newtons Gesetz muss dieselbe Menge zugleich durch jede Kugelschale um die Masse gehen. Genau das tut eine pulsierende Blase in einer Flüssigkeit: Sie drückt Flüssigkeit hinaus und holt sie zurück, durch jede Kugelschale fließt in jedem Augenblick dieselbe Menge, und eine zweite, gleichtaktig pulsierende Blase wird mit einer Kraft wie $1/r^2$ zu ihr hingedrückt, eine gegentaktige weggedrückt (Bjerknes, 1906; Lanoy und Kollegen, 2015). Über eine Schwingung gemittelt kehrt das verdrängte Volumen zum Ausgangswert zurück, und Zu- und Abstrom gleichen sich aus, wie es der Autor für die Gravitationswellen aus allen Richtungen sagt (Frage 69). Ob die Schwingung dabei Energie an das Medium abgibt oder in Wärme umsetzt, ist gesondert zu bilanzieren, denn im Versuch wird sie von

außen mit Schall angetrieben; was sie im Medium unterhält, ist dieselbe Frage wie in Frage 76, welche Quelle im Takt Energie nachliefert. Bei starker Kopplung ändert sich die Kraft mit dem Abstand, bis hin zum Wechsel von Hindrücken in der Ferne zu Wegdrücken in der Nähe (Lanoy und Kollegen, 2015). Prüfsteine : Alle Materie müsste im gleichen Takt schwingen, mit einer Stärke, die genau mit der Masse wächst (MICROSCOPE), denn nach der Formel für pulsierende Blasen hebt sich die Fernwirkung zweier gleicher, gegentaktig schwingender Körper auf, statt sich zu verdoppeln; die erste Frage aus einer Prüfung durch ChatGPT, was im Bild des Autors pulsiert, beantwortet der Autor im folgenden Absatz; für die Schwerkraft braucht das Modell den Takt nicht, denn sie ist das Dichtegefälle des Hofs, und Höfe addieren sich im schwachen Feld linear (Anhang B); die Bjerknes-Kraft mit ihrem Takt gehört zur Ladung (Anhang F); und $1/r^2$ gilt nur auf Abständen weit unter der Wellenlänge der Schwingung, die damit ein Kandidat für die Länge ℓ ist (Frage 42). Zur Drehung [F]: Richtig ist, dass die Flüssigkeit bei schneller Drehung nicht mehr nach unten, sondern nach außen läuft. Gemessen treibt die Fliehkraft die Flüssigkeit einer Seifenhaut aber wie die Schwerkraft ab, die Haut wird von der Drehachse nach außen dünner (Monier und Kollegen, 2023), und zwar umso schneller, je schneller sie dreht (Monier und Kollegen, 2026). Gemessen ist das an ebenen Seifenhäuten in einem Rahmen; die Übertragung auf eine geschlossene Blase ist ein eigener Schritt. Danach sollte sich an einer drehenden Blase die Flüssigkeit am Äquator sammeln und die Pole dünner werden, wie bei schnell drehenden

Sternen (Achernar, 3.1); dass schnell drehende Blasen länger halten, ist nicht gemessen . Zu den Skizzen [F]: Die drei Achsen X, Y und Z bis ins Unendliche (Notizbuch, Tafel »Oktanten«) sind der Grund für $1/r^2$: In drei Dimensionen wächst die Kugelfläche mit r^2, in d Dimensionen mit r^(d−1); im Labor stimmt $1/r^2$ zwischen 52 µm und 3 mm im Rahmen der Messgenauigkeit (Lee und Kollegen, 2020). Die Kugelfläche ist genau vier Kreisflächen πr^2 (Archimedes), jeder Oktant erhält $\pi r^2/2$. Sechs Punkte auf den Achsen und acht in den Oktanten (Notizbuch: »8 Oktanten, 6+1 Raumpunkte«; Kugelbilder des Autors) sind die Nachbarn im raumzentrierten kubischen Gitter; dessen Zelle, ein Oktaederstumpf mit 6 Quadraten zu den Achsen und 8 Sechsecken zu den Oktanten, schlug Kelvin (1887) als Zelle des Seifenschaums mit der kleinsten Wandfläche vor; Weaire und Phelan (1994) fanden einen Schaum mit 0,3 % weniger Fläche. Ostriker und Cowie (1981, im Notizbuch) ließen Galaxien in Schalen entstehen, die Explosionen zusammenschieben, wie Sterne am Rand von Gasblasen (5). In der Tabelle der Tafel »Oktanten« stehen 2 und −4 beide als + + −, 4 und −2 beide als − − +, und es fehlen + − + und − + −; nach dem Würfelnetz derselben Tafel (Mitte 1 bis 4, unten −1 bis −4) müssten 4 = + − + und −4 = − + − sein, dann sind alle acht Oktanten verschieden. Bei $V = \pi \cdot \pi \cdot \pi$ steckt die Zahl der Dimensionen im Exponenten von r, nicht von π (Kugel: $4/3 \cdot \pi \cdot r^3$).

Antwort des Autors zur ersten Frage (6. November 2026): Sind die g-Kräfte am Scheitelpunkt nicht höher? Thema Thermodynamik. Energie fällt

zum Kern, wird komprimiert, um den Kern geleitet und fließt wieder vom Kern weg, dabei dehnt sie sich aus. Richtung Oberfläche wird der Fluss wieder abgebremst, kondensiert und fällt wieder zum Kern. Eine Seifenblase hat keinen Kern [P]. Einordnung [F]: Damit pulsiert nicht der ganze Wirbel; Zu- und Abstrom wechseln in ihm, der Kern lenkt um, die Oberfläche bremst, die äußere Größe bleibt. Am Scheitelpunkt ist die Beschleunigung am größten, bei einer Schwingung an den Umkehrpunkten, bei einer Bahn um den Kern in der engsten Kurve ($a = v^2/r$). Nach der Euler-Gleichung gehört zur größten Beschleunigung der Flüssigkeit das größte Druckgefälle; bei pulsierenden Blasen entsteht die Kraft genau dort, denn sie ist das zeitliche Mittel aus Volumen mal Druckgefälle, und gleichtaktige Blasen sind am Umkehrpunkt zugleich am größten (Bjerknes, 1906; Wikipedia, Bjerknes force). Die Schwerebeschleunigung selbst ist im Mittelpunkt null und am Rand des dichten Kerns am größten, in der Erde an der Grenze zum äußeren Kern mit etwa 10,8 m/s² (Szczykulska und Kollegen, 2013); der Druck dagegen ist im Mittelpunkt am höchsten, verdichtet wird also im Kern am stärksten. Folge für Frage 42 : Ein Kreislauf, der innerhalb der Oberfläche schließt, ändert das äußere Volumen nicht; bei Blasen folgt $1/r^2$ aber gerade aus der Volumenänderung, und die Strömung eines geschlossenen Wirbels fällt außen wie $1/r^3$ ab (Batchelor, 1967; oben). Für $1/r^2$ außen muss also die Oberfläche im Takt des Kreislaufs atmen, oder es muss netto etwas durch jede Kugelschale gehen, das genau mit der Masse wächst. Gemessen pulsiert ein Körper mit innerem Kreislauf tatsächlich: Die Sonne schwingt in rund 10^7 Moden mit Perioden um 5 Minuten, angeregt von der Konvektion nahe der Oberfläche, jede Mode mit höchstens etwa 10 cm/s und mit zufälligen Phasen (Leighton, Noyes und Simon, 1962; Christensen-Dalsgaard, 2002); ein gemeinsamer Takt, wie ihn Frage 42 verlangt, ist das nicht.


Takt, Name und Bahnen im Atom (Autor, 6. November 2026): Der Takt hat doch dann etwas mit der Dichte zu tun. Das Elementarteilchen nennen wir Exkluon. Je dichter die Exkluonen dem Kern kommen, desto schneller werden sie am Kern beschleunigt, und daher ist die Bahn extrem verschoben. Bei extrem verschobenen Bahnen ist die Gefahr von Kollisionen höher. Im Prinzip ist deshalb Richtung Kern und Richtung Oberfläche die höchste Aufenthaltswahrscheinlichkeit, da sich die Exkluonen hier langsamer bewegen und mehr Gewicht haben. Deshalb werden Atome vermutlich undurchsichtig, weil die Bahnen chaotisch sind; bei geordneten Atomen sind die Schleifen (Orbitalbahnen) sehr geordnet [P]. Abgleich

[F]: Zum Takt: Im Modell hängt die Frequenz an der Dichte, denn Uhren gehen im dichteren Medium langsamer (Frage 1). Dann laufen Körper in verschieden dichtem Medium verschieden schnell, die Sonne gegenüber der Erde um etwa $2{,}1 \cdot 10^{-6}$; ihr Phasenunterschied wandert, und die Kraft zwischen pulsierenden Körpern wechselte ihr Vorzeichen. Damit sie über 300 Jahre Bahnbeobachtung hinweg zueinander drückt, müsste eine Schwingung länger als etwa einen Tag dauern (Rechnung von Claude; Frage 42). Zum Namen: Exkluon ist in der Physik nicht belegt; ähnlich klingt das Excluson, ein Teilchen mit verallgemeinerter Ausschlussstatis-

tik nach Haldane (Hatsugai, Kohmoto, Koma und Wu, 1995). Zu den Bahnen: Sommerfeld (1916) erklärte die Feinstruktur des Wasserstoffs mit Ellipsenbahnen, deren Perihel sich wie das des Merkur dreht, weil das Elektron nahe am Kern schneller und damit träger wird; bei Bahnen, die in die inneren Elektronenschalen tauchen, verschieben sich die Energiestufen (Gallagher, 1994), und diese Verschiebung lässt sich wie eine Periheldrehung berechnen (Kholodenko, 2020). Wo sich etwas langsamer bewegt, hält es sich länger auf, an den Umkehrpunkten einer Bahn am längsten; im Grundzustand des Wasserstoffs ist die Aufenthaltsdichte am Kern am größten (Schrödinger, 1926). Zur Durchsichtigkeit: Freie, ungeordnet stoßende Elektronen machen Materie undurchsichtig; die Undurchsichtigkeit des heißen Gases wächst mit der Dichte (Kramers, 1923), und das Weltall wurde erst durchsichtig, als sich die Elektronen bei der Rekombination an Atome banden (Planck-Kollaboration, 2020). : »Am Kern beschleunigt« und »Richtung Kern langsamer« passen nur zusammen, wenn die Zusammenstöße die Exkluonen dort abbremsen; so ist es hier gelesen. »Mehr Gewicht« ist als größeres statistisches Gewicht gelesen, also längere Verweildauer; als Masse wäre es nach Sommerfeld umgekehrt, die schnellen Teilchen am Kern sind die trägeren. Die gemessenen Energiestufen folgen aus den Eigenmoden der Strömung: Der Wellenleiter um den Kern gibt $E_n = -\mathrm{hcR}\infty/n^2$ mit $\mathrm{hcR}\infty = 13{,}605693$ eV (Anhang E; Frage 28).

Durchsichtig durch Ausrichtung (Abgleich vom 10. November 2026). Das Bild des Autors [P]: Elektronen sind Stürme mit stillem Auge; sind die Achsen der Atome ausgerichtet, liegen die Augen in einer Linie, und man kann hindurchsehen. Abwechselnde Ladung koppelt dabei die Ströme wie Perlen auf einem Pfeifenreiniger. Das gemessene Gegenstück ist die Kanalisierung [F]: Zeigt eine Kristallachse zum Strahl, laufen geladene Teilchen viel tiefer hinein; die Rückstreuung sinkt oft auf 2 bis 5 %, und schon eine Verkippung unter 1° zerstört den Effekt (Robinson und Oen, 1963; Lindhard, 1965; Davies, Denhartog und Whitton, 1968; Gemmell, 1974). Genau genommen laufen die Teilchen in den offenen Gängen zwischen den Atomreihen; die Kerne selbst sind das Hindernis. Sichtbares Licht ist dagegen rund zweitausend Atomabstände lang. Ob ein Stoff für das Auge klar ist, entscheidet die Bändertheorie: ob es Energiestufen gibt, an denen das Licht verschluckt wird, und ob die Struktur auf der Skala der Wellenlänge streut [F]. Diamant ist dichter als Graphit und klar, Saphir dichter als Aluminium und klar; Steinsalz mit abwechselnder Ladung ist klar, Metalle mit einem See freier Elektronen sind es nicht (Phillip und Taft, 1964). Die Kanalisierung ist also ein gemessenes Analogon; die Lesart mit den Augen bleibt [P]. Dass Kopplung durchsichtig machen kann, ist gemessen [F]: Ein sonst schluckendes Gas lässt Licht durch, wenn ein zweiter Lichtstrahl passende Zustände koppelt, die elektromagnetisch induzierte Transparenz (Harris, Field und Imamoğlu, 1990; Boller, Imamoğlu und Harris, 1991). Ein Trenntest [V]: Sichtbares Licht an einem kubischen Kristall wie Diamant zeigt nach der Bändertheorie keine Senke mit der Richtung, wie sie Ionen zeigen; ein Vielkristall streut, ein Einkristall gleicher Zusammensetzung nicht

(Apetz und van Bruggen, 2003). Eine Richtungssenke im Sichtbaren würde die Lesart mit den Augen stützen.



Links: geometrische Lesart. Die Ringe sind die Elektronenstürme (Donut, Zitterbahn), die Öffnung ist das stille Auge. Blau und Rot stehen für abwechselnde Ladung, wie in der Perlenkette. Rechts oben: typische Form einer Kanalisierungssenke mit gemessenen Kenngrößen. Im Minimum bleiben oft 2 bis 5 Prozent der zufälligen Rückstreuung, die halbe Breite liegt typisch unter 1° (Davies, Denhartog und Whitton 1968, DOI 10.1103/PhysRev.165.345; Gemmell 1974, DOI 10.1103/RevModPhys.46.129). Die Kurve ist keine Digitalisierung einer einzelnen Abbildung. Rechts unten: Durchlass einer 1-mm-Schicht bei 550 nm. Bei den klaren Stoffen begrenzt nur die Reflexion an den Flächen, berechnet aus der Brechzahl. Silicium nach Aspnes und Studna 1983 (DOI 10.1103/PhysRevB.27.985), Aluminium nach Rakić 1998 (DOI 10.1364/AO.37.005271), Diamant nach Phillip und Taft 1964 (DOI 10.1103/PhysRev.136.A1445). Dichten in g/cm³.

Abbildung 1: Durchblick: links die Lesart mit ausgerichteten Augen in einer Linie, abwechselnd geladen, darunter verdreht; rechts oben die typische Form einer Kanalisierungssenke (Minimum oft 2 bis 5 %, halbe Breite unter 1°, keine Digitalisierung einer einzelnen Messung); rechts unten der Durchlass einer 1-mm-Schicht bei 550 nm: Diamant 71 %, Saphir 86 %, Steinsalz 91 %, Kieselglas 93 %, Silicium, Graphit und Aluminium 0 %.

Vorschlag zur Prüfung, zweiter Weg: Die Schwarzschild-Geometrie der Allgemeinen Relativitätstheorie lässt sich exakt als flacher Hintergrund beschreiben, durch den etwas wie ein Fluss in die Masse strömt, mit der Fluchtgeschwindigkeit v = √(2GM/r); bei Hamilton und Lisle ist es der Raum selbst, im Modell wäre es das Medium (Hamilton und Lisle, 2008). Der ruhende Hof ohne Netto-Fluss steht in Anhang B; Die Beschleunigung dieses Flusses ist genau Newtons GM/r² (Rechnung von Claude), und ein frei fallender Körper wird mit ihm getragen, wie es P4 sagt: Jeder Körper strömt mit dem Medium. Bei einem drehenden Körper trägt der Fluss zusätzlich eine Verdrehung (Hamilton und Lisle, 2008), das Gegenstück der Kreiseldrehung von Gravity Probe B (oben). Schall in einer strömenden Flüssigkeit folgt denselben Gleichungen wie ein Feld in einer gekrümmten Raumzeit (Unruh, 1981). Prüfsteine: Solche Strömungsmodelle bilden die Bahnen von Licht und Schall nach, nicht aber Einsteins Gleichungen selbst; welche Strömung entsteht, muss aus den Gleichungen des Mediums folgen (Barceló, Liberati und Visser, 2011). Und bleibt das Medium erhal-

ten, verlangt ein gleichmäßiger Einstrom, dass seine Dichte nach innen wie r^(−3/2) zunimmt und ständig Medium in den Körper fließt (Rechnung von Claude); ein solcher Einstrom ist aber nicht nötig: Der Hof ist ein ruhendes Gleichgewicht aus Gewicht und Strahlungsdruck des Mediums, $\rho = \rho_\infty \exp(GM/(rc^2))$, ohne Netto-Fluss, und Strömungen am Körper senken die Dichte nur, $\rho = \rho_\infty \exp(-u^2/(2c^2))$ (Anhang B). Dichtebild (Brechzahl) und Flussbild (Strömung) beschreiben in der Relativitätstheorie dieselbe gemessene Geometrie in verschiedenen Koordinaten, und der Autor meint eine Mischung aus beidem (P4).

Ein kleines Rad in einer Strömung dreht sich mit der halben Wirbelstärke, $\omega = \tfrac{1}{2}\,\nabla \times v$ (Batchelor, 1967) [F]. Die Kreisel von Gravity Probe B sind solche Räder; gemessen ist damit die Wirbelstärke des Mediums in Bahnhöhe, rund $1{,}1 \cdot 10^{-14}$ pro Sekunde (Rechnung von Claude). In der zweiten und dritten Lesart ist sie außerhalb der Erde klein, weil das Medium dort ohne eigene Drehung kreist oder vorbeiströmt. (Zu Bildern aus einem Erklärvideo über Wirbelstärke, die der Autor am 5. November 2026 gezeigt hat.)

Daraus ergibt sich ein harter Prüfstein [F]. Gestein ist mehr als 10^{23}-mal dichter als das Gas zwischen den Sternen. Eine optische Uhr, die tief im Fels des Fréjus-Tunnels stand, ging trotzdem genau so schnell, wie

es ihre Höhe im Schwerefeld der Erde verlangt (Grotti und Kollegen, 2018). Auch Licht läuft in Wasser nur 1,33-mal langsamer als im leeren Raum. Uhren und Licht folgen also nicht der Dichte direkt am Ort, sondern einer Größe, die sich aus der Masse ringsum aufbaut und mit 1/r abfällt. Das Modell verbindet beides über den Hof: Uhren folgen der Dichte des Mediums, $\rho/\rho_\infty = \exp(GM/(rc^2))$, die sich aus der Masse ringsum aufbaut und wie 1/r abfällt; Licht in Wasser verzögern dagegen die Elektronen des Wassers, ein anderer Vorgang (Frage 31).

Vorschlag zur Prüfung (aus einer Durchsicht mit Gemini, angepasst): Uhren folgen nicht der Dichte der Knoten, aus denen das Gestein besteht, sondern dem dünnen Medium zwischen ihnen; auch Gestein besteht fast nur aus Raum zwischen den Atomkernen. Beantwortet in Frage 31 und Abschnitt 2.12. In diesem Medium baut sich aus der Masse ringsum ein winziger relativer Überschuss auf, der mit 1/r abfällt, etwa $\Delta\rho/\rho_0 = 2GM/(rc^2)$ mit ρ_0 als Dichte des Vakuums [F]. Weil das Vakuum dünn ist, steckt darin kaum zusätzliches Medium: Bei einer Dichte in der Größenordnung der Dunklen Energie wären es um die Erde bis zum doppelten Erdradius nur etwa 4×10^{-14} kg. Weiter draußen wächst die Summe allerdings mit dem Quadrat des Abstands, weil die Kugelschalen schneller wachsen, als der Überschuss abfällt: Bis zum Hubble-Radius erreicht sie etwa die Masse der Erde selbst (dieselbe Übereinstimmung wie bei Sciama, 1953), bis zum Rand des beobachtbaren Universums rund das Neunfache. Weil die Gesamtmasse gleich bleibt (P2), muss der Überschuss in großem Abstand enden oder anderswo durch Ausdünnung ausgeglichen sein. Naheliegend ist der Ausgleich durch die Leerräume (aus einer Durchsicht mit Gemini): Die Verdichtung um einen Knoten fehlt dann in den angrenzenden Leerräumen, und über eine gan-

ze Zelle aus Knoten und Leerraum summiert sich der Überschuss zu null. Das passt dazu, dass sich Körper von Leerräumen fortbewegen (5.7, Dipole Repeller), und entspricht dem Standardbild der Kosmologie, in dem nur die Abweichung von der mittleren Dichte Schwerkraft erzeugt. Bis zur Größe typischer Leerräume von einigen hundert Millionen Lichtjahren bleibt der Überschuss um die Erde verschwindend klein. Mit einem dichten Vakuum, wie es die Quantenfeldtheorie annimmt, wäre es mehr als eine Sonnenmasse; der Vorschlag passt also nur zum dünnen Vakuum des Autors. Atome spüren als Uhren nur das Medium zwischen den Knoten, weil Gang und Größe der Uhr der Dichte am Ort folgen, $n = (\rho/\rho\infty)^2$, und diese setzt sich aus den Höfen aller Massen zusammen (Frage 31; Uhren auf $7 \cdot 10^{-5}$ bestätigt, Vessot 1980).

Was das Medium dafür können muss [F]. Dass der Überschuss wie 1/r abfällt, folgt nicht von selbst. In einer ruhenden Flüssigkeit ist der Druck außerhalb eines Knotens überall gleich und damit auch die Dichte. In einem festen, elastischen Stoff gilt ein klassisches Ergebnis: Wird ein kleiner Bereich zusammengedrückt oder aufgebläht, wird die Umgebung nur geschert, nicht verdichtet; außerhalb bleibt die Dichte genau gleich (Eshelby, 1957; Lazar, 2019). Ein hartes Medium, wie es P2 für die Querwellen braucht, bildet um einen Knoten also von sich aus keinen Dichtehof, der wie 1/r abfällt; erst in zweiter Näherung entstehen winzige Änderungen, die viel schneller abklingen. Es braucht eine weitere Eigenschaft (Frage 42).

Vorschlag zur Prüfung: Das Medium hat zusätzlich Energie, wenn benachbarte Bereiche verschieden dicht sind. Das passt zum Grundsatz, dass nur Unterschiede wirken (P3). Solche Stoffe beschreibt die Gradientenelastizität (Mindlin, 1964; Aifantis, 1992). Der Hof braucht diese Länge nicht; er folgt aus Anhang B. Darin fällt die Verdichtung um einen Knoten wie e^(−r/ℓ)/r ab (Lazar, 2019); ℓ ist eine Länge, die das Medium festlegt [F]. Weit innerhalb von ℓ ist das der Abfall wie 1/r und damit Newtons Gesetz. Weit außerhalb bricht der Hof ab, und die Summe des Überschusses bleibt endlich, statt mit dem Quadrat des Abstands zu wachsen; das wäre eine zweite Lösung für die Schwierigkeit aus dem vorigen Absatz. Weil die Ränder von Galaxien eher mehr Schwerkraft zeigen als erwartet, nicht weniger (6.2), muss ℓ weit größer sein als Galaxien; das Modell braucht ℓ für Newtons Gesetz nicht, denn der Hof aus $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ fällt ohne Abbruch wie 1/r ab, und die Summe der Überschüsse bleibt endlich, weil sich Knoten und Leerräume über eine Zelle zu null ergänzen (oben); gemessen gilt das $1/r^2$-Gesetz von 52 µm (Lee und Kollegen, 2020) bis zu den Planetenbahnen (Frage 42). Ein solches Medium trägt zwei Arten von Wellen: Querwellen aus der Scherhärte, mit denen Licht und Gravitationswellen laufen, und Längswellen, die

Änderungen des Hofs weitergeben und nach P2 schneller als c sind; diese dürfen kaum Energie forttragen (Frage 29).

Je größer der Dichteunterschied, desto größer die Ausgleichs- bzw. Reaktionsenergie. Das sieht man an der Vernichtung von Materie und Antima-

terie, aber auch an der Reaktion anderer stark unterschiedlicher Elemente [P] (2.6).

Materie mit unterschiedlicher Dichte stößt sich ab; je höher der Dichteunterschied, desto höher die Beschleunigung [P]. (Nachtrag vom 5. November 2026, aus der Zusammenfassung des Hauptpapers.)

Gemeint ist das Gefälle des Mediums am Ort, nicht der Unterschied zwischen den Dichten der Körper [F]. Platin (21,45 g/cm³) und Titan (4,5 g/cm³) fallen auf 10^{-15} gleich schnell (MICROSCOPE; Touboul und Kollegen, 2022); hinge die Beschleunigung von der Dichte des fallenden Körpers ab, müssten sie verschieden fallen. Ein steileres Gefälle ergibt dagegen für jeden Körper eine größere Beschleunigung, so wie Newtons Beschleunigung GM/r^2 nahe einer Masse wächst. So gelesen passt der Satz zu den Messungen.

2.2 Zähigkeit ohne Reibung

Es geht um Viskosität: Die Zähigkeit des Mediums bestimmt, wie schnell sich darin etwas ausbreitet und wie schnell Uhren laufen [P]. Durch Druck verteilt sich das Medium in niederviskose und hochviskose Bereiche und das Spektrum dazwischen; die Extreme sind Leerräume und Schwarze Löcher (5.1) [P]. Gewöhnliche Zähigkeit erzeugt allerdings Reibung, und Reibung würde jede Bahn bremsen. Die Erde umkreist die Sonne seit 4,5 Milliarden Jahren, und die Mondentfernung ist per Laser auf Millimeter genau vermessen, ohne Spur einer Bremsung durch ein Medium [F]. Die Zähigkeit muss also wie eine Brechzahl wirken, nicht wie Reibung: Sie verlangsamt Vorgänge, ohne Bewegung zu bremsen. Ein Vorbild ist supraflüssiges Helium, das unterhalb einer kritischen Geschwindigkeit ohne Reibung fließt [F].

Wenn Masse durch das Medium fliegt, entsteht durch die Bewegung ein Gegenwind; Strömungsbilder um umströmte Körper zeigen das. Die Masse wurde aber von demselben Medium beschleunigt [P]. (Nachtrag vom 4. November 2026, zu einem Bild mit Strömungen um einen stromlinienförmigen Körper, einen Zylinder mit Kármánscher Wirbelstraße und einen Tragflügel, beschrieben mit Bernoullis Gleichung $p + \tfrac{1}{2}\rho v^2 + \rho g h = \text{konstant}$.)

Das Bild zeigt die beiden Fälle, auf die es ankommt [F]. Beim stromlinienförmigen Körper fließt das Medium ohne Reibung: Es teilt sich vor dem Körper und schließt sich hinter ihm wieder. Der Druck vorne und hinten gleicht sich dann genau aus, und ein gleichmäßig bewegter Körper spürt keine bremsende Kraft (d’Alembert, 1752). Beim Zylinder wirkt Reibung: Hinter ihm lösen sich Wirbel ab, und erst dadurch entsteht ein Widerstand, der bremst. Im Weltraum ist keine Bremsung gemessen (oben). Das Medium muss sich also wie im ersten Fall verhalten, wie supraflüssiges Helium unterhalb der kritischen Geschwindigkeit: Der Gegenwind ist da, kostet bei gleichförmiger Bewegung aber keine Kraft. Beim Beschleunigen dagegen muss ein Körper in einem reibungsfreien Medium einen Teil des Mediums mitbewegen und wirkt dadurch träger, bei einer Kugel um die Hälfte

der Masse des verdrängten Mediums. Bessel bemerkte das 1828 an Pendeln in Luft, Stokes berechnete es (Stokes, 1851). Dass Trägheit so aus der Wechselwirkung mit einem Medium entsteht, wird als Bild für den Higgs-Mechanismus genutzt (Krishnaswami und Phatak, 2020); das passt zur Aussage des Autors, dass Masse eine Auswirkung der Wechselwirkung ist (2.6).

Druck erzeugt Gegendruck, aber ohne Festlager erzeugen Druck und Gegendruck Rotation. Alles, was sich bewegt, erzeugt Reibung und damit Wärme. Was warm ist, dehnt sich aus. Etwas, das sich ausdehnt, hat mehr Zeit zum Beschleunigen und wird dadurch schneller; wird es schneller, wird die Reibung höher, es wird wärmer und dehnt sich weiter aus. Alles, was sich bewegt, erzeugt auch einen Windschatten; alles, was sich ausdehnt, erzwingt deshalb einen Unterdruck, und dadurch entstehen Turbulenzen und Wirbel. Man stelle sich ein Gefäß vor, in dem ganz viele Teilchen herumfliegen, die sich gegenseitig abstoßen [P]. (Nachtrag vom 6. November 2026.)

Zum ersten Satz [F]: Zwei gleich große, entgegengesetzte Kräfte, die nicht auf einer Linie angreifen, bilden ein Kräftepaar; einen frei beweglichen Körper drehen sie, ohne ihn zu verschieben, auf einer Linie drücken sie ihn nur zusammen. In Flüssigkeiten und Gasen gilt dazu der Zirkulationssatz von Bjerknes (1898): Drehung entsteht, wo sich Flächen gleichen Drucks und Flächen gleicher Dichte schneiden, etwa beim Seewind, wenn warme, leichte Luft über dem Land aufsteigt und kühle, schwere über dem Meer absinkt; hängt die Dichte nur vom Druck ab, entsteht keine neue Drehung (Yu, Vorlesung zur Zirkulation). Das passt zum Leitgedanken: Über die Drehung entscheiden Druck und Dichte zusammen. Im Gefäß ist die Wand das Festlager, sie nimmt Gegendruck und Drehimpuls auf. Ohne Wand bleibt der Drehimpuls insgesamt erhalten, weil sich die inneren Drehmomente der Paarkräfte aufheben; drehte das Medium anfangs nicht, braucht jeder Wirbel einen Gegenwirbel. So zeigt es die Kármánsche Wirbelstraße mit abwechselnd links- und rechtsdrehenden Wirbeln (V15), und das beobachtbare Universum zeigt als Ganzes keine messbare Drehung (Saadeh und Kollegen, 2016).

Zum zweiten Satz [F]: Wo sich Teile gegeneinander bewegen, wird Bewegung zu Wärme. Für eine gleichförmige Bahn durch das Medium ist dagegen keine Bremsung gemessen (oben, Mondentfernung). Beides verträgt sich, wenn die Reibung bei gleichförmiger Bewegung fast null ist, wie es der Autor für den Windschatten der Gravitonen selbst gesagt hat (Bild der Eisenbahnwagen), und Wärme vor allem beim Beschleunigen, beim Scheren und in Wirbeln entsteht. Wasser dehnt sich beim Erwärmen aus und unterhalb von 3,98 °C auch beim Abkühlen, zwei Gegenteile mit ähnlicher Wirkung (oben; Kell, 1975; Min und Kang, 2025).

Zur Rückkopplung [F]: Eine Geschwindigkeit wächst nur, solange eine Beschleunigung wirkt, $\Delta v = \int a\,dt$, und Reibung wandelt nur Bewegung in Wärme um, die vorher zugeführt wurde. Die Rückkopplung braucht daher eine Quelle, die Energie nachliefert, im Modell den Druck des Mediums; das ist die Frage von Frage 76. Dass die Ausdehnung schneller wird, ist

seit z ≈ 0,46 gemessen, vorher wurde sie langsamer (Riess und Kollegen, 2004). Für die Wärme gilt ein Prüfstein : Die Hintergrundstrahlung war früher wärmer und kühlt mit der Ausdehnung ab, bei Rotverschiebung 2,69 gemessen 10,5 K, insgesamt T(z) = 2,725 · (1 + z)^(1−β) K mit β = −0,007 ± 0,027 (Noterdaeme und Kollegen, 2011), und nachträglich zugeführte Wärme darf ihr Spektrum höchstens um etwa 6 · 10⁻⁵ verändern (Fixsen und Kollegen, 1996). Wo die Rückkopplung wärmer macht, muss sie also sehr früh enden oder das Licht nicht erreichen.

Zum Windschatten [F]: Hinter bewegten Körpern lösen sich Wirbel ab (Kármánsche Wirbelstraße, oben), und beim Ausstoß aus einem Zylinder löst sich ein Wirbelring vom Strahl, sobald der Kolbenhub etwa das Vierfache des Durchmessers erreicht (Gharib, Rambod und Shariff, 1998). Reibung braucht es dafür nicht: In einem supraflüssigen Gas ohne Zähigkeit erzeugte ein bewegtes Hindernis oberhalb einer kritischen Geschwindigkeit von 1,11 mm/s eine regelmäßige Wirbelstraße wie in Wasser (Kwon und Kollegen, 2016). Das verbindet die reibungsfreie Bewegung mit den Wirbeln im Windschatten. Eine genau kugelförmige Ausdehnung erzeugt dagegen keinen Wirbel, denn eine rein nach außen gerichtete

Strömung dreht sich nicht (Rechnung von Claude: rot(f(r) · r̂) = 0); Wirbel brauchen eine Ungleichmäßigkeit, nach Bjerknes sich schneidende Flächen von Druck und Dichte. Im Gefäß nehmen die Wände den Gegendruck auf; im unendlichen Raum fehlt dieses Festlager. Ein gemessenes Gefäß mit vielen gleich geladenen, sich abstoßenden Teilchen ist die Ionenfalle (Frage 76).

Wasser dehnt sich aus, wenn es wärmer und wenn es kälter wird. Und natürlich wird es kälter, wenn es sich ausdehnt. Wenn die Teilchen so viel Platz haben, dass sie sich extrem schnell bewegen, berühren sie sich fast nie. Aber immer wieder treffen sich Teilchen und blitzen als Materie auf, vergehen aber sofort wieder [P]. (Nachtrag vom 6. November 2026; das Wasser stand schon als Beispiel für zwei Gegenteile mit ähnlicher Wirkung im Text, Kell, 1975.)

Damit hat die Rückkopplung (oben) eine Gegenrichtung, und beide sind gemessen [F]: Reibung erwärmt, Ausdehnung kühlt. Ein Gas, das aus einer Düse ins Vakuum strömt, kühlt sich auf etwa 2 K ab und wird dabei so dünn, dass keine Stöße mehr stattfinden (Leopold-Gruppe, University of Minnesota); die Teilchen fliegen schnell nach außen, stoßen aber kaum noch zusammen. Ebenso kühlt die Hintergrundstrahlung mit der Ausdehnung ab (Noterdaeme und Kollegen, 2011). Mit der gemessenen Abkühlung verträgt sich die Rückkopplung also, solange die Kühlung durch Ausdehnung überwiegt; wo die Erwärmung durch Reibung überwiegt, bleibt Teil von Frage 76.

Zum Aufblitzen [F]: Dass Teilchen beim Zusammentreffen kurz zu Materie werden und wieder vergehen, ist gemessen. Aus Zusammenstößen von Lichtteilchen in den Feldern aneinander vorbeifliegender Goldkerne entstanden 6085 Elektron-Positron-Paare (STAR-Kollaboration, 2021), und Elektron und Positron werden beim Zusammentreffen wieder zu Licht (Frage 69). Das neutrale Pion entsteht bei Stößen und zerfällt nach rund 8 ·

10^{-17} Sekunden in zwei Lichtteilchen (PrimEx-II-Kollaboration, 2020). Das passt zu Folgerung 1: Teilchen verschmelzen nur, wenn sie sich sehr nahe kommen, und nach dem dritten Newtonschen Axiom drückt die Abstoßung sie wieder auseinander. Ein Prüfstein bleibt : Manche Verschmelzungen vergehen nicht; ein Proton lebt mindestens $2{,}4 \cdot 10^{34}$ Jahre (Super-Kamiokande-Kollaboration, 2020). Was einen Blitz zu dauerhafter Materie macht, muss das Modell erklären.

Vermutlich braucht man eine gewisse Anzahl an Teilchen in einem Wirbelsystem. Der Zug muss geschlossen sein. Erst dann bleibt es relativ unabhängig vom äußeren System stabil [P]. (Antwort des Autors vom 6. November 2026 auf den Prüfstein zur dauerhaften Materie; »Zug« wie im Bild der Eisenbahnwagen, die im Kreis im Windschatten des vorherigen fahren.)

Das deckt sich mit der Strömungslehre und mit Messungen [F]. In einem reibungsfreien Medium können Wirbellinien nicht enden; sie schließen sich zu Ringen, und ihre Stärke bleibt erhalten (Helmholtz, 1858; Kelvin, 1869; oben). Im geschlossenen Zug gibt es keinen ersten Wagen, der den Gegenwind allein trägt; ein nicht geschlossener Zug hätte eine Spitze, die gebremst wird. In supraflüssigem Helium sind frei laufende, geschlossene Wirbelringe gemessen, deren Umlauf genau ein Quant beträgt (Rayfield und Reif, 1964); ihr Umlauf kann daher nicht allmählich abnehmen. Auch die Anzahl zählt, gemessen bei Kernen: Helium-4 und Kohlenstoff-12 sind stabil, Beryllium-8 zerfällt mit einer Halbwertszeit von $8{,}19 \cdot 10^{-17}$ s in zwei Heliumkerne (Wikipedia, Beryllium-8). Und das äußere System zählt, wie das »relativ« des Autors sagt: Proton und Neutron bestehen beide aus drei Quarks, das freie Neutron zerfällt aber nach etwa 878 s (Gonzalez und Kollegen, 2021), während es in stabilen Kernen bestehen bleibt. Prüfstein : Welche Anzahl und welche Anordnung einen Wirbel dauerhaft machen und warum das Proton allein stabil ist, das Neutron aber nur im Kern, muss das Modell zeigen (Frage 63).

Daraus folgt ein Prüfstein (Frage 57) . In Luft und Wasser hängt die mitbewegte Masse vom Volumen und von der Form eines Körpers ab, nicht von seiner Masse. Im Weltraum fallen gemessen alle Körper gleich: Platin und Titan, die sich in der Dichte um mehr als das Vierfache unterscheiden, fallen auf 10^{-15} genau gleich (MICROSCOPE). Eine mitbewegte Masse des Mediums müsste also genau mit der Masse des Körpers wachsen oder verschwindend klein sein. Im Modell folgt es daraus: Körper und Medium werden vom selben Dichtegefälle gleich beschleunigt, also bewegen sie sich nicht gegeneinander, und eine mitbewegte Masse entsteht nicht (Frage 57).

Zudem muss das Medium alle Farben gleich brechen [F]. Glas lenkt blaues Licht stärker ab als rotes. Die Ablenkung an der Sonne ist dagegen für Radiowellen dieselbe wie für sichtbares Licht; Radiomessungen bestätigen sie auf etwa 0,01 % (Frage 3).

2.3 Gezeiten

Die Gezeiten entstehen aus dem Unterschied des Dichtegefälles über den Erddurchmesser [F]:

1. Der Mond verdichtet das Medium um sich; sein Gefälle reicht bis zur Erde, und die ganze Erde bewegt sich auf ihn zu, auf ihrer Bahn um den gemeinsamen Schwerpunkt.

2. Auf der Mondseite ist das Gefälle stärker als in der Erdmitte, in der Erdmitte stärker als auf der Gegenseite.

3. Das Wasser auf der Mondseite läuft deshalb voraus, das auf der Gegenseite bleibt zurück: zwei Flutberge, Hochwasser alle 12 Stunden 25 Minuten.

Weil dieser Unterschied mit der Entfernung hoch drei abnimmt, sind die Gezeiten der Sonne nur etwa halb so stark wie die des Mondes, obwohl das Gefälle der Sonne an der Erde rund 180-mal stärker ist [F].

2.4 Lagrange-Punkte

Zwischen zwei Massen liegt ein Punkt, an dem sich ihre Dichtegefälle ausgleichen. Entlang der Verbindungslinie ist das Medium dort am dünnsten, quer dazu am dichtesten: ein Pass, deshalb instabil [F]. Materie sammelt sich stattdessen bei L4 und L5, wo die Bahnbewegung sie hält, etwa über 10.000 Trojaner bei Jupiter [F].

2.5 Licht und Uhren

Die Lichtgeschwindigkeit hängt von der Dichte des Mediums ab (P2) [P]. Zeitdilatation entsteht, weil das Medium dichter wird: Die Energie wird zähflüssiger, und die Frequenz sinkt. Die Zeit vergeht nicht langsamer, nur die Uhren laufen langsamer [P].

Eine Uhr, unbewegt im Vakuum, müsste schneller gehen als eine Uhr in einer Überdruckkammer [P]. Teilweise ist das schon gemessen [F]: In Rubidium- und Cäsium-Atomuhren verändert ein Gas um die Atome die Frequenz, bei Rubidium und üblichem Gasdruck in der Größenordnung von einem Millionstel. Die Richtung hängt aber von der Gasart ab: Die schweren Edelgase Argon, Krypton und Xenon machen die Uhr langsamer, Helium, Neon und Stickstoff machen sie schneller (McGuyer, Xia und Happer, 2011). Eine Rubidium-Uhr in Stickstoff, dem Hauptbestandteil der Luft, geht also schneller als im Vakuum. Die Standardphysik erklärt diese Verschiebungen mit Stößen zwischen den Atomen. Das Modell verlangt zusätzlich eine Verlangsamung, die bei gleicher Dichte für jedes Gas gleich ist (V16). Sie muss

sehr klein sein, denn die ganze Erde verlangsamt Uhren an ihrer Oberfläche nur um 7×10^{-10} (Frage 31).

Gemessen ist [F]: Nahe der Sonne ist Licht langsamer; Radarsignale kommen etwa 200 Mikrosekunden zu spät (Shapiro-Effekt, von Cassini 2003 auf 0,002 % bestätigt), und Licht wird am Sonnenrand um 1,75 Bogensekunden abgelenkt. GPS-Uhren gehen in 20.200 km Höhe pro Tag 45 Mikrosekunden schneller und durch ihre Bahngeschwindigkeit 7 Mikrosekunden langsamer. Schon 33 cm Höhenunterschied sind messbar (Chou und Kollegen, 2010). Daraus folgt die Richtung: Nahe einer Masse ist das Medium dichter, nicht dünner [F].

Rechnung zur Lichtablenkung [F] (aus einer Prüfung durch ChatGPT, von Claude nachgerechnet): Mit einem freien Faktor k in der Brechzahl, $n = 1 + k \cdot GM/(rc^2)$, ergibt sich für einen Strahl, der im Abstand b am Körper vorbeiläuft, die Ablenkung $\alpha = 2k \cdot GM/(bc^2)$. Am Sonnenrand sind das 0,875 Bogensekunden für $k = 1$ (nur die Uhren, wie in Einsteins Rechnung von 1911) und 1,75 Bogensekunden für $k = 2$ (Uhren und Maßstäbe). Ablenkung und Shapiro-Verzögerung wachsen beide mit dem Faktor $1 + \gamma$, also ist $k = 1 + \gamma$. Cassini maß $\gamma - 1 = (2{,}1 \pm 2{,}3) \cdot 10^{-5}$ (Bertotti, Iess und Tortora, 2003); damit ist $k = 2{,}000021 \pm 0{,}000023$ (Rechnung von Claude). Die 2 liegt innerhalb einer Standardabweichung. Genau 2 ist das Ziel, wenn das Modell im schwachen Feld mit der Relativitätstheorie übereinstimmt; die Messung lässt einen kleinen Bereich darum zu. Eine Herleitung des Dichteprofils aus dem Medium (Frage 1) muss diesen Wert liefern, ohne ihn an der Sonnenablenkung einzustellen .

Jedes nicht geschlossene System ist ein geschlossenes System. Die Erdatmosphäre hat keine wirklich feste Schale; sie wird immer dünner, praktisch bis zu den Lagrange-Bahnen. Deshalb findet die Lichtbrechung in Phasen statt: Je dichter das Medium, desto stärker wird das Licht gebrochen. Je weiter man von einer Masse entfernt ist, desto geringer ist die Dichte und desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass Licht abgelenkt wird. Ein Reflektor lenkt das Licht vollständig um; das ist dann eine harte Schale [P]. (Antwort des Autors vom 6. November 2026 zu Frage 1, mit zwei Bildern zur Brechzahl $n = c_0/c_n$ und zum Brechungsgesetz $n_1 \cdot \sin\alpha = n_2 \cdot \sin\beta$.)

Das Bild der Lufthülle ist gemessen [F]. Die Wasserstoffhülle der Erde reicht bis etwa 630.000 km, über die Mondbahn hinaus (ESA, SOHO/SWAN; Baliukin und Kollegen, 2019). In der Luft wird Licht Schicht für Schicht nach dem Brechungsgesetz gebrochen und biegt sich zur dichteren Luft hin; am Horizont hebt das die Sonne um etwa 35 Bogenminuten, mehr als ihren eigenen Durchmesser (Wikipedia, Atmospheric refraction). Fasst man die Schichten zusammen, ist die Ablenkung die Summe der Brechzahl-Änderungen quer zum Strahl; mit $n - 1 = A/r$ ergibt sich $2A/b$, mit $A = 2GM/c^2$ am Sonnenrand 1,75″ (oben). Dass die Ablenkung nach außen schwächer wird, folgt daraus: Sie fällt wie $1/b$.

Daraus lässt sich das Dichteprofil rechnen [F] (Rechnung von Claude). Eine Lufthülle im Gleichgewicht folgt der barometrischen Höhenformel: Zur Masse hin steigt die Dichte wie $\rho/\rho_0 = \exp(GM/(r \cdot s^2))$, wobei s die Geschwin-

digkeit ist, mit der sich Druck im Medium ausbreitet. Für Luft ist $s \approx 290$ m/s; $GM/(r \cdot s^2)$ ist an der Erdoberfläche etwa 760, und die Dichte halbiert sich deshalb schon alle rund 6 km. Für das Medium setzt der Autor die Ausbreitung wie Schall in einer Atmosphäre an (Frage 69), und gemessen laufen Gravitationswellen mit c (GW170817). Mit $s = c$ ist $GM/(rc^2)$ außer an Schwarzen Löchern überall klein, an der Erde $7 \cdot 10^{-10}$, an der Sonne $2{,}1 \cdot 10^{-6}$, und die Dichte fällt nicht rasch, sondern wie 1/r: $\rho/\rho_0 \approx 1 + GM/(rc^2)$. Das ist genau der Verlauf und die Größe, die Frage 1 verlangt, bis auf den Faktor 2.

Den Faktor 2 liefern Uhren und Maßstäbe, wie es im Text schon steht [F]: Im dichteren Medium laufen Uhren langsamer, und Atome sind etwas kleiner (Dicke, 1957; oben). Die Uhren sind gemessen, und zwar genau mit dem Dichteüberschuss $GM/(rc^2)$: Eine Wasserstoffuhr in 10.000 km Höhe lief schneller als am Boden, wie vorhergesagt auf etwa $7 \cdot 10^{-5}$ genau (Vessot, 1980). Werden Maßstäbe um denselben Anteil

kürzer, läuft das Licht, von außen gemessen, um beide Anteile langsamer, und die Brechzahl ist das Quadrat des Dichteverhältnisses: $n = (\rho/\rho_0)^2 = \exp(2GM/(rc^2))$, im schwachen Feld $n \approx 1 + 2GM/(rc^2)$ (Rechnung von Claude). Das ist genau die Form, die Puthoff (2002) verwendet; sie gibt Lichtablenkung, Rotverschiebung, Periheldrehung und Radarverzögerung richtig wieder und weicht erst in höheren Ordnungen von der Allgemeinen Relativitätstheorie ab (Ibison, 2003). Mit den Uhren allein wäre $k = 1$ und die Ablenkung 0,875″; gemessen ist $k = 2{,}000021 \pm 0{,}000023$ (oben).

Das Bild schließt sich, wie der erste Satz des Autors sagt [F]: Dieselbe Brechzahl gibt langsamen Körpern genau Newtons Beschleunigung GM/r^2 (Puthoff, 2002), und das Medium selbst steht mit $s = c$ in genau diesem Gefälle im Gleichgewicht, ohne feste Schale (Rechnung von Claude). Eine harte Schale wie ein Reflektor entsteht dabei nicht; die Dichte steigt zur Masse hin stetig an. Damit ist Frage 1 teilweise beantwortet. Drei Prüfsteine folgen, und die nächsten Absätze beantworten sie: Erstens, warum sich Druck im Medium mit c ausbreitet; gemessen ist das nur für die Gravitationswellen (Frage 69, V17). Zweitens, warum Atome im dichteren Medium um genau denselben Anteil kleiner werden, um den Uhren langsamer laufen. Drittens das starke Feld: Die Form $\exp(2GM/(rc^2))$ hat keinen Horizont und weicht nahe Schwarzer Löcher von der Allgemeinen Relativitätstheorie ab; das passt dazu, dass Sterne und Schwarze Löcher im Modell zwei Zustände desselben Objekts sind, muss sich aber an den Ringen des Event Horizon Telescope und an den Wellen verschmelzender Schwarzer Löcher bewähren (Frage 53). Die Gravitationskonstante G selbst muss, wie in jeder Theorie, gemessen werden.

Uhren bestehen aus Atomen. Wenn die Elementarteilchen wenig Platz haben, um zu beschleunigen, werden sie früher abgebremst und bewegen sich daher langsamer. Deshalb gehen Uhren langsamer, weil die Frequenz sinkt. Würde man sehr viel Druck aufwenden, würden die Elementarteilchen anfangen, chaotisch zu zittern. Die Energie steigt, weil sie gezwungen werden, sich zu nah zu kommen; dann entsteht auch wieder mehr Hitze, weil sich

viel häufiger Teilchen treffen [P]. (Antwort des Autors vom 6. November 2026 zu Frage 1.)

Daraus folgt der Anteil der Maßstäbe [F] (Rechnung von Claude). Die Frequenz einer Uhr ist Geschwindigkeit geteilt durch Größe, $f \propto v/L$. Werden die Teilchen im dichteren Medium um denselben Anteil langsamer wie das Licht, also um $2GM/(rc^2)$, und gehen die Uhren gemessen um $GM/(rc^2)$ langsamer (Vessot, 1980), dann muss die Größe um $GM/(rc^2)$ abnehmen: $(1 - 2\delta)/(1 - \delta) \approx 1 - \delta$ mit $\delta = GM/(rc^2)$. Die kleineren Atome sind dann keine eigene Annahme mehr, sondern folgen aus zwei Messungen, der Ablenkung ($k = 2$) und der Rotverschiebung. Weniger Platz allein würde die Frequenz dagegen erhöhen, wie bei einer kürzeren Saite oder bei Quantenpunkten, die umso blauer leuchten, je kleiner sie sind (Frage 51); die Uhr geht nur langsamer, weil die Teilchen stärker gebremst werden, als der Platz schrumpft. Vorschlag zur Prüfung: Licht und die Teilchen der Uhr werden durch dasselbe gebremst, die häufigeren Treffer im dichteren Medium (oben, Licht); dann werden beide um denselben Anteil langsamer. Beantwortet in Frage 1.

Zwei Messungen stützen das [F]. Erstens gehen alle Uhren gleich langsamer, gleich woraus sie bestehen: Wasserstoffmaser und Cäsium-Fontänen unterscheiden sich im Jahresgang des Sonnenpotentials um höchstens $(0{,}1 \pm 1{,}4) \cdot 10^{-6}$ (Ashby und Kollegen, 2007). Das passt dazu, dass alle Uhren aus demselben Elementarteilchen bestehen (Postulat); gewöhnliche Stoßverschiebungen im Gas hängen dagegen von der Gasart ab (V16). Zweitens bleibt die Verlangsamung auch an sehr dichten Körpern bestehen: Die Spektrallinien des Weißen Zwergs Sirius B sind um $80{,}65 \pm 0{,}77$ km/s rotverschoben, und die daraus

folgende Masse von 1,017 Sonnenmassen stimmt mit der Bahnmasse überein (Joyce und Kollegen, 2018); Atome an seiner Oberfläche gehen also um rund $2{,}7 \cdot 10^{-4}$ langsamer (Rechnung von Claude).

Zum Zittern unter sehr hohem Druck [F]: Dass Teilchen, die man zusammenzwingt, mehr Energie bekommen, ist gemessen. Kleinere Quantenpunkte leuchten energiereicher (Frage 51), Elektronen in Weißen Zwergen bewegen sich auch ohne Wärme schnell, weil sie einander nicht ausweichen können, und dieser Druck trägt den Stern (oben); Zusammendrücken erwärmt ein Gas. Prüfstein : Beides heißt im Modell »weniger Platz«, gemessen wirken die beiden aber verschieden: Ein dichteres Medium verlangsamt alle Uhren gleich, Zusammendrücken der Materie verschiebt ihre Frequenzen je nach Stoff und erhöht die Energie. Das Modell muss sagen, wo der eine Bereich in den anderen übergeht.

Der Druck im Medium gibt quasi die Lichtgeschwindigkeit vor. Licht bewegt sich nicht; Licht entsteht, wenn es knallt, und dann ist es weg. Licht kann sich also nicht schneller bewegen als die Druckwelle, und für die Teilchen der Uhren gilt dasselbe. Gravitationswellen kommen aus allen Richtungen: Jede Materie strahlt je nach Energie Gravitationswellen ab, dazu kommen die Supernovae; das ist der Abstrom, und jeder Abstrom wird zum Zustrom auf die restliche Materie. Im starken Feld werden die Teilchen wie

in einem Teilchenbeschleuniger beschleunigt und zusammengedrückt, und die Kollisionswahrscheinlichkeit steigt. Auf der Oberfläche des Schwarzen Lochs fließen die Teilchen geordnet, ohne sich zu berühren; deshalb ist es vermutlich durchsichtig wie das Vakuum. In der Akkretionsscheibe ist dagegen die Hölle los [P]. (Antworten des Autors vom 6. November 2026 auf die vier Punkte zu Frage 1, Frage 69 und zum starken Feld.)

Damit sind die ersten beiden Punkte beantwortet [F]. Ist Licht kein Gegenstand, der fliegt, sondern ein Aufblitzen bei jedem Knall, das die Druckwelle weiterträgt, dann ist die Lichtgeschwindigkeit die Geschwindigkeit der Druckwelle, und alles, was aus denselben Teilchen besteht, ist an dieselbe Grenze gebunden; im dichteren Medium werden Licht und Teilchen deshalb um denselben Anteil langsamer. Dass der Druck die Geschwindigkeit vorgibt, hat ein Vorbild: In einer stark vorgespannten Kette sich berührender Kugeln hängt die Geschwindigkeit eines Stoßes nicht mehr von seiner Stärke ab (Nesterenko, 1983; 1), und Licht aller Energien läuft gemessen gleich schnell (Abdo und Kollegen, 2009). Drei weitere Messungen passen: Gravitationswellen und Licht laufen auf etwa 15 Stellen gleich schnell (GW170817), alle Uhren gehen gleich langsamer (Ashby und Kollegen, 2007), und vor Ort misst jeder dieselbe Lichtgeschwindigkeit, richtungsunabhängig auf etwa 10^{-18} (Nagel und Kollegen, 2015), weil Uhren und Maßstäbe aus denselben Teilchen bestehen. Der Satz oben, Licht sei keine Welle des Mediums, gilt damit nur noch für das einzelne Aufblitzen; weiter läuft die Druckwelle. In der Herleitung zu Frage 1 ändert das im schwachen Feld nichts, weil sich die Druckgeschwindigkeit dort erst in zweiter Ordnung ändert (Rechnung von Claude). Frage 1 ist damit für das schwache Feld beantwortet.

Ein Vorgang für vier Messungen. Wenn Licht nicht fliegt, sondern bei jedem Knall entsteht und die Druckwelle weiterläuft (oben; Nesterenko, 1983; Abdo und Kollegen, 2009), dann sind Brechung, Streuung und Abbremsung derselbe Vorgang: Die Druckwelle trifft auf ein Teilchen, und es knallt [P]. Wie oft und wie es knallt, hängt nach der Messung an vier Dingen [F]. Erstens an der Dichte: Je dichter die Luft, desto stärker wird das Licht gebrochen; am Horizont hebt das die Sonne um etwa 35 Bogenminuten (oben, Lufthülle). Zweitens an der Frequenz: Kleine Teilchen streuen kurzes Licht viel stärker als langes, mit der vierten Potenz der Frequenz (Strutt, 1871; Strutt, 1899); blaues Licht bei 450 nm wird etwa 4,4-mal so stark gestreut wie rotes bei 650 nm. Deshalb ist der Himmel blau, und am Abend, wenn der Weg durch die Luft lang ist, ist das Blau unterwegs weggestreut, und Rot bleibt übrig. Drittens am Gegenverkehr: Ein Atom, das dem Laserstrahl entgegenläuft, nimmt mehr Licht auf und wird abgebremst (Hänsch und Schawlow, 1975; unten, Geisterfahrer). Viertens am Winkel: Das gestreute Licht ist senkrecht zur Richtung der Sonne am stärksten polarisiert. Für ein einzelnes kleines Teilchen ist es bei 90° vollständig polarisiert; am klaren Himmel wurden bei 90° etwa 75 % gemessen, der Rest geht auf Mehrfachstreuung, die Form der Moleküle, den Boden und Staub zurück (Gehrels, 1962). Dichte, Frequenz, Gegenverkehr und Winkel sind

damit vier Stellgrößen desselben Knalls in einem einzigen Medium [P]. Für die Farbe des Himmels entscheidet davon die Frequenz. Die Drehung der Erde trägt dazu nichts Messbares bei [F]: Die Luft am Äquator bewegt sich mit etwa 0,46 km/s, das sind rund 1,55 Millionstel der Lichtgeschwindigkeit, und der Dopplereffekt verschiebt die Farbe höchstens um denselben Anteil, bei grünem Licht von 550 nm um etwa 0,00085 nm. Aus Weiß wird dadurch kein Blau. Beim Laserkühlen wirkt der Gegenverkehr nur, weil die Atome genau auf eine schmale Linie abgestimmt sind; dort entscheidet schon eine winzige Verschiebung, ob ein Atom das Licht aufnimmt oder nicht.

Zwei Prüfsteine folgen daraus . Erstens schwingt Licht quer, mit zwei Polarisationen (Frage 69); eine Druckwelle schwingt längs, das Aufblitzen muss also die Querschwingung tragen. Zweitens zeigt Licht keine Körnung: Bei einem Gammablitz kamen nach rund 7 Milliarden Jahren Lichtteilchen sehr verschiedener Energie fast gleichzeitig an (Abdo und Kollegen, 2009); eine Kette von Knallen muss also für alle Energien gleich schnell sein, wie in der vorgespannten Kugelkette.

Zum dritten Punkt [F]: Dass Gravitationswellen aus allen Richtungen kommen, ist gemessen. Die Zeitsignale von 67 Pulsaren schwanken gemeinsam nach dem Muster, das ein Hintergrund aus Gravitationswellen erwarten lässt (Hellings-Downs-Muster), mit einer Bedeutung von etwa 3,5 bis 4 Standardabweichungen (NANOGrav, 2023); und Doppelsterne verlieren gemessen Energie als

Gravitationswellen (PSR B1913+16, oben), das ist Abstrom. Das gemessene Muster ist das von Querwellen in Tensorform. Gemessen ist dabei vor allem die Richtung, in die das Medium schwingt: quer zur Laufrichtung, in einer Richtung gedehnt und senkrecht dazu gestaucht (GW170814); weiter gibt das Medium sie als Querscherung: Ihr Schermodul ist gleich der Energiedichte, deshalb läuft sie mit c (GW170817), und ihr spurfreier Querteil hat genau die zwei gemessenen Formen (Anhang A; Frage 69). Dass Abstrom zu Zustrom wird, muss mit der geringen Aufnahme vereinbar sein: Von GW150914 blieb in der Erde so gut wie nichts zurück (oben).

Zum vierten Punkt [F]: Das Bild passt zu den Messungen. Gas in Akkretionsscheiben leuchtet hell, und an der Oberfläche von Sagittarius A* ist kein Leuchten gemessen, das ein Aufprall erzeugen müsste (Broderick, Loeb und Narayan, 2009; Frage 59); ein geordneter Fluss ohne Zusammenstöße strahlt nach dem Satz des Autors nicht (1). Durchsichtig heißt dabei nicht hell: Mit der Brechzahl $n = \exp(2GM/(rc^2))$ ist $n \cdot r$ bei $r = 2GM/c^2$ am kleinsten, und Licht, das näher als $b = 2e \cdot GM/c^2 \approx 5{,}44\ GM/c^2$ vorbeiläuft, kehrt vor der Oberfläche nicht mehr um (Rechnung von Claude); es entsteht ein Schatten auch ohne Horizont, wie hell er innen ist, steht im folgenden Absatz. Nach Einstein liegt diese Grenze bei $3\sqrt{3} \cdot GM/c^2 \approx 5{,}20\ GM/c^2$. Der Schatten ist im Modell also etwa 4,6 % größer (V22). Gemessen stimmt der Ring von Sagittarius A* auf etwa 10 % mit Einstein überein (Event Horizon Telescope, 2022); die 4,6 % liegen darin und sind noch nicht zu unterscheiden. Wohin die Energie des einfallenden Gases geht, hat der Autor schon beantwortet: in die Jets (3.4, Frage 59); bei Sagittarius A* ist

bisher kein Jet sicher nachgewiesen (Chavez und Kollegen, 2024).

Licht an der Oberfläche und Prüfung durch ChatGPT (6. November 2026). Auf die Frage, was mit einem Lichtstrahl geschieht, der entlang der Drehachse auf das kompakte Objekt zufliegt: Ein Teil der Energie des Lichtstrahls wird abgelenkt, ein Teil zurückgeworfen und ein Teil in Bewegung, was zu Wärme bzw. Ausdehnung führt. Das Verhältnis hängt von der Oberfläche ab [P]. Einordnung [F]: Damit bleibt $b = 2e \cdot GM/c^2$ der Rand des Schattens, und innen ist er nicht ganz dunkel. Bewegung und Ausdehnung sind damit mögliche Wege, aufgenommene Energie abzuführen. Wie viel Licht zurückkehrt und wie hell es innerhalb des Rings wird, muss eine Rechnung für die Oberfläche und das umgebende Gas ergeben; vergleichen lässt sie sich mit dem Ring von M87*, der bei 1,3 mm mindestens etwa zehnmal heller ist als die Mitte (Event Horizon Telescope, 2019), wobei auch leuchtendes Gas in der Sichtlinie zur Mitte beiträgt. Für Sagittarius A* schließt das Event Horizon Telescope unter seinen Annahmen eine Oberfläche aus, die aufgenommene Strahlung als Wärme wieder abgibt, und hält eine vollständig zurückwerfende für unwahrscheinlich (Event Horizon Telescope, 2022); Broderick, Loeb und Narayan (2009) begrenzen die Leuchtkraft einer solchen Oberfläche auf unter 0,4 % der Leuchtkraft des Zustroms, unter der Annahme eines gleichbleibenden Zustroms und einer Oberfläche, die wie ein schwarzer Körper strahlt; ein Reflexionsgrad ist das nicht. Entlang der Drehachse trifft das Licht im Modell auf die Stelle, an der die Energie ausbricht (Jets, bei Sagittarius A* die Fermi-Blasen, 3.4). Die Photonensphäre der exponentiellen Form bei $r = 2GM/c^2$ fanden schon Boonserm und Kollegen (2018); in der reinen exponentiellen Form führte ein Strahl unterhalb des Randes durch einen Hals bei $r = GM/c^2$ hindurch, im Modell trifft er auf die Oberfläche. Gemessen ist für Sagittarius A* die Abweichung des Schattens vom Wert nach Einstein $\delta = -0{,}04$ $(+0{,}09/-0{,}10)$ mit der Masse aus Keck und $\delta = -0{,}08 \pm 0{,}09$ mit der aus dem VLTI (Event Horizon Telescope, 2022); der Wert des Modells $\delta = +0{,}046$ liegt 1 bis 1,4 Standardabweichungen darüber (Rechnung von Claude); beide Werte stammen aus demselben Bild mit verschiedenem Verhältnis von Masse zu Entfernung, V22 ist damit vereinbar, bevorzugt wird der positive Wert von den Daten bisher nicht; die Umrechnung vom Ring auf den Schatten stützt sich dabei auf Rechnungen nach Einstein. Nach der Kerr-Lösung macht Drehung den Schatten kleiner, bei Blick auf den Pol und größter Drehung um etwa 7 % (Rechnung von Claude); ein größerer Schatten lässt sich dort also nicht durch Drehung erklären.

Die Rechnung ist kugelsymmetrisch; die Drehung, die im Modell über die Schwelle entscheidet, verschiebt den Rand gemessen wenig: Auch für schnell drehende Löcher ändert sich der Schattendurchmesser nur um etwa 4 % (Johannsen und Psaltis, 2010), und der gemessene Ring von M87* und Sagittarius A* liegt innerhalb von etwa 10 % (Event Horizon Telescope, 2019, 2022). Welche Oberfläche sich aus Ablenken, Zurückwerfen und Bewegung ergibt, begrenzt das Fehlen von Röntgenblitzen: Sie gibt weniger als 0,4 % der Zustromenergie ab (3.4). Aus derselben Prüfung übernom-

men [F]: Beim dritten Newtonschen Axiom steht im Paper jetzt zuerst Newtons Fassung, zu jeder Kraft eine gleich große, entgegengesetzt gerichtete Gegenkraft, dann die des Autors; in 3.2 und in der Zusammenfassung des Papers steht, dass die Rechnung zur Lufthülle Newtons Feld voraussetzt und das Dichteprofil bestimmt, das darin im Gleichgewicht steht, während Frage 42 fragt, wie die Exkluonen dieses Feld selbst erzeugen; in 3.3, dass der Faktor 2 an der Annahme hängt, dass sich Uhren und Maßstäbe um denselben Anteil ändern, und durch Cassini festgelegt ist. Nicht übernommen: ChatGPTs Neufassung des Postulats (»das sich abstößt«), denn der Wortlaut des Autors lautet »das die gleichen Kräfte hat wie seine Geschwister«; die Abstoßung steht in seinem Bild vom Gefäß (1); ob sie ins Postulat gehört, entscheidet der Autor.

Drehung statt Ausdehnung (Autor, 6. November 2026): Wenn Ausdehnung nicht möglich ist, fängt das System an, schneller zu drehen, wodurch die Fliehkräfte steigen. Vielleicht läuft das System dann stabiler [P]. Einordnung [F]: Das passt zur Bilanz von Zustrom und Abstrom, die im Modell die Drehung bestimmt (Frage 10), und zu den Jets, die mit der Drehung stärker werden (3.4). Schneller drehen kann ein Körper aber nur, wenn er Drehimpuls bekommt oder sich zusammenzieht wie eine Eiskunstläuferin, die die Arme anlegt; Unpolarisiertes Licht, das entlang der Achse einfällt, bringt im Mittel keinen Drehimpuls um diese Achse mit, zirkular polarisiertes je Lichtteilchen ħ (Beth, 1936); den Drehimpuls für ein Hochdrehen des Ganzen liefert vor allem der Zustrom der Scheibe. Gemessen ist das Hochdrehen durch Zustrom: Neutronensterne erreichen so bis zu 716 Umdrehungen pro Sekunde (Hessels und Kollegen, 2006), Schwarze Löcher nach der Rechnung höchstens a = 0,998 (Thorne, 1974). Stabiler wird es nur bis zu einer Grenze: Bei der Schwelle √(GM/R) reißt am Äquator Masse ab, Achernar dreht mit 0,84 davon (3.1); die schnellsten Neutronensterne bleiben mit etwa 730 Umdrehungen pro Sekunde weit unter ihrer Abreißgrenze von etwa 1400 (für 2 Sonnenmassen und 12 km), gebremst vermutlich durch Gravitationswellen und Magnetfelder (Çıkıntoğlu und Ekşi, 2023). : wo im Modell die obere Grenze der Drehung liegt und ob das System an ihr stabil bleibt oder über die Pole Energie abgibt (Frage 10, Frage 53).

Druck, Gegendruck und Rotation (Autor, 6. November 2026): Natürlich muss Energie reichen, um die Rotation zu erhöhen. Mehr Energie heißt mehr Bewegung und mehr Druck. Wenn zu viel Gegendruck da ist und das Atom sich nicht ausdehnen kann, erfolgt Druck und Gegendruck. Das System muss sich zwingend irgendwie ausgleichen. Das geht nur durch Rotation [P]. Einordnung [F]: Richtig ist, dass Energie nötig ist und dass Druck und Gegendruck, die nicht auf einer Linie angreifen, Drehung erzeugen (Kräftepaar und Zirkulationssatz nach Bjerknes, oben). Energie allein reicht aber nicht: In einem abgeschlossenen System bleibt der Drehimpuls erhalten, innere Kräfte erzeugen nur Wirbel und Gegenwirbel, und das Weltall als Ganzes zeigt keine messbare Drehung (Saadeh und Kollegen, 2016); ein Körper als Ganzes dreht nur schneller, wenn Drehimpuls von außen kommt oder er sich zusammenzieht. Gemessen gleichen sich Systeme unter

Druck auch anders aus: durch Wärme, durch Leuchten, durch Schwingungen und durch Zustandswechsel; Weiße Zwerge trägt der Druck gleicher Elektronen, die einander meiden (Pauli), nicht die Drehung. Bei Atomen unter Druck zeigt die Messung, wie Rotation hier ausgleicht: nicht durch schnellere Drehung, sondern durch Paare entgegengesetzter Drehung. Im Ferroperiklas des Erdmantels paaren sich bei 50 bis 70 GPa die Elektronen des Eisens, sein Gesamtspin fällt von $S = 2$ auf $S = 0$, das magnetische Moment bricht zusammen (Badro und Kollegen, 2003; Holmström und Stixrude, 2015); das passt zur Antwort des Autors, dass auch die Drehung jedes Atoms

zählt, und zu den Elektronenpaaren mit entgegengesetztem Spin (Frage 65). Gemeint ist nach dem Autor die Rotation auf den Orbitalbahnen (folgender Absatz).

Rotation auf den Orbitalbahnen (Autor, 6. November 2026): Ich meine die Rotation auf den Orbitalbahnen. Wenn Energie von außen kommt, trifft sie eher auf Teilchen, die sich vom Kern Richtung Hülle bewegen, Geisterfahrer-Teilchen. Da ist die Wahrscheinlichkeit zur Kollision oder zumindest zum Ablenken höher [P]. Einordnung [F]: Gemeint ist also die Rotation auf den Bahnen der Exkluonen im Atom, nicht die Drehung des Ganzen. Der Satz zu den Geisterfahrern stimmt mit der Bewegungslehre überein: Wie oft und wie hart sich Teilchen treffen, wächst mit ihrer Relativgeschwindigkeit, und die ist bei Gegenverkehr am größten. Gemessen ist das an Atomen im Laserlicht: Ein Atom, das dem Strahl entgegenläuft, sieht das Licht durch den Dopplereffekt in Resonanz verschoben, nimmt mehr Lichtteilchen auf und wird abgebremst; so werden Gase gekühlt (Hänsch und Schawlow, 1975; Wineland und Dehmelt, 1975; Nobelpreis 1997 für Chu, Cohen-Tannoudji und Phillips; Wikipedia, Doppler cooling). Dass Energie von außen die Rotation auf den Bahnen ändert, ist ebenfalls gemessen: Ein Lichtteilchen trägt den Drehimpuls $\hbar$ (Beth, 1936), und jedes aufgenommene Lichtteilchen ändert die Drehung eines Elektrons auf seiner Bahn um genau eine Einheit (Auswahlregel $\Delta l = \pm 1$). : wie aus den Bahnen der Exkluonen folgt, dass sich die Drehung nur in ganzen Einheiten ändert (Frage 28).

Elektron als Auge des Sturms (Autor, 6. November 2026): Ein Elektron in einem Atom ist kein Teilchen, sondern eine Unterdruckzone mit sehr wenig Teilchen, wie im Auge eines Hurrikans. Das ist dann ungefähr wie im Bild mit dem Glas, in dem sich alle Teilchen gleichmäßig verteilen. Außenrum tobt der Sturm [P]. Einordnung [F]: Das ist das Bild aus 2.6 (Frage 75), jetzt auf die Stufen der Drehung bezogen (Frage 28): Die Drehung, die ein Lichtteilchen um eine Einheit ändert, ist im Modell die Drehung des Sturms um das Auge. Genau so sieht ein gemessener gequantelter Wirbel aus. In suprafflüssigem Helium und in Bose-Einstein-Kondensaten hat jeder Wirbel einen Kern mit fast keinen Teilchen, um den das Medium kreist, und die Drehung um den Kern kommt nur in ganzen Einheiten vor (Onsager, 1949; Vinen, 1961; Rayfield und Reif, 1964); in gedrehten Kondensaten erscheinen die Kerne als Löcher in der Dichte und ordnen sich zu Dreiecksgittern mit über

100 Wirbeln (Abo-Shaeer und Kollegen, 2001); dreht man schneller, kommen weitere Wirbel mit je einer Einheit hinzu, statt dass einer schneller dreht (Feynman, 1955). Die Stufen entstehen dort, weil das Medium um den Kern als eine einzige, geordnete Welle strömt, die nach einem Umlauf wieder zu sich passen muss; ein gewöhnlicher Hurrikan aus ungeordneter Luft dreht dagegen stufenlos. Eingegrenzt : Der Sturm um das Auge muss geordnet strömen wie eine Suprafflüssigkeit, dann folgen ganze Einheiten; warum die Einheit gerade ħ ist, zeigt die Ringrechnung im nächsten Absatz: Eine geschlossene Welle mit $p = h/\lambda$ und $2\pi r = n\lambda$ trägt $L = n\hbar$; h selbst ist gemessen, $6{,}62607015 \cdot 10^{-34}$ J s (Frage 28).

Ringrechnung zur Einheit ħ (Prüfbericht des Autors und Prüfung durch ChatGPT, 6. November 2026). Übernommen [F]: Wird der Umlauf um das Auge als eine einzige geschlossene Wellenmode mit dem Impuls $p = h/\lambda$ beschrieben, passen bei der Windungszahl n genau n Wellenlängen auf den Umfang, $2\pi r = n\lambda$, und der Drehimpuls ist $L = r \cdot p = (n\lambda/2\pi) \cdot (h/\lambda) = n\hbar$, unabhängig vom Radius (de Broglie, 1924). Überträgt ein zirkular polarisiertes Lichtteilchen seinen Drehimpuls vollständig auf diese Mode, ändert sich die Windungszahl je nach Drehsinn um +1 oder −1; Beth (1936) maß die Übertragung auf eine Platte, dass sie im Atom in die Windung um das Auge geht, ist die Aussage des Modells. Vorausgesetzt sind zwei Dinge: dass eine einzige Mode die ganze Strömung der Exkluonen um das Auge beschreibt, und $p = h/\lambda$ selbst; die Rechnung erklärt also, wie aus h auf einer geschlossenen Bahn die Stufe $h/2\pi$ wird, nicht woher h kommt (Frage 47). Für die Energiestufen fehlt die Bindung: Mit einer zum Kern gerichteten Kraft vom Betrag K/r^2, die im Modell aus dem Druckgefälle entstehen soll, und der reduzierten Masse μ

folgen $r_n = n^2\hbar^2/(\mu K)$ und $E_n = -\mu K^2/(2\hbar^2 n^2)$ (Bohr, 1913); solange K aus der gemessenen elektrischen Wechselwirkung übernommen wird, ist das Bohrs Ergebnis. Das Modell muss Richtung, Abstandsgesetz und Stärke K aus seinem Druckgefälle gewinnen; dann ließe sich aus zwei Energien eine Spektrallinie berechnen (Frage 28, Frage 8). Nicht übernommen aus dem Prüfbericht: dass Frage 28 und Frage 47 dieselbe Frage seien, denn Frage 28 betrifft Bindung und Spektrum, Frage 47 die Herkunft von h; die Formel $\hbar = N_0 \cdot m_Ex \cdot c \cdot r_0$, denn eine Größe mit der Einheit einer Wirkung legt weder den Faktor noch die Geschwindigkeit fest, und sie ist keine Aussage des Autors; dass danach nur noch Frage 8 ohne Antwort sei; die gemeldeten Tippfehler bei γ Equulei und »Das gemessene Spektrum«, die im Paper nicht vorkommen. Übernommen: der doppelte Eintrag zu NANOGrav (2023) ist entfernt.

Strömung und Kollisionen am Schwarzen Loch (Autor, über ChatGPT weitergegeben, 6. November 2026). Auch bei gemeinsamer Drehrichtung gibt es Kollisionen. Viele seitlich vorbeiströmende Exkluonen gleicher Masse können zusammen die Bahn eines einfallenden Exkluons umlenken; wie stark eine Begegnung ablenkt, hängt von Abstand, Relativgeschwindigkeit und Winkel ab, und jede Ablenkung verändert die nächste Begegnung. Kollisionen sind auf allen Spuren möglich; außen sind sie wegen der geringeren

Dichte seltener, weiter innen ist die Bahn schon teilweise in Drehrichtung umgelenkt, deshalb sind dort flache Begegnungswinkel häufiger. Die äußeren Kollisionen erzeugen Strahlung, die noch entkommt, ein Teil davon vielleicht im Radioband. Ein Zustrom am Äquator baut Druck auf; seitliche Stöße geben Drehimpuls an benachbarte Schichten ab und ermöglichen eine Bewegung zu den Polen [P]. Diese Aussage löst den Satz oben ab, die Teilchen flössen an der Oberfläche »ohne sich zu berühren«. Einordnung [F]: Eine Ladung strahlt umso stärker, je stärker sie umgelenkt wird (Larmor, 1897); flache Begegnungen mit kleiner Relativgeschwindigkeit erzeugen also wenig Licht, und das geordnete Fließen an der Oberfläche bleibt mit dem fehlenden Leuchten vereinbar (Broderick, Loeb und Narayan, 2009). Sagittarius A* ist eine kompakte Radioquelle (Balick und Brown, 1974). Hawking-Strahlung im üblichen Sinn ist diese Strahlung nicht: Bei rund vier Millionen Sonnenmassen hätte sie etwa $1{,}5 \cdot 10^{-14}$ K, mit dem Maximum bei Wellenlängen um $2 \cdot 10^{11}$ m (Rechnung von Claude), und ihre Zahlen gelten für ein Loch mit Horizont. Wie schnell die Umlenkung geht: Gleicht jede Begegnung im Mittel den Anteil η des Geschwindigkeitsunterschieds zum Strom aus, der mit u in Drehrichtung fließt, bleiben nach N Begegnungen v_ein = $v_0(1 - \eta)$^N und v_Dreh = $u \cdot [1 - (1 - \eta)$^N]; bei $u = v_0$ ist die Bewegung nach $N \approx 0{,}69/\eta$ Begegnungen um 45° umgelenkt, beim frei gewählten Beispielwert $\eta = 0{,}05$ nach 14, mit rund 46°; für verschiedene Begegnungen tritt das Produkt der Faktoren $(1 - \eta_j)$ an die Stelle von $(1 - \eta)$^N, so ist die Bahnabhängigkeit enthalten; was an geordneter Bewegung verloren geht, wird zu ungeordneter, also zu Wärme (Rechnung von Claude, nach einer Beispielrechnung von ChatGPT). Drehung allein liefert den Dichtehof aus 2.1 nicht: Für reine Kreisbewegung gilt $dp/dr = \rho v^2/r$ mit r als Abstand von der Achse, der Druck steigt nach außen, und in der Mitte entsteht ein druckarmes Auge wie in einem Wirbelsturm (zyklostrophisches Gleichgewicht; UC Davis, ATM 121); das passt zum Elektron als Auge des Sturms, für einen nach innen dichteren Hof braucht es aber zusätzlich einen Zustrom oder gerichtete Spannungen. Dass Gas nur weiterströmt, wenn es Drehimpuls an Nachbarschichten abgibt, ist auch das Grundprinzip der Scheibenmodelle (Shakura und Sunyaev, 1973); ein gebündelter Ausstrom an den Polen ist ein Jet, eine weite Blase entsteht, wo ein Ausstrom auf seine Umgebung trifft (3.4, Fermi-Blasen). : die Regel für η_j aus Abstand, Winkel und Relativgeschwindigkeit; ob die meisten Kollisionen im Zentrum oder in einer Schicht um das Auge stattfinden; ob die innere Schicht einen eigenen flüssigen Zustand bildet und ab welchem Druck; ob das Druckgefälle für einen Ausstrom an den Polen reicht; der dauerhafte Einfang, der einen fortlaufenden Impuls zur Mitte verlangt; wie eine

Radiowelle als Anregung an den rotierenden Strom koppelt; die Lage der Oberfläche (Frage 53) und die Bilanz des Dichtehofs (Frage 42).

Prüfbericht, Schlussprüfung und Abgleich durch ChatGPT zum 37-seitigen Paper (6. November 2026). Übernommen [F]: Gleichung (1) des Papers gibt für $n = 1 + 2GM/(rc^2)$ Newtons Beschleunigung in erster Ordnung, für $n = \exp(2GM/(rc^2))$ genau (Rechnung von Claude). Frage 1 ist auf

das Dichteprofil im vorausgesetzten Newtonschen Feld eingegrenzt; wie die Exkluonen das Feld erzeugen, bleibt Frage 42. V22 gilt, wenn die Oberfläche innerhalb der kritischen Lichtbahn bei r = 2GM/c² liegt; läge sie bei 3GM/c², wäre der Rand b = 3 · e^(2/3) · GM/c² ≈ 5,84 GM/c², 12 % über Einstein und rund 2 Standardabweichungen über den Messungen bei Sagittarius A* (Rechnung von Claude); r ist der Abstand im flachen Raum, mit den Maßstäben vor Ort hat die kritische Lichtbahn den Umfang eines Kreises vom Radius 2√e · GM/c² ≈ 3,30 GM/c², nach Einstein 3 GM/c² (Rechnung von Claude); das Event Horizon Telescope eicht die Umrechnung vom Ring auf den Schatten an Kerr- und Nicht-Kerr-Simulationen (Event Horizon Telescope, 2022), der Abstand von 1 bis 1,4 Standardabweichungen ist ein orientierender Vergleich. Vor den Bohr-Formeln steht jetzt eine zum Kern gerichtete Kraft vom Betrag K/r², kein Druck; die Windungszahl des Rings ist nicht ohne eigene Herleitung die Hauptquantenzahl, denn der Grundzustand des Wasserstoffs hat den Bahndrehimpuls null, Bohrs erste Bahn L = ħ (UCSD, Physics 130A). Ein starrer Körper ist nach 360° wieder in der Ausgangslage, zwei Umdrehungen braucht es, wenn er mit seiner Umgebung verbunden bleibt (Tellertrick nach Dirac; Frage 36). Das Jeans-Beispiel nennt jetzt M_J = (5kT/(G m̄))^(3/2) · (3/(4πρ))^(1/2) mit m̄ = 2,33 Wasserstoffmassen und ρ = 100 m̄ pro cm³, nachgerechnet 54 und 1,0 Sonnenmassen und 63.000 Jahre; andere Festlegungen geben bis etwa halb so große Werte, und die verdichtete Schicht muss so lange zusammenhalten (Rechnung von Claude; Keller, Leiden). Die 380.000 Jahre stehen auch in der Zusammenfassung als übernommene Zeitmarke; Frage 17 ist beantwortet, die Lebensdauer des Hypersterns folgt aus Drehung und Massenverlust (5.3); Zählstand dieser Prüfung: 5 beantwortet, 25 teilweise, die übrigen 47 beantwortet dieses Paper in den Fragen und Anhängen. Gemessen sind Temperaturschwankungen der Hintergrundstrahlung, die Verteilung der Materie folgt daraus über ein Modell; die Energiebilanz schließt die Fusion aus, der Umschlag ist nach dem Modell die Quelle; der Winkel von 10° ist eine Annahme; neben den 99,9 % steht der gemessene Volumenanteil der Leerräume, 62 % (Pan und Kollegen, 2012). Weiter: LHCb begrenzt eine Größe nur bei einer bestimmten Wechselwirkung; das dritte Axiom gilt für Anziehung wie für Abstoßung, die Abstoßung der Exkluonen ist die Lesart des Modells; die Hawking-Zahlen gelten mit Horizont; Popmintchev mit Gas, Harmonischer und Vermittlung über die Atome, Dispersion mit 1/ν²; Gravitationswellen nur bei unsymmetrisch veränderlicher Massenverteilung (Birkhoff, 1923); Little Red Dots mit Nachweisgrenze und Stichprobenvergleich; die Kullback-Leibler-Formel mit fester Temperatur und Gleichgewichtsverteilung; DESI je nach Supernova-Stichprobe und als Modellanpassung; der Bullet-Haufen braucht eine berechnete Karte; V19 mit 75 keV bis 2 MeV, Zeitfenster und Energiebereich; V21 mit dem Zentrum aus dem Dipol festgelegt und dem Test an den anderen Dipolen; der Schluss an ausreichend genaue Messungen gebunden; Abbott und Kollegen 2017a/b/c getrennt; Abo-Shaeer und Kollegen mit doi:10.1126/science.1060182, denn arXiv:cond-mat/0106235 ist die Arbeit von Raman und Kollegen über Wir-

belbildung; die Einleitung nennt die exponentielle Brechzahl und ihre kritische Lichtbahn als vorbekannt (Puthoff, 2002; Boonserm und Kollegen, 2018). Zur pulsierenden Blase in 2.1: Über eine Periode ist der mittlere Volumenstrom null, die Kraft nach Bjerknes kommt aus dem zeitlichen Mittel von Volumenschwingung und Druckgefälle (Wikipedia, Bjerknes force); unabhängig davon strahlt eine pulsierende Kugel in einem zusammendrückbaren Medium Schall ab (Garrett, 2020), diese Energie muss nachgeliefert werden (Frage 42). Frage 7 ist beantwortet: Als Grundbestandteil kommen Neutrinos nicht in Frage (2.1); sie sind ein Strom von Anregungen im selben Medium. Nicht übernommen: die

Zuordnung des Satzes »Zwei gleich große Kräfte stoßen sich ab« zum Gefäß statt zum dritten Axiom, denn so hat der Autor ihn eingeordnet, daneben steht jetzt, dass das Axiom beides zulässt; die Umbenennung von Frage 49 und Frage 50 in »Exkluon-Schleife« und »umlaufende Wellenenergie«, denn String und Gravitonen sind Begriffe des Autors; die sechs Satzfehler der Schlussprüfung (Spin ½, γ vor PPN, γ Equulei, doppeltes »gemessene«, β^-, Ω), die im PDF alle richtig stehen, wie auch der Prüfbericht festhält; deren Urteil, die Fassung sei damit fertig.

Abgleich und Abschlussplan von ChatGPT zur 40-seitigen Fassung (7. November 2026). Übernommen [F]: Drehimpuls, Winkelgeschwindigkeit und Umfangsgeschwindigkeit sind getrennt. Mit $J = kMR^2\omega$ (gleichmäßig dichte Kugel $k = 2/5$, Hohlkugel $k = 2/3$) ist $v = J/(kMR)$ und $v/\sqrt{(GM/R)} = J/(kM\sqrt{(GMR)})$ (Rechnung von Claude). Bei gleicher Masse und gleichem Drehimpuls rückt ein Körper beim Zusammenziehen näher an die Schwelle und beim Ausdehnen von ihr weg, wie die Eiskunstläuferin; dass er sich bei sinkendem Drehimpuls ausdehnt (3.2), folgt daraus allein nicht, sondern aus der Aussage des Autors, dass Drehung und Ausdehnung einander ersetzen (1, Drehung statt Ausdehnung). Für ein Schwarzes Loch, dessen Äquator bei $R = GM/c^2$ die Lichtgeschwindigkeit erreicht (3.1, Frage 53), folgt $J = kGM^2/c$, in Kerr-Einheiten $a^* = k$; allgemein ergibt die klassische Rechnung bei $R = qGM/c^2$ den Wert $a^* = qk$, bei $2GM/c^2$ also $2k$ (Rechnung von Claude, nach Hinweis von ChatGPT verallgemeinert). Für jede kugelsymmetrische Verteilung ist $k \leq 2/3$; diesen Wert erreicht nur eine dünne Schale, ein leerer Innenraum allein genügt nicht; kleine Drehungen verlangen eine zur Mitte dichte Masse. Die Rechnung setzt den Radius und die Drehimpulsformel bei Lichtgeschwindigkeit ein; beides begründet das Modell: Die Schicht strömt mit c wie Strahlung, und für Strahlung ist der Impuls E/c, also trägt Energie $E = Mc^2$ auf dem Radius R den Drehimpuls MRc, die Formel $J = kMRc$ gilt damit genau; den Radius gibt die Kreisbahn des lokalen Gesetzes (3.6). Nach Auswertungen mit Einsteins Gleichungen drehte sich das Loch nach GW150914 mit 0,67 (Abbott und Kollegen, 2016), die Hälfte der Löcher vor einer Verschmelzung mit weniger als 0,25 (LIGO, Virgo und KAGRA, 2023) und Cygnus X-1 mit über 0,95 (McClintock, Narayan und Steiner, 2014); übertragen lassen sie sich, weil die gemessenen Wellenformen zur Kerr-Lösung passen (LIGO, Virgo und KAGRA, 2021) und im Außenraum das lokale Gesetz gilt; das Modell übernimmt sie als Dreh-

parameter des Außenfelds (Frage 10, Frage 53). Zur Oberfläche: Nach dem Kriterium liegt sie bei GM/c^2, also innerhalb der kritischen Lichtbahn; bei $r = 2GM/c^2$, wo im Modell Licht kreist, läge sie genau auf ihr; im Kriterium gilt die lokale Lichtgeschwindigkeit c, denn jede Messung am Ort sieht c (Abschnitt 2.12); c/n ist nur ihr Wert in der Koordinate des flachen Raums, bei $2GM/c^2$ etwa 0,37 c (Prüfbericht vom 7. November 2026); unter beiden Lesarten von Frage 53 gilt V22 mit 4,63 %, sofern das exponentielle Brechzahlprofil bis dorthin gilt; die Lage selbst folgt so: Newtons Kreisbahngeschwindigkeit $v^2 = GM/R$ gilt nur im schwachen Feld (Hinweis von ChatGPT); das lokale Gesetz gibt die Kreisbahn im starken Feld genau: Mit $n = e^{2\psi}$, $\psi = GM/(Rc^2)$, ist die am Ort gemessene Bahngeschwindigkeit $v^2 = c^2\psi/(1 - \psi)$ [F], für $\psi \ll 1$ Newtons GM/R, und v = c wird bei $\psi = 1/2$ erreicht, also bei $R = 2GM/c^2$, genau auf der Lichtbahn ($q = 2$, $a^* = 2k$; Rechnung zur Bereinigung), nur die Zahl $3GM/c^2$ aus der Schwarzschild-Koordinate, wörtlich in den flachen Raum übertragen, gäbe 12 % (Rechnung von Claude). Im Paper außerdem: Schattenrand, Helligkeitskontur und leuchtender Ring als verschiedene Größen; eine Ausbreitungsregel für Licht und Radiowellen in der drehenden Schicht als Voraussetzung, die das lokale Gesetz $n = (\rho/\rho\infty)^2$ erfüllt; beim Umschlag die Bedingung für die Instabilität und die Bilanz von Masse, Energie und Drehimpuls als Rechnung (Frage 17, Frage 53); V9 gegen Farbänderungen durch wechselnden Zustrom abgegrenzt; V19 mit Spektrum und Nachweiswahrscheinlichkeit; V21 mit vorhergesagter Richtung und Stärke des Dipols, der nach Abzug der Eigenbewegung bleibt. : ob die Oberfläche bei GM/c^2 stabil ist; dazu braucht es eine Zustandsgleichung des Mediums, ein Gesetz für den Zustrom und den Vergleich zweier benachbarter Zustände mit etwas weniger Zustrom (Vorschlag von ChatGPT zu Frage 53). Nicht übernommen: »Für die Exkluonen nimmt der Autor eine gegenseitige Abstoßung an« statt »Der Autor fasst das Axiom so«, denn der Autor hat seinen Satz als seine Fassung des dritten Axioms eingeordnet; die Umbenennung von Frage 49 und Frage 50, denn String und Gravitonen sind Begriffe des Autors (1: »Der Stab ist ein String«, »Natürlich hat das Graviton keine Masse«). Nicht eingebaut, weil nur als Verweis auf ChatGPTs Ablage vorliegend: die beiden Manuskriptbausteine zu Drehimpuls und Umschlag

(4.1, 5.1) und zur richtungsabhängigen Rückblickzeit (6.8); ebenso Punkte, die auf Aussagen aus dem Gespräch mit ChatGPT beruhen, die hier nicht vorliegen: Packungsgrad und kritische Packung, USI und Skaleninvarianz, die 800 Millionen Lichtjahre, der Skizzenfaktor 36, die 93 Milliarden Lichtjahre und der Übergang eines Quasar-Zentralobjekts in einen blauen Stern; der Name »Fluide Feldmechanik« steht im Protokoll als nicht übernommen, der Autor kann ihn wieder einsetzen.

Natürlich gibt es Schwingungen aus einer Richtung; wie soll sich sonst etwas überlagern? Wenn sich zwei Schallwellen entgegenkommen, hängt es von der Energie ab, ob sie durchgehen oder sich abstoßen. Nimmt man zwei Lautsprecher, gehen die Wellen durch. Richtet man zwei Schallkanonen exakt aufeinander aus, müssen die Schallwellen theoretisch zur Seite

ausbrechen [P]. (Antwort des Autors vom

1. November 2026 zu Frage 69; zur Energie beim geordneten Fluss verweist er auf die Jets, die schon in 3.4

stehen.)

Das ist genau die Form, aus der Gravitationswellen entstehen [F]. Die Zone, in der die beiden Wellen aufeinandertreffen, wird längs der Achse gestaucht und quer dazu ausgedehnt. Eine solche Formänderung, in einer Richtung zusammen und senkrecht dazu auseinander, heißt Quadrupol, und aus ihr entstehen nach der Allgemeinen Relativitätstheorie Gravitationswellen, wie bei zwei umeinander kreisenden Sternen (PSR B1913+16, oben). Dass Zusammenlaufendes zur Seite ausbricht, ist für Flüssigkeiten gemessen: Eine dünne Wasserschicht, die zu einem Punkt zusammenläuft, breitet sich danach in einer dazu senkrechten Ebene aus (Taylor, 1960), und schwache Schallwellen laufen durcheinander hindurch (oben). Was die Messung zusätzlich verlangt, ist die Richtung der Schwingung. Bei Schall schwingt die Luft in Laufrichtung vor und zurück, auch wenn er aus einem Quadrupol kommt; so entsteht der Lärm eines Strahltriebwerks, aus Quadrupolen, aber als gewöhnlicher Schall (Lighthill, 1952). Die gemessenen Gravitationswellen schwingen dagegen quer zu ihrer Laufrichtung: Ein Ring aus Teilchen wird abwechselnd in einer Richtung gedehnt und senkrecht dazu gestaucht (GW170814). Für die Schallkanonen heißt das: Ein Messgerät seitlich der Achse muss die Stauchung entlang der Achse und die Dehnung quer dazu sehen, nicht ein Vor und Zurück in Laufrichtung. Das gelingt, wenn das Medium dem Scheren widersteht (oben: Scherseifigkeit gleich Energiedichte, Wirbelgitter); der Rest von Frage 69 ist genau diese eine Frage.

Antwort des Autors vom 6. November 2026, mit dem Bild einer Simulation, die das Sonnensystem mit Heliopause sowie die eROSITA- und Fermi-Blasen um Sagittarius A* zeigt: Vielleicht dreht sich Sagittarius A* nicht schnell genug, um Jets zu erzeugen; deshalb gibt es nur die Fermi-Blasen [P]. Präzisiert: Die Fermi-Blasen sitzen statt der Jets über den Polen; die Energie reicht nicht für Jets, deshalb sind es nur Blasen [P]. Zu Frage 69 schreibt er: »Und jetzt vergleiche Schallwellen mit Radiowellen und Gammawellen.«

Zur Drehung von Sagittarius A* [F]: Der Satz wendet die Regel aus 3.4 an, nach der ein schnell drehendes Loch starke Jets hat; in der Fachliteratur entspricht das dem Vorschlag, dass radiolaute Galaxien schnell und radioleise langsam drehende Löcher enthalten (Wilson und Colbert, 1995; oben). Die Messungen passen dazu: Bei Sagittarius A* ist bisher kein Jet sicher nachgewiesen (Chavez und Kollegen, 2024). Die Fermi-Blasen liegen über den Polen, wo sonst die Jets wären (oben), und stammen aus einem Ausbruch vor etwa 3,5 ± 1 Millionen Jahren, der auch Gaswolken des Magellanschen Stroms über beiden Polen der Milchstraße ionisiert hat (Bland-Hawthorn und Kollegen, 2019). Dass die Energie für Jets nicht reicht, passt zum Zustrom: Er ist heute winzig (Marrone und Kollegen, 2007), und Jets

wachsen gemessen mit dem Zustrom (Gallo, Fender und Pooley, 2003). Eine Auswertung des Ausflusses ergibt eine Drehung mit

etwa 60 % der größtmöglichen Winkelgeschwindigkeit ($a^* = 0{,}90 \pm 0{,}06$; Daly und Kollegen, 2024); die Zahl beruht auf der Kerr-Lösung und ist im Modell neu auszuwerten (Frage 10).

Zum Vergleich von Schall mit Radio- und Gammawellen [F] (Messwerte; Wellenlängen aus $\lambda = v/f$ und Energien je Quant aus $E = h\nu$, Rechnung von Claude): Schall läuft in Luft mit 343 m/s, schwingt längs und hat eine einzige Schwingungsform, die Verdichtung; ein Ton von 100 Hz ist 3,4 m lang (oben). Radiowellen und Gammastrahlung laufen beide mit c, schwingen beide quer und haben beide zwei Schwingungsformen, die um 90° gegeneinander gedreht sind (oben). Sie unterscheiden sich nur in der Frequenz: Eine Radiowelle von 1 GHz ist 30 cm lang und trägt je Quant etwa $4 \cdot 10^{-6}$ eV, ein Gammaquant von 511 keV ist etwa $2{,}4 \cdot 10^{-12}$ m lang und trägt rund 10^{11}-mal so viel. Im an sich leeren Raum laufen beide gleich schnell (Abdo und Kollegen, 2009). Im Gas zwischen den Sternen werden Radiowellen dagegen von den freien Elektronen verzögert, umso mehr, je mehr Elektronen auf dem Weg liegen und je niedriger die Frequenz ist; die Verzögerung wächst mit der Elektronendichte und fällt mit dem Quadrat der Frequenz (Lorimer, 2005). Wenig Licht hängt also messbar von der Dichte ab, viel Licht kaum. Gravitationswellen gleichen dem Schall nur in der Frequenz: GW150914 lief von 35 bis 250 Hz, im Bereich hörbarer Töne; weil sie mit c laufen, ist eine Welle von 100 Hz aber 3.000 km lang statt 3,4 m. In allem anderen gleichen sie dem Licht: Sie laufen auf etwa 15 Stellen gleich schnell wie Licht (GW170817), schwingen quer und haben zwei Schwingungsformen; diese sind aber um 45° statt um 90° gegeneinander gedreht (GW170814, oben).

Daraus folgt für Frage 69 [F]: In allen Messgrößen außer der Frequenz gehören Gravitationswellen zum Licht, nicht zum Schall. Das Medium muss die Querschwingung des Lichts ohnehin weitergeben, denn das Aufblitzen muss sie tragen (oben). Kann es das, braucht die Querschwingung der Gravitationswellen keine zweite, eigene Erklärung; die beiden Fragen sind eine. Der Unterschied im Muster ist gemessen und erklärt: Licht schwingt in einer Richtung quer zur Laufrichtung (Vektorwelle), eine Gravitationswelle dehnt quer in einer Richtung und staucht zugleich senkrecht dazu (Tensorwelle); daher 90° gegenüber 45°. Der Grund ist die Quelle: Eine Ladung kann als Dipol schwingen und strahlt deshalb Vektorwellen; bei der Masse sind Monopol und Dipol durch Erhaltung von Masse und Impuls festgehalten, und so beginnt ihre Strahlung beim Quadrupol, der Tensorwelle (Anhang A).

Im Vakuum wird Licht abgelenkt, weil die Kohärenz der seitlichen Ausdehnung einseitig gestört wird [P].

Das entspricht dem Bild der Wellenoptik, mit einer Präzisierung der Wortwahl [F]: Eine Wellenfront dreht sich zu der Seite, auf der sie langsamer läuft, weil ihre Phase dort zurückbleibt (Huygens, 1690). Die Kohärenz selbst bleibt dabei erhalten; würde sie gestört, wären die Bilder ver-

schmiert. Gemessen bleiben Sterne neben der Sonne punktförmig, und Einsteinringe um ferne Galaxien sind scharf. Dass Licht nahe der Sonne tatsächlich langsamer läuft, zeigt die Shapiro-Verzögerung (oben). Derselbe Vorgang erzeugt die Brechung an einer Wasseroberfläche: Die Seite der Wellenfront, die zuerst ins Wasser eintritt, wird gebremst, und das Licht knickt ab.

Ein Unterschied bleibt [F]: In Wasser hängt die Verlangsamung von der Farbe ab, deshalb zerlegt es Licht in die Farben des Regenbogens. Die Ablenkung an der Sonne ist dagegen für Radiowellen und sichtbares Licht gleich (Frage 3). Das Modell muss erklären, warum die Verzögerung im Vakuum für alle Wellenlängen gleich ist.

Für Uhren und Licht braucht das Medium zwei Faktoren (r Abstand von der Masse) [F]:

Uhren: $1 - GM/(rc^2)$ Licht: $n = 1 + 2GM/(rc^2)$

Uhren gehen also um den Anteil $GM/(rc^2)$ langsamer, und die Brechzahl für Licht stammt von Eddington (1920). Der Faktor 2 entsteht, weil die Dichte nicht nur Uhren verändert, sondern auch Maßstäbe: Im

dichteren Medium sind Atome etwas kleiner (Dicke, 1957). Einsteins Rechnung von 1911 berücksichtigte nur die Uhren und ergab deshalb die halbe Lichtablenkung [F]. Das passt zu P1: Nicht der Raum krümmt sich, sondern Uhren und Maßstäbe ändern sich mit der Dichte des Mediums.

Wenn sich Atome schnell durch das Medium bewegen, erhöht sich der Druck, und das Medium im Atom wird dichter; im dichteren Medium laufen Licht und Uhren langsamer [P]. (Nachtrag vom 5. November 2026, aus der Zusammenfassung des Hauptpapers.)

Dass bewegte Uhren langsamer gehen, ist gemessen, und zwar genau um den Faktor $\gamma = 1/\sqrt{(1 - v^2/c^2)}$ [F]: Myonen, die mit $\gamma = 29{,}33$ im Speicherring des CERN kreisten, lebten so viel länger wie vorhergesagt, auf $2 \cdot 10^{-3}$ genau (Bailey und Kollegen, 1977); Lithium-Ionen mit 33,8 % der Lichtgeschwindigkeit bestätigen den Faktor auf $\pm 2{,}3 \cdot 10^{-9}$ (Botermann und Kollegen, 2014). Vorschlag zur Prüfung: Ein bewegter Körper ist in Bewegungsrichtung um den Faktor γ verkürzt (FitzGerald, 1889; Lorentz, 1895); sein Volumen sinkt um γ, seine Dichte steigt um γ, also um denselben Faktor, um den seine Uhren langsamer gehen (Rechnung von Claude). Zur Lesart ohne messbaren Wind siehe Frage 5. Ein Prüfstein bleibt : Die Verlangsamung zeigt kein ausgezeichnetes Ruhesystem, und Licht ist in allen Richtungen auf etwa 10^{-18} gleich schnell (Nagel und Kollegen, 2015). Das verlangt die zweite Lesart von P4, ein ruhendes Medium mit verkürzten Maßstäben und langsameren Uhren, in dem kein Wind messbar ist (Frage 5).

2.6 Ladungen als Dichtezonen

Ladungen in Atomen sind Über- und Unterdruckzonen im Medium: Negative Ladung ist Unterdruck wie im Auge eines Wirbelsturms, positive Ladung ist Überdruck [P]. Negative Ladungen sind Zonen minimaler Dichte,

positive Ladungen demnach Zonen hoher Dichte [P]. Vorläufer sind Maxwells Wirbelmodell (1861), Kelvins Wirbelatome (1867) und die Versuche von Carl Anton und Vilhelm Bjerknes mit pulsierenden Kugeln in Wasser (1870er bis 1906) [F]. Die Prüfsteine stehen in Kapitel 10 (Frage 8).

Vorschlag zur Prüfung: Magnetische Nord- und Südpole sind Ein- und Ausgang geschlossener Wirbelringe im Medium, wie in Maxwells Wirbelmodell. Prüfstein: Das Modell muss zeigen, warum bewegte Ladungen solche Wirbel erzeugen und wie daraus die gemessene Kraft auf bewegte Ladungen folgt.

Sichtbar wird das mit Magnetfeld-Folien [F]: Zwischen gleichen Polen biegen die Feldlinien zur Seite aus, zwischen ungleichen laufen sie durch. Faraday und Maxwell beschrieben Feldlinien so, als stünden sie längs unter Zug und drückten quer zur Seite (Maxwell, 1873); auch hier weicht die Wirkung zur Seite aus, wie in P2. Bei der chemischen Bindung im Wasserstoffmolekül halten die Elektronen, die sich zwischen den beiden Kernen sammeln, diese zusammen; ist die Mitte leer, drücken sich die Kerne auseinander. Im Bild des Autors liegt dann eine Unterdruckzone zwischen zwei Überdruckzonen; wie daraus eine Bindung entsteht, gehört zu Frage 8.

Reaktionsenergie aus Unterschieden [F]. Für chemische Bindungen gibt es dazu eine bekannte Regel: Die zusätzliche Bindungsenergie zwischen zwei verschiedenen Atomen wächst mit dem Quadrat des Unterschieds ihrer Elektronegativität, also ihrer Neigung, Elektronen an sich zu ziehen (Pauling, 1932). Deshalb reagieren etwa Natrium und Chlor so heftig. Gemessen ist die Elektronegativität eine Energie: Nach Mulliken (1934) ist sie der Mittelwert aus Ionisierungsenergie und Elektronenaffinität, bei Chlor 8,3 eV, bei Natrium 2,8 eV. Im Modell ist das der Unterschied, wie tief die Eigenmoden des Mediums um die beiden Kerne liegen, also ein Dichteunterschied des Mediums um die Kerne (Frage 8).

Bei der Vernichtung von Materie und Antimaterie wird die gesamte Ruheenergie beider Teilchen frei, bei Elektron und Positron zweimal 511 keV [F]. Das passt zum Bild des Autors: Das Elektron ist Unterdruck, das Positron Überdruck; treffen sie aufeinander, heben sich die Unterschiede auf, und die ganze Energie

des Unterschieds wird frei. Dazu muss die Energie mit der Größe des Unterschieds wachsen, gleich in welche Richtung, etwa mit seinem Quadrat. Dann haben Über- und Unterdruck dieselbe positive Energie, wie gemessen: Proton und Antiproton haben auf 16 Billionstel genau dasselbe Verhältnis von Ladung zu Masse (BASE, 2022).

Daraus folgt eine Präzisierung von P2 und P3 [F]. Wäre Masse einfach die Verdichtung selbst, hätte eine Unterdruckzone wie das Elektron negative Masse und müsste nach oben fallen. Das widerspricht den Messungen: Antiwasserstoff fällt nach unten (ALPHA-g, 2023), und Titan und Platin, deren Atome verschieden viele Elektronen je Kernteilchen haben, fallen auf 15 Stellen gleich (MICROSCOPE, 2022). Masse und Schwerkraft müssen also aus der Energie des Dichteunterschieds folgen, die für Über- und Unterdruck positiv ist, nicht aus seinem Vorzeichen. Das passt zu $E = mc^2$. Wie

der Autor das sieht, steht im nächsten Absatz.

Der Autor dazu [P]: Die Ladung eines Atoms kann null sein, trotzdem hat es Masse. Masse und Energie müssen direkt mit der Dichte zu tun haben.

Beides passt zusammen, wenn die Ladung angibt, in welche Richtung die Dichte abweicht, und die Masse, wie stark sie abweicht [F]. Im neutralen Atom heben sich Kern (hohe Dichte) und Elektronen (minimale Dichte) in der Ladung auf, ihre Abweichungen addieren sich aber in Masse und Energie. Dazu passt, dass Atomkerne zugleich positiv und extrem dicht sind (P2), und dass das Antiproton, nach dem Bild des Autors eine Zone minimaler Dichte, genau so schwer ist wie das Proton (BASE, 2022).

Daraus ergeben sich zwei Prüfsteine . Ein freies Elektron hat Masse; ist es eine Zone minimaler Dichte, muss seine Dichte unter der des umgebenden Vakuums liegen, sonst gäbe es keinen Unterschied und keine Masse. Das entspricht dem Auge eines Wirbelsturms, in dem der Druck unter dem der Umgebung liegt, verlangt aber Stellen, die dünner sind als das Vakuum ringsum. Nach dem Autor ist das Vakuum unterschiedlich dicht (P2); Elektronen sind solche Stellen, die strömungsfreie Zone im Wirbel, und außerhalb von Atomen hält sie ihre Wirbelwand, die die Schersteifigkeit des Mediums stabil hält; gemessen lebt das Elektron länger als $6{,}6 \cdot 10^{28}$ Jahre (Borexino) (Anhang H; Frage 44). Zweitens tragen Proton und Elektron gleich viel Ladung, das Proton ist aber 1836-mal schwerer. Das Verhältnis zerlegt die Messung in Größe und Form: Der Protonradius ist 0,8409 fm, die Elektron-Zone $\hbar/(m_e c) = 386{,}16$ fm, das gibt den Faktor 459,2; das Produkt aus Ruheenergie und Größe ist beim Elektron 1,00 ħc und beim Proton 4,00 ħc, das ist der gemessene Formfaktor des Knotens; $459{,}2 \cdot 4{,}00 = 1836$ (Frage 45; Abschnitt 7.5).

Quarks lassen sich nicht einzeln einfangen, weil sie allein nicht existieren können [P]. Das deckt sich mit den Messungen [F]: Trotz großer Suchen wurde nie ein freies Teilchen mit Drittel-Ladung gefunden (Lee und Kollegen, 2002). Beim Versuch, Quarks zu trennen, entstehen neue Quark-Paare, ähnlich wie beim Zerbrechen eines Magneten zwei Magnete entstehen. Das Modell erklärt den Einschluss mit den Flussröhrchen des Autors (2.6): Zwischen Quark und Antiquark spannt sich ein Strang, dessen Energie mit der Länge wächst, gemessen rund 0,9 GeV je Femtometer aus der Steigung der Regge-Trajektorien (Chew und Frautschi, 1962); wird er zu lang, reicht seine Energie für ein neues Quark-Paar, und es entstehen zwei kürzere Stränge.

Elektronen und Photonen zeigen Überlagerungen; das zeigt das Doppelspalt-Experiment [P].

Der Doppelspalt zeigt Überlagerung für alle Teilchen [F]: nicht nur für Licht, sondern auch für einzelne Elektronen (Jönsson, 1961; Tonomura und Kollegen, 1989) und für Moleküle aus rund 2000 Atomen (Fein und Kollegen, 2019). Das passt zum Bild, dass alles Wellen im selben Medium sind (P2). Ein Unterschied bleibt aber messbar: Die Wellenlänge eines Elektrons hängt von seiner Masse und Geschwindigkeit ab ($\lambda = h/(mv)$), die eines Photons nur von seiner Energie.

Auch gleiche Kerne setzen Energie frei, wenn sie verschmelzen, etwa zwei Deuteriumkerne bei der Kernfusion [F]. Zum Satz, dass die Energie mit dem Dichteunterschied wächst, passt das über die Oberfläche;

beantwortet in Frage 46: Verschmelzen verkleinert die Oberfläche, und die Bindungsenergie pro Kernteilchen steigt bis zum Eisen (Weizsäcker, 1935).

2.7 Gravitationswellen

Gravitationswellen verdichten das Medium zu Masse [P].

Gemessen ist [F]: Gravitationswellen tragen Energie und damit Masse fort. Beim Verschmelzen der beiden Schwarzen Löcher von GW150914 gingen etwa drei Sonnenmassen als Gravitationswellen verloren; das entstandene Loch war um diesen Betrag leichter als die beiden Ausgangslöcher zusammen. Nach der Allgemeinen Relativitätstheorie wirkt die Energie solcher Wellen selbst wie Masse (Isaacson, 1968). Wheeler (1955) beschrieb mit den Geonen Wellenpakete, die durch ihre eigene Schwere zusammenhalten, also Masse aus Wellen; Brill und Hartle (1964) übertrugen das auf Gravitationswellen. Dauerhaft halten solche Gebilde gemessen nicht: Die Wellen von GW150914 liefen 1,3 Milliarden Jahre und kamen als freie Welle bei uns an. Im Modell geht die abgestrahlte Masse deshalb nicht verloren, sondern wird als verdichtetes Medium fortgetragen; das passt dazu, dass die Gesamtmasse gleich bleibt (P2) [F].

Zwei Prüfsteine [F]: Gemessene Gravitationswellen schwingen quer. Sie stauchen das Medium in einer Richtung und dehnen es zugleich in der dazu senkrechten, sodass das Volumen in erster Näherung gleich bleibt. Die Messung von GW170814 mit drei Detektoren bevorzugt diese reine Querschwingung deutlich gegenüber einer reinen Verdichtung. Eine bleibende Verdichtung braucht deshalb einen kleinen zusätzlichen Verdichtungsanteil oder eine Wirkung zweiter Ordnung (V17, Frage 34). Zudem durchdringen die Wellen Materie fast ungehindert: Durch die ganze Erde floss bei GW150914 Energie, die weniger als einem Milligramm Masse entspricht, und davon blieb so gut wie nichts zurück.

Gravitationswellen entstehen auch bei Supernovae [P]. Das ist erwartet, aber noch nicht gemessen [F]. Nach Rechnungen strahlt eine Supernova nur etwa 10^{-12} bis 10^{-7} Sonnenmassen als Gravitationswellen ab, mindestens zehn Millionen Mal weniger als GW150914; ein schnell rotierender Kern strahlt deutlich stärker (Gossan und Kollegen, 2016). Messbar wäre das bisher nur bei einer Supernova in der Milchstraße, bei schnell rotierendem Kern auch in der Großen Magellanschen Wolke. Das Signal käme zusammen mit dem Neutrinoblitz an, wie ihn das Modell auch für den Umschlag eines Schwarzen Lochs erwartet (4.5).

2.8 Das Druckgesetz und die lokalen Messungen

Die folgenden Abschnitte schreiben die zugehörigen Rechnungen vollständig aus.

2.9 Medium, Strahlung und Masse

Im Ein-Medium-Bild ist Strahlung die bewegliche Erscheinungsform des Mediums. Eine dauerhafte Konzentration speichert Energie in einer gebundenen Struktur. Ihre Masse entspricht dieser gespeicherten Energie:

$$M = \frac{E_{\text{gebunden}}}{c^2}. \tag{1}$$

Ein Teilchen ist damit eine beständige Anregung des Mediums: eine geschlossene Strömung, ein Wirbel, eine stehende Welle oder eine Kombination daraus. Die Verbindung lautet

$$\begin{aligned} &\text{Mediumbewegung} \longrightarrow \text{gebundene Struktur} \\ &\longrightarrow \text{gespeicherte Energie} \longrightarrow \text{Masse}. \end{aligned} \tag{2}$$

Zur Struktur gehört auch ihre Übergangszone. Wo deren Energie räumlich verteilt ist, ist auch die Gesamtenergie des Objekts verteilt. Eine vollständige Massenbilanz berücksichtigt deshalb Kern, Strömung, Phasengrenze und äußere Störung gemeinsam. Die Übergangszone gehört zur Masse; das ist dieselbe Zuordnung wie im Atommodell.

Die Ruheenergie Mc^2 ist unsichtbare Strahlung desselben Mediums. Eine Konzentration verdichtet ihre Umgebung durch diese Strahlung. Der Raum wird dadurch optisch und zeitlich verändert: Lichtwege, Laufzeiten und Uhren antworten auf dieselbe Dichteschichtung. Es gibt keine zweite Substanz namens „Gravitationsfeld“ neben dem Medium und keine zweite Substanz namens „Photon“ neben der Strahlung, aus der das Medium besteht.

Frage. Sind Masse, Strahlung, Photon, Elektron, Gitter und Plasma verschiedene Stoffe?

Antwort. Nein. Gemessen werden sie als verschiedene Erscheinungen desselben Zusammenhangs: dieselbe Lichtgeschwindigkeit trägt elektromagnetische Wellen und — in GW170817 zusammen mit GRB 170817A — die Gravitationswelle auf 15 Stellen genau [35]. Dieselbe Eigenzeit trägt Uhren und Materie (MICROSCOPE begrenzt eine stoffabhängige Abweichung auf 10^{-15}). Dieselbe Coulomb-Kraft trägt freie Elektronen in der Falle (Fan und Kollegen 2023, magnetisches Moment auf $0{,}13$ Billionstel) und gebundene Elektronen in den Atomspektren. Im Ein-Medium-Bild sind das Dichte, Bewegung, Bindung und Ordnung eines einzigen Mediums.

Frage. Besteht das Medium aus Neutrinos?

Antwort. Nein. Der Druck kosmischer Neutrinos liegt bei etwa $10^{-20}\,\mathrm{Pa}$, der der Reliktneutrinos bei etwa $10^{-14}\,\mathrm{Pa}$. Stöße lichtschneller Teilchen übertragen nur rund $58\,\%$ von c. Ein Le-Sage-Schub bräuchte eine Energiedichte von etwa $8\times10^{34}\,\mathrm{J/m^3}$ gegenüber etwa $10^{-7}\,\mathrm{J/m^3}$ der Sonnenneutrinos. Die Erde ist bis etwa $40\,\mathrm{TeV}$ durchsichtig (IceCube). Neutrinos sind ein Strom in diesem Medium, nicht sein Grundbestandteil.

Frage. Schiebt das Medium die Materie nach Art von Le Sage, oder verdichtet es sie?

Antwort. Es verdichtet sie. Als Ursache der Schwerkraft verlangt ein Le-Sage-Schub mindestens etwa $2{,}5\times10^{21}\,\mathrm{W/kg}$ (aus der Abschirmgrenze $<10^{-22}\,\mathrm{m^2/kg}$). Gemessen strahlt die Sonne etwa $2\times10^{-4}\,\mathrm{W/kg}$ ab, die Erde etwa $7\times10^{-12}\,\mathrm{W/kg}$. Kurze Druckspitzen senken diesen Mittelwert nicht. Die Schwerkraft ist das Gefälle der Mediumdichteschichtung, getragen durch $\Delta p = c^2\Delta\rho$.

2.10 Konzentration, Druck und Dichteumgebung

Eine Konzentration verändert den Zustand des umgebenden Mediums. Weil das Medium aus Strahlung besteht, gehört zu jeder Dichteänderung dieselbe Druckänderung wie zur Strahlungsenergiedichte:

$$\mathrm{d}p = c^2\,\mathrm{d}\rho. \tag{3}$$

Im statischen Gleichgewicht trägt der Druckgradient die Dichteschichtung,

$$\mathrm{d}p = -\rho\,\mathrm{d}\Phi, \tag{4}$$

mit dem Newton-Potential einer kugelsymmetrischen Quelle $\Phi = -GM/r$. Aus (3) und (4) folgt

$$\mathrm{d}\ln\rho = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{c^2}. \tag{5}$$

Mit

$$\psi = -\frac{\Phi}{c^2} = \frac{GM}{rc^2} \tag{6}$$

lautet das Dichteprofil

$$\frac{\rho}{\rho_\infty} = e^{\psi} = \exp\!\Big(\frac{GM}{rc^2}\Big). \tag{7}$$

Damit verbindet sich die Masse einer Konzentration mit einer räumlich ausgedehnten Dichtestruktur. Diese Umgebung ist zugleich der Bereich, durch den sich Licht und andere Anregungen bewegen.

Mehrere Konzentrationen überlagern sich im Exponenten:

$$\frac{\rho}{\rho_\infty} = \exp\Big(\sum_i U_i\Big), \qquad U_i = \frac{GM_i}{r_i c^2}. \tag{8}$$

Ein über das betrachtete Gebiet konstanter Hintergrund faktorisiert und definiert nur die lokale Bezugsdichte ρ_∞. Das ist der Inhalt von Abschnitt 2.15.

Die folgenden Zahlen verwenden $GM_\odot = 1{,}32712440018 \times 10^{20}\,\mathrm{m^3 s^{-2}}$, $c = 299792458\,\mathrm{m/s}$, den IAU-Sonnenradius $R_\odot = 6{,}957 \times 10^8\,\mathrm{m}$ und $\mu = GM_\odot/c^2 = 1476{,}625\,\mathrm{m}$. Am Sonnenrand ist $U_\odot = \mu/R_\odot = 2{,}123 \times 10^{-6}$, an der Erdbahn $U_\oplus = 9{,}87 \times 10^{-9}$, am Merkur $U_\mathrm{M} = 2{,}550 \times 10^{-8}$.

Frage. Warum fällt die Dichte gerade so, dass der optische Index $n = \exp(2GM/rc^2)$ wird?

Antwort. Weil das Medium aus Strahlung besteht, gilt $\mathrm{d}p = c^2\,\mathrm{d}\rho$. Das hydrostatische Gleichgewicht integriert dann zu (7). Licht ist dasselbe Medium; Uhren und räumliche Maßstäbe tragen denselben Faktor e^ψ (Abschnitt 2.12). Der Fermat-Index ist deshalb das Quadrat der Dichte, $n = (\rho/\rho_\infty)^2 = e^{2\psi}$. Im schwachen Feld ist $n = 1 + 2GM/(rc^2) + \cdots$. Genau dieser lineare Koeffizient ist die gemessene Stärke der Lichtablenkung und der Shapiro-Verzögerung.

Frage. Kommt der Dichtehof aus der Drehung oder aus einem geschlossenen Wirbel?

Antwort. Nein. Reine Drehung liefert $\mathrm{d}p/\mathrm{d}r = \rho v^2/r$, also ein druckarmes Auge, keinen nach innen dichteren Hof. Die Strömung um einen Wirbelring fällt wie $1/r^3$, ihr Unterdruck wie $1/r^6$ [37]. Gravity Probe B begrenzt eine drehsinnabhängige Rahmenziehung auf $37{,}2 \pm 7{,}2$ Millibogensekunden pro Jahr, etwa 10^{-10} der Erddrehung. Die Schwerkraft hängt nur von der Masse ab (MICROSCOPE), nicht von Drehsinn und Lage der Wirbel. Der Hof (7) kommt aus Strahlung und hydrostatischem Gleichgewicht. Magnetismus ist die orientierte Zirkulation desselben Mediums und hat die Dipolform $|\omega| \propto 1/r^3$; Gravitation ist die Dichteschichtung.

Frage. Liefert die eingeschlossene Hofmasse selbst die $43''$ des Merkurs, wenn die Übergangszone zur Masse zählt?

Antwort. Die Übergangszone zählt zur Masse, und Φ speist sich aus Kern plus Hof. Führend gilt $\delta\rho \simeq \rho_\infty \mu/r$, also $M_h = 2\pi\rho_\infty\mu\,(r^2 - R_\odot^2)$. Ein Schnitt an der Heliopause ($120\,\mathrm{AE}$) macht die Gesamtmasse endlich, $M_h/M = 1{,}50\,\rho_\infty$ (ρ_∞ in $\mathrm{kg/m^3}$), ändert aber nichts zwischen den Planeten: $\Delta GM/GM = 8{,}88\times$

$10^{-5}\,\rho_\infty$ (Merkur gegen Erde). Die Kepler-Forderung $|\Delta GM/GM| \lesssim 10^{-10}$ verlangt $\rho_\infty \lesssim 1{,}1\times10^{-6}\,\mathrm{kg/m^3}$. Bei der kritischen Dichte $\rho_{\mathrm{crit}} \simeq 8{,}5\times10^{-27}\,\mathrm{kg/m^3}$ ist der Hof gravitativ unsichtbar ($\Delta GM/GM \sim 10^{-30}$). Eingeschlossene Hofmasse vom Typ $1/r$ erzeugt eine fast konstante Zusatzkraft, kein $1/r^2$-Potenzial, und deshalb nicht die $43''$. Die $43''$ kommen aus dem Index $n = e^{2\psi}$ selbst (Abschnitt 2.14).

Ein Photonen-Gas mit $\mathrm{d}p = c^2\mathrm{d}\rho/3$ ergäbe $\rho/\rho_\infty = e^{3U}$ und bereits in erster Ordnung $\gamma = 3$, im Widerspruch zur gemessenen Lichtablenkung. Das steife Gesetz (3) ist das Gesetz, das zur Messung passt.

2.11 Dichte, räumliche Ordnung und Lichtausbreitung

Die Strahlung erzeugt eine geordnete Struktur des Mediums. Lichtausbreitung bedeutet die Weitergabe einer Anregung durch diese Struktur. Dabei wirken zwei Eigenschaften zusammen:

- Die lokale Ordnung bestimmt, wie eine Anregung weitergegeben wird.
- Der räumliche Gradient dieser Ordnung bestimmt, wie sich ihre Ausbreitungsrichtung verändert.

Das Gitter- oder Kanalbild ist die mikroskopische Deutung. Der optische Index ist seine makroskopische Beschreibung.

Die Gitterlinien verlaufen radial zum Mittelpunkt jeder Konzentration. Photonen fliegen gassenweise. Radial zur Sonne bleibt der Strahl aus Kugelsymmetrie gerade. Ein Strahl, der den Sonnenrand streift, läuft quer zu den konvergierenden Linien: das Medium ist nach innen optisch dichter, und nach Fermat krümmt sich der Weg stetig zur dichteren Seite, wie in einer Gradientenfaser. Gesehen wird nur längs eines solchen Kanals. Sichtbar wird der Zustand erst, wenn er gestreut oder in einem Empfänger aufgenommen wird.

Für die effektive Metrik

$$\mathrm{d}s^2 = -e^{-2\psi}c^2\mathrm{d}t^2 + e^{2\psi}\,\mathrm{d}\ell^2 \tag{9}$$

gilt für Licht ($\mathrm{d}s = 0$)

$$\mathrm{d}t = \frac{e^{2\psi}}{c}\,\mathrm{d}\ell. \tag{10}$$

Damit lautet der Fermat-Index

$$\boxed{n = e^{2\psi} = \Big(\frac{\rho}{\rho_\infty}\Big)^2 = \exp\Big(\frac{2GM}{rc^2}\Big).} \tag{11}$$

Die Verbindung ist damit

$$\begin{aligned}&\text{Dichtezustand} \longrightarrow \text{effektive Zeit- und Raumfaktoren}\\ &\longrightarrow \text{optischer Index} \longrightarrow \text{Lichtweg und Laufzeit.}\end{aligned} \tag{12}$$

Die Entwicklung

$$n = 1 + 2U + 2U^2 + O(U^3), \qquad U = \frac{GM}{rc^2}, \tag{13}$$

legt die beiden gemessenen Kombinationen fest. Schreibt man allgemein $n = 1 + 2U + \alpha U^2$, so ist der lineare Koeffizient 2 die gemessene Stärke der Lichtablenkung und der Shapiro-Verzögerung,

$$\theta = (1+\gamma)\frac{2GM}{c^2 b}, \qquad \gamma = 1. \tag{14}$$

Aus $g_{00} = -1/n = -1 + 2U - (4-\alpha)U^2 + O(U^3)$ folgt mit der Standardform $g_{00} = -1+2U-2\beta U^2$ die Zuordnung $\beta = 2-\alpha/2$. Für $\alpha = 2$ ist $\beta = 1$. Beide Werte kommen aus dem einen Gesetz $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ zusammen mit dem optischen Index $n = e^{2\psi}$.

Ein isotropes Gitter mit Gitterabstand a und Stoßzeit τ hat den Fermat-Index $n = (\tau/\tau_\infty)\,(a_\infty/a)$. Die konforme Metrik (9) bedeutet $n = e^{2\psi}$ und damit $a = a_\infty e^{-\psi}$ zusammen mit $\tau/\tau_\infty = a_\infty/a$. Die Zahl der radialen Linien ist nicht fest: eine feste Speichenzahl ($a_t = \kappa r$) wäre optisch nicht asymptotisch euklidisch und unverträglich mit einem endlichen ρ_∞. Das Gitter verdichtet sich zur Masse hin isotrop, so wie die Dichte selbst.

Abbildung 2 zeigt das radiale Kanalbild: längs der Speichen bleibt der Weg gerade, quer dazu folgt er dem Gradienten von n.

Frage. Warum hat das Medium im Radio- bis Sichtbaren keine farbtrennende Resonanz, und warum bremst es die Planeten nicht?

Antwort. Licht ist die Weitergabe eines Zustands von Nachbar zu Nachbar, keine Reibung einer durchfliegenden Kugel an einem ruhenden Stoff. Bei gleichförmiger Bewegung verschwindet der Widerstand (d'Alembert): der Druck vor und hinter einem gleichförmig bewegten Körper hält sich die Waage. Die Planetenbahnen bleiben deshalb über Jahrhunderte keplerisch, bis auf die in Abschnitt 2.14 behandelte Perihelvorschiebung. Eine farbtrennende Resonanz im Radio- bis Sichtbaren würde die Laufzeiten und Spektren ferner Quellen verzerren; gemessen sind sie auf etwa $0{,}01\,\%$ farbenunabhängig. Deshalb hat das tragende Gitter in diesem Spektralbereich keine dissipative Resonanz.

Frage. Wie verträgt sich das Gitter mit Aberration, Sagnac und Fizeau?

Antwort. Die jährliche Aberration beträgt $20{,}495''$ (Bradley). Ein vollständiges Mitströmen des Mediums mit der Erde würde sie auslöschen. Gemessen wird sie jedes Jahr. Also strömt das tragende Gitter nicht als Ganzes mit der Erde mit. Der Fizeau-Versuch misst in bewegtem Wasser den Mitführungsfaktor $1 - 1/n^2$: mitbewegt ist der materielle Anteil des durchsichtigen Körpers, also das verdichtete Medium der bewegten Elektronen, nicht




Abbildung 2: Radiale Gitterkanäle um eine kugelsymmetrische Konzentration. Längs einer Speiche bleibt der Lichtweg gerade. Ein streifender Strahl läuft quer zum Gradienten und wird nach Fermat zur dichteren Seite gebeugt, wie in einer Gradientenfaser. Der Sonnenparameter μ ist in der Zeichnung zur Sichtbarkeit vergrößert.

der astronomische Hintergrund. Sagnac misst die Laufzeitdifferenz auf einem geschlossenen, rotierenden Weg; das ist dieselbe Nachbar-zu-Nachbar-Weitergabe auf einem bewegten Umlauf. Die drei Messungen zusammen legen fest: die Kanäle des Hintergrunds werden von der Erdbewegung nicht als Ganzes mitgeführt; die materielle Verdichtung in bewegter durchsichtiger Materie wird mitgeführt, und zwar mit dem gemessenen Faktor $1-1/n^2$.

2.12 Uhren und die gemessene Lichtgeschwindigkeit

Eine Uhr ist in diesem Bild selbst eine wiederkehrende Anregung des Mediums. Deshalb betrifft die Zustandsänderung nicht nur das durchlaufende Licht, sondern auch den Vergleichsprozess, mit dem dessen Frequenz gemessen wird.

Das Uhrengesetz lautet

$$\mathrm{d}\tau = e^{-\psi}\,\mathrm{d}t. \tag{15}$$

Der räumliche Eigenabstand lautet gleichzeitig

$$\mathrm{d}\ell_{\mathrm{phys}} = e^{\psi}\,\mathrm{d}\ell. \tag{16}$$

Zusammen mit der Lichtlaufzeit (10) folgt

$$\frac{\mathrm{d}\ell_{\mathrm{phys}}}{\mathrm{d}\tau} = c. \tag{17}$$

Die veränderte Koordinatengeschwindigkeit des Lichts und eine lokal unveränderte gemessene Lichtgeschwindigkeit sind innerhalb dieser Metrik miteinander vereinbar. Die lokale Uhr und der lokale Maßstab verändern sich zusammen mit dem Ausbreitungszustand.

Das ist keine zusätzliche Kopplung. Uhren, Materie und Licht sind dasselbe Medium, deshalb teilen sie dieselbe Eigenzeit. MICROSCOPE begrenzt eine stoffabhängige Abweichung vom universellen Fall auf 10^{-15}. Würde der Druck nur auf Oberflächen wirken, so wäre die Beschleunigung dichteabhängig; das ist durch genau diese Messung ausgeschlossen. Das Dichtegefälle durchdringt jede Konzentration, weil jede Konzentration selbst aus dem Medium besteht.

Frage. Warum folgen Uhren der Masse ringsum und nicht der Ortsdichte gewöhnlicher Materie? Warum hat Wasser $n = 1{,}33$, obwohl seine Materiedichte rund 10^{23}-mal höher ist als die des tragenden Hintergrunds?

Antwort. Zwei Dichten werden gemessen. Die Uhren folgen dem Hüllenprofil $\rho/\rho_\infty = \exp(GM/rc^2)$ der Gesamtmasse, also dem Feld ψ. Licht in Wasser verzögern die gebundenen Elektronen des Wassers: das ist der materielle Brechungsindex $n = 1{,}33$, eine lokale Bindung desselben Mediums,

nicht eine zusätzliche gravitative Verdichtung des Hintergrunds. Eine Uhr im Fels (Fréjus) geht so, wie es das Erdpotenzial verlangt, nicht so, wie es eine 10^{23}-fache Hintergrundverdichtung verlangen würde. Die gebundene Materie organisiert das Medium in sich selbst (Abschnitte 7.5); sie setzt den Hintergrund ρ_∞ nicht um denselben Faktor herauf.

2.13 Lichtablenkung, Shapiro-Verzögerung und Rotverschiebung

Diese drei Erscheinungen greifen auf unterschiedliche Eigenschaften desselben Feldes ψ zu. Die Lichtablenkung hängt vom Quergradienten von n ab, die Shapiro-Verzögerung vom Linienintegral von $n-1$, die Rotverschiebung vom Unterschied der Eigenzeit zwischen zwei ruhenden Orten.

2.13.1 Die Lichtablenkung am Sonnenrand

Messung. Ein streifender Strahl am Sonnenrand wird um $1{,}75''$ abgelenkt. Das ist der Wert, den Einstein 1916 angegeben hat und den die Radiointerferometrie am Himmel bestätigt: Lambert und Le Poncin-Lafitte messen $\gamma = 0{,}99992 \pm 0{,}00012$ aus der gravitativen Ablenkung der Radiowellen ferner Quellen [47]. Mit der Definition $\theta = (1+\gamma)\,2GM/(c^2 b)$ bedeutet $\gamma = 1$ am Sonnenrand gerade $\theta = 4GM/(c^2 R_\odot) = 1{,}75''$.

Erklärung. Licht ist kein fliegendes Teilchen, sondern ein Zustand, der von Nachbar zu Nachbar weitergegeben wird. Radial zur Sonne liegt der Weg längs einer Gitterlinie und bleibt gerade. Ein Strahl, der den Sonnenrand streift, läuft quer zum Gradienten: das Medium ist nach innen optisch dichter, $n = \exp(2GM/rc^2) \approx 1 + 2GM/(rc^2)$. Nach Fermat krümmt sich der Weg stetig zur dichteren Seite.

Für $n = 1 + 2\mu/r$ ist die Querableitung auf einem geraden Referenzweg mit Stoßparameter b gleich $\partial n/\partial x = -2\mu b/r^3$. Die Ablenkung zur Sonne hin ist das Integral

$$\theta = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2\mu b}{(b^2+z^2)^{3/2}}\,\mathrm{d}z = \frac{4\mu}{b}. \tag{18}$$

Am Sonnenrand ($b = R_\odot$) folgt

$$\theta = \frac{4GM}{c^2 R_\odot} = 1{,}7512''. \tag{19}$$

Das ist der gemessene Wert $1{,}75''$. Beide Anteile von $n = e^{2\psi}$ sind nötig, damit der volle Betrag herauskommt: die langsamere Weitergabe im dichteren Medium und die räumliche Verdichtung tragen je $0{,}8756''$ bei. Sichtbar wird der abgelenkte Zustand erst, wenn er gestreut oder in einem Empfänger aufgenommen wird; gesehen wird er längs des Kanals, der bei der Erde ankommt.

2.13.2 Die Shapiro-Laufzeitverzögerung

Messung. Radiosignale, die nahe an der Sonne vorbeilaufen, brauchen länger als längs des euklidischen Weges [57]. Die genaueste Bestimmung dieses Faktors stammt von der Cassini-Sonnenkonjunktion 2002: Bertotti, Iess und Tortora messen

$$\gamma - 1 = (2{,}1 \pm 2{,}3) \times 10^{-5}, \tag{20}$$

also $\gamma = 1$ auf 2×10^{-5} [38]. Dieselbe Kombination $1+\gamma$ steckt in der Lichtablenkung; Cassini liest sie aus der Laufzeit bzw. der Frequenzverschiebung der Mehrfrequenz-Radioverbindung (Plasma der Korona abgetrennt).

Erklärung. Im dichteren Medium nahe der Sonne ist $n > 1$. Der Zustand wird von Nachbar zu Nachbar langsamer weitergegeben als im ungestörten Hintergrund. Die überschüssige Einweg-Laufzeit längs des Weges ist

$$\Delta t = \frac{1}{c} \int (n - 1)\, \mathrm{d}\ell. \tag{21}$$

Mit $n - 1 = 2GM/(rc^2) + O(U^2)$ folgt genau die Shapiro-Formel zum Faktor $\gamma = 1$,

$$\Delta t = \frac{2GM}{c^3} \ln \frac{r_E + r_S + R}{r_E + r_S - R}, \tag{22}$$

wobei R der Abstand von Sender und Empfänger ist. Der Vorfaktor beträgt $2GM_\odot/c^3 = 9{,}851\,\mu\mathrm{s}$; für die Hin- und Rückverbindung das Doppelte. Cassini bestimmt gerade diesen Vorfaktor in der Form $(1+\gamma)GM/c^3$ und findet $1+\gamma = 2$. Der aus $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ folgende Index $n = \exp(2U)$ liefert $\gamma = 1$ und damit $\gamma - 1 = 0$, innerhalb von $(2{,}1 \pm 2{,}3) \times 10^{-5}$.

2.13.3 Die gravitative Rotverschiebung

Messung. Pound und Rebka sowie Pound und Snider haben die Frequenzverschiebung der $14{,}4\,\mathrm{keV}$-Linie von $^{57}\mathrm{Fe}$ über den Turm des Jefferson-Labors gemessen [52, 53]. Für den Rundweg gilt $2gh/c^2 = 4{,}905 \times 10^{-15}$; gemessen wurde das $(0{,}9990 \pm 0{,}0076)$-fache dieses Wertes. Die Einwegverschiebung ist damit $gh/c^2 = 2{,}4525 \times 10^{-15}$.

Im Global Positioning System gehen die Satellitenuhren gravitativ schneller als Uhren auf der Geoidfläche. Der Standardwert dieser Differenz ist $45{,}7\,\mu\mathrm{s}$ je Tag [36]. Das Funktionieren der Navigation auf Meterniveau ist die Messung dieser Verschiebung: ohne sie wüchse der Positionsfehler um mehr als zehn Kilometer je Tag.

Erklärung. Am Erdboden ist das Medium dichter als in der Höhe. Dieselbe Schwingung des Mediums — Kern, Uhr, Zustand — läuft dort langsamer, wo das Medium dichter ist. Mit $\mathrm{d}\tau = e^{-\psi}\,\mathrm{d}t$ und $\psi = GM/(rc^2)$ gilt zwischen zwei ruhenden Orten

$$\frac{\Delta\nu}{\nu} = \Delta\psi = \frac{GM}{c^2}\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right). \tag{23}$$

Für eine Höhe h über der Erdoberfläche ist das gh/c^2. Mit $g = 9{,}80\,\mathrm{m/s^2}$ und $h = 22{,}5\,\mathrm{m}$ folgt

$$\frac{gh}{c^2} = 2{,}453 \times 10^{-15}, \qquad \frac{2gh}{c^2} = 4{,}907 \times 10^{-15}, \tag{24}$$

in Übereinstimmung mit dem von Pound und Snider verwendeten Wert $4{,}905 \times 10^{-15}$ und mit ihrem gemessenen Faktor $0{,}9990 \pm 0{,}0076$.

Für einen GPS-Satelliten auf der Bahn $a = 26561{,}752\,\mathrm{km}$ und den Äquatorradius $R_E = 6378{,}137\,\mathrm{km}$ ist $GM_E/c^2 = 4{,}435 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}$ und

$$\Delta\psi = \frac{GM_E}{c^2}\left(\frac{1}{R_E} - \frac{1}{a}\right) = 5{,}284 \times 10^{-10}. \tag{25}$$

Je Tag sind das $45{,}65\,\mu\mathrm{s}$, der gemessene und im GPS verrechnete Betrag von $45{,}7\,\mu\mathrm{s/d}$. In größerer Höhe ist das Medium dünner, die Uhren gehen schneller. Licht, das aus dem dichteren Medium nach oben weitergegeben wird, erscheint einer dortigen Uhr rotverschoben; nach unten erscheint es blauverschoben. Das ist dieselbe Dichteschichtung wie bei Merkur und bei der Lichtablenkung.

2.14 Materiebewegung und die Periheldrehung Merkurs

Messung. Der gravitoelektrische Anteil der Periheldrehung Merkurs beträgt $42{,}9799 \pm 0{,}0009''$ je julianisches Jahrhundert. Die gesamte gemessene Rate, einschließlich der newtonschen Störungen durch die Planeten und des Sonnenquadrupols, ist $575{,}3100 \pm 0{,}0015''$/Jh. [51]. Zusammen mit der Cassini-Bestimmung von γ folgt $\beta - 1 = (-2{,}7 \pm 3{,}9) \times 10^{-5}$, also $\beta = 1$ in der Messgenauigkeit. Derselbe überschüssige Betrag von $43''$/Jh. ist seit Le Verrier und Newcomb der gemessene Rest, der über die newtonschen Planetenstörungen hinausgeht.

Erklärung. Materie, Uhren und Licht sind dasselbe Medium. Eine frei fallende Konzentration folgt deshalb derselben Eigenzeit wie eine Uhr und dasselbe optische Gesetz wie das Licht. Im dichteren Medium in Sonnennähe ist der optische Index $n = \exp(2U) = 1 + 2U + 2U^2 + \cdots$. Das liefert $\gamma = 1$ und $\beta = 1$ [F]. Die Perihelvorschiebung je Umlauf ist dann

$$\Delta\omega = (2 + 2\gamma - \beta)\,\frac{2\pi GM}{c^2 a(1-e^2)} = \frac{6\pi GM}{c^2 a(1-e^2)}. \tag{26}$$

Mit $a = 0{,}38709893\,\mathrm{AE}$, $e = 0{,}20563069$ und $P = 87{,}969257\,\mathrm{d}$ (also $415{,}20$ Umläufe je julianisches Jahrhundert) ergibt die Auswertung

$$\dot\omega = 42{,}9805''/\mathrm{Jh}. \tag{27}$$

Das ist der gemessene Wert $42{,}98''$/Jh. und liegt innerhalb der Unsicherheit von $42{,}9799 \pm 0{,}0009''$/Jh. Die $43''$ sind die optische und zeitliche Struktur desselben Mediums, das zur Sonne hin dichter wird [F].

Wäre das Druckgesetz das frühere Phasengesetz $p = K\rho^2$ mit $c_{s,\infty} = c$, so wäre $\rho/\rho_\infty = 1 + U$, $n = (1+U)^2 = 1 + 2U + U^2$, also $\alpha = 1$, $\beta = 3/2$ und das Perihel nur $35{,}82''$/Jh. (Faktor $5/6$). Die Messung $42{,}98''$ wählt zwischen diesen Gesetzen: lokal, im schwachen Feld der Sonne, gilt $\Delta p = c^2 \Delta\rho$. Eine frühere Fassung dieses Buches setzte dieses Phasengesetz für eine dichte, geordnete Phase an (Abschnitt 5.9). Die Messung schließt es aus. Das war ein Fehler; das Phasengesetz ist fallen gelassen, und $\Delta p = c^2\Delta\rho$ gilt im ganzen Medium.

Die Fortsetzung $e^{-2\psi} = 1 - 2\mu/r$ der Existenzschranken-Außenlösung gäbe $n = 1/(1-2\mu/r) = 1 + 2\mu/r + 4\mu^2/r^2$, also $\beta = 0$ und ein Perihel vom Faktor $4/3$. Auch das steht gegen die Messung. Der lokale Index ist $n = \exp(2\mu/r)$.

Selbstkonsistente Hofmasse ändert β nicht. Poisson liefert eine Korrektur vom Jeans-Typ; sie erzeugt kein Glied μ^2/r^2. Feldenergie $\delta\rho \propto (\nabla\Phi)^2 \propto 1/r^4$ konvergiert ($M_{\mathrm{FE}}/M \simeq 1{,}06 \times 10^{-6}$) und erzeugt ein echtes μ^2/r^2. Standard-Feldenergie gäbe $\beta = 3/4$, nicht 1. $\beta = 1$ kommt natürlich aus $\Delta p = c^2\Delta\rho$ zusammen mit $n = (\rho/\rho_\infty)^2$, ohne diesen Zusatzfaktor.

Frage. Sind die Lagrange-Punkte L4 und L5 genau dann stabil, wenn das Massenverhältnis groß genug ist?

Antwort. Ja. Im schwachen Feld folgt aus $n = 1 + 2U$ die Beschleunigung GM/r^2. Dann gilt wie bei Gascheau (1843) Stabilität ab einem Massenverhältnis von etwa $24{,}96$. Sonne/Jupiter (1047) und Erde/Mond (81) sind stabil; das wird beobachtet.

Frage. Warum fallen alle Körper gleich, obwohl beschleunigte Körper Medium mitbewegen?

Antwort. Weil Körper und Medium vom selben Gefälle beschleunigt werden. Es gibt dann keine Relativbewegung und keine mitgeführte Zusatzmasse. Fielen sie durch ein ruhendes Medium, unterschieden sich Titan und Platin um $2{,}6 \times 10^{-4}$ mal der Mediumdichte in $\mathrm{kg/m^3}$; MICROSCOPE begrenzt diese Dichte dann auf unter etwa $10^{-11}\,\mathrm{kg/m^3}$. Die universelle Kopplung ist keine extra Vorschrift: Uhren, Materie und Licht sind dasselbe Medium und teilen eine Eigenzeit.

Frage. Warum zeigt die Schwerkraft keine Spur der Bewegung gegen das Ruhesystem der Hintergrundstrahlung?

Antwort. Hinge die Schwerkraft von der Bewegung gegen die Hintergrundstrahlung ab, müssten Pulsarachsen taumeln. Der Kennwert ist kleiner als $1{,}6\times10^{-9}$ [56]. Weil das Dichtegefälle jede Konzentration durchdringt und mit ihr fällt, bleibt nur die Gezeitenwirkung des Hintergrunds, die weit unter der Messgrenze liegt (Abschnitt 2.15).

2.15 Lokale Konzentrationen und der Hintergrund

Messung. Die lokalen dimensionslosen Messungen sehen nur die Sonne und die Planeten. Der gravitoelektrische Merkurperihel ist $42{,}9799 \pm 0{,}0009''$/Jh. ohne einen zusätzlichen Anteil der Galaxis oder des Kosmos [51]. Cassini findet $\gamma - 1 = (2{,}1 \pm 2{,}3) \times 10^{-5}$ [38]. Eine richtungsabhängige Variation der Gravitationskopplung ist durch Pulsarprofile begrenzt: $|\hat{\xi}| < 3{,}9 \times 10^{-9}$ (95 % CL) [56].

Das galaktische Potenzial hat die Größenordnung der lokalen Rotationsgeschwindigkeit, $U_{\mathrm{gal}} \simeq v_\odot^2/c^2 = (220\,\mathrm{km/s})^2/c^2 = 5{,}39 \times 10^{-7}$. Mit der Fluchtgeschwindigkeit $\simeq 550\,\mathrm{km/s}$ eher $U_{\mathrm{gal}} \simeq v_{\mathrm{esc}}^2/(2c^2) = 1{,}68 \times 10^{-6}$. Eine Newton-Summe über eine Hubble-Kugel liefert $U_{\mathrm{cosmo}} = (3/4)\Omega$, also $0{,}236$ für $\Omega_m \simeq 0{,}315$ und $0{,}75$ für $\Omega = 1$. Ein einzelner Nachbarstern ($1\,M_\odot$ in $1\,\mathrm{pc}$) trägt nur $U_\star = 4{,}79 \times 10^{-14}$.

Erklärung. Das Druckgesetz $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ integriert über das gesamte Potenzial:

$$\frac{\rho}{\rho_{\mathrm{bare}}} = \exp\Big(\sum_i U_i\Big) = e^{U_{\mathrm{bg}}}\, e^{U_\odot}. \tag{28}$$

Der Hintergrund von Milchstraße und Kosmos ist über das Sonnensystem praktisch konstant. Er definiert nur die lokale Bezugsdichte $\rho_\infty = \rho_{\mathrm{bare}}\, e^{U_{\mathrm{bg}}}$, den Gitterabstand a_∞ und die gemessene Lichtgeschwindigkeit c. Der optische Index faktorisiert ebenso,

$$n = \exp\Big(2\sum_i U_i\Big) = n_{\mathrm{bg}}\, \exp(2U_\odot), \qquad \frac{n}{n_{\mathrm{bg}}} = \exp(2U_\odot). \tag{29}$$

In Fermats Prinzip $\delta \int n\,\mathrm{d}\ell = 0$ fällt eine Konstante n_{bg} heraus. Dieselbe Konstante reskaliert c und $\mu = GM/c^2$ so, dass β und γ unverändert $\beta = \gamma = 1$ bleiben. Deshalb messen Park und Cassini dieselben lokalen Werte, die schon aus dem Sonnenpotenzial allein folgen: $42{,}98''$/Jh. und $\gamma - 1 = 0$ innerhalb von 2×10^{-5}. Die fernen Massen setzen die Skala, nicht die lokalen dimensionslosen Kombinationen.

Genau diese Struktur — eine globale Umskalierung der dimensionsbehafteten Größen bei unveränderten dimensionslosen Verhältnissen — erhält auch die primordiale Nukleosynthese: Gupta und Samaras finden, dass eine gemeinsame Plateauskalierung der dimensionsbehafteten Raten die Häufigkeiten der leichten Elemente auf 10^{-3} bis 10^{-4} identisch lässt [42].

Ein additives Profil $n = 1 + 2W + 2W^2$ mit $W = U_\odot + U_{\mathrm{bg}}$ faktorisiert nicht. Nach Normierung auf n_{bg} bliebe $\beta = 1 + 2U_{\mathrm{bg}}$. Für den Kosmos ($U_{\mathrm{cosmo}} = O(1)$) entstünde daraus eine Periheldrift von etwa 3 bis $14''$/Jh.. Das wird nicht gemessen. Deshalb ist die Überlagerung multiplikativ, so wie es das integrierte Druckgesetz (5) bereits liefert.

Das homogene galaktische Feld fällt mit dem Sonnensystem frei. Es bleibt die Gezeitenbeschleunigung $a_{\mathrm{tid}} \simeq (v_\odot^2/R_0^2)\, a_{\mathrm{M}} = 4{,}38 \times 10^{-20}\,\mathrm{m/s^2}$ bei $R_0 = 8{,}2\,\mathrm{kpc}$, das ist $1{,}1 \times 10^{-18}$ der Sonnenbeschleunigung am Merkur und

entspricht einer Periheldrift von etwa $4{,}5\times10^{-10}\,''$/Jh. — weit unter der Messunsicherheit von $0{,}0015''$/Jh. Eine Anisotropie der Hintergrundkompression längs ∇U_{gal} würde sich als Preferred-Location-Effekt ξ zeigen; die Pulsargrenze $|\hat{\xi}| < 3{,}9\times10^{-9}$ sagt, dass ein solcher Richtungseffekt nicht gemessen wird. Der Hintergrund vieler ferner Massen ist isotrop und reskaliert nur die Einheiten.

Frage. Was bedeutet „Die Gesamtmasse bleibt gleich“ im Unendlichen?

Antwort. Die mittlere Dichte bleibt gleich, und Masse wird nur verschoben (Erhaltungsgleichung). Dazu passt, dass sich die Stärke der Schwerkraft um höchstens etwa 10^{-13} pro Jahr ändert [45].

2.16 Strömung, Druckgrenzen und die Heliopause

Die Heliopause ergänzt das statische Bild um Bewegung. Abstrom der Sonne und Zustrom von außen sind dasselbe Medium in entgegengesetzter Bewegung: nach außen die Strahlung und der Wind der Sonne, nach innen das interstellare Medium. Plasma, Wind und Zustrom sind nicht ein zweiter Stoff neben einem „optischen Grundmedium“; sie sind dasselbe Medium in anderer Dichte und anderer Bewegung. Wo ihre Drücke einander die Waage halten, entsteht eine Gleichgewichtsfläche. Das ist die Heliopause. Voyager hat genau diese Fläche gemessen.

2.16.1 Die Voyager-Messungen

Voyager 1 kreuzte die Heliopause am 25. August 2012 bei $121{,}6\,\mathrm{AE}$ (nördliche Hemisphäre). Voyager 2 kreuzte sie am 5. November 2018 bei $119\,\mathrm{AE}$ (südliche Flanke). Beide Übergänge dauerten weniger als einen Tag; die Fläche ist dünner als etwa $5\times10^{-3}\,\mathrm{AE}$, falls sie ruhte [59, 58, 40].

Das Plasma im Heliosheath hat typisch $0{,}002\,\mathrm{cm}^{-3}$. Die ersten interstellaren Dichten sind $0{,}055\,\mathrm{cm}^{-3}$ bei Voyager 1 (23. Oktober 2013, $122{,}6\,\mathrm{AE}$), später $0{,}06$–$0{,}08\,\mathrm{cm}^{-3}$ [43], und $0{,}039\,\mathrm{cm}^{-3}\pm15\,\%$ bei Voyager 2 (30. Januar 2019, $119{,}7\,\mathrm{AE}$) [44]. Der Sprung beträgt etwa den Faktor 20 ($0{,}039/0{,}002=19{,}5$ auf der Voyager-2-Flanke; $0{,}055/0{,}002=27{,}5$ bei der ersten Voyager-1-Messung).

Anomale kosmische Strahlung und Heliosheath-Teilchen fallen in wenigen Tagen um mindestens den Faktor 300–500. Die galaktische kosmische Strahlung steigt um bis zu etwa 2; die Heliosphäre schirmt mehr als $70\,\%$ der galaktischen Komponente ab [46, 54].

Das Magnetfeld springt im Betrag (Voyager 1: etwa $0{,}13\,\mathrm{nT}$ innen auf im Mittel $0{,}49\,\mathrm{nT}$ außen, Verhältnis $3{,}8$; Voyager 2: magnetische Barriere innen,

außen rund $0{,}7\,\mathrm{nT}$), ändert aber über die Fläche die Richtung nur um wenige Grad oder gar nicht und bleibt nahe der Parker-Spirale [39, 40].

Vor der Fläche liegt eine Wasserstoffwand: HST/GHRS gegen α Centauri misst aufgeheizten neutralen Wasserstoff mit $T = 29\,000 \pm 5\,000\,\mathrm{K}$ und $\log N(\mathrm{H\,I}) = 14{,}74 \pm 0{,}24$, gegen das ungestörte lokale interstellare Gas mit $T = 5400 \pm 500\,\mathrm{K}$ [49]. Voyager 2 maß das geladene Pendant außen bei $30\,000$–$50\,000\,\mathrm{K}$ [55].

Der Gesamtdruck im Heliosheath beträgt $20\,500 \pm 1\,600\,\mathrm{K\,cm^{-3}}$, knapp außen $23\,310 \pm 4\,100\,\mathrm{K\,cm^{-3}}$. Das ungestörte lokale interstellare Medium ohne Staudruck hätte nur $12\,000 \pm 1\,600\,\mathrm{K\,cm^{-3}}$; der wirksame Staudruck des Zustroms ist $11\,610 \pm 4\,030\,\mathrm{K\,cm^{-3}}$ [48]. Dazu passen $B \approx 0{,}5\,\mathrm{nT}$, $n_{\mathrm{H}} \approx 0{,}12\,\mathrm{cm^{-3}}$ und der Heliumzustrom von etwa $26\,\mathrm{km/s}$ [41, 50]. Vor der Heliosphäre liegt eine Bugwelle, kein Bugstoß.

2.16.2 Warum die Fläche gerade dort steht

Der Zustrom liegt außerhalb der Heliosphäre und bildet sie. Die beiden Sonden treffen die Fläche bei $121{,}6$ und $119\,\mathrm{AE}$, nur $2{,}6\,\mathrm{AE}$ auseinander. Die Nase ist daher fast rund, im Einklang mit der langsamen Bewegung der Sonne gegen den Zustrom ($26\,\mathrm{km/s}$ im Helium) und mit einer Bugwelle statt eines Bugstoßes.

Der Druck ist der Zustrom. Innen $20\,500 \pm 1\,600$ und außen $23\,310 \pm 4\,100\,\mathrm{K\,cm^{-3}}$ unterscheiden sich um 2810 bei einer kombinierten Unsicherheit von 4400 ($0{,}64\,\sigma$): die Fläche steht im Gleichgewicht. Ohne den Staudruck des Zustroms stünden $20\,500$ gegen $12\,000\,\mathrm{K\,cm^{-3}}$, eine Differenz von 8500 bei einer Unsicherheit von 2260 ($3{,}8\,\sigma$). Erst der mitgezählte Zustrom macht aus den gemessenen Drücken eine ruhende Fläche bei 119–$122\,\mathrm{AE}$.

Das Sonnenpotenzial allein ändert die Dichte dort draußen kaum: $U(120\,\mathrm{AE}) = 8{,}23 \times 10^{-11}$, also $\rho/\rho_\infty = 1 + 8{,}23 \times 10^{-11}$. Die Lage der Heliopause kommt nicht aus dieser winzigen statischen Schichtung, sondern aus dem Gleichgewicht zweier Strömungen desselben Mediums. In einer idealen Beschreibung enthält der normale Impulsfluss

$$\Pi_{nn} = \rho v_n^2 + p + \frac{B^2}{2\mu_0} - \frac{B_n^2}{\mu_0}, \tag{30}$$

ergänzt um weitere Teilchen- und Spannungskomponenten. Genau diese Bilanz ist die gemessene Druckgleichheit von $20\,500$ gegen $23\,310\,\mathrm{K\,cm^{-3}}$.

Der Dichtesprung um den Faktor ≈ 20 ist der Kontrast zweier Strömungen desselben Mediums an einer Kontaktfläche: außen der dichtere Zustrom, innen der verdünnte Abstrom der Sonne. Eine Stoßfront, die das Innenplasma um das Dreißigfache oder mehr verdichten würde, wird nicht gemessen; gemessen wird eine dünne Fläche, die in weniger als einem Tag durchquert ist. Würde man $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ allein auf diesen Sprung anwenden, so entstünde ein Druckverhältnis von etwa 20 bis 40 (mit dem früheren Phasengesetz 400

bis 1600); das stünde nicht im Gleichgewicht. Die Fläche ist eine Strömungsgrenze, kein statischer barotroper Sprung.

Dieselbe Fläche trennt die Teilchen. Solare und heliosphärische Teilchen bleiben weitgehend innen (Abfall der anomalen kosmischen Strahlung um 300–500), galaktische weitgehend außen (Anstieg bis etwa 2, Abschirmung von mehr als $70\,\%$). Die Hülle ist nicht absolut dicht; auf der Voyager-2-Flanke ist sie etwas durchlässiger als an der Voyager-1-Nase.

Das eingefrorene Magnetfeld des Zustroms legt sich um die Heliosphäre (Draping). Knapp außen liegt es deshalb parallel zum inneren Parker-Feld: die Richtung springt nicht. Der Betrag steigt durch die Stauchung des drapierten Feldes ($0{,}13$ auf $0{,}49\,\mathrm{nT}$ bei Voyager 1). Magnetismus ist hier die orientierte Zirkulation desselben Mediums; sie wird an der Gleichgewichtsfläche gestaut und umgelenkt, nicht neu erzeugt.

Der neutrale Anteil des Zustroms wird außen vor der Gleichgewichtsfläche gestaut und durch Ladungsaustausch mit dem abgelenkten Plasma auf etwa $3\times10^{4}\,\mathrm{K}$ geheizt. Das ist die gemessene Wasserstoffwand ($29\,000\pm5\,000\,\mathrm{K}$ gegen $5400\pm500\,\mathrm{K}$ im ungestörten lokalen Gas) und das von Voyager 2 außen gemessene wärmere Plasma ($30\,000$–$50\,000\,\mathrm{K}$).

Frage. Reicht das Magnetfeld der Erde über den Mond hinaus, und was bedeutet das für das Medium?

Antwort. Ja. Der Mond umkreist die Erde in 60 Erdradien. Die Magnetopausenfläche liegt sonnenseitig bei etwa 10 Erdradien; der Magnetschweif reicht weit darüber hinaus, typisch über 100–200 Erdradien. Der Mond durchquert den Schweif jeden Monat für mehrere Tage; ARTEMIS hat dieses durchquerte, erdmagnetisierte Medium gemessen. Das Erdmagnetfeld ist die orientierte Zirkulation desselben Mediums, das auch die Erde selbst ist. Es endet nicht an der festen Oberfläche und nicht an der Mondbahn, sondern dort, wo der gerichtete Fluss im Gleichgewicht mit dem Sonnenwind steht — dieselbe Logik wie an der Heliopause, nur auf der Skala der Erde.

3 Schwarze Löcher und Sterne: zwei Zustände desselben Objekts

Ein Schwarzes Loch, das sich zu langsam dreht, ist ein Stern. Ein Stern, der sich schnell genug dreht, wird zum Schwarzen Loch. Pulsare liegen dazwischen [P].

3.1 Das Kriterium: Umfangsgeschwindigkeit am Äquator

Licht kann nicht entweichen, weil sich das Objekt zu schnell dreht [P]. Maßgeblich ist die Umfangsgeschwindigkeit am Äquator, nicht die Umlaufzeit. Die Schwelle hängt nicht von der Masse ab: Ein Schwarzes Loch kann beliebig schwer oder leicht sein.

Misst man die Bahngeschwindigkeit direkt über der Oberfläche, ergibt sich genau diese Reihenfolge [F]:

Objekt Bahngeschwindigkeit am Äquator (Anteil von c)

Sonne ≈ 0,15 %

Weißer Zwerg ≈ 1–2 %

Neutronenstern (Pulsar) ≈ 40 %

Schwarzes Loch (innerste stabile Bahn) ≈ 50 % ohne Drehung bis nahe 100 % bei maximaler Drehung

Die Geschwindigkeit hängt nur vom Verhältnis von Masse zu Radius ab. Deshalb gilt die Schwelle für jede Masse [F]:

$v^2/c^2 = GM/(Rc^2)$

Bahngeschwindigkeit und Eigendrehung hängen voneinander ab, in beide Richtungen [P]. Beides ist beobachtet: Eine Scheibe kann einen Neutronenstern auf mehrere hundert Umdrehungen pro Sekunde aufdrehen (Millisekundenpulsare). Umgekehrt bestimmt die Drehung eines Schwarzen Lochs, wie schnell seine Scheibe am Innenrand kreist [F].

Die Kette von der Dichte zur Drehung. Je höher die Dichte, desto höher der Druck, und desto schneller muss die Rotation sein, um ihn auszugleichen [P]. Tatsächlich hängt die Drehung, bei der ein Körper gerade noch zusammenhält, nur von seiner mittleren Dichte ρ ab [F]:

Kritische Winkelgeschwindigkeit: $\Omega = \sqrt{(4\pi G\rho/3)}$

Für die Sonne entspricht das einer Umdrehung in etwa 2,8 Stunden, für einen Weißen Zwerg in etwa 12 Sekunden und für einen Neutronenstern in etwa einer halben Millisekunde; der schnellste bekannte Pulsar dreht sich 716-mal pro Sekunde und bleibt darunter [F]. Erreicht die Äquatorgeschwindigkeit bei dieser Drehung c, hält das Objekt das Licht fest.

Beide Formeln beschreiben dieselbe Bedingung [F]: Mit der mittleren Dichte $\rho = M/(4/3 \cdot \pi \cdot R^3)$ wird $\Omega^2 = GM/R^3$, und mit der Umfangsgeschwindigkeit $v = \Omega \cdot R$ folgt $v^2 = GM/R$, also $v^2/c^2 = GM/(Rc^2)$. Die Schwelle aus der Dichte und die Schwelle aus der Umfangsgeschwindigkeit am Äquator sind ein und dieselbe; damit hängt das Drehungskriterium direkt an der mittleren Dichte, wie es der Leitgedanke verlangt.

Einen Vorläufer hat das Kriterium bei Einstein (1939) [F]: Er untersuchte eine Kugel aus Teilchen auf Kreisbahnen und zeigte, dass die Teilchen beim Zusammenziehen die Lichtgeschwindigkeit erreichen müssten, und zwar auf der Bahn, auf der auch Licht kreist, bei 1,5 Schwarzschild-Radien. Er schloss daraus, dass sich keine Schwarzen Löcher bilden können; das Modell schließt umgekehrt, dass bei dieser Geschwindigkeit eines entsteht. Im selben Jahr berechneten Oppenheimer und Snyder (1939) den Kollaps ohne Drehung bis zum Horizont; die heute gemessenen Schwarzen Löcher mit geringer Drehung stützen sie (Frage 10). Zu klären ist auch der Radius: Nach der Relativitätstheorie erreicht eine Kreisbahn die Lichtgeschwindigkeit bei $3GM/c^2$, die Schwelle oben folgt aus Newtons Formel und liegt bei GM/c^2 (Frage 53).

Vorschlag zur Prüfung: Der Horizont ist keine Einbahnstraße einer gekrümmten Raumzeit, sondern eine bewegliche Drehgrenze im flachen Raum. Beantwortet in Frage 53 mit $v^2 = c^2\psi/(1-\psi)$. Das passt zum Dichtebild: Im Medium nach Puthoff (2002) hat eine ruhende Masse gar keinen Horizont, das Licht wird zur Mitte hin nur immer langsamer [F]. Ein

Horizont entstünde dann allein aus der Drehung, wie es das Modell verlangt. Sinkt die Drehung unter die Schwelle, bricht die Grenze zusammen, und das Plasma tritt aus (3.4). Prüfstein: Beim Verschmelzen zweier Schwarzer Löcher muss diese Grenze genau wie ein Kerr-Horizont nachklingen; das Gravitationswellen-Signal GW250114 (2025) zeigt dieses Nachklingen deutlich (Frage 30).

Zur Schwelle aus Frage 10 (Nachtrag vom 6. November 2026, aus einem vom Autor mitgeschickten Text) [F]: Die Schwelle ist die Bahngeschwindigkeit am Äquator, $v = \sqrt{(GM/R)}$; sie hängt nur von Masse und Radius ab, die Winkelgeschwindigkeit an der Schwelle nur von der mittleren Dichte. Wie schnell sich ein Körper tatsächlich dreht, folgt aus seinem Drehimpuls $J = I \cdot \Omega$ mit dem Trägheitsmoment $I \propto MR^2$; J ändert sich mit der Differenz aus dem Drehimpuls, den der Zustrom bringt, und dem, den der Abstrom über Winde und Jets fortträgt. Geordnet wird deshalb nach dem Verhältnis zur Schwelle, nicht nach der Oberflächengeschwindigkeit: Achernar dreht am Äquator mit 298,8 km/s, bei rund 0,84 seiner Schwelle (Domiciano de Souza und Kollegen, 2014; Rechnung von Claude), der Neutronenstern 1E 161348-5055 mit rund 3 m/s bei etwa $2 \cdot 10^{-8}$ seiner Schwelle von rund 140.000 km/s (Rechnung von Claude).

Berichtigt gegenüber dem mitgeschickten Text [F]: 1E 161348-5055 ist nicht alt, sondern sitzt im rund 2000 Jahre alten Überrest RCW 103; gebremst wurde er vermutlich durch zurückgefallenes Material, das er wegschleuderte (De Luca und Kollegen, 2006; Li, 2007), also durch Abstrom

über Zustrom. PSR J0737-3039A wurde durch früheren Zustrom beschleunigt; heute strömt nichts mehr zu (Lorimer und Kollegen, 2007). Prüfsteine : Schnell drehende Sterne sind am Äquator breiter, Achernar 1,35-mal so breit wie über die Pole (Domiciano de Souza und Kollegen, 2014); ob das Volumen bei mehr Drehimpuls insgesamt sinkt, wie 3.2 sagt, ist nicht gemessen. Schwarze Löcher mit sehr wenig Zustrom wie A0620-00 bleiben seit Jahrzehnten dunkel (Narayan, Garcia und McClintock, 1997); dass ihr Horizont bei abnehmendem Zustrom aufbricht, müsste lange dauern (Frage 59, Frage 60). Ob die Schwelle bei GM/c^2 oder $3GM/c^2$ liegt, bleibt Frage 53. An der Schwelle dreht der Äquator mit $f = c/(2\pi R)$, also mit $c^3/(2\pi GM)$ bei GM/c^2 und mit $c^3/(6\pi GM)$ bei $3GM/c^2$: für 10 Sonnenmassen 3,2 oder 1,1 kHz, für Sagittarius A* einmal in 2,1 oder 6,4 Minuten (Rechnung von Claude). Von der Beobachtung zur Schwelle führt der gemessene Drehparameter a* [F]: In der Kerr-Lösung, mit der a* bestimmt wird, läuft der Äquator des Horizonts mit $v/c = a^*/(1 + \sqrt{(1 - a^{*2})})$ und erreicht c genau bei $a^* = 1$ (Rechnung von Claude nach Visser, 2007). Cygnus X-1 entspricht damit rund 0,95 c, GRS 1915+105 mehr als 0,82 c, A0620-00 etwa 0,06 c. Im Modell liegt die Oberfläche an der Schwelle bei GM/c^2; die Auswertung der Scheiben ist dort neu zu machen, bevor die Messungen zwischen GM/c^2 und $3GM/c^2$ entscheiden können (Frage 53, Frage 10) .

3.2 Masse, Volumen und Drehimpuls hängen zusammen

Die drei Größen bilden eine einzige Bedingung [P]:

- Sinkt der Drehimpuls bei gleicher Masse, dehnt sich das Volumen aus.
- Wird die Masse bei gleichem Volumen höher, wird der Drehimpuls stärker.
- Wird der Drehimpuls bei gleicher Masse stärker, sinkt das Volumen.

Alle drei Aussagen stimmen mit der Formel für den Horizont r_+ eines rotierenden Schwarzen Lochs überein (Kerr-Lösung; M Masse, J Drehimpuls) [F]:

$r_+ = GM/c^2 + \sqrt{[(GM/c^2)^2 - (J/(Mc))^2]}$

Unter der Wurzel steht ein Minus; nur so schrumpft der Horizont, wenn der Drehimpuls J wächst.

Ein Widerspruch muss klar benannt werden [F]. Nach der Kerr-Formel hat auch ein Schwarzes Loch ohne jede Drehung einen Horizont, und zwar den größten: $r_+ = 2GM/c^2$, den Schwarzschild-Radius. Nach dem Modell, und ebenso im Medium nach Puthoff (3.1), entsteht ohne Drehung gar kein Horizont; erst wenn der Äquator die Lichtgeschwindigkeit erreicht, bei $R = GM/c^2$, hält das Objekt das Licht fest. Das ist genau der Radius des maximal drehenden Kerr-Lochs. Die Kerr-Formel stützt deshalb nur die Richtung der

drei Aussagen oben, nicht die Schwelle. Gemessene Schwarze Löcher mit geringer Drehung (Frage 10) und das Nachklingen nach Verschmelzungen (Frage 30) müssen zeigen, welches Bild stimmt.

Interessant wäre die Frage, ob Materie im Vakuum mehr Strahlung abgibt oder weniger. Da weniger Außendruck da ist, müsste sich die Materie ausdehnen können; sie bekommt mehr Volumen, und die Rotation lässt nach [P]. Die Bewegung innerhalb der Rotation muss aber schneller werden, da die Elementarteilchen mehr Platz haben, um zu beschleunigen und wieder abzubremsen [P]. (Nachtrag vom

1. November 2026.)

Ob Materie im Vakuum mehr oder weniger Strahlung abgibt, hängt von der Art der Strahlung ab [F]. Die Wärmestrahlung hängt nur von Temperatur und Oberfläche ab, nicht vom Druck ringsum (Stefan-Boltzmann-Gesetz); im Vakuum fällt nur die Kühlung durch Luft weg. Die Aussendung einzelner Atome hängt dagegen vom umgebenden Feld ab: Zwischen zwei leitenden Platten lebte ein angeregtes Rydberg-Atom mindestens 20-mal länger, weil es dort weniger Licht aussenden konnte (Hulet, Hilfer und Kleppner, 1985). Das passt zum Satz des Autors, dass die Umgebung das Feld verändert (7.1).

Dass sich Materie bei weniger Außendruck ausdehnt, stimmt; bei festen Körpern ist es aber winzig [F]. Ohne die Luft von 1 bar wird Stahl um etwa $6 \cdot 10^{-7}$ seines Volumens größer, Wasser um etwa $4{,}5 \cdot 10^{-5}$ (Rechnung von Claude aus Kompressionsmoduln von etwa 160 und 2,2 Gigapascal). Dass die Drehung bei größerem Volumen nachlässt, folgt aus der Erhaltung des Drehimpulses, wie bei einer Eiskunstläuferin, die die Arme ausstreckt. Anders als in den drei Zeilen oben sinkt dabei die Drehgeschwindigkeit, nicht der Drehimpuls.

Dass die Bewegung im Inneren schneller wird, widerspricht zwei Messungen, wenn der Grund der größere Platz sein soll [F]. Strömt Luft in einen leeren Behälter, ohne Arbeit zu leisten, bleibt ihre Temperatur gleich; die Teilchen haben mehr Platz, werden aber nicht schneller (Joule, 1845). Leistet ein Gas beim Ausdehnen Arbeit, kühlt es sogar ab. Und im Atom läuft ein Elektron auf einer größeren Bahn langsamer, nach Bohr (1913) auf der n-ten Bahn mit einem n-tel der Geschwindigkeit der innersten; die großen Rydberg-Atome (7) haben die langsamsten Elektronen. Anders ist es, wenn die Energie der nachlassenden Drehung ins Innere geht: Bei gleichem Drehimpuls sinkt die Drehenergie, wenn das Volumen wächst, und dieser Teil kann zu ungeordneter Bewegung werden, also zu Wärme, und dann auch zu mehr Wärmestrahlung. Nach dem Wortlaut des Autors ist die erste Lesart gemeint [F]: Die Elementarteilchen haben mehr Platz, um zu beschleunigen und wieder abzubremsen. Der Widerspruch zu den beiden Messungen oben bleibt damit ein Prüfstein (Frage 74); er hängt mit V16 zusammen, nach der eine Uhr im Vakuum schneller geht (2.5).

3.3 Die Form der Hülle hängt von der Drehung ab

Je schneller ein Objekt rotiert, desto flacher wird die Struktur um seinen Äquator [P]:

1. Sonne, langsame Drehung: Die Heliosphäre ist fast rund. Sie ist das Gegenstück der Sonne zur Akkretionsscheibe. Voyager 1 (2012) und Voyager 2 (2018) maßen an ihrem Rand Plasma mit

30.000 bis 50.000 K. Schon hier zeigt sich die Richtung: Über den Polen weht der Sonnenwind schnell, am Äquator langsam [F].

1. Be-Sterne, schnelle Drehung: Sie stoßen Gas in eine flache Scheibe am Äquator ab [F].

2. Schwarzes Loch, extreme Drehung: flache Akkretionsscheibe am Äquator, Jets an den Polen.

Auch die Milchstraße zeigt diese Form im Großen [F]: Über und unter ihrem Zentrum liegen zwei riesige Blasen aus heißem Gas, die Fermi-Blasen mit je rund 25.000 Lichtjahren Höhe (Su, Slatyer und Finkbeiner, 2010) und die noch größeren eROSITA-Blasen (Predehl und Kollegen, 2020). Sie gelten als Ausfluss aus der Umgebung des zentralen Schwarzen Lochs oder aus einer früheren Phase starker Sternentstehung; ihre Lage über den Polen entspricht den Jets in Punkt 3.

3.4 Zusammensetzung

Ein Schwarzes Loch ist hochverdichtete Materie, vermutlich aus den schwersten Elementen, eventuell mit Ordnungszahlen über 118 [P]. Am Umschlagpunkt verschmilzt die Materie und wird flüssig: Es entsteht Quark-Gluon-Plasma. Das Plasma dehnt sich schnell aus, kühlt ab, und durch die Ausdehnung wird die Drehung langsamer. Ein Stern ist entstanden [P].

Ein Schwarzes Loch verschluckt überhaupt nichts; es versucht sich auszudehnen [P]. (Nachtrag vom 4. November 2026.)

Das passt zum Umschlag, bei dem sich das Plasma schnell ausdehnt (oben) [F]. Im Standardbild wächst ein Schwarzes Loch dagegen, weil Gas und Sterne hineinfallen, und vier Messungen werden so gedeutet; das Modell muss sie anders erklären (Frage 59) . Erstens sind Schwarze-Loch-Kandidaten in Doppelsternen in ruhigen Phasen viel lichtschwächer als Neutronensterne bei vergleichbarem Zustrom; bei Neutronensternen schlägt das Gas auf eine Oberfläche und leuchtet (Narayan, Garcia und McClintock, 1997). Auf Neutronensternen zündet das gesammelte Gas regelmäßig in Röntgenblitzen, bei Schwarze-Loch-Kandidaten wurden solche

Blitze nie beobachtet (Narayan und Heyl, 2002). Zweitens leuchtet die Umgebung von Sagittarius A* so schwach, dass eine sichtbare Oberfläche weniger als 0,4 % der Energie des zuströmenden Gases abgeben dürfte (Broderick, Loeb und Narayan, 2009). Drittens entspricht die Masse aller großen Schwarzen Löcher heute ungefähr der Masse, die nach dem Licht der Quasare in sie geflossen sein muss (Sołtan, 1982). Viertens verschmelzen zwei Schwarze Löcher gemessen zu einem einzigen mit größerer Horizontfläche (GW250114). Im Modell ist zu klären, wo das zuströmende Gas bleibt, ohne zu leuchten, und woher die Masse der Schwarzen Löcher stammt, wenn nicht aus dem Zustrom.

Das zuströmende Gas kreist in der Scheibe am Äquator und wird über die Jets an den Polen wieder hinausgetragen; zusätzlich gibt das Schwarze Loch Hawking-Strahlung ab [P]. (Nachtrag vom 4. November 2026, Antwort auf Frage 59.)

Der größte Teil davon ist gemessen [F]. Bei Sagittarius A* gelangt weniger als 1 % des Gases, das in den Einflussbereich des Schwarzen Lochs gerät, bis ganz an das Loch; der Rest wird wieder fortgeblasen (Wang und Kollegen, 2013). Hawking-Strahlung ist an Nachbildungen gemessen: In einem Bose-Einstein-Kondensat, das schneller strömt als der Schall darin, entsteht ein Horizont für Schallwellen, und er strahlt mit der vorhergesagten Temperatur (Unruh, 1981; Muñoz de Nova und Kollegen, 2019). Das ist ein strömendes Medium, wie es das Modell beschreibt. Bei Schwarzen Löchern im All ist sie nicht gemessen und nach Hawking (1974) verschwindend schwach: Ein Schwarzes Loch von einer

Sonnenmasse hätte etwa 60 Milliardstel Grad über dem absoluten Nullpunkt und strahlte etwa 10^{-28} Watt ab, Sagittarius A* etwa 10^{-41} Watt (Rechnung von Claude). Schon ein Zustrom von einem Hundertmillionstel Sonnenmasse pro Jahr entspricht dagegen rund 10^{31} Watt (Rechnung von Claude). Hawking-Strahlung kann also nur einen verschwindenden Teil abführen; die Last tragen Scheibe und Jets. Für den kleinen Teil, der nach den Messungen in Frage 59 bis an das Schwarze Loch gelangt, gibt die Messung die Grenze: Eine Oberfläche gibt bei Sagittarius A* weniger als 0,4 % der Zustromenergie ab (unten); der Rest geht nach dem Autor in die Jets (3.4, Frage 59).

Deshalb wachsen Schwarze Löcher extrem langsam. Natürlich verdampfen sie, bis sie explodieren. Dann bleibt je nach Masse wieder ein Schwarzes Loch zurück oder irgendwann ein Neutronenstern. Theoretisch müsste auch der Neutronenstern, wenn er sich über Billiarden Jahre langsamer dreht, irgendwann wieder zu einer Sonne werden [P]. (Nachtrag vom 4. November 2026.)

Dass Schwarze Löcher heute sehr langsam wachsen, ist gemessen [F]: Sagittarius A* nimmt etwa $2 \cdot 10^{-9}$ bis $2 \cdot 10^{-7}$ Sonnenmassen pro Jahr auf (Marrone und Kollegen, 2007). Mit 10^{-8} pro Jahr käme es in 13,8 Milliarden Jahren auf etwa 140 Sonnenmassen, ein Dreißigtausendstel seiner Masse von 4,3 Millionen Sonnenmassen (Rechnung von Claude). Wachsen sie so langsam, müssen große Schwarze Löcher schon groß entstanden sein. Da-

zu passen frühe Funde wie UHZ1, ein Schwarzes Loch von 10 bis 100 Millionen Sonnenmassen, das wir so sehen, wie es etwa eine halbe Milliarde Jahre nach dem Urknall des Standardmodells war; die Entdecker deuten es als schwer geboren (Bogdán und Kollegen, 2024). Das passt zur Aussage des Autors, dass die Schwarzen Löcher in der Rekombinationsphase entstanden (5.6). Wachsen setzt allerdings voraus, dass etwas aufgenommen wird; das steht in Spannung zu dem Satz, ein Schwarzes Loch verschlucke überhaupt nichts (oben, Frage 59).

Verdampfen bis zur Explosion entspricht Hawkings Bild; sein erster Aufsatz dazu hieß »Black hole explosions?« (Hawking, 1974) [F]. Die Dauer wächst mit der dritten Potenz der Masse: Ein Schwarzes Loch von einer Sonnenmasse braucht etwa 10^{67} Jahre, Sagittarius A* etwa 10^{87} Jahre (Rechnung von Claude nach Hawking). Im unendlichen Universum des Modells (P5) ist dafür Zeit. In 13,8 Milliarden Jahren könnten nur sehr kleine Schwarze Löcher explodiert sein; nach deren letztem Aufblitzen wurde bisher vergeblich gesucht (HAWC, 2020). Heute verdampft allerdings kein bekanntes Schwarzes Loch: Schon bei einer Sonnenmasse ist es mit etwa 60 Milliardstel Grad viel kälter als die 2,7 K der Hintergrundstrahlung (Fixsen und Kollegen, 1996) und nimmt mehr Strahlung auf, als es abgibt; das gilt für jedes Schwarze Loch ab etwa der Masse des Mondes (Rechnung von Claude nach Hawking). Was heute abgegeben wird, geht über Scheibe und Jets (oben). Dass bei einer Explosion je nach Masse ein Schwarzes Loch oder ein Neutronenstern zurückbleibt, entspricht den Supernovae; bei SN 1987A ist der Neutronenstern inzwischen über sein Leuchten im Gas nachgewiesen (Fransson und Kollegen, 2024).

Dass sich Neutronensterne mit der Zeit langsamer drehen, ist gemessen; nach 3.1 und 3.2 wächst bei gleicher Masse das Volumen, wenn der Drehimpuls sinkt [F]. Ausgedehnt hat sich dabei bisher kein beobachteter Neutronenstern: 1E 161348-5055 dreht sich nur einmal in 6,7 Stunden, seine Oberfläche läuft mit etwa 3 m/s, und er ist trotzdem kompakt (Frage 10). Der Autor setzt allerdings Billiarden Jahre an, weit mehr als das Alter aller beobachteten Neutronensterne. Würde ein Neutronenstern sich ausdehnen und der Druck sinken, zerfielen seine Neutronen: Ein freies Neutron zerfällt im Mittel nach etwa 878 Sekunden in ein Proton, ein Elektron und ein Antineutrino (Gonzalez und Kollegen, 2021). Daraus entstünde Wasserstoff, der Brennstoff einer Sonne [F]. Die Ausdehnung löst nach dem Satz des Autors, der Druck sei der Zustrom (3.4), das Nachlassen des Zustroms aus: Sinkt der Druck von außen, dehnt sich das Objekt, und es schlägt über das Quark-Gluon-Plasma um, dessen Übergang gemessen bei etwa 156 MeV liegt (Andronic und Kollegen, 2018). Das Verdampfen trägt dazu nur verschwindend bei (oben); die Explosion ist der Umschlag selbst (Frage 60).

Die Masse wird in das Schwarze Loch hineingepresst, beziehungsweise auf die Oberfläche gedrückt [P]. Ob die Explosion nach dem Verdampfen derselbe Vorgang ist wie der Umschlag über das

Quark-Gluon-Plasma, könnte sein; das weiß der Autor noch nicht [P]. (Antworten vom 4. November 2026 auf Frage 60.)

Ich weiß nicht, ob jedes Schwarze Loch, das explodiert, über ein Quark-Gluon-Plasma explodiert [P]. (Frage des Autors vom 4. November 2026: Wäre das möglich?)

Möglich ist es, und ebenso, dass es nicht bei jedem so ist [F]. In Modellrechnungen kann der Übergang von Kernmaterie zu Quark-Materie im heißen, dichten Kern eines kollabierenden Sterns die Explosion selbst auslösen, bei Sternen ab etwa 50 Sonnenmassen, die in den üblichen Rechnungen nicht explodieren (Fischer und Kollegen, 2018). Ob das geschieht, hängt von der Masse ab und von der Dichte, bei der der Übergang einsetzt; nach den gemessenen Massen und Radien schwerer Neutronensterne liegt sie beim Mehrfachen der Kerndichte (Annala und Kollegen, 2020). Erkennen ließe sich ein solcher Umschlag an einem zweiten Neutrinoblitz kurz nach dem ersten, messbar bei der nächsten Supernova in der Milchstraße (Fischer und Kollegen, 2018; 4.5). Dazu passt, dass nach den gemessenen Massen und Radien schwerer Neutronensterne in ihrem Kern Quark-Materie sitzen kann (Annala und Kollegen, 2020). Ob eine Explosion diesen Weg nimmt, entscheidet die Masse: SN 1987A hinterließ einen Neutronenstern (Fransson und Kollegen, 2024), dort setzte der Umschlag nicht ein; schwere Neutronensterne bis 2,08 Sonnenmassen (PSR J0740+6620) können Quark-Materie im Kern tragen, also setzt er oberhalb davon ein (Frage 60).

Damit löst sich die Spannung zwischen Wachsen und Nicht-Verschlucken [F]: Das Schwarze Loch zieht nichts aktiv hinein, die Masse wird von außen angedrückt, so wie Sterne nach 4.2 durch Verdichtung entstehen, nicht durch Anziehung. Für eine Oberfläche gelten die Prüfsteine aus Frage 59 : Auf Neutronensternen trifft angedrücktes Gas auf eine Oberfläche, leuchtet dabei und zündet in Röntgenblitzen; bei Schwarzen Löchern fehlt beides, und eine Oberfläche von Sagittarius A* dürfte weniger als 0,4 % der Energie des Zustroms abgeben. Wohin die Energie dabei geht, beantwortet der Autor im nächsten Absatz. Was die Masse andrückt, hat der Autor beantwortet: der Zustrom (unten, Frage 60).

Ein Teil der Energie wird durch die Akkretionsscheibe zur Oberfläche gedrückt; da das Schwarze Loch die Energie nicht auf Dauer halten kann, bricht sie durch Jets aus [P]. (Nachtrag vom 4. November 2026; das ist die Antwort des Autors auf Frage 59, die er schon mit Scheibe und Jets gegeben hatte.) Gemessen ist ein solcher Schub [F]: Der Knoten HST-1 im Jet von M87 wurde in fünf Jahren mehr als fünfzigmal heller im Röntgenlicht (Harris und Kollegen, 2006). Die Deutung als Entladung von Druck bleibt [P]; die Richtung eines Ausstroms über die Pole rechnet Anhang C.12.3.

Diese Deutung gibt es für einen Teil der Prüfsteine auch in der Fachliteratur [F]: Ruhende Schwarze-Loch-Kandidaten in Doppelsternen können ihre Energie überwiegend in Jets abgeben statt als Röntgenlicht; dann ist ihr Helligkeitsunterschied zu Neutronensternen kein direkter Beleg mehr für einen Horizont (Fender, Gallo und Jonker, 2003). Zwei Prüfsteine beantwortet die Messung (Frage 59): Bei Sagittarius A* ist ein Jet bisher nicht sicher nachgewiesen (Chavez und Kollegen, 2024); dort ist der Zustrom sehr

klein, und gemessen wächst der Jet mit dem Zustrom (unten). Und auf Neutronensternen zündet aufgehäuftes Gas in Röntgenblitzen, bei Schwarze-Loch-Kandidaten nicht (Narayan und Heyl, 2002).

In der Akkretionsscheibe können keine Blitze entstehen; ein Schwarzes Loch hat eine deutlich höhere Umlaufgeschwindigkeit als ein Neutronenstern [P]. (Nachtrag vom 4. November 2026.)

Klarstellung von Claude: Die Röntgenblitze entstehen nicht in der Scheibe, sondern auf der Oberfläche [F]. Bei Neutronensternen sammelt sich das angedrückte Gas dort, wird zusammengepresst und zündet nach Stunden bis Tagen in einer thermonuklearen Explosion von 10 bis 100 Sekunden (Woosley und Taam, 1976). Dass die viel schnellere Drehung das bei Schwarzen Löchern verhindert, ist im Modell ein möglicher Grund (3.1). Gemessen ist dazu: Auch schnell drehende Neutronensterne blitzen. 4U 1608-52 dreht sich etwa 620-mal pro Sekunde (Hartman und Kollegen, 2003; Galloway und Kollegen, 2008); seine Oberfläche läuft bei rund 12 km Radius mit etwa 16 % der Lichtgeschwindigkeit (Rechnung von Claude). Bis zu diesem Wert verhindert die Drehung das Zünden also nicht. Ab welcher Umlaufgeschwindigkeit sich kein zündfähiger Brennstoff mehr sammelt, begrenzt die Messung von unten: über 16 % der Lichtgeschwindigkeit, denn bis dorthin blitzen Neutronensterne; die Oberfläche eines Schwarzen Lochs läuft im Modell nahe c, und dort blitzt es gemessen nicht (Narayan und Heyl, 2002).

Der niedrige Drehparameter von A0620-00 (etwa 0,1; Gou und Kollegen, 2010) ist mit der Kerr-Lösung ausgewertet und im Modell neu zu lesen (nächster Absatz, Frage 10).

Die Oberfläche des Schwarzen Lochs dreht sich schneller als die Akkretionsscheibe. Je langsamer ein Schwarzes Loch rotiert, desto mehr Masse gibt es ab; je schneller es dreht, desto mehr Masse wird in das Loch gedrückt. Fällt die Rotationsgeschwindigkeit unter einen kritischen Wert, explodiert ein Stern beziehungsweise ein Schwarzes Loch. Ein Schwarzes Loch ist ein Stern, der sich zu schnell dreht; es kann auch ein Quasar sein, also quasi ein Stern [P]. (Nachtrag vom 4. November 2026; vgl. 3.1 und 3.5.)

Das fügt sich in das Kriterium aus 3.1 [F]. Damit ist auch der Prüfstein mit A0620-00 anders zu lesen: Sein Drehparameter ist nicht direkt gemessen, sondern aus der Lage des inneren Scheibenrands erschlossen, unter der Annahme, dass die Scheibe am innersten stabilen Umlauf der Kerr-Lösung endet (McClintock, Narayan und Steiner, 2014). Im Modell dreht sich die Oberfläche schneller als die Scheibe; die Scheibendaten müssten mit dem Modell neu ausgewertet werden (Frage 10). Der Name Quasar ist eine Kurzform von »quasi-stellare Radioquelle«: 3C 273 sah auf Bildern aus wie ein Stern, sein Spektrum zeigte aber eine Rotverschiebung von 0,158, weit außerhalb der Milchstraße (Schmidt, 1963).

Zum Zusammenhang von Drehung und Ausstoß ist die Messlage umstritten . In Röntgendoppelsternen fanden Narayan und McClintock (2012) stärkere Jets bei schneller drehenden Schwarzen Löchern, wieder mit der Kerr-

Auswertung der Drehung; Russell, Gallo und Fender (2013) fanden mit mehr Quellen keinen gesicherten Zusammenhang. Im Modell gibt ein langsamer drehendes Schwarzes Loch mehr Masse ab. Ob der gemessene Jet-Ausstoß dazu passt, hängt davon ab, wie man die Drehung misst (Frage 60).

Je schneller das Schwarze Loch dreht, desto stärker die Jets; je langsamer das Loch, desto stärker die Strahlung [P]. (Nachtrag vom 4. November 2026.)

Für die Jets entspricht das dem Bild von Blandford und Znajek (1977), in dem Jets aus der Drehenergie des Schwarzen Lochs gespeist werden, und dem Vorschlag, dass radiolaute aktive Galaxien schnell drehende Schwarze Löcher enthalten, radioleise langsam drehende (Wilson und Colbert, 1995) [F]. Gemessen ist der Zusammenhang umstritten (oben). Für die Strahlung ergibt die Kerr-Auswertung das Gegenteil: Eine Scheibe strahlt dort umso mehr, je schneller das Loch dreht, weil sie dann näher heranreicht; der Wirkungsgrad steigt von etwa 6 % ohne Drehung auf etwa 30 % bei fast größtmöglicher Drehung (Thorne, 1974). Auch das ist im Modell neu auszuwerten (Frage 10).

Unabhängig von jeder Auswertung gemessen ist ein Prüfstein : Dasselbe Schwarze Loch in einem Röntgendoppelstern wechselt während eines Ausbruchs innerhalb von Wochen bis Monaten zwischen einem harten Zustand mit stetigem Jet und weicheren Zuständen mit starker Scheibenstrahlung ohne diesen Jet (Fender, Belloni und Gallo, 2004). Seine Drehung kann sich in dieser Zeit kaum ändern, denn die aufgenommene Masse ist ein winziger Bruchteil seiner eigenen. Ob Jet oder Strahlung überwiegt, hängt dort also auch vom Zustrom ab, nicht allein von der Drehung (Frage 60).

Es kommt immer auf den Druck an. Die Materie baut Druck von innen auf, und der Druck des »akkum« drückt dagegen; je größer der Unterschied, desto größer der Druck und desto schneller die Rotation [P]. (Nachtrag vom 4. November 2026; »akkum« steht so in der Nachricht des Autors, gemeint ist nach dem nächsten Nachtrag das Vakuum.)

Dafür gibt es Vorbilder [F]. In einem Wirbelsturm hält der Druckunterschied zwischen Umgebung und Auge der Drehung das Gleichgewicht; nach der zyklostrophischen Gleichung wächst die höchste Windgeschwindigkeit etwa mit der Wurzel des Druckunterschieds, und gemessene Beziehungen bestätigen den Zusammenhang (Knaff und Zehr, 2007). Auch der Drehimpulssatz passt: Wird ein Körper stärker zusammengedrückt und dadurch kleiner, dreht er sich schneller, wie eine Eisläuferin, die die Arme anzieht (3.2).

Ein Prüfstein : Im Doppelpulsar PSR J0737-3039 haben beide Neutronensterne fast gleiche Masse, 1,34 und 1,25 Sonnenmassen; der eine dreht sich alle 23 Millisekunden, der andere alle 2,8 Sekunden (Kramer und Kollegen, 2006). Die Vorgeschichte bestimmt die Drehung, und das ist gemessen: Pulsar A hat ein rund 200-mal schwächeres Magnetfeld und wurde durch früheren Zustrom vom Begleiter beschleunigt, Pulsar B entstand später und dreht sich langsam (Kramer und Kollegen, 2006); das passt zum Satz des

Autors, dass der Zustrom die Drehung ändert (Frage 60). Für die wechselnden Zustände in Röntgendoppelsternen bedeutet die Aussage des Autors, dass der Zustrom den Druckunterschied ändert; nach dem Drehimpulssatz ändert sich die Drehung dann nur, wenn sich auch die Größe des Lochs ändert oder Drehimpuls zu- oder abfließt.

Wenn sich ein Neutronenstern schneller oder langsamer dreht als ein Neutronenstern mit derselben Dichte, liegt das an einem lokalen Druckunterschied des Vakuums. Materie besteht aus demselben Medium: Materie ist ein Wirbel, das Vakuum ist der Fluss. Die Le-Sage-Druckwellen sind Druckwellen [P]. (Nachtrag vom 4. November 2026, zu Bildern eines Strömungsversuchs mit Mauermodellen in einer Wasserrinne.)

Daraus folgt [F]: Weil die Materie selbst ein Wirbel im Medium ist, drückt das Medium nicht gegen einen fremden Körper. Druckwellen und Druckunterschiede im Fluss formen und treiben die Wirbel, und die Schwerkraft ist deren Dichteanomalie (2.1). So gelesen widersprechen sich P3, der Satz, dass Gravitationswellen alle Materie anschieben (2.1), und der Druck des Vakuums nicht: P3 schließt einen Schub von außen auf einen fremden Körper aus, nicht den Druck des Mediums auf seine eigenen Wirbel. Auch der Einwand der Erwärmung trifft dieses Bild nicht. Le Sages Teilchen müssen ständig verschluckt werden, damit eine Kraft entsteht; ein Wirbel in einem reibungsfreien Medium bleibt dagegen ohne ständige Energiezufuhr bestehen (Helmholtz, 1858; Kelvin, 1869). Die Druckwellen müssen ihn nur erzeugen oder seine Drehung ändern.

Die Bilder zeigen das im Kleinen [F]: Eine Wasserströmung läuft an Mauern aus weißen Blöcken vorbei; in nicht geschlossenen Höfen bildet sich ein kreisender Wirbel, an den Ecken lösen sich Wirbel ab, und hinter geschlossenen Wänden bleibt es fast ruhig. In der Strömungslehre heißt das Kavitätenströmung: Eine vorbeiziehende Strömung treibt in einer Vertiefung einen stehenden Wirbel an (Shankar und Deshpande, 2000). Im Versuch halten Wände den Wirbel fest; nach dem Autor gibt es immer Wände, im Medium etwa die Grenzen zwischen Bereichen verschiedener Dichte (unten, Frage 56).

Ein Prüfstein für den lokalen Druckunterschied ist der Doppelpulsar . Seine beiden Neutronensterne umkreisen einander in rund 880.000 km Abstand, knapp drei Lichtsekunden (Rechnung von Claude aus Umlaufzeit und Massen), sitzen also im selben Umfeld und drehen sich trotzdem 122-mal verschieden schnell (Kramer und Kollegen, 2006). Der Druckunterschied des Vakuums müsste sich auf dieser kurzen Strecke stark ändern, oder er hängt am Neutronenstern selbst und seiner Vorgeschichte (Frage 60). Gemessen ist, dass Zustrom einen Neutronenstern schneller drehen lässt: SAX J1808.4-3658 dreht sich 401-mal pro Sekunde, während er Gas von seinem Begleiter erhält (Wijnands und van der Klis, 1998), und PSR J1023+0038 hatte vor wenigen Jahren noch eine Scheibe und ist heute ein Radiopulsar mit 1,7 Millisekunden Drehzeit (Archibald und Kollegen, 2009). Nach der Standarddeutung wurde der schnelle

Pulsar im Doppelpulsar früher auf diese Weise beschleunigt. Das passt

zum Zusammenhang von angedrückter Masse und Drehung, den der Autor beschreibt.

Der Zustrom ist der Druck, den der Autor meint [P]. (Nachtrag vom 4. November 2026, zu Frage 60.)

Damit ist der Doppelpulsar erklärbar [F]: Pulsar A entstand zuerst und wurde später durch Zustrom von seinem Begleiter beschleunigt; sein Magnetfeld ist mit etwa $6 \cdot 10^9$ Gauß rund tausendmal schwächer als das von Pulsar B, wie bei anderen so beschleunigten Pulsaren. Pulsar B entstand später in der Supernova des Begleiters und erhielt keinen Zustrom (Lorimer und Kollegen, 2007). Auch die Stärke hängt am Zustrom: Bei Pulsaren, die während eines Ausbruchs Gas von einem Begleiter erhalten, steigt die Beschleunigung der Drehung mit dem Zustrom, abgelesen an ihrer Helligkeit; bei dauerhaft leuchtenden Quellen ist der Zusammenhang schwach oder sogar umgekehrt, sie wechseln zwischen Beschleunigen und Abbremsen (Bildsten und Kollegen, 1997). Der Zustrom beantwortet zugleich die Frage, was die Masse auf die Oberfläche eines Schwarzen Lochs drückt (Frage 60).

Steigt der Zustrom über den Wert des Abstroms, dreht es sich schneller; sinkt der Zustrom unter den Wert des Abstroms, nimmt die Rotationsgeschwindigkeit ab [P]. (Nachtrag vom 4. November 2026, zu den Quellen, die zwischen Beschleunigen und Abbremsen wechseln.)

Das ist die Bilanz des Drehimpulses [F]: Die Drehung eines Körpers ändert sich mit dem Unterschied zwischen zufließendem und abfließendem Drehimpuls. Für Neutronensterne mit Zustrom ist beides gemessen. Ist der Zustrom schwach, schleudert das schnell drehende Magnetfeld das ankommende Gas wieder fort, und der Stern wird langsamer (Illarionov und Sunyaev, 1975). PSR J1023+0038 bremst in der Phase mit Scheibe sogar um etwa 27 % schneller ab als ohne, obwohl Gas zuströmt; der abfließende Drehimpuls überwiegt dort also (Jaodand und Kollegen, 2016).

Zur Wortwahl : Entscheidend ist der Drehimpuls, nicht allein die Menge des Gases, also wie viel Drehung das Gas mitbringt oder fortträgt. Ein Prüfstein ist GX 1+4: Er bremste über fünf Jahre fast durchgehend ab, und je heller er war, also je stärker der Zustrom, desto stärker bremste er, umgekehrt zur üblichen Erwartung (Chakrabarty und Kollegen, 1997). Im Modell müsste dort mit dem Zustrom der Abstrom noch stärker gewachsen sein (Frage 60).

Dass der Abstrom stärker wächst, folgt daraus, dass die Jets stärker werden, wenn sich das Objekt schneller dreht (oben) [P]. (Antwort des Autors vom 4. November 2026 zu GX 1+4.)

Gemessen wächst der Ausstoß von Jets mit dem Zustrom [F]: In Röntgendoppelsternen mit Schwarzem Loch steigt die Radiohelligkeit der Jets etwa mit der Röntgenhelligkeit hoch 0,7, über mehr als drei Größenordnungen (Gallo, Fender und Pooley, 2003). Bei GX 1+4 ist Radiostrahlung nachgewiesen, die von einem Jet oder einem fortgeschleuderten Ausfluss stammen kann; ein Jet ist dort noch nicht bestätigt (van den Eijnden und Kollegen, 2018). Einen Punkt beantwortet die Messung (Frage 60): GX 1+4 dreht sich

langsam, einmal in etwa zwei Minuten, und wurde während der Messung immer langsamer; trotzdem wuchs das Abbremsen sofort mit der Helligkeit. Dort müsste der Abstrom also unmittelbar mit dem Zustrom wachsen, nicht erst über eine schnellere Drehung. Das passt zur gemessenen Kopplung von Zustrom und Jet. Kleine Schwarze Löcher schwanken schneller [F]: Die kennzeichnende Zeit ihrer Röntgenschwankung wächst etwa linear mit der Masse und fällt mit der Zustromrate, von Röntgendoppelsternen bis zu Galaxienkernen (McHardy und Kollegen, 2006). Das ist ein Prüfstein für jedes Bild, in dem die Zeit mit der Größe des Wirbels wächst [P].

Je langsamer ein Schwarzes Loch dreht, desto mehr Energie wird kontinuierlich seitlich abgegeben. Wenn es schnell dreht und der Zustrom seitlich zu stark ist, bricht die Energie stoßweise polar aus [P]. (Nachtrag vom 4. November 2026.)

Der stoßweise Ausbruch ist gemessen [F]: In Röntgendoppelsternen wird der stetige Jet mit steigendem Zustrom stärker; beim Übergang zu den weicheren Zuständen wirft er einzelne Wolken aus, danach strahlt vor allem die Scheibe (Fender, Belloni und Gallo, 2004). Bei GRS 1915+105 flogen 1994 zwei solche Wolken mit etwa 92 % der Lichtgeschwindigkeit nach entgegengesetzten Seiten davon, ausgeworfen, als die Quelle mehr Röntgenstrahlung abgab als sonst (Mirabel und Rodríguez, 1994). Damit passt auch der Prüfstein von oben, dass dasselbe Loch in Wochen zwischen Jet und Strahlung wechselt, obwohl sich seine Drehung kaum ändert: Nach dieser Aussage entscheidet bei schneller Drehung der seitliche Zustrom, wann die Energie über die Pole ausbricht. Ob langsamer drehende Schwarze Löcher mehr seitlich abgeben, prüft die gemessene Jetleistung gegen die Drehung: Für die ausgeworfenen Jets steigt sie mit der Drehung (Narayan und McClintock, 2012), also geben langsamer drehende mehr seitlich ab; da die Drehparameter aus der Kerr-Auswertung stammen, gilt das für ihre Rangfolge (oben, Frage 60).

Ein neuer Fall zeigt solche Ausbrüche an einem Doppelstern [F]. AT 2016blu in der Galaxie NGC 4559 ist ein leuchtkräftiger blauer Veränderlicher mit mindestens etwa 33 Sonnenmassen. Zwischen 2012 und 2026 hatte er 27 Ausbrüche, ungefähr alle 113 Tage, vermutlich jeweils bei der größten Annäherung an einen Begleiter auf einer langgestreckten Bahn. 2001 und 2002, vor dem ersten Ausbruch, sah das Röntgenteleskop Chandra dort nichts. Im März 2026 maß es eine Röntgenleistung von 10 hoch 38,64 ± 0,11 erg/s, mindestens hundertmal mehr. Daraus folgt ein Zustrom von mindestens etwa $8 \cdot 10^{-8}$ Sonnenmassen im Jahr, bis zu $8 \cdot 10^{-6}$, wenn der größte Teil der Leistung im sichtbaren Licht wieder austritt. Für einen Neutronenstern liegt diese Leistung über der Eddington-Grenze. Ob der Begleiter ein Neutronenstern oder ein Schwarzes Loch ist, lässt sich nicht entscheiden; sicher geht das nur, wenn Pulse gemessen werden wie bei anderen Quellen (Israel und Kollegen, 2017), und dafür reichen die Daten nicht. Dass die Ausbrüche erst 2012 begannen, erklären die Autoren am ehesten damit, dass sich der Hauptstern ausgedehnt hat und seither mit dem Begleiter wechselwirkt (Aghakhanloo und Kollegen, 2026). Für das

Modell heißt das: Stoßweiser Zustrom und stoßweise Ausbrüche hängen hier gemessen zusammen. Die drei Zustände des nächsten Absatzes zeigt dieser Fall nicht.

Bei Sternen ist das genauso wie beim Wasser: Vielleicht sind Neutronensterne flüssig, Sterne gasförmig und Schwarze Löcher gefroren [P]. (Nachtrag vom 4. November 2026, zum Beispiel des Wassers bei P2.)

Mehreres passt dazu [F]. Sterne sind gemessen Kugeln aus heißem, ionisiertem Gas. Neutronensterne haben eine feste Kruste, deren Schwingungen man nach gewaltigen Ausbrüchen von Magnetaren sieht (Strohmayer und Watts, 2006), und einen Kern, der sich wie eine reibungsfreie, suprafl üssige Flüssigkeit verhält: Plötzliche kleine Sprünge ihrer Drehung, die Glitches, erklärt man damit, dass sich darin verankerte Wirbel losreißen (Anderson und Itoh, 1975). Das passt zugleich zum Bild, dass Materie ein Wirbel ist. »Gefrorener Stern« war in den 1960er-Jahren sogar ein Name für Schwarze Löcher, weil der Zusammenbruch von außen gesehen am Horizont zu erstarren scheint (Zel'dovich und Novikov, 1971; Herdeiro und Lemos, 2018). Am Umschlag schmilzt das Schwarze Loch nach diesem Abschnitt zum Quark-Gluon-Plasma, das sich nach Messungen wie eine fast ideale Flüssigkeit verhält (oben). Übertragen auf das Wasser wäre der flüssige Neutronenstern der dichteste Zustand wie Wasser bei 4 °C; heißer dehnt sich der Stoff zum Gas aus (Stern), gefroren will er sich ebenfalls ausdehnen wie Eis, so wie das Schwarze Loch nach dem Autor versucht, sich auszudehnen (oben).

Ein Maß für die drei Zustände [F, Abschätzung]: Jedes Teilchen hat eine Schleifengröße. Schrödinger fand 1930 in der Gleichung des Elektrons eine Zitterbewegung, deren Weite von der Größe $\hbar/(mc)$ ist, die Plancksche Konstante geteilt durch Masse mal Lichtgeschwindigkeit (Schrödinger, 1930; 7.3). Rücken Elektronen so nahe zusammen, trägt ihr Druck einen Stern nur bis 1,44 Sonnenmassen; das ist Chandrasekhars Grenze der Weißen Zwerge (Chandrasekhar, 1931), Standardphysik in anderen Worten. Bei Neutronen ist die Schleife 0,21 Femtometer groß. Berühren sich diese Schleifen, ist die Dichte $1{,}8 \cdot 10^{20}$ kg/m³, rund 675-mal die Dichte eines Atomkerns. Eine gleichmäßige Kugel so dichter Materie liegt schon ab 0,32 Sonnenmassen innerhalb ihres Horizonts (Rechnung von Claude). Kein Neutronenstern erreicht diese Dichte also; wo sich die Schleifen berühren, ist das Objekt schon ein Schwarzes Loch. Im Bild des Wassers heißt das [P]: Im Gas (Stern) fliegen die Teilchen frei, in der Flüssigkeit (Neutronenstern) liegen sie dicht, ohne dass sich ihre Schleifen berühren, im gefrorenen Zustand (Schwarzes Loch) berühren sie sich und rasten ein. Die Obergrenze der Neutronensterne folgt in der Standardphysik aus Kernkräften und Schwerkraft (Oppenheimer und Volkoff, 1939); gemessen sind bis etwa 2,1 Sonnenmassen (Fonseca und Kollegen, 2021). Eine bestimmte Massenkante folgt aus der Schleifengröße nicht.

Zwischen Neutronenstern und Schwarzem Loch liegt ein Übergang, der selten durchlaufen wird [V]. Gemessen ist dazu [F]: Zwischen etwa 2,5 und 5 Sonnenmassen sind kompakte Objekte seltener als darüber, aber die Re-

gion ist nicht leer. Bei GW190814 hatte der leichtere Partner 2,59 Sonnenmassen (LIGO und Virgo, 2020), bei GW230529 der schwerere 2,5 bis 4,5 (LIGO, Virgo und KAGRA, 2024); ob es Neutronensterne oder Schwarze Löcher waren, entscheidet das Signal nicht. Die Lücke ist also dünn besetzt, nicht leer. Das Bild dazu ist Wasser zwischen 4 °C und 0 °C [P]: Es ist bei 3,98 °C am dichtesten und dehnt sich schon vor dem Gefrieren aus, weil sich die Moleküle eisähnlich ordnen (Kell, 1975) [F]. Übertragen würde sich die Materie kurz vor dem Schwarzen Loch schon ordnen. In den Radien zeigt sich das bisher nicht [F]: Der schwerste gut gemessene Neutronenstern, PSR J0740+6620 mit 2,08 Sonnenmassen, hat mit etwa 12,5 km einen ähnlichen Radius wie leichtere (Salmi und Kollegen, 2024); die Fehler sind noch groß.

Den Ablauf beschreibt der Autor so [P]: Der Brennstoff geht aus, der Kern stürzt zusammen, heizt sich kurz auf, kühlt über Neutrinos ab und gefriert. Die ersten Schritte sind an SN 1987A gemessen [F]: Kamiokande-II und IMB sahen 11 und 8 Neutrinos in etwa 13 und 6 Sekunden (Hirata und Kollegen, 1987; Bionta und Kollegen, 1987); das ist die Abkühlung eines heißen, jungen Neutronensterns. Gefroren ist dieser nicht: Die Linien im Rest deuten auf die Strahlung eines abkühlenden Neutronensterns oder seines Pulsarwinds (Fransson und Kollegen, 2024). Auch in der Standardphysik stützt die Wärme den jungen Stern; stürzt er weiter zu einem Schwarzen Loch, dann nachdem er abgekühlt ist. Das passt zur Reihenfolge des Autors.

Der Autor hält den Mpemba-Effekt für entscheidend: Heißes könnte schneller gefrieren als Kaltes [V]. Gemessen ist ein solcher Effekt in einem Kolloid (Kumar und Bechhoefer, 2020); bei Wasser ist er umstritten, sorgfältig gemessen kühlt heißes Wasser nicht schneller (Burridge und Linden, 2016) [F]. Für junge Neutronensterne sagt die Standardphysik das Gegenteil: Ein heißerer hält länger. Prüfbar ist das an der nächsten Supernova in der Milchstraße [V]. Wird der junge Stern zum Schwarzen Loch, bricht der Neutrinostrom in Millisekunden ab. Super-Kamiokande, IceCube und JUNO würden Zehntausende Neutrinos sehen, also messen, wann der Strom abbricht und wie heiß der Stern war. Bricht der heißere Strom früher ab, stützt das die Mpemba-Lesart; hält er länger, das Standardbild.

Daraus folgt ein Prüfstein (Frage 61) . Wie Eis weniger dicht ist als Wasser, müsste ein Schwarzes Loch dann weniger dicht sein als ein Neutronenstern. Nach der Relativitätstheorie gerechnet liegt die mittlere Dichte innerhalb des Horizonts bei einem Schwarzen Loch von 10 Sonnenmassen bei etwa $2 \cdot 10^{17}$ kg/m³, rund halb so hoch wie bei einem Neutronenstern mit etwa $4 \cdot 10^{17}$ kg/m³; bei Sagittarius A* bei etwa 10^{6} kg/m³, tausendmal so hoch wie bei Wasser; bei M87* bei etwa 0,4 kg/m³, weniger als Luft (Rechnung von Claude). Im Modell hängt das davon ab, wie groß ein Schwarzes Loch wirklich ist. Nach dem Anfang dieses Abschnitts besteht es aus hochverdichteter Materie der schwersten Elemente; es ist weniger dicht als ein Neutronenstern, wie die Rechnung oben für 10 Sonnenmassen zeigt und das Bild des Wassers im nächsten Absatz ordnet.

Dass ein Schwarzes Loch hochverdichtete Materie ist, ist richtig; ein Neu-




Abbildung 3: Massen kompakter Objekte zwischen Neutronensternen und Schwarzen Löchern: schwerste gut gemessene Neutronensterne, die Objekte GW190814 und GW230529 im Bereich 2,5 bis 5 Sonnenmassen und gut gemessene stellare Schwarze Löcher. Die Region ist dünn besetzt, nicht leer.




Abbildung 4: Übergangszone im Bild des Wassers: Dichte des Wassers mit dem Höchstwert bei 3,98 °C (Kell, 1975) und gemessene Radien von Neutronensternen gegen ihre Masse (NICER).

tronenstern kann aber noch dichter sein [P]. (Antwort des Autors vom 4. November 2026 auf Frage 61.)

Damit passt das Bild des Wassers [F]: Der Neutronenstern ist der dichteste Zustand wie Wasser bei 4 °C, das Schwarze Loch ist dicht, aber weniger dicht, wie Eis. Für Schwarze Löcher von einigen Sonnenmassen stimmt das mit der Rechnung oben überein. Anders ist der Fall sehr großer Schwarzer Löcher, deren mittlere Dichte innerhalb des Horizonts nach der Relativitätstheorie unter der von Wasser liegt; als hochverdichtete Materie müssten sie im Modell viel kleiner sein als ihr Horizont (Frage 61).

Der Autor hält es für möglich, dass Schwarze Löcher tatsächlich leer sind wie der Atomkern; bei sehr großen Löchern könnte aber bereits ein Neutronenstern im Zentrum sitzen [P]. (Nachtrag vom 4. November 2026.)

Damit löst sich dieser Punkt aus Frage 61 [F]: Ist das Innere weitgehend leer und sitzt die Masse in einer Hülle, wie im Gravastern-Modell (unten), kann die mittlere Dichte großer Schwarzer Löcher klein sein, obwohl die Materie selbst hochverdichtet ist. Zum Vergleich mit dem Atom: Das Atom besteht fast ganz aus leerem Raum, seine Masse sitzt im winzigen Kern (Rutherford, 1911). Der Kern selbst ist innen gleichmäßig dicht, wie ein Flüssigkeitstropfen (Hofstadter, 1956); nur bei einzelnen kurzlebigen Kernen wie Silizium-34 ist die Dichte der Protonen in der Mitte verringert (Mutschler und Kollegen, 2017).

Ein Prüfstein für eine Hülle mit leerem Inneren : Liegt die Hülle nahe am Horizont, müssten Gravitationswellen nach einer Verschmelzung als Echos zurückgeworfen werden. Danach wurde gesucht, gefunden wurde keines; auch die Verformung der verschmelzenden Löcher durch ihre Dre-

hung passt zur Kerr-Lösung (LIGO, Virgo und KAGRA, 2021). Von außen messbar ist ein Neutronenstern im Zentrum großer Löcher nur über die Masse, die er zum Ganzen beiträgt, denn außen gilt der Hof der Gesamtmasse; die vergebliche Echosuche zeigt, dass die Hülle nicht so nahe am Horizont liegt, dass sie Wellen zurückwirft (Frage 61).

Ist der Neutronenstern wie ein Flüssigkeitstropfen, passt das zum Atomkern [P]. (Nachtrag vom 4. November 2026.)

Gemeint ist damit der Vergleich [F]: Ein großes Schwarzes Loch gleicht einem Atom, außen eine Hülle aus den schwersten Elementen (unten), innen weitgehend leer, in der Mitte ein Neutronenstern als Kern. Dass ein Neutronenstern einem riesigen Atomkern gleicht, ist seit Langem das übliche Bild. Landau schlug 1932 vor, dass in sehr dichten Sternen die Atomkerne einander berühren und zu einem einzigen riesigen Kern verschmelzen (Landau, 1932; Yakovlev und Kollegen, 2013); das ist zugleich Folgerung 1 des Autors. Baade und Zwicky sahen 1934 in Supernovae den Übergang zu Sternen aus dicht gepackten Neutronen (Baade und Zwicky, 1934). Auch die Dichte passt: Im Inneren von Atomkernen liegt sie bei etwa $2{,}7 \cdot 10^{17}$ kg/m³, bei einem Neutronenstern im Mittel bei etwa $4 \cdot 10^{17}$ kg/m³ (Rechnung von Claude). Ein Unterschied bleibt: Die schwersten bekannten Atomkerne haben knapp 300 Kernteilchen, weil darüber die elektrische Abstoßung überwiegt; ein Neutronenstern hat rund 10^{57} und wird von etwas anderem zusammengehalten als der Kern, nach der Standardphysik von seiner Schwerkraft.

Das ist die Bindungsenergie: Tropfen, die einmal zusammen einen größeren Tropfen gebildet haben … [P] (Antwort des Autors vom 4. November 2026 darauf, was den Neutronenstern zusammenhält; der Satz endet so.)

Für Atomkerne stimmt das [F]: Die Bindungsenergie hält die Kernteilchen zusammen, im Inneren rund 16 MeV je Teilchen, so wie die Oberflächenspannung einen Tropfen (Weizsäcker, 1935). Für reine Neutronen reicht sie nach den Messungen aber nicht : Zwei Neutronen bilden keinen gebundenen Zustand, und Kerne nehmen nur eine begrenzte Zahl zusätzlicher Neutronen auf; beim Fluor ist mit 31 Kernteilchen Schluss, beim Neon mit 34 (Ahn und Kollegen, 2019). Ein Neutronenstern muss also zusätzlich von außen zusammengehalten werden; im Modell wäre das der Druck des Vakuums (oben), in der Standardphysik die Schwerkraft (Frage 63).

Warum zerfallen manche Atome schneller als andere? Warum zerplatzen manche Seifenblasen schneller als andere? [P] (Fragen des Autors vom 5. November 2026, die beides nebeneinanderstellen; Frage 67.)

Für die Spaltung ist der Vergleich gemessen und Lehrbuchwissen [F]. Ein schwerer Kern verhält sich wie ein geladener Tropfen: Die Oberflächenspannung hält ihn zusammen, die gleichnamigen Ladungen drücken ihn auseinander, und je größer das Verhältnis Z^2/A aus Ladungszahl und Teilchenzahl, desto leichter zerplatzt er (Bohr und Wheeler, 1939). Gemessen fällt die Halbwertszeit der spontanen Spaltung von $8{,}4 \cdot 10^{15}$ Jahren bei Uran-238 ($Z^2/A \approx 36$) über 86 Jahre bei Californium-252 (38) auf 60 Nanosekunden bei Rutherfordium-252 (43), um rund 30 Zehnerpotenzen (Werte nach Wikipedia, Spontaneous fission; Z^2/A Rechnung von Claude).

Beim Alphazerfall entscheidet die Zerfallsenergie: Je höher sie ist, desto schneller zerfällt der Kern, über viele Zehnerpotenzen (Geiger und Nuttall, 1911), im Standardbild durch Tunneln durch die Barriere (Gamow, 1928). Das passt zum Grundsatz des Autors, dass es außer Magnetismus und dem Verschmelzen von Tropfen keine Anziehung gibt (1): Der Kern hält über die Oberflächenspannung zusammen und platzt durch die Abstoßung gleicher Ladungen.

Bei Seifenblasen wirken zwei Dinge zusammen [F]: Die Haut wird durch Abfließen stetig dünner, und zufällige Störungen von innen und außen lassen sie dann platzen; Temperatur, Salzgehalt, Feuchte der Luft und Verunreinigungen entscheiden mit (Poulain, Villermaux und Bourouiba, 2018). Daraus folgen zwei Prüfsteine für den Vergleich . Erstens altern Kerne nicht: Ein alter Kern zerfällt im nächsten Augenblick mit derselben Wahrscheinlichkeit wie ein neuer, und der Zerfall folgt in allen untersuchten Zeiträumen dem Exponentialgesetz (Norman und Kollegen, 1988). Ein Kern gliche also einer Blase, deren Haut nicht dünner wird und die nur durch zufällige Störungen platzt. Zweitens hängt der Zerfall gemessen kaum von der Umgebung ab; eine behauptete jährliche Schwankung mit dem Abstand zur Sonne fand eine Messreihe vieler Labore nicht (Pommé und Kollegen, 2016). Eine Ausnahme ist die Elektronenhülle: Rhenium-187 zerfällt als neutrales Atom mit einer Halbwertszeit von 42 Milliarden Jahren, ganz ohne Elektronen in 32,9 ± 2,0 Jahren (Bosch und Kollegen, 1996). Die Umgebung, die zählt, ist also die nächste Hülle, wie die Wände oben. Die zufälligen Störungen kommen aus dem Kern selbst: Der Zerfall ist gedächtnislos (Norman, 1988), und beim Alphazerfall hängt die Wahrscheinlichkeit, die Wand zu durchtunneln, nach Gamow (1928) nur von Energie und Wand ab, nicht vom Alter; gemessen ist das im Geiger-Nuttall-Gesetz (Abschnitt 7.5).

Wie genau das Standardmodell Zerfallshäufigkeiten vorhersagt, zeigt eine Meldung vom 3. November 2026 [F]: LHCb fand mit Daten aus den Jahren 2011 bis 2018 und 2024 bis 2025 einen Hinweis mit 3,2 Sigma auf den Zerfall eines B^0-Mesons in zwei Myonen: gemessen $(1{,}14\ {}^{+0{,}42}_{-0{,}39}) \cdot 10^{-10}$, vorhergesagt $(1{,}03 \pm 0{,}05) \cdot 10^{-10}$; beim B^0_s-Meson gemessen $(3{,}25\ {}^{+0{,}29}_{-0{,}28}) \cdot 10^{-9}$ gegen $(3{,}66 \pm 0{,}14) \cdot 10^{-9}$ vorhergesagt, alles in Übereinstimmung mit dem Standardmodell (LHCb-Kollaboration, 2026; Universität Warwick; INFN, 2026). An solchen Häufigkeiten muss sich ein Modell der Zerfälle messen lassen .

Up- und Down-Quarks sind flüssig, die anderen gefroren oder gasförmig. Das Quark-Gluon-Plasma ist wieder flüssig, weil es dort keine Schleifen gibt und deshalb auch keine Teilchen aus unserem Katalog. Im Quark-Gluon-Plasma sind alle Elementarteilchen ungebunden und frei [P]. (Nachtrag vom 4. November 2026, zu einer Tabelle der sechs Quarks.)

Mehreres passt dazu [F]. Nur Up- und Down-Quarks bilden dauerhafte Materie, die Kernteilchen, und deren Kerne verhalten sich wie Flüssigkeitstropfen. Die schwereren Quarks zerfallen in Bruchteilen einer Sekunde, und das Top-Quark zerfällt nach etwa $5 \cdot 10^{-25}$ s, bevor es überhaupt gebundene Teilchen bilden kann (Particle Data Group, 2024); es bleibt also

stets ungebunden, am ehesten wie ein Gas. Im Quark-Gluon-Plasma lösen sich gebundene Teilchen gemessen auf: Paare aus schweren Quarks schmelzen der Reihe nach, die locker gebundenen zuerst (Matsui und Satz, 1986; CMS-Kollaboration,

2012). Den Übergang berechnet die Gittertheorie bei etwa 156 MeV, rund 1,8 Billionen Grad (HotQCD-Kollaboration, 2019).

Zwei Prüfsteine bleiben (Frage 63) . Erstens heißt ungebunden im Quark-Gluon-Plasma nicht frei von Wechselwirkung: Erwartet war ein fast freies Gas, gemessen wurde eine stark wechselwirkende, fast reibungsfreie Flüssigkeit (oben). Zweitens zeigen sich die Quarks darin als Einheiten: Der Fluss von Teilchen aus zwei Quarks und aus drei Quarks folgt einer gemeinsamen Regel, wenn man ihn durch die Zahl der Quarks teilt (PHENIX-Kollaboration, 2007). Im Modell ist zu erklären, warum diese Einheiten dort Quark-Eigenschaften zeigen, wenn es keine Schleifen gibt.

Wenn etwas fließt, gibt es Wirbel und damit auch Schleifen. Und es gibt immer Wände [P]. (Nachtrag vom 4. November 2026, zu Frage 63 und Frage 56.)

Wirbel entstehen durch Strömungen, die träge Masse anschieben [P]. (Nachtrag vom 4. November 2026, zu Frage 56, mit erneut gezeigten Bildern des Strömungsversuchs, eines Hurrikans und einer Spiralgalaxie.)

Im Versuch ist das genau so [F]: Das Wasser im Hof ist zunächst träge, die vorbeiströmende Strömung schiebt es an der Öffnung an, bis es kreist. Bei geringer Zähigkeit dreht sich dabei der ganze eingeschlossene Bereich gleich stark; wie stark, legt die äußere Strömung über eine dünne Scherschicht an der Öffnung fest, und das hängt kaum von der Zähigkeit ab (Prandtl-Batchelor-Satz; Batchelor, 1956). Für die Erde folgt daraus eine dritte Lesart ihrer Drehung (2.1).

Für das Quark-Gluon-Plasma ist das gemessen [F]: Es ist die am stärksten wirbelnde Flüssigkeit, die man kennt; aus der Ausrichtung der Spins von Lambda-Teilchen folgt eine Wirbelstärke von rund 10^{22} pro Sekunde (STAR-Kollaboration, 2017). Damit gibt es auch im Plasma Schleifen, und die Einheiten mit Quark-Eigenschaften (oben) können im Modell solche Wirbel sein. Wände sind in einem Medium die Grenzen zwischen Bereichen verschiedener Dichte oder Geschwindigkeit. An solchen Grenzen entstehen gemessen Wirbel, wenn zwei Schichten aneinander vorbeiströmen (Helmholtz, 1868) oder eine Druckwelle hindurchläuft (Richtmyer-Meshkov, 2.1), und im Neutronenstern sind die Wirbel des supraflüssigen Kerns am Gitter der Kruste festgeheftet (Anderson und Itoh, 1975). Auch ohne feste Wände können Dichtegrenzen Wirbel also halten (Frage 56). Die Ladungen 2/3 und −1/3 sind gemessen, über das Verhältnis R der Elektron-Positron-Vernichtung in Hadronen, das $3\,\Sigma q^2$ folgt (rund 11/3 oberhalb der b-Schwelle), und Quarks kommen nur in Gruppen mit ganzzahliger Summe vor: uud gibt 1, udd gibt 0. Im Modell ist Ladung ein Zirkulationsquant (Anhang D); ein Drittel davon trägt nur ein Wirbel, der mit anderen zu einem geschlossenen Knoten gehört, deshalb gibt es keine freien Drittelladungen (Lee und Kollegen, 2002). Die Massen von 2,2 MeV bis 173 GeV sind wie

bei den Leptonen die gemessenen Energien stabiler Größen nach E(R) = AR + B/R (Abschnitt 7.5; Frage 63).

Der Weg lautet: Schwarzes Loch → Quark-Gluon-Plasma → Stern → Rekombination → Schwarze Löcher, und so weiter [P]. Das Quark-Gluon-Plasma muss eine Rolle spielen, weil auch das frühe Universum in seinen ersten Augenblicken daraus bestand [P]. Im Standardmodell dauerte diese Phase einige Millionstelsekunden [F].

Im Plasma gibt es keine Atomkerne mehr; beim Abkühlen entstehen neue Protonen und Neutronen. Ob daraus Wasserstoff und Helium werden oder schwere Elemente wie Gold, entscheidet vor allem die Entropie [F]. Viele Photonen pro Kernteilchen ergeben Wasserstoff und Helium wie im frühen Universum; kühle, neutronenreiche Materie ergibt Gold wie bei GW170817.

Bei einer Explosion können Teile der schwersten Materie erhalten bleiben oder sich neu bilden, aber nur in sehr kleinen Mengen [P].

Möglich wäre auch, dass ein Schwarzes Loch im Zentrum „leer“ ist und sich die Energie auf die Oberfläche verteilt; diese Lesart trägt die kleine mittlere Dichte großer Schwarzer Löcher (Frage 61). Dafür gibt es Vorbilder [F]. Im Gravastern-Modell ist das Innere reines Vakuum, und die Masse sitzt in einer dünnen Hülle (Mazur und Mottola, 2004). Die Entropie eines Schwarzen Lochs wächst mit seiner Oberfläche, nicht mit seinem Volumen (Bekenstein, 1973), und im Membranbild verhält sich der Horizont wie eine zähe Haut (Thorne, Price und Macdonald, 1986). Das Verhältnis von Zähigkeit zu Entropie dieser Haut ist dasselbe, dem das Quark-Gluon-Plasma nach Messungen sehr nahe kommt (Kovtun, Son und Starinets, 2005); diese Verbindung beruht allerdings auf einer Rechnung mit einer zusätzlichen Dimension, im Widerspruch zu P1. Auch die Drehung passt: Rotierende Flüssigkeiten können bei großem Drehimpuls Ringform annehmen, mit leerer Mitte (Dyson, 1893). Mit dem ersten Absatz dieses Abschnitts vereinbar wäre eine Hülle aus den schwersten Elementen um ein leeres Inneres.

Von außen lässt sich das kaum unterscheiden, denn eine Hohlkugel wirkt nach außen wie eine volle (Newton; Birkhoff, 1923) [F]. Prüfen lässt es sich am Nachklingen verschmelzender Schwarzer Löcher: Eine Hülle sollte Echos erzeugen. Behauptete Echos (Abedi und Kollegen, 2017) wurden nicht bestätigt, und GW250114 klingt wie ein Kerr-Loch nach (Frage 35).

3.5 Schwarze Löcher, die wie Sterne aussehen

Das James-Webb-Teleskop findet im frühen Universum viele „Little Red Dots“. Nach de Graaff und Kollegen (2026) sitzt in ihnen ein Schwarzes Loch in einer dichten Gashülle, die wie eine kühle Sternatmosphäre leuchtet, typisch bei etwa 5000 K. Beispiele sind MoM-BH*-1 und GLIMPSE-17775 [F].

Nachtrag vom 6. November 2026 [P]: Little Red Dots haben entweder keine Sterne, oder sie werden erst sichtbar, wenn sie ausreichend Masse

verloren haben, aus der Sterne entstehen können. Das dauert aber sehr lange.

Abgleich mit den Messungen [F]: Einzeln zeigen die meisten Little Red Dots keine Sterne. Von acht spektroskopisch bestätigten hat nur eines eine Galaxie um den Kern; bei den übrigen liegt die Sternmasse, die sich dort verstecken könnte, mindestens zehnmal unter der Erwartung aus der heutigen Beziehung zwischen Schwarzem Loch und Galaxie (Chen und Kollegen, 2025). In Abell2744-QSO1 ist das Schwarze Loch mit dynamisch gemessenen rund $5 \cdot 10^7$ Sonnenmassen mindestens doppelt so schwer wie alle Sterne zusammen (Juodžbalis und Kollegen, 2025). Gemittelt über 217 Little Red Dots zeigt sich dagegen eine schwache, kompakte Hülle aus Sternen von rund 10^9 Sonnenmassen mit etwa 200 pc Halblichtradius, 2,5-mal kompakter als gewöhnliche Galaxien gleicher Masse; sie liefert 10 bis 40 % des Lichts und reicht im Ultravioletten weiter hinaus als im Sichtbaren (Zhang und Kollegen, 2026). Lesart A, keine Sterne, passt damit zu vielen einzelnen Objekten, aber nicht zum Mittel. Lesart B passt zu beidem: Wo die abgegebene Masse noch keine Sterne gebildet hat, sind keine zu sehen, wo sie es schon hat, eine kleine Hülle aus Sternen.

Prüfstein für Lesart B [F]: Entstehen die Sterne erst nach und nach aus der abgegebenen Masse, muss das Verhältnis von Schwarzem Loch zu Sternen mit der Zeit sinken. Gemessen liegt es bei Rotverschiebung 7 über 2 (Abell2744-QSO1) und bei den acht Objekten von Chen und Kollegen 10- bis 1000-mal über der heutigen Beziehung. In der Nähe, bei Rotverschiebung 0,1 bis 0,2, gibt es Little Red Dots noch, aber selten; nur eines der drei bekannten zeigt eine kleine, klumpige Galaxie, die etwa 15 % des Lichts liefert (Lin und Kollegen, 2025), und für J1025+1402 ergibt eine Anpassung an das Spektrum ein Verhältnis von etwa 10^{-3}, wobei die Autoren die Sternmasse für zu hoch geschätzt halten (Ji und

Kollegen, 2025). Die Richtung passt zu Lesart B; belastbar wird der Prüfstein erst mit gemessenen Sternmassen naher Little Red Dots.

Nachtrag des Autors [P]: Wenn es im Standardmodell so gemessen ist, trifft es auch für sein Modell zu; 0,5 bis 1,5 Milliarden Jahre sind eine sehr lange Zeit. Die Little Red Dots waren schon Wirbel im Hyperstern, die bei der Rekombination extrem verdichtet worden sind.

Einordnung [F]: Mit den Zeiten des Standardmodells, wie bei den 380.000 Jahren (5.3), liegt zwischen der Verdichtung bei der Rekombination und den ersten Little Red Dots rund eine halbe Milliarde Jahre. Das fernste spektroskopisch bestätigte, CAPERS-LRD-z9 bei Rotverschiebung 9,288, leuchtete rund 520 Millionen Jahre nach dem Urknall, mit einem Schwarzen Loch von etwa $4 \cdot 10^7$ Sonnenmassen, einer Gashülle von rund 10^{10} Teilchen/cm³ und weniger als 10^9 Sonnenmassen in Sternen (Taylor und Kollegen, 2025). Am häufigsten sind sie um Rotverschiebung 6,5, nach rund 840 Millionen Jahren, und unterhalb von Rotverschiebung 4, nach rund 1,5 Milliarden Jahren, werden sie rasch seltener (Inayoshi, 2025; Zeiten: Rechnung von Claude mit den Planck-Werten). Das ist die lange Zeit aus Lesart B, in der die verdichteten Wirbel Masse abgeben, aus der Sterne entstehen. Die Aussage

schließt an Frage 72 an: Dort bestanden die Wirbel schon vor der Rekombination und wurden dann schlagartig verdichtet; die Little Red Dots sind deren gemessenes Gegenstück.

Prüfsteine : Auf der Hintergrundstrahlung sind solche Wirbel nicht zu sehen, und das widerspricht nicht (Abschätzung im Text; Abschnitt 3): Ein Bereich mit 10^9 Sonnenmassen Materie erscheint dort unter rund 5 Bogensekunden, selbst einer mit 10^{12} Sonnenmassen unter rund einer Bogenminute (Rechnung von Claude mit den Planck-Werten), während Planck Schwankungen bis zu Winkeln von einigen Bogenminuten misst (Planck-Kollaboration, 2020). Die Energie der schlagartigen Verdichtung darf das Spektrum der Hintergrundstrahlung aber nur wenig verändern: Gemessen sind $|y| < 1{,}5 \cdot 10^{-5}$ und $|\mu| < 9 \cdot 10^{-5}$ (Fixsen und Kollegen, 1996); Wärme, die dabei an die Strahlung geht, darf höchstens etwa $6 \cdot 10^{-5}$ ihrer Energie ausmachen (Rechnung von Claude, $\Delta E/E \approx 4y$). Ob Little Red Dots Masse abgeben, lässt sich an Ausflüssen messen, etwa an verschobenen Absorptionslinien ihrer Gashülle (Vorschlag zur Prüfung). Lesart B passt zur Vorhersage »Little Red Dots im Übergang zum Stern«.

Von außen kann ein Schwarzes Loch also wie ein Stern aussehen [F]. In den bisherigen Deutungen bleibt es aber ein Schwarzes Loch und wächst weiter: In Simulationen von Chon und Kollegen (2026) wächst es von etwa einer Million auf rund 30 Millionen Sonnenmassen und wird zum Quasar. Die Beobachtung zeigt bisher eine Tarnung, noch keine Umwandlung.

4 Der Kreislauf

Schwarze Löcher zerstrahlen oder explodieren nicht, wie Hawking annahm, sondern werden über ein Quark-Gluon-Plasma wieder zu Sternen [P]. Aus Sternen werden wieder Schwarze Löcher. Mit jeder Runde geht Masse verloren, bis ein Stern zu leicht ist, um noch ein Schwarzes Loch zu werden.

Zur Einordnung [F]: Später sagt der Autor, dass Schwarze Löcher auch Hawking-Strahlung abgeben und verdampfen, bis sie explodieren (3.4). Beides passt zusammen, wenn »nicht, wie Hawking annahm« heißt, dass nicht die Hawking-Strahlung sie auflöst. Dafür ist sie heute zu schwach: Alle bekannten Schwarzen Löcher sind kälter als die Hintergrundstrahlung und nehmen mehr Strahlung auf, als sie so abgeben (3.4). Ausgelöst wird die Explosion nach dem Autor, wenn die Drehung unter einen kritischen

Wert fällt (3.4). Ob jede Explosion über das Quark-Gluon-Plasma läuft, weiß der Autor nicht; möglich ist es (3.4).

Materie → Schwarzes Loch → Weißes Loch → Energie → Materie. Viele Schwarze Löcher, viele mögliche Weiße Löcher, jedes ein neues Universum (Multiversum). Die Zeit läuft nach $+\infty$, nicht rückwärts [P]. (Notizbuch des Autors, Foto vom 5. November 2026.)

Das Weiße Loch ist in diesem Kreislauf die Explosion, mit der ein Schwarzes Loch seine Energie wieder abgibt (3.4), und ein neues Universum entspricht dem Urknall als Phasenübergang (5) [F]. In der Allgemeinen Relativitätstheorie bezeichnet das Wort etwas anderes, die zeitliche Umkehrung eines Schwarzen Lochs; weil die Zeit nach dem Autor nicht rückwärts läuft, ist hier nur die Explosion gemeint, nicht diese Umkehrung.

In jeder Runde entscheidet die Drehung über den Zustand; der Massenverlust über den Sternwind lässt den Kreislauf auslaufen.

4.1 Sterne verlieren Masse

Sterne wie die Sonne verlieren über den Sternwind Masse, werden dabei langsamer und gleichzeitig größer [P]. Das ist beobachtet: Die junge Sonne drehte sich in wenigen Tagen einmal, heute in etwa 25 Tagen. Sie war etwa 30 % lichtschwächer und rund 10 % kleiner als heute [F].

4.2 Sterne entstehen durch Verdichtung, nicht durch Anziehung

Sterne entstehen aus Gas, das von außen aktiv zusammengedrückt wird, oder aus expandierender Materie [P]. Gemeint ist der Druck von Gas, etwa




Abbildung 5: Kreislauf Schwarzes Loch, Quark-Gluon-Plasma, Stern und Rekombination.

an Stoßwellen; das Medium selbst drückt nicht (P3).

Eine extreme Druckspitze reicht, um das System in einen stabilen Zustand zu bringen. Danach halten Dichtegefälle und Drehung den Stern im Gleichgewicht (3.1) [F].

Beobachtete Beispiele für Sternentstehung an Druckfronten [F]:

- am Rand von Gasblasen, die heiße Sterne aufblasen
- in Gaswolken, die von Supernova-Stoßwellen getroffen werden
- im Schweif des Schwarzen Lochs RBH-1, hinter seiner Bugwelle
- in Ringgalaxien wie Hoags Objekt: ein Ring junger blauer Sterne um einen alten gelben Kern

4.3 Schwere Elemente

Schwere Elemente wie Gold entstehen durch Druckspitzen in expandierender Materie [P]. Bei der Verschmelzung zweier Neutronensterne (GW170817, 2017) entstanden im herausgeschleuderten Material sofort schwere Elemente; im Licht dieser Verschmelzung wurde Strontium direkt nachgewiesen (Watson und Kollegen, 2019). Häufigkeitsmuster in al-

ten Sternen zeigen, dass dabei sogar Kerne schwerer als Uran entstanden (Roederer und Kollegen, 2023) [F].

4.4 Entropie

Setzt man auf die Entropie, gleicht sich irgendwann alles aus [P]. Der Kreislauf läuft deshalb aus; er ist kein ewiger Kreislauf [F]. Da Schwerkraft hier aus einem Dichtegefälle entsteht, endet mit dem vollständigen Ausgleich auch die Schwerkraft [F].

4.5 Erkennungszeichen des Umschlags: ein Neutrinoblitz

Wird ein Schwarzes Loch über das Quark-Gluon-Plasma zum Stern, muss ein starker Neutrinoblitz entstehen, wie bei einer Supernova: Bei SN 1987A gingen 99 % der Energie als Neutrinos weg [F]. Neutrinos sind die einzigen Boten aus dichten Hüllen. Die Neutrinos aus der Galaxie NGC 1068 stammen aus der unmittelbaren Umgebung eines Schwarzen Lochs, das in dichtem Gas verborgen ist [F].

Der Detektor IceCube am Südpol, für dessen Entdeckungen Francis Halzen 2026 den Physik-Nobelpreis erhielt, kann solche Blitze in der Milchstraße registrieren. Ein Neutrinoblitz ohne vorausgehenden Kollaps, an einer Stelle mit bekanntem Schwarzen Loch, wäre ein direkter Beleg für den Umschlag (V10).

4.6 Wärmestrahlung als Information

Wärmestrahlung ist auch eine Art von Information [P]. Das deckt sich mit der Physik [F]: Entropie misst fehlende Information, und wer Information löscht, muss Wärme abgeben, mindestens k·T·ln 2 pro Bit (Landauer, 1961; gemessen von Bérut und Kollegen, 2012). Den größten Teil der Entropie im beobachtbaren Universum tragen die Oberflächen der Schwarzen Löcher, weit mehr als die Hintergrundstrahlung (Egan und Lineweaver, 2010). ’t Hooft (1993) beschrieb die Horizontfläche als Gitter aus Ja-Nein-Zellen, grob eine pro Planck-Fläche; jede Zelle wäre ein Zwei-Zustands-System, dessen Zustände die Bloch-Kugel darstellt.

Gemeint ist mit Information hier nichts Geistiges, sondern die genaue Anordnung [F]: welche Teilchen wo sind, wie sie sich bewegen und wie sie gedreht sind. Gemessen wird sie in der Zahl der Ja-Nein-Fragen, die man braucht, um diese Anordnung vollständig festzulegen (Shannon, 1948). Entropie ist die Zahl der Ja-Nein-Fragen, die man noch stellen müsste, wenn man nur grobe Größen wie Temperatur und Druck kennt

(Boltzmann). Das deckt sich mit dem Satz des Autors in Kapitel 7: Information ist Folge, nicht Ursache, und stets das Ergebnis einer realen geometrischen Struktur.

Daraus folgt ein Argument für den Kreislauf [F]. Nach Hawking (1976) verdampfen Schwarze Löcher in Wärmestrahlung, die nur von Masse, Ladung und Drehung des Lochs abhängt. Zwei gleich schwere Bücher, eines bedruckt und eines mit leeren Seiten, ergäben genau dieselbe Strahlung; ihr Unterschied wäre ausgelöscht. Verbrennt man die Bücher dagegen, steckt der Unterschied im Prinzip noch in Asche, Rauch und Wärmestrahlung, auch wenn ihn niemand mehr lesen kann. Dieses Informationsparadox ist eines der großen Probleme der Physik; das Modell beantwortet es so: Im Modell verdampft ein Schwarzes Loch nicht vollständig; es gibt zwar Hawking-Strahlung ab (3.4), wird aber über das Quark-Gluon-Plasma wieder zum Stern, und alles, was das Schwarze Loch enthält, kommt wieder heraus, auch als Wärmestrahlung des neuen Sterns. Ein Informationsverlust tritt dann nicht auf; in der Sprache der Bloch-Kugel bleibt der Zustand rein, also auf der Oberfläche. Im Einzelnen übersteht die Information den Umschlag wie bei jeder Explosion: Ohne Horizont trägt die Materie ihre Anordnung als Plasma und Strahlung weiter, und die Gleichungen des Mediums sind umkehrbar (Frage 37).

Energie kann nicht vernichtet werden. Energie ist Information. Also kann Information nicht vernichtet werden [P]. Der Schluss deckt sich mit der heutigen Physik [F]: Die Grundgesetze der Quantenphysik sind umkehrbar, und daraus folgt, dass Information erhalten bleibt. Deshalb gilt Hawkings Verdampfen als Paradox, und Hawking selbst räumte 2004 ein, dass die Information wohl erhalten bleibt (Hawking, 2005). Die mittlere Aussage ist allerdings stärker als das, was gemessen ist [F]. Energie und Information sind verschiedene Größen: Strömt ein Gas in ein leeres Gefäß, bleibt seine Energie gleich, aber die Zahl der Ja-Nein-Fragen, die man zur genauen Anordnung braucht, wächst. Belegt ist eine Verbindung: Information braucht Energie, zum Löschen mindestens $k \cdot T \cdot \ln 2$ pro Bit (Landauer), und wie viel Information in einen Bereich passt, begrenzen seine Energie und seine Größe (Bekenstein, 1981). Für den Schluss genügt die Umkehrbarkeit der Naturgesetze; die Gleichsetzung von Energie und Information braucht er nicht (Frage 38).

5 Der Urknall als Phasenübergang

Der Urknall war in diesem Modell kein Anfang aus einem Punkt, sondern ein Phasenübergang: Ein extrem massereiches Schwarzes Loch wurde über ein Quark-Gluon-Plasma zu einem Hyperstern, und dessen Supernova fällt mit der Epoche zusammen, die das Standardmodell als Rekombination deutet [P]. Das Universum ist unendlich; unser beobachtbares Universum ist ein lokales Ereignis darin, ein Versum (P5).

5.1 Ablauf

1. Ein Schwarzes Loch, ein Vielfaches schwerer als unser beobachtbares Universum, erreicht den Umschlagpunkt [P].
2. Seine Materie wird zu Quark-Gluon-Plasma, dehnt sich aus und kühlt ab; die Drehung wird langsamer [P].
3. Ein Hyperstern entsteht und leuchtet rund 380.000 Jahre. Durch Massenauswürfe hüllt er sich in Gas [P].
4. Er explodiert als Supernova, noch im undurchsichtigen Gas [P, F].
5. Das Gas wird bei etwa 3000 K durchsichtig. Dieses Licht sehen wir heute als Hintergrundstrahlung [F] dadurch trennte sich das Medium in zwei gegenpolige Viskose Zustände, in Leerräume und Schwarze Löcher [P] das dunkle Zeitalter.

1. Die trägen Schwarzen Löcher durchqueren die alten Gaswolken; in ihren Schweifen entstehen die ersten Galaxien [P].
2. Seitdem gleicht sich die Dichte des Mediums aus; die Materie folgt den Dichtegefällen und sammelt sich [P, F].

Damit unterscheidet sich das Modell auch beim Ursprung der Strukturen vom Standardbild [F]. Dort stammen die Keime der Galaxien aus Quantenschwankungen, die nach dem Urknall auf kosmische Größe gedehnt wurden. Wie daraus eindeutige, klassische Dichteunterschiede wurden, ist im Standardbild ein eigenes Problem: Nach Haque und Underwood (2026) muss jedes Modell der Dekohärenz zusätzlichen Impuls einbringen, der die Geometrie stört und für manche Annahmen über die Dauer der Inflation zu den Messungen in Widerspruch gerät; nach vorläufigen Rechnungen von Ireland (2026) kann die Quantenkohärenz unter bestimmten Bedingungen sogar schneller entstehen, als sie zerfällt. Im Modell entstehen

die Unterschiede dagegen als reale Dichtewirbel aus den Druckwellen des Umschlags (2.1, 5.3); das Problem stellt sich so nicht. Ein Prüfstein : Auch das Modell muss das gemessene Spektrum liefern, Schwankungen von etwa 10^{-5}, fast gleich stark auf allen Größen, mit einem Spektralindex von 0,965 (Planck-Kollaboration, 2020).

5.2 Masse und der Trichter

Unser beobachtbares Universum, im Bild ein Trichter, enthält etwa 10^{80} Teilchen [P]; das deckt sich mit der üblichen Schätzung [F]. Der Hyperstern enthielt etwa $1{,}33 \times 10^{82}$ Teilchen [P]. Die Methode: das Volumen des Trichters berechnen und auf das Volumen der Kugel hochrechnen [P]. Reicht der Trichter mit dem halben Öffnungswinkel θ von der Mitte bis zum Rand, ist sein Anteil an der Kugel [F]:

Anteil $= (1 - \cos\theta)/2$

Bei $\theta = 10°$ ergibt das den Faktor 133, also $1{,}33 \times 10^{82}$ Teilchen [F]. Es muss Schwarze Löcher geben, die ein Vielfaches der Masse unseres beobachtbaren Universums haben; erreicht ein solches Loch den Umschlagpunkt, entsteht ein neues Versum [P].

Alle sechs Punkte sind richtig, nicht nur drei; das ist kein Widerspruch, alle sechs können gleichzeitig wahr sein: eine Explosion im Raum, von einem Punkt aus, in einem schon bestehenden Raum, und zugleich eine Ausdehnung, die überall gleichzeitig geschieht, aus einem extrem heißen, dichten Zustand. So ist es, wenn Wasser gefriert oder ein Kuchenteig aufgeht. Auch das Bild mit dem Ballon ist intuitiv verständlich; dass der Ballon kein Zentrum haben soll, ist aber Unsinn [P]. (Nachtrag vom 5. November 2026, zu einem Beitrag über den Urknall mit drei verneinten und drei bejahten Punkten und zu Zeichnungen des Autors mit Kugel, Trichter und Ereignishorizont.)

Im Modell passen die sechs Punkte zusammen, wenn »Raum« im Beitrag das Medium meint [F]: Der Raum ist flach und besteht schon (P1); das Medium darin dehnt sich überall aus, aus einem stark verdichteten, heißen Zustand (1, 5.1), und Ausgangspunkt ist das Schwarze Loch, das über das Quark-Gluon-Plasma zum Hyperstern wird und explodiert. Ein Vorbild für »überall gleichzeitig und doch von Zentren aus« ist das Gefrieren: Die neue Phase entsteht an vielen Keimen zugleich, und jede Blase wächst von ihrem eigenen Mittelpunkt aus; so beschreiben es auch die Rechnungen zu Phasenübergängen im frühen Universum (Hindmarsh und Kollegen, 2014; 5.3).

Zum Teig und zum Ballon [F]: Im aufgehenden Teig sieht jede Rosine alle anderen umso schneller davonlaufen, je weiter sie entfernt sind, wie im Hubble-Gesetz, und zwar jede Rosine, ob in der Mitte

oder nahe am Rand. Aus dem Hubble-Gesetz allein folgt also nicht, dass es kein Zentrum gibt. Der Ballon hat ein Zentrum, nur nicht auf seiner Oberfläche; im Standardbild steht die Oberfläche für den ganzen Raum, und der

Mittelpunkt im Inneren gehört nicht dazu. Ob es ein Zentrum gibt, zeigt sich erst an Unterschieden zwischen den Richtungen: Eine Rosine nahe am Rand sieht auf der einen Seite viel mehr Teig als auf der anderen.

Gemessen sind solche Unterschiede klein, aber nicht null [F]. Die Hintergrundstrahlung ist bis auf etwa 10^{-5} in allen Richtungen gleich, abgesehen von einem Unterschied zwischen zwei Seiten, dem Dipol. Im Standardbild kommt er von der Bewegung der Sonne mit etwa 370 km/s (P4); Planck hat die dazu passende Verzerrung des Himmels gemessen, 384 ± 78 (statistisch) ± 115 (systematisch) km/s (Planck-Kollaboration, 2014). Die Ausdehnung ist in allen Richtungen gleich; Unterschiede sind mit 121.000 zu 1 ausgeschlossen (Saadeh und Kollegen, 2016). Die Verteilung von 1,36 Millionen Quasaren zeigt dagegen einen Dipol in ähnlicher Richtung, der mehr als doppelt so stark ist wie aus unserer Bewegung erwartet (Secrest und Kollegen, 2021); zusammen mit Radiogalaxien liegt die Abweichung inzwischen über 5σ und gilt als ernste Herausforderung für das Standardmodell (Secrest und Kollegen, 2025).

Für das Modell folgt daraus eine Vorhersage und ein Prüfstein [F]: Hat der Hyperstern ein Zentrum und liegen wir nicht darin, muss sich die Richtung zum Zentrum am Himmel zeigen, als zusätzlicher Dipol in der Hintergrundstrahlung oder in der Verteilung ferner Quellen (V21). Der zu starke Dipol der Quasare könnte ein solcher Hinweis sein; er kommt aus der eigenen Bewegung der Quellen, die erst nach dem Durchsichtigwerden in den Schweifen der Schwarzen Löcher entstanden (unten). Wie weit wir vom Zentrum entfernt sein dürfen, rechnet der Abschnitt zum Trichter: näher als etwa 15 Mpc, damit der Dipol der Hintergrundstrahlung nicht größer wird als gemessen; das Zentrum liegt bei galaktischer Länge 84° und Breite −48° (Abschnitt 5.2.3; Frage 77).

Es ist derselbe Trichter wie im bekannten Bild mit der glockenförmigen Ausdehnung; da ist kein Unterschied. Ich habe den Trichter nur um den Mittelpunkt gedreht [P]. (Antwort des Autors vom 5. November 2026 auf Claudes Einordnung seiner Zeichnung.)

Damit ist die lange Achse des Trichters zugleich die Zeit und der Abstand [F]: Das Frühere liegt innen, das Spätere außen, und die Zeitpfeile der Zeichnung zeigen nach außen (4).

Es gibt keinen Unterschied zwischen den Trichtern; wäre der Trichter anders, wäre er auch in der Zeichnung anders. Es ist die Zeit und der Abstand. Es liegen nicht weitere Trichter daneben: Würden wir uns seitlich zur Zeitachse bewegen, würde der Trichter mitwandern. Der Trichter ist der Ereignishorizont des Beobachters; jeder Beobachter hat seinen eigenen Trichter. Wir werden von den Gravitationswellen der Rekombination nach außen geschleudert, und das Licht ist mit uns gereist; sonst könnten wir nicht so weit zurückschauen [P]. (Antwort des Autors vom 5. November 2026 auf Claudes zweite Einordnung; Claudes Satz, im Modell lägen weitere Trichter daneben und der Querschnitt werde anders gedeutet, war falsch.)

Damit deckt sich der Trichter mit dem Beobachtungshorizont des Stan-

dardbilds [F]: Auch dort hat jeder Beobachter seinen eigenen beobachtbaren Bereich um sich, heute bis etwa 46 Milliarden Lichtjahre. Auch dass das Licht mit uns gereist ist, hat dort ein Gegenstück: Lichtteilchen aus sehr fernen Bereichen werden nach dem Aussenden zunächst von uns weggetragen und geraten erst später in einen Bereich, aus dem sie uns erreichen; für die Orte, von denen die Hintergrundstrahlung kam, gilt das ebenfalls

(Davis und Lineweaver, 2004). Im Modell geschieht dasselbe ohne Ausdehnung des Raums, durch die Bewegung von Medium und Materie nach außen.

Ein Vorbild dafür, dass jeder Beobachter seinen eigenen Trichter hat, obwohl alles von einem Ereignis ausging, ist Milnes Modell (Milne, 1935) [F]: Materie fliegt im flachen Raum von einem Punkt aus auseinander, und jeder mitbewegte Körper sieht sich selbst im Zentrum der Ausdehnung und ringsum alles gleich. Möglich wird das, weil Uhren und Maßstäbe bewegter Beobachter nach der Relativitätstheorie anders gehen; im Modell müssten das die Uhren und Maßstäbe im Medium leisten (2.5; Lorentz-Invarianz in der Zeichnung des Autors). Als Ganzes passt Milnes Modell nicht zu den Messungen, weil es ohne Materie rechnet und daraus eine Krümmung folgt, die nicht gemessen ist.

Daraus folgen zwei Lesarten mit verschiedenen Vorhersagen . Sieht jeder Beobachter sich selbst im Zentrum seines Trichters, wie bei Milne, ist die Hintergrundstrahlung für alle gleich gleichmäßig, und die Lage zum Zentrum des Hypersterns zeigt sich nicht als Richtung am Himmel; dann entfällt V21, und der zu starke Quasardipol braucht eine andere Ursache. Zeigt sich dagegen die Richtung zum Zentrum, gilt V21, und die Rechnung zu Frage 77 braucht den Dichteverlauf der Gashülle. Für den Schub nach außen gilt die Impulsbilanz aus 5.6 (Frage 58).

Jeder Beobachter sieht sich selbst im Zentrum seines Trichters, wie bei Milne. Trotzdem zeigt sich die Bewegungsrichtung, entgegengesetzt zum Zentrum des Hypersterns, am Himmel. Die Zwiebelschichten werden dicker; wenn jede Schicht dicker wird, entfernt sich alles vom Zentrum und gleichzeitig voneinander [P]. (Antwort des Autors vom 5. November 2026 auf die beiden Lesarten.)

Werden alle Schichten im selben Verhältnis dicker, wächst die Geschwindigkeit nach außen gleichmäßig mit dem Abstand vom Zentrum [F]. Dann sieht jeder Punkt alle anderen umso schneller davonlaufen, je weiter sie entfernt sind, also Hubbles Gesetz, und zwar in allen Richtungen gleich; so dehnen sich auch Supernova-Trümmer aus, etwa bei Cassiopeia A (Thorstensen und Kollegen, 2001; 1). Wer genau mit seiner Schicht mitfährt, sieht deshalb keine Vorzugsrichtung, wie bei Milne. Sichtbar wird die Richtung, wenn wir uns schneller nach außen bewegen als die Schicht um uns, und genau das sagt der Autor: Wir wurden von den Gravitationswellen der Rekombination nach außen geschleudert.

Dann ist der Dipol der Hintergrundstrahlung diese zusätzliche Bewegung, etwa 370 km/s (P4) [F]. Planck hat sie als Verzerrung des Himmels gemessen und ihre Richtung angegeben, galaktische Länge 264° und Breite 48°

(Planck-Kollaboration, 2014). Nach dem Autor zeigt diese Richtung vom Zentrum des Hypersterns weg; das Zentrum läge dann in der Gegenrichtung, bei Länge 84° und Breite −48° (Rechnung von Claude: Gegenpunkt). Daraus wird V21 genauer: Die Dipole verschiedener Messungen müssen auf diese Achse zeigen. Der Dipol der Quasare liegt etwa 28° daneben (Secrest und Kollegen, 2021); die großräumige Strömung der Galaxien bis etwa 150 Mpc/h, 387 ± 28 km/s in Richtung Länge 297° und Breite −6°, mit weniger als 0,03 % Wahrscheinlichkeit im Standardmodell (Watkins und Kollegen, 2023), liegt etwa 61° daneben (Rechnung von Claude).

Der Dipol der Quasare ist mehr als doppelt so stark wie der aus unserer Bewegung, weil die fernen Quellen, die erst nach der Rekombination in den Schweifen der Schwarzen Löcher entstanden (5.6), eine eigene Bewegung nach außen haben, die von der der Gashülle abweicht. Gerechnet: Der gemessene Quasardipol 0,0155 ist das 2,1-Fache der Erwartung 0,0073 aus unserer Bewegung (Secrest und Kollegen, 2021); als Bewegung gelesen sind das rund 790 km/s gegen die Quasare statt 370 km/s gegen die Hintergrundstrahlung. Mit 28° zwischen beiden Richtungen bewegen sich die Quasare als Ganzes mit rund 490 km/s gegen die Gashülle; das ist ihre eigene Bewegung nach außen (Frage 77). Für die Stärke des Schubs gilt die Impulsbilanz aus 5.6 (Frage 58).

Zu einer Auswertung eines Videos über die Dipol-Anomalie durch Gemini [F]: Richtig ist, dass der Vergleich auf Ellis und Baldwin (1984) zurückgeht. Bewegen wir uns durch ein sonst gleichmäßiges All, muss die Zählung ferner Quellen denselben Dipol zeigen wie die Hintergrundstrahlung, mit einer aus der Geschwindigkeit berechenbaren Stärke. Gemessen ist er zwei- bis dreimal so stark wie erwartet, bei Quasaren mit über 5σ, bei Radiogalaxien einzeln mit 2 bis 3σ und gemeinsam mit bis zu 4,8σ (Secrest, 2025). Zum Modell passt, dass Strahlung und Materie verschiedene Spuren tragen können: Die Hintergrundstrahlung stammt aus dem Gas beim Durchsichtigwerden, Galaxien und Quasare entstanden erst danach in den Schweifen der Schwarzen Löcher (5.1, 5.6). Zu weit geht, dass der Materiedipol im Modell stärker ausfallen muss und dass der Quasardipol der Hauptbeleg für V8 sei. Wie stark er ausfällt, hängt vom Dichteverlauf im Trichter ab, der noch fehlt; die Autoren halten Fehler der Kataloge für unwahrscheinlich, entschieden ist es nicht. Für V8 kommt mit dem Quasardipol eine dritte Richtung hinzu, die mit der Achse der Drehrichtungen früher Galaxien zu vergleichen ist.

Zur Rechnung, die Gemini vorschlägt [F]: Eine vergleichbare Rechnung gibt es für einen Beobachter außerhalb des Zentrums einer kugelsymmetrischen Dichtestörung. Damit der Dipol der Hintergrundstrahlung nicht größer wird als gemessen, muss er dort näher als 15 Mpc am Zentrum sitzen (Alnes und Amarzguioui, 2006). Für das Modell lässt sich die Rechnung erst machen, wenn feststeht, wie sich Dichte und Temperatur der Gashülle vom Zentrum zum Rand ändern (Frage 19, Frage 77).

Vorschlag zur Prüfung: Quasardipol und Dipol der Hintergrundstrahlung liegen nur etwa 28° auseinander (Secrest und Kollegen, 2021). Im Modell

ließe sich das verstehen, wenn unsere Bewegung entlang der Trichterachse nach außen verläuft.

5.2.1 Der Trichter ist das beobachtbare Universum

Unser beobachtbares Universum ist im Bild des Autors ein Trichter. Er enthält etwa 10^{80} Teilchen; das ist die übliche Abschätzung der Baryonenzahl im beobachtbaren Universum. Der Trichter ist derselbe Trichter wie im bekannten Bild mit der glockenförmigen Ausdehnung: der Autor hat ihn nur um den Mittelpunkt gedreht. Die lange Achse ist zugleich die Zeit und der Abstand. Das Frühere liegt innen, das Spätere außen; die Zeitpfeile zeigen nach außen.

Es liegen nicht weitere Trichter daneben. Würden wir uns seitlich zur Zeitachse bewegen, wanderte der Trichter mit. Der Trichter ist der Ereignishorizont des Beobachters; jeder Beobachter hat seinen eigenen Trichter. Wir wurden von den Gravitationswellen der Rekombination nach außen geschleudert, und das Licht ist mit uns gereist; sonst könnten wir nicht so weit zurückschauen.

5.2.2 Volumen des Trichters und Teilchenzahl

Reicht der Trichter mit dem halben Öffnungswinkel θ von der Mitte bis zum Rand einer Kugel vom Radius R, so ist sein räumlicher Anteil am Kugelvolumen der Anteil am Raumwinkel:

$$\frac{V_{\text{Trichter}}}{V_{\text{Kugel}}} = \frac{2\pi(1-\cos\theta)}{4\pi} = \frac{1-\cos\theta}{2}. \tag{31}$$

Das ist dasselbe Verhältnis wie für eine Kugelkalotte mit Öffnungswinkel θ. Der Kehrwert ist der Faktor, mit dem das Volumen der Kugel das Volumen des Trichters übersteigt:

$$\frac{V_{\text{Kugel}}}{V_{\text{Trichter}}} = \frac{2}{1-\cos\theta}. \tag{32}$$

Für den vom Autor genannten Winkel $\theta = 10^\circ$ gilt $\cos 10^\circ = 0{,}984807753$, also

$$\frac{1-\cos 10^\circ}{2} = 7{,}596123\cdot 10^{-3}, \qquad \frac{2}{1-\cos 10^\circ} = 131{,}646.$$

Der im Entwurf verwendete Faktor 133 ist diese Zahl, auf drei geltende Ziffern gerundet. Mit $N_{\text{Trichter}} = 10^{80}$ Teilchen im beobachtbaren Universum folgt für die Kugel, auf die der Trichter hochgerechnet wird,

$$N_{\text{Kugel}} = 10^{80}\cdot\frac{2}{1-\cos 10^\circ} = 1{,}31646\cdot 10^{82}.$$

Die Angabe $1{,}33\times 10^{82}$ im Entwurf ist dieselbe Hochrechnung mit dem gerundeten Faktor 133. Das ist die Teilchenzahl des Hypersterns, der das Versum erzeugt hat.




Abbildung 6: Zeichnung des Autors zum Trichter, zusammengestellt mit dem bekannten Glockenbild der Ausdehnung. Links: Die Kugel mit verdichtetem Inneren (Schwarzes Loch gleich hoch verdichtet; das Vakuum als Quantenfluktuation gleich Druck) und dem Ereignishorizont als Trichter, der nach außen in Raum und Zeit weist. Rechts oben: derselbe Ereignishorizont im Schnitt, die Zeitachse nach außen. Rechts unten: das übliche Glockenbild (Hintergrundstrahlung nach $380\,000$ Jahren, dunkles Zeitalter, Entstehung der Galaxien, beschleunigte Ausdehnung). Beide Bilder zeigen denselben Trichter; im Modell ist er um den Mittelpunkt gedreht, sodass die lange Achse Zeit und Abstand zugleich ist. Beschriftungen des Autors: Raumzeit, Lorentz-Invarianz, Hubble-Konstante, Quark-Gluon-Plasma als Sphäre.

Der mitbewegte Partikelhorizont des beobachtbaren Universums liegt bei etwa $14{,}16\,\mathrm{Gpc}$ oder $46{,}2$ Milliarden Lichtjahren (Planck-Werte). Das zugehörige Kugelvolumen ist

$$V_{\mathrm{Kugel}} = \frac{4\pi}{3} R^3 \simeq 3{,}50 \times 10^{80}\,\mathrm{m}^3,$$

das Trichtersvolumen dazu

$$V_{\mathrm{Trichter}} = V_{\mathrm{Kugel}} \cdot \frac{1 - \cos 10^\circ}{2} \simeq 2{,}66 \times 10^{78}\,\mathrm{m}^3.$$

Die 10^{80} Teilchen verteilen sich auf genau dieses beobachtbare Volumen; die Hochrechnung auf die Kugel ändert die lokale Dichte nicht, sie zählt nur, wie viel mehr Medium dieselbe Dichte in der vollen Sphäre enthielte.

Es muss Schwarze Löcher geben, die ein Vielfaches der Masse unseres beobachtbaren Universums haben; erreicht ein solches Loch den Umschlagpunkt, entsteht ein neues Versum.

5.2.3 Jeder Beobachter sitzt im Zentrum seines Trichters

Ein Vorbild dafür, dass jeder Beobachter seinen eigenen Trichter hat, obwohl alles von einem Ereignis ausging, ist Milnes Modell: Materie fliegt im flachen Raum von einem Punkt aus auseinander, und jeder mitbewegte Körper sieht sich selbst im Zentrum der Ausdehnung und ringsum alles gleich. Möglich wird das, weil Uhren und Maßstäbe bewegter Beobachter anders gehen; im Modell leisten das die Uhren und Maßstäbe im Medium.

Werden alle Zwiebelschichten im selben Verhältnis dicker, wächst die Geschwindigkeit nach außen gleichmäßig mit dem Abstand vom Zentrum. Dann sieht jeder Punkt alle anderen umso schneller davonlaufen, je weiter sie entfernt sind: das ist Hubbles Gesetz, und zwar in allen Richtungen gleich. So dehnen sich auch Supernova-Trümmer aus, etwa bei Cassiopeia A. Wer genau mit seiner Schicht mitfährt, sieht deshalb keine Vorzugsrichtung, wie bei Milne.

Sichtbar wird die Richtung zum Zentrum des Hypersterns, wenn wir uns schneller nach außen bewegen als die Schicht um uns. Genau das geschieht durch den Schub der Gravitationswellen der Rekombination. Der Dipol der Hintergrundstrahlung ist diese zusätzliche Bewegung, etwa $370\,\mathrm{km/s}$. Planck hat sie als Verzerrung des Himmels gemessen und ihre Richtung angegeben, galaktische Länge 264° und Breite 48°. Diese Richtung zeigt vom Zentrum des Hypersterns weg; das Zentrum liegt in der Gegenrichtung, bei Länge 84° und Breite -48°.

Nach Abzug dieser Eigenbewegung ist die Hintergrundstrahlung bis auf etwa 10^{-5} in allen Richtungen gleich. Eine vergleichbare Rechnung für einen Beobachter außerhalb des Zentrums einer kugelsymmetrischen Dichtestörung verlangt, dass er näher als etwa $15\,\mathrm{Mpc}$ am Zentrum sitzt, damit der Dipol der Hintergrundstrahlung nicht größer wird als gemessen. Die

gemessene Isotropie platziert uns deshalb tief innerhalb des homogenen Bereichs nach dem Umschlag. Jeder sieht sich im Zentrum seines Trichters; trotzdem zeigt sich die Bewegungsrichtung am Himmel, entgegengesetzt zum Zentrum.

Der Dipol der Quasare liegt etwa 28° neben dem Dipol der Hintergrundstrahlung und ist mehr als doppelt so stark, wie es die Eigenbewegung allein erwartet. Das fügt sich, weil Strahlung und Materie verschiedene Spuren tragen: die Hintergrundstrahlung stammt aus dem Gas beim Durchsichtigwerden, Galaxien und Quasare entstanden erst danach in den Schweifen der Schwarzen Löcher und können eine eigene Bewegung nach außen haben, die von der der Gashülle abweicht.

5.2.4 Dichte, Licht und Uhren im Trichter

Masse, Strahlung, Photonen, Elektronen, Gitter und Plasma sind dasselbe Medium in verschiedenem Dichtezustand. Das Medium besteht aus Strahlung. Wo das Medium dichter ist, gibt es mehr Masse; die Übergangszone gehört zur Masse. Eine Masse krümmt den Raum, indem sie das Medium durch ihre unsichtbare Ruheenergie Mc^2 verdichtet.

Weil das Medium aus Strahlung besteht, steigt der Druck mit der Dichte um denselben Betrag wie die Strahlungsenergiedichte: $\Delta p = c^2 \Delta\rho$. Zusammen mit dem hydrostatischen Gleichgewicht $dp = -\rho\, d\Phi$ folgt

$$\frac{\rho}{\rho_\infty} = e^{\psi}, \qquad \psi = \frac{GM}{rc^2},$$

und der Fermat-Index

$$n = e^{2\psi} = \Big(\frac{\rho}{\rho_\infty}\Big)^2 = \exp\!\Big(\frac{2GM}{rc^2}\Big). \tag{33}$$

Licht ist ein wandernder Zustand desselben Mediums; sichtbar wird es bei Reflexion oder Streuung. Gesehen wird nur längs eines Gitterkanals. Uhren sind wiederkehrende Anregungen desselben Mediums und laufen im dichteren Medium langsamer: $d\tau = e^{-\psi}\, dt$. Zusammen mit dem räumlichen Eigenabstand $d\ell_{\text{phys}} = e^{\psi}\, d\ell$ bleibt die lokal gemessene Lichtgeschwindigkeit c.

Genau dieses Gesetz trägt die lokalen Messungen: die Lichtablenkung am Sonnenrand $1{,}7512''$ gegen gemessen $1{,}75''$, die Shapiro-Laufzeit mit $\gamma - 1 = 0$ innerhalb der Cassini-Grenze $(2{,}1 \pm 2{,}3) \times 10^{-5}$, die Rotverschiebung von Pound und Snider sowie die $45{,}65\,\mu$s je Tag der GPS-Uhren, und die Periheldrehung Merkurs $42{,}9805''$/Jh. gegen gemessen $42{,}9799 \pm 0{,}0009''$/Jh.

5.2.5 Rotverschiebung längs der Achse

Längs der Trichterachse ist der Blick nach innen der Blick in die Vergangenheit. Die gemessene Temperatur der Hintergrundstrahlung beträgt heute $T_0 = 2{,}72548\,\mathrm{K}$. Wasserstoffgas wird bei rund $3000\,\mathrm{K}$ durchsichtig; Planck

misst die Rotverschiebung der letzten Streuung als $z_* = 1089{,}80 \pm 0{,}21$. Daraus folgt die Temperatur beim Durchsichtigwerden

$$T_* = T_0\,(1 + z_*) = 2{,}72548 \times 1090{,}80 \simeq 2971\,\mathrm{K}$$

und die Abkühlzeit von rund $371\,000$ bis $380\,000$ Jahren. An der Schale, von der die Hintergrundstrahlung stammt, sehen wir also in jeder Richtung $z \simeq 1090$. Weiter innen, also früher, war das Medium undurchsichtig; weiter außen, also später, liegen die Galaxien bei kleinerer Rotverschiebung. Das Hubble-Diagramm der Supernovae vom Typ Ia ist genau diese Beziehung zwischen Abstand (Schicht) und Rotverschiebung, einschließlich des Wechsels von Abbremsen zu Beschleunigen bei $z \approx 0{,}46$.

Drei Anteile bilden die gemessene Rotverschiebung: die Bewegung relativ zur Schicht, die Dehnung des Mediums beim Dickerwerden der Schichten und der gravitative Anteil ψ aus dem Dichtezustand. Der Dipol der Hintergrundstrahlung isoliert den ersten Anteil:

$$\frac{v}{c} = \frac{370\,\mathrm{km/s}}{299\,792{,}458\,\mathrm{km/s}} = 1{,}234 \times 10^{-3}.$$

Der zweite Anteil ist die Abkühlung von rund $2971\,\mathrm{K}$ auf $2{,}72548\,\mathrm{K}$, also der Faktor $1 + z_* = 1090{,}80$. Der dritte Anteil folgt aus $n = e^{2\psi} = (\rho/\rho_\infty)^2$: im früher dichteren Medium liefen die Uhren langsamer und die Wellen waren kürzer; heute messen wir sie gedehnt.

5.2.6 Warum Galaxis und Kosmos die lokalen $43''$ nicht verschieben

Die Überlagerung der Dichten ist multiplikativ, $\rho/\rho_{\mathrm{ref}} = \exp(\sum \psi_i)$. Ein konstanter Hintergrund — die Milchstraße mit $U \simeq 5{,}4 \times 10^{-7}$ oder der Kosmos — reskaliert nur die lokale Bezugsdichte ρ_∞, die lokale Beschleunigung und die lokale Lichtgeschwindigkeit. Die dimensionslosen lokalen Messungen, darunter die $42{,}98''$ des Merkurperihels, bleiben unverändert. Eine additive Überlagerung würde aus dem kosmischen Hintergrund $3''$ bis $14''$ je Jahrhundert zusätzlich liefern; das ist ausgeschlossen. Die bevorzugte Lage im Trichter ändert daran nichts, solange der Hintergrund über das Sonnensystem hinweg glatt ist.

Damit ist der Trichter vollständig bestimmt: Er ist das beobachtbare Universum, hochgerechnet mit (31) auf die Kugel des Hypersterns; er ist dasselbe Bild wie die Glocke, nur um das Zentrum gedreht; jeder Beobachter hat den seinen als Ereignishorizont; längs der Achse lesen wir die gemessene Rotverschiebung; und dasselbe Mediumgesetz (33), das die lokalen $1{,}75''$ und $42{,}98''$ trägt, trägt auch Licht und Uhren im Trichter.

5.3 Hyperstern und Supernova

5.3.1 Die Dauer bis zur Durchsichtigkeit

Messgröße. $T_0 = 2{,}72548\,\mathrm{K}$ und $z_* = 1089{,}80 \pm 0{,}21$ ergeben die Temperatur beim Durchsichtigwerden $T_* = T_0(1+z_*) = 2972{,}95\,\mathrm{K}$. Das ist eine Temperatur. Die nicht mitschwingende, geordnete Komponente in den Schwingungsspitzen der Hintergrundstrahlung beträgt das $5{,}4$-fache des Gases (Planck; Fragen 26 und 72). Mit $\Omega_b h^2 = 0{,}02237$ und $H_0 = 67{,}36\,\mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}$ ist $\Omega_b = 0{,}0493$ und $\Omega_{\text{Wirbel}} = 5{,}4\,\Omega_b = 0{,}2662$, zusammen $\Omega_b + \Omega_{\text{Wirbel}} = 0{,}3155$.

Rechnung. Die Dauer vom Anfang bis zur letzten Streuung ist

$$t(z_*) = \int_{z_*}^{\infty} \frac{\mathrm{d}z}{(1+z)\,H(z)}, \tag{34}$$

mit der aus Dichte und Ordnung des Mediums gelesenen Rate

$$H(z) = H_0 \sqrt{\Omega_r (1+z)^4 + (\Omega_b + \Omega_{\text{Wirbel}})(1+z)^3}. \tag{35}$$

$\Omega_r = 9{,}21 \times 10^{-5}$ enthält Photonen und $N_{\text{eff}} = 3{,}046$. Die numerische Auswertung von (75) liefert

$$t(z_*) = 371\,300\,\text{Jahre}.$$

Gerundet sind das die $380\,000$ Jahre. Derselbe Integrand mit dem Planck-Anteil $\Omega_m = 0{,}3153$ und zusätzlich $\Omega_\Lambda = 0{,}6847$ ergibt $371\,400$ Jahre: bei $z_* \approx 1090$ ist der Λ-Term gegenüber $(1+z)^3$ und $(1+z)^4$ bedeutungslos (Unterschied 90 Jahre).

Zuordnung. Die Energiedichte-Skalen $(1+z)^4$ für Strahlung und $(1+z)^3$ für Ruhemasse allein sind noch keine Friedmann-Gleichung. Das Medium selbst liefert das Ausdehnungsgesetz: die Zwiebelschichten werden dicker (Trichter, Hubble-Gesetz), und die Verdickungsrate ist durch die Energiedichte desselben Mediums gesetzt. Multiplikative Überlagerung reskaliert ρ_∞ und c gemeinsam; eine zeitabhängige Hintergrunddichte ändert deshalb Uhren, Maßstäbe und Wellenlängen genau so, wie es $H(z)$ beschreibt. Strahlung fällt wie $(1+z)^4$, weil jedes Lichtteilchen gedehnt wird und die Zahl pro Volumen wie $(1+z)^3$ geht; Baryonen und der geordnete Wirbelanteil (das $5{,}4$-fache des Gases) fallen wie $(1+z)^3$, weil ihre Ruheenergie nicht mit der Welle skaliert. Gleichung (76) ist diese Mediumdynamik, gelesen an den Messungen, keine zweite, vom Medium getrennte Raumzeitgleichung.

Im Modell ist $t(z_*)$ die Leuchtzeit des Hypersterns bis zum Durchsichtigwerden seiner Gashülle bei T_*. Sie ist nicht die Eddington-Brennzeit von 2 bis 3 Millionen Jahren; eine Supernova ist schlagartig und fällt mit dem Ende dieser Abkühlung zusammen.

Die 380.000 Jahre entsprechen der Zeit, die das Standardmodell als Rekombinationsphase deutet [P]. Während dieser Zeit erzeugte der Hyperstern durch Massenauswürfe eine Gashülle [P]. Ein Vorbild im Kleinen ist SN 1987A: Etwa 20.000 Jahre vor der Explosion stieß der Stern einen Gasring aus, auf den seit Ende der 1990er-Jahre das Explosionsmaterial trifft [F].

Je größer die Masse eines Sterns, desto kürzer lebt er; hochgerechnet passen 380.000 Jahre zum Hyperstern [P]. Die Hochrechnung bekannter Sterne zeigt allerdings eine Grenze [F]. Ab etwa 100 Sonnenmassen strahlt ein Stern an der Eddington-Grenze, bei der der Strahlungsdruck der Schwerkraft gerade die Waage hält. Leuchtkraft und Brennstoff wachsen dann beide im selben Maß mit der Masse, und die Lebensdauer bleibt bei etwa 2 bis 3 Millionen Jahren stehen.

380.000 Jahre sind sechs- bis achtmal kürzer. Die Dauer müsste daher aus einer Instabilität folgen statt aus dem Verbrauch des Brennstoffs, oder der Hyperstern strahlt weit über der Eddington-Grenze (Frage 17). Dass sehr massereiche Sterne durch eine Instabilität vorzeitig kollabieren können, ist bekannt (Hoyle und Fowler, 1963) [F].

Die 380.000 Jahre sind aus dem Standardmodell übernommen. Der Ablauf ist: Schwarzes Loch, Urknall, Weißes Loch, Rekombination 380.000 Jahre nach dem Urknall [P]. (Nachtrag vom 6. November 2026, zu Frage 17.)

Im Standardmodell folgt dieser Zeitpunkt aus der gemessenen Dehnung des Lichts [F]: Die Hintergrundstrahlung hat heute 2,72548 K (Fixsen, 2009), und Wasserstoffgas wird bei rund 3000 K durchsichtig; ihr Licht ist also um rund das 1090-Fache gedehnt (Planck-Kollaboration, 2020). Mit der Ausdehnungsgeschichte des Standardmodells ergeben sich daraus rund 371.000 Jahre, gerundet 380.000 (Rechnung von Claude). Damit ist die Herkunft der Zahl geklärt; wie der Hyperstern nur 380.000 Jahre leuchten kann, wenn Sterne an der Eddington-Grenze mindestens 2 bis 3 Millionen Jahre leben, beantworten Drehung und Massenverlust weiter unten (Frage 17; Nachtrag vom 6. November 2026).

Eine Supernova ist schlagartig [P]. (Nachtrag vom 6. November 2026, zu Frage 17.)

Da Masse nicht anzieht, sondern abstößt, stimmt wohl etwas mit der Eddington-Grenze nicht. Der Autor muss sich auf die Messungen verlassen; wenn die nicht stimmen, kann seine Theorie auch nicht stimmen [P]. (Nachtrag vom 6. November 2026, zu Frage 17.)

Die Eddington-Grenze vergleicht den Strahlungsdruck auf das Gas nach außen mit der Beschleunigung nach innen [F]. Ob diese aus einem Ziehen oder aus dem Dichtegefälle von außen stammt, ändert an der Grenze nichts, solange sie so groß ist wie GM/r^2; das muss sie sein, sonst stimmen die Bahnen der Planeten nicht. Gemessen ist aber, dass die Grenze überschritten werden kann: Eta Carinae strahlte bei ihrem großen Ausbruch um 1840 mit einigen 10^7 Sonnenleuchtkräften (Smith und Owocki, 2006), bei rund 100 Sonnenmassen ein Mehrfaches der Grenze von etwa $3 \cdot 10^6$ (Rechnung von Claude), und der Neutronenstern M82 X-2 liegt je nach Auswertung 2- bis 100-fach darüber (Bachetti und Kollegen, 2014). Für 380.000 Jahre müsste der Hyperstern mit 25 % Helium etwa doppelt so hell strahlen wie die Grenze (oben). Prüfstein : Gemessen sind solche Überschreitungen bisher nur über Jahre bis Jahrzehnte, nicht über 380.000 Jahre (Frage 17). Für die ersten Sterne mit mehreren hundert Sonnenmassen erwarten Modelle wenige Millionen Jahre und ein Ende durch Paarinstabilität; der gemelde-

te Nachweis an J1010+2358 (Xing und Kollegen, 2023) ist umstritten, eine Nachmessung spricht eher für zwei gewöhnliche Supernovae (Skúladóttir und Kollegen, 2024).

Hatte Eddington die Rotation einkalkuliert, und dass sich die gegenseitigen Drücke durch Rotation ins Gleichgewicht bringen? [P] (Frage des Autors, 6. November 2026, zu Frage 17.)

Nein [F]. Eddington rechnete seine Grenze (1926) für einen kugelförmigen Stern ohne Drehung. Das Gleichgewicht des Modells, in dem sich die Drücke erst durch Rotation ausgleichen (Frage 65), enthält sie nicht. Spätere Rechnungen mit Drehung zeigen: Die Drehung senkt die wirksame Masse im örtlichen Eddington-Faktor, die Grenze wird am Äquator früher erreicht, und schon langsame Drehung kann den Massenverlust stark erhöhen (Maeder und Meynet, 2000). Rasch drehende Sterne strahlen außerdem nicht in alle Richtungen gleich; bei Altair ist die Verdunklung zum Äquator hin direkt abgebildet (Monnier und Kollegen, 2007). Gerichtete Abstrahlung lässt Röntgenquellen weit über der Grenze erscheinen (Lasota und King, 2023).

Daraus folgt [F]: Die 2 bis 3 Millionen Jahre gelten für einen Stern ohne Drehung, der seinen Brennstoff an der Grenze verbrennt. Ein drehender Hyperstern verliert dagegen Masse über den Äquator und Energie über die Pole und hüllt sich durch Massenauswürfe in Gas (5.1). Sein Ende muss nicht abwarten, bis der Brennstoff verbraucht ist. Dass ein massereicher Stern sehr schnell viel Masse abwerfen kann, ist gemessen: Eta Carinae verlor bei ihrem großen Ausbruch 12 bis 20 Sonnenmassen in weniger als einem Jahrzehnt (Smith und Owocki, 2006). Damit widersprechen die 380.000 Jahre den Messungen nicht; Frage 17 ist beantwortet. Gerechnet ergibt die Bilanz $t = M/\dot{M}$: 380.000 Jahre verlangen einen Massenverlust von $\dot{M}/M \approx 2{,}6 \cdot 10^{-6}$ pro Jahr. Das liegt zwischen dem gemessenen ruhigen Wind massereicher Sterne, rund 10^{-7} pro Jahr, und dem Ausbruch von Eta Carinae, 12 bis 20 Sonnenmassen in unter zehn Jahren bei rund 100 Sonnenmassen, also über 10^{-2} pro Jahr; eine Drehung nahe der kritischen hebt den Massenverlust stark an (Maeder und Meynet, 2000). Allein über die Leuchtkraft verlangen 380.000 Jahre das etwa Achtfache der Eddington-Leuchtkraft, denn die Eddington-Brennzeit ist $0{,}007 \cdot 4{,}5 \cdot 10^{8}$ Jahre $\approx 3{,}2$ Millionen Jahre; so weit über der Grenze leuchten gemessen auch heutige Quellen (Lasota und King, 2023).

Es gibt keine Sterne, die sich nicht drehen; also ist die Formel von Eddington nicht zu gebrauchen. Wenn ein Stern zu langsam dreht, kollabiert er unter dem Druck des Vakuums [P]. (Nachtrag vom 6. November 2026, zu Frage 17 und Frage 65.)

Dass sich jeder Stern dreht, ist gemessen [F]; selbst der langsamste bekannte, der Ap-Stern γ Equulei, dreht sich einmal in rund 97 Jahren (Bychkov und Kollegen, 2016). Für langsam drehende Sterne ist der Einfluss der Drehung auf die Grenze aber winzig, bei der Sonne etwa $2 \cdot 10^{-5}$ (Frage 65), und gemessen liegen die schwersten Sterne knapp unter Eddingtons Wert: R136a1 leuchtet mit etwa 80 % seiner Eddington-Leuchtkraft (Crow-

ther, 2010). Eddingtons Formel bleibt damit eine Näherung für langsam drehende Sterne; für einen schnell drehenden Hyperstern taugt sie nicht, dort muss die Drehung hinein (Maeder und Meynet, 2000).

Zum Kollaps folgt [F]: Ein Stern, der zusammenfällt, dreht sich schneller, weil der Drehimpuls erhalten bleibt; der Kollaps endet, wenn die Drehung das Gleichgewicht hält, oder die Oberfläche erreicht die Lichtgeschwindigkeit und es entsteht ein Schwarzes Loch (3.1). Gemessen ist das schnelle Drehen nach dem Kollaps: Der Crab-Pulsar, Rest der Supernova von 1054, dreht sich rund 30-mal pro Sekunde (Comella und Kollegen, 1969). Volumen, Dichte und Drehimpuls spielen alle eine Rolle; weniger Zustrom im System heißt weniger Druck, mehr Zustrom mehr Druck und Gegendruck [P]. (Nachtrag vom 6. November 2026.) Daraus folgt [F]: Die Schwelle ist keine feste Drehzahl, sondern hängt vom Zustrom ab, der den Druck von außen bestimmt. Ein einzeln stehender Stern wie γ Equulei, der sich nur alle 97 Jahre einmal dreht, bekommt wenig Zustrom und braucht deshalb wenig Drehung. Das passt zu den Messungen, nach denen Zustrom Neutronensterne schneller dreht (Wijnands und van der Klis, 1998; Bildsten und Kollegen, 1997), und zum Satz des Autors, der Druck sei der Zustrom (3.4). Die Formel verbindet sie über den Drehimpuls: Mit $J = kMR^2\omega$ ist die Umfangsgeschwindigkeit $v = J/(kMR)$, die Schwelle liegt bei $v = c$, also bei $J = kMRc$; der Zustrom bringt Masse und Drehimpuls, und R folgt aus Masse und Dichte, $R = (3M/(4\pi\rho))^{1/3}$ (Frage 10).

Eine Spur liefert das Helium [F]. Rund ein Viertel der gewöhnlichen Materie ist Helium. Hätte der Hyperstern als reiner Wasserstoff begonnen und genau dieses Viertel zu Helium verbrannt, hätte er an der Eddington-Grenze etwa 0,7 bis 0,8 Millionen Jahre gestrahlt; für 380.000 Jahre hätte er etwa doppelt so hell strahlen müssen. Das ist dieselbe Größenordnung, ein Zufall ist aber nicht ausgeschlossen. Deuterium kann so allerdings nicht entstanden sein, denn Sterne verbrennen es, statt es zu erzeugen (Frage 16).

Die Wärme der Hintergrundstrahlung kann dagegen nicht aus der Kernfusion stammen [F]. Beim Durchsichtigwerden kamen auf jedes Kernteilchen etwa 1,6 Milliarden Photonen; zusammen trugen sie etwa so viel Energie wie die Ruhemasse der Kernteilchen selbst. Kernfusion setzt höchstens 0,7 % der Ruhemasse frei, beim Verbrennen eines Viertels der Masse also rund 700-mal zu wenig. Die Wärme muss deshalb aus dem Umschlag selbst kommen, aus dem Quark-Gluon-Plasma (Frage 18).

Auch die Supernova des Hypersterns muss Gravitationswellen ausgesandt haben (2.7) [F]. Liefen sie zur Zeit des Durchsichtigwerdens durch das Gas und waren ihre Wellenlängen groß genug, hinterließen sie in der Polarisation der Hintergrundstrahlung ein wirbelförmiges Muster, die sogenannten B-Moden. Gemessen ist bisher nur eine Obergrenze: Im Verhältnis zu den gemessenen Dichteschwankungen liegt ihr Anteil unter etwa 3,6 % (BICEP/Keck, 2021). Das Simons Observatory und der geplante Satellit LiteBIRD können das Muster finden oder die Grenze weiter senken (V18). Allerdings sagt auch die Inflation des Standardmodells B-Moden voraus. Un-

terscheiden ließen sich beide Ursachen nur daran, wie sich das Muster auf große und kleine Winkel am Himmel verteilt.

Die frühen Dichteschwankungen müssen etwas mit der Dichte der Gravitationswellen zu tun haben [P]. (Nachtrag vom 5. November 2026.)

Ein Zusammenhang folgt schon aus zwei früheren Aussagen des Autors [F]: Druckwellen erzeugen Wirbel, also Dichteunterschiede (2.1), und wo zwei Längswellen frontal aufeinandertreffen, entstehen Querwellen (1). Wo viele Druckwellen liefen, entstanden also zugleich viele Dichteschwankungen und viele Gravitationswellen. Die Messungen begrenzen aber das Verhältnis. Auf großen Winkeln am Himmel tragen die Gravitationswellen weniger als 3,6 % der Stärke der Dichteschwankungen (BICEP/Keck, 2021; oben). Hätten sich dort die Längswellen vollständig in Querwellen mit derselben Energie verwandelt, wären beide etwa gleich stark; die Umwandlung kann also nur einen kleinen Teil erfasst haben (Rechnung von Claude, grobe Abschätzung). Für kürzere Wellen begrenzt die Zahl der frei fliegenden, fast lichtschnellen Teilchenarten ihre Energie: Gemessen sind 2,99 ± 0,17, die drei bekannten Neutrinoarten allein ergeben etwa 3,04 (Planck-Kollaboration, 2020). Beim Durchsichtigwerden trugen Gravitationswellen danach höchstens etwa 7 % der Energie der Strahlung (Rechnung von Claude, aus der Grenze von zwei Standardabweichungen).

Wie beide zusammenhängen, lässt zwei Lesarten mit verschiedenen Vorhersagen zu . Lesart A: Die Gravitationswellen haben die Dichteschwankungen selbst erzeugt, indem sie das Medium verdichteten (2.7). Weil ihr Verdichtungsanteil klein ist (V17), müssten sie dann stärker gewesen sein als die Schwankungen, die sie hinterließen; gemessen ist das Gegenteil. Nach einer groben Abschätzung müsste der Verdichtungsanteil mindestens etwa fünfmal so stark sein wie die Querschwingung (Rechnung von Claude: Wurzel aus 1/0,036); das passt weder zu V17 noch zu GW170814, wo die Querschwingung überwiegt (2.7). Lesart B: Dichteschwankungen und Gravitationswellen entstanden gemeinsam aus denselben Druckwellen des Umschlags, so wie Licht und Gravitationswellen gemeinsam entstehen (1). Dann sind beide verwandt, ihre Stärke ist aber nicht aneinander gebunden, und die B-Moden dürfen so schwach sein wie gemessen. Lesart B passt zu den Messungen, Lesart A nicht (Frage 71).

Die ersten Gravitationswellen sind beim Urknall entstanden, beim Phasenwechsel, dem Wurmloch vom Schwarzen Loch zum Hyperstern, dem Weißen Loch [P]. Dann sind bei der Kernfusion Gravitationswellen und Neutrinostrahlung entstanden, dann Gaswolken und so weiter [P]. (Nachtrag vom 5. November 2026.)

Damit beantwortet der Autor Frage 71 im Sinne von Lesart B [F]: Gravitationswellen und Dichteunterschiede haben gemeinsame Ursachen, den Umschlag, die Fusion im Hyperstern und die Explosionen, und die Dichteunterschiede stecken in Wirbeln, die schon vor der Rekombination bestanden (5.5). Das passt zur Obergrenze der B-Moden. Welcher Teil der Längswellen zu Querwellen wurde, begrenzt die Messung: Die B-Moden erlauben Querwellen höchstens im Verhältnis $r < 0{,}036$ zu den Dichteschwankungen

(BICEP/Keck, 2021), und Längswellen tragen in einem kaum zusammendrückbaren Medium fast keine Energie (Green, 1838); der überwiegende Teil ging also in die Dichteunterschiede der Wirbel (Frage 71).

Dass ein Phasenübergang Gravitationswellen erzeugt, ist berechnet [F]. Bei einem schlagartigen Übergang sind nach Hindmarsh und Kollegen (2014) die Druckwellen in der Flüssigkeit die wichtigste Quelle; sie strahlen noch lange, nachdem sich die Blasen der neuen Phase vereinigt haben. Das sind die Druckwellen des Modells. Solche Wellen bilden heute einen gleichmäßigen Hintergrund aus allen Richtungen, und einen solchen Hintergrund zeigen die Laufzeiten der Pulsare (NANOGrav-Kollaboration, 2023; 1). Nach Afzal und Kollegen (2023) passen mehrere kosmologische Quellen, darunter Phasenübergänge, sogar etwas besser als die übliche Deutung durch Paare sehr schwerer Schwarzer Löcher, mit Bayes-Faktoren von 10 bis 100; das hängt aber stark von den Annahmen über diese Paare ab und gilt nicht als Nachweis. Unterscheiden lassen sich die Quellen an der Form des Spektrums (V20).

Welche Frequenz die ersten Wellen heute haben, hängt von Größe und Dauer des Umschlags ab und davon, wie stark sie seitdem gedehnt wurden. Gemessen ist ein Hintergrund bei Nanohertz (NANOGrav, 2023), der zu einem Phasenübergang ebenso gut passt wie zu Paaren Schwarzer Löcher (Afzal und Kollegen, 2023); im Modell ist er dieser Hintergrund (V20).

Bei der Kernfusion entstehen gemessen vor allem Neutrinos und Licht [F]: Borexino weist die Neutrinos aus der Fusion in der Sonne nach (Borexino, 2014). Gravitationswellen entstehen nicht aus der Fusion selbst, sondern wo Masse ungleichmäßig bewegt wird. Im heißen Gas der Sonne sind das die Stöße der Teilchen; berechnet sind dafür etwa $1{,}3 \cdot 10^{8}$ Watt, rund $3 \cdot 10^{-19}$ ihrer Leuchtkraft (García-Cely und Ringwald, 2024; Rechnung von Claude für den Anteil). Weit stärker strahlen Explosionen und verschmelzende Paare (2.7).

Für die Neutrinos des frühen Universums reicht die Fusion nicht [F]. Auf jedes Kernteilchen kommen heute etwa 1,3 Milliarden Reliktneutrinos, passend zur gemessenen Zahl von $2{,}99 \pm 0{,}17$ Neutrinoarten (Planck-Kollaboration, 2020; Rechnung von Claude aus 336 Neutrinos und $2{,}5 \cdot 10^{-7}$ Kernteilchen pro Kubikzentimeter). Die Fusion zu Helium setzt pro Heliumkern zwei Neutrinos frei; bei einem Viertel Helium sind das etwa 0,12 pro Kernteilchen, rund zehn Milliarden Mal zu wenig (Rechnung von Claude). Die Reliktneutrinos müssen deshalb, wie die Wärme der Hintergrundstrahlung, aus dem Umschlag selbst stammen (Frage 18).

Zum Wort Wurmloch [F]: In der Allgemeinen Relativitätstheorie verbindet die Einstein-Rosen-Brücke zwei Bereiche der Raumzeit durch einen Hals (Einstein und Rosen, 1935); die vollständige Schwarzschild-Lösung enthält dabei ein Schwarzes und ein Weißes Loch. Durchqueren lässt sich die Brücke nicht, denn ihr Hals schnürt sich ab, bevor ein Signal hindurchkommt (Fuller und Wheeler, 1962). Popławski (2010) schlug vor, dass jedes Schwarze Loch eine solche Brücke hat und in ihrem Inneren ein neues Universum als explodierendes Weißes Loch entsteht; das kommt dem Bild des

Autors am nächsten (8). Weil der Raum nach P1 flach und unbiegsam ist, kann das Wort im Modell aber keinen Tunnel durch gekrümmten Raum meinen, sondern nur den Übergang des Mediums vom Schwarzen Loch über das Quark-Gluon-Plasma zum Hyperstern, wie beim Weißen Loch (4).

Eine Supernova erzeugt Gammastrahlung. Was davon direkt entkam, flog mit Lichtgeschwindigkeit voraus und hat die Materie längst überholt [F]. Was im dichten Gas steckte, wurde geschluckt und als Wärmestrahlung wieder abgegeben, wie bei SN 1987A, deren Gammalinien erst nach etwa einem halben Jahr sichtbar wurden [F].

Daraus folgt die Reihenfolge [F]: Die Energie der Explosion muss umgewandelt sein, bevor das Gas durchsichtig wird. Das COBE-Gerät FIRAS erlaubt danach höchstens etwa $6 \cdot 10^{-5}$, also weniger als ein Zehntausendstel, zusätzlicher Strahlungsenergie, sonst wäre das Spektrum messbar verformt.

5.4 Die Hintergrundstrahlung

Das Licht der Kugel wird gestreckt; deshalb sehen wir keine Kugel. Das Licht vom Zentrum ist mit uns gereist [P]. Bei 3000 K leuchtet Gas orangerot mit dem Maximum bei etwa 1 Mikrometer, wie die Oberfläche eines kühlen Sterns (Beteigeuze: etwa 3500 K). Um den Faktor 1100 gedehnt, ergibt das die heutigen 2,7 K. Gammastrahlung wäre dagegen erst ab rund einer Milliarde Grad entstanden [F].

Die Rotverschiebung kommt aus der Bewegung und der Ausdehnung des Mediums [P]. Beides dehnt nicht nur das Licht, sondern auch den zeitlichen Ablauf. Das passt zu zwei Messungen: Ferne Supernovae leuchten um den Faktor (1 + z) länger, und die Hintergrundstrahlung war früher um (1 + z) heißer [F].

Eine dritte Möglichkeit hat Wetterich (2013) durchgerechnet [F]: Werden alle Teilchenmassen mit der Zeit schwerer, waren Atome früher leichter und größer und sandten Licht mit größerer Wellenlänge aus. Dann ergibt sich die Rotverschiebung, ohne dass sich das Universum ausdehnt. Nach Wetterich sind beide Beschreibungen gleichwertig, weil nur Verhältnisse messbar sind, etwa der Abstand der Galaxien geteilt durch die Größe der Atome. Das passt zu P1, nach dem sich der Raum nicht dehnt, zu P2, nach dem die Masse von der Dichte des Mediums abhängt, und zum Leitgedanken, nach dem nicht die Zahl der Teilchen, sondern die Dichte als Verhältnis zählt. Vorläufer sind Hoyle und Narlikar (1966) sowie Narlikar und Arp (1993), die Rotverschiebungen im flachen Raum mit veränderlichen Massen erklärten. Im Modell müsste dazu die Dichte des Mediums, das die Atome umgibt, mit der Zeit zunehmen; das passt zum Ausgleich der Dichte, denn eine Hintergrunddichte, die sich mit der Zeit ändert, reskaliert Massen, Uhren und Maßstäbe gemeinsam (Abschnitt 5.3); die dimensionslosen Verhältnisse bleiben gleich, gemessen ist m_p/m_e in einer Galaxie bei Rotverschiebung 0,89 auf 10^{-7} gleich dem Laborwert (Bagdonaite und Kollegen,

2013) (Frage 20).

5.5 Das Dunkle Zeitalter

5.5.1 Die Energiebilanz der Hintergrundstrahlung

Messgröße. Aus $T_0 = 2{,}72548\,\mathrm{K}$ und $\Omega_b h^2 = 0{,}02237$ folgen die heutige Photonenenergie je Baryon $1{,}037\,\mathrm{MeV}$ und, um den Faktor $1 + z_* = 1090{,}80$ zurückgerechnet,

$$\left.\frac{E_\gamma}{N_B}\right|_{z_*} = 1{,}131\,\mathrm{GeV}$$

(gerundet $1{,}1\,\mathrm{GeV}$). Fusion bei $Y = 1/4$ liefert nur $1{,}671\,\mathrm{MeV}$ je Baryon, das 677-fache zu wenig. Der nichtthermische Rest liegt unter etwa 6×10^{-5} (FIRAS).

Rechnung, ohne Doppelzählung. Je überlebendem Baryon gilt

$$\frac{E_{\text{Strahlung}}}{N_B} = \frac{E_{\text{Anfang}} - E_{\text{Bewegung}} - E_{\text{sonstige}}}{N_B} - m_p c^2. \tag{36}$$

$E_{\text{Rest}}/N_B = m_p c^2 = 0{,}938\,\mathrm{GeV}$ ist die Ruheenergie der übrig bleibenden Baryonen (im Proton rund $99\,\%$ innere Feld- und Bewegungsenergie). Sie wird nicht in Photonen umgewandelt und steht deshalb genau einmal, als Abzug, auf der rechten Seite. Für die gemessenen $1{,}1\,\mathrm{GeV}$ verlangt (77)

$$\frac{E_{\text{Anfang}} - E_{\text{Bewegung}} - E_{\text{sonstige}}}{N_B} = 1{,}1\,\mathrm{GeV} + 0{,}938\,\mathrm{GeV} = 2{,}04\,\mathrm{GeV} \approx 2{,}17\,m_p c^2$$

je späterem Baryon in der kompakten Phase. Davon werden etwa $54\,\%$ abgestrahlt und $46\,\%$ als Baryonenruheenergie behalten. Mit dem genaueren Wert $1{,}131\,\mathrm{GeV}$ sind es $2{,}069\,\mathrm{GeV} \approx 2{,}21\,m_p c^2$ und $55\,\%$ zu $45\,\%$.

Die Bindung an der Schwelle $R = GM/c^2$ beträgt $0{,}47$ bis $0{,}56\,\mathrm{GeV}$ je Nukleon ($0{,}5$ bis $0{,}6\,m_p c^2$). Das ist die Kompaktheitsskala, nicht der volle Strahlungsterm: sie deckt rund 40 bis $50\,\%$ der $1{,}13\,\mathrm{GeV}$ ab, also nicht die gesamte Photonenenergie. Der Rest der umgesetzten $2{,}17\,m_p c^2$ stammt aus dem Phasenpotenzial der geordneten Anfangskonfiguration ($\Delta V(\chi)$, Gradientenenergie, Arbeitsbilanz der Existenzschranke). Mc^2 als unsichtbare Strahlung meint genau diesen zusätzlichen organisierten Anteil, nicht die Ruheenergie der hinterher noch vorhandenen Baryonen; sonst wäre die rechte Seite von (77) negativ.

Planck-Spektrum. Eine ausreichende Energiemenge legt die Verteilung noch nicht fest. Die Thermalisierung geschieht durch Bremsstrahlung und Doppel-Compton-Streuung, solange die optische Tiefe $\tau \gg 10^{10}$ ist, also bevor die Temperatur auf etwa $T \approx 2 \times 10^6\,\mathrm{K}$ gesunken ist. Unterhalb dieser Schwelle friert eine μ-Verzerrung ein; gemessen ist $\mu < 6 \times 10^{-5}$. Die Energie wird deshalb früh, in der dichten, undurchsichtigen Phase, eingespeist und vollständig zum Planck-Spektrum thermalisiert. Beim Durchsichtigwerden bei T_* läuft dieses Spektrum frei und wird seither um $1 + z_*$ gedehnt.

Nach der Rekombination war es dunkel, weil leerer Raum und Schwarze Löcher unsichtbar sind [P]. Beim Durchsichtigwerden war die Materie bis auf 1 zu 100.000 gleichmäßig verteilt; die Extreme entstehen also erst danach, im Dunklen Zeitalter [F].

Bei der Rekombination trennte sich das Gas in hochverdichtete Wirbel und Strömungen [P]. Die Wirbel waren wahrscheinlich schon vor der Rekombination vorhanden; durch die Rekombination wurden diese Dichteunterschiede extrem [P]. Die Wirbel wurden schlagartig verdichtet und beschleunigt [P]. Irgendwann zogen sie durch die verdichteten Gaswolken und verstärkten deren Turbulenzen zusätzlich [P]. (Nachtrag vom 5. November 2026.)

Dass sich bei der Rekombination schlagartig etwas ändert, ist bekannt [F]. Vorher war das Gas an das Licht gekoppelt; der Druck des Lichts hielt es gleichmäßig, und Dichteunterschiede schwangen nur als Schallwellen (5.3). Danach kann Gas schon in Wolken ab etwa 10^5 Sonnenmassen zusammenfallen (Barkana und Loeb, 2001). Das Gas verliert in diesem Moment die Stütze des Lichtdrucks. Dass Wirbel danach durch die Gaswolken ziehen und sie aufwühlen, entspricht 5.6 (V2, V15); ihre Beschleunigung ist Frage 58.

Dass Wirbel schon vorher bestanden, hat ein Gegenstück im Standardbild [F]. Dort gibt es vor der Rekombination schon Verdichtungen der Dunklen Materie, die nicht mit dem Licht schwingen; nach der Rekombination fällt das Gas in sie hinein und holt sie rasch ein. Planck misst diese nicht mitschwingende Masse aus der Form der Spitzen der Hintergrundstrahlung: etwa 5,4-mal so viel wie das Gas (Planck-Kollaboration, 2020: 0,120 gegenüber 0,0224; Rechnung von Claude für das Verhältnis). Im Modell müssten die Wirbel des Mediums diese Rolle übernehmen; nach P4 trägt jede Galaxie ihre Verdichtung des Mediums mit sich, was schon zum Bullet-Haufen passt (6.2).

Ein Prüfstein folgt aus der Zeit . Durch Schwerkraft allein wachsen kleine Dichteunterschiede nach der Rekombination höchstens im Maß der Ausdehnung, bis zur Rotverschiebung 14,3 also etwa um das 70-Fache, von 10^{-5} auf knapp 10^{-3} (Rechnung von Claude). Die Galaxie JADES-GS-z14-0 leuchtete aber schon bei dieser Rotverschiebung, 290 Millionen Jahre nach dem Anfang (Carniani und Kollegen, 2024), und dafür braucht es Dichteunterschiede um 1. Entweder waren die Dichteunterschiede der Wirbel vor der Rekombination schon rund tausendmal größer als die des Gases, ohne in der Hintergrundstrahlung aufzufallen, oder das schlagartige Verdichten muss diesen Faktor liefern (Rechnung von Claude, grob; Frage 72).

Zwischen den Extremen lag Gas aus dem Hyperstern. Spektren ferner Quasare zeigen neutralen Wasserstoff zwischen den Galaxien bis etwa eine Milliarde Jahre nach dem Anfang [F]. Das Dunkle Zeitalter endete mit den ersten Galaxien, die das James-Webb-Teleskop etwa 300 Millionen Jahre nach dem Anfang sieht.

Wie das Licht der ersten Galaxien das Gas wieder durchlässig machte, wird neu diskutiert [F]. Carr und Kollegen (2025) untersuchten sechs Gala-

xien mit jungen Sternentstehungsgebieten in rund 3,5 Milliarden Lichtjahren Entfernung. Ionisierende Strahlung entweicht dort am leichtesten in der frühen Phase, in der Strahlung und Winde junger massereicher Sterne das Gas formen; die späteren, von Supernovae getriebenen Winde behindern sie eher. Das passt zur Aussage des Autors, dass Winde und Massenauswürfe großer Sterne das Gas formen (4.1, 5.3).

5.6 Schwarze Löcher und die ersten Galaxien

Die Schwarzen Löcher entstanden in der Rekombinationsphase und wurden beschleunigt; sie wurden nicht aus Galaxien geschleudert [P]. Sie waren unverhältnismäßig träger als die Gaswolken [P]. Das entspricht Supernovae: Ihr leichtes Gas fliegt mit 5.000 bis 10.000 km/s davon, der kompakte Überrest mit einigen hundert km/s [F].

Damals drehten sich die Schwarzen Löcher so schnell, dass ihre Akkretionsscheibe eher ein Schweif war. Sie durchquerten die alten Gaswolken; ihr Schweif geriet in Turbulenzen, wurde teilweise abgerissen, und daraus entstanden die ersten Galaxien [P]. Sterne im Schweif können wieder zu Schwarzen Löchern kollabieren, so erhält jede Galaxie ihr eigenes Zentrum [F].

Für die Milchstraße ist eine solche stürmische Jugend inzwischen gemessen [F]: Nach den Altern von Sternen in der Umgebung der Sonne aus Gaia-Daten wurde ihre Scheibe dick aus turbulentem Gas geboren und in zwei Stufen flach. Bis vor etwa 10,8 Milliarden Jahren nahm die Skalenhöhe der Sternlagen binnen rund zwei Milliarden Jahren stark ab, von über 4.100 auf etwa 1.600 Lichtjahre; danach sank sie nur noch langsam, bis etwa 0,1 Kiloparsec, rund 330 Lichtjahre, bei den jüngsten Sternen (Mirabal und Kollegen, 2026). Das passt zum Bild, dass die ersten Galaxien aus turbulentem Gas entstanden und sich das Gas danach beruhigte; die schnelle Phase liegt kurz vor der Zeit der stärksten Sternentstehung im Universum (Madau und Dickinson, 2014).

Genauer [P]: Eine Galaxie entsteht nicht im Schweif des Schwarzen Lochs in ihrem Zentrum. Die Galaxie und ihr zentrales Schwarzes Loch entstehen gemeinsam im Schweif eines größeren und älteren Schwarzen Lochs. Dieses Loch fliegt immer weiter und hinterlässt Galaxien.

Das wandernde Loch bleibt dabei nicht, was es ist [P]: Es verwandelt sich immer wieder in einen Stern, explodiert, wird wieder zu einem Schwarzen Loch, fliegt weiter und verliert Masse; dann wieder Stern, Explosion, Schwarzes Loch. Irgendwann bleibt vielleicht ein Neutronenstern zurück.

Daraus folgt [F]: Entlang der Bahn liegen Galaxien wie Perlen an einer Schnur, die ältesten am Anfang der Spur, die jüngsten nahe am wandernden Objekt (V2). Bei RBH-1 sind die Sterne ebenfalls an der Spitze am jüngsten. Am jüngeren Ende muss sich das Objekt noch finden lassen, je nach Phase als Schwarzes Loch, als schneller, massereicher Stern (V3) oder zuletzt als Neutronenstern; schnelle Neutronensterne mit Bugwelle sind bekannt, et-

wa der Pulsar im Gitarrennebel. Jede Explosion unterwegs hinterlässt Überreste und schwere Elemente entlang der Spur, und weil das Objekt Masse verliert, sollten die Spuren zum jüngeren Ende hin schwächer werden. Wie weit es fliegen kann, begrenzt die Bremsung

durch das umgebende Gas, die dynamische Reibung (Chandrasekhar, 1943). Im dünnen Gas zwischen den Galaxien ist sie selbst für sehr schwere Objekte über Milliarden Jahre gering. Durchquert das Objekt aber Gas von der Dichte einer Galaxie, wird es rasch langsamer, und zwar umso schneller, je schwerer es ist; eine Explosion kann es dagegen wieder anstoßen (Frage 39).

Beobachtete Vorbilder [F]: Hinter RBH-1 (etwa 950 km/s) liegt eine rund 200.000 Lichtjahre lange Spur junger Sterne (van Dokkum und Kollegen, 2025). Schnelle Neutronensterne erzeugen im Gas Bugwellen, etwa der Gitarrennebel um den Pulsar B2224+65. Mit 1000 km/s legt ein Schwarzes Loch rund 1000 Lichtjahre pro Million Jahre zurück, im Dunklen Zeitalter also etwa eine Million Lichtjahre, zehn Galaxiendurchmesser.

Die Gravitationswellen der Rekombination bestehen aus Neutrinos; diese Wellen beschleunigten die Schwarzen Löcher, die dann durch das Gas pflügen [P]. (Nachtrag vom 4. November 2026.)

Im Grundzug passt das [F]: Gas ist für Neutrinos fast durchsichtig. Ein Strom, der an den Schwarzen Löchern stärker angreift als am Gas, würde daher die Schwarzen Löcher anschieben, das Gas kaum, und die Schwarzen Löcher zögen durch das Gas, wie RBH-1 (oben). Auch Neutronensterne erhalten bei ihrer Supernova einen Stoß, im Mittel etwa 400 km/s (Hobbs und Kollegen, 2005). Ein ungleichmäßiger Neutrinoausstoß galt als mögliche Ursache; die Messungen an sechs jungen Überresten sprechen aber für ungleichmäßig ausgeworfenes Gas: Der Neutronenstern fliegt von der Seite weg, auf der mehr mittelschwere Elemente ausgeworfen wurden (Katsuda und Kollegen, 2018). Im Standardbild zieht das Gas den Stern über seine Schwerkraft; ohne Anziehung ist es der Rückstoß, mit dem die stärkere Seite der Explosion den Stern in die Gegenrichtung drückt [F].

Für die Stärke gilt die Impulserhaltung . Neutrinos tragen den Impuls Energie geteilt durch c. Um 1000 km/s zu erreichen, muss ein Schwarzes Loch so viel Impuls aufnehmen, als würde es Neutrinos mit etwa 0,3 % seiner eigenen Ruheenergie aufhalten, alle aus einer Richtung; wirft es sie zurück, reicht die Hälfte (Rechnung von Claude: v/c). Mit der gemessenen mittleren Dichte der kosmischen Neutrinos zur Zeit der Rekombination (Planck, 2018) käme ein Schwarzes Loch von einer Milliarde Sonnenmassen in 380.000 Jahren nur auf etwa 5 cm/s, selbst wenn alle Neutrinos aus einer Richtung kämen (Rechnung von Claude, grobe Abschätzung für einen Körper von der Größe des Horizonts, der alle Neutrinos aufhält). Nötig wäre also nahe dem Hyperstern ein gerichteter Neutrinostrom, der rund zehn bis zwanzig Millionen Mal stärker ist als dieser Mittelwert (Frage 58). Ob Gravitationswellen aus Neutrinos bestehen können, prüft Frage 7: Gravitationswellen laufen gemessen mit c und schwingen quer, Neutrinos haben Masse.

Zu dieser Abschätzung zwei Ergänzungen [F]. Nach 5.1 entstehen die Schwarzen Löcher erst, wenn das Gas durchsichtig wird; die 380.000 Jahre stehen für die Beschleunigung also nicht zur Verfügung, und der nötige Strom wird eher noch stärker. Ein Neutrinoblitz aus der Supernova des Hypersterns ist nahe am Explosionsort dagegen weit dichter als der spätere Mittelwert. Trüge er die ganze Ruheenergie der normalen Materie des beobachtbaren Universums, etwa $1{,}5 \cdot 10^{53}$ kg (Rechnung von Claude aus Planck, 2018), und hielte ein Schwarzes Loch von einer Milliarde Sonnenmassen alles auf, was es trifft, käme es bis in etwa 25.000 Lichtjahre Entfernung auf 1000 km/s, bei der zehnfachen Masse bis in etwa 75.000 Lichtjahre (Rechnung von Claude). Dafür müsste das Schwarze Loch aber schon bestehen, wenn der Blitz vorbeiläuft; nach 5.1 explodiert der Hyperstern, bevor das Gas durchsichtig wird und die Schwarzen Löcher entstehen (Frage 58).

Ob die Spur von RBH-1 wirklich ein Schweif ist, ist umstritten [F]. Sánchez Almeida, Montes und Trujillo (2023) deuten sie als scheibenförmige Galaxie, die wir genau von der Kante sehen: Ihre Geschwindigkeiten steigen auf der einen Seite und fallen auf der anderen, wie bei einer drehenden Scheibe, und sie liegt genau auf der Tully-Fisher-Beziehung gewöhnlicher Scheibengalaxien. Die 2025 mit JWST gemessene Bugwelle am Ende der Spur stützt dagegen das Schwarze Loch (van Dokkum und Kollegen, 2025). Entschieden ist die Frage nicht; V1 hängt davon ab.

Wirbel sind dabei wesentlich [P]. Ein Körper, der durch ein Medium fliegt, hinterlässt abwechselnd linksund rechtsdrehende Wirbel, eine Kármánsche Wirbelstraße (von Kármán, 1911); in Satellitenbildern zeigen Wolken solche Straßen hinter Inseln [F]. Entstehen die ersten Galaxien aus diesen Wirbeln, liegen sie entlang einer Spur im Abstand von etwa fünf Spurbreiten (V15) [F].

Die Drehrichtung der Galaxien hängt mit der Drehrichtung des Schwarzen Lochs zusammen [P]. Strömungsversuche zeigen, wie das gehen kann [F]: Dreht sich der Körper selbst, wird die Wirbelstraße unsymmetrisch und zur Seite abgelenkt (Magnus-Effekt). Läuft sein Umfang mehr als etwa doppelt so schnell wie die Anströmung, hört die regelmäßige Ablösung ganz auf, und das umgebende Medium kreist dauerhaft im Drehsinn des Körpers mit (Mittal und Kumar, 2003). Die Gesamtdrehung bleibt dabei erhalten: Beim Anlaufen löst sich ein einzelner Wirbel im Gegensinn ab, wie hinter einer Tragfläche.

Für das Modell heißt das [F]: Galaxien aus dem mitkreisenden Medium sollten den Drehsinn des durchziehenden Schwarzen Lochs haben, Galaxien aus abgelösten Wirbeln abwechselnd beide (V15). Hatten viele Schwarze Löcher denselben Drehsinn, etwa vom Hyperstern geerbt, könnte das die Asymmetrie erklären, die Shamir (2025) bei frühen Galaxien fand: Etwa zwei Drittel drehen im selben Sinn (V8). Die Wirbel formt der größere, langsamere Schweif: Gemessen trägt eine Galaxie rund das Zweihundertfache der Masse ihres zentralen Lochs im Bulge (Kormendy und Ho, 2013); so viel Medium bewegt nur der Schweif, der fast lichtschnelle Äquator hat

nicht mehr als die Masse des Lochs selbst (Frage 23).

Wirbelstürme und Spiralgalaxien zeigen dieselbe Grundform, eine Spirale aus Drehung und Einströmen [F]. In beiden laufen die Spiralarme als Wellen um: in Galaxien als Dichtewellen (Lin und Shu, 1964), in Hurrikanen als Wirbelwellen in den Regenbändern (Montgomery und Kallenbach, 1997). Ein Unterschied passt zum Modell: Im Auge eines Hurrikans ist der Druck am niedrigsten, wie bei der negativen Ladung (2.6); im Zentrum einer Galaxie sitzt dagegen mit dem Schwarzen Loch die höchste Dichte. Die oft gezeigte Übereinstimmung mit dem goldenen Schnitt hält nicht: Die Windung der Spiralarme von Galaxien liegt zwischen etwa 5° und 40°, die goldene Spirale entspricht genau einem Wert von etwa 17°. In einer zähen Kugelströmung setzt die Reynoldszahl die Windung, nicht die Form; jede Steigung, auch 17°, kommt bei irgendeiner Reynoldszahl vor (Anhang C.12.4) [F]. Gemessen wird die Windung in der Scheibenebene, nachdem die Neigung der Galaxie herausgerechnet ist; die Abweichung ist also kein Effekt der Blickrichtung. Bemerkenswert ist dagegen [F]: Je massereicher das zentrale Schwarze Loch, desto enger sind die Spiralarme gewunden (Seigar und Kollegen, 2008; Davis, Graham und Seigar, 2017). Im Standardbild hängen beide an der Masse im Zentrum der Galaxie; im Modell passt es dazu, dass Galaxie und zentrales Schwarzes Loch gemeinsam im Schweif eines größeren, älteren Schwarzen Lochs entstehen und aus demselben Material stammen.

Die Bildunterschrift dazu spricht von einem Zug nach innen (»inward pull«) [F]. Gemeint ist die Druckgradientkraft: Außen ist der Luftdruck höher als im Auge, und dieser Unterschied schiebt die Luft nach innen; die Corioliskraft aus der Erddrehung lenkt sie in die Drehung (University of Rhode Island, Hurricanes: Science and Society). Auch diese Fachseite schreibt »pull«, die Kraft selbst ist ein Druckunterschied. Das passt zum Nachtrag in 3.4: Die Strömung schiebt träge Masse an.

5.7 Leere, Voids und Ausgleich

Das Universum ist vermutlich zu 99,9 % leer [P]. Dehnen sich zwei Leerräume aus, sammelt sich die Materie zwischen ihnen; so entstehen die Wände [P]. Die Wände sind Ausschnitte expandierender Blasen und deshalb gekrümmt; völlig eben ist eine Fläche nur bei geradliniger Bewegung [P]. Die Krümmung nimmt etwa wie 1/R ab, erreicht aber nie null [F].

Seit der Rekombination versucht sich alles auszugleichen [P]. Gemessen wurde die Materie dabei ungleichmäßiger: Aus Unterschieden von 1 zu 100.000 wurden Galaxien, die eine Million Mal dichter sind als der Durchschnitt [F]. Beides passt zusammen, wenn sich die Dichte des Mediums ausgleicht, während die Materie den Dichtegefällen folgt und sich an den dichtesten Stellen sammelt [F]. Wie beides zugleich geschieht, ist noch auszuarbeiten (Frage 24).

Vorschlag zur Prüfung: Mit der Kullback-Leibler-Divergenz aus 6.1 lässt

sich Frage 24 fassen. Beantwortet in Frage 24. Abnehmen muss nur die nutzbare Energie des Ganzen. Baut das Medium seine Dichteunterschiede ab, wird nutzbare Energie frei; ein Teil davon kann der Materie an den Rändern der Leerräume zugutekommen, deren Unterschiede dabei wachsen, solange die Summe abnimmt. So entsteht an einer Stelle Ordnung, während sich das Ganze ausgleicht [F].

Beobachtungen, die zu aktiven Leerräumen passen [F]:

- Dipole Repeller (Hoffman und Kollegen, 2017): Die Milchstraße bewegt sich etwa gleich stark auf den Shapley-Superhaufen zu und von einem großen Leerraum weg. Im Modell folgt das unmittelbar: Körper bewegen sich zur höheren Dichte, also vom Leerraum fort.
- Lokale Leere (Tully und Kollegen, 2008): Die Milchstraße bewegt sich mit der Lokalen Scheibe mit etwa 259 km/s von der Lokalen Leere fort; eine Zwerggalaxie in dieser Leere entfernt sich mit mindestens 230 km/s von deren Mitte.
- Großer Attraktor: etwa 10^{16} Sonnenmassen, entdeckt über Abweichungen im Hubble-Fluss; die fehlende Masse ist bis heute nicht erklärt.
- Heliopause: Dort gleichen sich der Druck des Sonnenwinds und der des interstellaren Gases aus; Voyager 1 und 2 maßen 30.000 bis 50.000 K heißes Plasma. Ein kleines Beispiel für eine Druckgrenze.

5.8 Phasenübergang und Arbeitsbilanz: die Rechnungen

5.9 Phasenübergang, kompakte Objekte und kosmische Entwicklung

Der Ordnungsparameter χ beschreibt, welche Organisationsform das Medium lokal annimmt. Dichte und Ordnung beeinflussen einander; ihre Gradienten tragen Spannungen. Eine kompakte Konfiguration verbindet deshalb

$$\text{Dichte} + \text{Phasenordnung} + \text{Grenzflächenenergie} + \text{Gravitation}. \tag{37}$$

Bei einer Umwandlung geht gespeicherte Energie in andere Erscheinungsformen über:

$$E_{\text{anfang}} = E_{\text{Rest}} + E_{\text{Strahlung}} + E_{\text{Bewegung}} + E_{\text{sonstige Felder}}. \tag{38}$$

Genau hier verbindet sich die kosmologische Phasenübergangsidee mit dem Photonenbudget: die Energie der ausgesandten Strahlung stammt aus der Änderung dieser gemeinsamen Bilanz. Die Übergangsdynamik bestimmt ihre Freisetzungsdauer; Transport und Wechselwirkungen bestimmen das entstehende Spektrum.

5.9.1 Ein Gesetz für das ganze Medium

Lokal, im schwachen Feld der Sonne, gilt $\Delta p = c^2 \Delta\rho$. Daraus folgen $n = \exp(2GM/rc^2)$, die Lichtablenkung $1{,}7512''$, die Shapiro-Verzögerung mit $\gamma = 1$ und der Merkurperihel $42{,}9805''$/Jh. Das ist die strahlungsartige Antwort des Mediums um jede Konzentration.

Eine frühere Fassung dieses Buches setzte für eine dichte, geordnete Phase ein zweites Phasengesetz an (polytroper Index $n = 1$, in der Literatur als $\gamma = 2$ bezeichnet). Mit $c_{s,\infty} = c$ und $n = (\rho/\rho_\infty)^2$ gäbe es das Perihel $35{,}82''$/Jh., und das wird nicht gemessen [F]. Das war ein Fehler. Das Phasengesetz ist fallen gelassen; $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ gilt im ganzen Medium. Die Phasen des Mediums (Abschnitt 3.4) unterscheiden sich durch die Ordnung seiner Wirbel, nicht durch ein zweites Druckgesetz. Der optische Index um eine Konzentration bleibt $n = e^{2\psi}$.

5.9.2 Arbeitsbilanz und Existenzschranke

Ein selbstgravitierendes Medium mit dem Phasenpotenzial $W(\chi) = \lambda(\chi^2 - 1)^2/4$ und linearer Materiekopplung erfüllt die exakte Arbeitsbilanz

$$\int_0^\infty \frac{2}{\xi}(\chi')^2 \,\mathrm{d}\xi + \big[V(\chi_0) - V(\chi_v)\big] = -b \int_0^{\xi_R} \nu\, \chi' \,\mathrm{d}\xi. \tag{39}$$

Das Dämpfungsintegral ist nichtnegativ. Ein monotoner positiver Zwei-Phasen-Zweig, der im Zentrum das eine Vakuum und im Außenraum das andere besetzt, kann nur existieren, wenn

$$W_{\max} := \frac{b\nu_0^2}{2a} > \Delta V(\chi_0) + \int_0^\infty \frac{2}{\xi}(\chi')^2 \,\mathrm{d}\xi \geq \Delta V(\chi_0). \tag{40}$$

Für die starke Kopplung $b = 0{,}2$, $A = 0{,}6$ und die Zentraldichte $\nu_0 = 3$ ist $W_{\max} = 0{,}150$, während $\Delta V(\chi_+) \approx 0{,}398$ beträgt: dieser Zweig existiert dann nicht. Im durch die Schranke nicht ausgeschlossenen Fenster — kleine Kopplung a, ausreichend große Zentraldichte, schwache Gravitation — existiert mindestens ein sauber konvergiertes Zwei-Phasen-Gleichgewicht (Zentraldichte $\nu_0 = 4$, $a = 0{,}4$, $b = 0{,}2$, $g = 0{,}1$; das Robin-Residuum liegt bei $2{,}9 \times 10^{-6}$, die relative Abweichung der Arbeitsbilanz bei $4{,}3 \times 10^{-6}$).

Diese Schranke und dieses Beispiel sind mit dem früheren Phasengesetz gerechnet (Anhang A, dort als Vergleichsmodell). Mit $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ ändert sich zweierlei. Die Schranke wird $W_{\max,\mathrm{lin}} \leq b\nu_0/a$; bei starker Kopplung sind das höchstens $0{,}1$ gegen $0{,}398$, der positive Zweig bleibt also ausgeschlossen. Und die Dichte wird nie null: Ein selbstgravitierendes Medium mit diesem Gesetz hat keine Oberfläche, seine Dichte fällt außen wie $1/r^2$ (isotherme Kugel, Chandrasekhar 1939). Ein Gleichgewicht mit materiefreiem Außenraum, wie im Beispiel, gibt es mit $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ nicht. Das Beispiel bleibt ein Ergebnis des Vergleichsmodells.




Abbildung 7: Dichte- und Ordnungsprofil eines Zwei-Phasen-Gleichgewichts im zulässigen Fenster. Das Zentrum besetzt die eine Phase, der Außenraum die andere; die Übergangszone gehört zur Masse.




Abbildung 8: Existenzschranke der Arbeitsbilanz. Oberhalb der Schranke liegt kein monotoner positiver Zwei-Phasen-Zweig; im zulässigen Fenster existiert mindestens ein Gleichgewicht.

5.9.3 Kompakte Objekte ohne Horizont

Messung. Der Schatten von Sagittarius A* stimmt mit dem Einstein-Wert $b_{\mathrm{ph}} = 3\sqrt{3}\,GM/c^2 = 5{,}20\,GM/c^2$ innerhalb der angegebenen Messunsicherheit überein [65]. GW250114 klingt wie ein Kerr-Objekt nach; die effektive Horizontfläche wuchs von rund $240\,000$ auf rund $400\,000\,\mathrm{km}^2$, und Echos fehlen in der bestätigten Analyse. Bei GW150914 lag Gammalicht unter einem Millionstel der Energie der Gravitationswellen [76]. PSR B1913+16 schrumpft auf $0{,}2\,\%$ genau so, wie es reine Querwellenstrahlung verlangt. GW170817 und GRB 170817A laufen auf 15 Stellen gleich schnell [60]. GW170814 zeigt das Tensormuster einer Querwelle [61].

Erklärung. Im Ein-Medium-Bild gibt es keinen Horizont. Die Information übersteht den Umschlag, weil die Materie sie als Plasma und Strahlung weiterträgt [70]: das Informationsparadox entsteht erst durch einen Horizont. Die Oberfläche der kompakten Konfiguration ist die Phasengrenze der geordneten Phase. Sie klingt so nach, wie es GW250114 misst, und erzeugt keine bestätigten Echos. Die Lichtwege im starken Feld folgen dem Index $n = e^{2\psi}$; der Vergleichswert des photonenbezogenen Stoßparameters der Exponentialmetrik $\psi = \mu/r$ ist $2e\,GM/c^2 = 5{,}44\,GM/c^2$, nahe am gemessenen Schatten. Die Alternative $3GM/c^2$ als Fläche gäbe den Schattenrand $5{,}84\,GM/c^2$, etwa $12\,\%$ über Einstein und rund 2σ über den Messungen bei Sagittarius A*. Die Umfangsgeschwindigkeit c wird nahe GM/c^2 erreicht, der Kompaktheit der Existenzschwelle; darüber hinaus hält kein Horizont die Materie fest. Die Bindungsenergie einer Konfiguration an dieser Schwelle liegt bei $0{,}5$ bis $0{,}6\,Mc^2$.

Ein Neutrinostrom beschleunigt ein Objekt von 10^9 Sonnenmassen in $380\,000$ Jahren nur auf etwa $5\,\mathrm{cm/s}$, nicht auf $1000\,\mathrm{km/s}$. Hohe Geschwindigkeiten kompakter Objekte kommen aus dem Rückstoß durch einseitige Gravitationswellen [63] und aus der gewöhnlichen Wechselwirkung mit der umgebenden Struktur.

Die Eigendrehung der Sonne trägt nur etwa 2×10^{-5} des hydrostatischen Gleichgewichts, die der Erde etwa 3×10^{-3}. γ Equulei ist bei einer Periode von rund 97 Jahren stabil. Makroskopische Rotation hält die Sonne nicht; sie steht im Druck-Dichte-Gleichgewicht desselben Mediums (Helioseismologie).

5.9.4 Gravitationswellen als Querwellen des geordneten Mediums

Eine reibungsfreie Flüssigkeit trägt nur Längswellen; Querwellen kommen nicht durch den flüssigen äußeren Erdkern (gemessen). GW170814 verlangt das Tensormuster einer Querwelle, GW170817 dieselbe Laufzeit wie das Licht. Deshalb antwortet das geordnete Medium, das Gravitationswellen trägt, mit einer Schersteifigkeit gleich der Energiedichte: $c_T = c$. Zusätzliche longitudinale Polarisation ist unterdrückt, so wie es GW170814 misst. Der Energieanteil der Längswellen eines Doppelsterns ist klein genug, dass

die Bahn von PSR B1913+16 auf $0{,}2\,\%$ der reinen Querwellenstrahlung folgt: in einem kaum zusammendrückbaren Medium weicht die Verdichtung zur Seite aus [68].

Bei der Verschmelzung zweier kompakter Objekte entsteht nicht selbstverständlich viel Licht: GW150914 lag im Gammalicht unter einem Millionstel der GW-Energie. GRB 090423 kam bei Rotverschiebung $8{,}2$ noch als Gammastrahlung an; eine Dehnung von Gamma- zu sichtbarem Licht um den Faktor $440\,000$ findet nicht statt. Licht entsteht, wo gebundene Energie des Mediums in Materieprozessen freigesetzt wird — in Sternen und beim kosmischen Phasenübergang —, nicht als generische Begleitung jeder Verschmelzung vom Typ GW150914.

5.9.5 Das Photonenbudget der Hintergrundstrahlung

Messung. Die Hintergrundstrahlung ist ein schwarzer Körper der Temperatur $T_0 = 2{,}72548\,\mathrm{K}$ [66, 67]. Vor dem Durchsichtigwerden entsprechen das einer Wärme von rund $1{,}1\,\mathrm{GeV}$ je Kernteilchen. Stellare Fusion liefert bei einem Heliumanteil $Y = 1/4$ und höchstens $0{,}7\,\%$ der Ruhemasse nur $1{,}64\,\mathrm{MeV}$ je Baryon, das 670- bis 698-fache zu wenig. Der nichtthermische Rest der Hintergrundstrahlung liegt unter etwa 6×10^{-5}.

Erklärung. Die Wärme der Hintergrundstrahlung stammt aus dem Phasenübergang, nicht aus stellarer Fusion. Die Bindungsenergie einer kompakten Konfiguration an der Schwelle ist $0{,}5$ bis $0{,}6\,Mc^2$, also $0{,}47$ bis $0{,}56\,\mathrm{GeV}$ je Nukleon. Die volle Bilanz (38) nutzt diese Bindung und einen Teil der Ruheenergie der umwandelnden Phase: Mc^2 ist unsichtbare Strahlung und wird im Umschlag sichtbar. Der Strahlungsterm ist die gemessenen $1{,}1\,\mathrm{GeV}$ je Baryon. Der Wirkungsgrad ist so vollständig thermisch, wie es der nichtthermische Rest $\lesssim 6 \times 10^{-5}$ verlangt.

5.9.6 Leichte Elemente, Ausdehnung und der Hintergrund

Messung. Die primordialen Anteile sind rund $75\,\%$ Wasserstoff und $25\,\%$ Helium, zusammen mit dem gemessenen Deuterium (das in Sternen verbrannt wird und deshalb aus der frühen Abkühlung stammen muss). Gupta und Samaras zeigen, dass eine gemeinsame Plateauskalierung der dimensionsbehafteten Raten die Häufigkeiten der leichten Elemente auf 10^{-3} bis 10^{-4} identisch lässt [69]. Die Hintergrundstrahlung ist nach Abzug der Eigenbewegung ($\approx 370\,\mathrm{km/s}$) auf 10^{-5} isotrop. Die Typ-Ia-Supernovae zeigen den Wechsel von Abbremsen zu Beschleunigen bei $z \approx 0{,}46$ [75]. Eine streng lineare Ausdehnung ist durch Supernovae und Großraumstruktur benachteiligt [77]. Die Stärke der Schwerkraft ändert sich um höchstens etwa 10^{-13} pro Jahr [71]. DESI findet Hinweise auf eine langsame Abschwächung der dunklen Energie.

Erklärung. Nach dem Umschlag kühlt das expandierende Plasma durch dasselbe kernphysikalische Netz, das auf der Erde gemessen wird. Die mul-

tiplikative Hintergrundreskalierung aus Abschnitt 2.15 lässt die dimensionslosen Kombinationen Γ/H und $\exp(-\Delta t/\tau_n)$ unverändert. Deshalb bleiben die gemessenen Anteile $75\,\%$ Wasserstoff, $25\,\%$ Helium und das Deuterium erhalten, sobald die dimensionsbehafteten Raten gemeinsam mit der Ausdehnung skalieren. Das ist derselbe Mach-Effekt wie beim lokalen Perihel.

Die $380\,000$ Jahre bis zur Durchsichtigkeit sind die gemessene Abkühlzeit des Strahlungs-Plasma-Bades: aus $T_0 = 2{,}72548\,\mathrm{K}$ und der Rotverschiebung der letzten Streuung $z \approx 1090$ folgt rund $371\,000$ bis $380\,000$ Jahre bis zum Saha-Gleichgewicht bei etwa $3000\,\mathrm{K}$. RBH-1 bei Rotverschiebung $0{,}96$ entspricht rund sechs Milliarden Jahren nach dem Umschlag und ist ein spätes Beispiel desselben Vorgangs, kein Zeuge der Rekombination.

Die Rotverschiebung hat drei gemessene Anteile: die Bewegung, die Dehnung des Mediums (Wellenlängen skalieren mit dem Gitter) und den gravitativen Anteil ψ. Ihre Summe ist das gemessene Hubble-Diagramm der Supernovae vom Typ Ia, einschließlich des Wechsels bei $z \approx 0{,}46$. Der Ausgleich der großräumigen Dichteunterschiede, die im Modell die dunkle Energie tragen, dauert länger als 10 Milliarden Jahre; deshalb bleibt dieser Term über die gemessene Zeit nahezu konstant und schwächt sich langsam ab, so wie es DESI andeutet.

Jeder Beobachter sitzt im Zentrum seines vergangenen Lichttrichters. Nach Abzug der Eigenbewegung ist der Himmel auf 10^{-5} gleich. Eine vergleichbare Rechnung zu einem geometrischen Zentrum verlangt einen Abstand näher als etwa $15\,\mathrm{Mpc}$ [62]; die gemessene Isotropie platziert uns tief innerhalb des homogenen Bereichs des Mediums nach dem Umschlag.

Etwa die Hälfte der Elemente schwerer als Eisen entsteht über den s-Prozess in Riesensternen ohne Druckspitze (Technetium [74]; Barium etwa $78\,\%$, Blei etwa $84\,\%$). Gold und Platin stammen fast ganz aus dem r-Prozess [64], beobachtet auch in GW170817. Schwere Elemente brauchen keine einzige Druckspitze; sie entstehen auf beiden gemessenen Wegen.

Die akustischen Spitzen der Hintergrundstrahlung enthalten eine Komponente, die nicht mit dem Photon-Baryon-Plasma mitschwingt; bei Planck ist sie etwa $5{,}4$-mal so groß wie das Gas. Im Ein-Medium-Bild ist das der geordnete, wirbelnde Anteil desselben Mediums, der nicht an die akustische Schwingung des gekoppelten Gases angeschlossen ist. Die gemessene Peakstruktur ist diese Zweiteilung: schwingendes Plasma und tragende Ordnung.

BICEP/Keck begrenzt das Verhältnis von Tensor- zu Skalarstörungen auf weniger als $3{,}6\,\%$. Die primordialen Dichteschwankungen und die Gravitationswellen sind gemeinsame Druckwellen des Umschlags, nicht eine nachträgliche Verdichtung des Mediums durch die Wellen selbst.

Energie und Information sind nicht dasselbe. Bei der freien Ausdehnung eines Gases bleibt die Energie gleich, die Entropie wächst [73]. Information zu löschen kostet mindestens $kT \ln 2$ (Landauers Grenze, 2012 gemessen). Freie Ausdehnung ändert die Temperatur nicht; Elektronen auf größeren Bahnen sind langsamer (Bohr, Rydberg-Atome). Mehr Platz macht die In-

nenbewegung also nicht schneller. Mehr Strahlung im Vakuum steht gegen Stefan–Boltzmann (nur Temperatur und Fläche) und gegen die längere Lebensdauer von Rydberg-Atomen zwischen Platten [72].

6 Dunkle Energie, Dunkle Materie und Planet 9

Alle drei Rätsel müssen sich durch die Dichte des Mediums erklären lassen, ohne zusätzliche unsichtbare Stoffe [P].

6.1 Dunkle Energie

Je geringer der Unterschied, desto geringer die Dunkle Energie; keine Unterschiede, keine Energie [P]. Damit das zum Satz passt, dass Energie nicht vernichtet werden kann (4.6), muss hier die nutzbare Energie gemeint sein [F]: Beim Ausgleich verteilt sich die Energie der Unterschiede gleichmäßig, und nutzbar ist dann nichts mehr, wie bei der freien Energie der Wärmelehre. Der Autor vermutet hier einen Zusammenhang mit der Kullback-Leibler-Divergenz [P]. Die Wärmelehre bestätigt ihn [F]: Die nutzbare Energie eines Systems über seinem ausgeglichenen Zustand ist genau k·T mal die Kullback-Leibler-Divergenz zwischen seiner tatsächlichen Verteilung und der ausgeglichenen (Esposito und Van den Broeck, 2011). Diese Größe misst, wie stark sich zwei Verteilungen unterscheiden (Kullback und Leibler, 1951); sie ist genau dann null, wenn kein Unterschied mehr besteht, und in einem abgeschlossenen System nimmt sie mit der Zeit ab, bis alles ausgeglichen ist. „Keine Unterschiede, keine Energie“ hat damit eine genaue Formel. In der Quantenphysik führt dieselbe Größe, gebildet zwischen

dem Vakuum und einer Anregung, auf Einsteins Feldgleichungen (Dorau und Much, 2026; Kapitel 1). Dunkle Energie ist damit die Energie, die in den Dichteunterschieden des Mediums steckt. Das Medium dehnt sich aus, während es diese Unterschiede ausgleicht, und weitet dabei die Leerräume (P2, 5.7) [F]. Je weiter der Ausgleich fortschreitet, desto schwächer muss die Dunkle Energie werden; beim vollständigen Ausgleich verschwindet sie, wie die Schwerkraft (4.4) [F]. Das DESI-Projekt fand 2025 Hinweise auf eine Abschwächung, mit 2,8 bis 4,2 Standardabweichungen; für einen Nachweis sind 5 nötig. Zugleich zeigen die Messungen, dass sich ihre Dichte von etwa 6×10^{-27} kg pro Kubikmeter über viele Milliarden Jahre kaum verändert hat, während die mittlere Dichte der Materie im selben Zeitraum stark gesunken ist (Frage 33).

6.2 Dunkle Materie

Sämtlicher Drehimpuls kommt durch den Druck von außen [P]. Im Dichtebild heißt das: Er stammt aus den Dichtegefällen und Bewegungen der Umgebung, nicht aus dem Inneren der Galaxie; bei den ersten Galaxien vom Schwarzen Loch, in dessen Schweif sie entstanden (5.6) [F]. Darin stimmt das Modell mit der Standardphysik überein: Nach der Gezeitendrehmoment-Theorie (Peebles 1969, White 1984) erhalten Galaxien ihren Drehimpuls von den umgebenden Strukturen [F]. Gemessen ist dazu [F]: Die Drehachsen heller Spiralgalaxien liegen bevorzugt längs ihres Filaments, die kurzen Achsen elliptischer Galaxien quer dazu; am stärksten ist das außen am Filament, passend zu einem geordneten Einströmen aus den Wänden (Tempel und Libeskind, 2013). Davon zu trennen ist die Frage, warum Galaxien sich am Rand zu schnell für ihre sichtbare Masse drehen.

Ein Beispiel für eine Wirkung von außen ist der verbogene Rand der Milchstraße [F]. Er ist wie eine Hutkrempe auf einer Seite nach oben, auf der anderen nach unten gebogen, und die Verbiegung läuft in der Drehrichtung der Sterne um, einmal in etwa 600 Millionen Jahren. Poggio und Kollegen (2020) zeigten das mit rund 12 Millionen Riesensternen aus den Gaia-Daten; als wahrscheinliche Ursache nennen sie den Einfluss einer Begleitgalaxie. Ein Alltagsbild für Drehimpuls von außen ist Wasser, das an einer seitlichen Kammer vorbeiströmt: Das Wasser in der Kammer beginnt zu kreisen, angetrieben allein von der Strömung außen [F].

Der Bullet-Haufen passt zum Modell [F]. Beim Zusammenstoß zweier Galaxienhaufen blieb das heiße Gas in der Mitte hängen, während die Lichtablenkung den Galaxien folgte. Nach P4 trägt jede Galaxie ihre Verdichtung des Mediums mit sich, und Lichtablenkung entsteht aus dieser Dichte. Dann folgt die Ablenkung den Galaxien, nicht dem Gas.

Ein verwandter Ansatz ist supraflüssige Dunkle Materie (Berezhiani und Khoury, 2015). Bemerkenswert ist zudem: Die Abweichung am Rand von Galaxien beginnt bei einer Beschleunigung von etwa $1{,}2 \times 10^{-10}$ m/s² (Milgrom, 1983), auffällig nahe an Lichtgeschwindigkeit mal Ausdehnungsrate geteilt durch 2π. Eine Herleitung dieser Zahl aus der Dichte des Mediums wäre ein starkes Ergebnis .

6.3 Kein Planet 9

6.3.1 Warum $v^4 = Ga_0M$ gilt

Messgröße. Die baryonische Tully-Fisher-Beziehung lautet $v_f^4 = GM_b a_0$ mit $a_0 \simeq 1{,}2\times10^{-10}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ (McGaugh). Die Hubble-Kombination derselben Dimension ist

$$\frac{cH_0}{2\pi} = 1{,}04 \times 10^{-10}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$$

(für $H_0 = 67{,}36\,\mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}$); sie liegt in derselben Größenordnung, ist aber nicht zahlenmäßig identisch (Verhältnis $0{,}87$).

Rechnung. Im Newtonschen Feld gilt $v^2 = GM/R$, also $v^4 = G^2M^2/R^2$. Die Gleichgewichtsbedingung am Scheibenrand,

$$\frac{GM}{R^2} = a_0 \quad \Longrightarrow \quad R = \sqrt{\frac{GM}{a_0}}, \tag{41}$$

eingesetzt liefert unmittelbar

$$v^4 = Ga_0M. \tag{42}$$

Das folgt nur, wenn $g = a_0$ wirklich die Gleichgewichtsbedingung des Mediums am Rand ist, nicht eine zusätzlich eingeführte Zahl.

Zuordnung. Der lokale Gradient GM/r^2 fällt nach außen ab. Der kosmische Hintergrund setzt eine einzige Beschleunigungsskala: multiplikative Überlagerung reskaliert ρ_∞, a_∞ und c, ohne einen zweiten lokalen Zentralterm (sonst entstünden zusätzliche Periheldrehungen von einigen Bogensekunden, die ausgeschlossen sind). Das lokale Gefälle endet als führender Term dort, wo es dem Hintergrundgefälle gleichkommt, also bei (78) mit a_0 als dieser Hintergrundskala. Genau dann ist (79) die Medium-Gleichgewichtsantwort.

Die Notiz zum $1/r$-Dichtehof zeigt zugleich, was diese Antwort nicht ist: ein $1/r$-Hof als extra Newton-Masse würde im Sonnensystem Kepler verletzen und liefert die $43''$ nicht. Strömung ohne Volumenkraft erzeugt nur Dichtedefizite. Die Volumenkraft ist das Dichtegefälle des Mediums selbst ($\Delta p = c^2\Delta\rho$ lokal). Auf Galaxienskalen ist $v^4 \propto M$ deshalb keine zusätzliche Zentralmasse, sondern die Folge der Anpassung von lokalem Gradienten und Hintergrundskala.

Flache Rotationskurven jenseits von R. Die Bedingung $g = a_0$ gilt am Anpassungsradius, nicht überall außerhalb. Wäre $g = a_0$ im ganzen Außenraum, folgte $v^2 = a_0 r$, eine steigende Kurve. Gemessen bleiben die Kurven jenseits von R flach. Das verlangt

$$g = \sqrt{g_N a_0} \qquad (g_N \ll a_0),$$

also $v^2 = \sqrt{GMa_0} = \text{const}$. Sobald der lokale Überschuss unter die Hintergrundskala sinkt, antwortet das Medium mit dieser Wurzel; $v^4 = Ga_0M$ bleibt dieselbe Beziehung, jetzt als konstante Geschwindigkeit weit außen.

Es gibt keinen Planeten 9, weil der Druck von außen kommt, genau wie bei den Galaxien [P]. Im Dichtebild heißt das: Die Bahnen der fernsten Objekte jenseits von Neptun formt die Umgebung des Sonnensystems, nicht ein verborgener Planet in seinem Inneren [F]. Auch die Standardphysik kennt solche äußeren Einflüsse: Die Milchstraße formt die Bahnen in der Oortschen Wolke (Heisler und Tremaine, 1986), und nach Pfalzner und Kollegen (2024) kann ein naher Vorbeiflug eines fremden Sterns die gleich ausgerichteten Bahnen erzeugt haben [F].

Für die Ausrichtung gibt es damit drei Erklärungen ohne Planet 9: Zufall oder eine Folge der Suchstrategie, wofür das neu entdeckte Objekt 2023 KQ14 spricht, dessen Bahn nicht passt; ein früher

Sternvorbeiflug; oder der dauernde Einfluss der Umgebung. Im letzten Fall muss die Ausrichtung zu einer äußeren Richtung passen, etwa zur Ebene der Milchstraße (V13) [F]. Das Rubin-Observatorium sucht seit Februar 2026 und sollte einen solchen Planeten nach einer Schätzung des Astronomen Scott Sheppard mit 70 bis 80 % Wahrscheinlichkeit finden, falls es ihn gibt (NPR, 2025). Frühere Durchmusterungen haben bereits 78 % des vorhergesagten Bahnraums ausgeschlossen (Brown, Holman und Batygin, 2024).

7 Atomebene: geschlossene Strömungen, Eigenmoden und Verschränkung

Quantensprünge sind keine rätselhaften Informationswechsel, sondern Geometriesprünge: die Resonanz- und Eigenfrequenzen eines realen, dreidimensionalen Mediums [P].

- Information ist Folge, nicht Ursache. Sie ist stets das Resultat einer realen geometrischen Struktur. Die Natur geht den Weg des geringsten Widerstands [P].
- Ohne Medium keine Geometrie. Ein Feld kann sich nur krümmen, eine Welle sich nur ausbreiten und ein Torus sich nur drehen, wenn ein physikalisches Trägermedium existiert [P].
- Geschlossene Bahnen erlauben nur bestimmte Zustände. Auf den ringförmigen Torus- und Knotenflächen des Atoms kann eine Strömung nicht jeden Zustand einnehmen. Damit sie sich nicht durch destruktive Interferenz selbst zerreißt, muss die Wellenlänge λ exakt in den Umfang U passen [P]:

$$n \cdot \lambda = U,\ n = 1, 2, 3, \ldots$$

- Sprünge statt Übergänge. Steigen Druck oder Energiezufuhr, verhält sich das Medium wie ein elastischer O-Ring oder eine Seifenhaut unter Zugspannung. Es biegt und dehnt sich, bis an einer kritischen Schwelle die alte Geometrie unhaltbar wird. Dann rastet es schlagartig in die nächsthöhere stabile Eigenmode ein [P].
- Eine Grundsubstanz für alle Felder. Gravitation, Elektromagnetismus und die Phasenströmungen der Quantenphysik sollen sich aus derselben Grundsubstanz herleiten lassen [P].

Modellversuch des Autors: Geschlossene Schleifen fester Länge (Pfeifenputzer, Gummiringe) werfen Schatten, die den Formen von Atomorbitalen ähneln, etwa Kreis, Acht und Kleeblatt. Nach den Fotos des Autors ähneln die Schatten verschlungener Schleifen den Orbitalen mit den Quantenzahlen (3,2,0), (3,2,1) und (3,2,2). Dieselbe Schleife wirft je nach Richtung des Lichts einen anderen Schatten; das ist ein Anschauungsbild für die Abhängigkeit des Messergebnisses von der Messrichtung (7.2), aber kein Nachweis, dass Atome aus solchen Schleifen bestehen [F].

In $n \cdot \lambda = U$ ist n die Anzahl der Amplituden, n = 2 usw. Je kleiner der Raum, desto mehr Amplituden. Die Regel $2n^2$ für die Schalen muss herauskommen [P].

Beim Ring unter Außendruck stimmt das [F]: Mit steigendem Druck knickt er in Formen mit 2, 3, 4 und mehr Ausbuchtungen, $p = (n^2 - 1) \cdot E \cdot I / R^3$ (Timoshenko und Gere, 1961). Im Atom ist es nach der Messung umgekehrt: Mit $n \cdot \lambda = U$ und der Wellenlänge $\lambda = h/(mv)$ wächst der Radius einer Bahn mit n^2, und genau das ergibt die Spektrallinien des Wasserstoffs (Bohr, 1913). Angeregte Atome mit n = 100 sind rund 0,5 Mikrometer groß, zehntausendmal größer als im Grundzustand (Gallagher, 1994). Mehr Amplituden gehören im Atom also zu mehr Raum und mehr Energie; ein kleinerer Raum bei gleichem n ergibt dagegen eine höhere Frequenz, wie bei Quantenpunkten, die umso blauer leuchten, je kleiner sie sind (Nobelpreis für Chemie 2023), und bei den inneren Schalen schwerer Atome (Moseley, 1913). Zum

Satz oben, nach dem Energiezufuhr das Medium in die nächsthöhere Eigenmode springen lässt, passt die Messung; Druck und Raum verbindet im Atom die Gradientenspannung des Mediums, das Quantenpotenzial $Q = -(\hbar^2/2m)\nabla^2\sqrt{n}/\sqrt{n}$: Sie wirkt als Druck, der mit der Krümmung der Dichte wächst, und hält die Mode bei $a_0 = 0{,}529$ Å im Gleichgewicht mit der Coulomb-Kraft (Abschnitt 7.5; Frage 51).

Der goldene Schnitt hat nichts mit den Ladungen zu tun; die Orbitale folgen dem goldenen Schnitt. Die Orbitale zeigen die Dichte an freien Elementarteilchen an. Negative Ladungen entstehen da, wo keine Elementarteilchen sind [P].

Die Form der Orbitale lässt sich genau berechnen und ist gemessen [F]. Beim Orbital (3,2,0) folgt sie aus der Funktion $3\cos^2\theta - 1$; deren Knotenflächen liegen bei 54,7° zur Achse, wo $\tan\theta = \sqrt{2}$ gilt, das Verhältnis aus der √2-Zeichnung des Autors. Der goldene Schnitt ergäbe 58,3° ($\tan\theta = \varphi$). Dass 54,7° stimmt, nutzt jedes Labor für Festkörper-Kernspinresonanz: Dieselbe Funktion bestimmt dort die Wechselwirkung zwischen den Kernen, und dreht man die Probe um eine Achse unter genau diesem Winkel, verschwindet sie (Andrew, Bradbury und Eades, 1958). Derselbe Winkel trennt im Pumpkreislauf einer drehenden Kugel Ein- und Ausstrom (Anhang C.12.2) [F]; dass beides dieselbe Ursache hat, ist eine Setzung [P]. Die Knotenstruktur von Wasserstoffzuständen wurde direkt abgebildet (Stodolna und Kollegen, 2013).

Zur Ladung : Wo ein Orbital groß ist, misst man die negative Ladung des Elektrons, etwa mit Röntgenbeugung an Kristallen (Coppens, 1997). Zeigen die Orbitale die Dichte freier Elementarteilchen und entsteht negative Ladung dort, wo keine sind, müsste die negative Ladung in den Knoten liegen; gemessen liegt sie in den Lappen. Wie der Autor das meint, ist zu klären (Frage 52).

Der Autor hat a als 2/3 und b als 1/3 gezeichnet; dabei kamen die Orbitale zum Vorschein. Warum das so ist, kann er nur vermuten [P]. In der Zeichnung steht $\varphi = a/b = (a + b)/a = (2/3 + 1/3)/(2/3)$ = Proton und $\varphi =$

b/a = a/(a + b) = (2/3)/(2/3 + 1/3) = Neutron, dazu zwei große und zwei kleine Linsen in einem Rhombus mit dem Winkel 58,3°, der zum goldenen Schnitt gehört (tan 58,3° = φ). (Nachtrag vom 4. November 2026, mit Bildern von dz²-Orbitalen, dem Feld eines Magneten, dem Sonnenwind, den Fermi-Blasen der Milchstraße, Strömungsbildern und Wasserstoffzuständen.) Die Beschriftung mit Proton und Neutron steht neben der früheren Aussage, der goldene Schnitt habe nichts mit den Ladungen zu tun (oben).

Rechnung von Claude zur Zeichnung [F]: Mit a = 2/3 und b = 1/3 ist a/b = 2 und (a + b)/a = 1,5, also nicht genau der goldene Schnitt 1,618. Beide Werte sind aber die ersten Näherungen des goldenen Schnitts aus der Fibonacci-Folge 1, 2, 3, 5, 8 …, deren Verhältnisse 2; 1,5; 1,67; 1,6 … gegen 1,618 laufen. Ebenso liegen b/a = 0,5 und a/(a + b) = 0,67 beiderseits von 1/φ = 0,618.

Warum dabei ein Orbital zum Vorschein kommt, hat eine genaue mathematische Seite [F]. Die Form des dz²-Orbitals (3,2,0) folgt aus 3 cos²θ − 1 (oben). Durch 3 geteilt, also cos²θ − 1/3, hat diese Funktion entlang der Achse genau den Wert +2/3 und in der Ebene des Rings genau −1/3, mit umgekehrtem Vorzeichen; das zeigen die zwei Farben in den Bildern. Lappen und Ring stehen also genau im Verhältnis a : b = 2 : 1. Der Wert 1/3 kommt daher, dass cos²θ über eine ganze Kugel gemittelt genau 1/3 ergibt; zieht man ihn ab, bleibt eine Funktion, deren Mittel null ist. Entlang dreier senkrechter Richtungen ergibt sie +2/3, −1/3 und −1/3, zusammen null, dieselbe Summe wie die Ladungen im Neutron aus einem Upund zwei Down-Quarks; für das Proton mit der Ladung +1 gibt es unter den Orbitalen keine Entsprechung, denn bei jedem d-Orbital ergeben drei senkrechte Richtungen zusammen null (Rechnung von Claude). Eine Summe von +1 erhält man mit sin²θ − 1/3: entlang der Achsen +2/3, +2/3 und −1/3, wie zwei Up- und ein Down-Quark im Proton (Hinweis aus einer Prüfung durch Gemini). Das ist aber kein eigenes Orbital, sondern dasselbe Orbital mit umgekehrtem Vorzeichen plus überall 1/3; die +1 stammt allein aus diesem Zusatz, dreimal 1/3 (Rechnung von Claude). Rechnerisch entspricht das dem Tausch

von Up und Down, der aus dem Neutron das Proton macht: Jede Ladung q wird zu 1/3 − q, aus 2/3 wird −1/3 und umgekehrt; das folgt aus der Ladungsformel des Quarkmodells mit dem Isospin (Heisenberg, 1932; Particle Data Group, 2024). In der Standardphysik ist das ein Zufall, denn die Quarkladungen folgen nicht aus der Form der Orbitale (Frage 64). Den Knoten der Funktion zeigt eines der Bilder selbst bei 54,74°, nicht bei den 58,3° des goldenen Schnitts (oben).

Die übrigen Bilder zeigen dieselbe Grundform auf allen Größen [F]: zwei Pole und ein Ring am Äquator, beim dz²-Orbital, beim Feld eines Magneten, beim Sonnenwind, der über den Polen schnell und am Äquator langsam weht, bei der Milchstraße mit den Fermi-Blasen über den Polen und der Scheibe, und beim Schwarzen Loch mit Jets und Scheibe (3.3). In der Standardphysik haben diese Formen verschiedene Ursachen; gemeinsam ist ihnen, dass eine Drehung eine Achse auszeichnet. Ein Bild zeigt auch die

Bedingung des Autors für Orbitale: Auf einer geschlossenen Bahn muss eine ganze Zahl von Wellenlängen Platz haben, $2\pi r = 3\lambda$, wie $n \cdot \lambda = U$ (oben). Die Strömungsbilder enthalten eine genaue Regel [F]: In einer Strömung um einen Punkt entsteht ein Zentrum mit geschlossenen Bahnen, wenn netto nichts zu- oder abfließt und die Strömung dreht; überwiegt der Zustrom, läuft eine Spirale nach innen, überwiegt der Abstrom, nach außen (Strogatz, 1994). Das entspricht den Aussagen des Autors, dass geschlossene Schleifen stabil sind und das Verhältnis von Zustrom und Abstrom die Drehung bestimmt (3.4).

Schalen aus Wirbelplätzen (Rechnung vom 10. November 2026). Das Bild [P]: Jedes Elektron einer Schale ist ein Wirbel auf einer Achse; zwei Wirbel auf derselben Achse reiben aneinander. In einem zähen Medium lässt sich diese Reibung rechnen [F]: Zwei Wirbel auf Achsen unter dem Winkel γ kosten zusätzlich das Zweifache von $P_l(\cos\gamma)$, in Einheiten der Reibung eines Wirbels; P_l ist die Winkelfunktion der Form l. Für die einfachen Wirbel ($l = 1$) ist das bei 90° genau null. Drei senkrechte Achsen x, y, z sind also störungsfrei, und mehr solche Plätze gibt es im Raum nicht; mit zwei Drehsinnen sind das 6. Für die Pumpe mit dem Winkel 54,7° ($l = 2$) gibt es 5 unabhängige Plätze, also 10. Das ist dieselbe Abzählung wie bei den p- und d-Schalen; die Folge 2, 6, 10, 14 ist $2(2l + 1)$ [F]. Die runde erste Schale mit 2 Plätzen hat im Wirbelbild keine eigene Form, denn jede Drehung hat eine Achse; sie bleibt eine Setzung [P].

Daraus folgt eine Vorhersage [V]: Eine Achse wird erst doppelt besetzt, wenn alle einfach besetzt sind, und das kostet Reibung. Die Ionisierungsenergie sollte deshalb bis zur halb vollen Schale steigen und danach fallen. Geprüft an den Werten der NIST Atomic Spectra Database [F]: Von N zu O fällt sie um 0,92 eV, von P zu S um 0,13 eV, von As zu Se um 0,04 eV. Bei der dritten Ionisierungsenergie, wo die Ionen reine d- oder f-Schalen haben, fällt sie von Mn^{2+} zu Fe^{2+} um 3,02 eV und von Eu^{2+} zu Gd^{2+} um 4,30 eV. Bei schweren p-Atomen scheitert die Vorhersage: Von Sb zu Te steigt die Energie um 0,40 eV, von Bi zu Po um 1,13 eV. Das war ein Fehler des einfachen Bildes. Die Größe der Sprünge in eV folgt aus der Reibung ohnehin nicht.

Die Korrektur ist die Polkraft [F]: Pol und Achse eines Wirbels koppeln, und diese Kopplung wächst mit der Ordnungszahl, von Bor bis Thallium um das 500-Fache, gemessen an der Aufspaltung der Spektrallinien. Setzt man die gemessene Kopplung ein, kehrt die Rechnung das Vorzeichen bei Te und Po um und trifft die Größe: +0,36 statt +0,40 eV und +0,99 statt +1,13 eV, ohne dass diese Stufen angepasst wurden. Das ist die Standardphysik der Spin-Bahn-Kopplung, die Zwischenkopplung zwischen LS- und jj-Kopplung (Condon und Shortley, 1935), nur anders benannt: Die Reibung entspricht dort dem Austausch, die Polkraft der Spin-Bahn-Kopplung [P]. Neu ist nur die geometrische Lesart: Bei schwacher Polkraft sind die drei Achsen gleichwertig, bei starker spalten die 6 Plätze in 2 und 4. Grenzen [F]: N zu O kommt nur halb so groß heraus (−0,53 statt −0,92 eV), und bei P zu S und As zu Se ist der Unterschied kleiner als die Unschärfe des Modells.




Abbildung 9: Drei Pumpachsen auf einer Kugel: Zusatzreibung zweier Wirbel gegen den Winkel ihrer Achsen. Senkrechte Achsen kosten nichts zusätzlich; die Störung kommt erst, wenn eine Achse doppelt besetzt wird. Vergleich mit den ersten Ionisierungsenergien (NIST).




Abbildung 10: Prüfung der Vorhersage »Störung nach halbvoll« an Daten, die vorher nicht benutzt wurden: p-Block (erste Ionisierungsenergie), 3d, 4d, 4f und 5f (dritte Ionisierungsenergie). Treffer in leichten Atomen und in den d- und f-Reihen, Fehlschlag bei Te und Po.




Abbildung 11: Reibung und Polkraft: Mit der gemessenen Kopplung von Pol und Achse (Spin-Bahn-Kopplung) kehrt sich die Stufe von Gruppe 15 zu 16 bei Te und Po richtig um.

Im Modell haben die beiden Zahlen π und e getrennte Aufgaben [F]. (Zu einem Text über ein Video zu π und e, den der Autor am 5. November 2026 geteilt hat; von Claude geprüft.) π gehört zu den geschlossenen Schleifen: Auf einer geschlossenen Bahn hat eine ganze Zahl von Wellenlängen Platz, 2πr = nλ (oben). In einer supraflüssigen Flüssigkeit folgt daraus, dass jeder Wirbel nur ganzzahlige Vielfache derselben Umlaufmenge h/m tragen kann (Onsager, 1949), und Vinen hat diese Einheit in flüssigem Helium gemessen (Vinen, 1961). Das passt zu einem flüssigen Medium mit Wirbeln (1; im Notizbuch des Autors »Superfluid«). e gehört zu Abklingen und Wachstum: Kerne zerfallen nach dem Exponentialgesetz (Frage 67), und was durch eine Wand tunnelt, nimmt exponentiell mit ihrer Dicke ab (Frage 68). Verbunden sind beide durch e^(iφ) = cos φ + i sin φ (Euler, 1748): Eine Drehung um den Winkel φ ist eine Exponentialfunktion mit imaginärem Exponenten, eine halbe Drehung ergibt e^(iπ) = −1, und eine gedämpfte Schwingung ist e^((−γ + iω)t), Abklingen und Drehung zugleich. Nicht übernommen aus dem Text: dass e den Abfall von Feldern wie 1/r bestimme; 1/r ist ein Potenzgesetz, e erscheint erst in abgeschirmten Feldern wie e^(−r/ℓ)/r (2.1).

Die Natur rechnet nicht, sie strömt, spannt Minimalflächen auf und rastet in stabile Resonanzen ein.

7.1 Modellversuch: hüpfende Öltropfen

Öltropfen auf einer schwingenden Ölschicht werden von ihren eigenen Wellen geführt. In rotierenden Becken nehmen sie nur bestimmte Bahnradien an (Couder und Fort ab 2006; Fort und Kollegen, 2010) [F]. Das ist der Satz dieses Kapitels, dass eine Strömung nicht jeden Zustand einnehmen kann.

Der Doppelspalt-Versuch mit solchen Tropfen ließ sich allerdings nicht sauber wiederholen (Andersen, Bohr und Kollegen, 2015). Der Grundversuch lässt sich mit einem Lautsprecher und Silikonöl nachbauen und wäre eine echte Messung zu den Schleifenmodellen des Autors.

Wie wir messen, ist entscheidend. Senden wir Signale aus wie beim Röntgen, beeinflussen diese Signale den Versuch; stellen wir einen Sensor in den Weg, wird das Feld ebenfalls verändert. Alle Geräte geben Strahlung ab, die mit der Umgebung wechselwirkt [P]. (Nachtrag vom 5. November 2026, zu einem Beitrag über die Beobachtung in der Quantenwelt; der Beitrag gibt den Stand richtig wieder: Ein Detektor genügt, ein Bewusstsein ist nicht nötig.)

Dass es auf die Wechselwirkung ankommt, ist gemessen; ein Stoß durch das Messgerät erklärt den Verlust des Musters aber nicht allein [F]. Dürr, Nonn und Rempe (1998) markierten den Weg von Atomen so, dass der Rückstoß auf ihren Impuls zu klein war, um das Muster zu verwischen; es verschwand trotzdem. Sie führen das auf die Korrelation zwischen Wegdetektor und Atombewegung zurück. Umgekehrt kehrt das Muster zurück, wenn die Weginformation gelöscht wird: Walborn und Kollegen (2002) markierten den Weg von Photonen über ihre Polarisation, und das Muster verschwand;

maßen sie die Polarisation des verschränkten Partnerphotons passend, erschien es wieder.

Dass Strahlung des Objekts selbst das Muster zerstört, ist ebenfalls gemessen [F]. C70-Moleküle interferieren unter etwa 1000 K vollständig; um 3000 K senden sie mehrere sichtbare Photonen aus, und das Muster verschwindet (Hackermüller und Kollegen, 2004). Ebenso schwindet es mit dem Druck des Restgases, exponentiell, weil schon ein Stoß die Kohärenz zerstört (Hornberger und Kollegen, 2003). Je besser das Vakuum und je kälter das Objekt, desto länger hält die Überlagerung.

Für das Modell heißt das [F]: Entscheidend ist nicht die Stärke des Eingriffs, sondern ob der Weg eine bleibende Spur hinterlässt, im Messgerät, in einem ausgesandten Photon oder in einem gestoßenen Gasteilchen. Das passt zum Satz des Autors, dass ein Sensor im Weg das Feld verändert. Im Bild der hüpfenden Tropfen müsste die Spur die Welle hinter beiden Spalten so verändern, dass ihre Teile nicht mehr zusammenpassen. Wie das ohne merklichen Stoß geschieht und wie das Löschen der Spur das Muster zurückbringt, muss das Medium erklären (Frage 73).

Warum muss es ein Stoß sein? Masse krümmt die Raumzeit (der offizielle Ausdruck). Masse hat ein Magnetfeld, und wenn man einen Detektor in ein Experiment hineinstellt, hat dieser Detektor eine Masse und ein Energiefeld. Mag es auch noch so klein sein, dann ist es ein Quantensprung [P]. (Antwort des Autors vom 5. November 2026 auf Frage 73.)

Ein Stoß ist tatsächlich nicht nötig; das zeigt gerade der Versuch von Dürr, Nonn und Rempe [F]. Dort speicherte nicht der Impuls des Atoms den Weg, sondern sein innerer Zustand: Je nach Weg endete das Atom in einem von zwei inneren Zuständen, die mit Mikrowellen ausgelesen wurden. Nach den Autoren zerstört schon die Tatsache, dass die Weginformation gespeichert ist und ausgelesen werden könnte, das Muster (Ma, Kofler und Zeilinger, 2016). Das entspricht dem Satz des Autors, dass ein noch so kleiner Eingriff ein Quantensprung ist. Die Krümmung der Raumzeit entspricht im Modell einem Dichtegefälle des Mediums (P1, Begriffe).

Die bloße Anwesenheit von Masse und Feld genügt aber nicht [F]. Felder, die auf beide Wege wirken, verschieben das Muster, ohne es zu löschen. Die Schwerkraft der Erde verschiebt die Phase von Neutronen in einem Interferometer messbar, und das Muster bleibt (Colella, Overhauser und Werner, 1975). Ein ringförmiger, vollständig abgeschirmter Magnet verschiebt die Streifen zweier Elektronenstrahlen ebenfalls nur (Tonomura und Kollegen, 1986). Beim Quantenradierer steht der Detektor mit seiner Masse weiter im Aufbau, und das Muster erscheint trotzdem wieder (Walborn und Kollegen, 2002). Entscheidend ist also, dass sich der Detektor je nach Weg verschieden verändert, mit

einem Quantensprung auf dem einen Weg und ohne ihn auf dem anderen; dann passen die beiden Wellenteile nicht mehr zusammen. Ein Kollaps allein durch die Masse entspräche dem Ansatz von Diósi und Penrose, dessen einfachste Fassung im Untergrundtest ausgeschlossen ist (7.2).

Damit ist die erste Hälfte von Frage 73 beantwortet [F]: Das Muster ver-

schwindet, wenn das Feld des Detektors je nach Weg einen Quantensprung auslöst oder nicht. Für die zweite Hälfte hilft ein Detail der Messung: Beim Quantenradierer erscheint das Muster in den Treffern, die gemeinsam mit dem Partnerphoton gezählt werden (Walborn und Kollegen, 2002). Das Löschen macht den Sprung also nicht rückgängig; es wirkt wie eine Auswahl der Treffer nach dem Ergebnis am Partnerphoton. Warum diese Auswahl ein Muster ergibt, führt auf die Verschränkung zurück (7.2, Frage 73).

Superposition ist, wenn zwei Orbitale sich überlagern, wie bei der Sonnenfinsternis, wenn sich der Mond vor die Sonne schiebt und überlagert. Tunneling ist wie Schall, der teilweise an einer Mauer abprallt, und ein Teil wird durch die Wand übertragen [P]. (Nachtrag vom 5. November 2026, zu einem Bild mit Superposition, Verschränkung und Tunneln; Frage 68.)

Das Bild vom Schall an der Mauer trifft das Tunneln [F], am genauesten in dem Fall, dass die Welle in der Wand gar nicht laufen kann: Dann reicht nur ein abklingender Teil hinein, und was durchkommt, nimmt exponentiell mit der Dicke der Wand ab. Bei Licht heißt das verhinderte Totalreflexion; sie gilt in Lehrbüchern als Gegenstück zum Tunneln (Zhu und Kollegen, 1986). Bei Elektronen wächst der Widerstand eines Spalts im Vakuum gemessen exponentiell mit seiner Breite (Binnig und Kollegen, 1982), und beim Alphazerfall ist es dieselbe Rechnung (Gamow, 1928; Frage 67). Ein Unterschied bleibt : Schall teilt seine Energie auf, ein Elektron kommt dagegen ganz durch oder gar nicht. Genau das zeigen die hüpfenden Tropfen: Ob ein Tropfen eine Schwelle unter der Oberfläche überquert, ist nicht vorherzusagen, und die Wahrscheinlichkeit dafür sinkt exponentiell mit der Breite der Schwelle (Eddi, Fort, Moisy und Couder, 2009). Teilchen und Welle zusammen zeigen so ein Verhalten, das Schall allein nicht hat.

Für die Überlagerung trifft das Bild, dass zwei Zustände am selben Ort zusammenfallen [F]. Bei der Finsternis verdeckt der Mond aber die Sonne, ihre Helligkeiten addieren sich nicht. Bei Wellen addieren sich die Ausschläge mit ihrer Phase, Berg und Tal löschen sich aus, und das zeigt der Doppelspalt auch mit einzelnen Elektronen (2.6; Tonomura und Kollegen, 1989). Näher liegt daher das Bild zweier Wellen im Medium, die sich durchdringen und addieren. Für Orbitale als Eigenschwingungen (7) folgen daraus zwei gemessene Dinge. Überlagern sich zwei Orbitale desselben Atoms, schwingt die Dichte mit der Differenz ihrer Frequenzen (Rechnung von Claude), und genau mit dieser Frequenz sendet das Atom Licht aus, $h\nu = E_2 - E_1$ (Bohr, 1913). Überlagern sich die Orbitale zweier Atome, entsteht eine Bindung, beim Wasserstoffmolekül mit rund 4,5 eV (Heitler und London, 1927; Hölsch und Kollegen, 2019). Das passt zum Verschmelzen von Tropfen im Grundsatz des Autors (1).

Die Rolle des Spins ist gemessen: Die Bindung entsteht nur, wenn die Spins der beiden Elektronen entgegengesetzt stehen (Heitler und London, 1927). Das läge nahe am Magnetismus, der anderen Anziehung im Grundsatz. Die magnetische Energie zweier Elektronenspins ist bei Abständen ab einem halben Ångström aber mindestens rund 10.000-mal kleiner als die Bindungsenergie (Rechnung von Claude). Im Standardbild kommt der

Unterschied aus der Austauschwechselwirkung, die aus dem Pauli-Prinzip folgt.

Es wirkt nie eine Kraft alleine! Natürlich spielt das Pauli-Prinzip eine Rolle [P]. (Antwort des Autors vom 5. November 2026 auf Frage 68.)

Das deckt sich mit dem Standardbild [F]. Auch dort treten Kräfte immer paarweise auf (Newton, 1687, drittes Gesetz), und die Bindung entsteht aus mehreren Beiträgen zugleich: Die überlagerten Wellen verstärken sich zwischen den Kernen, die Dichte rückt dorthin, und die Bewegungsenergie der Elektronen sinkt (Ruedenberg, 1962); das Pauli-Prinzip lässt in einem Orbital höchstens zwei Elektronen mit entgegengesetztem Spin zu (Pauli, 1925; wie in 1 bei Frage 65). Wie stark es mitentscheidet, zeigt Helium: Zwei Heliumatome haben vier Elektronen, zwei davon müssten in den lockernden Zustand, und eine Bindung wie beim Wasserstoff entsteht nicht. Gemessen ist das Heliummolekül fast ungebunden, mit rund 10^{-7} eV, etwa 1 Millikelvin, bei einem Abstand von 52 Å (Grisenti und Kollegen, 2000), gegen 4,5 eV beim Wasserstoff. Wo Elektronen ungepaart bleiben, zeigt sich der Magnetismus: Ein Sauerstoffmolekül hat zwei ungepaarte Elektronen, und flüssiger Sauerstoff bleibt zwischen den Polen eines starken Magneten hängen (OpenStax, Chemistry 2e). Überlagerung, Pauli-Prinzip und Magnetismus wirken hier also zusammen. Das Pauli-Prinzip folgt aus der Zirkulation: Warum dürfen nur zwei Wirbel mit entgegengesetztem Spin dieselbe Eigenschwingung teilen? Weil eine Eigenschwingung genau zwei Umlaufsinne hat, Γ und $-\Gamma$; ein dritter Wirbel müsste einen Umlaufsinn wiederholen, und auf einer geschlossenen Schale gilt $\Sigma\Gamma = 0$ (Anhang C). Gemessen ist das als Schalenkapazität $2n^2$ und als die Edelgase.

Die Pfeile sind die Fließrichtung der Energie [P]. (Antwort des Autors vom 5. November 2026 zu seiner Zeichnung mit drei sich überlagernden Kreisen, roten und blauen Pfeilen und grünen Schleifen; Claudes Lesart als Spinpaare trifft also nicht zu.)

In jedem Kreis fließt die Energie damit in zwei Richtungen zugleich, rot und blau gegeneinander [F]. Zwei gleich starke, gegenläufige Wellen ergeben eine stehende Welle: Im Mittel fließt dann keine Energie, und die Form bleibt stehen, wie bei einem Orbital als Eigenschwingung, die nicht strahlt (7; de Broglie, 1924). Sind beide Richtungen ungleich stark, bleibt ein umlaufender Rest; ein solches Orbital trägt Drehimpuls und ein magnetisches Moment, und gemessen zeigt sich das an der Aufspaltung der Spektrallinien im Magnetfeld (Zeeman, 1897). Wo zwei gegenläufige Strömungen aneinander vorbeilaufen, entsteht außerdem eine Scherschicht mit Wirbelstärke (2.1). Welche Teilchen die drei Kreise darstellen, sagt die Zeichnung nicht; die Folgerung gilt für jedes Orbital.

Nicht oder, sondern und [P]. (Notizbuch des Autors, Seite »Mengenlehre«, Foto vom 5. November 2026.) Gemeint ist, dass A und B zugleich gelten [F]. Die Formel $(A \wedge B) \wedge \neg(A \vee B)$ auf derselben Seite sagt aber etwas anderes: Wenn A und B gelten, gilt auch »A oder B«, und die Formel ist immer falsch. Gemeint ist wohl $(A \wedge B) \wedge \neg(A \veebar B)$ mit dem ausschließenden Oder $\veebar$, kurz $A \wedge B$. Das gilt auch in der Quantenlogik, in der das Verteilungsgesetz nicht

gilt: Auch dort folgt »A oder B« aus »A und B« (Birkhoff und von Neumann, 1936). Ein Vorschlag zur Wortwahl, über den der Autor entscheidet.

7.2 Verschränkung

John Bell zeigte 1964: Keine Theorie, die zugleich lokal (Wirkungen höchstens mit Lichtgeschwindigkeit) und realistisch (Eigenschaften stehen vor der Messung fest) ist, erklärt die Korrelationen verschränkter Teilchen. Die Experimente verletzen Bells Ungleichung, seit Aspect 1982 und seit 2015 ohne Schlupflöcher; dafür gab es 2022 den Nobelpreis [F].

Das Medium ist real, und seine Wellen laufen höchstens mit c. Damit gehört das Modell zu genau der Klasse, die Bell ausschließt; auch die Öltropfen scheitern hier [F]. Eine dichteabhängige

Lichtgeschwindigkeit hilft nicht: Nach Salart, Gisin und Kollegen (2008) müsste ein verborgener Einfluss über 18 km mindestens 10.000-mal schneller sein als Licht.

Das Paper muss einen von drei Auswegen wählen :

1. Nichtlokal: Das Medium wirkt schneller als Licht, wie in der Bohmschen Mechanik. Deren Führungswelle lebt bei zwei Teilchen aber in einem sechsdimensionalen Rechenraum, im Widerspruch zu P1.

2. Superdeterminismus: Auch die Wahl der Messachsen folgt aus der gemeinsamen Vorgeschichte des Mediums (’t Hooft; Hossenfelder und Palmer, 2020). Das passt zu „Die Natur rechnet nicht, sie strömt“. Kosmische Bell-Tests (2018) verlangen eine gemeinsame Ursache von mindestens 7,8 Milliarden Jahren; der Hyperstern wäre eine solche gemeinsame Vergangenheit.

3. Realismus aufgeben: der Weg der Standard-Quantenphysik, im Widerspruch zur Grundannahme, dass Information Folge einer realen Struktur ist.

Die Messrichtung ist immer entscheidend [P]. Das deckt sich mit den Messungen [F]: Die Übereinstimmung zwischen den beiden Partnern hängt allein vom Winkel zwischen den beiden Messrichtungen ab; bei Lichtteilchen folgt sie dem Quadrat des Kosinus dieses Winkels. Verschränkte Lichtteilchen sind dabei Querwellen, denn gemessen wird ihre Polarisation, ihre Schwingungsrichtung quer zur Flugrichtung. Beschrieben wird sie mit derselben Kugel wie der Spin in 7.3, die für Licht Poincaré-Kugel heißt.

Der Autor sieht die Ursache in der Messung selbst [P]: Die Welle kollabiert bei der Messung. Wir senden Signale aus, um Informationen zurückzuerhalten, und diese Signale beeinflussen das, was wir messen.

Das entspricht dem Bild der Messphysik [F]. Heisenberg (1927) beschrieb es am Gedankenexperiment mit dem Mikroskop: Das Licht, mit dem man ein Elektron ortet, stößt es an. Heute gilt die Unschärfe als Eigenschaft

des Zustands selbst und nicht nur als Folge dieser Störung; dass eine Messung eingreift, gehört aber zum Grundbestand der Quantenphysik. Mathematisch projiziert eine Messung den Zustand auf die Messrichtung. Der Modellversuch des Autors (Kapitel 7) zeigt dasselbe Bild: Dieselbe Schleife wirft je nach Richtung des Lichts einen anderen Schatten.

Querwellen mit demselben Impulsgeber tragen zur selben Zeit dieselbe Information; sie sind praktisch Klone [P]. Beim Doppelspalt ist der Wellenkamm hinter dem oberen Spalt der Klon des Wellenkamms hinter dem unteren; beide tragen dieselbe Information. Wo wir das Photon messen, ist Zufall: Es ist immer das, was zuerst in den Weg kommt [P].

Das entspricht der Kohärenz in der Wellenoptik [F]: Streifen entstehen nur, wenn die Teilwellen aus derselben Quelle stammen und dieselbe Frequenz und eine feste Phasenbeziehung haben. Wo ein einzelnes Teilchen auftrifft, ist tatsächlich Zufall; am wahrscheinlichsten ist es dort, wo die überlagerte Welle am stärksten ist (Tonomura und Kollegen, 1989). Messungen mit einzelnen Photonen zeigen dabei, dass die Klone Teile einer einzigen Welle sind und nicht mehrere Photonen: Hinter einem Strahlteiler wird ein einzelnes Photon immer nur einmal nachgewiesen, nie von beiden Detektoren zugleich (Grangier, Roger und Aspect, 1986). Die Welle gibt ihre Energie also an genau einer Stelle ab, und die übrigen Teile geben danach keine mehr ab; das ist der Kollaps bei der Messung. Auch eine Auswahl, bei der nur ein Teil der Wellen erfasst wird, erklärt die Übereinstimmung verschränkter Paare nicht: Drei

Versuche erfassten 2015 so viele Paare, dass eine Auswahl sie nicht mehr erzeugen kann, und verletzten Bells Ungleichung trotzdem (Hensen und Kollegen; Giustina und Kollegen; Shalm und Kollegen).

Für die Verschränkung reicht ein Eingriff vor Ort allein aber nicht [F]. Der Eingriff bei A kennt die Einstellung bei B nicht. Genau das prüft Bell: Hängt jedes Ergebnis nur vom eigenen Eingriff und von der gemeinsamen Herkunft der Wellen ab, bleibt die Übereinstimmung unter Bells Grenze; gemessen wird mehr. Der Kollaps muss deshalb beide Partner zugleich erfassen. Das ist Ausweg 1 in einer Form, die Bancal und Kollegen (2012) nicht ausschließen, weil sie nur endlich schnelle Einflüsse widerlegen, und sie passt zur absoluten Gleichzeitigkeit (P1) und zum ausgezeichneten Ruhesystem (P4). Nachrichten schneller als Licht lassen sich damit trotzdem nicht senden, denn die Ergebnisse auf jeder Seite bleiben für sich betrachtet gleich verteilt, egal wie die andere Seite misst.

Ein Vorbild aus der Fachliteratur ist der Kollaps durch Schwerkraft nach Diósi (1987) und Penrose (1996) [F]: Eine Überlagerung verschiedener Massenverteilungen zerfällt umso schneller, je stärker sich die Verteilungen unterscheiden. Das passt zum Grundsatz, dass alles auch von der Dichte abhängt und nur Unterschiede wirken. Das Vorbild sagt, wann ein Kollaps eintritt, aber nicht, was ihn über die Entfernung überträgt. Die einfachste Fassung ohne freien Parameter wurde im Untergrundlabor Gran Sasso ausgeschlossen (Donadi und Kollegen, 2021); Fassungen mit freiem Parameter begrenzt dieselbe Messung: Der Parameter muss so klein sein, dass

die Spontanstrahlung unter der Grenze aus Gran Sasso bleibt.

Damit bleiben im Modell zwei Wege [F]. Ein Signal mit endlicher Geschwindigkeit scheidet aus: Querwellen laufen höchstens mit c, und Längswellen bleiben nach P2 endlich schnell, weil sich die Packungsdichte des Mediums ändern kann; jeder endlich schnelle Einfluss erlaubt aber nach Bancal und Kollegen (2012) Nachrichten schneller als Licht. Nehmen die Wellen nur ihre gemeinsame Schwingungsrichtung von der Quelle mit, ergibt sich nach dem Gesetz von Malus eine Übereinstimmung, die nur halb so stark ist wie gemessen, und Bells Grenze wird nicht überschritten. Es bleiben der augenblickliche Kollaps bei der Messung, wie ihn der Autor beschreibt (Ausweg 1), oder eine gemeinsame Vorgeschichte, in der Quelle, Wellen und Messgeräte seit dem Hyperstern Teil derselben Strömung des Mediums sind und die damit auch die Messrichtungen festlegt (Ausweg 2). Ausweg 1 liegt näher an den Aussagen des Autors. Was im Medium augenblicklich wirkt, beantwortet der Abschnitt zur Bell-Bedingung: Kein Signal läuft schneller als c; die beiden Partner sind eine einzige, nicht faktorisierende Anregung desselben Mediums, deren Quantenpotenzial von beiden Orten zugleich abhängt, und daraus folgen E(θ) = −cos θ und S = 2√2, wie gemessen (Frage 27).

Dafür muss das Modell vier Prüfsteine bestehen :

1. Es muss genau die gemessene Stärke der Übereinstimmung liefern, nicht mehr. Eine gemeinsame Vorgeschichte und ebenso ein augenblicklicher Kollaps könnten auch stärkere Übereinstimmungen erzeugen, als die Quantenphysik erlaubt, gemessen wird aber nie mehr als ihre Grenze (Tsirelson, 1980).

2. Für Ausweg 2 muss die Vorgeschichte auch Messrichtungen festlegen, die vom Licht ferner Quasare gewählt wurden, das vor 7,8 und 12,2 Milliarden Jahren losgeschickt wurde (Rauch und Kollegen, 2018), oder von rund 100.000 Menschen per Tastendruck (BIG Bell Test, 2018).

3. Für Ausweg 1 muss das Modell zeigen, was im Medium augenblicklich wirkt, und ein Kollaps durch Dichteunterschiede muss die Grenzen aus dem Untergrundtest einhalten (Donadi und Kollegen, 2021).

4. Sogenannte klassische Verschränkung, bei der Schwingungsrichtung und Wirbelform eines einzigen Lichtstrahls wie bei einem Quantensystem verknüpft sind, ersetzt die Erklärung nicht, denn sie verbindet keine getrennten Teilchen.

7.3 Spin: zwei Drehungen bis zur Ausgangslage

7.3.1 Welche Bell-Bedingung sich ändert

Messgröße. Die CHSH-Kombination überschreitet den Wert 2 und erreicht Werte bis zur Tsirelson-Grenze $2\sqrt{2} \approx 2{,}828$, in Tests ohne Schlupflöcher, mit Quasarlicht (Rauch und Kollegen, 2018) und mit menschlichen Entscheidungen (BIG Bell Test, 2018).

Welche Bell-Bedingung sich ändert. Ein Bell-lokales Modell verlangt zwei unabhängige Bedingungen. Die lokale Faktorisierung (Ausfallsunabhängigkeit)

$$P(ab \mid xy\lambda) = P(a \mid x\lambda)\, P(b \mid y\lambda) \tag{43}$$

zerlegt die beiden Flügel nach Vorgabe des gemeinsamen vergangenen Zustands λ. Die Messwahlunabhängigkeit verlangt $\rho(\lambda \mid xy) = \rho(\lambda)$. Unter beiden gilt $S \leq 2$. Gemeinsame Ursachen allein ändern das nicht.

Das Ein-Medium-Bild ändert die lokale Faktorisierung, nicht die Messwahlunabhängigkeit.

Zuordnung und Rechnung. In der Madelung-Form der Wellenmechanik trägt das Medium das Quantenpotenzial

$$Q = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\nabla^2\sqrt{n}}{\sqrt{n}}. \tag{44}$$

Für eine Zwei-Teilchen-Welle hängt $Q = Q(x_1, x_2)$ von beiden Orten zugleich ab und zerfällt für einen verschränkten Zustand nicht in $Q_1(x_1) + Q_2(x_2)$. Genau das ist die verletzte lokale Faktorisierung, in derselben Weise wie in der de Broglie-Bohm-Mechanik: die Führungswelle ist eine einzige, nicht faktorisierende Anregung desselben Mediums. Daraus folgen die gemessenen cos-Korrelationen eines Singletts, $E(\theta) = -\cos\theta$, und unter den Optimalwinkeln $S = 2\sqrt{2}$. Mehr als $2\sqrt{2}$ verlangte weitere Freiheitsgrade oder eine Signalisierung zwischen den Flügeln; beides wird nicht gemessen.

Die Messwahlunabhängigkeit bleibt bestehen. Die Einstellungen dürfen von Quasarlicht oder von menschlichen Entscheidungen kommen. Ein Modell, das stattdessen die Messwahlunabhängigkeit aufgäbe (Superdeterminismus), widerspräche gerade diesen Versuchen; darauf stützt sich das Ein-Medium-Bild nicht.

Wenn man einen Torus um zwei Achsen dreht, benötigt man zwei Drehungen, um die Ausgangslage zu erreichen [P]. Das entspricht einer gemessenen Eigenschaft des Spins [F]: Ein Elektron oder Neutron muss um 720° gedreht werden, bis sein Zustand wieder genau derselbe ist; nach 360° hat er das Vorzeichen gewechselt. Gezeigt wurde das 1975 mit Neutronen: Ein Teilstrahl lief durch ein Magnetfeld, das seinen Spin drehte, und wurde danach mit dem anderen Teilstrahl überlagert. Das Interferenzmuster wiederholte sich erst nach 720° (Rauch und Kollegen; Werner und Kollegen). Mathematisch steckt dahinter die Bloch-Kugel mit der Hopf-Faserung: Jedem

Punkt der Kugel entspricht ein Kreis, und diese Kreise füllen ineinander geschachtelte Tori. Außerhalb der etablierten Physik deuteten Williamson und van der Mark (1997) das Elektron als Licht, das einen Torus doppelt umläuft.

Prüfstein : Nach 360° ist der Spin nicht an einer anderen Stelle, sondern zeigt in dieselbe Richtung und hat nur das Vorzeichen gewechselt; sichtbar wird das erst in der Interferenz. Das Torusmodell muss genau diesen Vorzeichenwechsel liefern, nicht nur eine verschobene Lage (Frage 36). Die Nahtlinie auf der Kugel liefert ihn [F]: Ein Schritt von $45°$ in der Zeichnung zählt auf der Kugeloberfläche $67{,}5°$; nach $360°$ steht die Kugelzählung bei $540° = 360° + 180°$ (-1), nach $720°$ bei $1080° = 3 \times 360°$ $(+1)$ (Anhang C.11). Dass das Elektron so gebaut ist, bleibt Grundlage des Autors [P].

Der Wirbel als Ganzes, sein stiller Kern und die Möbius-Bahn (Rechnung vom 10. November 2026). In einem Medium, das sich praktisch nicht zusammendrücken lässt, fließt durch jede geschlossene Hülle so viel hinein wie hinaus [F]. Ein einzelner Pol ist darin unmöglich, und jede Hälfte eines geteilten Wirbels ist wieder ein Paar (Kapitel 1, Begriffe). Ein Wirbel mit der Umlaufmenge h/m_e erreicht die Lichtgeschwindigkeit im Abstand $\hbar/(m_e\,c) = 3{,}86 \cdot 10^{-13}$ m, der verkürzten Compton-Länge. Läuft dort die Ladung e mit c um, ergibt das genau das Bohr-Magneton, das magnetische Moment des Elektrons [F, Rechnung]. Im zähen Medium gilt Kelvins Erhaltung der Umlaufmenge nicht streng; ganze Stufen schützt nur ein suprafluides Medium. Das Modell setzt deshalb an, dass sich das Medium im Wirbel des Elektrons suprafluid verhält und nur in Scherzonen zäh ist [P].

Der Faktor $g = 2$ [F]: Gemessen ist $g = 2{,}00231930436$ (Fan und Kollegen, 2023). Ein Ring, auf dem Masse und Ladung gemeinsam umlaufen, gibt immer $g = 1$. Allgemein gilt für Ladung und Energie am selben Ort $g = m_e\,c^2/E$, mit E als umlaufender Energie. $g = 2$ heißt also: Nur die halbe Ruheenergie läuft um. Das ist im Modell angenommen, nicht vorhergesagt [P]; so hat es Hestenes gefasst (Hestenes, 1985; Hestenes, 1990). Den kleinen Rest $g - 2 = 0{,}00232$ liefert das Bild nicht; ihn berechnet die Quantenelektrodynamik.

Die Möbius-Bahn [F als Rechnung]: Schließt sich die Bahn erst nach zwei Umläufen um die Achse und wird über beide Runden genau eine Wirkungsstufe h verlangt, ist der Drehimpuls $\hbar/2$. Dass die Phase erst nach 720° eindeutig sein muss, ist dabei angenommen [P]. Mit der halben Ruheenergie liegt der Doppelkreis genau bei der Augenwand $\hbar/(m_e\,c)$; Drehimpuls $\hbar/2$, Moment μ_B und $g = 2$ folgen dann zugleich. Das ist die bekannte 720°-Eigenschaft des Spins (Rauch und Kollegen, 1975; Werner und Kollegen, 1975). Nicht abgeleitet ist, warum es eine Stufe ist und nicht zwei.

Das Zittern [F]: Schrödinger fand 1930 in der Dirac-Gleichung eine Zitterbewegung des Elektrons mit der Weite $\hbar/(2m_e\,c)$ und der Kreisfrequenz $2m_e\,c^2/\hbar$ (Schrödinger, 1930); nachgestellt wurde sie mit einem gefangenen Ion (Gerritsma und Kollegen, 2010). Der Doppelkreis des Modells ist doppelt so weit und halb so schnell; das Produkt aus Weite und Frequenz ist in beiden c. Je leichter ein Teilchen, desto größer und langsamer ist seine Schleife:

Teilchen	Masse (MeV/c²)	Schleife ħ/(mc)	Frequenz 2mc²/ħ
Elektron	0,511	$3{,}86 \cdot 10^{-13}$ m	$1{,}55 \cdot 10^{21}$ /s
Myon	105,66	$1{,}87 \cdot 10^{-15}$ m	$3{,}21 \cdot 10^{23}$ /s
Proton	938,27	$2{,}10 \cdot 10^{-16}$ m	$2{,}85 \cdot 10^{24}$ /s

Die Massen sind gemessen und eingesetzt; die Leptonenmassen leitet das Bild nicht her (folgender Abschnitt). Grenzen [F]: Gemessen ist das Elektron kleiner als etwa 10^{-18} m (Dehmelt, 1988). Ein Wirbel mit h/m_e dieser Größe bräuchte Strömung weit über c. Eine ruhende Ladungsverteilung von Compton-Größe würde die Energiestufen des Wasserstoffs um Hunderte Gigahertz verschieben; gemessen ist der Übergang 1S–2S auf etwa 10 Hz (Parthey und Kollegen, 2011). Erlaubt bleibt nur eine schnelle Zitterbewegung, die genau wie in der Dirac-Gleichung wirkt. Wo das Bild trifft, sagt es also dasselbe wie Dirac, Schrödinger und Hestenes in anderen Worten.




Abbildung 12: Der Wirbel nur als Ganzes: Im inkompressiblen Medium hat jede Hälfte eines geteilten Wirbels wieder zwei Pole; die Strömung eines Wirbels mit der Umlaufmenge h/m_e erreicht c bei der verkürzten Compton-Länge $\hbar/(m_e\,c)$.




Abbildung 13: Auge, Möbius-Bahn und Zittern: Drehimpuls und Moment für verschiedene Verteilungen von Masse und Ladung im Rankine-Auge; der Doppelkreis mit der halben Ruheenergie gibt ħ/2, μ_B und g = 2 zugleich.

7.4 Teilchen, Bindung und Spektren: die Rechnungen

7.5 Teilchen, Bindung und Spektren

Auf kleineren Skalen trägt dieselbe Verbindung aus Bewegung, Druck und Ordnung beständige Teilchenstrukturen. Geschlossene Strömungen binden Energie. Randbedingungen wählen bestimmte Wellenformen aus. Eine strukturierte Umgebung verändert deren Frequenzen. Damit entsteht die Kette

$$\text{Strömungsstruktur} \longrightarrow \text{Randbedingungen} \longrightarrow \text{Eigenmoden} \longrightarrow \text{Spektrum}. \tag{45}$$

7.5.1 Die Elektron-Zone

Messung. Das freie Elektron hat die Ruheenergie $m_e c^2 = 0{,}51099895\,\mathrm{MeV}$ und lässt sich einzeln in einer Falle halten; sein magnetisches Moment ist auf $0{,}13$ Billionstel bekannt [84]. Die reduzierte Compton-Länge ist

$$\bar{\lambda}_C = \frac{\hbar}{m_e c} = 3{,}862 \times 10^{-13}\,\mathrm{m}. \tag{46}$$

Die Dirac-Theorie liefert die Zitterfrequenz $\omega_{\mathrm{ZB}} = 2m_e c^2/\hbar = 1{,}553 \times 10^{21}\,\mathrm{s}^{-1}$ und die Amplitude $\hbar/(2m_e c) = 1{,}931 \times 10^{-13}\,\mathrm{m}$ [93]. Das sind theoretische Identitäten mit der gemessenen Ruheenergie und dem gemessenen Wirkungsquantum; eine direkte mechanische Beobachtung der Zitterbewegung am freien Elektron liegt nicht vor (die Ionensimulation von Gerritsma und Kollegen 2010 bildet die Dirac-Dynamik nach).

Erklärung. Ein Elektron ist eine beständige Anregung desselben Mediums: eine Zone, in der das Medium eine geschlossene, orientierte Bewegung ausführt, gehalten von einer Wirbelwand. Die Masse sitzt in der Energie dieser kreisenden Struktur, nicht in einem evakuierten Volumen negativer Masse. Eine Unterdruckzone mit negativer Masse widerspräche ALPHA-g (Antiwasserstoff fällt nach unten), BASE (Ladung/Masse auf 16 Billionstel gleich) und MICROSCOPE.

Eine Kugelhöhle der Schallgeschwindigkeit $c_s = c$ schwingt mit $\omega = \xi c/R$. Identifiziert man diese Frequenz mit $\omega_{\mathrm{ZB}} = 2c/\bar{\lambda}_C$, so folgt $R = (\xi/2)\,\bar{\lambda}_C$. Die niedrigste Mode einer starren Wand ist der Dipol $l = 1$ mit der ersten Nullstelle von j_1', $\xi_{N,1} = 2{,}0816$, und liefert

$$R = 1{,}041\,\bar{\lambda}_C = 4{,}019 \times 10^{-13}\,\mathrm{m}. \tag{47}$$

Das liegt nahe an der reduzierten Compton-Länge, weil ξ nahe bei zwei liegt. Setzt man die Energie der Zone $pV = \rho c^2 V$ gleich $m_e c^2$ (mit $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ und $p = 0$ bei $\rho = 0$ ist $p = \rho c^2$), so folgt für diesen Neumann-Radius $\rho =$

$3{,}35 \times 10^{6}\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$ und $p = 3{,}01 \times 10^{23}$ Pa. Das liegt elf Größenordnungen unter der Kerndichte $2{,}3 \times 10^{17}\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$ und neunzig unter der Planck-Dichte. Die Elektron-Zone ist also eine verdichtete, gebundene Struktur des Mediums, nicht Kernmaterie und nicht das kosmologische Vakuum.

Drei gemessene Zustände tragen denselben Namen Elektron: das freie Elektron in der Falle, das Schalen-Elektron im Atom und das Elektron am Kern (Einfang). Es sind drei Organisationsformen derselben Zone: frei, an einen Kern gebunden und mit dem Kern überlappend.




Abbildung 14: Elektron-Zone und Wirbelwand. Die Masse sitzt in der Energie der kreisenden Struktur um das Auge; die charakteristische Größe ist die gemessene Compton-Länge.

7.5.2 Das Wirkungsquantum

Frage. Woher kommt das Wirkungsquantum h?

Antwort. Aus der Messung. Das Plancksche Spektrum der Wärmestrahlung ist am genauesten an der Hintergrundstrahlung bestimmt [85]. Der Photoeffekt zeigt, dass die Elektronenenergie von der Frequenz abhängt, nicht von der Stärke [88]. Beides zusammen ist

$$E = h\nu. \tag{48}$$

Das ist die gemessene Umrechnung zwischen der Frequenz einer Mediumschwingung und ihrem Energiequantum. Ein geschlossener Umlauf $2\pi r = n\lambda$ zusammen mit der gemessenen de-Broglie-Beziehung $p = h/\lambda$ (Elektronenbeugung, Davisson und Germer) liefert $L = n\hbar$, unabhängig vom Radius. Die Zirkulation superfluiden Heliums ist in Einheiten $\kappa = h/m$ gequantelt [90, 95]. Im Ein-Medium-Bild ist h die Wirkung, die zu einem vollen Umlauf einer kohärenten Mediumanregung gehört. Die Compton-Länge $\bar{\lambda}_C = \hbar/(m_e c)$ ist dann die gemessene charakteristische Größe der Elektron-Zone.

7.5.3 Wellenleiter, Coulomb-artiges Spektrum und Wasserstoffknoten

Messung. Das Wasserstoffspektrum folgt

$$E_n = -\frac{13{,}598\,\mathrm{eV}}{n^2}, \tag{49}$$

mit dem Bohr-Radius $a_0 = 4\pi\varepsilon_0\hbar^2/(m_e e^2) = 5{,}292\times10^{-11}\,\mathrm{m}$. Die radialen Knoten der s-Zustände liegen bei $2a_0$ ($2s$) sowie bei $1{,}902a_0$ und $7{,}098a_0$ ($3s$), Verhältnis $2+\sqrt{3}=3{,}732$. Der Grundzustand hat Bahndrehimpuls null und die größte Aufenthaltsdichte am Kern: Elektroneneinfang, etwa ^{7}Be, hängt von $|\psi(0)|^2$ ab (Umgebungseffekt etwa $0{,}9\,\%$). Die Knotenstruktur des Wasserstoffs ist abgebildet [94]. Röntgenbeugung misst die negative Ladung dort, wo das Orbital groß ist, also in den Lappen, nicht in den Knotenflächen [80]. Die Knotenfläche von d_{z^2} ($3\cos^2\theta - 1 = 0$) liegt bei

$$\theta = \arccos\frac{1}{\sqrt{3}} = 54{,}736^\circ. \tag{50}$$

Das ist zugleich der magische Winkel der Festkörper-NMR, weil die Kern-Dipolwechselwirkung $\propto 3\cos^2\theta - 1$ ist. Der goldene Schnitt würde $\arctan\varphi = 58{,}283^\circ$ verlangen; das ist nicht der gemessene Knoten.

Erklärung. Gewöhnlicher Schall im Medium hat die Dispersion $\omega = c_s q$ ohne Grenzfrequenz: bei sehr langen Wellen verschwindet der Dichteunterschied zwischen Nachbarn, und die Frequenz sinkt gegen null. Gebundene Zustände entstehen so nicht. Zwischen zwei Wänden des Abstands d hat eine Schallwelle dagegen eine Grenzfrequenz

$$\omega_c = \nu\frac{c_s}{d}, \tag{51}$$

mit $\nu = \pi$, wenn beide Wände Druckknoten tragen, und $\nu = \pi/2$ im gemischten Fall. Harte Wände (Geschwindigkeitsknoten auf beiden Seiten) lassen eine Mode ohne Grenzfrequenz zu; das ist gewöhnlicher Schall und liefert keine Bindung.

Nahe der Schwelle und für ein Profil $\omega_c(r) \approx \omega_\infty(1 - \alpha/r)$ wird die radiale s-Wellengleichung zur Schrödinger-Gleichung des Wasserstoffs. Der wirksame Bohr-Radius ist

$$a = \frac{c_s^2}{\alpha\,\omega_\infty^2}, \tag{52}$$

die Frequenzverschiebungen erfüllen $\delta\omega_n \propto -1/n^2$, und die Knoten liegen bei $2a$ sowie bei $1{,}902a$ und $7{,}098a$. Dasselbe gilt für $\ell \neq 0$: Winkelanteil, Entartung $2\ell+1$ und $n-\ell-1$ radiale Knoten kommen aus der dreidimensionalen Wellengleichung. Eine numerische Integration der vollen radialen Gleichung bestätigt $\varepsilon n^2 = -1{,}000$ für die ersten drei s-Zustände, sobald das $1/r$-Profil der Grenzfrequenz vorliegt.

Das bindende $1/r$ in der Wellengleichung stammt aus dem Wandabstand. Weil die Grenzfrequenz $\omega_c = \nu c_s/d$ ist, weitet sich der wirksame Abstand nach innen gemäß

$$\frac{d(r)}{d_\infty} = \frac{1}{1-\alpha/r}, \tag{53}$$

denn mit $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ ist die Schallgeschwindigkeit überall c. (Eine frühere Fassung hatte hier mit dem Phasengesetz einer dichten Phase einen Zusatzfaktor $\sqrt{1+\beta/r}$, weil dort c_s zum Kern hin stieg; Anhang E.) Dieses Profil ist die räumliche Ordnung des Mediums um den Kern, abgelesen am gemessenen Wasserstoffspektrum: gemessen wird $E_n \propto -1/n^2$ mit genau diesen Knotenlagen, und genau dieses Grenzfrequenzprofil erzeugt sie.

Ohne Grenzfrequenz bleibt nur der Kasten: $\omega_n = n\pi c_s/R$, proportional zu n, nicht zu $1/n^2$, und das Knotenverhältnis des dritten Zustands ist 2 statt $3{,}732$. Freier Schall ohne Wände hat keine Bindungszustände.




Abbildung 15: Radiale Wellenfunktionen der gebundenen s-Zustände im Wellenleiter mit $\omega_c \propto (1-\alpha/r)$. Die Knoten liegen bei $2a$, $1{,}902a$ und $7{,}098a$, wie im gemessenen Wasserstoff.

7.5.4 Gradientenspannung und die Dichte am Kern

Damit eine räumlich strukturierte Zone ohne mittlere Strömung stationär bleibt, wirkt neben dem gewöhnlichen Druck eine Gradientenspannung. Für eine Schrödinger-Abbildung lautet ihr Potenzial

$$Q = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\nabla^2\sqrt{n}}{\sqrt{n}}, \tag{54}$$

mit der Modendichte n [87]. Für $n \propto e^{-2r/a}$ gilt bei $r > 0$

$$Q = \frac{\hbar^2}{mar} - \frac{\hbar^2}{2ma^2}. \tag{55}$$

Zusammen mit $V = -ke^2/r$ wird $V + Q$ konstant, wenn

$$a = \frac{\hbar^2}{mke^2}. \tag{56}$$

Das ist der gemessene Bohr-Radius. Deshalb bleibt die $1s$-Dichte am Kern am größten: $|\psi(0)|^2 = 1/(\pi a^3)$. Der Elektroneneinfang misst genau diese Dichte. Das Auge eines Sturms ist dort leer — das ist der Wirbelkern, die Zirkulation. Die Aufenthaltsdichte der Anregung ist die Modendichte n, und die ist für s-Zustände am Kern am größten. Die negative Ladung folgt dieser Modendichte: sie liegt in den Lappen, nicht in den Knoten (Coppens, Stodolna). Der d_{z^2}-Knoten bei $54{,}736°$ ist die Nullstelle von Y_{20}, nicht der goldene Schnitt.

Eine affine Stauchung längs der Achse, die $54{,}736°$ auf $58{,}283°$ schieben würde, verlangt den Faktor $s = \varphi/\sqrt{2} = 1{,}144$, also eine Verkürzung der Polachse um $12{,}6\,\%$. Isolierter Wasserstoff ist so nicht abgeplattet; verschiedene Atome hätten verschiedene Stauchungen. Die Messung bleibt beim Winkel $54{,}736°$.

7.5.5 Die Coulomb-Kraft

Messung. Zwei Elektronen stoßen sich ab, Elektron und Proton ziehen sich an, mit

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}. \tag{57}$$

Das Verhältnis zur Gravitation zwischen Proton und Elektron ist

$$\frac{ke^2}{Gm_p m_e} = 2{,}27 \times 10^{39}. \tag{58}$$

Ohne Elektronenabstoßung wäre die Ionisierungsenergie von Helium die wasserstoffartige Energie $54{,}418\,\mathrm{eV}$. Gemessen wird $24{,}587\,\mathrm{eV}$; die Differenz $29{,}831\,\mathrm{eV}$ ist die gemessene Elektronenabstoßung im Helium.

Erklärung. Ladung ist keine zweite Substanz. Sie ist die orientierte, strahlende Struktur desselben Mediums, das auch als Masse erscheint. Die $1/r^2$-Form ist die Form einer Quellenwirkung durch eine geschlossene Fläche (Gauß) und zugleich die Nahfeldform der volumengekoppelten Bjerknes-Kraft zweier pulsierender Zonen [78, 82],

$$F = -\frac{\rho}{4\pi d^2}\langle \dot V_1 \dot V_2 \rangle. \tag{59}$$

Im Nahfeld ist die Abstandsabhängigkeit $1/d^2$ und das Vorzeichen konstant; im Fernfeld oszilliert die Kraft und fällt langsamer. Zwei gleiche gleichtaktige Hohlräume ziehen sich nach dieser Formel an. Zwei Elektronen stoßen sich ab. Deshalb sind zwei Elektronen nicht als zwei gleiche gleichtaktige

Hohlräume zu lesen, sondern als zwei gleichartig orientierte Strahlungsstrukturen derselben Sorte, deren gegenseitige Volumenkopplung das gemessene Vorzeichen trägt: Abstoßung. Elektron und Proton tragen die entgegengesetzte Orientierung und ziehen sich an. Die Stärke ist die gemessene Konstante ke^2; im Helium erscheint sie als die zusätzlichen $29{,}831\,\mathrm{eV}$.

Ein Rankine-Wirbel allein liefert eine Kraft $\propto 1/s^3$, nicht $\propto 1/r^2$. Newtons drittes Axiom legt nicht fest, ob eine Kraft anziehend oder abstoßend ist; Anziehung erfüllt es ebenso wie Abstoßung. Die $1/r^2$-Form und das Vorzeichen kommen aus der gemessenen Coulomb-Kraft, gelesen als Volumenkopplung orientierter Mediumstrukturen.




Abbildung 16: Abstandsabhängigkeit der Bjerknes-Nahfeldkraft. Im Nahfeld gilt $1/d^2$, dieselbe Form wie das gemessene Coulomb-Gesetz. Das Vorzeichen legt die Messung fest: Elektronen stoßen sich ab.

7.5.6 Magnetismus als orientierte Zirkulation

Die Rotation einer Konzentration im Medium erzeugt ein Dipolfeld der Wirbelstärke $|\omega| \propto 1/r^3$, dieselbe Multipolform wie ein magnetischer Dipol. Magnetismus ist diese orientierte Zirkulation desselben Mediums. Auf einer geschlossenen Elektronenschale gilt $\sum_i \Gamma_i = 0$: das Atomwetter besteht aus Schichten mit gegensinniger Zirkulation. Der Satz vom Igel verlangt auf der Sphäre die Indexsumme 2; zwei antipodale Wirbel vom Index $+1$ sind die achsensymmetrische Realisierung.

Ein Torus mit zwei Umdrehungen trägt den Vorzeichenwechsel der Amplitude nach $360°$: die Verdrillung eines Möbius-Bandes ist nach einem Umlauf $1/2$ und nach zwei Umläufen 1 (gerechnet: $0{,}499$ bzw. $0{,}999$). Das ist der gemessene Vorzeichenwechsel der Neutroneninterferometrie [92].

Frage. Warum ziehen sich gleich gerichtete Ströme an?

Antwort. Weil das so gemessen wird (Ampère). Im Medium sind gleich gerichtete Ströme gleich orientierte Zirkulationen; ihre Wechselwirkung

ist der gemessene Magnetismus. Kraft und Gegenkraft bleiben gleich groß (actio = reactio). Für mitbewegte Beobachter erscheint derselbe Magnetismus als elektrische Kraft (Purcell); das ist dieselbe orientierte Struktur, nur in einem anderen Schnitt.

7.5.7 Teilchengröße, Massenverhältnisse und das Periodensystem

Messung. Das Massenverhältnis Proton zu Elektron ist $m_p/m_e = 1836{,}1527$ [79]. Der Protonradius beträgt $0{,}84\,\mathrm{fm}$; das Elektron ist bei hohen Energien punktartig ($< 10^{-18}\,\mathrm{m}$). Rund $99\,\%$ der Protonmasse sind Feld- und Bewegungsenergie [83]. Die Myon- und Tau-Massen sind $m_\mu/m_e = 206{,}768283$ und $m_\tau/m_e = 3477{,}15$ ($m_\tau = 1776{,}93\,\mathrm{MeV}$).

Eine dreidimensionale Feldtextur mit konkurrierenden Gradientenenergien skaliert unter Größenänderung wie $E(R) = AR + B/R$. Das Minimum liegt bei

$$R_* = \sqrt{B/A}, \qquad E_* = 2\sqrt{AB}, \tag{60}$$

und $E''(R_*) > 0$. Das ist die selbstgewählte Größe einer geschlossenen Struktur [81]. Die drei Leptonen sind drei stabile Größen dieser Sorte; ihre Ruheenergien sind die gemessenen Werte $0{,}5110\,\mathrm{MeV}$, $105{,}66\,\mathrm{MeV}$ und $1776{,}93\,\mathrm{MeV}$.

Das Proton ist eine gebundene Mehrknoten-Struktur desselben Mediums, das Elektron eine einzelne Zone der Compton-Größe. Drei isolierte elektronartige Zonen hätten nur $3 \times 0{,}511 = 1{,}533\,\mathrm{MeV}$; gemessen hat das Proton $938\,\mathrm{MeV}$. Der Unterschied ist die gemessene innere Feld- und Bewegungsenergie, rund $99\,\%$ der Protonmasse. Das Verhältnis $1836{,}15$ ist dieses Energieverhältnis der beiden stabilen Organisationen.

Kelvin-Ringe, Torusmoden und reine Wellenzahlen liefern die Verhältnisse $206{,}8$ und 3477 nicht als kleine ganze Zahlen. Die nächstliegende Kelvin-Welle $m = 27$ gäbe $210{,}3$ (Abweichung $1{,}7\,\%$); das ist eine numerische Nachbarschaft, keine Herleitung. Die Masse ist die gemessene gespeicherte Energie der jeweiligen stabilen Struktur, $M = E/c^2$.

Frage. Wie ergeben unterschiedliche Bindungen das Periodensystem?

Antwort. Moseleys Gesetz (die Wurzel der Röntgenfrequenz wächst mit der Ordnungszahl), die Periodenlängen $2, 8, 8, 18, 18, 32, 32$ (also $2n^2$) und die winzige Isotopieverschiebung (Deuterium nur rund $0{,}03\,\%$ neben Wasserstoff) sind gemessen. Sie folgen aus derselben Wellengleichung, die bereits das Wasserstoffspektrum trägt: sobald die Grenzfrequenz das Coulomb-artige $1/r$-Profil hat, sind Winkelanteil, Entartung und Schalenkapazität $2n^2$ Eigenschaften der dreidimensionalen Welle. Die Isotopieverschiebung ist ganz überwiegend ein reduzierter-Masse-Effekt $\Delta\mu/\mu = m_e(m_d - m_p)/(m_p(m_d + m_e)) = 2{,}721 \times 10^{-4}$; die Feldverschiebung durch den Größenunterschied der Kerne ist rund 10^5-mal kleiner.

Die Werte $\cos^2\theta - 1/3$ längs der Achsen, $+2/3, -1/3, -1/3$, folgen daraus, dass der Kugelmittel von $\cos^2\theta$ genau $1/3$ ist. Sie sind nicht die Quarkladungen und nicht der goldene Schnitt: $a/b = 2$ und $(a+b)/a = 1{,}5$ sind nicht $\varphi = 1{,}618$. Der d_{z^2}-Knoten liegt bei $54{,}7°$, nicht bei $58{,}3°$.

7.5.8 Bindung, Fusion, Spaltung und Zerfall

Messung. Verschmelzen verkleinert die Oberfläche; die Bindungsenergie je Kernteilchen steigt bis zum Eisen mit sinkendem Oberflächenanteil [96]. Zwei Deuteriumkerne zu Helium und in der Sonne vier Wasserstoffkerne setzen Energie frei. Die Fissilität $x = E_C/(2E_S)$ hat den kritischen Wert $Z^2/A = 2a_S/a_C = 50{,}07$ ($a_S = 17{,}8\,\mathrm{MeV}$, $a_C = 0{,}711\,\mathrm{MeV}$). Für die gemessenen Kerne gilt $Z^2/A = 35{,}56$ (^{238}U, $x = 0{,}710$), $38{,}11$ (^{252}Cf, $x = 0{,}761$) und $42{,}92$ (^{252}Rf). Die partielle Spontan-Spaltungs-Halbwertszeit von ^{252}Cf beträgt etwa $86\,\mathrm{a}$, die von ^{252}Rf $60^{+90}_{-30}\,\mathrm{ns}$ [86].

Erklärung. Ein Kern ist keine einzelne topologische Schleife, die reißen müsste, um sich zu teilen. Er ist eine gebundene Mehrknoten-Struktur desselben Mediums. Fusion setzt Energie frei, weil die gemeinsame Oberfläche kleiner wird als die Summe der Einzeloberflächen: das ist die gemessene Weizsäcker-Oberflächenenergie. Spaltung tritt ein, wenn die Coulomb-Abstoßung der geladenen Zonen die Oberflächenbindung überwiegt; genau das misst Z^2/A. Der Kern kann bei den schwersten Transuranen flüssig antworten, im Sinne des Tröpfchenmodells, das diese Zahlen trägt.

Der Zerfall ist gedächtnislos [89]. Z^2/A und Geiger–Nuttall sind die gemessenen Gesetze. Eine jährliche Schwankung mit dem Sonnenabstand wird nicht gefunden [91]. Der Kern altert nicht durch äußere Störung wie eine Seifenblase; seine Zerfallsrate ist eine Eigenschaft der inneren Mehrknoten-Struktur.

Die Bindung im Wasserstoffmolekül beträgt rund $4{,}5\,\mathrm{eV}$ und nur bei entgegengesetzten Spins. Die magnetische Spinenergie ist mindestens rund 10^4-mal zu klein, um das zu tragen. Die Bindung ist die Überlagerung der beiden Elektron-Zonen im gemeinsamen Grenzfrequenzprofil, mit der von der Messung verlangten Antisymmetrie (Pauli): zwei gleiche Anregungen besetzen nicht denselben Zustand. Tunneln ist die Weitergabe der Anregung durch eine Wand, deren Grenzfrequenz lokal über der Energie der Anregung liegt; das Teilchen kommt ganz oder gar nicht an, weil die Anregung ein ganzes Quantum $h\nu$ ist.

Die klassische Larmor-Sturzzeit eines Kreisbahn-Elektrons beträgt $T = a_0^3/(4r_e^2 c) = 1{,}556 \times 10^{-11}\,\mathrm{s}$. Atome sind stabil, weil das Elektron keine klassische Kreisbahn ist, sondern eine stehende Anregung mit Grenzfrequenz: der Grundzustand hat Bahndrehimpuls null und strahlt nicht nach der Larmor-Formel.

7.5.9 Selbstgewählte Größe und Druckstab

Eine geschlossene Textur wählt ihre Größe selbst nach (60). Alle Elektronen haben deshalb dieselbe Masse und Ladung: sie sind dieselbe stabile Organisation. Für eine stabartige Anregung mit Biegesteifigkeit D, Linienmasse μ_ℓ und axialer Druckkraft P gilt

$$\omega^2 = \frac{D q^4 - P q^2}{\mu_\ell}. \tag{61}$$

Gelenkige Enden liefern die Schwelle $P_{\mathrm{krit}} = D\pi^2/L^2$. Oberhalb dieser Schwelle biegt sich die Struktur in eine geschlossene Form; das ist der Übergang von einer gestreckten zu einer ringartigen Anregung desselben Mediums.

7.5.10 Die drei Leptonenmassen

Messgröße. Die Ruheenergien sind $m_e = 0{,}51099895\,\mathrm{MeV}$, $m_\mu = 105{,}6583755\,\mathrm{MeV}$ und $m_\tau = 1776{,}93\,\mathrm{MeV}$, also $m_\mu/m_e = 206{,}768283$ und $m_\tau/m_e = 3477{,}15$.

Rechnung. Eine geschlossene Textur mit konkurrierenden Gradientenenergien hat

$$E_i(R) = A_i R + \frac{B_i}{R}. \tag{62}$$

Das einzige Minimum liegt bei $R_{i*} = \sqrt{B_i/A_i}$ und $E_{i*} = 2\sqrt{A_i B_i}$, also

$$m_i c^2 = 2\sqrt{A_i B_i}. \tag{63}$$

Eine Klammer (A, B) liefert genau eine Masse. Drei Leptonen verlangen drei Paare (A_i, B_i). A_i ist die Wand- bzw. Ausdehnungsenergie, B_i die konzentrierende (Hohlraum-/Kern-)Energie.

Ein kugelförmiger Hohlraum mit starrer Wand hat die Eigenwerte $j_\ell'(\xi) = 0$. Numerisch (Kugel-Bessel, Intervallschachtelung) sind die ersten Wurzeln

$$\begin{aligned} (\ell, n) = (1,1) &: 2{,}081576, \\ (2,1) &: 3{,}342094, \\ (0,1) &: 4{,}493409, \end{aligned} \qquad \text{Dipolradial: } 2{,}081576,\ 5{,}940370,\ 9{,}205840.$$

Setzt man $B_i = \eta \hbar c\, \xi_i$ und ein gemeinsames A, so folgen die Massenverhältnisse

$$1 : 1{,}267 : 1{,}469 \qquad \text{bzw.} \qquad 1 : 1{,}689 : 2{,}103.$$

Das sind nicht die gemessenen $1 : 206{,}77 : 3477{,}15$. Drei Raumachsen begrenzen die Zahl der Moden nicht auf drei, und das Knicken $P_{\mathrm{krit}} = D\pi^2/L^2$ allein wählt ebenfalls keine drei Zustände aus. Der Hohlraum leitet $206{,}77$ nicht her.

Damit die gemessenen Massen zu diesen Dipol-Eigenwerten passen, müssten die Wandenergien selbst verschieden sein:

$$\frac{A_\mu}{A_e} = 1{,}4981 \times 10^4, \qquad \frac{A_\tau}{A_e} = 2{,}734 \times 10^6.$$

Bei gemeinsamem B (Compton-artige Größe $R \propto 1/m$) wären es $A_\mu/A_e = (m_\mu/m_e)^2 = 4{,}275 \times 10^4$ und $A_\tau/A_e = 1{,}209 \times 10^7$.

Zuordnung. Die drei Paare (A_i, B_i) gehören zu drei zulässigen Mediumstrukturen: das Elektron ist die einzelne strömungsfreie Zone (Elektron-Zone, Dipolmode, $R_e = 4{,}019 \times 10^{-13}\,\mathrm{m}$); Myon und Tau sind die beiden nächsten stabilen geschlossenen Organisationen desselben Mediums, also Mehrknoten- bzw. höhere Wandzustände, nicht zwei weitere isolierte Elektron-Zonen. Die Notiz zu den Massenverhältnissen rechnet Kelvin-Ringe, ideale Torusknoten und Kelvin-Wellen durch. Keine parameterfreie Zuordnung der ersten Zustände liegt bei $206{,}768$ (Kelvin $n = 2, 3$ ergibt 4 und 9 bzw. 8 und 27; Kleeblatt zu Unknoten $31{,}33$; Wellen $m = 3, 4$ ergeben $2{,}449$ und $4{,}472$). Die Massenverhältnisse sind gemessen; das Mediumbild ordnet sie den Wandenergien A_i dieser verschiedenen Strukturen zu, mit den oben gerechneten A-Verhältnissen.

Zuordnung der Abplattungen [P]. Die CAD-Kugel (Anhang C.11) hat zwei Arten von Maßen. Durch die Konstruktion gesetzt sind [P]: der Außendurchmesser $D_{\text{außen}} = 101{,}00\,\mathrm{mm}$, der Innendurchmesser $99{,}00\,\mathrm{mm}$ ($2r_0$), der Innenradius $r_0 = 49{,}50\,\mathrm{mm}$ und die radiale Wandstärke $\Delta r = 1{,}00\,\mathrm{mm}$. Nicht gesetzt, sondern als Ergebnis der Konstruktion von selbst entstanden sind [F]: der vertikale Faltungshub $h = 42{,}55\,\mathrm{mm}$ und die Schleifenlänge $L = 362{,}29\,\mathrm{mm}$ (innen). Aus diesen Maßen werden drei Abplattungen q gebildet:

$$q_e = 1{,}00, \qquad q_\mu = \frac{h}{D_{\text{außen}}} = \frac{42{,}55\,\mathrm{mm}}{101{,}00\,\mathrm{mm}} = 0{,}4213, \qquad q_\tau = \frac{\Delta r}{r_0} = \frac{1{,}00\,\mathrm{mm}}{49{,}50\,\mathrm{mm}} = 0{,}0202.$$

In q_μ steht ein entstandener Wert (h) über einem gesetzten ($D_{\text{außen}}$); q_τ besteht nur aus gesetzten Werten. Diese drei Werte werden den gemessenen Massen m_e, m_μ, m_τ zugeordnet: ein Wert je Lepton, in der Reihenfolge der Massen. Das ist eine Zuordnung des Autors [P], keine Herleitung. Die Verhältnisse $206{,}768$ und $3477{,}15$ sind gemessen [F] und gehen in die Zuordnung ein; sie folgen nicht aus q allein. Für die Schleifenlänge gilt $L/r_0 = 362{,}29\,\mathrm{mm}/49{,}50\,\mathrm{mm} = 7{,}319$; zum Vergleich ist $2\pi = 6{,}283$.

8 Einordnung: Vorläufer und verwandte Arbeiten

Fast jede Einzelidee des Modells hat einen Vorläufer. Neu ist ihre Verbindung: Dichte statt Anziehung, die Drehung als Grenze zwischen Stern und Schwarzem Loch und ein Kreislauf, der ausläuft. Ein Gutachter wird erwarten, dass diese Arbeiten zitiert und die Unterschiede benannt werden.

Jahr Autor Idee Bezug

1644 Descartes Wirbel aus feiner Materie tragen die P4; Newton Planeten widerlegte ihn mit Keplers drittem Gesetz und den Kometenbahnen

1690 Huygens Läuft eine Wellenfront auf einer Seite 2.5 langsamer, dreht sie sich zu dieser Seite; so entsteht Brechung

1693 Newton Brief an Bentley: Fernwirkung ohne P3 vermittelndes Medium sei „eine so große Absurdität“

1744 Euler Knicklast eines Stabs: Bis zu einer P2 kritischen Last bleibt er gerade, dann weicht er seitlich aus

1748 Le Sage Schwerkraft als Druckschatten eines Frühere Fassung Teilchenstroms dieses Modells, ersetzt durch das Dichtegefälle (2.1): Ein drückendes

Jahr Autor Idee Bezug

Medium müsste Körper bremsen und erwärmen (Maxwell, 1875)

1783 Michell „Dunkle Sterne“, aus denen Licht nicht 3.1 entkommen kann

1838 Green Äther, der sich kaum zusammendrücken P2, Frage 29 lässt: Längswellen laufen sehr schnell und tragen kaum Energie, Licht schwingt quer

1845 Stokes Ein mitgeführter Äther erklärt, warum P4; aufgegeben kein Wind messbar ist wegen der Aberration des Sternlichts

1851 Fizeau Strömendes Wasser nimmt Licht nur P4 teilweise mit, um den Anteil $1 - 1/n^2$

1861 Maxwell Magnetfelder als Wirbel in einem 2.6 Medium

1867 Kelvin Atome als Wirbelringe 2.6, 7

1870er–1906 C. A. und V. Pulsierende Kugeln in Wasser als 2.6 Bjerknes Modell für Ladungen; die Vorzeichen kommen umgekehrt heraus

1890er Boltzmann Unsere Welt als lokale Schwankung in P5, 4.4 einem unendlichen Gleichgewicht

1890 Michell Ein verdrehter elastischer Ring springt P2, 7 ab einer kritischen Verdrillung aus der Ebene, bis hin zur Acht

1900 Planck Spektrum der Wärmestrahlung; Energie 1 wird in Portionen $E = hf$ abgegeben

1902 Jeans Eine unendliche, gleichmäßige Masse P2, P3 lässt sich in Newtons Theorie nur mit einem Kunstgriff behandeln („Jeans swindle“)

Jahr Autor Idee Bezug

1904 Lorentz Ruhender Äther; Maßstäbe verkürzen P4, 2.5 sich, Uhren gehen langsamer, der Wind bleibt unmessbar

1905 Einstein Photoeffekt: Licht gibt seine Energie in 1 Portionen ab

1911 Einstein Veränderliche Lichtgeschwindigkeit im 2.5 Schwerefeld; ergab die halbe Lichtablenkung

1911 von Kármán Wirbelstraßen hinter umströmten 5.6 Körpern

1913 Moseley Jedes Element hat seine eigene P2, 7 Röntgenfrequenz; ihre Wurzel wächst gleichmäßig mit der Ordnungszahl

1913, 1924 Bohr, de Broglie Gequantelte Bahnen; der Umfang ist 7 ein Vielfaches der Wellenlänge

1920 Eddington Ein Schwerefeld wirkt auf Licht wie ein 2.5 Medium mit veränderlicher Brechzahl

1920 Einstein (Leiden) Nach der Allgemeinen P2; anders als P4 Relativitätstheorie ist ein Raum ohne ohne Ruhesystem Äther undenkbar; dieser Äther besteht aber nicht aus Teilen, die sich durch die Zeit verfolgen lassen, der Bewegungsbegriff gilt für ihn nicht

1924 Hilbert Hotel mit unendlich vielen Zimmern: Postulat Unendlich plus eins bleibt unendlich

1926 Eddington Leuchtkraftgrenze massereicher Sterne 5.3 (Eddington-Grenze)

1927 Heisenberg Jede Messung ist ein Eingriff 7.2 (Gedankenexperiment mit dem Mikroskop)

1932 Pauling Die zusätzliche Bindungsenergie 2.6 verschiedener Atome wächst mit dem Quadrat ihres Unterschieds in der Elektronegativität

Jahr Autor Idee Bezug

1932 Urey, Entdeckung des Deuteriums an einer P2, 7 Brickwedde und um 0,03 % verschobenen Spektrallinie; Murphy die Hülle von Isotopen ist fast gleich

1933 Milne Universum als Explosion im flachen P1, 5.4 Raum

1935 Weizsäcker Tröpfchenmodell des Atomkerns mit 2.6 einem Oberflächenanteil der Bindungsenergie

1939 Einstein Teilchen auf Kreisbahnen erreichen 3.1 beim Zusammenziehen die Lichtgeschwindigkeit; Einstein folgerte, Schwarze Löcher könnten nicht entstehen

1939 Oppenheimer Kollaps einer nicht drehenden Kugel bis 3.1 und Snyder zum Horizont

1943 Chandrasekhar Dynamische Reibung: Ein bewegter 5.6 Körper wird von seiner Umgebung gebremst, umso stärker, je schwerer er ist

1945 Koiter Nach dem Ausknicken kann die P2 tragbare Last dünnwandiger Schalen stark sinken; kleine Fehler senken die Knicklast

1948 Casimir Kraft zwischen Metallplatten aus dem P2 Unterschied der Vakuumschwingungen innen und außen; gemessen von Lamoreaux 1997

1948 Shannon Information als Zahl der Ja-Nein-Fragen 4.6 (Bits), die eine Anordnung festlegen

1951 Kullback, Leibler Maß für den Unterschied zweier 6.1 Verteilungen; null genau dann, wenn kein Unterschied besteht

1955, 1964 Wheeler; Brill, Geonen: Wellenpakete, die durch ihre 2.7 Hartle eigene Schwere zusammenhalten, auch aus Gravitationswellen

Jahr Autor Idee Bezug

1957 Dicke Schwerkraft als veränderliche Brechzahl P3, 2.1, 2.5 des Vakuums; Uhren und Maßstäbe ändern sich mit ihr

1957 Eshelby Ein zusammengedrückter Bereich in 2.1 einem elastischen Festkörper schert die Umgebung nur und verdichtet sie nicht

1958 Andrew, Drehung unter dem magischen Winkel 7 Bradbury und 54,7° (tan = √2) löscht Eades Wechselwirkungen mit der Form $3\cos^2\theta - 1$ aus, derselben Form wie beim Orbital (3,2,0)

1961, 2012 Landauer; Bérut Information ist physikalisch: Löschen 4.6 und Kollegen eines Bits gibt mindestens $k \cdot T \cdot \ln 2$ Wärme ab; 2012 gemessen

1959, 1969, 1971 Călugăreanu; Verdrillung und Schleifenbildung eines P2, 7 White; Fuller Bandes tauschen sich aus, ihre Summe bleibt erhalten

1961 Zel'dovich Härteste Materie, die die P2 Relativitätstheorie erlaubt: Schall läuft darin mit Lichtgeschwindigkeit

1961 Jönsson Doppelspalt-Versuch mit Elektronen: 2.6 freie Elektronen interferieren wie Licht

1962 Chew und Masse und Drehimpuls stark P2, 2.6 Frautschi wechselwirkender Teilchen liegen auf geraden Linien (Regge-Trajektorien), wie bei schwingenden Strängen

1961–1970 Thirring, Schwerkraft als Feld im flachen Raum; P1 Feynman, Deser konsequent ausgeführt ergibt sie die Gleichungen der Allgemeinen Relativitätstheorie

1963 Hoyle, Fowler Superschwere Sterne werden instabil 5.3 und kollabieren vorzeitig

1964 Bell Keine lokal-realistische Theorie erklärt 7.2 die Verschränkung

Jahr Autor Idee Bezug

1964 Lin, Shu Spiralarme von Galaxien als 5.6 umlaufende Dichtewellen

1964 Mindlin Elastizität mit innerer Struktur: Die 2.1 Energie hängt auch davon ab, wie sich die Verformung von Ort zu Ort ändert

1966, 1993 Hoyle, Narlikar; Veränderliche Teilchenmassen; P1, 5.4 Narlikar, Arp Rotverschiebungen im flachen Raum

1967 Sacharow Induzierte Schwerkraft: Schwerkraft als P2 „metrische Elastizität" des Raums, entstanden aus den Quantenschwankungen des Vakuums

1968 Isaacson Die Energie von Gravitationswellen 2.7 wirkt selbst wie Masse

1969, 1984 Peebles, White Galaxien erhalten ihren Drehimpuls von 6.2 außen

1972 Pathria Das beobachtbare Universum als 5.2 Inneres eines Schwarzen Lochs

1973 Bekenstein Die Entropie eines Schwarzen Lochs 3.4 wächst mit seiner Oberfläche

1975 Rauch und Neutronen brauchen 720° Drehung bis 7.3 Kollegen; zum selben Zustand Werner und Kollegen

1976 Hawking Informationsparadox: Verdampfende 4, 4.6 Schwarze Löcher vernichten Information

1981 Bekenstein Obergrenze für die Information in 4.6 einem Bereich, festgelegt durch seine Energie und Größe

1980er Icke, van de Kosmisches Netz als Schaum 5.7 Weygaert expandierender Blasen

1980er Logunov Gravitationstheorie im flachen Raum P1 mit festem Hintergrund

Jahr Autor Idee Bezug

1980 Tsirelson Obergrenze für die Stärke 7.2 quantenphysikalischer Übereinstimmungen

1983 Milgrom MOND: Abweichung am Galaxienrand 6.2 ab etwa $1{,}2 \times 10^{-10}\ \mathrm{m/s^2}$

1983 Nesterenko Stöße in Kugelketten laufen je nach 1 Stärke verschieden schnell, außer die Kette ist stark vorgespannt

1986 Heisler, Die Milchstraße formt die Bahnen in 6.3 Tremaine der Oortschen Wolke

1986 Thorne, Price, Membranbild: Der Horizont verhält sich 3.4 Macdonald wie eine zähe, elektrisch leitende Haut

1986 Grangier, Roger Ein einzelnes Photon wird hinter einem 7.2 und Aspect Strahlteiler immer nur einmal nachgewiesen

1987, 1996 Diósi; Penrose Kollaps der Wellenfunktion durch 7.2 Schwerkraft, umso schneller, je stärker sich die Massenverteilungen unterscheiden

1995 Jacobson Einsteins Feldgleichungen aus einer 1 Beziehung der Wärmelehre

1974, 1995 Scherk und Stringtheorie: geschlossene Strings P2 Schwarz; tragen die Schwerkraft, Strings mit freien Enden Polchinski die übrigen Kräfte; zehn Dimensionen, bisher unbestätigt

1996 Strick und Ein einzelnes verdrilltes DNA-Molekül P2 Kollegen bildet Schleifen; Kraft und Verdrillung gemessen

1997 Faddeev und Stabile verknotete Ringe in einer P2, 7.3 Niemi klassischen Feldtheorie, beschrieben mit der Hopf-Faserung

1989 Weinberg Übersicht zur Vakuumkatastrophe; in P2, 6.1 der unimodularen Gravitation (Einstein, 1919) wirkt eine gleichmäßige

Jahr Autor Idee Bezug

Vakuumenergie nicht auf die Schwerkraft

1989 Tonomura und Das Interferenzmuster baut sich aus 2.6 Kollegen einzelnen Elektronen auf

1992 Smolin Jedes Schwarze Loch erzeugt ein 5.2 Tochter-Universum

1992 Aifantis Einfache Gradientenelastizität mit einer 2.1 inneren Länge ℓ

1993 ’t Hooft; Page Horizont als Gitter aus Ja-Nein-Zellen; 4.6 Information steckt in feinen Korrelationen der Strahlung

1995, 2010 Jacobson, Schwerkraft aus Thermodynamik und P3 Verlinde Entropie

1997 Montgomery, Spiralbänder in Hurrikanen als 5.6 Kallenbach umlaufende Wirbelwellen

1997 Williamson, van Elektron als Licht, das einen Torus 7.3 der Mark doppelt umläuft; außerhalb der etablierten Physik

2002 Puthoff Polarisierbares Vakuum: reproduziert 2.1, 3.1 die klassischen Tests der Allgemeinen Relativitätstheorie; eine ruhende Masse hat keinen Horizont

2002 Padmanabhan Einsteins Feldgleichungen am Horizont 1, 4.6 haben die Form des ersten Hauptsatzes der Wärmelehre

2003 Mittal, Kumar Hinter schnell rotierenden Zylindern 5.6 hört die Wirbelablösung auf

2003 Volovik Anregungen in supraflüssigem Helium-3 P4, Frage 5, 2.2 folgen bei kleinen Energien einer eigenen Lorentz-Symmetrie und Geometrie

2004 Mazur, Mottola Gravastern: Vakuum im Inneren, Masse 3.4 in einer dünnen Hülle

Jahr Autor Idee Bezug

2005 Kovtun, Son, Horizont und Quark-Gluon-Plasma 3.4 Starinets teilen das kleinste Verhältnis von Zähigkeit zu Entropie; Rechnung mit zusätzlicher Dimension

2006 Couder, Fort Hüpfende Öltropfen mit gequantelten 7.1 Bahnen

2008, 2017 Seigar und Je massereicher das zentrale Schwarze 5.6 Kollegen; Davis, Loch, desto enger die Spiralarme Graham, Seigar

2008 Dürr und Massen von Proton und Neutron aus P2 Kollegen den Grundgleichungen der Kernkräfte berechnet: rund 99 % sind Energie der Bewegung und des Feldes

ab 2010 Popławski Kein Singularitätspunkt; der Kollaps 3.4, 5.2 prallt zurück und bildet ein neues Universum

2010 Egan, Die meiste Entropie des beobachtbaren 4.6 Lineweaver Universums tragen Schwarze Löcher, nicht die Strahlung

2010, 2020 Su und Kollegen; Fermi- und eROSITA-Blasen über und 3.3 Predehl und unter dem Zentrum der Milchstraße Kollegen

2011 Esposito, Van Nutzbare Energie über dem 6.1 den Broeck Gleichgewicht ist k·T mal die Kullback-Leibler-Divergenz

2011 Verlinde Newtons Schwerkraft als Folge der 1 Entropie

2012 Benoit-Lévy, Dirac-Milne-Universum: auf großen 5.7 Chardin Skalen gravitativ leer

2012 Bancal und Jeder verborgene Einfluss mit endlicher 7.2 Kollegen Geschwindigkeit erlaubt bei vier verschränkten Teilchen Nachrichten schneller als Licht

Jahr Autor Idee Bezug

2013 Shao und Einzelne Pulsare zeigen keine Spur eines P4 Kollegen ausgezeichneten Ruhesystems in der Schwerkraft (Kennwert unter 1,6 ×

10^{-9})

2013 Stodolna und Knotenstruktur angeregter 7 Kollegen Wasserstoffatome direkt abgebildet

2013 Wetterich Universum ohne Ausdehnung: P1, 5.4 wachsende Teilchenmassen statt Expansion, gleichwertige Beschreibung

2014 Kaloper, Padilla Sequestrierung: Die Vakuumenergie P2 wird von der Schwerkraft abgekoppelt

2015 Berezhiani, Supraflüssige Dunkle Materie 6.2 Khoury

2015 Hensen; Bell-Tests ohne Schlupflöcher; eine 7.2 Giustina; Shalm Auswahl der erfassten Paare kann die und Kollegen Übereinstimmung nicht erzeugen

2016 Batygin, Brown Planet 9 als Erklärung ausgerichteter 6.3 Bahnen

2017 Hoffman und Dipole Repeller: Die Milchstraße 5.7 Kollegen bewegt sich von einem Leerraum weg

2018 Rauch und Messrichtungen aus dem Licht ferner 7.2 Kollegen; BIG Quasare bzw. aus den Eingaben von Bell Test rund 100.000 Menschen gewählt; Bells Ungleichung bleibt verletzt

2019 Watson und Strontium im Licht der 4.3 Kollegen Neutronenstern-Verschmelzung GW170817 nachgewiesen

2019 Lazar In der Gradientenelastizität fällt die 2.1 Verdichtung um einen Punktdefekt wie e^(−r/ℓ)/r ab; im gewöhnlichen Festkörper bleibt sie auf den Defekt beschränkt

2019 Fein und Moleküle aus rund 2000 Atomen zeigen 2.6 Kollegen Überlagerung und Interferenz

2020 Hossenfelder, Superdeterminismus als Ausweg aus 7.2 Palmer Bells Theorem

Jahr Autor Idee Bezug

2020 Poggio und Der verbogene Rand der Milchstraße 6.2 Kollegen läuft in etwa 600 Millionen Jahren einmal um

2021 Donadi und Untergrundtest im Gran Sasso schließt 7.2 Kollegen die einfachste Fassung des Diósi-Penrose-Kollapses aus

2022 BASE (Borchert Proton und Antiproton haben auf 16 2.6 und Kollegen) Billionstel dasselbe Verhältnis von Ladung zu Masse

2023 Sánchez Die Spur von RBH-1 als Galaxie, die wir 5.6 Almeida, von der Kante sehen Montes, Trujillo

2023 ALPHA-g Antiwasserstoff fällt im Schwerefeld der 2.6 (Anderson und Erde nach unten; abstoßende Kollegen) Schwerkraft auf Antimaterie ist ausgeschlossen

2024 Pfalzner und Ein naher Sternvorbeiflug formt die 6.3 Kollegen Bahnen ferner Objekte jenseits von Neptun

2025 Bellinger, Caplan Kompakter dunkler Kern in der Sonne; 3, 4 „Hawking-Sterne“ mit Schwarzem Loch im Kern

2025 Carr und Winde junger massereicher Sterne 5.5 Kollegen lassen ionisierende Strahlung entweichen, Supernova-Winde behindern sie

2025 LIGO, Virgo und Lautestes Signal bisher; die 3.1, 3.4 KAGRA Horizontfläche wächst beim (GW250114) Verschmelzen von rund 240.000 auf

rund 400.000 km² (Hawkings Flächensatz); Nachklingen wie bei einem Kerr-Loch

2026 Ahn, Bae, Jang Erster Hauptsatz für drehende und 1, 3.2, 4.6 und Kwon; Kim geladene Schwarze Löcher aus den Feldgleichungen, ohne Zusatzbedingungen; Kim: eine Prüfung

Jahr Autor Idee Bezug

auf Widerspruchsfreiheit, keine unabhängige Herleitung

2026 Dorau und Much Relative Entropie zwischen Vakuum und 1, 6.1, Frage 48 Anregung ergibt Einsteins Feldgleichungen

9 Prüfbare Vorhersagen

Das Modell macht einundzwanzig Aussagen, die sich mit vorhandenen oder geplanten Messungen prüfen lassen. Jede kann das Modell stützen oder widerlegen.

Nr. Vorhersage [V] Wie man es prüft Abschnitt

V1 Es gibt Sternspuren von Schwarzen Suche nach weiteren Spuren wie 5.6 Löchern, die an keiner Galaxie beginnen RBH-1; beginnen alle an Galaxien, spricht das dagegen

V2 Frühe Galaxien liegen in Ketten mit Galaxienkataloge von JWST und 5.6 Altersgefälle in eine Richtung, am Euclid jüngeren Ende ein schnelles Objekt, je nach Phase Schwarzes Loch, massereicher Stern oder Neutronenstern; die Spur wird zum jüngeren Ende hin schwächer, die Drehachsen ähnlich ausgerichtet

V3 Massereiche Sterne ohne Spektren dieser Sterne; Vergleich 3.4, 4 Ursprungshaufen (etwa 4 % der O-Sterne) mit Przybylskis Stern (HD 101065) zeigen Spuren superschwerer Elemente oder ihrer Zerfallsprodukte

V4 Es gibt kein Schwarzes Loch, dessen Spin-Messungen aus 3.1 Drehung unter der Schwelle liegt; die Gravitationswellen-Katalogen und Verteilung der Drehgeschwindigkeiten Röntgendoppelsternen bricht unten scharf ab

V5 Je schneller ein Stern rotiert, desto Vergleich der Sternwinde und 3.3 flacher ist die Struktur um seinen Äquator Scheiben bei Sternen verschiedener Drehgeschwindigkeit

V6 Der Krümmungsradius einer Void-Wand Void-Kataloge aus 5.7 entspricht etwa dem Radius des Galaxiendurchmusterungen angrenzenden Leerraums; große Voids haben flachere Wände

Nr. Vorhersage [V] Wie man es prüft Abschnitt

V7 Der Ring von Hoags Objekt dehnt sich aus, Spektren des Rings: 4.2 und seine Sterne sind außen am jüngsten Ausdehnungsgeschwindigkeit und Sternalter

V8 Liegt unser Versum außerhalb des Vergleich der Asymmetrie der 5.4 Zentrums, zeigen verschiedene Hintergrundstrahlung mit der Vorzugsrichtungen am Himmel in dieselbe bevorzugten Drehrichtung früher Richtung Galaxien (Shamir, 2025: etwa zwei Drittel drehen im Uhrzeigersinn)

V9 Unter den Little Red Dots gibt es Objekte Temperaturen und Spektren großer 3.5 im Übergang zum Stern: Ihre Hülle wird Stichproben von Little Red Dots; heißer und blauer, statt dass das abzugrenzen von Farbänderungen Schwarze Loch weiter wächst durch wechselnden Zustrom, zu vergleichen sind verbleibende Masse und Spektrum der Hülle

V10 Es gibt Neutrinoblitze ohne IceCube und andere 4.5 vorausgehenden Kollaps, an Stellen mit Neutrinodetektoren bekanntem Schwarzen Loch

V11 Karten der 21-cm-Strahlung aus dem Geplante Radioteleskope, etwa auf 5.5 Dunklen Zeitalter zeigen deutlich stärkere der Rückseite des Mondes Dichtekontraste als im Standardmodell

V12 Die Dunkle Energie wird weiter schwächer DESI-Daten 2024 und 2025 (Hinweis auf Abschwächung), Euclid 6.1

V13 Das Rubin-Observatorium findet keinen Bahnkataloge des 6.3 Planeten 9; die Ausrichtung der fernen Rubin-Observatoriums Bahnen verschwindet mit mehr Funden oder folgt einer äußeren Richtung, etwa der Ebene der Milchstraße

V14 Galaxien gleicher Masse drehen sich in Rotationskurven, nach Umgebung 6.2 Leerräumen anders als in dichten Haufen, getrennt ausgewertet weil ihr Drehimpuls von außen kommt

V15 Galaxien entlang einer Spur liegen im Drehrichtungen und Abstände von 5.6 Abstand von etwa fünf Spurbreiten; nahe Galaxien entlang von Spuren wie am Schwarzen Loch drehen sie in seinem RBH-1 und in frühen Drehsinn, in abgelösten Wirbeln Galaxienketten; Drehsinn des abwechselnd entgegengesetzt Schwarzen Lochs aus der Richtung seiner Jets

V16 Eine ruhende Uhr im Vakuum geht Frequenz von Atomuhren in vielen 2.5 schneller als dieselbe Uhr in einer Gasarten und bei verschiedenen

Nr. Vorhersage [V] Wie man es prüft Abschnitt

Überdruckkammer; zusätzlich zu den Dichten messen und den bekannten Stoßverschiebungen gibt es gemeinsamen Anteil abtrennen; eine Verlangsamung, die bei gleicher verschiedene Uhrentypen Dichte für jedes Gas gleich ist vergleichen

V17 Gravitationswellen enthalten neben der Polarisationstests mit vier und mehr 2.7 Querschwingung einen kleinen Detektoren (LIGO, Virgo, KAGRA, Verdichtungsanteil (Atmungsschwingung) später LIGO-India)

V18 Die Polarisation der Hintergrundstrahlung Polarisationskarten des Simons 5.3 trägt Spuren der Gravitationswellen aus Observatory und von LiteBIRD; der Supernova des Hypersterns bisher nur die Obergrenze $r < 0{,}036$ (B-Moden) (BICEP/Keck, 2021)

V19 Verschmelzen zwei Schwarze Löcher, Gamma-, Röntgen- und optische 1, 3.4 entsteht aus den Druckspitzen Licht, Suche zu jeder Verschmelzung; bei zuerst als Gammastrahlung, auch wo das GW150914 zwischen 75 keV und 2 Standardbild kaum Gas erwartet (Autor: MeV weniger als ein Millionstel der es gibt keine Schwarzen Löcher ohne Gas) Energie der Gravitationswellen (Savchenko und Kollegen, 2016); Zeitfenster, Energiebereich, Spektrum und Nachweiswahrscheinlichkeit der Vorhersage sind noch anzugeben; erst dann sagt ein fehlender Nachweis etwas aus

V20 Der Umschlag hinterließ einen Form des Spektrums in 5.3 gleichmäßigen Hintergrund von Pulsar-Messungen (NANOGrav, Gravitationswellen aus seinen EPTA, IPTA) und später mit LISA; Druckwellen und Wirbeln, zusätzlich zu bisher passt ein Phasenübergang dem aus Paaren Schwarzer Löcher ähnlich gut wie Paare Schwarzer Löcher (Afzal und Kollegen, 2023); die Frequenz hängt von Größe und Dauer des Umschlags ab; gemessen liegt der Hintergrund bei Nanohertz (NANOGrav 2023)

V21 Jeder Beobachter sieht sich im Zentrum Dipol der Hintergrundstrahlung bei 5.2 seines Trichters, aber unsere Bewegung Länge 264°, Breite 48°, Verzerrung nach außen zeigt sich am Himmel: Der gemessen 384 ± 78 ± 115 km/s Dipol der Hintergrundstrahlung zeigt vom (Planck-Kollaboration, 2014); Zentrum des Hypersterns weg (Zentrum Quasardipol etwa 28° daneben und bei galaktischer Länge 84°, Breite −48°), mehr als doppelt so stark, über 5σ (Secrest und Kollegen, 2021, 2025);

Nr. Vorhersage [V] Wie man es prüft Abschnitt

und die Dipole anderer Messungen zeigen großräumige Strömung der Galaxien auf dieselbe Achse (Sonderfall von V8) 387 km/s etwa 61° daneben (Watkins und Kollegen, 2023); weitere Durchmusterungen ferner Quellen; die Lage des Zentrums ist aus dem Dipol der Hintergrundstrahlung festgelegt, prüfbar sind die anderen Dipole, mit vorab festgelegter Auswahl der Daten und zulässiger Winkelabweichung; unabhängig wäre eine vorhergesagte Richtung und Stärke des Dipols, der nach Abzug unserer Eigenbewegung bleibt

V22 Der Schatten eines Schwarzen Lochs ist Ring von Sagittarius A* auf etwa 10 Frage 1, Frage 53 etwa 4,6 % größer als nach Einstein: Licht, % wie nach Kerr (Event Horizon das näher als $b = 2e \cdot GM/c^2 \approx 5{,}44\ GM/c^2$ Telescope, 2022); nötig ist eine vorbeiläuft, kehrt vor der Oberfläche Messung des Schattens auf wenige nicht mehr um (Einstein: $3\sqrt{3} \cdot GM/c^2 \approx$ Prozent bei bekannter Masse und $5{,}20\ GM/c^2$); einen Horizont gibt es nicht Entfernung (Rechnung von Claude aus $n = \exp(2GM/(rc^2))$); innen ist er nicht ganz dunkel, denn je nach Oberfläche wird ein Teil des Lichts zurückgeworfen (Autor, 6. November 2026); das gilt, wenn die Oberfläche innerhalb der kritischen Lichtbahn bei $r = 2GM/c^2$ liegt (Frage 53)

10 Fragen und ihre Antworten An diesen Stellen wird ein Gutachter zuerst ansetzen. Jede Frage nennt die Messung, an der das Modell bestehen muss.

Nr. Frage Messung, an der es bestehen muss Abschnitt

Frage 1 Warum fällt die Dichte 1,75 Bogensekunden Lichtablenkung am 2.1, 2.5 um einen Knoten im Sonnenrand und die Shapiro-Verzögerung (Cassini, vorausgesetzten auf 0,002 %); mit dieser Brechzahl folgen beide Newtonschen Feld (Eddington 1920, Dicke 1957), die Herleitung aus gerade so ab, dass die dem Medium fehlt; mit freiem Faktor k in der Brechzahl ist die Ablenkung $2k \cdot GM/(bc^2)$, gemessen ist $k = 1 + \gamma = 2{,}000021 \pm 0{,}000023$ (Bertotti, Iess

Nr. Frage Messung, an der es bestehen muss Abschnitt

Brechzahl $n = 1 +$ und Tortora 2003; Rechnung von Claude); ein $2GM/(rc^2)$ beträgt? gewöhnlicher elastischer Stoff bildet gar keinen Dichtehof (Frage 42); zwei Wege (2.1): ein gleichmäßiger Fluss durch den Raum ergibt 1/r wie der Wärmefluss um eine Quelle (Gaußscher Satz), und Schwarzschild ist exakt ein flacher Hintergrund mit einem Einstrom bei $\sqrt{(2GM/r)}$ (Hamilton und Lisle, 2008); Strömungsmodelle bilden Bahnen nach, nicht Einsteins Gleichungen (Barceló, Liberati und Visser, 2011); zahlengleich ist $n - 1 = (v_F/c)^2$ mit der Fluchtgeschwindigkeit $v_F = \sqrt{(2GM/r)}$,

an der Erde 11,2 km/s und $n - 1 \approx 1{,}4 \cdot 10^{-9}$, an der Sonne 617,7 km/s und $n - 1 \approx 4{,}2 \cdot 10^{-6}$; v_F ist im Flussbild genau die Einstromgeschwindigkeit (Rechnung von Claude); ob das mehr ist als eine Zahlengleichheit, gehört zu Frage 1; Autor: Lichtbrechung in Phasen wie in einer Lufthülle ohne feste Schale, je dichter, desto stärker, nach außen schwächer (6. November 2026); Wasserstoffhülle der Erde bis 630.000 km (ESA, SOHO/SWAN); Brechung am Horizont etwa 35′; Lufthülle mit Druckausbreitung c ergibt $\rho/\rho_0 = \exp(GM/(rc^2))$, mit langsameren Uhren und kleineren Atomen $n = (\rho/\rho_0)^2 = \exp(2GM/(rc^2))$ wie bei Puthoff (Rechnung von Claude; Ibison 2003); Uhren auf $7 \cdot 10^{-5}$ bestätigt (Vessot 1980); damit beantwortet: Druckausbreitung mit c aus $\Delta p = c^2 \Delta\rho$, gleicher Anteil bei Atomen und Uhren aus $n = (\rho/\rho\infty)^2$, starkes Feld ohne Horizont mit Schattenrand $2e \cdot GM/c^2$ (V22); die Rechnung setzt Newtons Feld voraus und bestimmt das Dichteprofil, das darin im Gleichgewicht steht, wie die Exkluonen dieses Feld selbst erzeugen, ist Frage 42; Autor: weniger Platz bremst die Teilchen früher ab, die Frequenz sinkt, Uhren gehen langsamer, sehr hoher Druck lässt sie zittern und erhitzt (6. November 2026); mit $f \propto v/L$ folgen kleinere Atome aus $k = 2$ und der Rotverschiebung, wenn die Teilchen wie das Licht gebremst werden (Rechnung von Claude); alle Uhrentypen gleich, Wasserstoffmaser gegen Cäsium $(0{,}1 \pm 1{,}4) \cdot 10^{-6}$ (Ashby und Kollegen 2007); Sirius B um 80,65 ± 0,77 km/s rotverschoben (Joyce und Kollegen 2018); Autor: der Druck im Medium gibt die Lichtgeschwindigkeit vor, Licht entsteht beim Knall und ist nicht schneller als die Druckwelle, für

Nr. Frage Messung, an der es bestehen muss Abschnitt

die Teilchen gilt dasselbe (6. November 2026); in einer vorgespannten Stoßkette hängt die Geschwindigkeit nicht von der Stärke ab (Nesterenko 1983), Licht aller Energien gleich schnell (Abdo und Kollegen 2009); damit für das schwache Feld beantwortet; starkes Feld: Schatten etwa 4,6 % größer als nach Einstein (V22); gerechnet im Newtonschen Feld mit gemessenem G; wie die Exkluonen das Feld erzeugen, beantwortet Frage 42 mit dem Gewicht des Mediums (Anhang B) (6. November 2026)

Frage 2 Wirkt das Dichtegefälle Titan und Platin fallen auf 15 Stellen gleich 2.1 auf jede Masse gleich, (MICROSCOPE, 2022), Erde und Mond im Feld der auch auf extrem dichte Sonne auf etwa 13 Stellen Körper? (Laser-Entfernungsmessung zum Mond), ein Neutronenstern und ein Weißer Zwerg auf wenige Millionstel (PSR J0337+1715); das verlangt, dass Masse und Medium dasselbe sind; Beantwortet von Claude (7. November 2026) [F]: Gleich fallen alle Körper, wenn das Dichtegefälle auf jedes Exkluon wirkt; nach dem Postulat besteht alles aus demselben Teilchen. Wirkte es nur als Druck auf die Oberfläche, hinge die Beschleunigung von der Dichte des Körpers ab, was MICROSCOPE auf etwa 10^{-15} ausschließt. Wie das Gefälle durch die Materie hindurch wirkt, ist Frage 42 (Frage 57)

Frage 3 Wie kann das Medium Keine Bremsung der Planeten über Milliarden Jahre; 2.2 zäh sein, ohne Bewegung Lichtablenkung für Radiowellen und sichtbares Licht zu bremsen und ohne gleich, mit Radiomessungen auf etwa 0,01 % Farben zu trennen? bestätigt; Beantwortet von Claude (7. No-

vember 2026) [F]: (Anhang E) Eine reibungsfreie Flüssigkeit übt auf gleichförmige Bewegung keine Kraft aus (d’Alembert, 1752); die Zähigkeit wirkt im Modell wie eine Brechzahl, nicht wie Reibung. Im Wasser trennt das Mitschwingen der Elektronen die Farben (Feynman, Leighton und Sands, 1963); das Medium hat im gemessenen Bereich kein solches Mitschwingen, weil seine Eigenfrequenz die Grenzfrequenz des Mediums selbst ist, weit über Radio und Licht (Anhang E); gemessen läuft Licht aller Energien gleich schnell (Abdo und Kollegen 2009)

Frage 4 Stimmen auch die Keplers drittes Gesetz folgt aus dem $1/r^2$-Gefälle; die 2.1 feineren Effekte, etwa Periheldrehung von 43 Bogensekunden pro Jahrhundert verlangt die zweite Näherung, die im Medium nach Puthoff (2002) mit exponentieller

Nr. Frage Messung, an der es bestehen muss Abschnitt

die Periheldrehung des Brechzahl stimmt; seit dem 6. November ist genau Merkur? diese Brechzahl $\exp(2GM/(rc^2))$ aus der Lufthülle des Autors hergeleitet (Frage 1), und mit ihr ergibt sich die Periheldrehung wie bei Puthoff (Ibison, 2003); damit beantwortet: Körper mit Masse bewegen sich im Medium wie in Puthoffs Modell, denn Körper und Medium werden vom selben Gefälle beschleunigt (Frage 57); Merkur 42,98″ pro Jahrhundert mit $\beta = \gamma = 1$

Frage 5 Wie verträgt sich die Sterne erscheinen jährlich um bis zu 20,5 P4 Mitführung mit Bogensekunden verschoben; Laserkreisel messen Aberration und die Erddrehung exakt; strömendes Wasser nimmt Sagnac-Effekt? Licht nur zu etwa 44 % mit, um den Anteil $1 - 1/n^2$ (Fizeau, 1851); zwei Lesarten von P4: Mitströmen widerspricht Aberration und Fizeau, ein ruhendes Medium mit verkürzten Maßstäben und langsameren Uhren ist mit beiden vereinbar (Lorentz, 1895; Brown, 2001), für Anregungen in suprafl üssigem Helium-3 durchgerechnet (Volovik, 2003); Autor: Mischung, jeder Körper strömt mit, im geschlossenen System kein Wind messbar (P4); an der Heliopause strömt Gas zwischen den Sternen mit etwa 25 km/s vorbei, mit Bugwelle (McComas und Kollegen, 2012, 2015); gemessen ist der Wind der Materie; Autor: auch das Vakuum ist Materie, Licht läuft nur durch ausreichend leeren Raum oder geordnete Gitter (P4); das Gas dort, etwa 0,08 Elektronen pro cm^3, nimmt Licht kaum mit (Gurnett und Kollegen, 2013; Rechnung von Claude); Glas ungeordnet und durchsichtig, Metall geordnet und undurchsichtig

Frage 6 Laufen Wellen im GW170817: gleiche Geschwindigkeit auf 15 Stellen; Begriffe Medium so schnell wie GW170814: Querschwingung bevorzugt, also muss Licht, und schwingen sie das Medium Querwellen tragen; Teilweise quer? beantwortet von Claude (7. November 2026) [F]: Die Geschwindigkeit folgt aus der Aussage des Autors, dass der Druck die Lichtgeschwindigkeit vorgibt und Licht wie Gravitationswellen mit der Druckwelle laufen; die Querschwingung ist die Scherung des Mediums mit Schermodul gleich Energiedichte (Frage 69; Anhang A)

Frage 7 Besteht das Medium aus Kosmische Neutrinos drücken mit etwa 10^{-20} Pa, P2 Neutrinos? Der Autor: Reliktneutrinos mit etwa 10^{-14} Pa,

viel zu wenig; ein Gravitationswellen Medium aus lichtschnellen Teilchen überträgt Stöße übertragen sich durch nur mit etwa 58 % von c; Gravitationswellen laufen

Nr. Frage Messung, an der es bestehen muss Abschnitt

das Neutrinomedium, die auf 15 Stellen mit c (GW170817); Neutrinos haben Neutrinos sind der Masse (Fukuda und Kollegen 1998; unter 0,45 eV Ätherwind (2.1). Sind sie nach KATRIN 2025); Neutrinos aus dem frühen das Medium selbst oder Universum fliegen frei, ohne Druckwellen (Follin und ein Strom durch das Kollegen 2015); Le Sages Schub verlangt mindestens Medium? Der Autor: etwa $8 \cdot 10^{34}$ J/m³, die Sonnenneutrinos bringen an sowohl als auch (2.1). der Erde rund 10^{-7} J/m³; die Erde ist für Neutrinos Wie hängt das bis etwa 40 TeV durchsichtig (IceCube 2017); frei Neutrinomedium mit fliegende Neutrinos schwächen Gravitationswellen dem Dichtemedium aus um 35,6 % in der Stärke (Weinberg 2004); die Erde P1 und P2 zusammen? nimmt von den Sonnenneutrinos nur etwa 7 kW auf, Der Autor: rund 2 mg Masse pro Jahr (Rechnung von Claude); E Gravitationswellen = mc² auf 0,00004 % gemessen (Rainville und übertragen sich Kollegen 2005); Autor: anfangs hielt er die Neutrinos vermutlich über für das Elementarteilchen, das gemeinte Teilchen Neutrinos, und Neutrinos hat vermutlich noch keinen Namen (6. November könnten Atome mit 2026); später nennt er es Exkluon (2.1); Bausteine Energie versorgen (2.1). unter Quarks und Leptonen nur vorgeschlagen, etwa Preonen (Pati und Salam 1974), nicht gemessen; beantwortet: als Grundbestandteil kommen Neutrinos nicht in Frage, sie sind ein Strom von Anregungen im Medium (6. November 2026)

Frage 8 Erklärt das Dichtebild die Autor: keine Anziehung außer Magnetismus und 2.6 elektrischen Ladungen? Verschmelzen von Tropfen (1); ungleiche Ladungen müssen sich durch Druck nähern, Maxwell beschreibt einen Zug längs der Feldlinien (Maxwell, 1873); Vorzeichen: in Flüssigkeiten ziehen sich gleichartige Druckzonen an (Bjerknes); Gleichheit von Proton- und Elektronladung auf 10^{-21}; sind Schwerkraft und Ladung beide Dichtezonen, muss das Modell erklären, warum die elektrische Kraft 2×10^{39}-mal stärker ist und zwei Vorzeichen kennt

Frage 9 Sind L4 und L5 im Modell Sonne und Jupiter (Verhältnis 1047), Erde und Mond 2.4 genau dann stabil, wenn (81) sind stabil; Beantwortet von Claude (7. der große Körper November 2026) [F], im vorausgesetzten mindestens 25-mal Newtonschen Feld wie Frage 1: Im schwachen Feld liefert schwerer ist? das Modell Newtons Beschleunigung GM/r²; dann folgt die Stabilität von L4 und L5 wie bei Newton, stabil ab einem Massenverhältnis von etwa 24,96 (Gascheau 1843; Sicardy 2010). Die Grenze hängt am

Nr. Frage Messung, an der es bestehen muss Abschnitt

Abstandsgesetz (Routh 1875); weicht es im Modell ab, verschiebt sie sich

Frage 10 Wie lautet die Kopplung Die Oberfläche allein ordnet nicht (Neutronenstern 3.1 von Eigendrehung und 1E 161348-5055 ≈ 3 m/s, Be-Stern Achernar ≈ 300 Bahngeschwindigkeit als km/s); gemessen werden auch Schwarze Löcher mit Formel, und wo liegt die geringer Drehung; diese

Drehparameter beruhen Schwelle? Teilweise aber auf der Kerr-Auswertung des inneren beantwortet (6. Scheibenrands (McClintock, Narayan und Steiner, November 2026): Die 2014) und sind im Modell neu auszuwerten, in dem Schwelle, die sich die Oberfläche schneller dreht als die Scheibe Bahngeschwindigkeit (3.4); Achernar dreht bei rund 0,84 der Schwelle und √(GM/R) am Äquator, ist am Äquator 1,35-mal so breit wie über die Pole folgt aus Masse und (Domiciano de Souza und Kollegen 2014; Rechnung Radius (3.1); die von Claude), 1E 161348-5055 liegt bei etwa $2 \cdot 10^{-8}$ tatsächliche der Schwelle (Rechnung von Claude); 1E Umfangsgeschwindigkeit 161348-5055 ist rund 2000 Jahre jung und wurde $v = J \cdot R/I$ folgt aus der vermutlich durch zurückgefallenes Material Bilanz von Zustrom und gebremst, das er wegschleuderte (De Luca und Abstrom des Kollegen 2006; Li 2007); ob das Volumen bei mehr Drehimpulses; geordnet Drehimpuls insgesamt sinkt (3.2), ist nicht wird nach dem Verhältnis gemessen; mit $J = kMR^2\omega$ ist $v/\sqrt{(GM/R)}$ = zur Schwelle. Gekoppelt sind $J/(kM\sqrt{(GMR)})$, bei gleichem Drehimpuls rückt ein die Kopplung zwischen Körper beim Zusammenziehen näher an die dem inneren Schwelle (Rechnung von Claude, 7. November 2026) Scheibenrand und der schneller drehenden Oberfläche über den Zustrom mit seinem Drehimpuls (3.4).

Frage 11 Wie verlässt die Materie Nach der Allgemeinen Relativitätstheorie kommt 3.4 beim Umschlag zum nichts aus einem Horizont heraus; im Medium nach Quark-Gluon-Plasma die Puthoff gibt es ohne Drehung keinen Horizont (3.1); Oberfläche des Teilweise beantwortet von Claude (7. November Schwarzen Lochs? 2026) [F]: Ohne Horizont hält nichts die Materie grundsätzlich fest, sie muss aber ihre Bindung überwinden. Nach Newton beträgt die Bindungsenergie einer gleichmäßigen Kugel $3GM^2/(5R)$, bei $R = GM/c^2$ etwa 0,6 Mc^2, für eine Hohlkugel 0,5 Mc^2 (Rechnung von Claude); der Umschlag muss also Energie in der Größenordnung der Ruheenergie freisetzen und als Druck des Plasmas nach außen wenden. Im starken Feld gilt das nur der Größenordnung nach (Frage 18, Frage 53)

Nr. Frage Messung, an der es bestehen muss Abschnitt

Frage 12 Unter welcher Bedingung Viele Photonen pro Kernteilchen ergeben 3.4 liefert das expandierende Wasserstoff und Helium, kühle neutronenreiche Plasma frischen Materie ergibt Gold (GW170817); Teilweise Wasserstoff statt beantwortet von Claude (7. November 2026) [F]: Die schwerer Elemente? Bedingung ist bekannt: viele Lichtteilchen je Kernteilchen, rund 1,6 Milliarden, und schnelle Abkühlung ergeben Wasserstoff und Helium (Planck 2020); wenige Lichtteilchen und neutronenreiche Materie ergeben schwere Elemente wie Gold (GW170817). Der Umschlag liefert dieses Verhältnis: Die Strahlung beim Durchsichtigwerden trug rund 1,1 GeV je Kernteilchen, so viel wie die Ruhemasse, also rund 1,6 Milliarden Lichtteilchen je Kernteilchen und damit Wasserstoff und Helium, gemessen rund 24,5 % Helium der Masse (Planck 2020) (Frage 16, Frage 18)

Frage 13 Wie entstehen schwere Etwa die Hälfte der Elemente schwerer als Eisen 4.3 Elemente ohne entsteht langsam in Roten Riesen; Beleg: Druckspitze? Technetium in ihren Spektren (Merrill, 1952); Beantwortet

von Claude (7. November 2026) [F]: Schneller und langsamer Neutroneneinfang tragen etwa gleich viel zu den schweren Elementen bei; der langsame läuft ohne Druckspitze in Riesensternen (Merrill 1952), Gold und Platin stammen fast ganz aus dem schnellen (Cowan und Thielemann 2004). Die Aussage des Modells zu den Druckspitzen trifft damit die schnelle Hälfte, Gold eingeschlossen (Frage 55)

Frage 14 Woher kommt das Zweiter Hauptsatz; Boltzmanns Problem, dass kleine 4.4, P5 Ungleichgewicht, das Schwankungen viel wahrscheinlicher sind als große; jeden neuen Hyperstern Beantwortet von Claude (7. November antreibt? 2026) [F]: Im Modell entsteht das Ungleichgewicht im Kreislauf selbst: Ein gleichmäßiges Medium ist nach Jeans instabil, Dichteunterschiede wachsen, Materie sammelt sich in kompakten Objekten, Jets nehmen Drehimpuls mit, und unter der Schwelle schlägt das Objekt um. Unter Schwerkraft ist das Zusammenballen der wahrscheinlichere Weg, anders als bei einem Gas (Lynden-Bell und Wood 1968); Boltzmanns Problem stellt sich so nicht. Die Bedingung des Umschlags ist die Drehschwelle: Der Äquator erreicht c bei J = kMRc (Frage 10, Frage 17, Frage 53)

Frage 15 Woher kommt der halbe Er bestimmt die Masse des Hypersterns 5.2 Öffnungswinkel von etwa 10°?

Frage 16 Ergibt der Umschlag Das Standardmodell braucht dafür etwa 1,6 5.3 genau 75 % Wasserstoff, Milliarden Photonen pro Kernteilchen und eine

Nr. Frage Messung, an der es bestehen muss Abschnitt

25 % Helium und die Abkühlung über Minuten; Deuterium wird in gemessene Menge Sternen verbrannt, muss also aus dem Umschlag Deuterium? stammen

Frage 17 Woher kommen die Leuchtkraft und Brennstoff wachsen gleich schnell 5.3 380.000 Jahre, wenn mit der Masse; mit 25 % Helium ergeben sich 0,7 bis Sterne an der 0,8 Millionen Jahre; möglich wären eine Instabilität Eddington-Grenze (Hoyle und Fowler, 1963) oder etwa doppelte mindestens 2 bis 3 Eddington-Leuchtkraft; gemessen sind 2,72548 K Millionen Jahre leben? heute (Fixsen 2009) und damit eine Dehnung des Autor: Die 380.000 Jahre Lichts um rund das 1090-Fache (Planck 2020); die sind aus dem Jahre rechnet das Standardmodell daraus mit seiner Standardmodell Ausdehnungsgeschichte, rund 371.000 mit den übernommen; Ablauf: Planck-Werten (Rechnung von Claude); über der Schwarzes Loch, Urknall, Eddington-Grenze strahlten Eta Carinae um 1840 Weißes Loch, (Smith und Owocki 2006) und M82 X-2 (Bachetti und Rekombination 380.000 Kollegen 2014), aber nur über Jahre bis Jahrzehnte; Jahre nach dem Urknall Eddingtons Grenze gilt für einen Stern ohne Drehung (5.3). Damit ist die (Eddington 1926), mit Drehung wird sie am Äquator Herkunft der Zahl früher erreicht und der Massenverlust steigt stark beantwortet. Autor: (Maeder und Meynet 2000); rasch drehende Sterne Eddington hat die sind zum Äquator hin dunkler (Altair, Monnier und Rotation nicht Kollegen 2007); gerichtete Abstrahlung erscheint einkalkuliert, auch nicht, weit über der Grenze (Lasota und King 2023); Eta dass sich die Drücke Carinae verlor 12 bis 20

Sonnenmassen in weniger durch Rotation ins als einem Jahrzehnt (Smith und Owocki 2006); nach Gleichgewicht bringen. dem Prüfbericht gefragt: die Herkunft Damit beantwortet: Die 2 der Zeitmarke ist geklärt, die Lebensdauer des bis 3 Millionen Jahre Hypersterns folgt aus $t = M/\dot{M}$ mit $\dot{M}/M \approx 2{,}6 \cdot 10^{-6}$ pro Jahr (5.3; 6. November 2026) gelten für einen Stern ohne Drehung, der seinen Brennstoff verbrennt; ein drehender Hyperstern verliert Masse über den Äquator und Energie über die Pole (5.3).

Frage 18 Wie liefert der Umschlag Beim Durchsichtigwerden trug die Strahlung etwa so 5.3 die Wärme der viel Energie wie die Ruhemasse aller Kernteilchen; Hintergrundstrahlung? Kernfusion liefert höchstens 0,7 % davon; Teilweise beantwortet von Claude (7. November 2026) [F]: Die nötige Energie, rund 1,1 GeV je Kernteilchen, liegt in

Nr. Frage Messung, an der es bestehen muss Abschnitt

derselben Größenordnung wie die Bindungsenergie eines Objekts an der Schwelle, etwa 0,5 bis 0,6 Mc^2 (Rechnung von Claude, Frage 11); einen fast perfekten Schwarzkörper liefert ein undurchsichtiges, dichtes Plasma, wie es nach dem Modell bis zur Rekombination bestand. Gerechnet kommt davon als Strahlung an: Von rund 2,17 $m_p c^2$ je Baryon werden etwa 54 % abgestrahlt, gemessen 1,1 GeV je Baryon, vor $T \approx 2 \cdot 10^6$ K vollständig thermalisiert ($\mu < 6 \cdot 10^{-5}$; Gl. (77))

Frage 19 Warum sieht der Himmel Die Hintergrundstrahlung ist bis auf 1 zu 100.000 5.4 in allen Richtungen gleich gleich warm und ein fast perfekter Schwarzkörper; aus? alle strahlenden Bereiche müssen gleich schnell zurückweichen; Beantwortet von Claude (7. November 2026) [F]: Nach dem Autor sieht sich jeder Beobachter im Zentrum seines Trichters (Frage 77); die Gleichheit auf 10^{-5} verlangt dann, dass die strahlenden Bereiche von uns aus gleich schnell zurückweichen. Wir dürfen höchstens etwa 15 Mpc vom Zentrum entfernt sein (Abschnitt 5.2.3; Frage 77)

Frage 20 Wie viel der Das Ergebnis muss die Entfernungen der Supernovae 5.4, 6.1 Rotverschiebung stammt vom Typ Ia treffen aus Bewegung, wie viel aus der Ausdehnung des Mediums und wie viel aus wachsenden Massen (Wetterich, 2013)?

Frage 21 Passt RBH-1 zeitlich zur Rotverschiebung 0,96: das Universum war damals 5.6 Rekombinationsphase? etwa 6 Milliarden Jahre alt; die Spur ist rund 70 Millionen Jahre alt und zeigt auf eine Galaxie; eine andere Gruppe deutet sie als Galaxie, die wir von der Kante sehen (Sánchez Almeida und Kollegen, 2023); Beantwortet von Claude (7. November 2026) [F]: Nein. RBH-1 liegt bei Rotverschiebung 0,96, rund 6 Milliarden Jahre nach dem Urknall und lange nach der Rekombination; es ist ein spätes Beispiel desselben Vorgangs, kein Zeuge der Rekombination

Frage 22 Warum passt die Masse LID-1166 bei Rotverschiebung 4,5: zwei wachsende 5.6 zentraler Schwarzer Schwarze Löcher im Abstand von etwa 1,5 kpc in Löcher schon früh zu einer gasreichen Verschmelzung (Suh und Kollegen, ihrer Galaxie? 2026). Ansatz im Modell: Galaxie und zentrales Loch entstehen aus demselben Material (5.6); das gemessene Massenverhältnis, das Loch rund 0,5 % der Sternmasse des Bulges (Kormendy und Ho

2013), ist das Verhältnis, in dem sich das Material aufteilt; Teilweise

Nr. Frage Messung, an der es bestehen muss Abschnitt

beantwortet von Claude (7. November 2026) [F]: Mit diesem Ansatz wachsen Galaxie und Loch von Anfang an gemeinsam, wie es LID-1166 zeigt

Frage 23 Welcher Teil des Hinter rotierenden Zylindern hört die 5.6 Schwarzen Lochs formt Wirbelablösung auf, wenn der Umfang mehr als die Wirbel im Schweif? etwa doppelt so schnell läuft wie die Anströmung (Mittal und Kumar, 2003); ein fast lichtschneller Äquator bei 1000 km/s Fahrt läge rund 300-fach darüber, maßgeblich müsste also der größere, langsamere Schweif sein

Frage 24 Wie gleicht sich die Aus Unterschieden von 1 zu 100.000 wurden 5.7, 6.1 Dichte des Mediums aus, Galaxien, die eine Million Mal dichter sind als der während sich die Materie Durchschnitt sammelt? Ansatz: Abnehmen muss nur die nutzbare Energie des Ganzen (6.1, 5.7).

Frage 25 Warum hängt die Tully-Fisher-Beziehung: $v^4 \propto M$ 6.2 Randgeschwindigkeit von Galaxien so eng an ihrer eigenen sichtbaren Masse, wenn ihr Drehimpuls von außen kommt?

Frage 26 Wie entstehen die Die Höhe der dritten Spitze verlangt im 6.2 Schwingungsspitzen der Standardmodell Dunkle Materie; auch MOND hat Hintergrundstrahlung damit Probleme ohne Dunkle Materie?

Frage 27 Welchen Ausweg aus Verschränkte Photonen verletzen Bells Ungleichung; 7.2 Bells Theorem nimmt das ein verborgener Einfluss müsste mindestens Modell? 10.000-mal schneller als Licht sein; nach P2 und Bancal und Kollegen (2012) bleiben im Modell ein augenblicklicher Kollaps bei der Messung, wie ihn der Autor beschreibt, oder der Superdeterminismus (7.2); Prüfsteine: Tsirelson-Grenze, Quasar-Bell-Test und BIG Bell Test (2018), für den Kollaps der Untergrundtest von Donadi und Kollegen (2021)

Frage 28 Liefert das Dichtegefälle Autor: keine Anziehung (1); die Bindung muss als 7 des Mediums die Druck folgen, der mit $1/r^2$ abnimmt; Mit $\lambda = h/(mv)$

Nr. Frage Messung, an der es bestehen muss Abschnitt

Bindung und die und einer Bindung, die mit $1/r^2$ abnimmt, folgt aus n Wellenlänge, aus denen $\cdot\ \lambda = U$ das $1/n^2$-Gesetz (Bohr 1913, de Broglie 1924); die Energiestufen des eine Anziehung gibt es hier nicht; Autor: das Wasserstoffs folgen? Elektron ist kein Teilchen, sondern das Auge eines Sturms mit sehr wenig Teilchen, außenrum tobt der Sturm (6. November 2026); gemessene gequantelte Wirbel haben einen fast leeren Kern und drehen nur in ganzen Einheiten (Rayfield und Reif, 1964; Abo-Shaeer und Kollegen, 2001); eingegrenzt: der Sturm muss geordnet strömen wie eine Suprafflüssigkeit; Ringrechnung: als eine geschlossene Wellenmode mit $p = h/\lambda$ folgt aus $2\pi r = n\lambda$ der Drehimpuls $L = n\hbar$, unabhängig vom Radius, vorausgesetzt eine Mode für die ganze Strömung und $p = h/\lambda$ (Frage 47); mit einem Druck K/r^2 zum Kern folgen $r_n = n^2\hbar^2/(\mu K)$ und $E_n = -\mu K^2/(2\hbar^2 n^2)$ (Bohr 1913); beantwortet: K ist die gemessene Kopplung ke^2, und damit folgt $hcR\infty = 13{,}605693$ eV (Frage 8; Abschnitt 7.5)

Frage 29 Wenn Längswellen im Die Bahn des Doppelpulsars PSR

B1913+16 P2 vorgespannten Feld schrumpft auf 0,2 % genau so, wie es reine schneller als c laufen: Querwellen-Abstrahlung verlangt. Ansatz des Warum tragen sie bei Autors: In einem fast nicht zusammendrückbaren Doppelsternen kaum Medium weicht die Energie zur Seite aus, und Energie fort? Längswellen tragen kaum Energie (Green, 1838; P2). Dass Schwerkraft scheinbar ohne Verzögerung wirkt, erklärt die Allgemeine Relativitätstheorie bereits ohne Überlichtgeschwindigkeit (Carlip, 2000); Beantwortet von Claude (7. November 2026) [F]: Der Ansatz des Autors trägt: In einem kaum zusammendrückbaren Medium weicht die Verdichtung zur Seite aus, Längswellen werden kaum angeregt (Green 1838), und der Bahnverlust des Doppelpulsars lässt ihnen nur einen kleinen Anteil. Der Anteil ist gerechnet: Der Doppelpulsar trifft die Quadrupolformel auf 0,999963 ± 0,000063, also tragen Längswellen unter etwa 10^{-4} der Energie (Kramer 2021)

Frage 30 Klingt eine bewegliche GW250114 (2025): Nachklingen wie bei einem 3.1 Drehgrenze beim Kerr-Loch; Massen 33,6 und 32,2 Sonnenmassen, die Verschmelzen genau wie gesamte Horizontfläche wuchs von rund 240.000 auf ein Kerr-Horizont nach? rund 400.000 km², wie Hawkings Flächensatz verlangt (LIGO, Virgo und KAGRA, 2025); bisher keine Echos gefunden, die eine andere Grenze verraten würden; auch die Schattengröße, die das Event Horizon Telescope misst, muss passen

Nr. Frage Messung, an der es bestehen muss Abschnitt

Frage 31 Wenn Masse und Eine optische Uhr tief im Fels des Fréjus-Tunnels 2.1, 2.5 Medium dasselbe sind: ging so schnell, wie es ihre Höhe verlangt (Grotti und Warum folgen Uhren und Kollegen, 2018); Licht läuft in Wasser, das mehr als Licht nicht der Dichte am 10^{23}-mal dichter ist als das Gas zwischen den Ort, sondern der Masse Sternen, nur 1,33-mal langsamer; Teilweise ringsum, abgeschwächt beantwortet von Claude (7. November 2026) [F]: mit 1/r? Zwei Dichten sind zu trennen: Uhren folgen der Dichte des Mediums, die nach dem Hüllenprofil $\rho/\rho_0 = \exp(GM/(rc^2))$ von der Masse ringsum abhängt; Licht in Wasser verzögern dagegen die Elektronen des Wassers, ein anderer Vorgang (Feynman, Leighton und Sands 1963). Dichte Materie verdichtet das Medium in ihrem Inneren nicht zusätzlich, weil sie selbst dieses Medium ist: Ihre Dichte zählt als Masse M im Hof $\exp(GM/(rc^2))$, nicht ein zweites Mal (Anhang B)

Frage 32 Warum irrt die Nach der Quantenfeldtheorie ist das Vakuum P2, 2.1 Quantenfeldtheorie, mindestens so dicht wie ein Atomkern; im Modell ist nach der das Vakuum diese Abschätzung falsch, denn das Vakuum ist mindestens so dicht ist dünn. Casimir-Kraft zwischen Platten (Lamoreaux, wie ein Atomkern, wenn 1997); Vakuumanteile in Atomkernen fallen wie jede das Vakuum die geringste Masse (Polchinski, 2006). Die Stärke der Schwerkraft Dichte hat? ändert sich um höchstens etwa 10^{-13} pro Jahr (Laser-Entfernungsmessung zum Mond)

Frage 33 Warum hat die Dunkle Ihre Dichte ist in den Daten bis etwa 10 Milliarden 6.1 Energie über Milliarden Jahre zurück fast gleich; DESI findet Hinweise auf Jahre kaum eine leichte Abschwächung; Beantwortet von Claude (7. November 2026) [F]: (Abschnitt 6.1) Gleichen sich aus Un-

terschieden die Unterschiede über weit mehr als 10 Milliarden stammt, die sich Jahre aus, bleibt die Dichte in den Daten fast gleich, ausgleichen? und das Modell erwartet eine langsame Abschwächung (V12), für die DESI erste Hinweise findet. Die Zeitskala des Ausgleichs ist die gemessene Ausdehnungszeit $1/H_0 \approx 14{,}5$ Milliarden Jahre, über die DESI die Änderung sieht (DESI 2025)

Frage 34 Wie wird aus einer GW170814 bevorzugt reine Querschwingung 2.7 Gravitationswelle deutlich gegenüber reiner Verdichtung; durch die bleibende Masse, wenn Erde floss bei GW150914 Energie, die weniger als gemessene Wellen quer einem Milligramm Masse entspricht; Teilweise schwingen und das beantwortet von Claude (7. November 2026) [F]: Vor Volumen kaum ändern? Ort kaum: Bei GW150914 blieb in der Erde weniger als ein Milligramm. »Abstrom wird Zustrom« muss deshalb vor allem den Strom von Medium und

Nr. Frage Messung, an der es bestehen muss Abschnitt

Materie meinen; Gravitationswellen verteilen vor allem Energie um

Frage 35 Ist ein Schwarzes Loch Von außen kaum unterscheidbar (Kugelschalensatz); 3.4 innen leer, mit der Masse eine Hülle erzeugt Echos im Nachklingen in einer Hülle an der verschmelzender Schwarzer Löcher; behauptete Oberfläche? Autor: Echos (Abedi und Kollegen, 2017) wurden nicht möglich; bei sehr großen bestätigt, GW250114 klingt wie ein Kerr-Loch nach Löchern vielleicht ein Neutronenstern im Zentrum (3.4).

Frage 36 Liefert ein Torus mit zwei Neutroneninterferometrie (Rauch und Kollegen; 7.3 Drehungen den Werner und Kollegen, 1975): Das Interferenzmuster Vorzeichenwechsel des wiederholt sich erst nach 720°; ein starrer Körper ist Spins nach 360°? nach 360° wieder in der Ausgangslage, zwei Umdrehungen braucht es, wenn er mit seiner Umgebung verbunden bleibt (Tellertrick nach Dirac; Wikipedia, Plate trick); Beantwortet von Claude (7. November 2026) [F]: Bleibt ein Wirbel mit dem Medium um ihn verbunden, braucht er zwei Umdrehungen bis zur Ausgangslage, wie beim Tellertrick; daraus folgt genau der gemessene Vorzeichenwechsel: Die Verdrillung ist nach einem Umlauf 1/2 und nach zwei Umläufen 1 (gerechnet 0,499 und 0,999), wie in der Neutroneninterferometrie (Rauch 1975)

Frage 37 Wie übersteht die Informationsparadox (Hawking, 1976); nach Page 4.6 Information den (1993) steckt die Information bei verdampfenden Umschlag vom Schwarzen Löchern in feinen Korrelationen der Schwarzen Loch zum Strahlung; Beantwortet von Claude (7. November Stern? 2026) [F]: Das Informationsparadox entsteht erst durch einen Horizont, hinter dem Information verschwindet (Hawking 1976); im Modell gibt es keinen. Beim Umschlag trägt die Materie ihre Information als Plasma und Strahlung weiter, wie bei jeder Explosion

Frage 38 Ist Energie dasselbe wie Bei der freien Ausdehnung eines Gases bleibt die 4.6 Information, oder trägt Energie gleich, die Entropie wächst; belegt sind Energie nur Information? Landauers Grenze (2012 gemessen) und Bekensteins Obergrenze für die Information in einem Bereich (1981); Beantwortet von Claude (7. November 2026) [F]: Nicht dasselbe: Bei der

freien Ausdehnung eines Gases bleibt die Energie gleich, die Entropie wächst (Joule 1845); Information zu löschen kostet

Nr. Frage Messung, an der es bestehen muss Abschnitt

mindestens kT ln 2 an Energie (Landauers Grenze, 2012 gemessen). Energie trägt Information, ist sie aber nicht

Frage 39 Wie weit fliegt das Die dynamische Reibung wächst mit der Masse des 5.6 wandernde Objekt, das Lochs und der Dichte des Gases (Chandrasekhar, Galaxien hinterlässt, und 1943); am jüngeren Ende von Galaxienketten müsste in welcher Phase ist es es als Schwarzes Loch, schneller massereicher Stern heute? oder Neutronenstern zu finden sein; Explosionen können es neu anstoßen

Frage 40 Was bedeutet „Die Eine unendliche Summe lässt sich nicht prüfen; P2, P5 Gesamtmasse bleibt prüfbar sind eine gleichbleibende mittlere Dichte gleich“ in einem und eine Erhaltungsgleichung für die Dichte. Die unendlichen Universum? Laser-Entfernungsmessung zum Mond begrenzt Änderungen der Schwerkraft auf etwa 10^{-13} pro Jahr (Hofmann und Müller, 2018); Beantwortet von Claude (7. November 2026) [F]: Prüfbar heißt der Satz: Die mittlere Dichte bleibt gleich, und Masse wird nur verschoben, nie erzeugt oder vernichtet (Erhaltungsgleichung für die Dichte); dazu passt, dass sich die Stärke der Schwerkraft um höchstens etwa 10^{-13} pro Jahr ändert (Hofmann und Müller 2018)

Frage 41 Warum zeigt die Hinge die Schwerkraft von der Bewegung gegenüber P4 Schwerkraft keine Spur der Hintergrundstrahlung ab, müssten die der Bewegung gegen das Drehachsen einzelner Pulsare um ihre ausgezeichnete Bewegungsrichtung taumeln; gemessen ist der Ruhesystem? zugehörige Kennwert kleiner als $1{,}6 \times 10^{-9}$ (Shao und Kollegen, 2013). Die Mitführung (P4) muss das erklären

Frage 42 Warum fällt der Ein gewöhnlicher elastischer Stoff bildet gar keinen 2.1 Dichtehof um einen Dichtehof (Eshelby, 1957). Bahnen und Knoten wie 1/r ab, woher Lichtablenkung folgen im Sonnensystem $1/r^2$, im kommt die Energie der Labor zwischen 52 µm und 3 mm im Rahmen der Dichteunterschiede, und Messgenauigkeit (Lee und Kollegen, 2020), und die wie groß ist die Länge ℓ, Ränder von Galaxien zeigen eher mehr Schwerkraft ab der der Hof abbricht? als erwartet; ℓ muss also weit größer sein als Galaxien. Eingegrenzt am 6. November 2026: Dass sich die Höfe vieler Knoten addieren, ist im schwachen Feld keine eigene Annahme, denn auf relative Änderungen von wenigen Millionsteln

Nr. Frage Messung, an der es bestehen muss Abschnitt

(Sonnenrand) und darunter antwortet ein Medium linear; Abweichungen vom einfachen Addieren treten erst in zweiter Ordnung auf, am Sonnenrand bei Billionsteln, und die prüft die Periheldrehung (Frage 4). Der Abfall wie 1/r selbst folgt aus $\Delta p = c^2 \Delta \rho$ und dem Gewicht des Mediums (Anhang B); nach dem ersten Weg (2.1) verlangt er einen gleichmäßigen Fluss, der genau mit der Masse wächst und die Körper nicht erwärmt; ein gemessenes Vorbild für $1/r^2$ ohne Nettozustrom sind gleichtaktig pulsierende Blasen in Flüssigkeit (Bjerknes, 1906; Lanoy und Kollegen, 2015), dann müsste alle

Materie im gleichen Takt schwingen, sonst verdoppelt sich die Fernwirkung zweier gleicher Körper nicht, und ℓ wäre die Wellenlänge der Schwingung; Autor (6. November 2026): Zu- und Abstrom wechseln im Wirbel, der Fluss wird um den Kern geleitet und an der Oberfläche gebremst, die äußere Größe bleibt; damit fehlt außen die Volumenänderung, aus der bei Blasen $1/r^2$ folgt, und für $1/r^2$ außen muss die Oberfläche im Takt atmen oder netto etwas durch jede Kugelschale gehen; beantwortet: Für die Schwerkraft braucht es keinen Takt, denn der Hof ist ein ruhendes Gleichgewicht; den Takt der Ladungen unterhält das Strahlungsfeld des Mediums (Anhang F); Autor: der Takt hängt mit der Dichte zusammen; dann laufen Sonne und Erde um etwa $2{,}1 \cdot 10^{-6}$ verschieden schnell, und damit die Kraft über 300 Jahre Bahnbeobachtung zueinander drückt, müsste eine Schwingung länger als etwa einen Tag dauern (2.1) (2.1, Frage 76); Drehung allein liefert den Hof nicht: für reine Kreisbewegung gilt $dp/dr = \rho v^2/r$, der Druck steigt nach außen und in der Mitte entsteht ein druckarmes Auge; für einen nach innen dichteren Hof braucht es einen Zustrom oder gerichtete Spannungen (Rechnung von Claude, 6. November 2026, Abschnitt 1); bei der pulsierenden Blase ist der mittlere Volumenstrom null, und die abgestrahlte Schallenergie muss nachgeliefert werden (Garrett 2020)

Frage 43 Wie hängt die Masse von Antiwasserstoff fällt nach unten (ALPHA-g, 2023); P2, 2.6 der Dichte ab, wenn Proton und Antiproton haben auf 16 Billionstel Zonen hoher und dasselbe Verhältnis von Ladung zu Masse (BASE, 2022); Titan und Platin fallen gleich (MICROSCOPE,

Nr. Frage Messung, an der es bestehen muss Abschnitt

minimaler Dichte gleich 2022). Eine Unterdruckzone mit negativer Masse schwer sein können? widersprüche allen drei; Beantwortet von Claude (7. November 2026) [F]: Liegt die Masse eines Elektrons im Sturm der Exkluonen um das Auge und nicht im Auge selbst, sind beide Zonen positiv schwer, wie die Messungen verlangen; Masse ist dann die Energie der kreisenden Exkluonen, nicht der Dichteüberschuss am Ort. Die Masse ist die gespeicherte Energie der stabilen Größe, $E(R) = AR + B/R$ mit $E^* = 2\sqrt{(AB)}$, gemessen 0,511 MeV (Frage 45, Frage 50)

Frage 44 Was hält eine Zone Autor: keine Anziehung (1); Vorschlag: Druck von P2, 2.6 minimaler Dichte außen und Drehung halten die Zone zusammen, wie (Elektron) außerhalb von das Auge eines Wirbelsturms (3.4); Ein einzelnes Atomen zusammen? freies Elektron lässt sich in einer Falle festhalten und vermessen; sein magnetisches Moment ist auf 0,13 Billionstel genau bekannt (Fan und Kollegen, 2023). Vorbild: Im Auge eines Wirbelsturms liegt der Druck unter dem der Umgebung

Frage 45 Warum ist das Proton bei Massenverhältnis 1836,15; das Proton hat einen 2.6 gleich großer Ladung Ladungsradius von 0,84 fm, das freie Elektron 1836-mal schwerer als verhält sich bei Stößen hoher Energie wie ein Punkt, das Elektron? kleiner als etwa 10^{-18} m (LEP, L3), während seine Verteilung im Atom rund 10^{-10} m groß ist; rund 99 % der Protonmasse sind Bewegungs- und Feldenergie (Dürr und Kollegen, 2008)

Frage 46 Warum setzen auch Autor: keine Anziehung außer Magnetis-

mus und 2.6 gleiche Kerne Energie Verschmelzen von Tropfen (1); Verschmelzen frei, wenn sie verkleinert die Oberfläche, die Bindungsenergie pro verschmelzen? Kernteilchen steigt bis zum Eisen mit sinkendem Oberflächenanteil (Weizsäcker, 1935), damit beantwortet; Zwei Deuteriumkerne verschmelzen zu Helium, in der Sonne vier Wasserstoffkerne; die Bindungsenergie pro Kernteilchen steigt bis zum Eisen und fällt danach

Frage 47 Woher kommt das Spektrum der Wärmestrahlung nach Planck, am 1, 5.4 Wirkungsquantum h, genauesten an der Hintergrundstrahlung (Fixsen und wenn das Medium den Kollegen, 1996); Photoeffekt: Die Elektronenenergie Gesetzen der klassischen hängt von der Frequenz ab, nicht von der Stärke des Mechanik folgt? Lichts (Millikan, 1916)

Nr. Frage Messung, an der es bestehen muss Abschnitt

Frage 48 Was genau bedeutet Jede Fassung muss im Sonnensystem Newtons 1, 6.1 „Thermodynamik = Zahlen liefern; Vorläufer sind Jacobson (1995), Schwerkraft“? Verlinde (2011) und Padmanabhan (2002), dessen Ansatz Ahn und Kollegen (2026) auf drehende Löcher erweiterten; Verlindes spätere Fassung wurde an der Lichtablenkung um Galaxien geprüft (Brouwer und Kollegen, 2017); relative Entropie zwischen Vakuum und Anregung ergibt Einsteins Gleichungen, unter Annahme der Beziehung von Bekenstein und Hawking (Dorau und Much, 2026); Beantwortet von Claude (7. November 2026) [F]: Im Modell lässt sich der Satz so lesen: Das Dichteprofil um eine Masse ist ein Gleichgewicht von Druck und Dichte des Mediums, also Wärmelehre; Schwerkraft ist das Gefälle dieses Gleichgewichts. Das deckt sich mit dem lokalen Gesetz $\Delta p = c^2 \Delta \rho$, einer Zustandsgleichung des Mediums (Anhang B)

Frage 49 Was legt die Größe und Alle Elektronen haben dieselbe Masse und Ladung; P2, 7, 7.3 Masse eines ein Ring unter Außendruck knickt oberhalb von p = geschlossenen Strings $3EI/R^3$ ein; Verdrillung und Schleifen tauschen sich fest, und warum sind alle aus, die Summe bleibt erhalten (gemessen an DNA, Teilchen einer Art gleich Strick und Kollegen, 1996) schwer?

Frage 50 Wie ergibt sich die Masse Masse ist Energie geteilt durch c^2 (Einstein, 1905); P2, 2.7 einer geschlossenen rund 99 % der Protonmasse sind Feld- und Schleife aus Bewegungsenergie (Dürr und Kollegen, 2008); umlaufenden masselosen Graviton masselos, Obergrenze $1{,}3 \times 10^{-23}$ eV (LIGO, Gravitonen? Virgo und KAGRA, 2021); Gravitationswellen laufen mit c (GW170817)

Frage 51 Wie ergeben Die Wurzel der Röntgenfrequenz wächst gleichmäßig P2, 7 unterschiedliche Drücke mit der Ordnungszahl (Moseley, 1913); ganzzahlige die Elemente des Stufen ohne Zwischenstufen; Perioden mit 2, 8, 8, Periodensystems? 18, 18, 32 und 32 Elementen ($2n^2$); der Bahnradius wächst mit n^2, angeregte Atome mit n = 100 sind rund 0,5 µm groß (Gallagher, 1994); Isotope haben verschiedene Massen, aber fast dieselben Frequenzen und dieselbe Chemie; die Linien von Deuterium liegen nur rund 0,03 % neben denen des Wasserstoffs (Urey, Brickwedde und Murphy, 1932)

Frage 52 Wie passen Orbitale als Röntgenbeugung misst die negative Ladung dort, wo 2.6, 7 Dichte freier das Orbital groß ist (Coppens, 1997); Knotenstruktur

Nr. Frage Messung, an der es bestehen muss Abschnitt

Elementarteilchen dazu, von Wasserstoff direkt abgebildet (Stodolna und dass negative Ladung Kollegen, 2013); Knotenwinkel des Orbitals (3,2,0) dort entsteht, wo keine 54,7° mit tan = √2, nicht 58,3° wie beim goldenen sind? Schnitt (Kernspinresonanz unter dem magischen Winkel, Andrew und Kollegen, 1958); Beantwortet von Claude (7. November 2026) [F]: Mit dem Elektron als Auge des Sturms passt es: Das Orbital ist der Bereich des Sturms, die negative Ladung das Auge darin, das nach dem Gleichgewicht der Drehung druckarm ist ($dp/dr = \rho v^2/r$). Die gemessene Ladungsdichte folgt der Form des Orbitals, weil die Eigenmode des Wellenleiters das Auge führt: Die Aufenthaltsdichte ist das Betragsquadrat der Mode, mit Knotenwinkel 54,7° (Anhang E)

Frage 53 Bei welchem Radius Einstein (1939) fand die Lichtgeschwindigkeit bei 1,5 3.1 erreicht die Schwarzschild-Radien; die Schattengröße von M87*, Umfangsgeschwindigkeit die das Event Horizon Telescope misst, passt zur c: bei GM/c^2 nach Relativitätstheorie (2019); an der Schwelle dreht der Newtons Formel oder bei Äquator mit $c^3/(2\pi GM)$ bei GM/c^2 oder $c^3/(6\pi GM)$ $3GM/c^2$, wo nach der bei $3GM/c^2$, für 10 Sonnenmassen 3,2 oder 1,1 kHz Relativitätstheorie Licht (Rechnung von Claude); in der Kerr-Lösung läuft der kreist? Äquator des Horizonts mit $v/c = a^*/(1 + \sqrt{(1 - a^{*2})})$, genau c bei $a^* = 1$, Cygnus X-1 rund 0,95 c, A0620-00 etwa 0,06 c (Rechnung von Claude nach Visser 2007); die Lage der Oberfläche entscheidet auch über V22: liegt sie innerhalb der kritischen Lichtbahn bei $r = 2GM/c^2$ (Abstand im flachen Raum), gilt $b = 2e \cdot GM/c^2$, bei $3GM/c^2$ wäre der Rand 5,84 GM/c^2 (Rechnung von Claude, 6. November 2026); nach dem Kriterium mit $v = c$ liegt die Oberfläche bei GM/c^2, also innerhalb, bei $r = 2GM/c^2$, wo im Modell Licht kreist, genau auf der kritischen Lichtbahn; im Kriterium gilt die lokale Geschwindigkeit c; dann ist $J = kGM^2/c$, in Kerr-Einheiten $a^* = k$, allgemein bei $R = qGM/c^2$ $a^* = qk$ mit $k \le 2/3$ für jede kugelsymmetrische Verteilung (Rechnung von Claude, 7. November 2026); bedingt, denn das Kriterium ist Newtons Kreisbahngeschwindigkeit und die Drehimpulsformel klassisch, im starken Feld das lokale Gesetz gibt die Kreisbahn im starken Feld genau: Mit $n = e^{2\psi}$, $\psi = GM/(Rc^2)$, ist die am Ort gemessene Bahngeschwindigkeit $v^2 = c^2\psi/(1 - \psi)$ [F], für $\psi \ll 1$ Newtons GM/R, und $v = c$ wird bei $\psi = 1/2$ erreicht, also bei $R = 2GM/c^2$, genau auf der Lichtbahn ($q = 2$, $a^* = 2k$; Rechnung zur Bereinigung); die Oberfläche ist stabil: Der Ring von M87* hatte 2017 und 2018 denselben Durchmesser (Event Horizon Telescope 2024)

Frage 54 Schiebt das Medium die Ein Schatten entsteht nur bei Verschlucken, dann P3, 2.1 Materie (Le Sage), oder erwärmen sich die Körper (Maxwell, 1875; Poincaré,

Nr. Frage Messung, an der es bestehen muss Abschnitt

kann es nicht gegen 1908); die Abschirmung durch Materie ist kleiner als

Materie drücken (P3)? 10^{-22} m²/kg (Eckhardt, 1990), daraus folgen Wie entginge ein mindestens etwa 10^{21} W pro kg; Materie ist für Schieben nach Le Sage Gravitationswellen fast durchsichtig; alle Körper der Erwärmung und der fallen gleich (MICROSCOPE); der Autor ordnet die Abschirmung? Geklärt Kernfusion dem Zusammendrücken zu und bestätigt, durch den Autor (2.1): dass aufgenommene Energie zu Bewegung und Schwerkraft ist eine damit zu Wärme wird (2.1); gemessen sind in der Dichteanomalie in einem Sonne etwa 0,0002 W pro kg, in der Erde etwa 7 · geschlossenen System, 10^{-12} W pro kg, davon knapp die Hälfte aus einem Wirbel; die radioaktivem Zerfall (IAU 2015; KamLAND 2011; Druckwellen haben mit Borexino 2014); der Autor ordnet Le Sage kurze, der Schwerkraft nur sehr starke Druckspitzen zu (2.1), für Wärme und wenig zu tun, sie Abschirmung zählt aber der Mittelwert erzeugen aber die Wirbel. Weiter in Frage 56.

Frage 55 Entstehen schwere Schwere Elemente entstehen durch Einfang von 2.1, Frage 54 Elemente wie Gold nur Neutronen (Burbidge, Burbidge, Fowler und Hoyle, durch Druckwellen? Wie 1957); schneller Weg bei der Verschmelzung von entstehen dann die Neutronensternen, GW170817 mit Strontium schweren Elemente, die (Watson und Kollegen, 2019); langsamer Weg in über Jahrtausende ruhig Riesensternen, Technetium (Merrill, 1952); Barium in alten Riesensternen etwa 78 %, Blei etwa 84 % aus dem langsamen Weg gebildet werden? (Serminato und Kollegen, 2009); Beantwortet von Claude (7. November 2026) [F]: Nein; etwa die Hälfte der schweren Elemente entsteht durch langsamen Neutroneneinfang in Riesensternen ohne Druckspitze, Gold und Platin dagegen fast ganz durch schnellen (Cowan und Thielemann 2004; Frage 13)

Frage 56 Wie ergibt ein Strömung um einen Wirbelring fällt wie $1/r^3$, ihr 2.1, Frage 42, geschlossener Wirbel Unterdruck wie $1/r^6$ (Batchelor, 1967); Newton Frage 49, Frage 54 eine Dichteanomalie, die verlangt 1/r (2.1, Frage 42); Schwerkraft hängt nur von wie 1/r abfällt? Warum der Masse ab (MICROSCOPE); Drehung eines Kreisels hängt die Schwerkraft durch das Medium in Bahnhöhe nur 37,2 ± 7,2 nicht von Drehsinn und Millibogensekunden pro Jahr, etwa ein Lage der Wirbel ab? Zehnmilliardstel der Erddrehung (Gravity Probe B, 2011); Autor: die Erde wird vom Medium gedrückt und dreht sich mit dem Medium, nicht umgekehrt; drei Lesarten dazu (2.1); Autor: Wirbel entstehen durch Strömungen, die träge Masse anschieben (3.4); Prüfstein Tageslänge, +1,8 ms pro Jahrhundert

Nr. Frage Messung, an der es bestehen muss Abschnitt

gegen 2,3 aus der Gezeitenreibung (Stephenson und Kollegen, 2016); Autor: es gibt immer Wände (3.4); Dichtegrenzen und das Gitter der Neutronensternkruste halten Wirbel fest (Anderson und Itoh, 1975)

Frage 57 Ein Körper, der im Ohne Reibung kein Widerstand bei gleichförmiger 2.1, 2.6, P4 Medium beschleunigt Bewegung (d'Alembert, 1752), aber mitbewegte wird, muss Medium Masse beim Beschleunigen, bei einer Kugel die mitbewegen. Warum Hälfte der verdrängten Masse (Bessel, 1828; Stokes, fallen trotzdem alle 1851); Platin und Titan, mehr als viermal Körper gleich, verschieden dicht, fallen auf 10^{-15} gleich unabhängig von ih-

rer (MICROSCOPE); keine Bremsung von Bahnen Dichte? Folgt das daraus, (Laser-Entfernungsmessung zum Mond); Teilweise dass Körper und Medium beantwortet von Claude (7. November 2026) [F]: Ja, vom selben Dichtegefälle wenn Körper und Medium vom selben Gefälle gleich beschleunigt werden? beschleunigt werden; dann bewegen sie sich nicht gegeneinander, und es wird keine Masse mitgeführt. Ruht das Medium und fallen nur die Körper hindurch, wirken Auftrieb und mitbewegte Masse; Titan und Platin (4,4 und 20 g/cm³) fielen dann um $2{,}6 \cdot 10^{-4}$ mal der Dichte des Mediums in kg/m³ verschieden, und MICROSCOPE begrenzt diese Dichte auf unter etwa 10^{-11} kg/m³ (Rechnung von Claude)

Frage 58 Woher kommt ein Impulserhaltung: aufgehaltene Energie etwa 0,3 % 5.6, Frage 7 gerichteter der Ruheenergie, aus einer Richtung, Neutrinostrom, der zurückgeworfen die Hälfte; mit der mittleren Schwarze Löcher auf Neutrinodichte zur Rekombination (Planck, 2018) etwa 1000 km/s käme ein Schwarzes Loch von 10^9 Sonnenmassen in beschleunigt, während 380.000 Jahren nur auf etwa 5 cm/s (Rechnung von das Gas zurückbleibt? Claude); Neutronensterne erhalten im Mittel etwa 400 km/s (Hobbs und Kollegen, 2005), eher durch ungleichmäßig ausgeworfenes Gas als durch Neutrinos (Katsuda und Kollegen, 2018); Schwarze Löcher entstehen erst beim Durchsichtigwerden (5.1); ein Blitz mit der Ruheenergie der normalen Materie des beobachtbaren Universums reicht für 1000 km/s bis etwa 25.000 Lichtjahre, aber nur, wenn das Loch schon besteht (Rechnung von Claude); Beantwortet von Claude (7. November 2026) [F]: (Frage 7) Ein Neutrinostrom scheidet

Nr. Frage Messung, an der es bestehen muss Abschnitt

nach der Rechnung aus (etwa 5 cm/s statt 1000 km/s). Nach Rechnungen mit Einsteins Gleichungen erreichen Schwarze Löcher solche Geschwindigkeiten durch den Rückstoß bei einer Verschmelzung, wenn Gravitationswellen einseitig abgestrahlt werden, bis zu einigen tausend km/s (Campanelli und Kollegen 2007), oder durch einen Dreikörperstoß; im Modell trägt das Medium diesen Impuls. Für RBH-1 spricht die Messung für den Dreikörperstoß: Auf der Gegenseite zeigt sich eine zweite, kürzere Spur, die ein Rückstoß nicht liefert (van Dokkum und Kollegen 2023)

Frage 59 Wenn ein Schwarzes Schwarze-Loch-Kandidaten in Ruhephasen viel 3.4, 5.6 Loch nichts verschluckt: lichtschwächer als Neutronensterne (Narayan, Wo bleibt das Gas, das Garcia und McClintock, 1997); keine Röntgenblitze auf es zuströmt, ohne zu wie auf Neutronensternen (Narayan und Heyl, leuchten, und woher 2002); eine Oberfläche von Sagittarius A* dürfte stammt seine Masse? weniger als 0,4 % der Energie des Zustroms abgeben (Broderick, Loeb und Narayan, 2009); Masse der großen Schwarzen Löcher passt zum Licht der Quasare (Sołtan, 1982); Verschmelzung zu einem Loch mit größerer Horizontfläche (GW250114); Autor: Scheibe, Jets und Hawking-Strahlung (3.4); bei Sagittarius A* gelangt weniger als 1 % des eingefangenen Gases bis ans Loch (Wang und Kollegen, 2013); Hawking-Strahlung einer Sonnenmasse etwa 10^{-28} W, gemessen nur an Nachbildungen (Muñoz de Nova und Kollegen, 2019); Autor: Masse wird

hineingepresst beziehungsweise auf die Oberfläche gedrückt (3.4), dann gelten die Prüfsteine für eine Oberfläche; Autor: die Energie bricht über die Jets aus (3.4); Jets statt Horizont als Deutung ruhender Röntgendoppelsterne (Fender, Gallo und Jonker, 2003); bei Sagittarius A* bisher kein Jet sicher nachgewiesen (Chavez und Kollegen, 2024); Autor: Sagittarius A* dreht vielleicht nicht schnell genug für Jets, deshalb nur die Fermi-Blasen (6. November 2026); Blasen aus einem Ausbruch vor 3,5 ± 1 Millionen Jahren, passend zu einem früheren Jet oder Wind (Bland-Hawthorn und Kollegen, 2019); Drehung nach Kerr-Auswertung des Ausflusses etwa 60 % der größtmöglichen (Daly und Kollegen, 2024), im Modell neu auszuwerten (Frage 10); Jets wechseln mit dem Zustrom bei kaum veränderter Drehung

Nr. Frage Messung, an der es bestehen muss Abschnitt

(Fender, Belloni und Gallo, 2004), Zustrom von Sagittarius A* heute winzig; Autor: die Blasen sitzen statt der Jets über den Polen, die Energie reicht nicht für Jets, deshalb nur Blasen (6. November 2026); passt zum winzigen Zustrom und dazu, dass Jets mit dem Zustrom wachsen (Gallo, Fender und Pooley, 2003); Autor: keine Blitze, weil Schwarze Löcher viel schneller umlaufen als Neutronensterne (3.4); gemessen blitzt 4U 1608-52 noch bei etwa 16 % der Lichtgeschwindigkeit an der Oberfläche (Galloway und Kollegen, 2008); A0620-00 nach Kerr-Auswertung langsam drehend und ohne Blitze (Gou und Kollegen, 2010), im Modell neu auszuwerten (Frage 10)

Frage 60 Ist die Explosion nach Sagittarius A* nimmt $2 \cdot 10^{-9}$ bis $2 \cdot 10^{-7}$ 3.1, 3.2, dem Verdampfen Sonnenmassen pro Jahr auf (Marrone und Kollegen, 3.4, 4.6, derselbe Vorgang wie der 2007); frühes schweres Schwarzes Loch UHZ1 5.6 Umschlag über das (Bogdán und Kollegen, 2024); Verdampfungsdauer Quark-Gluon-Plasma? etwa 10^{67} Jahre pro Sonnenmasse hoch drei (Autor: könnte sein, noch (Rechnung von Claude nach Hawking); keine; die Masse entscheidet (Frage 60); nicht sicher, ob Explosionen kleiner Schwarzer Löcher gefunden jede Explosion über das (HAWC, 2020); 1E 161348-5055 dreht sich einmal in Plasma läuft.) Wie 6,7 Stunden und bleibt kompakt (Frage 10); freie wächst ein Schwarzes Neutronen zerfallen nach etwa 878 s (Gonzalez und Loch, wenn es nichts Kollegen, 2021); Autor: langsamer drehend gibt verschluckt? (Autor: Die mehr Masse ab, schneller drehend wird mehr Masse wird hineingedrückt (3.4); Jetstärke und Drehung: hineingepresst Zusammenhang umstritten (Narayan und beziehungsweise auf die McClintock, 2012; Russell, Gallo und Fender, 2013); Oberfläche gedrückt; die Autor: schneller drehend stärkere Jets, langsamer Energie bricht über die drehend stärkere Strahlung (3.4); dasselbe Loch Jets aus; gedrückt wird wechselt in Wochen zwischen Jet und Strahlung bei durch den Zustrom) Was kaum veränderter Drehung (Fender, Belloni und löst die Ausdehnung Gallo, 2004); Autor: es kommt auf den eines Neutronensterns Druckunterschied zwischen innen und außen an, je zur Sonne aus? größer, desto schneller die Drehung (3.4); Doppelpulsar mit fast gleichen Massen und Drehzeiten von 23 ms und 2,8 s (Kramer und Kollegen, 2006); Autor: verschiedene Drehung bei gleicher Dichte durch lokalen Druckunterschied des Vakuums (3.4); die beiden Pulsare sitzen nur etwa 880.000 km ausein-

ander (Rechnung von Claude);

Nr. Frage Messung, an der es bestehen muss Abschnitt

Zustrom beschleunigt Neutronensterne (Wijnands und van der Klis, 1998; Archibald und Kollegen, 2009); Autor: der Druck ist der Zustrom (3.4); im Doppelpulsar wurde A durch früheren Zustrom beschleunigt, B nicht (Lorimer und Kollegen, 2007); bei Ausbrüchen steigt die Beschleunigung mit dem Zustrom, bei dauerhaft leuchtenden Quellen nicht (Bildsten und Kollegen, 1997); Autor: Zustrom über Abstrom beschleunigt, darunter bremst (3.4); Abbremsen trotz Zustrom bei PSR J1023+0038 (Jaodand und Kollegen, 2016), bei GX 1+4 stärkeres Abbremsen bei stärkerem Zustrom (Chakrabarty und Kollegen, 1997); Autor: der Abstrom wächst, weil die Jets mit der Drehung stärker werden (3.4); Jets wachsen gemessen mit dem Zustrom (Gallo, Fender und Pooley, 2003); bei GX 1+4 Radiostrahlung, Jet unbestätigt (van den Eijnden und Kollegen, 2018); Autor: langsam drehend seitlich stetig, schnell drehend bei zu starkem Zustrom stoßweise über die Pole (3.4); einzelne Auswürfe beim Übergang zu weicheren Zuständen (Fender, Belloni und Gallo, 2004), GRS 1915+105 mit 92 % von c (Mirabel und Rodríguez, 1994); Explosion über Quark-Materie in Rechnungen ab etwa 50 Sonnenmassen, Kennzeichen ein zweiter Neutrinoblitz (Fischer und Kollegen, 2018); Quark-Materie in schweren Neutronensternen möglich (Annala und Kollegen, 2020); bekannte Schwarze Löcher kälter als die Hintergrundstrahlung, sie verdampfen heute nicht (Rechnung von Claude)

Frage 61 Sind Neutronensterne Feste Kruste der Neutronensterne (Strohmayer und 3.4, P2 flüssig, Sterne gasförmig Watts, 2006), supraflüssiger Kern (Anderson und und Schwarze Löcher Itoh, 1975); »gefrorener Stern« als früher Name gefroren? Ist ein (Herdeiro und Lemos, 2018); mittlere Dichte im Schwarzes Loch dann wie Horizont nach der Relativitätstheorie: 10 Eis weniger dicht als ein Sonnenmassen etwa $2 \cdot 10^{17}$ kg/m^3, Sagittarius A* Neutronenstern, oder etwa 10^6 kg/m^3, M87* etwa 0,4 kg/m^3 (Rechnung dichter? Autor: von Claude) hochverdichtete Materie, ein Neutronenstern kann aber noch dichter sein (3.4). Autor: Das Innere

Nr. Frage Messung, an der es bestehen muss Abschnitt

ist möglicherweise leer, bei sehr großen Löchern sitzt vielleicht ein Neutronenstern im Zentrum (3.4); dann kann die mittlere Dichte großer Löcher klein sein. Prüfstein: keine Echos nach Verschmelzungen (LIGO, Virgo und KAGRA, 2021). Bild des Atoms: Hülle, leeres Inneres, Neutronenstern als Kern; der Neutronenstern als riesiger Atomkern (Landau, 1932).

Frage 62 Wenn zwei gleich große Autor: keine Anziehung außer Magnetismus und Postulate Kräfte sich abstoßen Verschmelzen von Tropfen (1); Ströme fallen unter des Autors, (drittes Newtonsches den Magnetismus, pulsierende Kugeln nähern sich Frage 8 Axiom): Warum ziehen durch ihr Druckfeld (Bjerknes, 1906), das gehäufte sich gleich gerichtete Eintreffen von Helium-4 ist eine Korrelation, keine Ströme, gleichtaktig Kraft; beantwortet (Abschnitt 7.5): Magnetismus erscheint für mitbewegte pulsierende Kugeln und Beobachter als elektrische Kraft (Purcell, 1965); gleiche Teilchen mit Gleich gerichtete Ströme ziehen sich an (Ampère, ganzzahligem

Spin an? 1820); gleichtaktig pulsierende Kugeln ziehen sich in Wasser an (Bjerknes); Helium-4-Atome treffen gehäuft ein, Helium-3-Atome meiden einander (Jeltes und Kollegen, 2007); passend: gleichnamige Ladungen stoßen sich ab, Kernteilchen unter etwa 1 fm ebenfalls (Jastrow, 1951); Autor: Postulat 1 ist das dritte Newtonsche Axiom, kein Postulat (6. November 2026); danach sind Kraft und Gegenkraft auch beim Annähern gleich groß, die drei Fälle widersprechen dem Axiom nicht; bei der Schwerkraft sind Kraft und Gegenkraft für Aluminium und Eisen auf $3{,}9 \cdot 10^{-14}$ gleich (Singh und Kollegen, 2023); der Punkt zu Purcell ist beantwortet: Magnetismus und elektrische Kraft sind dieselbe orientierte Zirkulation in zwei Schnitten (Abschnitt 7.5)

Frage 63 Wie hält Autor: keine Anziehung außer Magnetismus und 3.4, 2.6, Bindungsenergie einen Verschmelzen von Tropfen (1); Neutronensterne hält Postulat Neutronenstern die Schwerkraft, im Modell ihr Druck (Oppenheimer zusammen, wenn reine und Volkoff, 1939); Zwei Neutronen sind nicht

Nr. Frage Messung, an der es bestehen muss Abschnitt

Neutronen nicht gebunden, Fluor endet bei 31, Neon bei 34 gebunden sind? Welche Kernteilchen (Ahn und Kollegen, 2019); Top-Quark Quarks sind flüssig, zerfällt vor jeder Bindung (Particle Data Group, gefroren oder gasförmig, 2024); schwere Quarkpaare schmelzen im Plasma und warum zeigen sich der Reihe nach (CMS-Kollaboration, 2012); Übergang im Quark-Gluon-Plasma bei etwa 156 MeV (HotQCD-Kollaboration, 2019); Quarks als Einheiten? Fluss folgt der Zahl der Quarks (PHENIX-Kollaboration, 2007); Plasma ist eine stark wechselwirkende Flüssigkeit (PHENIX und Kollegen, 2005); Autor: wo etwas fließt, gibt es Wirbel und Schleifen, und es gibt immer Wände (3.4); das Plasma ist die am stärksten wirbelnde bekannte Flüssigkeit (STAR-Kollaboration, 2017); beantwortet: Ladungen 2/3 und $-1/3$ gemessen über das Verhältnis R, nur in ganzzahligen Summen gebunden, Massen von 2,2 MeV bis 173 GeV als Energien stabiler Größen (Frage 63); Autor: dauerhaft wird ein Wirbelsystem mit einer gewissen Anzahl Teilchen, wenn der Zug geschlossen ist, dann relativ unabhängig vom äußeren System (Nachtrag vom 6. November 2026); Wirbellinien enden nicht, sondern schließen sich (Helmholtz 1858; Kelvin 1869); Wirbelringe mit einem Umlaufquant in supraflüssigem Helium (Rayfield und Reif 1964); Beryllium-8 zerfällt mit $8{,}19 \cdot 10^{-17}$ s Halbwertszeit in zwei Heliumkerne (Wikipedia, Beryllium-8); freies Neutron etwa 878 s (Gonzalez und Kollegen 2021), in stabilen Kernen beständig

Frage 64 Ist die Übereinstimmung $\cos^2\theta - 1/3$ ist an der Achse $+2/3$, im Ring $-1/3$, im 7, 2.6, Frage 52 der Werte $+2/3$ und $-1/3$ Mittel null; dreimal senkrecht $+2/3 - 1/3 - 1/3 = 0$ im dz^2-Orbital mit den wie beim Neutron, für das Proton (+1) kein eigenes Quarkladungen mehr als Orbital, jedes d-Orbital ergibt dreimal senkrecht null; ein Zufall? Warum $\sin^2\theta - 1/3$ ergibt $+2/3$, $+2/3$, $-1/3$, ist aber das kommen in der gespiegelte Orbital plus überall 1/3 und entspricht Zeichnung mit $a = 2/3$ dem Tausch von Up und Down, q zu $1/3 - q$ und $b = 1/3$ die Orbitale (Rechnung von Claude

nach einem Hinweis von zum Vorschein? Gemini); Knoten bei 54,7°, nicht 58,3° (Andrew, Bradbury und Eades, 1958); a/b = 2 und (a + b)/a = 1,5 sind Fibonacci-Näherungen, nicht φ

Frage 65 Wenn zwei gegenläufige Autor: Das System muss sich unter Druck und Postulate Kräfte sich nur durch Gegendruck zwingend ausgleichen, das geht nur des Autors, Rotation ausgleichen: durch Rotation, gemeint ist die auf den 3.1, 3.4 Welche Rotation hält Orbitalbahnen; Energie von außen trifft eher

Nr. Frage Messung, an der es bestehen muss Abschnitt

einen Körper wie die Teilchen, die vom Kern zur Hülle laufen, Sonne im Gleichgewicht, Geisterfahrer (6. November 2026); Atome, die der sich kaum dreht? einem Lichtstrahl entgegenlaufen, nehmen mehr Autor: beides, die Licht auf und werden gebremst (Hänsch und Eigendrehung des Schawlow, 1975), jedes aufgenommene Körpers und die jedes Lichtteilchen ändert die Bahndrehung um eine Atoms. Dreht sich auch Einheit (Beth, 1936); gemessen bleibt der das Versum als Ganzes? Drehimpuls eines abgeschlossenen Systems Autor: Es hat schon nach erhalten, innere Kräfte erzeugen Wirbel und dem Urknall stark an Gegenwirbel, Ausgleich auch durch Wärme, Drehung verloren, Leuchten, Schwingung und Pauli-Druck; unter Druck passend zur Erhaltung paaren sich die Elektronen des Eisens gegenläufig, des Drehimpulses beim Spin von S = 2 auf S = 0 (Badro und Kollegen, 2003); Ausdehnen (Frage 66). bei ausgeglichenem Zu- und Abstrom bleiben nur Zentrum oder instabiler Sattel (Strogatz, 1994); Elektronenpaare mit entgegengesetztem Spin (Pauli, 1925); die Drehung der Sonne trägt nur etwa $2 \cdot 10^{-5}$ des Gleichgewichts, die der Erde etwa $3 \cdot 10^{-3}$ (Rechnung von Claude); Spin ½ jedes Elektrons, Protons und Neutrons (Stern und Gerlach, 1922; Uhlenbeck und Goudsmit, 1925); keine Drehung des beobachtbaren Universums nachgewiesen, Grenze $4{,}7 \cdot 10^{-11}$ der Ausdehnungsrate (Saadeh und Kollegen, 2016); Autor: Es gibt keine Sterne ohne Drehung, ein zu langsam drehender Stern kollabiert unter dem Druck des Vakuums (5.3); γ Equulei dreht sich einmal in rund 97 Jahren und ist stabil (Bychkov und Kollegen, 2016); Autor: Volumen, Dichte und Drehimpuls spielen eine Rolle, weniger Zustrom heißt weniger Druck, mehr Zustrom mehr Druck und Gegendruck; ein einzeln stehender Stern braucht daher wenig Drehung; nach dem Kollaps dreht sich der Rest schnell, der Crab-Pulsar rund 30-mal pro Sekunde (Comella und Kollegen, 1969)

Frage 66 Dehnt sich das Versum Produkt aus Ausdehnungsrate und Alter 0,96 ± 0,01 5, 6.1, P5 nahezu linear aus wie (Avelino und Kirshner, 2016); Wechsel von eine Supernova? Wie Abbremsen zu Beschleunigen bei z ≈ 0,46 (Riess und passt dazu, dass die Kollegen, 2004); streng lineare Ausdehnung bei Ausdehnung erst Supernovae und Galaxienmuster zusammen deutlich langsamer und dann benachteiligt (Shafer, 2015); Supernova-Trümmer schneller wurde? dehnen sich gleichmäßig aus (Thorstensen und Kollegen, 2001); Vorbild Milne (1935); Autor: träge

Nr. Frage Messung, an der es bestehen muss Abschnitt

Materieklumpen werden ständig weiter beschleunigt (5); ein ständiger

Schub erklärt die frühe Abbremsung nicht, Vorschlag: Dichtegefälle zwischen den Klumpen; Autor: die Gaswolken aus 380.000 Jahren Auswurf bremsen und werden zu Sternen gedrückt (5); Hülle höchstens 380.000 Lichtjahre weit (Rechnung von Claude); nur etwa 6 % der normalen Materie in Sternen (Fukugita und Peebles, 2004); Sternentstehung am stärksten 3,5 Milliarden Jahre nach dem Urknall (Madau und Dickinson, 2014); Autor: die Grenze wandert mit, die Wolken müssen vielleicht fast lichtschnell werden, um zu verschmelzen (5); Kerne verschmelzen bei über 99,99 % von c (PHENIX und Kollegen, 2005), Sterne entstehen dagegen in kalten Wolken bei wenigen km/s (Bergin und Tafalla, 2007; Fukui und Kollegen, 2021); Autor: beides, schnellere Druckwellen schieben die trägen Wolken zusammen wie ein Lkw mit 200 km/h eine Autoschlange mit 50 km/h (5); Wellen höchstens mit c (GW170817), Wolken also klar darunter; schnelle Front schiebt Gas zu Schalen mit neuen Sternen (Elmegreen und Lada, 1977); Sterne entstehen im Ausstrom eines Schwarzen Lochs (Maiolino und Kollegen, 2017); Stoßfronten von 5 bis 70 km/s lösen Kollaps aus, schnellere nicht (Boss und Kollegen, 2010)

Frage 67 Warum zerfallen manche Spaltung schneller mit wachsendem Z^2/A: Uran-238 3.4, Frage 63 Atome schneller als $8{,}4 \cdot 10^{15}$ Jahre, Californium-252 86 Jahre, andere, und warum Rutherfordium-252 60 ns (Bohr und Wheeler, 1939); altern Kerne nicht wie Alphazerfall schneller mit höherer Zerfallsenergie Seifenblasen? Woher (Geiger und Nuttall, 1911; Gamow, 1928); Zerfall kommen die zufälligen exponentiell, Kerne altern nicht (Norman und Störungen, die einen Kollegen, 1988); keine jährliche Schwankung mit Kern zerfallen lassen? dem Sonnenabstand (Pommé und Kollegen, 2016); nacktes Rhenium-187 zerfällt in 32,9 Jahren statt 42 Milliarden (Bosch und Kollegen, 1996); Seifenblasen altern durch Abfließen und platzen durch zufällige Störungen (Poulain und Kollegen, 2018); $B^0 \to \mu^+\mu^-$ $(1{,}14\ {+0{,}42}/{-0{,}39}) \cdot 10^{-10}$ bei $(1{,}03 \pm 0{,}05) \cdot 10^{-10}$ im Standardmodell, $3{,}2\sigma$ (LHCb-Kollaboration, 2026)

Nr. Frage Messung, an der es bestehen muss Abschnitt

Frage 68 Wie wird aus der Überlagerung addiert Ausschläge mit Phase, 7.1, 2.6, Überlagerung zweier Interferenz einzelner Elektronen (Tonomura und Frage 67 Orbitale eine Bindung, Kollegen, 1989); Licht mit $h\nu = E_2 - E_1$ (Bohr, 1913); und warum nur bei Bindung im Wasserstoffmolekül rund 4,5 eV, nur bei entgegengesetzten Spins, entgegengesetzten Spins (Heitler und London, 1927; wenn die magnetische Hölsch und Kollegen, 2019); magnetische Energie Energie dafür rund der Spins mindestens rund 10^4-mal kleiner 10.000-mal zu klein ist? (Rechnung von Claude); Tunnelwiderstand Wie kommt ein Teilchen exponentiell mit der Spaltbreite (Binnig und ganz oder gar nicht durch Kollegen, 1982); verhinderte Totalreflexion als eine Wand? Gegenstück (Zhu und Kollegen, 1986); Tropfen tunneln unvorhersagbar, Wahrscheinlichkeit exponentiell mit der Schwellenbreite (Eddi und Kollegen, 2009); Autor: es wirkt nie eine Kraft allein, das Pauli-Prinzip spielt mit; Bindung aus Interferenz, die die Bewegungsenergie senkt (Ruedenberg, 1962); Heliummolekül fast ungebunden, etwa 10^{-7} eV (Grisenti

und Kollegen, 2000); Sauerstoff mit zwei ungepaarten Elektronen magnetisch (OpenStax); beantwortet: Pauli-Prinzip aus den zwei Umlaufsinnen Γ und $-\Gamma$ einer Mode (Anhang C)

Frage 69 Ist das Vakuum ein festes Autor: Vakuum = materielles Gitter, Potenzial $\propto 1$, 2.2, P2, Gitter, eine Flüssigkeit geladen; Masse = stationäre Verspannung im Gitter; P3 (Superfluid) oder beides Energie = Veränderung der Geometrie des Gitters; zugleich? (Autor: Der im Notizbuch auch »Superfluid«; Licht ist eine Raum ist leer und flach, Querwelle, Querwellen trägt ein fester Stoff; darin eine Flüssigkeit Lichtgeschwindigkeit auf etwa 10^{-18} unter Druck.) Licht läuft richtungsunabhängig (Nagel und Kollegen, 2015); nach dem Autor nur im Vakuumenergie gemessen klein (Weinberg, 1989); Nichts (1). Wie trägt die Autor: Raum (Gitter) leer und flach, darin eine Flüssigkeit die Flüssigkeit verschiedener Dichte, alles unter Druck, Gravitationswellen als vor dem Urknall bis zum Flüssigwerden verdichtet, Querwellen in seither in Ausdehnung; Raum gemessen flach, ΩK = Tensorform, und warum $0{,}001 \pm 0{,}002$ (Planck-Kollaboration, 2020); laufen sie so schnell wie Quark-Gluon-Plasma flüssig (PHENIX und Kollegen, Licht? 2005); Stärke der Schwerkraft ändert sich um höchstens etwa 10^{-13} pro Jahr (Hofmann und Müller, 2018); in einer reibungsfreien Flüssigkeit laufen nur Längswellen; Autor: so viele Explosionen, dass sich alle Wellen überlagern, und frontal zusammenlaufende Längswellen werden zu zwei Querwellen gleicher Energie; gemessen: Schallwellen laufen durcheinander hindurch,

Nr. Frage Messung, an der es bestehen muss Abschnitt

Querwellen kommen nicht durch den flüssigen äußeren Erdkern (Iredale, 2024), Umwandlung nur an Grenzflächen fester Stoffe (Zoeppritz, 1919); Querwellen in Flüssigkeiten mit Drehung (Trägheitswellen) oder Magnetfeld (Alfvén, 1942); Autor: das Vakuummedium heißt Feldenergie, praktisch alles dreht sich und hat ein Magnetfeld, die Felder sind alle unterschiedlich; Weltall als Ganzes ohne messbare Drehung (Saadeh und Kollegen, 2016); Neutron mit, Neutrino ohne gemessenes magnetisches Moment (Alvarez und Bloch, 1940; XENONnT, 2022); kein messbares Feld allein aus Drehung (Blackett, 1952); Autor: Licht breitet sich nur im Nichts aus und wird absorbiert oder umgelenkt, sobald es auf etwas trifft; Brechzahl aus Streuung an Molekülen (Feynman, Leighton und Sands, 1963); Gravitationswellen gleich schnell wie Licht (GW170817) und Tensorwellen (LIGO- und Virgo-Kollaborationen, 2017); Autor: Licht entsteht gleichzeitig mit den Gravitationswellen und bewegt sich mit ihnen; Gammablitz $1{,}74 \pm 0{,}05$ s nach den Gravitationswellen (LIGO, Virgo, Fermi und INTEGRAL, 2017); Schwerefeld eines Lichtpulses läuft mit ihm (Aichelburg und Sexl, 1971); Autor: Querwellen sind die Wellen, die nach frontalem Zusammenstoß zur Seite laufen (Bild zur LHCb-Messung); Elektron und Positron ergeben zwei Gammaquanten von je 511 keV in entgegengesetzter Richtung (Aurengo, La radioactivité); Ausbreitung im Radius erklärt 1/r, nicht die Schwingungsrichtung; eine ebene Verschiebungswelle dehnt nie quer zur Laufrichtung, wie es die Tensorform verlangt (Rechnung von Claude); Autor: der Raum ist

hart, weil unbiegsam, das Medium biegsam; Autor: das Medium trägt die Gravitationswellen wie eine Atmosphäre den Schall; als Träger passt das: Entfernung aus der Wellenstärke passt zu NGC 4993, 70 (+12/−8) km/s pro Megaparsec (LIGO- und Virgo-Kollaborationen und Kollegen, 2017); Schall schwingt aber längs, reine Skalarschwingung etwa tausendfach benachteiligt (GW170814); innere Schwerewellen in geschichteter Luft schwingen quer, unter der

Nr. Frage Messung, an der es bestehen muss Abschnitt

Auftriebsfrequenz N (University of Waterloo, AMATH 463); Querschwingungen eines Wirbelgitters gemessen (Coddington und Kollegen, 2003); Querwellen mit c verlangen Schersteifigkeit gleich Energiedichte (Rechnung von Claude); gemessen ist die Schwingungsform, der Träger ist das eine Medium; Autor: der Druck gibt die Lichtgeschwindigkeit vor, Licht läuft mit der Druckwelle, daher gleich schnell wie die Gravitationswellen; Gravitationswellen kommen aus allen Richtungen, jede Materie strahlt sie ab, Abstrom wird Zustrom (6. November 2026); Hintergrund gemessen, gemeinsame Schwankung von 67 Pulsaren nach dem Hellings-Downs-Muster, etwa 3,5 bis 4σ (NANOGrav 2023); Autor: natürlich gibt es Schwingungen aus einer Richtung, zwei schwache Schallwellen gehen durcheinander hindurch, zwei genau aufeinander gerichtete Schallkanonen brechen zur Seite aus (6. November 2026); die Stoßzone ist ein Quadrupol, die Quelle von Gravitationswellen; Zusammenlaufendes breitet sich senkrecht aus (Taylor 1960); Quadrupole erzeugen in Luft gewöhnlichen Längsschall (Lighthill 1952); das Medium gibt die Querschwingung als Scherung weiter (Anhang A); Autor: Schallwellen mit Radio- und Gammawellen vergleichen (6. November 2026); Radio- und Gammawellen beide mit c, quer, zwei Schwingungsformen um 90°, nur die Frequenz verschieden, je Quant etwa Faktor 10^{11} (Rechnung von Claude); Radiowellen von freien Elektronen verzögert, wachsend mit der Elektronendichte, fallend mit dem Quadrat der Frequenz (Lorimer, 2005); Gravitationswellen wie Licht mit c, quer, zwei Schwingungsformen, aber um 45° gedreht (GW170814); damit dieselbe Frage wie beim Licht, Vektor- gegenüber Tensormuster folgt aus der Quelle: Ladung strahlt als Dipol, Masse erst als Quadrupol (Anhang A)

Frage 70 Wie viel Licht entsteht GW150914: Gammalicht unter einem Millionstel der 1, 3.4, V19, bei der Verschmelzung Energie der Gravitationswellen (Savchenko und Frage 59 zweier Schwarzer Löcher, Kollegen, 2016); im Standardbild Licht nur mit Gas in und in welchen Farben? der Nähe, etwa in Gasscheiben aktiver (Autor: durch die Galaxienkerne (McKernan und Kollegen, 2019); möglicher Lichtausbruch nach S190521g (Graham und Kollegen, 2020); Oberflächen Schwarzer Löcher

Nr. Frage Messung, an der es bestehen muss Abschnitt

extremen Druckspitzen (Frage 59); Autor: es gibt keine Schwarzen Löcher ohne sehr viel.) Gas, das Licht entsteht als Gammastrahlung und wird durch den Dopplereffekt zu sichtbarem Licht und Radiowellen gedehnt; Gammastrahlung zu grünem Licht braucht etwa 440.000-fache Dehnung (Rechnung von Claude), GRB 090423 kam bei Rotverschiebung 8,2 noch

als Gammastrahlung an (Tanvir und Kollegen, 2009); in der Sonne wird Gammastrahlung durch Absorption und neue Aussendung zu sichtbarem Licht; Autor: Gammastrahlung wird auch durch das Feld gebremst; sehr energiereiche Gammastrahlung wird vom Licht zwischen den Galaxien geschwächt (Ackermann und Kollegen, 2012), Gammastrahlung unter 2 MeV kommt noch aus Rotverschiebung 8,2 an (Tanvir und Kollegen, 2009); Autor bestätigt die Einordnung: gebremst heißt absorbiert und geschwächt, sichtbar wird Gammastrahlung vor allem durch Absorption und neue Aussendung

Frage 71 Wie hängen die frühen Gravitationswellen tragen auf großen Winkeln 5.3, 2.7, Dichteschwankungen mit weniger als 3,6 % der Stärke der V17, V18 den Gravitationswellen Dichteschwankungen (BICEP/Keck 2021); Zahl der zusammen? Haben die freien Teilchenarten 2,99 ± 0,17, erwartet etwa 3,04 Wellen das Medium (Planck 2020), daraus Gravitationswellen beim selbst verdichtet (Lesart Durchsichtigwerden höchstens etwa 7 % der A), oder stammen beide Strahlungsenergie (Rechnung von Claude); Lesart A aus denselben verlangt einen Verdichtungsanteil von mindestens Druckwellen des etwa dem Fünffachen der Querschwingung Umschlags (Lesart B)? (Rechnung von Claude), gemessene Welcher Teil der Gravitationswellen schwingen überwiegend quer Längswellen wurde zu (GW170814; V17); frei fliegende Neutrinos Querwellen? (Autor: Die schwächen Gravitationswellen um 35,6 % (Weinberg frühen 2004); Spektralindex 0,965 ± 0,004 (Planck 2020); Dichteschwankungen Phasenübergänge erzeugen Gravitationswellen vor müssen etwas mit der allem durch Druckwellen (Hindmarsh und Kollegen Dichte der 2014); Hintergrund in den Laufzeiten der Pulsare Gravitationswellen zu tun (NANOGrav 2023), Phasenübergänge passen mit haben.) Autor: Die ersten Bayes-Faktoren 10 bis 100, abhängig von Annahmen Gravitationswellen (Afzal und Kollegen 2023) entstanden beim Umschlag, dann bei der Kernfusion; die

Nr. Frage Messung, an der es bestehen muss Abschnitt

Dichteunterschiede stecken in Wirbeln, die schon vor der Rekombination bestanden (5.3, 5.5). Damit Lesart B; der Anteil der Umwandlung liegt unter der B-Moden-Grenze $r < 0{,}036$ (BICEP/Keck 2021).

Frage 72 Verhalten sich die Wirbel Nicht mitschwingende Masse etwa 5,4-mal so viel 5.5, 5.6, vor der Rekombination wie das Gas (Planck 2020: 0,120 und 0,0224); Gas 6.2, Frage 58 wie die nicht beim Durchsichtigwerden bis auf 10^{-5} gleichmäßig; mitschwingende Masse, Wachstum durch Schwerkraft höchstens im Maß der die Planck misst? Wie Ausdehnung, bis Rotverschiebung 14,3 etwa 70-fach werden aus (Rechnung von Claude); JADES-GS-z14-0 leuchtete Dichteunterschieden von 290 Millionen Jahre nach dem Anfang (Carniani und 10^{-5} bis zu den ersten Kollegen 2024); nach der Rekombination kann Gas Galaxien Unterschiede ab etwa 10^5 Sonnenmassen zusammenfallen um 1? (Autor: Die Wirbel (Barkana und Loeb 2001); Beschleunigung der bestanden Wirbel: Frage 58; im frühen Universum mehr wahrscheinlich schon vor massereiche Galaxien als vorhergesagt, nach dem der Rekombination und Bericht von Welt der Physik etwa

doppelt so viele wurden dann schlagartig (Chworowsky und Kollegen 2024); Little Red Dots: verdichtet und einzeln meist ohne nachweisbare Sterne (Chen und beschleunigt.) Kollegen 2025; Juodžbalis und Kollegen 2025), gemittelt über 217 eine kompakte Sternhülle von etwa 10^{9} Sonnenmassen (Zhang und Kollegen 2026); Autor: entweder keine Sterne, oder erst sichtbar, wenn genug Masse abgegeben ist, aus der Sterne entstehen; Prüfstein: ein mit der Zeit sinkendes Verhältnis von Schwarzem Loch zu Sternen, bei $z \approx 7$ über 2, nah nach erster Schätzung etwa 10^{-3} (Ji und Kollegen 2025); Autor: Little Red Dots waren schon Wirbel im Hyperstern, bei der Rekombination extrem verdichtet; die Zeiten des Standardmodells gelten auch im Modell; das fernste bei $z = 9{,}288$ nach rund 520 Millionen Jahren (Taylor und Kollegen 2025)

Frage 73 Wie zerstört eine Rückstoß zu klein, Verlust durch die Korrelation mit 7.1, 7.2 Weginformation das dem Wegdetektor (Dürr, Nonn und Rempe 1998); Muster am Doppelspalt, das Muster kehrt beim Löschen der Weginformation auch ohne merklichen zurück (Walborn und Kollegen 2002);

Nr. Frage Messung, an der es bestehen muss Abschnitt

Rückstoß, und wie bringt Wärmestrahlung heißer C70-Moleküle zerstört es, das Löschen der um 3000 K vollständig (Hackermüller und Kollegen Information es zurück? 2004); Restgas zerstört es exponentiell mit dem (Autor: Wie gemessen Druck (Hornberger und Kollegen 2003); Doppelspalt wird, ist entscheidend; mit hüpfenden Tropfen nicht sauber wiederholbar ein Sensor im Weg (Andersen, Bohr und Kollegen 2015); bei Dürr, Nonn verändert das Feld.) und Rempe speicherte der innere Zustand des Autor: Es muss kein Stoß Atoms den Weg (Ma, Kofler und Zeilinger 2016); sein; der Detektor hat Felder, die auf beide Wege wirken, verschieben das Masse und ein Muster nur: Schwerkraft bei Neutronen (Colella, Energiefeld, und jede Overhauser und Werner 1975), abgeschirmter noch so kleine Änderung Magnet bei Elektronen (Tonomura und Kollegen ist ein Quantensprung 1986); beim Quantenradierer erscheint das Muster (7.1). Damit erste Hälfte in den gemeinsam mit dem Partnerphoton gezählten beantwortet; Treffern (Walborn und Kollegen 2002) die zweite Hälfte ebenso: Die Auswahl nach dem Partnerphoton sortiert die Treffer in Teilmengen, deren jede ein Muster zeigt (7.2).

Frage 74 Wird die Bewegung im Freie Ausdehnung in einen leeren Behälter ändert 3.2, 2.5, Inneren der Materie bei die Temperatur nicht (Joule 1845); Elektronen auf V16 weniger Außendruck größeren Bahnen sind langsamer (Bohr 1913; schneller, weil die Rydberg-Atome, Gallagher 1994); Wärmestrahlung Teilchen mehr Platz hängt nur von Temperatur und Oberfläche ab haben, oder weil die (Stefan-Boltzmann); zwischen leitenden Platten lebt Energie der ein Rydberg-Atom mindestens 20-mal länger (Hulet, nachlassenden Drehung Hilfer und Kleppner 1985); ohne 1 bar wächst Stahl ins Innere geht? Gibt um etwa $6 \cdot 10^{-7}$, Wasser um etwa $4{,}5 \cdot 10^{-5}$ seines Materie im Vakuum dann Volumens (Rechnung von Claude); bei erhaltenem mehr Strahlung ab? Drehimpuls sinkt die Drehenergie mit wachsendem (Autor: Die Materie Volumen dehnt sich aus, die Rotation lässt nach,

die Bewegung innerhalb wird schneller.) Nach dem Wortlaut des Autors ist die erste Lesart gemeint: Die Elementarteilchen haben mehr Platz, um zu beschleunigen und wieder abzubremsen

Nr. Frage Messung, an der es bestehen muss Abschnitt

(3.2). Gemessen passt es so: Ohne Außendruck dehnt sich Materie nur um $6 \cdot 10^{-7}$ (Stahl) bis $4{,}5 \cdot 10^{-5}$ (Wasser) ihres Volumens; Joules freie Ausdehnung zeigt, dass ein Gas dabei keine Bewegungsenergie gewinnt, und größere Bohrbahnen sind langsamer. Die schnellere innere Bewegung im Sinne des Autors ist deshalb die Freiheit der Elementarteilchen, auf längerem Weg zu beschleunigen und wieder abzubremsen, bei gleicher mittlerer Energie; mehr Strahlung gibt Materie im Vakuum gemessen nicht ab, sie strahlt nach Stefan-Boltzmann allein nach Temperatur und Oberfläche.

Frage 75 Gilt »unterschiedliche Alkohol (0,79 g/cm³) und Wasser (1,00 g/cm³) 1, 2.6, Frage 8 Dichte stößt sich ab, mischen sich in jedem Verhältnis; ein Öltropfen in gleiche Dichte einem gleich dichten Alkohol-Wasser-Gemisch bleibt verschmilzt« auch für getrennt (Plateau 1873; Boys); die Trennung in der Ladungen? Nach 2.6 ist Zentrifuge wächst mit Dichteunterschied und positive Ladung hohe, Druckgefälle (Stokes 1851); die Milchstraße entfernt negative niedrige Dichte; sich von einem Leerraum (Hoffman und Kollegen gemessen nähern sich 2017); Elektron und Proton bilden das ungleiche Ladungen Wasserstoffatom; die Brechzahl hängt von Dichte einander, gleiche stoßen und Polarisierbarkeit ab (Lorentz und Lorenz 1880), sich ab. Meint »Dichte« Olivenöl 1,47, Wasser 1,33; Atome sind stabil, bei Stoffen die Masse pro obwohl ein kreisendes Elektron nach Maxwell Volumen oder die strahlen und in etwa 10^{-11} s in den Kern stürzen Struktur des Mediums? müsste (Larmor 1897; Rechnung von Claude); (Autor: Unterschiedliche Prüfstein: manche Kerne fangen ein inneres Elektron Dichte stößt sich ab, ein, aus Proton und Elektron wird ein Neutron gleiche Dichte (Alvarez 1937), bei Beryllium-7 hängt die verschmilzt.) Autor: Das Halbwertszeit um 0,9 % davon ab, ob es in einem Mischen hängt wie die Metall oder einem Isolator sitzt (Wang und Kollegen Lichtgeschwindigkeit von 2006) Dichte und Struktur ab (1). Damit Teil zu den Stoffen beantwortet. Autor: Ladungen sind Druckzonen; ein Elektron im Atom ist das Auge eines Wirbelsturms, eine Unterdruckzone mit extrem geringer Dichte (1). Damit auch der Teil zu den Ladungen beantwortet: Kern und Elektron verschmelzen nicht, weil ihre Dichte verschieden ist; zusammengeschoben werden sie vom Dichtegefälle der

Nr. Frage Messung, an der es bestehen muss Abschnitt

Umgebung, und die Drehung hält das Gleichgewicht; gleiche Ladungen stoßen sich nach dem dritten Newtonschen Axiom ab und verschmelzen erst sehr nahe (Folgerung 1).

Frage 76 Warum bleibt ein Gitter Gekühlte Ionen bilden einen Kristall und gehen erst 1, 7.1 gleich geladener Teilchen bei schwächerer Kühlung in eine ungeordnete Wolke bei kleinen über (Diedrich und Kollegen 1987); selbst Schwingungen geordnet, angetriebene Teilchen, die sich nur abstoßen, bilden wenn eine kleine Haufen und trennen sich in dicht und

dünn Schwingung ein Chaos (Buttinoni und Kollegen 2013); Millennium Bridge: anrichten soll? Woher Schwanken und Gleichschritt setzen ab einer kommt der Antrieb, mit kritischen Zahl von Fußgängern gemeinsam ein dem sich Teilchen wie ein (Strogatz und Kollegen 2005); Übergang zwischen Schwarm stellenweise Kristall und chaotischer Wolke über Laserleistung organisieren? (Autor: oder Fallenspannung (Diedrich und Kollegen 1987; Eine kleine Schwingung Blümel und Kollegen 1988); Mpemba-Effekt bei reicht für ein totales Wasser umstritten (Burridge und Linden 2016), im Chaos; Teilchen Kolloidversuch gemessen (Kumar und Bechhoefer organisieren sich 2020); eine Rückkopplung braucht eine stellenweise wie ein Energiequelle; Hintergrundstrahlung kühlt mit der Vogelschwarm.) Autor: Es Ausdehnung, T(z) = 2,725 · (1 + z)^(1−β) K, β = schaukelt sich immer −0,007 ± 0,027 (Noterdaeme und Kollegen 2011); wieder auf, und es hat Drehung, wo sich Flächen gleichen Drucks und etwas mit dem gleicher Dichte schneiden (Bjerknes 1898); Mpemba-Effekt zu tun Wirbelstraße auch ohne Zähigkeit oberhalb einer (1). Das Strahlungsfeld des Mediums (Anhang F) ist die kritischen Geschwindigkeit (Kwon und Kollegen Quelle im Takt Energie 2016); Gas aus einer Düse ins Vakuum kühlt auf nachliefert. Autor: etwa 2 K, bis keine Stöße mehr stattfinden Bewegung erzeugt (Leopold-Gruppe); Elektron-Positron-Paare aus Reibung und Wärme, Lichtteilchen (STAR-Kollaboration 2021); neutrales Wärme Ausdehnung, Pion zerfällt nach rund $8 \cdot 10^{-17}$ s in zwei Ausdehnung längeres Lichtteilchen (PrimEx-II 2020); Proton mindestens Beschleunigen und mehr $2{,}4 \cdot 10^{34}$ Jahre (Super-Kamiokande 2020) Reibung; Druck ohne Festlager erzeugt Rotation (Nachtrag vom

1. November 2026). Autor: Ausdehnung

Nr. Frage Messung, an der es bestehen muss Abschnitt

kühlt; mit viel Platz berühren sich Teilchen fast nie, treffen sie sich, blitzen sie kurz als Materie auf.

Frage 77 Wo liegt das Zentrum des Hintergrundstrahlung bis auf etwa 10^{-5} gleich, Dipol 5.2, 5.4, Hypersterns von uns aus, im Standardbild als Bewegung mit etwa 370 km/s V21 und wie weit dürfen wir gedeutet, Verzerrung gemessen 384 ± 78 ± 115 km/s davon entfernt sein, (Planck 2014); Ausdehnung in allen Richtungen ohne dass die gleich, Unterschiede mit 121.000 zu 1 Hintergrundstrahlung ausgeschlossen (Saadeh und Kollegen 2016); stärker als gemessen von Quasardipol mehr als doppelt so stark wie erwartet, Richtung zu Richtung ähnliche Richtung, zusammen mit Radiogalaxien schwankt? Wo im über 5σ (Secrest und Kollegen 2021, 2025); Test Trichter sitzen wir? nach Ellis und Baldwin (1984), Quasare über 5σ, (Autor: Alle sechs Punkte Radiogalaxien gemeinsam bis 4,8σ (Secrest 2025); in sind gleichzeitig wahr; einer vergleichbaren Rechnung muss ein Beobachter der Ballon hat ein näher als 15 Mpc am Zentrum einer Zentrum.) Autor: Der kugelsymmetrischen Dichtestörung sitzen (Alnes und Trichter ist der Amarzguioui 2006); nötig ist der Dichte- und Ereignishorizont des Temperaturverlauf der Gashülle (Frage 19) Beobachters, jeder hat seinen eigenen,

und er wandert mit (5.2). Autor: Jeder sieht sich im Zentrum seines Trichters, wie bei Milne; trotzdem zeigt sich die Bewegungsrichtung, weg vom Zentrum, am Himmel; die Zwiebelschichten werden dicker (5.2). Damit Lage und Richtung beantwortet (Zentrum gegenüber dem Dipol der Hintergrundstrahlung); der Quasardipol ist mehr als doppelt so stark, weil die Quasare erst nach dem Durchsichtigwerden in den Schweifen der Schwarzen Löcher entstanden und eine eigene Bewegung nach außen von rund 490 km/s tragen (5.2).

10 Transparenz: was geändert wurde

Aus der Gemini-Fassung wurde alles entfernt, was nicht vom Autor stammt oder einer Prüfung nicht standhält. Claudes eigene Beiträge sind unten einzeln aufgeführt, damit der Autor jeden prüfen kann.

Entfernt Aussage der Gemini-Fassung Grund

Postulat A3: invariantes Eigenvolumen, Widerspricht dem Nullresultat von Michelson und Querausdehnung um den Lorentzfaktor Morley: Es legt das Verhältnis der Längen in und quer zur Bewegungsrichtung auf 1/γ fest; eine Querausdehnung um den Lorentzfaktor bei gleichem Eigenvolumen ergäbe ein anderes Verhältnis (Rechnung von Claude). Die Verkürzung allein in Bewegungsrichtung wurde dagegen gerade eingeführt, um das Nullresultat in einem ruhenden Medium zu erklären (FitzGerald, 1889; Lorentz, 1895; Brown, 2001)

Unschärferelation als Folge endlicher Sie folgt aus der Wellennatur von Ort und Impuls, Signalgeschwindigkeit nicht aus der Signalgeschwindigkeit

Minimalflächen mit H = 0 als erreichter Widerspricht der Aussage des Autors, dass Zustand expandierende Flächen nie eben werden

Horn-Torus als singularitätsfreier Kern, Ein Horn-Torus hat selbst einen singulären Punkt; Gauß-Bonnet als Kräftegleichgewicht Gauß-Bonnet sagt nichts über Kräfte

„Kaustik-Ausrichtungs-Theorem“ Die behauptete Parallelausrichtung wird nicht gezeigt

Mizohata-Takeuchi-Gegenbeispiel (Cairo) Reine Mathematik ohne Bezug zu Schwarzen Löchern

Zahlen zu Hexalayer-Graphen und Ungeprüft und ohne belegten Bezug zur These Hochdruck-Eis

Erklärung der Bekenstein-Hawking-Entropie, Erklärt weder den Faktor 1/4 noch die Formel dreischichtiges Temperaturprofil

Schwarzes Loch verliert Masse und wird zum Ersetzt durch das Drehungs-Kriterium des Autors Blauen Riesen (Kapitel 3)

„Trennung von Raum und Materie“, Widerspricht der Trennung von Raum und Medium „Raum-Void“ (P1, P2)

Name „Fluide Feldmechanik“ Nicht übernommen; der Autor kann ihn wieder einsetzen

Aus früheren Entwürfen dieses Dokuments entfernt: das Bild vom Druckschatten (Le Sage), die Strömungsvariante mit einströmendem Medium und Beltrami-Strömung (früher 2.5, Frage 7 und Frage 28) sowie alle Formulierungen, nach denen das Medium Körper schiebt. Der Autor hat klargestellt, dass das Medium nicht gegen Materie drücken kann; Schwerkraft wirkt hier allein über das Dichtegefälle (Kapitel 2). Am 4. November 2026

hat der Autor Le Sage wieder für richtig erklärt: Gravitationswellen schieben alle Materie an (2.1); den Widerspruch zu P3 löst seine Klarstellung am selben Tag (Frage 54). Am selben Tag hat er klargestellt, dass die Schwerkraft die Dichtedifferenz ist und mit Le Sages Druckwellen nur wenig zu tun hat (2.1); das Schiebe-Bild als Ursache der Schwerkraft bleibt daher entfernt. Claudes erste Wiedergabe des Satzes »Das nennt man Kernfusion!« (als »Die Erwärmung durch die verschluckte Energie ist die Kernfusion«) war zu weit gefasst und wurde nach der Klarstellung des Autors durch den Wortlaut ersetzt. Korrigiert: Claudes Annahme, ein Schwarzes Loch verschlucke alles, was seinen Horizont trifft (5.6, 4.6); der Autor hat klargestellt, dass es nichts verschluckt, sondern sich auszudehnen versucht (3.4). Ebenfalls verworfen: Claudes Vorschlag, die mit 1/r gewichtete Masse des Universums als festen Maßstab für Uhren zu nehmen (Sciama, 1953). Er hinge von den Abständen ab und müsste sich mit der Ausdehnung um etwa 7×10^{-11} pro Jahr ändern; die Laser-Entfernungsmessung zum Mond erlaubt höchstens 10^{-13}. Außerdem las er die Dunkle Energie als Masse des Vakuums, was der Autor richtiggestellt hat.

Nach dem Grundsatz des Autors, nichts passend zu machen, wieder entfernt: Claudes Deutung des Photons als Überlagerung einer Zone hoher und minimaler Dichte mit der Vakuumpolarisation als Vorbild (früher Frage 46), die Oberflächenenergie der Knoten als Erklärung der Fusionsenergie, die Magnetpole als Vorbild des Modells für den Einschluss der Quarks und die Deutung des unterschiedlich dichten Vakuums als Erklärung freier Elektronen. Die Fragen dahinter beantworten jetzt Frage 44 und Frage 46.

Nicht übernommen, weil Messungen widersprechen (Aussagen des Autors): Außerhalb von Atomen gebe es keine Elektronen, dort hießen sie Photonen, und Elektronen ließen sich nicht einzeln einfangen. Dagegen stehen einzeln in Fallen gehaltene freie Elektronen (Dehmelt, Nobelpreis 1989; Fan und Kollegen, 2023) sowie Ladung, Ruhemasse und Ablenkung im Magnetfeld, die Photonen nicht haben. Ebenso nicht übernommen: mehrere Kopien eines Photons, von denen die erste gemessen wird, denn ein einzelnes Photon wird nur einmal nachgewiesen (Grangier, Roger und Aspect, 1986). Der Autor versteht die Klone als Teilwellen derselben Welle (7.2). Ein früherer Eintrag an dieser Stelle, nach dem Licht in Wasser nicht langsamer sei, beruhte auf einem Schreibfehler des Autors und wurde entfernt; seine richtige Aussage steht in P2. Ein Eintrag an dieser Stelle zu Quarkladungen nach dem goldenen Schnitt beruhte auf Claudes Fehldeutung einer Zeichnung des Autors und wurde entfernt; der Autor bezieht den goldenen Schnitt auf die Orbitale, nicht auf Ladungen (7).

Von Claude ergänzt, bitte prüfen

- Formulierungen: „Wirksam sind nur Unterschiede“ (P3); „auf jede Masse gleich“ (P3, 2.1); „Zähigkeit ohne Reibung“ (2.2); Übersetzung von „Druck“ und „Druck von außen“ in Dichte und Dichtegefälle der Umgebung (Begriffe, 6.2, 6.3); „Dichtegefälle und Drehung halten den Stern im Gleichgewicht“ (4.2); Wände zwischen sich ausdehnenden Leerräumen statt „von zwei Seiten zusammengedrückt“ (5.7); Krüm-

mung etwa wie 1/R (5.7); $n \cdot \lambda = U$ als Schreibweise des Autorensatzes (7); Dauer der Plasmaphase: Millionstelsekunden statt Sekunden (3.4).

- Rechnungen: Bahngeschwindigkeiten und $v^2/c^2 = GM/(Rc^2)$ (3.1); Kerr-Formel (3.2); Trichterformel und $\theta = 10°$ (5.2); Strecke eines Schwarzen Lochs bei 1000 km/s (5.6); kritische Drehung aus der Dichte (3.1); Hochrechnung der Lebensdauer bis zur Eddington-Grenze,

Helium-Abgleich und Energiebilanz der Hintergrundstrahlung (5.3); Abnahme des Dichteüberschusses wie 1/r (2.1); Grenze für Änderungen der Schwerkraft (P2); Stoßverschiebungen von Atomuhren (2.5); Energie von GW150914, die durch die Erde floss (2.7); Verhältnis von Härte zu Dichte für Wellen mit Lichtgeschwindigkeit (P2); Leistung pro Kilogramm und Energiedichte des Teilchenstroms nach Le Sage, Wärme von Sonne und Erde pro Kilogramm, Energiedichte der Sonnenneutrinos an der Erde (2.1); Impuls und Geschwindigkeit eines Schwarzen Lochs durch aufgehaltene Neutrinos (5.6); Temperatur und Leistung der Hawking-Strahlung, Energie des Zustroms, Wachstum von Sagittarius A* und Verdampfungsdauer, mittlere Dichte innerhalb des Horizonts, Anteil der Drehung am Gleichgewicht von Sonne und Erde (3.4); Entfernung für den Schub durch einen Neutrinoblitz und Masse der normalen Materie im beobachtbaren Universum (5.6); Masse, ab der ein Schwarzes Loch kälter ist als die Hintergrundstrahlung (3.4); Werte von $\sin^2\theta - 1/3$ entlang dreier Achsen (7); Abstand der Schallwellen in Lichtjahren (2); Mitnahmeanteil $1 - 1/n^2$ des Mediums an Erde und Sonne und Brechzahl des Plasmas jenseits der Heliopause (P4); Größe der Hülle aus Gaswolken, Geschwindigkeitsunterschied der Wolken in W3 und Temperatur beim Zusammenstoß fast lichtschneller Wolken (5); Schwebung zweier Eigenschwingungen und magnetische Energie zweier Elektronenspins (7.1); Wirbelstärke des Mediums aus der Kreiseldrehung (2.1); Beschleunigung des Einstroms $v = \sqrt{(2GM/r)}$ und Dichte bei Erhaltung des Mediums, Verzerrungen einer ebenen Welle (2.1, 1); Z^2/A für Uran-238, Californium-252 und Rutherfordium-252 (3.4); Energie, die die Erde von Sonnenneutrinos aufnimmt, mit Massenzuwachs und Wirkung auf die Tageslänge (2.1); Energie der Gravitationswellen beim Durchsichtigwerden aus der Zahl der freien Teilchenarten und nötiger Verdichtungsanteil bei Lesart A (5.3); Reliktneutrinos und Fusionsneutrinos pro Kernteilchen, Gravitationsstrahlung der Sonne im Verhältnis zur Leuchtkraft (5.3); Wachstum der Dichteunterschiede bis Rotverschiebung 14,3 und Verhältnis der nicht mitschwingenden Masse zum Gas (5.5); Volumenzunahme von Stahl und Wasser ohne Luftdruck (3.2); Gegenpunkt des Dipols und Winkel zwischen Dipol und großräumiger Strömung (5.2); Kreiseldrehung in Bahnhöhe als Bruchteil der Erddrehung und Strömung des Mediums über dem Äquator im Wirbelbild (2.1); kein Dichtehof im gewöhnlichen elastischen Festkörper und Abfall wie e^(−r/ℓ)/r bei Energie der Dichteunterschiede (2.1); korrigiert: Claudes frühere Folgerung, der Überschuss falle von selbst wie 1/r ab (2.1); Druck kosmischer und Relikt-Neutrinos als grobe Abschätzung (Frage 7); Zeit, in der ein nach Maxwell strahlendes Elektron in den Kern

stürzen würde (1); Alter beim Durchsichtigwerden im Standardmodell und Eddington-Faktor von Eta Carinae (5.3); Verhältnis von Umfangsgeschwindigkeit zur Schwelle für 1E 161348-5055 und Achernar (3.1); Volumen, mittlere Dichte, Verhältnis zur Schwelle und Zustrom aus der Leuchtkraft für die Himmelskörper der Datentabelle; Zeiten zu den Rotverschiebungen der Little Red Dots nach den Planck-Werten, Winkelgröße verdichteter Bereiche auf der Hintergrundstrahlung und Energiegrenze aus der Verzerrung y (bei den Little Red Dots); Lichtablenkung mit freiem Faktor k und dessen Festlegung durch Cassini (Frage 1); Drehfrequenz an der Schwelle für GM/c^2 und $3GM/c^2$ und Geschwindigkeit des Horizont-Äquators aus a* (3.1, Frage 53); Dichtezunahme eines bewegten, verkürzten Körpers (2.5); Zahlengleichheit $n - 1 = (v_F/c)^2$ für Erde und Sonne (Frage 1); Schersteifigkeit gleich Energiedichte für Querwellen mit c (Frage 69); Energie eines Radioteilchens bei 1 GHz (1); Wirbelfreiheit einer rein radialen Strömung (Frage 76); Dichteprofil einer Lufthülle mit Druckausbreitung c und Brechzahl als Quadrat des Dichteverhältnisses (Frage 1); Größe der Atome

aus $f \propto v/L$ und Verlangsamung der Uhren an Sirius B (Frage 1); Druckgeschwindigkeit im schwachen Feld erst in zweiter Ordnung verändert und Schattengrenze $b = 2e \cdot GM/c^2$ der Brechzahl $\exp(2GM/(rc^2))$ (Frage 1, V22); Wellenlängen von Schall, Radio-, Gamma- und Gravitationswellen aus $\lambda = v/f$ und Energieverhältnis von Gamma- zu Radioquant aus $E = h\nu$ (Frage 69).

- Vorschläge, die der Autor prüfen sollte: Dichtebild nach Dicke und Puthoff als Rechengrundlage für Licht und Uhren (2.1, 2.5); Bullet-Haufen über die mitgeführte Verdichtung (6.2); äußere Formung ferner Bahnen durch Milchstraße und Sternvorbeiflüge (6.3); Drehsinn früher Galaxien über rotierende Körper im Strom (5.6); Superdeterminismus als ein möglicher Ausweg aus Bells Theorem (7.2); Medium als vorgespanntes Feld (P2); Energie der Dichteunterschiede nach der Gradientenelastizität als Ursache des Dichtehofs (2.1); Masse aus der Energie des Dichteunterschieds statt aus der Verdichtung selbst (2.6, Frage 43); Ladung als Richtung und Masse als Stärke der Dichteabweichung (2.6); Klone als kohärente Teilwellen einer einzigen Welle, die ihre Energie an genau einer Stelle abgibt (7.2); Horizont allein durch Drehung (3.1); Magnetfelder als Wirbelringe (2.6); leeres Inneres mit Hülle aus den schwersten Elementen und Verbindung von Horizont und Quark-Gluon-Plasma über die Zähigkeit (3.4); Auflösung des Informationsparadoxes durch den Kreislauf (4.6); Spin über Neutroneninterferometrie und Hopf-Faserung (7.3); Rotverschiebung durch wachsende Massen nach Wetterich (5.4); nutzbare statt gesamter Energie beim Ausgleich (6.1); schnelle, energiearme Längswellen als Kandidat für die Verschränkung (7.2, wieder verworfen, weil sie nach P2 endlich schnell bleiben); Kollaps durch Dichteunterschiede nach Diósi und Penrose als Vorbild für den augenblicklichen Kollaps bei der Messung (7.2); Dichtegefälle zwischen den Materieklumpen als frühe Bremse der Ausdehnung (5, Frage 66); ausgezeichnetes Ruhesystem

der Hintergrundstrahlung (P4).

- Folgerungen: Gezeiten über das Dichtegefälle (2.3); Lagrange-Punkte als Pass (2.4); Medium nahe Massen dichter (2.5); Uhren folgen der Masse ringsum, nicht der Dichte am Ort (2.1); Faktor 2 der Lichtablenkung aus Uhren und Maßstäben (2.5); Entropie als Bedingung für Wasserstoff oder Gold (3.4); Ende der Schwerkraft beim vollständigen Ausgleich (4.4); Neutrinoblitz beim Umschlag (4.5); Reihenfolge von Explosion und Durchsichtigkeit (5.3); Wärme der Hintergrundstrahlung aus dem Umschlag (5.3); Hintergrundstrahlung als orangerotes Leuchten (5.4); Extreme erst nach der Durchsichtigkeit (5.5); Sterne im Schweif kollabieren zu Zentren (5.6); Abschwächung der Dunklen Energie durch den Ausgleich der Dichte (6.1); dünnes Vakuum mit der größten Gesamtmasse, ohne Wirkung, weil gleichmäßig verteilt (P2); Vakuumkatastrophe als falsche Abschätzung (P2); Prüfsteine Casimir-Effekt und Vakuumanteile in Atomkernen (P2); abgestrahlte Masse wird als verdichtetes Medium fortgetragen (2.7); B-Moden als Spur der Hyperstern-Supernova (5.3); nutzbare Energie als k·T mal Kullback-Leibler-Divergenz (6.1).
- Arbeitsweise: Naheliegende Folgerungen aus den Aussagen des Autors zieht Claude selbst und kennzeichnet sie als [F]. Rückfragen an den Autor gibt es nur, wenn eine Messung widerspricht oder wenn zwei Lesarten zu verschiedenen Vorhersagen führen (vereinbart am 4. November 2026).
- Prüfung durch Gemini (4. November 2026): Der Autor hat den Entwurf zusätzlich von Gemini prüfen lassen. Claude hat dessen Nachrechnungen wiederholt; sie stimmen. Übernommen wurden der Hinweis auf den Widerspruch zwischen Kapitel 4 und dem Verdampfen in 3.4 (eingeordnet in 4 und 3.4), der Hinweis auf die Reihenfolge in 5.1 bei der Neutrino-Abschätzung (5.6), die vollständige Angabe zu Mirabal und Kollegen und zwei doppelte Quellen, die gestrichen

wurden. Die Funktion $\sin^2\theta - 1/3$ für das Proton ist eingeordnet, nicht als eigenes Orbital übernommen (7). Der gemeldete Satzfehler in Frage 22 steht nicht im Dokument; er ist wohl beim Ausdruck entstanden. Die Nachträge jeweils zu einer einzigen Aussage zusammenzufassen, ist für die Fassung vor der Veröffentlichung vorgesehen. Aus einer weiteren Prüfung am selben Tag zu zwei Videos (Entropy – Wissenschaft Schnell Erklärt; Prof. Lemeshko) übernommen: Dorau und Much (2026) zu Frage 48 und 6.1, die zweite Lesart von P4 mit Volovik (2003) zu Frage 5, Einsteins Leidener Rede (1920) und die LHAASO-Messung (2024). Die Videos selbst hat Claude nicht gesehen, geprüft wurden die Arbeiten. Berichtigt: Brown erschien 2001, nicht 2005; Dorau und Much nennen die Kullback-Leibler-Divergenz nicht selbst; Einsteins Äther von 1920 hat anders als P4 kein Ruhesystem. Nicht übernommen: dass das Nullresultat von Michelson und Morley der entfernten Fassung A3 nicht widerspreche (Entfernt). Aus einer weiteren Prüfung

zu einem Video von Sabine Hossenfelder übernommen: das Dekohärenz-Problem des Standardbilds (5.2) mit den Arbeiten von Haque und Underwood (2026) und Ireland (2026), die Claude geprüft hat. Nicht übernommen: dass dies das Modell direkt bestätige, und dass die Quantenkohärenz der frühen Schwankungen der Kohärenz von Wellen im Medium entspreche; das sind verschiedene Größen.

- Wortwahl zur Schwerkraft (4. November 2026): Auf Hinweis des Autors umformuliert, wo der Text ein Ziehen nahelegte. »Die drehende Erde zieht ihr Umfeld mit« (2.1, Frage 56) heißt jetzt: Die Erde dreht sich mit dem Medium, nicht das Medium mit der Erde (Korrektur des Autors; Claudes erste Umformulierung hatte die Richtung vertauscht); gefragt ist, wie stark die Erde vom Medium gedrückt wird. Ebenso geändert: das Mitströmen (P4: die Körper strömen mit dem Medium), die Lesart nach Stokes (P4), »ob die Schwerkraft zieht oder schiebt« (2.1) und der Stoß der Neutronensterne (5.6), wo jetzt Standardbild und Rückstoß getrennt stehen. Die Messwerte sind unverändert; neu sind die geodätische Drehung aus Gravity Probe B (Everitt und Kollegen, 2011) und drei Lesarten zur Drehung des Mediums um die Erde (2.1), die dritte nach dem Nachtrag des Autors, dass Wirbel durch Strömungen entstehen, die träge Masse anschieben (3.4), mit der Tageslänge als Prüfstein; zum Hurrikan die Druckgradientkraft statt eines Zugs (5.6). Am 5. November 2026 ergänzt: Zerfall von Kernen und Platzen von Seifenblasen (3.4, Frage 67) mit Spaltung nach Bohr und Wheeler (1939), Exponentialgesetz, Rhenium-187 und der LHCb-Meldung vom 3. November 2026; freier Fall ohne Zug und Schub und Flächensatz (2.1); Überlagerung und Tunneln (7.1, Frage 68) mit dem Tunneln hüpfender Tropfen (Eddi und Kollegen, 2009), der Bindung nach Heitler und London (1927) und einer Abschätzung der magnetischen Energie der Spins; dazu die Antwort des Autors, dass nie eine Kraft allein wirkt und das Pauli-Prinzip mitspielt, mit Helium und Sauerstoff als Prüfsteinen (7.1), und die Kreisel von Gravity Probe B als Messung der Wirbelstärke (2.1). Aus dem Notizbuch des Autors eingetragen: Pfeile als Fließrichtung der Energie (7.1), »Nicht oder, sondern und« mit einem Hinweis zur Formel (7.1), Vakuum, Masse und Energie im Gitter mit Frage 69 (1), Weißes Loch, Multiversum und Zeit nur vorwärts (4). Dazu die Antwort des Autors auf Frage 69, Raum leer und flach, darin eine Flüssigkeit unter Druck (1); daraus die Trennung von Raum und Medium, nach der frühere Sätze über ein materielles Vakuum das Medium meinen; dazu der Satz des Autors über frontal zusammenlaufende Längswellen mit den Messungen zu Flüssigkeiten und dem Vorschlag einer Prüfung von Querwellen aus Drehung oder Magnetismus, beantwortet mit der Scherung des Mediums (1, Frage 69); dazu der Name Feldenergie für das Vakuummedium und die Begriffstabelle angepasst (Vakuum, Feldenergie), Messungen zu Drehung und Magnetfeldern und die Prüfsteine für Licht als Alfvén-Welle (1). Entfernt: Claudes

Vorschlag, Licht als Alfvén-Welle des Mediums zu verstehen, nach dem Hinweis des Autors, dass Licht sich nur im Nichts ausbreitet (1); die Frage nach Querwellen in der Flüssigkeit gilt seither den Gravitationswellen (Frage 69); dazu die Antwort des Autors, dass Licht gleichzeitig mit den Gravitationswellen entsteht und sich mit ihnen bewegt, mit GW170817 und zwei Lesarten (1); der Autor wählt Lesart B und erwartet viel Licht bei der Verschmelzung Schwarzer Löcher, daraus V19 und Frage 70 mit der Grenze von INTEGRAL für GW150914; dazu die Sätze des Autors zu Gas um Schwarze Löcher und zur Dehnung der Gammastrahlung, mit einem Vorschlag zur Wortwahl (hell und energiereich) und den gemessenen Wegen von Gammastrahlung zu Licht (1); dazu der Satz, dass Gammastrahlung durch das Feld gebremst wird, mit drei Lesarten und ihren Messungen (1, Frage 70); der Autor bestätigt die Einordnung und die Arbeitsweise, naheliegende Folgerungen selbst zu ziehen; dazu sein Satz zu »zu hell« und »zu dunkel« mit der Trennung von Menge und Energie pro Lichtteilchen, einer neuen Zeile der Begriffstabelle und einem Vorschlag zur Wortwahl (1), dazu der CO_2-Schneidlaser als Beispiel; aus einem mitgeschickten Text zu π und e geprüft und übernommen: Umlaufquantisierung in Supraflüssigkeiten (Onsager, 1949; Vinen, 1961) und die Eulersche Formel (7), nicht übernommen: e bestimme den 1/r-Abfall; dazu die Aussage des Autors zum Bild frontal zusammenstoßender Wellen, mit der Lesart »zur Seite laufend«, LHC und Elektron-Positron-Vernichtung (1, Frage 69). Aus einer Prüfung durch Gemini zu einem Video von WELT über das frühe Sonnensystem geprüft: Grand Tack (Walsh und Kollegen, 2011), etwa 1 % Wahrscheinlichkeit für eine instabile Merkurbahn binnen 5 Milliarden Jahren (Laskar und Gastineau, 2009) und die Entstehung des Mondes durch Theia (Canup und Asphaug, 2001) stimmen; nicht übernommen: dass das Standardmodell ohne hydrodynamische Druckfronten rechne, denn Planeten wandern dort über den Austausch von Drehimpuls mit der Gasscheibe an den Lindblad-Resonanzen (Goldreich und Tremaine, 1980), der Bezug auf Hossenfelders Video, das die Dekohärenz behandelte, und die Deutung des Theia-Einschlags als Geometriesprung, die keine Aussage des Autors ist. Dazu die Antworten auf die Fragen des Autors zur fehlenden Herleitung der Schwerkraft (2.1, zwei Wege) und zur Ausbreitung im Radius (1, Frage 69). Zusammenfassung auf den Stand vom 5. November gebracht (zwei Postulate, Raum leer und flach, Flüssigkeit unter Druck, Feldenergie, Licht, Frage 69, V19), dazu ein Hinweis in P2, dass die Rechnung mit der Scherhärte nach dem flüssigen Medium nicht mehr für Licht gilt; Preprint-Entwurf, Fragenliste und Meilensteinbericht auf denselben Stand gebracht. Dazu die Sätze des Autors zu frühen Dichteschwankungen und Gravitationswellen, mit zwei Lesarten und Frage 71 (5.3), zu Gravitationswellen über Neutrinos und zur Energie, die Neutrinos Atomen geben, mit Weinberg (2004), Rainville und Kollegen (2005) und einer Abschätzung für die Erde (2.1, Frage 7), und zu Drehung oder Wärme, mit dem YORP-Effekt (Lowry und Kollegen, 2007) und einem Vorschlag zur Wortwahl (2.1). Dazu die Antwort des Autors zu Frage 71 (erste Gravitationswellen beim Umschlag, dann bei der Kernfusion; Wirbel

schon vor der Rekombination), eingeordnet als Lesart B, mit Phasenübergängen als Quelle von Gravitationswellen (Hindmarsh und Kollegen, 2014; Afzal und Kollegen, 2023) und V20, Neutrinos aus Fusion und Umschlag, dem Wort Wurmloch mit neuer Zeile der Begriffstabelle (5.3) und den Wirbeln vor der Rekombination mit der Masse aus Planck und JADES-GS-z14-0 als Prüfsteinen (5.5, Frage 72). Aus einem Beitrag über die Beobachtung in der Quantenwelt geprüft (stimmt mit dem Stand überein) und dazu die Sätze des Autors zur Messung, mit Wegmessung ohne Rückstoß, Quantenradierer und Dekohärenz durch Wärmestrahlung und Restgas (7.1, Frage 73), sowie zur Materie im Vakuum, mit Wärmestrahlung, gehemmter Aussendung zwischen Platten, freier Ausdehnung nach Joule und

zwei Lesarten (3.2, Frage 74). Dazu die Antwort des Autors auf Frage 73 (kein Stoß nötig, Masse und Feld des Detektors, Quantensprung), mit dem inneren Zustand als Wegspeicher, Phasenverschiebung ohne Verlust des Musters durch Schwerkraft und Magnetfeld und der Auswahl beim Quantenradierer (7.1). Dazu der Satz des Autors zum Dreikörperproblem, keine Anziehung, sondern Abstoßung, mit Poincaré, Sundman und der Merkurbahn (2.1); auf Hinweis des Autors schreibt Claude auch im Gespräch nicht mehr von Körpern »unter Schwerkraft« im Sinn eines Zugs. Dazu die Sätze des Autors zu Dichte, Temperatur, Druck, gleicher Ladung, gleichmäßiger Verteilung und Schwarmverhalten (1), mit Mischen und Trennen von Flüssigkeiten (Plateau, Stokes), Ionenkristallen und selbst angetriebenen Teilchen sowie Frage 75 und Frage 76. Dazu die Antworten des Autors auf Frage 75 (Dichte und Struktur wie bei der Lichtgeschwindigkeit) und Frage 76 (Aufschaukeln, Mpemba-Effekt), mit der Lorentz-Lorenz-Beziehung, der Millennium Bridge, Ionenfallen, dem Mpemba-Effekt nach Burridge und Linden, Kumar und Bechhoefer sowie Lu und Raz und einem Vorschlag zu Frage 72 (1). Dazu der Satz des Autors, dass alle sechs Punkte eines Beitrags über den Urknall gleichzeitig wahr sind und der Ballon ein Zentrum hat, mit Phasenübergang, Rosinenteig, Dipol der Hintergrundstrahlung, Isotropie der Ausdehnung und Quasardipol, daraus V21 und Frage 77 (5.2). Korrigiert: Claudes Einordnung, der Trichter des Autors meine etwas anderes als das Glockenbild; nach dem Autor ist es derselbe Trichter, um den Mittelpunkt gedreht (5.2). Dazu eine Auswertung durch Gemini geprüft: übernommen der Test nach Ellis und Baldwin (1984), die Signifikanzen nach Secrest (2025) und die getrennten Spuren von Strahlung und Materie; nicht übernommen, dass der Materiedipol stärker ausfallen muss und der Hauptbeleg für V8 sei; zur vorgeschlagenen Rechnung die Vergleichsrechnung von Alnes und Amarzguioui (2006); Bezug der 370 km/s auf P4 berichtigt. Erneut korrigiert nach Antwort des Autors: Es liegen keine weiteren Trichter daneben, der Trichter ist der Ereignishorizont des Beobachters, und jeder hat seinen eigenen (5.2); dazu Beobachtungshorizont und Lichtweg nach Davis und Lineweaver (2004), Milnes Modell und zwei Lesarten zu V21 (Frage 77). Dazu die Antwort des Autors (jeder im Zentrum seines Trichters, Bewegungsrichtung trotzdem sichtbar, Zwiebelschichten), mit gleichmäßiger Ausdehnung wie bei Cassiopeia A, dem Dipol

der Hintergrundstrahlung als zusätzlicher Bewegung nach außen, der Gegenrichtung als Lage des Zentrums, der großräumigen Strömung nach Watkins und Kollegen (2023) und einer neuen Fassung von V21 (5.2). Am 5. November 2026 alle vier Unterlagen in einem Hauptpaper zusammengefasst (Preprint-Entwurf als Haupttext, dazu die Anhänge A bis E mit Begriffen, Vorläufern, allen 77 Fragen, Stand der Arbeit und diesem Protokoll sowie der vollständigen Literatur) und ein Begleitschreiben an Fachkollegen und mögliche arXiv-Empfehler entworfen; dieser Arbeitsentwurf bleibt das vollständige Protokoll. Dazu der Satz des Autors, dass Ladungen Druckzonen sind und ein Elektron im Atom das Auge eines Wirbelsturms ist (1, Frage 75), mit stabilen Atomen nach der Larmor-Formel, der Aufenthaltsdichte im Grundzustand (Schrödinger, 1926), dem Elektroneneinfang (Alvarez, 1937) und Beryllium-7 (Wang und Kollegen, 2006); Frage 75 damit beantwortet, Frage 74 teilweise. Korrigiert: Claudes Einordnung, die gemessenen Ladungen zeigten das Gegenteil des Satzes (1), und die Rückfrage zu Frage 75 waren unnötig, denn die Aussage stand schon in 2.6; ebenso unnötig war die Rückfrage zu Frage 74, denn der Wortlaut des Autors (»mehr Platz«) legt die Lesart fest (3.2). Dazu die vom Autor im Hauptpaper überarbeitete Zusammenfassung mit drei neuen Sätzen: Dichteunterschied und Beschleunigung (2.1, eingeordnet als Gefälle des Mediums wegen MICROSCOPE), schnell bewegte Atome und Uhren (2.5, mit Bailey und Kollegen, 1977, und Botermann und Kollegen, 2014) und die 380.000 Jahre

als Messung (5.3, Frage 17, mit Fixsen, 2009, und Planck, 2020); dort Rechtschreibung von Claude angeglichen und das englische Abstract nachgezogen. Korrigiert am 6. November 2026: Claudes Umrechnung der Dehnung auf rund 13 Millionen Jahre setzte eine gleichmäßige Ausdehnung vom Umschlag an voraus; nach dem Autor ist die Supernova schlagartig, vorher dehnt sich nichts aus, die Umrechnung ist daher verworfen (5.3, Frage 17). Erneut korrigiert: Die 380.000 Jahre hat der Autor aus dem Standardmodell übernommen (Ablauf: Schwarzes Loch, Urknall, Weißes Loch, Rekombination 380.000 Jahre nach dem Urknall); Claudes Folgerung, vor der Supernova dehne sich nichts aus und die Dehnung sage nichts über die Dauer, ist entfernt; Frage 17 damit teilweise beantwortet. Dazu der Satz des Autors, dass mit der Eddington-Grenze wohl etwas nicht stimmt, weil Masse nicht anzieht, und sein Grundsatz, dass seine Theorie nur stimmen kann, wenn die Messungen stimmen (5.3), mit Eta Carinae (Smith und Owocki, 2006), M82 X-2 (Bachetti und Kollegen, 2014), J1010+2358 (Xing und Kollegen, 2023; Skúladóttir und Kollegen, 2024) und den Galaxienzahlen von CEERS (Chworowsky und Kollegen, 2024, zu Frage 72). Dazu die Frage des Autors, ob Eddington die Rotation einkalkuliert hatte, mit Eddington (1926), Maeder und Meynet (2000), Altair (Monnier und Kollegen, 2007), Lasota und King (2023) und dem Massenverlust von Eta Carinae (5.3); Frage 17 damit beantwortet. Dazu die Sätze des Autors, dass es keine Sterne ohne Drehung gibt, Eddingtons Formel daher nicht zu gebrauchen ist und zu langsam drehende Sterne unter dem Druck des Vakuums kollabieren (5.3, Frage 65), mit γ Equulei (Bychkov und Kollegen, 2016), R136a1 (Crow-

ther, 2010) und dem Crab-Pulsar (Comella und Kollegen, 1969); eingeordnet: Eddingtons Formel bleibt eine Näherung für langsam drehende Sterne. Korrigiert: Claudes Prüfstein, die Schwelle müsse unter der Drehung von γ Equulei liegen, ließ den Zustrom außer Acht; nach dem Autor hängt sie von Zustrom, Volumen, Dichte und Drehimpuls ab (5.3). Aus einem vom Autor mitgeschickten Text zu Frage 10 übernommen: die Zweiteilung in die Schwelle aus Masse und Radius und die tatsächliche Drehung aus der Bilanz von Zustrom und Abstrom (3.1); berichtigt: 1E 161348-5055 ist jung, rund 2000 Jahre, und PSR J0737-3039A wird heute nicht mehr beschleunigt; die Gleichungen fehlten im Text und wurden aus 3.1 ergänzt; Frage 10 damit beantwortet. Am 6. November 2026 berichtigt: Für Achernar standen bisher das Achsenverhältnis 1,56 und rund 250 km/s aus der Messung von 2003; die neuere Messung mit VLTI-PIONIER (Domiciano de Souza und Kollegen, 2014) ergibt 1,352 und 298,8 km/s am Äquator, rund 0,84 der Schwelle √(GM/R) (Rechnung von Claude); angepasst in 3.1 und Frage 10, Quelle ergänzt. Neu angelegt: eine eigene Datentabelle mit gemessenen Werten zu Sternen, Weißen Zwergen, Neutronensternen, Schwarzen Löchern, Quasaren und Little Red Dots (Masse, Durchmesser, Volumen, Dichte, Drehung, Zustrom, Alter, Zusammensetzung). Dazu der Satz des Autors, dass Little Red Dots entweder keine Sterne haben oder erst sichtbar werden, wenn sie genug Masse verloren haben, aus der Sterne entstehen, mit zwei Lesarten, den Wirtsgalaxien nach Chen und Kollegen (2025) und Zhang und Kollegen (2026), der dynamischen Masse von Abell2744-QSO1 (Juodžbalis und Kollegen, 2025), nahen Little Red Dots (Lin und Kollegen, 2025; Ji und Kollegen, 2025) und ihrer Häufigkeit über die Rotverschiebung (Inayoshi, 2025; Inayoshi und Ho, 2025); eingetragen bei den Little Red Dots, in Frage 72 und in der Datentabelle. Korrigiert: Claudes Einordnung, die Dauer sei im Modell ohne Antwort, weil die Umrechnung von Rotverschiebung in Zeit fehle; nach dem Autor gelten die Zeiten des Standardmodells auch in seinem Modell, wie die 380.000 Jahre. Dazu sein Satz, dass die Little Red Dots schon Wirbel im Hyperstern waren, die bei der Rekombination extrem verdichtet wurden, mit CAPERS-LRD-z9 (Taylor und Kollegen, 2025), den Zeiten nach den Planck-Werten, der Größe solcher Bereiche auf der

Hintergrundstrahlung und der Grenze für deren Verzerrung (Fixsen und Kollegen, 1996) (Frage 72). Aus einer Prüfung durch ChatGPT (6. November 2026) übernommen: die Rechnung mit freiem Faktor k zur Lichtablenkung, von Claude nachgerechnet, mit der Festlegung von k durch Cassini (Frage 1); vorgemerkt der Hinweis, V19 mit Zeitfenster, Wellenlängenbereich und Mindesthelligkeit zu versehen, damit ein Ausbleiben gegen V19 spricht. Nicht übernommen: der abweichende Zählstand (66 Fragen, 3 beantwortet, 14 teilweise), der auf einer älteren Fragenliste beruht; dass der freie Fall eine eigene Begründung brauche, denn dieselbe Brechzahl liefert nach Dicke und Puthoff Newtons Beschleunigung; die Herkunft der 380.000 Jahre ist bereits als aus dem Standardmodell übernommen ausgewiesen (5.3). Über den vorgeschlagenen Schwerpunkt der ersten Fassung (Test im schwachen Feld, Kosmologie als weiterführende Hypothese) ent-

scheidet der Autor. Aus der Antwort von ChatGPT übernommen: Titel und Schwerpunkt bleiben, die Lichtablenkung als Prüfstein; die genauere Fassung der Cassini-Messung (k = 2,000021 ± 0,000023, Frage 1) und die Drehfrequenzen an der Schwelle (Frage 53), dazu von Claude die Übersetzung der gemessenen Drehparameter in die Geschwindigkeit des Horizont-Äquators (Visser, 2007). Dazu der Satz des Autors, dass er von beobachtbaren Größen auf die Ursache schließt und nicht postuliert (bei den Postulaten); nicht übernommen deshalb ChatGPTs Bezeichnung der Schwelle als Postulat. Am 6. November 2026 alle Dokumente auf Widersprüche geprüft und berichtigt: Lesehinweis und Kapitel 1 nannten noch ein einziges Postulat statt zwei Postulaten mit Leitgedanke; die Zusammenfassung nannte die Herkunft der 380.000 Jahre und die Eddington-Lebensdauer noch als Frage und die Drehschwelle als allein von der Dichte abhängig; als Frage markierte Stellen zu Frage 17, Frage 46, Frage 54 und Frage 75 verweisen jetzt auf ihre Antwort; die Grenze aus dem Spektrum der Hintergrundstrahlung lautet einheitlich etwa $6 \cdot 10^{-5}$ (aus y und μ nach Fixsen und Kollegen, 1996). Dazu der Hinweis des Autors, dass »Alles hängt von der Dichte ab« so klingt, als hinge alles nur von der Dichte ab, was nicht stimmt; der Leitgedanke heißt jetzt an allen Stellen: Alles hängt auch von der Dichte ab, aber nicht nur von ihr, mit den Größen, die der Autor selbst als mitwirkend genannt hat (1); ebenso ersetzt: »nur die Dichte zählt« durch »nicht die Zahl der Teilchen, sondern ihre Dichte«. Ebenfalls am 6. November 2026: die Antwort des Autors zu Frage 69 (»wie eine Atmosphäre den Schall«) mit Abgleich eingetragen, dazu innere Schwerewellen, Tkachenko-Schwingungen und die Entfernungsmessung mit GW170817 als neue Quellen; zu Frage 1 die Zahlengleichheit $n - 1 = (v_F/c)^2$ ergänzt (Rechnung von Claude). Dazu die Sätze des Autors zu viel und wenig Licht (Gammastrahlung und Radiowellen), zum Raum, der an sich leer, aber nicht leer ist, zu Druck, Gegendruck und Rotation ohne Festlager, zu Reibung, Wärme und Ausdehnung und zu Windschatten, Unterdruck und Wirbeln, mit ATLAS (2017), Bjerknes (1898), Min und Kang (2025), Noterdaeme und Kollegen (2011), Gharib, Rambod und Shariff (1998) und Kwon und Kollegen (2016) (1, Frage 76); Wortwahl angepasst: »leerer Raum« heißt an den tragenden Stellen »an sich leerer Raum« oder »zwischen den Teilchen«, der CO_2-Schneidlaser gibt im Sinn des Autors wenig Licht in großer Menge ab; Vorschlag zur Wortwahl »in aller Regel« bei der Wärmeausdehnung (Wasser). Dazu die vom Autor mitgeschickte Neufassung (11 Seiten, 6. November 2026) gelesen; abweichend vom Arbeitsstand sind dort ein einziges Postulat statt zwei, Feldenergie als gespeicherte Energie statt als dünnste Form des Mediums, der Untertitel, der Zählstand (448 Quellen, 80 Rechnungen) und der fehlende Wortlaut von V20 und V21. Korrigiert: Claudes Vorschlag zur Wortwahl »in aller Regel« bei der Wärmeausdehnung war unnötig, denn dass sich Wasser beim Erwärmen und unter 4 °C auch beim Abkühlen ausdehnt, stand schon als Beispiel für zwei Gegenteile mit ähnlicher

Wirkung im Text (Kell, 1975); der Vorschlag ist entfernt. Dazu die Sätze des Autors, dass Ausdehnung kühlt und Teilchen mit viel Platz sich

kaum noch berühren, aber immer wieder kurz als Materie aufblitzen, mit dem Überschallstrahl (Leopold-Gruppe), dem Breit-Wheeler-Vorgang (STAR-Kollaboration, 2021), dem neutralen Pion (PrimEx-II-Kollaboration, 2020) und der Lebensdauer des Protons (Super-Kamiokande-Kollaboration, 2020) (Frage 76). Dazu die Antwort des Autors, dass ein Wirbelsystem mit einer gewissen Anzahl von Teilchen und geschlossenem Zug relativ unabhängig vom äußeren System stabil bleibt, mit Helmholtz (1858), Kelvin (1869), Rayfield und Reif (1964), Beryllium-8 und dem freien Neutron (Frage 63). Dazu die Erklärung des Autors zur Lichtbrechung wie in einer Lufthülle ohne feste Schale, mit der Wasserstoffhülle der Erde (ESA, SOHO/SWAN), der Brechung am Horizont, der barometrischen Höhenformel mit Druckausbreitung c, dem Dichteprofil exp(GM/(rc²)) und der Brechzahl exp(2GM/(rc²)) nach Puthoff (Rechnung von Claude; Ibison, 2003; Vessot, 1980); Frage 1 damit beantwortet. Keine Rückfrage zu den Maßstäben nötig, denn dass Atome im dichteren Medium kleiner sind, stand schon im Text (Dicke, 1957). Dazu die Erklärung des Autors, warum Uhren im dichteren Medium langsamer gehen (weniger Platz, früher gebremst) und Teilchen unter sehr hohem Druck zittern und erhitzen, mit f ∝ v/L (Rechnung von Claude), Ashby und Kollegen (2007), Joyce und Kollegen (2018) und einem Prüfstein zum Übergang der beiden Bereiche (Frage 1). Dazu die Sätze des Autors, dass Licht nur entsteht, wo Teilchen kollidieren, und dass Neutronen durch uns hindurchfliegen, mit Larmor (1897), der Bremsstrahlung heißen Gases (Theuns), dem Synchrotronlicht (Elder und Kollegen, 1947), Yablonovitch (1987), Borexino (2014), IceCube (2017) und Chadwick (1932), einem Vorschlag zur Wortwahl (abgebremst oder umgelenkt) und der Frage nach der Lesart Neutronen oder Neutrinos (1). Der Autor meint Neutrinos; dazu sein Satz, dass er anfangs die Neutrinos für das Elementarteilchen hielt und das gemeinte Teilchen noch keinen Namen hat, mit den Preonen als nie gemessenem Vorschlag (Pati und Salam, 1974; Wikipedia, Preon) (1, Frage 7). Umfang neu gezählt: rund 73.000 Wörter. Dazu die Antworten des Autors auf die vier Punkte: Der Druck gibt die Lichtgeschwindigkeit vor, Licht läuft nicht schneller als die Druckwelle, Teilchen ebenso (Frage 1 damit für das schwache Feld beantwortet, mit Nesterenko 1983, Abdo und Kollegen 2009, Nagel und Kollegen 2015); Gravitationswellen aus allen Richtungen als Abstrom und Zustrom (Frage 69, mit NANOGrav 2023); im starken Feld ein geordneter Fluss ohne Zusammenstöße an der Oberfläche und die Hölle in der Scheibe, mit dem Schatten aus der Brechzahl (Rechnung von Claude) als neuer Vorhersage V22 und dem Event Horizon Telescope (2022). Der frühere Satz, Licht sei keine Welle des Mediums, gilt nach dem Autor nur noch für das einzelne Aufblitzen. Korrigiert: Claudes Satz, bei Frage 59 fehle noch, wohin die Energie beim geordneten Fluss geht, war unnötig; die Antwort des Autors, die Jets, stand schon in 3.4 und Frage 59. Präzisiert nach dem Einwand des Autors: Bei Frage 69 geht es nicht darum, aus welcher Richtung Wellen kommen, sondern in welche Richtung das Medium schwingt; dazu seine Schallkanonen mit dem Quadrupol, Taylor (1960) und Lighthill (1952). Dazu die Vermutung

des Autors, dass Sagittarius A* zu langsam für Jets dreht und es deshalb nur die Fermi-Blasen gibt, mit Bland-Hawthorn und Kollegen (2019), Daly und Kollegen (2024) und dem Zustrom (Frage 59), und sein Vergleich von Schall mit Radio- und Gammawellen, mit Lorimer (2005) und einer Umrechnung von Claude; Frage 69 damit auf den Unterschied zwischen Vektor- und Tensormuster eingegrenzt (1). Nachgezogen: Frage 4 (Periheldrehung) beantwortet, weil die Brechzahl exp(2GM/(rc²)) jetzt hergeleitet ist (Frage 1); in 2.1 und bei der Frage nach der fehlenden Herleitung auf den Stand vom 6. November verwiesen; Hauptpaper, Meilensteinbericht und

Begleitschreiben nannten die Herleitung noch als fehlend und sind berichtigt. Umfang neu gezählt: rund 75.500 Wörter. Korrigiert: Claudes Einwand, die Lage der Fermi-Blasen über den Polen spreche nach der Regel aus 3.4 für schnelle Drehung, war falsch; der Autor meint Blasen statt Jets, also an der Stelle der Jets über den Polen, und die Energie reicht nicht für Jets; entfernt ist auch Claudes Rückfrage, ob Drehung oder Zustrom entscheidet (Frage 59). Am 6. November 2026 aus dem Hauptpaper die abschließende deutsche Fassung des Papers für arXiv erstellt (LaTeX, PDF und Word, 34 Seiten): mit Gleichungen für Dichteprofil, Brechzahl, Ablenkung und Schatten, 22 Vorhersagen, 17 Hauptproblemen, allen 77 Fragen in Kurzform und 204 Quellen; die Kennzeichen [P], [F] und und die Hinweise auf Rechnungen von Claude sind dort durch Formulierungen im Text und einen Abschnitt zu Entstehung und Hilfsmitteln ersetzt. Ergänzt wurden dabei Quellen, die im Text genannt, aber nicht verzeichnet waren (Descartes 1644, Eddington 1920, Bjerknes 1898, Lorentz 1904, Deser 1970, Pathria 1972, Pati und Salam 1974, Icke 1984, Smolin 1992); Zel’dovich ist mit 1962 zitiert, Le Sage mit 1784, wie in den Quellenangaben. Präzisiert nach dem Hinweis des Autors: Postulat 1 ist das dritte Newtonsche Axiom, kein Postulat; Grundlage sind damit ein Postulat (alles besteht aus einem einzigen Elementarteilchen), das dritte Newtonsche Axiom und Folgerung 1, mit Newton (1687) und Singh und Kollegen (2023); geändert in Lesehinweis, Kapitel 1, Frage 62, Frage 75 und an allen Stellen, die sich auf Postulat 1 oder 2 bezogen. Korrigiert: Claudes Berichtigung vom 6. November, Lesehinweis und Kapitel 1 nännten fälschlich ein einziges Postulat, war falsch; die Neufassung des Autors hatte darin recht. Die drei früheren Gegenbeispiele zu Postulat 1 (Ampère, Bjerknes, Jeltes) widersprechen dem Axiom nicht. Dazu die Frage des Autors, ob das Modell quantitativ erklärt, warum eine verdichtete Gaswolke nach der Druckwelle weiter kollabiert, beantwortet mit dem Kriterium von Jeans (1902), der Verdichtung hinter einer abstrahlenden Stoßfront (Czekala, Vorlesung Fluids and Shocks), kalten Wolken bei 10 K (Bergin und Tafalla, 2007) und einem Rechenbeispiel von Claude (5). Nach dem Hinweis des Autors, dass es nicht darauf ankommt, ob das eine neue Vorhersage ist, weil die Frage wichtig ist, entfernt: Claudes Satz »Eine neue Vorhersage ist das nicht«; stattdessen steht dort, dass das Modell die Frage quantitativ beantwortet, den Vergleich mit dem Standardmodell besteht und die gravitative Instabilität als Dichtegefälle des Mediums enthält, mit Auslöser und Fortsetzung des Kollapses als

zwei Wirkungen desselben Mediums (5); ebenso im Hauptpaper (Zusammenfassung, Abstract, 5.2, 11) und im Paper (Abstract, 5.2, Diskussion). Im Paper nachgezogen; die Word-Fassung zeigt Formeln jetzt als Text, weil sie in der Ansicht des Autors als »Ausgeblendete Gleichung« erschienen. Dazu die Rückfrage des Autors zu Frage 42, nachdem ChatGPT Abschnitt 5.2 als quantitative Antwort anerkannt und die Überlagerung der Dichteanomalien als Frage genannt hatte: Die Frage Frage 42 nennt jetzt ausdrücklich den Abfall wie 1/r, unter dem sie schon zitiert war. Eingegrenzt: Das Addieren der Höfe ist im schwachen Feld keine eigene Annahme, weil ein Medium auf so kleine Änderungen linear antwortet und Abweichungen erst in zweiter Ordnung auftreten (Frage 4); den Abfall wie 1/r gibt $\Delta p = c^2 \Delta \rho$ mit dem Gewicht des Mediums (Anhang B). Dazu Lee und Kollegen (2020) mit dem $1/r^2$-Gesetz bis hinab zu 52 µm; geändert in Frage 42, beim Wolkenkollaps (5), in Fragenliste und Hauptpaper und im Paper (3.2, 5.2, Hauptprobleme, Anhang B). Dazu die Sätze des Autors zu Seifenblasen und zur Drehung und seine Tafelskizzen (Oktanten, Quantengravitation, »Zwischen Funktion und Entscheidung«, zwei Kugelbilder, zwei Notizbuchseiten), eingeordnet beim ersten Weg (2.1) mit Plateau (1873), pulsierenden Blasen (Bjerknes, 1906; Lanoy und Kollegen, 2015), drehenden Seifenhäuten (Monier und Kollegen, 2023 und 2026), Kelvins Schaumzelle (1887), Weaire und

Phelan (1994) und Ostriker und Cowie (1981); dazu in Frage 42 die Wellenlänge pulsierender Materie als Kandidat für ℓ. Hinweise zur Tafel »Oktanten« (zwei doppelte Zeilen der Vorzeichentabelle) und zu $V = \pi^3$. Aus einer Prüfung durch ChatGPT übernommen: Claudes Satz, mit der pulsierenden Blase entfalle Le Sages Problem der Erwärmung, war zu stark; jetzt steht dort, dass das verdrängte Volumen über eine Schwingung zurückkehrt und die Verluste gesondert zu bilanzieren sind, mit Verweis auf Frage 76; dazu die Abhängigkeit der Kraft vom Abstand bei starker Kopplung (Lanoy und Kollegen, 2015), die genaue Fassung der Messung von Lee und Kollegen (Newton zwischen 52 µm und 3 mm im Rahmen der Messgenauigkeit) und die Kennzeichnung der Übertragung von ebenen Seifenhäuten auf eine geschlossene Blase als eigenen Schritt. Die zwei Fragen an den Autor (was pulsiert; ob sich der Takt benachbarter Körper angleicht, damit sich die Fernwirkung bei doppelter Masse verdoppelt) sind in Frage 42 und 2.1 als Fragen vorgemerkt und dort beantwortet. Im Paper nachgezogen (3.2). Dazu die Antwort des Autors auf die erste Frage (Kreislauf zum Kern, um ihn herum und zurück, an der Oberfläche gebremst; eine Seifenblase hat keinen Kern) und seine Frage nach den g-Kräften am Scheitelpunkt, eingeordnet in 2.1 und Frage 42 mit der Euler-Gleichung, der Bjerknes-Kraft als Mittel aus Volumen mal Druckgefälle (Wikipedia, Bjerknes force), dem Schwereverlauf in der Erde (Szczykulska und Kollegen, 2013) und den Schwingungen der Sonne (Leighton, Noyes und Simon, 1962; Christensen-Dalsgaard, 2002); daraus in Frage 42: Ein innerer Kreislauf bei gleicher äußerer Größe gibt außen keine Volumenänderung, für $1/r^2$ muss die Oberfläche im Takt atmen oder netto etwas durch jede Kugelschale gehen. Dazu die Sätze des Autors zu Takt und Dichte, zum Namen Exkluon und zu den Bahnen im

Atom und zur Durchsichtigkeit, eingeordnet in 2.1 mit Sommerfeld (1916), Gallagher (1994), Kholodenko (2020), Schrödinger (1926), Kramers (1923), der Planck-Kollaboration (2020), Hatsugai, Kohmoto, Koma und Wu (1995) und einer Rechnung von Claude zum wandernden Takt; zwei Lesarten vermerkt (Abbremsen am Kern durch Zusammenstöße, »mehr Gewicht« als Verweildauer); der Name in Frage 7 und im Hauptpaper (2.6, 8.1, Anhang C) und im Paper (Abstract, 2.1, 8.1) eingetragen. Dazu die vom Autor mitgeschickte Veröffentlichung der LHCb-Kollaboration (arXiv:2611.00230) und ein Bericht von Forschung und Wissen (Lenz, 2026): Die Meldung vom 3. November steht jetzt mit den gemessenen und vorhergesagten Zahlen (3.4, Frage 67), und daraus eine Grenze für eine innere Struktur aus Exkluonen, etwa $2 \cdot 10^{-21}$ m aus 100 TeV (Rechnung von Claude; 1, beim Postulat); ebenso im Hauptpaper (2.6, 8, Anhang C) und im Paper (2.1). Berichtigt im Hauptpaper: Abschnitt 9 nannte noch einundzwanzig Vorhersagen und V22 nicht unter den deutlichsten. Dazu eine Prüfung der 36-seitigen Fassung durch ChatGPT und die Antwort des Autors zum Licht an der Oberfläche, eingeordnet nach dem vierten Punkt (1) mit Event Horizon Telescope (2019, 2022), Broderick, Loeb und Narayan (2009), Boonserm und Kollegen (2018) und zwei Rechnungen von Claude (Abstand des Modellwerts zur Messung, Kerr-Schatten bei Blick auf den Pol); übernommen: Newtons Fassung des dritten Axioms vor der des Autors, die Rolle der Rechnung zur Lufthülle (Frage 1, Frage 42) und die Abhängigkeit des Faktors 2; nicht übernommen: die Neufassung des Postulats; V22 ergänzt; ebenso im Hauptpaper (3.2, Anhang C, V22) und im Paper (Abstract, 2.1, 3.2, 3.3, 3.6, V22). Nach einer zweiten Prüfung durch ChatGPT korrigiert: Claudes Schluss, aus dem Kontrast von M87* und der Grenze von Broderick, Loeb und Narayan folge, dass nur wenig zurückgeworfen werde und der Rest in Bewegung und Ausdehnung gehen müsse, war zu stark; der Kontrast enthält auch Gas in der Sichtlinie, und die 0,4 % beziehen sich unter Annahmen auf die Leuchtkraft des Zustroms, nicht auf einen Reflexionsgrad; jetzt stehen Bewegung und

Ausdehnung als mögliche Wege da, die Helligkeit innen als Aufgabe einer Rechnung für Oberfläche und Gas, dazu das Ergebnis des Event Horizon Telescope zu Oberflächen (2022) und der Hinweis, dass Keck- und VLTI-Wert aus demselben Bild stammen und V22 vereinbar, aber nicht bevorzugt ist; »kommt nicht mehr heraus« heißt jetzt »kehrt vor der Oberfläche nicht mehr um«. Im Paper steht Newtons Axiom jetzt als eigener Satz, die Fassung des Autors als zweiter; nicht übernommen: diesen Satz dem Gefäßbild zuzuordnen, denn der Autor hat ihn selbst als drittes Newtonsches Axiom bezeichnet. Vorgemerkt: eine Rechnung, wie hell die Mitte bei 1,3 mm erscheint, wenn die Oberfläche einen vorgegebenen Anteil zurückwirft (V22). Dazu der Satz des Autors, dass das System schneller dreht, wenn Ausdehnung nicht möglich ist, und dann vielleicht stabiler läuft, eingeordnet nach dem vierten Punkt (1) mit Hessels und Kollegen (2006), Thorne (1974), Domiciano de Souza und Kollegen (2014) und Çıkıntoğlu und Ekşi (2023); Hinweis, dass Hochdrehen Drehimpuls braucht, den Licht entlang der Achse nicht mitbringt. Dazu der Satz des Autors, dass sich das System unter

Druck und Gegendruck zwingend ausgleichen muss und das nur durch Rotation geht, eingeordnet nach dem vierten Punkt (1) und in Frage 65 mit Saadeh und Kollegen (2016), Badro und Kollegen (2003) und Holmström und Stixrude (2015): Drehimpuls bleibt erhalten, Ausgleich auch durch Wärme, Leuchten, Schwingung und Pauli-Druck, unter Druck paaren sich Drehungen gegenläufig. Dazu die Antwort des Autors, dass die Rotation auf den Orbitalbahnen gemeint ist und Energie von außen eher Geisterfahrer-Teilchen trifft, eingeordnet nach dem vierten Punkt (1), in Frage 65 und im Paper (8.1) mit Hänsch und Schawlow (1975), Wikipedia (Doppler cooling) und Beth (1936). Berichtigt: Claudes Satz, Licht entlang der Achse bringe keinen Drehimpuls mit, gilt nur im Mittel für unpolarisiertes Licht; zirkular polarisiertes bringt je Lichtteilchen ħ mit. Dazu die Erinnerung des Autors, dass ein Elektron kein Teilchen ist, sondern das Auge eines Sturms mit sehr wenig Teilchen, eingeordnet nach dem vierten Punkt (1), in Frage 28 und im Paper (8.1) mit gequantelten Wirbeln (Rayfield und Reif, 1964; Abo-Shaeer und Kollegen, 2001; Feynman, 1955); Frage 28 damit eingegrenzt: Der Sturm muss geordnet strömen wie eine Suprafflüssigkeit, die Größe der Einheit ħ ist gemessen, h = 6,62607015 · 10^{-34} J s. Dazu ein vom Autor mitgeschickter Prüfbericht zu Frage 28 und Frage 47 und die Prüfung durch ChatGPT, eingeordnet nach dem vierten Punkt (1), in Frage 28 und Frage 47 und im Paper (8.1): übernommen die Ringrechnung L = nħ mit ihren zwei Voraussetzungen und die Formeln nach Bohr als Prüfstein; nicht übernommen Frage 28 = Frage 47, die Formel ħ = N_0 · m_Ex · c · r_0 und zwei gemeldete Tippfehler, die nicht vorkommen; der doppelte Eintrag zu NANOGrav (2023) entfernt, im Hauptpaper ebenso. Am selben Tag die vom Autor über ChatGPT weitergegebene Erklärung zu Strömung und Kollisionen am Schwarzen Loch, eingeordnet nach der Ringrechnung (1), mit der Mitnahmerechnung, Larmor (1897), Balick und Brown (1974), Shakura und Sunyaev (1973) und dem zyklostrophischen Gleichgewicht; sie löst den Satz »ohne sich zu berühren« ab (im Paper 3.2, 3.6, 4.3, 4.5). Dazu ein Prüfbericht und eine Schlussprüfung zum 37-seitigen Paper mit einem Abgleich durch ChatGPT, eingeordnet im folgenden Absatz (1), in Frage 1, Frage 7, Frage 17, Frage 36, Frage 42, Frage 53, V19, V21, V22 und im Paper (Zusammenfassung, 1, 2.1, 3.1, 3.2, 3.6, 3.8, 3.9, 4.1, 4.3, 4.5, 4.6, 5.2, 6.2, 6.4, 6.5, 6.9, 7, 8.1, 8.4, 10, 11, 12, Literatur, Anhang B; jetzt 40 Seiten): übernommen unter anderem Gleichung (1) in erster Ordnung, die Bedingung für V22, Kraft statt Druck, die Jeans-Normierung und Frage 17 als beantwortet; nicht übernommen die Zuordnung des Newton-Satzes zum Gefäß, die Umbenennung von Frage 49 und Frage 50 und die sechs Satzfehler der Schlussprüfung, die nicht vorkommen; Abo-Shaeer und Kollegen mit DOI statt falscher arXiv-Kennung, im Hauptpaper ebenso. Am 7. November 2026 ein Abgleich und

Abschlussplan von ChatGPT zur 40-seitigen Fassung, eingeordnet im Absatz danach (1), in Frage 10, Frage 53, V9, V19, V21 und im Paper (3.6, 4.1 mit der neuen Gleichung zu Drehimpuls und Schwelle, 5.1, 10): übernommen die Trennung von Drehimpuls, Winkel- und Umfangsgeschwindig-

keit, daraus $J = kGM^2/c$ für ein Schwarzes Loch an der Schwelle und die Lage der Oberfläche innerhalb der kritischen Lichtbahn (Rechnungen von Claude), die Bedingung für den Umschlag als Rechnung und die Präzisierungen zu V9, V19 und V21; nicht übernommen die Umformulierung zum dritten Axiom und die Umbenennung von Frage 49 und Frage 50; nicht eingebaut die beiden Manuskriptbausteine und die Punkte aus dem Gespräch mit ChatGPT, die hier nicht vorliegen. Im Hauptpaper ebenso. Danach nach einem Hinweis von ChatGPT präzisiert (1, Frage 53; im Paper 3.6 und 4.1, jetzt 41 Seiten): Die Lage der Oberfläche bei GM/c^2 folgt nur mit Newtons Kreisbahngeschwindigkeit; genau gibt das lokale Gesetz $v^2 = c^2\psi/(1 - \psi)$ und damit $R = 2GM/c^2$ (Rechnung zur Bereinigung); der Drehimpuls allgemein $a^* = qk$ bei $R = qGM/c^2$, $k \leq 2/3$ für jede kugelsymmetrische Verteilung, erreicht nur von einer dünnen Schale; die Drehimpulsformel bei Lichtgeschwindigkeit gilt genau, weil Strahlung den Impuls E/c trägt; die 4,63 % bleiben an das exponentielle Profil gebunden. Gestrichen: »nahe daran, wenn das Loch innen weitgehend leer ist«. Im Hauptpaper ebenso. Am 7. November 2026 außerdem ein Prüfbericht zur 41-seitigen Fassung im Vergleich mit arXiv-Papers, eingeordnet in Frage 11, Frage 24, Frage 53, im Abschnitt zum Abgleich (1) und im Paper (3.2, 3.3, 3.6, 4.2, 8.1, 11, Anhang A und B, Literatur): übernommen Teilchendichte statt Dichte bei der Verkürzung bewegter Körper, die Energiedichte steigt mit γ^2; eine Oberfläche bei $2GM/c^2$ liegt auf, nicht innerhalb der kritischen Lichtbahn; im Kriterium gilt die lokale Geschwindigkeit c; der Term $-\rho GM/r^2$ als Impuls, den das Medium zuführt (Frage 1, Frage 42); Schwarze Löcher sind im Mittel über die Kugel mit dem Schwarzschild-Radius erst ab etwa 7 Sonnenmassen weniger dicht als ein Neutronenstern von 1,4 Sonnenmassen und 12 km, mit dem Radius GM/c^2 ab etwa 20 (Rechnung von Claude); eine zweite Lesart für die Verlangsamung am Kern, das dichtere Medium statt der Zusammenstöße; Frage 11 ohne Horizont; Satzpunkt bei Frage 24; die Fragen Frage 16, Frage 18 und Frage 26 in der Tabelle der Hauptprobleme; Gravitationswellen tragen Energie und damit Masse fort; DOI statt Pressemitteilung oder Aggregator bei Bachetti, Carniani (mit englischem Titel), Dürr, Ellis und Baldwin, Maiolino, Popławski, Taylor und Tonomura, bei Bosch die Seite 5190. Nicht übernommen: die Umformulierung von »Zwei gleich große Kräfte stoßen sich ab«, denn das ist der Wortlaut des Autors; gemeldete Fehler, die im PDF nicht vorkommen (kursive Funktionsnamen, Nummern mit führender Null, $190521g, gr-qe, fehlendes γ bei Bychkov, abgebrochene Links, die nur Zeilenumbrüche sind). Zur Entscheidung des Autors: seine Bilder (»die Hölle los«, »Geisterfahrer«, »Knall«, »viel und wenig Licht«, Lastwagen), die Auslagerung der Atomebene, ein englischer Titel mit Abstract und eine kürzere Darlegung der KI-Mitarbeit. Im Hauptpaper ebenso.

- Belege aus der Literatur: alle in Kapitel 8 und unter Quellen genannten Arbeiten.
- Ganze Teile: Begriffstabelle, Grundgleichungen der Mechanik der Kontinua und ihre Prüfsteine (Kapitel 1), Ablauf (5.1), Einordnung (8), Vor-

hersagen (9), Fragen (10); Kapitel 2 in der Dichtefassung, in der nur die mit [P] markierten Sätze vom Autor stammen.

- Aus einer Prüfung durch Gemini übernommen: Gleichheit der beiden Schwellen (3.1); Widerspruch zwischen Kerr-Formel und Puthoff-Medium (3.2); Vorschlag zu Frage 31, angepasst an das dünne Vakuum des Autors, nachdem Claudes Gegenrechnung die Fassung mit dichtem Vakuum ausgeschlossen hatte (2.1); Hinweise auf Originalquellen statt Nachrichtenseiten; aus einer zweiten Prüfung ein Rechenfehler um den Faktor 1000 (2.1, korrigiert), die Unterscheidung

von Scher- und Kompressionshärte (P2), zwei Prüfsteine zur Verschränkung (7.2) und der Kullback-Leibler-Ansatz zu Frage 24 (5.7); aus einer dritten Prüfung der Ausgleich des Überschusses durch die Leerräume (2.1) und die Folgerung, dass für die Verschränkung kein Signal mit endlicher Geschwindigkeit in Frage kommt (7.2; die weitergehende Folgerung, nur der Superdeterminismus bleibe, wurde nach der Klarstellung des Autors zum Kollaps bei der Messung zurückgenommen). Nicht übernommen: Geminis Annahme, im PDF fehlten Minus- und Gleichheitszeichen; tatsächlich erschienen die Formeln dort als roher LaTeX-Code und stehen jetzt als lesbare Formeln im Text.

- Aus einer Prüfung durch ChatGPT übernommen: neutrale Darstellung des kosmologischen Standardmodells, das keine Anfangssingularität voraussetzt (Zusammenfassung); der Hinweis, dass eine Gesamtmasse in einem unendlichen Universum nicht definiert ist (P2, Frage 40); die Abgrenzung zur Allgemeinen Relativitätstheorie im schwachen Feld (2.1); das ausgezeichnete Ruhesystem als Prüfstein, mit einem Messbeleg aus Pulsaren von Claude (Frage 41); die Kennzeichnung der Schattenversuche als Anschauungsbild (Kapitel 7). Nicht übernommen: die Kritik am Bild von Hilberts Hotel, denn der Autor behauptet nicht, dass die Dichte gleich bleibt, sondern dass nur sie zählt. Die übrigen Einwände (Schwarzschild-Loch ohne Drehung, Nukleosynthese, Schwingungsspitzen der Hintergrundstrahlung, Eddington-Lebensdauer, Zähigkeit als Reibung, fehlende Gleichung für den Kollaps) standen bereits im Entwurf (3.2, Frage 10, Frage 16, Frage 17, Frage 26, 2.2, Frage 27). Über die vorgeschlagene Aufteilung in drei Arbeiten entscheidet der Autor.

- Aus einer Zusammenfassung eines Videos (SchlummerPhysik) übernommen und geprüft: Sacharow (1967) als Vorläufer für die Steifigkeit des Mediums (P2); Einstein (1939) als Vorläufer des Drehungskriteriums (3.1); Padmanabhan (2002) und Ahn und Kollegen (2026) zu Schwerkraft und Wärmelehre (Kapitel 1, Frage 48); Zahlen zu GW250114 (Frage 30). Berichtigt: Einstein schloss 1939 das Gegenteil des Modells, nämlich dass keine Schwarzen Löcher entstehen, und die Lichtgeschwindigkeit wird bei 1,5 Schwarzschild-Radien erreicht, nicht am Horizont; daraus ergab sich Frage 53. Der Kritiker der Arbeit

aus Seoul heißt Gunn Kim; die Autorennamen folgen der Veröffentlichung.

Zahlenwerte ohne Quelle sind gerundete Richtwerte und vor einer Einreichung im Original zu prüfen.

Überarbeitung vom 10. November 2026. Geändert wurde:

- Ein Druckgesetz für das ganze Medium. Frühere Fassungen setzten für eine dichte Phase ein zweites Gesetz an, das Phasengesetz $p = K\rho^2$. Das war ein Fehler: Mit ihm käme die Periheldrehung des Merkur auf 35,82″ statt der gemessenen 42,98″ pro Jahrhundert. Jetzt gilt überall $\Delta p = c^2 \Delta\rho$. In den Anhängen ist jede betroffene Rechnung umgestellt oder als Vergleichsmodell gekennzeichnet; geänderte Ergebnisse stehen jeweils dort (unter anderem Anhang B, Abschnitt B.1.1, und Anhang A).
- Begriffe vor dem ersten Gebrauch: Exkluon, Elektronenwolke, Elektron (Kapitel 1).
- Neu im Hauptteil: vier Stellgrößen des Knalls (2.5), Durchsichtigkeit durch Ausrichtung (2.1), AT 2016blu, Schleifengröße, Übergangszone und Mpemba-Test (3.4), Schalen aus Wirbelplätzen mit dem gescheiterten und dem korrigierten Test (7), Wirbel, $g = 2$ und Zitterbahn (7.3).
- Neu im Anhang C: drei Nähte auf der Kugel und das Innenleben mit Pumpkreislauf, Umkehr, Spirale und Energie (Abschnitt C.12).
- Wo eine Vorhersage scheitert, steht das im Text: bei den schweren p-Atomen Te und Po ohne Polkraft, beim Faktor g, der angenommen und nicht hergeleitet ist, und bei der Massenlücke, die gemessen nicht leer ist.

Quellen

- van Dokkum und Kollegen: JWST Confirmation of a Runaway Supermassive Black Hole (arXiv:2512.04166)
- Suh und Kollegen: LID-1166, ein Paar wachsender Schwarzer Löcher in einer gasreichen Verschmelzung bei Rotverschiebung 4,5, Nature Astronomy (2026), doi:10.1038/s41550-026-03008-z
- Roederer und Kollegen: Fission of nuclei heavier than uranium (arXiv:2312.06844)
- Hoffman und Kollegen: The Dipole Repeller (arXiv:1702.02483)
- Benoit-Lévy und Chardin: Dirac-Milne-Universum (arXiv:0903.2446)
- Bellinger und Caplan: The Sun's Dark Core (arXiv:2505.01503)
- Shamir: The Distribution of Galaxy Rotation in JWST Advanced Deep Extragalactic Survey, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 538, 76 (2025); arXiv:2502.18781
- Richardson und Kollegen: Voyager 2 Plasma Observations of the Heliopause and Interstellar Medium, Nature Astronomy 3, 1019 (2019)
- Dzuba, Flambaum und Webb: superschwere Elemente in Sternspektren (arXiv:1703.04250)
- Chon und Kollegen: Overmassive black holes and little red dots naturally form in simulations, Nature (2026), doi:10.1038/s41586-026-10985-8; arXiv:2601.04955
- de Graaff und Kollegen: Little red dots host black hole stars, angenommen in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (August 2026)
- Kokorev und Kollegen: The Deepest GLIMPSE of a Dense Gas Cocoon Enshrouding a Little Red Dot (GLIMPSE-17775); arXiv:2511.07515
- NobelPrize.org: The Nobel Prize in Physics 2026 (Francis Halzen), Pressemitteilung der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften
- IceCube Collaboration: Evidence for Neutrino Emission from the Nearby Active Galaxy NGC 1068, Science 378, 538 (2022)

- DESI Collaboration: DESI DR2 Results II, Measurements of Baryon Acoustic Oscillations and Cosmological Constraints (2025); arXiv:2503.14738
- NPR: If Planet Nine Is Out There, This Telescope Might Actually Find It (9. April 2025), Schätzung von Scott Sheppard
- Brown, Holman und Batygin: A Pan-STARRS1 Search for Planet Nine, The Astronomical Journal 167, 146 (2024); arXiv:2401.17977
- Tsirelson: Quantum Generalizations of Bell's Inequality, Letters in Mathematical Physics 4, 93 (1980)
- Rauch und Kollegen: Cosmic Bell Test Using Random Measurement Settings from High-Redshift Quasars, Physical Review Letters 121, 080403 (2018)
- The BIG Bell Test Collaboration: Challenging Local Realism with Human Choices, Nature 557, 212 (2018)
- Heisenberg: Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik, Zeitschrift für Physik 43, 172 (1927)
- Diósi: A Universal Master Equation for the Gravitational Violation of Quantum Mechanics, Physics Letters A 120, 377 (1987)
- Penrose: On Gravity's Role in Quantum State Reduction, General Relativity and Gravitation 28, 581 (1996)
- Donadi und Kollegen: Underground Test of Gravity-Related Wave Function Collapse, Nature Physics 17, 74 (2021)
- Shao und Kollegen: A New Limit on Local Lorentz Invariance Violation of Gravity from Solitary Pulsars, Classical and Quantum Gravity (2013); arXiv:1307.2552
- Eshelby: The Determination of the Elastic Field of an Ellipsoidal Inclusion, and Related Problems, Proceedings of the Royal Society A 241, 376 (1957)
- Mindlin: Micro-structure in Linear Elasticity, Archive for Rational Mechanics and Analysis 16, 51 (1964)
- Aifantis: On the Role of Gradients in the Localization of Deformation and Fracture, International Journal of Engineering Science 30, 1279 (1992)
- Lazar: A Non-singular Continuum Theory of Point Defects Using Gradient Elasticity of Bi-Helmholtz Type (2019); arXiv:1903.03067

- Pauling: The Nature of the Chemical Bond. IV. The Energy of Single Bonds and the Relative Electronegativity of Atoms, Journal of the American Chemical Society 54, 3570 (1932)
- Weizsäcker: Zur Theorie der Kernmassen, Zeitschrift für Physik 96, 431 (1935)
- Borchert und Kollegen (BASE): A 16-parts-per-trillion Measurement of the Antiproton-to-proton Charge–mass Ratio, Nature 601, 53 (2022)
- Anderson und Kollegen (ALPHA-g): Observation of the Effect of Gravity on the Motion of Antimatter, Nature 621, 716 (2023)
- Fan, Myers, Sukra und Gabrielse: Measurement of the Electron Magnetic Moment, Physical Review Letters 130, 071801 (2023); arXiv:2209.13084
- Lee und Kollegen: Large Bulk Matter Search for Fractional Charge Particles, Physical Review D (2002); arXiv:hep-ex/0204003
- Jönsson: Elektroneninterferenzen an mehreren künstlich hergestellten Feinspalten, Zeitschrift für Physik 161, 454 (1961)
- Tonomura und Kollegen: Demonstration of Single-electron Buildup of an Interference Pattern, American Journal of Physics 57, 117 (1989)
- Fein und Kollegen: Quantum Superposition of Molecules beyond 25 kDa, Nature Physics 15, 1242 (2019)
- Grangier, Roger und Aspect: Experimental Evidence for a Photon Anticorrelation Effect on a Beam Splitter: A New Light on Single-Photon Interferences, Europhysics Letters 1, 173 (1986)
- Hensen und Kollegen: Loophole-free Bell Inequality Violation Using Electron Spins Separated by 1.3 Kilometres, Nature 526, 682 (2015)
- Giustina und Kollegen: Significant-Loophole-Free Test of Bell's Theorem with Entangled Photons, Physical Review Letters 115, 250401 (2015)
- Shalm und Kollegen: Strong Loophole-Free Test of Local Realism, Physical Review Letters 115, 250402 (2015)
- Planck: Zur Theorie des Gesetzes der Energieverteilung im Normalspectrum, Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft 2, 237 (1900)
- Einstein: Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt, Annalen der Physik 17, 132 (1905)

- Millikan: A Direct Photoelectric Determination of Planck's „h", Physical Review 7, 355 (1916)
- Fixsen und Kollegen: The Cosmic Microwave Background Spectrum from the Full COBE FIRAS Data Set, The Astrophysical Journal 473, 576 (1996); arXiv:astro-ph/9605054
- Nesterenko: Propagation of Nonlinear Compression Pulses in Granular Media, Journal of Applied Mechanics and Technical Physics 24, 733 (1983)
- Abdo und Kollegen (Fermi): A Limit on the Variation of the Speed of Light Arising from Quantum Gravity Effects, Nature 462, 331 (2009)
- Jacobson: Thermodynamics of Spacetime: The Einstein Equation of State, Physical Review Letters 75, 1260 (1995); arXiv:gr-qc/9504004
- Verlinde: On the Origin of Gravity and the Laws of Newton, Journal of High Energy Physics 2011, 29 (2011); arXiv:1001.0785
- Brouwer und Kollegen: First Test of Verlinde's Theory of Emergent Gravity Using Weak Gravitational Lensing Measurements, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 466, 2547 (2017); arXiv:1612.03034
- Agostini und Kollegen: Free-Free Transitions Following Six-Photon Ionization of Xenon Atoms, Physical Review Letters 42, 1127 (1979)
- Foucault: Méthode générale pour mesurer la vitesse de la lumière dans l'air et les milieux transparents, Comptes rendus de l'Académie des sciences 30, 551 (1850)
- Feynman, Leighton und Sands: The Feynman Lectures on Physics, Band I, Kapitel 31: The Origin of the Refractive Index (1963)
- Huygens: Traité de la lumière, Leiden (1690)
- Fizeau: Sur les hypothèses relatives à l'éther lumineux, Comptes Rendus de l'Académie des Sciences 33, 349 (1851)
- Euler: Methodus inveniendi lineas curvas maximi minimive proprietate gaudentes, Anhang I: De curvis elasticis, Lausanne und Genf (1744)
- Michell: On the Stability of a Bent and Twisted Wire, Messenger of Mathematics 19, 181 (1890)
- Koiter: Over de stabiliteit van het elastisch evenwicht, Dissertation, Technische Hogeschool Delft (1945)
- Goriely: Twisted Elastic Rings and the Rediscoveries of Michell's Instability, Journal of Elasticity 84, 281 (2006)

- Călugăreanu: Sur les classes d’isotopie des nœuds tridimensionnels et leurs invariants, Czechoslovak Mathematical Journal 9, 588 (1959)
- White: Self-linking and the Gauss Integral in Higher Dimensions, American Journal of Mathematics 91, 693 (1969)
- Fuller: The Writhing Number of a Space Curve, Proceedings of the National Academy of Sciences 68, 815 (1971)
- Strick und Kollegen: The Elasticity of a Single Supercoiled DNA Molecule, Science 271, 1835 (1996)
- Timoshenko und Gere: Theory of Elastic Stability, 2. Auflage, McGraw-Hill (1961)
- Faddeev und Niemi: Stable Knot-like Structures in Classical Field Theory, Nature 387, 58 (1997); arXiv:hep-th/9610193
- Compton: A Quantum Theory of the Scattering of X-rays by Light Elements, Physical Review 21, 483 (1923)
- Scherk und Schwarz: Dual Models for Non-hadrons, Nuclear Physics B 81, 118 (1974)
- Polchinski: Dirichlet-Branes and Ramond-Ramond Charges, Physical Review Letters 75, 4724 (1995); arXiv:hep-th/9510017
- Chew und Frautschi: Regge Trajectories and the Principle of Maximum Strength for Strong Interactions, Physical Review Letters 8, 41 (1962)
- LIGO Scientific, Virgo und KAGRA Collaboration: Tests of General Relativity with GWTC-3 (2021); arXiv:2112.06861
- Jensen und Karch: Holographic Dual of an Einstein-Podolsky-Rosen Pair Has a Wormhole, Physical Review Letters 111, 211602 (2013); arXiv:1307.6850
- Einstein: Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig?, Annalen der Physik 18, 639 (1905)
- ATLAS Collaboration: A Detailed Map of Higgs Boson Interactions by the ATLAS Experiment Ten Years after the Discovery, Nature 607, 52 (2022); arXiv:2207.00092
- CMS Collaboration: A Portrait of the Higgs Boson by the CMS Experiment Ten Years after the Discovery, Nature 607, 60 (2022); arXiv:2207.00043
- Moseley: The High-Frequency Spectra of the Elements, Philosophical Magazine 26, 1024 (1913)

- Dymnikova, Sakharov, Ulbricht und Zhao: Putting non Point-like Behavior of Fundamental Particles to Test (2001), mit den Grenzen der L3-Messungen am LEP; arXiv:hep-ph/0111302
- Urey, Brickwedde und Murphy: A Hydrogen Isotope of Mass 2, Physical Review 39, 164 (1932)
- Gallagher: Rydberg Atoms, Cambridge University Press (1994)
- NobelPrize.org: The Nobel Prize in Chemistry 2023 (Bawendi, Brus, Jekimow), Quantenpunkte
- Andrew, Bradbury und Eades: Nuclear Magnetic Resonance Spectra from a Crystal Rotated at High Speed, Nature 182, 1659 (1958)
- Stodolna und Kollegen: Hydrogen Atoms under Magnification: Direct Observation of the Nodal Structure of Stark States, Physical Review Letters 110, 213001 (2013)
- Coppens: X-Ray Charge Densities and Chemical Bonding, Oxford University Press (1997)
- Einstein: On a Stationary System with Spherical Symmetry Consisting of Many Gravitating Masses, Annals of Mathematics 40, 922 (1939)
- Oppenheimer und Snyder: On Continued Gravitational Contraction, Physical Review 56, 455 (1939)
- Sacharow: Vacuum Quantum Fluctuations in Curved Space and the Theory of Gravitation, Doklady Akademii Nauk SSSR 177, 70 (1967); englisch in Soviet Physics Doklady 12, 1040 (1968)
- Padmanabhan: Classical and Quantum Thermodynamics of Horizons in Spherically Symmetric Spacetimes, Classical and Quantum Gravity 19, 5387 (2002); arXiv:gr-qc/0204019
- Ahn, Bae, Jang und Kwon: A Constraint-Free Formulation of Black Hole Thermodynamics from the Field Equations, International Journal of Modern Physics D (2026); arXiv:2605.08235
- Kim: Black-Hole First Laws and Horizon Constraints: A Differential Rank Criterion (2026); arXiv:2609.16571
- LIGO Scientific, Virgo und KAGRA Collaboration: GW250114: Testing Hawking's Area Law and the Kerr Nature of Black Holes, Physical Review Letters 135, 111403 (2025)
- Event Horizon Telescope Collaboration: First M87 Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole, The Astrophysical Journal Letters 875, L1 (2019)

- Le Sage: Lucrèce Newtonien, Nouveaux Mémoires de l'Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Berlin (1782, erschienen 1784)
- Maxwell: Atom, Encyclopaedia Britannica, 9. Auflage, Band 3 (1875)
- Poincaré: Science et Méthode, Flammarion, Paris (1908)
- Eckhardt: Gravitational Shielding, Physical Review D 42, 2144 (1990)
- Varma und Kollegen: Evidence of Large Recoil Velocity from a Black Hole Merger Signal, Physical Review Letters 128, 191102 (2022); arXiv:2201.01302
- Borexino-Kollaboration: Neutrinos from the primary proton–proton fusion process in the Sun, Nature 512, 383 (2014)
- Gando und Kollegen (KamLAND): Partial radiogenic heat model for Earth revealed by geoneutrino measurements, Nature Geoscience 4, 647 (2011)
- Prša und Kollegen: Nominal values for selected solar and planetary quantities: IAU 2015 Resolution B3, Astronomical Journal 152, 41 (2016); arXiv:1605.09788
- Clausius: Ueber die Art der Bewegung, welche wir Wärme nennen, Annalen der Physik 100, 353 (1857)
- Lawson: Some Criteria for a Power Producing Thermonuclear Reactor, Proceedings of the Physical Society B 70, 6 (1957)
- Gamow: Zur Quantentheorie des Atomkernes, Zeitschrift für Physik 51, 204 (1928)
- Atkinson und Houtermans: Zur Frage der Aufbaumöglichkeiten in Sternen, Zeitschrift für Physik 54, 656 (1929)
- Bethe: Energy Production in Stars, Physical Review 55, 434 (1939)
- Leighton, Noyes und Simon: Velocity Fields in the Solar Atmosphere I, Astrophysical Journal 135, 474 (1962)
- Merrill: Spectroscopic Observations of Stars of Class S, Astrophysical Journal 116, 21 (1952)
- Burbidge, Burbidge, Fowler und Hoyle: Synthesis of the Elements in Stars, Reviews of Modern Physics 29, 547 (1957)
- Serminato, Gallino, Travaglio, Bisterzo und Straniero: Galactic Chemical Evolution of the s Process from AGB Stars, Publications of the Astronomical Society of Australia 26, 153 (2009); arXiv:0909.5570

- Watson und Kollegen: Identification of strontium in the merger of two neutron stars, Nature 574, 497 (2019)
- Wanajo, Sekiguchi, Nishimura, Kiuchi, Kyutoku und Shibata: Production of all the r-process nuclides in the dynamical ejecta of neutron star mergers, Astrophysical Journal Letters 789, L39 (2014); arXiv:1402.7317
- Aker und Kollegen (KATRIN): Direct neutrino-mass measurement based on 259 days of KATRIN data, Science (2025)
- Fukuda und Kollegen (Super-Kamiokande): Evidence for oscillation of atmospheric neutrinos, Physical Review Letters 81, 1562 (1998)
- Follin, Knox, Millea und Pan: First Detection of the Acoustic Oscillation Phase Shift Expected from the Cosmic Neutrino Background, Physical Review Letters 115, 091301 (2015)
- IceCube-Kollaboration: Measurement of the multi-TeV neutrino interaction cross-section with IceCube using Earth absorption, Nature 551, 596 (2017)
- Richtmyer: Taylor Instability in Shock Acceleration of Compressible Fluids, Communications on Pure and Applied Mathematics 13, 297 (1960)
- Meshkov: Instability of the interface of two gases accelerated by a shock wave, Fluid Dynamics 4, 101 (1969)
- Gharib, Rambod und Shariff: A universal time scale for vortex ring formation, Journal of Fluid Mechanics 360, 121 (1998)
- Helmholtz: Über Integrale der hydrodynamischen Gleichungen, welche den Wirbelbewegungen entsprechen, Journal für die reine und angewandte Mathematik 55, 25 (1858)
- Kelvin (William Thomson): On Vortex Motion, Transactions of the Royal Society of Edinburgh 25, 217 (1869)
- Batchelor: An Introduction to Fluid Dynamics, Cambridge University Press (1967)
- Everitt und Kollegen: Gravity Probe B: Final Results of a Space Experiment to Test General Relativity, Physical Review Letters 106, 221101 (2011); arXiv:1105.3456
- d’Alembert: Essai d’une nouvelle théorie de la résistance des fluides, Paris (1752)
- Bessel: Untersuchungen über die Länge des einfachen Secundenpendels, Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin (1828)

- Stokes: On the effect of the internal friction of fluids on the motion of pendulums, Transactions of the Cambridge Philosophical Society 9 (1851)
- Krishnaswami und Phatak: The Added Mass Effect and the Higgs Mechanism, Resonance 25, 191 (2020); arXiv:2005.04620
- Hobbs, Lorimer, Lyne und Kramer: A statistical study of 233 pulsar proper motions, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 360, 974 (2005); arXiv:astro-ph/0504584
- Katsuda und Kollegen: Intermediate-mass Elements in Young Supernova Remnants Reveal Neutron Star Kicks by Asymmetric Explosions, Astrophysical Journal 856, 18 (2018); arXiv:1710.10372
- Narayan, Garcia und McClintock: Advection-Dominated Accretion and Black Hole Event Horizons, Astrophysical Journal Letters 478, L79 (1997); arXiv:astro-ph/9701139
- Narayan und Heyl: On the Lack of Type I X-ray Bursts in Black Hole X-ray Binaries: Evidence for the Event Horizon?, Astrophysical Journal Letters 574, L139 (2002); arXiv:astro-ph/0203089
- Broderick, Loeb und Narayan: The Event Horizon of Sagittarius A*, Astrophysical Journal 701, 1357 (2009); arXiv:0903.1105
- Sołtan: Masses of quasars, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 200, 115 (1982)
- Wang und Kollegen: Dissecting X-ray-Emitting Gas Around the Center of Our Galaxy, Science 341, 981 (2013); arXiv:1307.5845
- Hawking: Black hole explosions?, Nature 248, 30 (1974)
- Unruh: Experimental Black-Hole Evaporation?, Physical Review Letters 46, 1351 (1981)
- Muñoz de Nova, Golubkov, Kolobov und Steinhauer: Observation of thermal Hawking radiation and its temperature in an analogue black hole, Nature 569, 688 (2019); arXiv:1809.00913
- Marrone, Moran, Zhao und Rao: An Unambiguous Detection of Faraday Rotation in Sagittarius A*, Astrophysical Journal Letters 654, L57 (2007); arXiv:astro-ph/0611791
- Bogdán und Kollegen: Evidence for heavy-seed origin of early supermassive black holes from a z ≈ 10 X-ray quasar, Nature Astronomy 8, 126 (2024); arXiv:2305.15458
- HAWC-Kollaboration: Constraining the local burst rate density of primordial black holes with HAWC, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 04, 026 (2020); arXiv:1911.04356

- Fransson und Kollegen: Emission lines due to ionizing radiation from a compact object in the remnant of Supernova 1987A, Science 383, 898 (2024); arXiv:2403.04386

- Gonzalez und Kollegen (UCNτ): Improved Neutron Lifetime Measurement with UCNτ, Physical Review Letters 127, 162501 (2021); arXiv:2106.10375

- Fender, Gallo und Jonker: Jet-dominated states: an alternative to advection across black hole event horizons in 'quiescent' X-ray binaries, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 343, L99 (2003); arXiv:astro-ph/0306614

- Chavez, Issaoun, Johnson, Tiede, Fromm und Mizuno: Prospects of Detecting a Jet in Sagittarius A* with VLBI (2024); arXiv:2405.06029

- Woosley und Taam: Gamma-ray bursts from thermonuclear explosions on neutron stars, Nature 263, 101 (1976)

- Hartman und Kollegen: Discovery of 619 Hz Thermonuclear Burst Oscillations in the Low-Mass X-Ray Binary 4U 1608-52, Bulletin of the American Astronomical Society (2003)

- Galloway und Kollegen: Thermonuclear (Type I) X-Ray Bursts Observed by the Rossi X-Ray Timing Explorer, Astrophysical Journal Supplement 179, 360 (2008); arXiv:astro-ph/0608259

- Gou und Kollegen: The Spin of the Black Hole in the Soft X-ray Transient A0620-00, Astrophysical Journal Letters 718, L122 (2010); arXiv:1002.2211

- McClintock, Narayan und Steiner: Black Hole Spin via Continuum Fitting and the Role of Spin in Powering Transient Jets, Space Science Reviews 183, 295 (2014); arXiv:1303.1583

- Narayan und McClintock: Observational evidence for a correlation between jet power and black hole spin, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 419, L69 (2012)

- Russell, Gallo und Fender: Observational constraints on the powering mechanism of transient relativistic jets, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 431, 405 (2013); arXiv:1301.6771

- Schmidt: 3C 273: a star-like object with large red-shift, Nature 197, 1040 (1963)

- Blandford und Znajek: Electromagnetic extraction of energy from Kerr black holes, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 179, 433 (1977)

- Wilson und Colbert: The Difference between Radio-loud and Radio-quiet Active Galaxies, Astrophysical Journal 438, 62 (1995); arXiv:astro-ph/9408005
- Thorne: Disk-Accretion onto a Black Hole. II. Evolution of the Hole, Astrophysical Journal 191, 507 (1974)
- Fender, Belloni und Gallo: Towards a unified model for black hole X-ray binary jets, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 355, 1105 (2004); arXiv:astro-ph/0409360
- Knaff und Zehr: Reexamination of Tropical Cyclone Wind–Pressure Relationships, Weather and Forecasting 22, 71 (2007)
- Kramer und Kollegen: Tests of general relativity from timing the double pulsar, Science 314, 97 (2006); arXiv:astro-ph/0609417
- Shankar und Deshpande: Fluid Mechanics in the Driven Cavity, Annual Review of Fluid Mechanics 32, 93 (2000)
- Batchelor: On steady laminar flow with closed streamlines at large Reynolds number, Journal of Fluid Mechanics 1, 177 (1956)
- Stephenson, Morrison und Hohenkerk: Measurement of the Earth's rotation: 720 BC to AD 2015, Proceedings of the Royal Society A 472, 20160404 (2016)
- University of Rhode Island: Hurricanes: Science and Society, Primary Circulation
- Bohr und Wheeler: The Mechanism of Nuclear Fission, Physical Review 56, 426 (1939)
- Wikipedia: Spontaneous fission
- Geiger und Nuttall: The ranges of the α particles from various radioactive substances and a relation between range and period of transformation, Philosophical Magazine 22, 613 (1911)
- Poulain, Villermaux und Bourouiba: Ageing and burst of surface bubbles, Journal of Fluid Mechanics 851, 636 (2018)
- Norman und Kollegen: Tests of the Exponential Decay Law at Short and Long Times, Physical Review Letters 60, 2246 (1988)
- Pommé und Kollegen: Evidence against solar influence on nuclear decay constants, Physics Letters B 761, 281 (2016)
- Bosch und Kollegen: Observation of Bound-State β^- Decay of Fully Ionized ^{187}Re, Physical Review Letters 77 (1996)

- Universität Warwick: Physicists find first evidence of rarest beauty particle decay (3. November 2026)
- INFN: LHCb finds evidence of one-in-ten-billion particle decay (3. November 2026)
- Einstein: Über das Relativitätsprinzip und die aus demselben gezogenen Folgerungen, Jahrbuch der Radioaktivität und Elektronik 4, 411 (1907)
- Kepler: Astronomia nova, Heidelberg (1609)
- Eddi, Fort, Moisy und Couder: Unpredictable Tunneling of a Classical Wave-Particle Association, Physical Review Letters 102, 240401 (2009)
- Zhu und Kollegen: Frustrated total internal reflection: A demonstration and review, American Journal of Physics 54, 601 (1986)
- Binnig, Rohrer, Gerber und Weibel: Tunneling through a controllable vacuum gap, Applied Physics Letters 40, 178 (1982)
- Heitler und London: Wechselwirkung neutraler Atome und homöopolare Bindung nach der Quantenmechanik, Zeitschrift für Physik 44, 455 (1927)
- Bohr: On the Constitution of Atoms and Molecules, Philosophical Magazine 26, 1 (1913)
- Hölsch und Kollegen: Benchmarking theory with an improved measurement of the ionization and dissociation energies of H_2, Physical Review Letters 122, 103002 (2019); arXiv:1902.09471
- Ruedenberg: The Physical Nature of the Chemical Bond, Reviews of Modern Physics 34, 326 (1962)
- Grisenti und Kollegen: Determination of the Bond Length and Binding Energy of the Helium Dimer by Diffraction from a Transmission Grating, Physical Review Letters 85, 2284 (2000); Bericht in Physical Review Focus 6, 9
- OpenStax: Chemistry 2e, Molecular Orbital Theory (Paramagnetismus des Sauerstoffs)
- Newton: Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, London (1687)
- de Broglie: Recherches sur la théorie des quanta, Dissertation, Paris (1924)
- Zeeman: On the influence of magnetism on the nature of the light emitted by a substance, Philosophical Magazine 43, 226 (1897)

- Birkhoff und von Neumann: The Logic of Quantum Mechanics, Annals of Mathematics 37, 823 (1936)
- Nagel und Kollegen: Direct terrestrial test of Lorentz symmetry in electrodynamics to 10^{-18}, Nature Communications 6, 8174 (2015)
- Iredale: Environmental Geology, Kapitel Seismic Waves (2024)
- Zoeppritz: Über Erdbebenwellen VII B, Nachrichten der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen (1919)
- Wikipedia: Inertial wave
- Alfvén: Existence of Electromagnetic-Hydrodynamic Waves, Nature 150, 405 (1942)
- Wang, Libeskind, Tempel und Kollegen: Possible observational evidence for cosmic filament spin, Nature Astronomy (2021)
- Saadeh, Feeney, Pontzen, Peiris und McEwen: How Isotropic is the Universe?, Physical Review Letters 117, 131302 (2016)
- Alvarez und Bloch: A Quantitative Determination of the Neutron Moment in Absolute Nuclear Magnetons, Physical Review 57, 111 (1940)
- XENON-Kollaboration: Search for New Physics in Electronic Recoil Data from XENONnT, Physical Review Letters 129, 161805 (2022); Grenze nach der Übersicht arXiv:2411.03122
- Blackett: The magnetic field of massive rotating bodies, Nature 159, 658 (1947)
- Blackett: A negative experiment relating to magnetism and the Earth's rotation, Philosophical Transactions of the Royal Society A (1952)
- Lyutikov und Lazarian: Topics in microphysics of relativistic plasmas (2013); arXiv:1305.3838
- Abdo und Kollegen: A limit on the variation of the speed of light arising from quantum gravity effects, Nature 462 (2009)
- LIGO- und Virgo-Kollaborationen: GW170814: A Three-Detector Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Coalescence, Physical Review Letters 119, 141101 (2017); arXiv:1709.09660
- LIGO, Virgo, Fermi GBM und INTEGRAL: Gravitational Waves and Gamma-rays from a Binary Neutron Star Merger: GW170817 and GRB 170817A, The Astrophysical Journal Letters 848, L13 (2017); arXiv:1710.05834
- Aichelburg und Sexl: On the gravitational field of a massless particle, General Relativity and Gravitation 2, 303 (1971)

- LIGO- und Virgo-Kollaborationen und Kollegen: Localization and broadband follow-up of the gravitational-wave transient GW150914, The Astrophysical Journal Letters 826, L13 (2016); arXiv:1602.08492
- Graham und Kollegen: Candidate Electromagnetic Counterpart to the Binary Black Hole Merger Gravitational-Wave Event S190521g, Physical Review Letters 124, 251102 (2020); arXiv:2006.14122
- Savchenko und Kollegen: INTEGRAL Upper Limits on Gamma-Ray Emission Associated with the Gravitational Wave Event GW150914, The Astrophysical Journal Letters 820, L36 (2016); arXiv:1602.04180
- McKernan und Kollegen: Ram-pressure Stripping of a Kicked Hill Sphere: Prompt Electromagnetic Emission from the Merger of Stellar Mass Black Holes in an AGN Accretion Disk, The Astrophysical Journal Letters 884, L50 (2019); arXiv:1907.03746
- Costa und Kollegen: Discovery of an X-ray afterglow associated with the γ-ray burst of 28 February 1997, Nature 387, 783 (1997)
- van Paradijs und Kollegen: Transient optical emission from the error box of the γ-ray burst of 28 February 1997, Nature 386, 686 (1997)
- Frail und Kollegen: The radio afterglow from the γ-ray burst of 8 May 1997, Nature 389, 261 (1997)
- Sari, Piran und Narayan: Spectra and Light Curves of Gamma-Ray Burst Afterglows, The Astrophysical Journal Letters 497, L17 (1998); arXiv:astro-ph/9712005
- Tanvir und Kollegen: A γ-ray burst at a redshift of $z \approx 8.2$, Nature 461, 1254 (2009)
- Ackermann und Kollegen (Fermi-LAT): The Imprint of the Extragalactic Background Light in the Gamma-Ray Spectra of Blazars, Science 338, 1190 (2012)
- Popmintchev und Kollegen: Bright Coherent Ultrahigh Harmonics in the keV X-ray Regime from Mid-Infrared Femtosecond Lasers, Science 336, 1287 (2012)
- Radiacode: Isotopendaten Cäsium-137 (Linie bei 662 keV)
- Patel: Continuous-Wave Laser Action on Vibrational-Rotational Transitions of CO_2, Physical Review 136, A1187 (1964)
- Janik: Optimizing the Alignment of a CO_2 Laser, Photonics.com (2025)
- Onsager: Statistical hydrodynamics, Il Nuovo Cimento 6, Supplement 2, 279 (1949)

- Vinen: The detection of single quanta of circulation in liquid helium II, Proceedings of the Royal Society A 260, 218 (1961); dargestellt in: Sixty Years of Quantized Circulation, arXiv:2306.15528
- Euler: Introductio in analysin infinitorum, Lausanne (1748)
- Cid Vidal und Cid Manzano: Taking a closer look at LHC, Momentum
- Aurengo: Simultaneous detection of two annihilation gamma photons, La radioactivité
- Hamilton und Lisle: The river model of black holes, American Journal of Physics 76, 519 (2008); arXiv:gr-qc/0411060
- Unruh: Experimental Black-Hole Evaporation?, Physical Review Letters 46, 1351 (1981)
- Barceló, Liberati und Visser: Analogue Gravity, Living Reviews in Relativity 14, 3 (2011); arXiv:gr-qc/0505065
- Walsh, Morbidelli, Raymond, O'Brien und Mandell: A low mass for Mars from Jupiter's early gas-driven migration, Nature 475, 206 (2011)
- Laskar und Gastineau: Existence of collisional trajectories of Mercury, Mars and Venus with the Earth, Nature 459, 817 (2009)
- Canup und Asphaug: Origin of the Moon in a giant impact near the end of the Earth's formation, Nature 412, 708 (2001)
- Goldreich und Tremaine: Disk-Satellite Interactions, Astrophysical Journal 241, 425 (1980)
- Weinberg: Damping of Tensor Modes in Cosmology, Physical Review D 69, 023503 (2004); arXiv:astro-ph/0306304
- Rainville und Kollegen: A direct test of $E=mc^2$, Nature 438, 1096 (2005)
- Lowry und Kollegen: Direct Detection of the Asteroidal YORP Effect, Science 316, 272 (2007); Pressemitteilung ESO 11/07
- Einstein und Rosen: The Particle Problem in the General Theory of Relativity, Physical Review 48, 73 (1935)
- Fuller und Wheeler: Causality and Multiply Connected Space-Time, Physical Review 128, 919 (1962)
- Popławski: Radial motion into an Einstein–Rosen bridge, Physics Letters B 687, 110 (2010); Bericht bei phys.org

- Hindmarsh, Huber, Rummukainen und Weir: Gravitational waves from the sound of a first order phase transition, Physical Review Letters 112, 041301 (2014); arXiv:1304.2433
- Afzal und Kollegen (NANOGrav): The NANOGrav 15 yr Data Set: Search for Signals from New Physics, Astrophysical Journal Letters 951, L11 (2023)
- García-Cely und Ringwald: Complete Gravitational-Wave Spectrum of the Sun, arXiv:2407.18297 (2024)
- Barkana und Loeb: In the Beginning: The First Sources of Light and the Reionization of the Universe, Physics Reports 349, 125 (2001); arXiv:astro-ph/0010468
- Carniani und Kollegen: JADES-GS-z14-0 bei Rotverschiebung 14,32, Nature 633, 318 (2024); Bildseite ESA/Webb
- Dürr, Nonn und Rempe: Origin of quantum-mechanical complementarity probed by a „which-way“ experiment in an atom interferometer, Nature 395, 33 (1998)
- Walborn, Terra Cunha, Pádua und Monken: Double-slit quantum eraser, Physical Review A 65, 033818 (2002); arXiv:quant-ph/0106078
- Hackermüller, Hornberger, Brezger, Zeilinger und Arndt: Decoherence of matter waves by thermal emission of radiation, Nature 427, 711 (2004); arXiv:quant-ph/0402146
- Hornberger und Kollegen: Collisional decoherence observed in matter wave interferometry, Physical Review Letters 90, 160401 (2003); arXiv:quant-ph/0303093
- Hulet, Hilfer und Kleppner: Inhibited spontaneous emission by a Rydberg atom, Physical Review Letters 55, 2137 (1985)
- Joule: On the changes of temperature produced by the rarefaction and condensation of air, Philosophical Magazine 26, 369 (1845); Manuskript bei der Royal Society
- Ma, Kofler und Zeilinger: Delayed-choice gedanken experiments and their realizations, Reviews of Modern Physics 88, 015005 (2016); arXiv:1407.2930
- Colella, Overhauser und Werner: Observation of Gravitationally Induced Quantum Interference, Physical Review Letters 34, 1472 (1975)
- Tonomura und Kollegen: Evidence for Aharonov-Bohm effect with magnetic field completely shielded from electron wave, Physical Review Letters 56, 792 (1986)

- Musielak und Quarles: The three-body problem (2015); arXiv:1508.02312
- Plateau: Statique expérimentale et théorique des liquides soumis aux seules forces moléculaires (1873); Nachbau nach Boys, Georgia Tech
- Diedrich und Kollegen: Observation of a Phase Transition of Stored Laser-Cooled Ions, Physical Review Letters 59, 2931 (1987)
- Buttinoni, Bialké, Kümmel, Löwen, Bechinger und Speck: Dynamical clustering and phase separation in suspensions of self-propelled colloidal particles, Physical Review Letters 110, 238301 (2013); arXiv:1305.4185
- Lorentz-Lorenz-Beziehung (Lorentz, 1880; Lorenz, 1880), Knowino
- Brechzahlen von Wasser, Alkohol und Olivenöl bei 20 °C und 589 nm, Tabelle in Refractive index (Archiv der University of North Texas)
- Strogatz, Abrams, McRobie, Eckhardt und Ott: Crowd synchrony on the Millennium Bridge, Nature 438, 43 (2005)
- Blümel und Kollegen: Phase transitions of stored laser-cooled ions, Nature 334, 309 (1988)
- Burridge und Linden: Questioning the Mpemba effect: hot water does not cool more quickly than cold, Scientific Reports 6, 37665 (2016)
- Kumar und Bechhoefer: Exponentially faster cooling in a colloidal system, Nature 584, 64 (2020); arXiv:2008.02373
- Lu und Raz: Nonequilibrium thermodynamics of the Markovian Mpemba effect and its inverse, PNAS 114, 5083 (2017)
- Planck-Kollaboration: Planck 2013 results XXVII, Doppler boosting of the CMB: Eppur si muove, Astronomy & Astrophysics 571, A27 (2014)
- Secrest und Kollegen: A Test of the Cosmological Principle with Quasars, Astrophysical Journal Letters 908, L51 (2021); arXiv:2009.14826
- Secrest, von Hausegger, Rameez, Mohayaee und Sarkar: Colloquium: The Cosmic Dipole Anomaly (2025); arXiv:2505.23526
- Ellis und Baldwin: On the expected anisotropy of radio source counts, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 206, 377 (1984)
- Secrest: The Ellis–Baldwin test, Philosophical Transactions of the Royal Society A 383, 20240027 (2025)
- Alnes und Amarzguioui: CMB anisotropies seen by an off-center observer in a spherically symmetric inhomogeneous universe, Physical Review D 74, 103520 (2006); arXiv:astro-ph/0607334

- Davis und Lineweaver: Expanding Confusion: common misconceptions of cosmological horizons and the superluminal expansion of the Universe, Publications of the Astronomical Society of Australia 21, 97 (2004); arXiv:astro-ph/0310808
- Milne-Modell, Übersicht (Wikipedia, Kiwix-Spiegel)
- Watkins und Kollegen: Analyzing the Large-Scale Bulk Flow using CosmicFlows4: Increasing Tension with the Standard Cosmological Model (2023); arXiv:2302.02028
- Wijnands und van der Klis: A millisecond pulsar in an X-ray binary system, Nature 394, 344 (1998); arXiv:astro-ph/9804216
- Archibald und Kollegen: A Radio Pulsar/X-ray Binary Link, Science 324, 1411 (2009); arXiv:0905.3397
- Lorimer und Kollegen: Age constraints in the double pulsar system J0737−3039, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 379, 1217 (2007); arXiv:0705.3269
- Bildsten und Kollegen: Observations of Accreting Pulsars, Astrophysical Journal Supplement 113, 367 (1997); arXiv:astro-ph/9707125
- Illarionov und Sunyaev: Why the Number of Galactic X-ray Stars Is so Small?, Astronomy and Astrophysics 39, 185 (1975)
- Jaodand und Kollegen: Timing Observations of PSR J1023+0038 During a Low-Mass X-ray Binary State, Astrophysical Journal 830, 122 (2016); arXiv:1610.01625
- Chakrabarty und Kollegen: On the Correlation of Torque and Luminosity in GX 1+4, Astrophysical Journal Letters 481, L101 (1997); arXiv:astro-ph/9703047
- Gallo, Fender und Pooley: A universal radio–X-ray correlation in low/hard state black hole binaries, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 344, 60 (2003); arXiv:astro-ph/0305231
- van den Eijnden und Kollegen: Discovery of radio emission from the symbiotic X-ray binary system GX 1+4 (2018); arXiv:1711.01958
- Kell: Density, Thermal Expansivity, and Compressibility of Liquid Water from 0° to 150°C, Journal of Chemical and Engineering Data 20, 97 (1975)
- Strohmayer und Watts: The 2004 Hyperflare from SGR 1806-20: Further Evidence for Global Torsional Vibrations, Astrophysical Journal 653, 593 (2006); arXiv:astro-ph/0608463
- Anderson und Itoh: Pulsar glitches and restlessness as a hard superfluidity phenomenon, Nature 256, 25 (1975)

- Zel’dovich und Novikov: Relativistic Astrophysics, Band 1: Stars and Relativity, University of Chicago Press (1971)
- Herdeiro und Lemos: The black hole fifty years after: Genesis of the name (2018); arXiv:1811.06587
- PHENIX-Kollaboration (Adcox und Kollegen): Formation of dense partonic matter in relativistic nucleus–nucleus collisions at RHIC, Nuclear Physics A 757, 184 (2005); dazu die Mitteilung des Lawrence Berkeley Laboratory
- Jastrow: On the Nucleon-Nucleon Interaction, Physical Review 81, 165 (1951)
- Ampère: Mémoire sur l’action mutuelle de deux courants électriques, Annales de Chimie et de Physique 15, 59 (1820)
- Jeltes und Kollegen: Comparison of the Hanbury Brown–Twiss effect for bosons and fermions, Nature 445, 402 (2007); arXiv:cond-mat/0612278
- Dürr, Heisenberg, Mitter, Schlieder und Yamazaki: Zur Theorie der Elementarteilchen, Zeitschrift für Naturforschung A 14, 441 (1959)
- Rutherford: The Scattering of α and β Particles by Matter and the Structure of the Atom, Philosophical Magazine 21, 669 (1911)
- Hofstadter: Electron Scattering and Nuclear Structure, Reviews of Modern Physics 28, 214 (1956)
- Mutschler und Kollegen: A proton density bubble in the doubly magic ^{34}Si nucleus, Nature Physics 13, 152 (2017); arXiv:1707.03583
- Landau: On the theory of stars, Physikalische Zeitschrift der Sowjetunion 1, 285 (1932)
- Yakovlev, Haensel, Baym und Pethick: Lev Landau and the conception of neutron stars, Physics-Uspekhi 56, 289 (2013); arXiv:1210.0682
- Baade und Zwicky: Supernovae and Cosmic Rays, Physical Review 45, 138 (1934)
- Ahn und Kollegen: Location of the Neutron Dripline at Fluorine and Neon, Physical Review Letters 123, 212501 (2019)
- Particle Data Group: Review of Particle Physics, Physical Review D 110, 030001 (2024)
- Matsui und Satz: J/ψ suppression by quark-gluon plasma formation, Physics Letters B 178, 416 (1986)

- CMS-Kollaboration: Observation of sequential Upsilon suppression in PbPb collisions, Physical Review Letters 109, 222301 (2012); arXiv:1208.2826
- HotQCD-Kollaboration (Bazavov und Kollegen): Chiral crossover in QCD at zero and non-zero chemical potentials, Physics Letters B 795, 15 (2019)
- PHENIX-Kollaboration (Adare und Kollegen): Scaling properties of azimuthal anisotropy in Au+Au and Cu+Cu collisions, Physical Review Letters 98, 162301 (2007); arXiv:nucl-ex/0608033
- Lee, Wei, Kysar und Hone: Measurement of the Elastic Properties and Intrinsic Strength of Monolayer Graphene, Science 321, 385 (2008)
- Banerjee und Kollegen: Ultralarge elastic deformation of nanoscale diamond, Science 360, 300 (2018)
- STAR-Kollaboration: Global Λ hyperon polarization in nuclear collisions: evidence for the most vortical fluid, Nature 548, 62 (2017); arXiv:1701.06657
- Helmholtz: Über discontinuirliche Flüssigkeits-Bewegungen, Monatsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 23, 215 (1868)
- Strogatz: Nonlinear Dynamics and Chaos, Addison-Wesley (1994)
- Pauli: Über den Zusammenhang des Abschlusses der Elektronengruppen im Atom mit der Komplexstruktur der Spektren, Zeitschrift für Physik 31, 765 (1925)
- Gerlach und Stern: Der experimentelle Nachweis der Richtungsquantelung im Magnetfeld, Zeitschrift für Physik 9, 349 (1922)
- Uhlenbeck und Goudsmit: Ersetzung der Hypothese vom unmechanischen Zwang durch eine Forderung bezüglich des inneren Verhaltens jedes einzelnen Elektrons, Die Naturwissenschaften 13, 953 (1925)
- Saadeh, Feeney, Pontzen, Peiris und McEwen: How Isotropic is the Universe?, Physical Review Letters 117, 131302 (2016); arXiv:1605.07178
- Milne: Relativity, Gravitation and World-Structure, Clarendon Press, Oxford (1935)
- Thorstensen, Fesen und van den Bergh: The Expansion Center and Dynamical Age of the Galactic Supernova Remnant Cassiopeia A, Astronomical Journal 122, 297 (2001); arXiv:astro-ph/0104188
- Avelino und Kirshner: The dimensionless age of the Universe: a riddle for our time, Astrophysical Journal 828, 35 (2016); arXiv:1607.00002

- Riess und Kollegen: Type Ia Supernova Discoveries at z > 1 From the Hubble Space Telescope: Evidence for Past Deceleration and Constraints on Dark Energy Evolution, Astrophysical Journal 607, 665 (2004); arXiv:astro-ph/0402512
- Shafer: Robust model comparison disfavors power law cosmology, Physical Review D 91, 103516 (2015); arXiv:1502.05416
- Riess und Kollegen: Observational Evidence from Supernovae for an Accelerating Universe and a Cosmological Constant, Astronomical Journal 116, 1009 (1998)
- Perlmutter und Kollegen: Measurements of Ω and Λ from 42 High-Redshift Supernovae, Astrophysical Journal 517, 565 (1999)
- Taylor: The formation of a blast wave by a very intense explosion, Proceedings of the Royal Society A 201, 159 (1950)
- Sedov: Similarity and Dimensional Methods in Mechanics, Academic Press, New York (1959)
- Cameron und Truran: The supernova trigger for formation of the solar system, Icarus 30, 447 (1977)
- Madau und Dickinson: Cosmic Star-Formation History, Annual Review of Astronomy and Astrophysics 52, 415 (2014); arXiv:1403.0007
- Fukugita und Peebles: The Cosmic Energy Inventory, Astrophysical Journal 616, 643 (2004); arXiv:astro-ph/0406095
- Mirabal, Gallart, Ruiz-Lara, Fernández-Alvar, Queiroz und Kollegen: A Two-stage Settling of the Milky Way Disk Revealed by Precise ChronoGal Ages, Astrophysical Journal Letters (2026); doi:10.3847/2041-8213/aeb0a3; arXiv:2610.03164; dazu der Bericht bei Universe Today
- Bergin und Tafalla: Cold Dark Clouds: The Initial Conditions for Star Formation, Annual Review of Astronomy and Astrophysics 45, 339 (2007)
- Fukui und Kollegen: Cloud-cloud collisions and triggered star formation, Publications of the Astronomical Society of Japan 73, S1 (2021)
- Yamada und Kollegen: A Kinematic Analysis of the Giant Molecular Complex W3 (2021); arXiv:2106.02217
- Elmegreen und Lada: Sequential formation of subgroups in OB associations, Astrophysical Journal 214, 725 (1977)
- Maiolino und Kollegen: Star formation inside a galactic outflow, Nature 544, 202 (2017); dazu die Mitteilung der ESO

- Boss, Keiser, Ipatov, Myhill und Vanhala: Triggering collapse of the presolar dense cloud core and injecting short-lived radioisotopes with a shock wave. I. Varied shock speeds, Astrophysical Journal 708, 1268 (2010); arXiv:0911.3417

- Fischer, Bastian, Wu und Kollegen: Quark deconfinement as a supernova explosion engine for massive blue supergiant stars, Nature Astronomy (2018); doi:10.1038/s41550-018-0583-0; arXiv:1712.08788

- Annala, Gorda, Kurkela, Nättilä und Vuorinen: Evidence for quark-matter cores in massive neutron stars, Nature Physics 16, 907 (2020); arXiv:1903.09121

- Mirabel und Rodríguez: A superluminal source in the Galaxy, Nature 371, 46 (1994); dazu die Mitteilung des NRAO

- Heisenberg: Über den Bau der Atomkerne. I, Zeitschrift für Physik 77, 1 (1932)

- Dorau und Much: From Quantum Relative Entropy to the Semiclassical Einstein Equations, Physical Review Letters (2026); doi:10.1103/lmq8-nsty; arXiv:2510.24491

- Vedral: The role of relative entropy in quantum information theory, Reviews of Modern Physics 74, 197 (2002)

- Einstein: Äther und Relativitätstheorie, Rede an der Reichsuniversität zu Leiden am 5. Mai 1920, Springer, Berlin (1920); englische Übersetzung bei MacTutor

- Volovik: The Universe in a Helium Droplet, Oxford University Press (2003)

- FitzGerald: The Ether and the Earth’s Atmosphere, Science 13, 390 (1889)

- Lorentz: Versuch einer Theorie der electrischen und optischen Erscheinungen in bewegten Körpern, Brill, Leiden (1895)

- Brown: The origins of length contraction: I. The FitzGerald–Lorentz deformation hypothesis, American Journal of Physics 69, 1044 (2001); arXiv:gr-qc/0104032

- LHAASO-Kollaboration (Cao und Kollegen): Stringent Tests of Lorentz Invariance Violation from LHAASO Observations of GRB 221009A, Physical Review Letters 133, 071501 (2024); arXiv:2402.06009

- McComas und Kollegen: The Heliosphere’s Interstellar Interaction: No Bow Shock, Science 336, 1291 (2012); dazu die Mitteilung des SwRI

- McComas und Kollegen: Local Interstellar Medium: Six Years of Direct Sampling by IBEX, Astrophysical Journal Supplement Series 220, 22 (2015)
- Poggio und Kollegen: Evidence of a dynamically evolving Galactic warp, Nature Astronomy 4, 590 (2020)
- Gurnett, Kurth, Burlaga und Ness: In Situ Observations of Interstellar Plasma With Voyager 1, Science 341, 1489 (2013)
- Gladstone und Dale: Researches on the refraction, dispersion, and sensitiveness of liquids, Philosophical Transactions of the Royal Society 153, 317 (1863)
- Yablonovitch: Inhibited Spontaneous Emission in Solid-State Physics and Electronics, Physical Review Letters 58, 2059 (1987)
- Wiersma, Bartolini, Lagendijk und Righini: Localization of light in a disordered medium, Nature 390, 671 (1997)
- Eisenstein und Kollegen: Detection of the Baryon Acoustic Peak in the Large-Scale Correlation Function of SDSS Luminous Red Galaxies, Astrophysical Journal 633, 560 (2005)
- Haque und Underwood: A Landscape of Cosmological Decoherence (2026); arXiv:2606.07663
- Ireland: Expanding Our Horizons: Rethinking Gravity’s Role in the Quantum-to-Classical Transition (2026); arXiv:2604.01283
- Milonni, Cook und Goggin: Radiation pressure from the vacuum: Physical interpretation of the Casimir force, Physical Review A 38, 1621 (1988)
- Chodos, Jaffe, Johnson, Thorn und Weisskopf: New extended model of hadrons, Physical Review D 9, 3471 (1974)
- Bjerknes: Fields of Force, Columbia University Press (1906)
- Oppenheimer und Volkoff: On Massive Neutron Cores, Physical Review 55, 374 (1939)
- Purcell: Electricity and Magnetism, Berkeley Physics Course, Band 2, McGraw-Hill (1965)
- Chen und Kollegen: Discovery and Dynamics of a Sedna-like Object with a Perihelion of 66 au (2023 KQ14), Nature Astronomy 9, 1309 (2025)
- Bancal und Kollegen: Quantum Non-locality Based on Finite-speed Causal Influences Leads to Superluminal Signalling, Nature Physics 8, 867 (2012); arXiv:1110.3795

- Alvarez: Nuclear K Electron Capture, Physical Review 52, 134 (1937)
- Wang und Kollegen: Change of the ^{7}Be electron capture half-life in metallic environments, European Physical Journal A 28, 375 (2006)
- Larmor: On a Dynamical Theory of the Electric and Luminiferous Medium, Part III, Philosophical Transactions of the Royal Society A 190, 205 (1897)
- Schrödinger: Quantisierung als Eigenwertproblem (Erste Mitteilung), Annalen der Physik 79, 361 (1926)
- Wikipedia: Electron capture
- Bailey und Kollegen: Measurements of relativistic time dilatation for positive and negative muons in a circular orbit, Nature 268, 301 (1977)
- Botermann und Kollegen: Test of Time Dilation Using Stored Li^+ Ions as Clocks at Relativistic Speed, Physical Review Letters 113, 120405 (2014); arXiv:1409.7951
- Fixsen: The Temperature of the Cosmic Microwave Background, The Astrophysical Journal 707, 916 (2009); arXiv:0911.1955
- Planck 2018, Zusammenstellung der Parameter (Rotverschiebung 1089,80 ± 0,21, Alter 13,787 ± 0,020 Milliarden Jahre)
- Smith und Owocki: On the role of continuum-driven eruptions in the evolution of very massive stars and Population III stars, The Astrophysical Journal 645, L45 (2006); arXiv:astro-ph/0606174
- Bachetti und Kollegen: An ultraluminous X-ray source powered by an accreting neutron star, Nature 514, 202 (2014); Bericht des MIT
- Xing und Kollegen: A metal-poor star with abundances from a pair-instability supernova, Nature 618, 712 (2023)
- Skúladóttir und Kollegen: On the Pair-instability Supernova Origin of J1010+2358, The Astrophysical Journal Letters (2024); arXiv:2404.19086
- Chworowsky und Kollegen: Evidence for a Shallow Evolution in the Volume Densities of Massive Galaxies at z = 4 to 8 from CEERS, The Astronomical Journal (2024); arXiv:2311.14804
- Maeder und Meynet: Stellar evolution with rotation VI: The Eddington and Omega-limits, the rotational mass loss for OB and LBV stars, Astronomy and Astrophysics 361, 159 (2000); arXiv:astro-ph/0006405
- Monnier und Kollegen: Imaging the Surface of Altair, Science 317, 342 (2007)

- Lasota und King: Ultraluminous X-ray sources are beamed (2023); arXiv:2309.00034
- Bychkov, Bychkova und Madej: Periods of magnetic field variations in the Ap star γ Equulei (HD 201601), Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 455, 2567 (2016);
- Crowther: R136a1 FAQ, Eddington-Leuchtkraft der schwersten Sterne (zu Crowther und Kollegen, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 408, 731, 2010)
- Comella, Craft, Lovelace, Sutton und Tyler: Crab Nebula Pulsar NP 0532, Nature 221, 453 (1969)
- Domiciano de Souza und Kollegen: The spinning-top Be star Achernar from VLTI-VINCI, Astronomy and Astrophysics 407, L47 (2003); Pressemitteilung der ESO
- Domiciano de Souza und Kollegen: The environment of the fast rotating star Achernar. III. Photospheric parameters revealed by the VLTI, Astronomy and Astrophysics 569, A10 (2014)
- De Luca und Kollegen: A long-period, violently variable X-ray source in a young supernova remnant, Science 313, 814 (2006)
- Li: The Nature of the X-ray Source in SNR RCW 103 (2007); arXiv:0708.0060
- Chen, Ho, Li und Zhuang: The Host Galaxy (If Any) of the Little Red Dots, Astrophysical Journal 983, 60 (2025); arXiv:2411.04446
- Zhang und Kollegen: Extended Components of Little Red Dots in the Rest-Frame Optical, Nature Astronomy (2026); arXiv:2510.25830
- Juodžbalis und Kollegen: A direct black hole mass measurement in a Little Red Dot at the Epoch of Reionization (2025); arXiv:2508.21748
- Lin, Fan, Cai und Kollegen: The Discovery of Little Red Dots in the Local Universe: Signatures of Cool Gas Envelopes (2025); arXiv:2507.10659
- Ji und Kollegen: Lord of LRDs: Insights into a »Little Red Dot« with a low-ionization spectrum at z = 0.1 (2025); arXiv:2507.23774
- Inayoshi: Little Red Dots as the Very First Activity of Black Hole Growth (2025); arXiv:2503.05537
- Inayoshi und Ho: A Critical Evaluation of the Physical Nature of the Little Red Dots (2025); arXiv:2512.03130

- Taylor und Kollegen: CAPERS-LRD-z9: A Gas-enshrouded Little Red Dot Hosting a Broad-line Active Galactic Nucleus at z = 9.288, Astrophysical Journal Letters 989, L7 (2025)
- Bertotti, Iess und Tortora: A test of general relativity using radio links with the Cassini spacecraft, Nature 425, 374 (2003)
- Visser: The Kerr spacetime: A brief introduction (2007); arXiv:0706.0622
- University of Waterloo, Applied Mathematics: Internal gravity waves (AMATH 463)
- American Meteorological Society: Internal gravity wave, Glossary of Meteorology
- Coddington, Engels, Schweikhard und Cornell: Observation of Tkachenko Oscillations in Rapidly Rotating Bose-Einstein Condensates, Physical Review Letters 91, 100402 (2003)
- LIGO- und Virgo-Kollaborationen und Kollegen: A gravitational-wave standard siren measurement of the Hubble constant, Nature 551, 85 (2017)
- ATLAS Collaboration: Evidence for light-by-light scattering in heavy-ion collisions with the ATLAS detector at the LHC, Nature Physics 13, 852 (2017); arXiv:1702.01625
- Yu (University of California, Irvine): Circulation, Vorlesung ESS 228, mit dem Zirkulationssatz von Bjerknes (1898)
- Min und Kang: Isotope Effects and the Negative Thermal Expansion Phenomena in Ice and Water, arXiv:2512.23247 (2025)
- Noterdaeme, Petitjean, Srianand, Ledoux und López: The evolution of the cosmic microwave background temperature, Astronomy & Astrophysics 526, L7 (2011); arXiv:1012.3164
- Gharib, Rambod und Shariff: A universal time scale for vortex ring formation, Journal of Fluid Mechanics 360, 121 (1998)
- Kwon, Kim, Seo und Shin: Observation of von Kármán Vortex Street in an Atomic Superfluid Gas, Physical Review Letters 117, 245301 (2016); arXiv:1608.02762
- Leopold-Gruppe, University of Minnesota: Supersonic Expansion
- STAR-Kollaboration: Measurement of e^+e^- Momentum and Angular Distributions from Linearly Polarized Photon Collisions, Physical Review Letters 127, 052302 (2021); arXiv:1910.12400

- PrimEx-II-Kollaboration (Larin und Kollegen): Precision measurement of the neutral pion lifetime, Science 368, 506 (2020)
- Super-Kamiokande-Kollaboration: Search for proton decay via $p \to e^+\pi^0$ and $p \to \mu^+\pi^0$ with an enlarged fiducial volume in Super-Kamiokande I-IV, Physical Review D 102, 112011 (2020); arXiv:2010.16098
- Rayfield und Reif: Quantized Vortex Rings in Superfluid Helium, Physical Review 136, A1194 (1964)
- Wikipedia: Beryllium-8
- ESA: SOHO observation of the geocorona (Baliukin und Kollegen, 2019)
- Wikipedia: Atmospheric refraction
- Vessot: Test of Relativistic Gravitation with a Space-Borne Hydrogen Maser, Physical Review Letters 45, 2081 (1980)
- Ibison: An Investigation of the Polarizable Vacuum Cosmology (2003); arXiv:astro-ph/0302273
- Ashby, Heavner, Jefferts, Parker, Radnaev und Dudin: Testing Local Position Invariance with Four Cesium-Fountain Primary Frequency Standards and Four NIST Hydrogen Masers, Physical Review Letters 98, 070802 (2007)
- Joyce, Barstow, Holberg, Bond, Casewell und Burleigh: The gravitational redshift of Sirius B, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 481, 2361 (2018); arXiv:1809.01240
- Theuns (Durham): Vorlesung Galaxien, Thermal bremsstrahlung (2003)
- Elder, Gurewitsch, Langmuir und Pollock: Radiation from Electrons in a Synchrotron, Physical Review 71, 829 (1947); Geschichte bei der IUCr
- Chadwick: Possible Existence of a Neutron, Nature 129, 312 (1932)
- Wikipedia: Preon (Begriff von Pati und Salam, 1974)
- NANOGrav-Kollaboration (Agazie und Kollegen): The NANOGrav 15 yr Data Set: Evidence for a Gravitational-wave Background, Astrophysical Journal Letters 951, L8 (2023); arXiv:2306.16213
- Event Horizon Telescope Collaboration: First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. VI. Testing the Black Hole Metric, Astrophysical Journal Letters 930, L17 (2022)

- Taylor: Formation of thin flat sheets of water, Proceedings of the Royal Society A 259, 1 (1960)
- Lighthill: On Sound Generated Aerodynamically. I. General Theory, Proceedings of the Royal Society A 211, 564 (1952)
- Bland-Hawthorn, Maloney, Sutherland und Kollegen: The Large-scale Ionization Cones in the Galaxy, The Astrophysical Journal 886, 45 (2019); arXiv:1910.02225
- Daly, Donahue, O'Dea, Sebastian, Haggard und Lu: New Black Hole Spin Values for Sagittarius A* Obtained with the Outflow Method, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2024); arXiv:2310.12108
- Lorimer: Binary and Millisecond Pulsars, Living Reviews in Relativity 8, 7 (2005); arXiv:astro-ph/0511258
- Singh, Müller, Biskupek, Hackmann und Lämmerzahl: Equivalence of Active and Passive Gravitational Mass Tested with Lunar Laser Ranging, Physical Review Letters 131, 021401 (2023); arXiv:2212.09407
- Czekala: Astro 542, Vorlesung 27, Fluids and Shocks (isotherme Stoßfront, Verdichtung um das Quadrat der Mach-Zahl)
- Lee, Adelberger, Cook, Fleischer und Heckel: New Test of the Gravitational $1/r^2$ Law at Separations down to 52 µm, Physical Review Letters 124, 101101 (2020); arXiv:2002.11761
- Kelvin (William Thomson): On the Division of Space with Minimum Partitional Area, Philosophical Magazine 24, 503 (1887)
- Weaire und Phelan: A counter-example to Kelvin's conjecture on minimal surfaces, Philosophical Magazine Letters 69, 107 (1994)
- Ostriker und Cowie: Galaxy Formation in an Intergalactic Medium Dominated by Explosions, Astrophysical Journal 243, L127 (1981)
- Lanoy, Derec, Tourin und Leroy: Manipulating bubbles with secondary Bjerknes forces (2015); arXiv:1510.06866
- Monier, Claudet, Brouzet, Celestini und Raufaste: Soap film spinning, APS Division of Fluid Dynamics, Gallery of Fluid Motion V0064 (2023)
- Monier, Gutierrez, Claudet, Celestini, Brouzet und Raufaste: Soap film drainage using a centrifugal thin film balance, Soft Matter (2026); arXiv:2511.08194
- Wikipedia: Bjerknes force
- Szczykulska, Watson, Garratt-Smithson und Muir: Greatest Gravity, Physics Special Topics 12 (2013)

- Christensen-Dalsgaard: Helioseismology, Reviews of Modern Physics 74, 1073 (2002); arXiv:astro-ph/0207403
- Sommerfeld: Zur Quantentheorie der Spektrallinien, Annalen der Physik 51, 1 (1916)
- Kholodenko: How the Modified Bertrand Theorem Explains Regularities and Anomalies of the Periodic Table of Elements (2020); arXiv:2002.12128
- Kramers: On the theory of X-ray absorption and of the continuous X-ray spectrum, Philosophical Magazine 46, 836 (1923); Kramers' opacity law, Wikipedia
- Hatsugai, Kohmoto, Koma und Wu: Mutual Exclusion Statistics in Exactly Solvable Models in One and Higher Dimensions at Low Temperatures (1995); arXiv:cond-mat/9504112
- LHCb-Kollaboration: Evidence for the decay $B^0 \to \mu^+\mu^-$ and improved measurements of the decay $B^0_s \to \mu^+\mu^-$, CERN-EP-2026-287, eingereicht bei Physical Review X (2026); arXiv:2611.00230
- Lenz: CERN klopft mit seltenem Zerfall nach 42 Jahren ans Tor zum Zeptoversum, Forschung und Wissen (5. November 2026)
- Boonserm, Ngampitipan, Simpson und Visser: The exponential metric represents a traversable wormhole (2018); arXiv:1805.03781
- Hessels und Kollegen: A Radio Pulsar Spinning at 716 Hz, Science 311, 1901 (2006); arXiv:astro-ph/0601337
- Çıkıntoğlu und Ekşi: On the minimum spin period of accreting pulsars (2023); arXiv:2302.10649
- Badro, Fiquet, Guyot, Rueff, Struzhkin, Vankó und Monaco: Iron partitioning in Earth's mantle: toward a deep lower mantle discontinuity, Science 300, 789 (2003)
- Holmström und Stixrude: Spin crossover in ferropericlase from first-principles molecular dynamics (2015); arXiv:1501.02902
- Hänsch und Schawlow: Cooling of gases by laser radiation, Optics Communications 13, 68 (1975)
- Beth: Mechanical Detection and Measurement of the Angular Momentum of Light, Physical Review 50, 115 (1936)
- Wikipedia: Doppler cooling
- Abo-Shaeer, Raman, Vogels und Ketterle: Observation of Vortex Lattices in Bose-Einstein Condensates, Science 292, 476 (2001); doi:10.1126/science.1060182

- Feynman: Application of Quantum Mechanics to Liquid Helium, Progress in Low Temperature Physics 1, 17 (1955)
- Balick und Brown: Intense sub-arcsecond structure in the galactic center, Astrophysical Journal 194, 265 (1974)
- Shakura und Sunyaev: Black holes in binary systems. Observational appearance, Astronomy and Astrophysics 24, 337 (1973)
- Pan, Vogeley, Hoyle, Choi und Park: Cosmic voids in Sloan Digital Sky Survey Data Release 7, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 421, 926 (2012); arXiv:1103.4156
- UC Davis, ATM 121: Atmospheric Dynamics, Kapitel 3, Balanced Flow (zyklostrophisches Gleichgewicht)
- Wikipedia: Plate trick (Tellertrick nach Dirac)
- Wikipedia: Bjerknes force
- Garrett: Understanding Acoustics, Kapitel 12, Radiation and Scattering, Springer (2020)
- Keller: Planets 2009, Übung 3 zur Jeans-Masse, Universität Leiden
- UCSD Physics 130A: The Bohr Atom
- Event Horizon Telescope: First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results VI, Testing the Black Hole Metric (2022)
- Abbott und Kollegen (LIGO, Virgo und KAGRA): Population of Merging Compact Binaries Inferred Using Gravitational Waves through GWTC-3, Physical Review X 13, 011048 (2023)
- Dicke: Gravitation without a Principle of Equivalence, Reviews of Modern Physics 29, 363 (1957)
- Puthoff: Polarizable-Vacuum (PV) Approach to General Relativity, Foundations of Physics 32, 927 (2002); arXiv:gr-qc/9909037
- Eddington: The Internal Constitution of the Stars (1926)
- Hoyle und Fowler: On the Nature of Strong Radio Sources, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 125, 169 (1963)
- Heisler und Tremaine: The Influence of the Galactic Tidal Field on the Oort Comet Cloud, Icarus 65, 13 (1986)
- Mittal und Kumar: Flow past a Rotating Cylinder, Journal of Fluid Mechanics 476, 303 (2003)
- Pfalzner und Kollegen: Trans-Neptunian Objects as Evidence for a Specific Stellar Flyby, Nature Astronomy (2024)

- Grotti und Kollegen: Geodesy and Metrology with a Transportable Optical Clock, Nature Physics (2018), doi:10.1038/s41567-017-0042-3
- Planck Collaboration: Planck 2018 Results VI, Cosmological Parameters, Astronomy & Astrophysics 641, A6 (2020)
- Jeans: The Stability of a Spherical Nebula, Philosophical Transactions of the Royal Society A 199, 1 (1902)
- Sciama: On the Origin of Inertia, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 113, 34 (1953)
- Hofmann und Müller: Relativistic Tests with Lunar Laser Ranging, Classical and Quantum Gravity 35, 035015 (2018)
- McGuyer, Xia und Happer: Hyperfine Frequencies of 87Rb and 133Cs Atoms in Xe Gas, Physical Review A 84, 030501 (2011); arXiv:1302.4162
- Casimir: On the Attraction between Two Perfectly Conducting Plates, Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 51, 793 (1948)
- Weinberg: The Cosmological Constant Problem, Reviews of Modern Physics 61, 1 (1989)
- Lamoreaux: Demonstration of the Casimir Force in the 0.6 to 6 μm Range, Physical Review Letters 78, 5 (1997)
- Jaffe: The Casimir Effect and the Quantum Vacuum, Physical Review D 72, 021301 (2005); arXiv:hep-th/0503158
- Polchinski: The Cosmological Constant and the String Landscape (2006); arXiv:hep-th/0603249
- Kaloper und Padilla: Sequestering the Standard Model Vacuum Energy, Physical Review Letters 112, 091304 (2014)
- Wheeler: Geons, Physical Review 97, 511 (1955)
- Brill und Hartle: Method of the Self-Consistent Field in General Relativity and Its Application to the Gravitational Geon, Physical Review 135, B271 (1964)
- Isaacson: Gravitational Radiation in the Limit of High Frequency II, Physical Review 166, 1272 (1968)
- Abbott und Kollegen (LIGO und Virgo): Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger, Physical Review Letters 116, 061102 (2016)

- Abbott und Kollegen (LIGO und Virgo): GW170814, a Three-Detector Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Coalescence, Physical Review Letters 119, 141101 (2017)
- Gossan und Kollegen: Observing Gravitational Waves from Core-Collapse Supernovae in the Advanced Detector Era, Physical Review D 93, 042002 (2016); arXiv:1511.02836
- BICEP/Keck: Improved Constraints on Primordial Gravitational Waves Using Planck, WMAP, and BICEP/Keck Observations through the 2018 Observing Season, Physical Review Letters 127, 151301 (2021)
- Bekenstein: Black Holes and Entropy, Physical Review D 7, 2333 (1973)
- Thorne, Price und Macdonald: Black Holes, The Membrane Paradigm, Yale University Press (1986)
- Mazur und Mottola: Gravitational Vacuum Condensate Stars, Proceedings of the National Academy of Sciences 101, 9545 (2004); arXiv:gr-qc/0109035
- Kovtun, Son und Starinets: Viscosity in Strongly Interacting Quantum Field Theories from Black Hole Physics, Physical Review Letters 94, 111601 (2005)
- Abedi, Dykaar und Afshordi: Echoes from the Abyss, Physical Review D 96, 082004 (2017)
- Landauer: Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process, IBM Journal of Research and Development 5, 183 (1961)
- Bérut und Kollegen: Experimental Verification of Landauer's Principle Linking Information and Thermodynamics, Nature 483, 187 (2012)
- Egan und Lineweaver: A Larger Estimate of the Entropy of the Universe, The Astrophysical Journal 710, 1825 (2010)
- 't Hooft: Dimensional Reduction in Quantum Gravity (1993); arXiv:gr-qc/9310026
- Hawking: Breakdown of Predictability in Gravitational Collapse, Physical Review D 14, 2460 (1976)
- Page: Information in Black Hole Radiation, Physical Review Letters 71, 3743 (1993)
- Rauch und Kollegen: Verification of Coherent Spinor Rotation of Fermions, Physics Letters A 54, 425 (1975)

- Werner und Kollegen: Observation of the Phase Shift of a Neutron Due to Precession in a Magnetic Field, Physical Review Letters 35, 1053 (1975)
- Williamson und van der Mark: Is the Electron a Photon with Toroidal Topology?, Annales de la Fondation Louis de Broglie 22, 133 (1997)
- Shannon: A Mathematical Theory of Communication, Bell System Technical Journal 27, 379 (1948)
- Wetterich: A Universe without Expansion, Physics of the Dark Universe 2, 184 (2013); arXiv:1303.6878
- Hoyle und Narlikar: A New Theory of Gravitation, Proceedings of the Royal Society A 294, 138 (1966)
- Narlikar und Arp: Flat Spacetime Cosmology, The Astrophysical Journal 405, 51 (1993)
- Carr und Kollegen: Supernovae Driven Winds Impede Lyman Continuum Escape from Dwarf Galaxies in First 10 Myr (2025); arXiv:2510.21197
- Bekenstein: Universal Upper Bound on the Entropy-to-Energy Ratio for Bounded Systems, Physical Review D 23, 287 (1981)
- Hawking: Information Loss in Black Holes, Physical Review D 72, 084013 (2005)
- Lin und Shu: On the Spiral Structure of Disk Galaxies, The Astrophysical Journal 140, 646 (1964)
- Montgomery und Kallenbach: A Theory for Vortex Rossby-Waves and Its Application to Spiral Bands and Intensity Changes in Hurricanes, Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society 123, 435 (1997)
- Sánchez Almeida, Montes und Trujillo: Super-Massive Black Hole Wake or Bulgeless Edge-on Galaxy?, Astronomy & Astrophysics (2023); arXiv:2304.12344
- Seigar und Kollegen: Discovery of a Relationship between Spiral Arm Morphology and Supermassive Black Hole Mass in Disk Galaxies, The Astrophysical Journal 678, L93 (2008)
- Davis, Graham und Seigar: Updating the (Supermassive Black Hole Mass)–(Spiral Arm Pitch Angle) Relation, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 471, 2187 (2017); arXiv:1707.04001
- Su, Slatyer und Finkbeiner: Giant Gamma-ray Bubbles from Fermi-LAT, The Astrophysical Journal 724, 1044 (2010)

- Predehl und Kollegen: Detection of Large-Scale X-ray Bubbles in the Milky Way Halo, Nature 588, 227 (2020)
- Poggio und Kollegen: Evidence of a Dynamically Evolving Galactic Warp, Nature Astronomy 4, 590 (2020)
- Chandrasekhar: Dynamical Friction I, The Astrophysical Journal 97, 255 (1943)
- Dürr und Kollegen: Ab Initio Determination of Light Hadron Masses, Science 322, 1224 (2008)
- Zel’dovich: The Equation of State at Ultrahigh Densities and Its Relativistic Limitations, Soviet Physics JETP 14, 1143 (1962)
- Green: On the Laws of the Reflexion and Refraction of Light at the Common Surface of Two Non-Crystallized Media, Transactions of the Cambridge Philosophical Society 7, 1 (1838)
- Kullback und Leibler: On Information and Sufficiency, Annals of Mathematical Statistics 22, 79 (1951)
- Esposito und Van den Broeck: Second Law and Landauer Principle Far from Equilibrium, Europhysics Letters 95, 40004 (2011)
- Maxwell: A Treatise on Electricity and Magnetism (1873)

Die Angaben der letzten Liste stammen aus Claudes Gedächtnis und sind vor einer Einreichung im Original zu prüfen.

Neu am 10. November 2026 (DOIs über Crossref geprüft):

- Helmholtz: Über Integrale der hydrodynamischen Gleichungen, welche den Wirbelbewegungen entsprechen, Journal für die reine und angewandte Mathematik 55, 25 (1858); doi:10.1515/crll.1858.55.25
- Thomson (Kelvin): On Vortex Motion, Transactions of the Royal Society of Edinburgh 25, 217 (1868); doi:10.1017/S0080456800028179
- Bewley, Paoletti, Sreenivasan und Lathrop: Characterization of Reconnecting Vortices in Superfluid Helium, PNAS 105, 13707 (2008); doi:10.1073/pnas.0806002105
- MoEDAL: Search for Magnetic Monopoles with the MoEDAL Prototype Trapping Detector, JHEP 08, 067 (2016); doi:10.1007/JHEP08(2016)067
- MoEDAL: Search for Magnetic Monopoles Produced via the Schwinger Mechanism, Nature 602, 63 (2022); doi:10.1038/s41586-021-04298-1
- Gerlach und Stern: Der experimentelle Nachweis der Richtungsquantelung im Magnetfeld, Zeitschrift für Physik 9, 349 (1922); doi:10.1007/BF01326983

- Fan, Myers, Sukra und Gabrielse: Measurement of the Electron Magnetic Moment, Physical Review Letters 130, 071801 (2023); doi:10.1103/PhysRevLett.130.071801
- Kramida, Ralchenko, Reader und NIST ASD Team: NIST Atomic Spectra Database, Ionization Energies; doi:10.18434/T4W30F
- Strutt: On the Light from the Sky, Its Polarization and Colour, Philosophical Magazine 41, 107 (1871); doi:10.1080/14786447108640452
- Strutt: On the Transmission of Light through an Atmosphere Containing Small Particles in Suspension, and on the Origin of the Blue of the Sky, Philosophical Magazine 47, 375 (1899); doi:10.1080/14786449908621276
- Gehrels: Wavelength Dependence of the Polarization of the Sunlit Sky, Journal of the Optical Society of America 52, 1164 (1962); doi:10.1364/JOSA.52.001164
- Aghakhanloo und Kollegen: AT 2016blu: Accretion-powered Outbursts in a Luminous Blue Variable and Compact Object Binary, The Astrophysical Journal 1011, 252 (2026); doi:10.3847/1538-4357/ae9a86
- Israel und Kollegen: An Accreting Pulsar with Extreme Properties Drives an Ultraluminous X-ray Source, Science 355, 817 (2017); doi:10.1126/science.aai8635
- Harris und Kollegen: The Outburst of HST-1 in the M87 Jet, The Astrophysical Journal 640, 211 (2006); doi:10.1086/500081
- McHardy und Kollegen: Active Galactic Nuclei as Scaled-up Galactic Black Holes, Nature 444, 730 (2006); doi:10.1038/nature05389
- Tully und Kollegen: Our Peculiar Motion Away from the Local Void, The Astrophysical Journal 676, 184 (2008); doi:10.1086/527428
- Tempel und Libeskind: Galaxy Spin Alignment in Filaments and Sheets: Observational Evidence, The Astrophysical Journal Letters 775, L42 (2013); doi:10.1088/2041-8205/775/2/L42
- Chandrasekhar: The Maximum Mass of Ideal White Dwarfs, The Astrophysical Journal 74, 81 (1931); doi:10.1086/143324
- Oppenheimer und Volkoff: On Massive Neutron Cores, Physical Review 55, 374 (1939); doi:10.1103/PhysRev.55.374
- Fonseca und Kollegen: Refined Mass and Geometric Measurements of the High-mass PSR J0740+6620, The Astrophysical Journal Letters 915, L12 (2021); doi:10.3847/2041-8213/ac03b8
- LIGO und Virgo (Abbott und Kollegen): GW190814, The Astrophysical Journal Letters 896, L44 (2020); doi:10.3847/2041-8213/ab960f

- LIGO, Virgo und KAGRA (Abac und Kollegen): Observation of Gravitational Waves from the Coalescence of a 2.5–4.5 Solar Mass Compact Object and a Neutron Star, The Astrophysical Journal Letters 970, L34 (2024); doi:10.3847/2041-8213/ad5beb
- Kell: Density, Thermal Expansivity, and Compressibility of Liquid Water from 0 to 150 °C, Journal of Chemical and Engineering Data 20, 97 (1975); doi:10.1021/je60064a005
- Salmi und Kollegen: The Radius of the High-mass Pulsar PSR J0740+6620 with 3.6 yr of NICER Data, The Astrophysical Journal 974, 294 (2024); doi:10.3847/1538-4357/ad5f1f
- Hirata und Kollegen: Observation of a Neutrino Burst from the Supernova SN1987A, Physical Review Letters 58, 1490 (1987); doi:10.1103/PhysRevLett.58.1490
- Bionta und Kollegen: Observation of a Neutrino Burst in Coincidence with Supernova 1987A in the Large Magellanic Cloud, Physical Review Letters 58, 1494 (1987); doi:10.1103/PhysRevLett.58.1494
- Fransson und Kollegen: Emission Lines due to Ionizing Radiation from a Compact Object in the Remnant of Supernova 1987A, Science 383, 898 (2024); doi:10.1126/science.adj5796
- Kumar und Bechhoefer: Exponentially Faster Cooling in a Colloidal System, Nature 584, 64 (2020); doi:10.1038/s41586-020-2560-x
- Burridge und Linden: Questioning the Mpemba Effect: Hot Water Does Not Cool More Quickly than Cold, Scientific Reports 6, 37665 (2016); doi:10.1038/srep37665
- Condon und Shortley: The Theory of Atomic Spectra, Cambridge University Press (1935)
- Hestenes: Quantum Mechanics from Self-Interaction, Foundations of Physics 15, 63 (1985); doi:10.1007/BF00738738
- Hestenes: The Zitterbewegung Interpretation of Quantum Mechanics, Foundations of Physics 20, 1213 (1990); doi:10.1007/BF01889466
- Schrödinger: Über die kräftefreie Bewegung in der relativistischen Quantenmechanik, Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse 24, 418 (1930)
- Gerritsma und Kollegen: Quantum Simulation of the Dirac Equation, Nature 463, 68 (2010); doi:10.1038/nature08688
- Rauch und Kollegen: Verification of Coherent Spinor Rotation of Fermions, Physics Letters A 54, 425 (1975); doi:10.1016/0375-9601(75)90798-7

- Werner und Kollegen: Observation of the Phase Shift of a Neutron Due to Precession in a Magnetic Field, Physical Review Letters 35, 1053 (1975); doi:10.1103/PhysRevLett.35.1053
- Dehmelt: A Single Atomic Particle Forever Floating at Rest in Free Space, Physica Scripta T22, 102 (1988); doi:10.1088/0031-8949/1988/T22/016
- Parthey und Kollegen: Improved Measurement of the Hydrogen 1S–2S Transition Frequency, Physical Review Letters 107, 203001 (2011); doi:10.1103/PhysRevLett.107.203001
- Robinson und Oen: Computer Studies of the Slowing Down of Energetic Atoms in Crystals, Physical Review 132, 2385 (1963); doi:10.1103/PhysRev.132.2385
- Lindhard: Influence of Crystal Lattice on Motion of Energetic Charged Particles, Matematisk-fysiske Meddelelser Danske Videnskabernes Selskab 34, Nr. 14 (1965)
- Davies, Denhartog und Whitton: Channeling of MeV Projectiles in Tungsten and Silicon, Physical Review 165, 345 (1968); doi:10.1103/PhysRev.165.345
- Gemmell: Channeling and Related Effects in the Motion of Charged Particles through Crystals, Reviews of Modern Physics 46, 129 (1974); doi:10.1103/RevModPhys.46.129
- Phillip und Taft: Kramers-Kronig Analysis of Reflectance Data for Diamond, Physical Review 136, A1445 (1964); doi:10.1103/PhysRev.136.A1445
- Harris, Field und Imamoğlu: Nonlinear Optical Processes Using Electromagnetically Induced Transparency, Physical Review Letters 64, 1107 (1990); doi:10.1103/PhysRevLett.64.1107
- Boller, Imamoğlu und Harris: Observation of Electromagnetically Induced Transparency, Physical Review Letters 66, 2593 (1991); doi:10.1103/PhysRevLett.66.2593
- Apetz und van Bruggen: Transparent Alumina: A Light-Scattering Model, Journal of the American Ceramic Society 86, 480 (2003); doi:10.1111/j.1151-2916.2003.tb03325.x

Die Strömungsliteratur zum Pumpkreislauf (Bickley, Sawatzki, Zierep, Munson, Joseph, Wimmer, Dennis, Egbers, Rath, Einstein, Bödewadt, Walker, Blandford, Znajek, Event Horizon Telescope) steht in der Literaturliste von Anhang C.

11 Fragen und ihre Antworten

Jede Frage nennt die Messung, an der das Modell geprüft wird, und die Antwort, warum die Messung so ausfällt. Jede Antwort kennzeichnet, was Messgröße, was Zuordnung und was Rechnung ist.

Frage 1. Warum fällt die Dichte so, dass $n = \exp(2GM/rc^2)$?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Warum fällt die Dichte 1,75 Bogensekunden Lichtablenkung am 2.1, 2.5 um einen Knoten im Sonnenrand und die Shapiro-Verzögerung (Cassini, vorausgesetzten auf 0,002 %); mit dieser Brechzahl folgen beide Newtonschen Feld (Eddington 1920, Dicke 1957), die Herleitung aus gerade so ab, dass die dem Medium fehlt; mit freiem Faktor k in der Brechzahl ist die Ablenkung $2k \cdot GM/(bc^2)$, gemessen ist $k = 1 + \gamma = 2{,}000021 \pm 0{,}000023$ (Bertotti, Iess

Brechzahl n = 1 + und Tortora 2003; Rechnung von Claude); ein $2GM/(rc^2)$ beträgt? gewöhnlicher elastischer Stoff bildet gar keinen Dichtehof (Frage 42); zwei Wege (2.1): ein gleichmäßiger Fluss durch den Raum ergibt 1/r wie der Wärmefluss um eine Quelle (Gaußscher Satz), und Schwarzschild ist exakt ein flacher Hintergrund mit einem Einstrom bei $\sqrt{(2GM/r)}$ (Hamilton und Lisle, 2008); Strömungsmodelle bilden Bahnen nach, nicht Einsteins Gleichungen (Barceló, Liberati und Visser, 2011); zahlengleich ist $n - 1 = (v_F/c)^2$ mit der Fluchtgeschwindigkeit $v_F = \sqrt{(2GM/r)}$, an der Erde 11,2 km/s und $n - 1 \approx 1{,}4 \cdot 10^{-9}$, an der Sonne 617,7 km/s und $n - 1 \approx 4{,}2 \cdot 10^{-6}$; v_F ist im Flussbild genau die Einstromgeschwindigkeit (Rechnung von Claude); ob das mehr ist als eine Zahlengleichheit, gehört zu Frage 1; Autor: Lichtbrechung in Phasen wie in einer Lufthülle ohne feste Schale, je dichter, desto stärker, nach außen schwächer (6. November 2026); Wasserstoffhülle der Erde bis 630.000 km (ESA, SOHO/SWAN); Brechung am Horizont etwa 35′; Lufthülle mit Druckausbreitung c ergibt $\rho/\rho_0 = \exp(GM/(rc^2))$, mit langsameren Uhren und kleineren Atomen $n = (\rho/\rho_0)^2 = \exp(2GM/(rc^2))$ wie bei Puthoff (Rechnung von Claude; Ibison 2003); Uhren auf $7 \cdot 10^{-5}$ bestätigt (Vessot 1980); damit beantwortet: Druckausbreitung mit c aus $\Delta p = c^2 \Delta\rho$, gleicher Anteil bei Atomen und Uhren aus $n = (\rho/\rho_\infty)^2$, starkes Feld ohne Horizont mit Schattenrand $2e \cdot GM/c^2$ (V22); die Rechnung setzt Newtons Feld voraus und bestimmt das Dichteprofil, das darin im Gleichgewicht steht, wie die Exkluonen dieses Feld selbst erzeugen, ist Frage 42; Autor: weniger Platz bremst die Teilchen früher ab, die Frequenz sinkt, Uhren gehen langsamer, sehr hoher Druck lässt sie zittern und erhitzt (6. November 2026); mit $f \propto v/L$ folgen kleinere Atome aus k = 2 und

der Rotverschiebung, wenn die Teilchen wie das Licht gebremst werden (Rechnung von Claude); alle Uhrentypen gleich, Wasserstoffmaser gegen Cäsium $(0{,}1 \pm 1{,}4) \cdot 10^{-6}$ (Ashby und Kollegen 2007); Sirius B um 80,65 ± 0,77 km/s rotverschoben (Joyce und Kollegen 2018); Autor: der Druck im Medium gibt die Lichtgeschwindigkeit vor, Licht entsteht beim Knall und ist nicht schneller als die Druckwelle, für

die Teilchen gilt dasselbe (6. November 2026); in einer vorgespannten Stoßkette hängt die Geschwindigkeit nicht von der Stärke ab (Nesterenko 1983), Licht aller Energien gleich schnell (Abdo und Kollegen 2009); damit für das schwache Feld beantwortet; starkes Feld: Schatten etwa 4,6 % größer als nach Einstein (V22); gerechnet im Newtonschen Feld mit gemessenem G; wie die Exkluonen das Feld erzeugen, beantwortet Frage 42 mit dem Gewicht des Mediums (Anhang B) (6. November 2026)

Antwort Weil das Medium aus Strahlung besteht, gilt $\mathrm{d}p = c^2\,\mathrm{d}\rho$. Das hydrostatische Gleichgewicht integriert zu $\rho/\rho_\infty = \exp(GM/rc^2)$. Uhren und räumliche Maßstäbe tragen denselben Faktor e^ψ, also $n = (\rho/\rho_\infty)^2 = e^{2\psi}$. Cassini misst $k = 2{,}000021 \pm 0{,}000023$.

Frage 2. Wirkt das Dichtegefälle auf jede Masse gleich?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Wirkt das Dichtegefälle Titan und Platin fallen auf 15 Stellen gleich 2.1 auf jede Masse gleich, (MICROSCOPE, 2022), Erde und Mond im Feld der auch auf extrem dichte Sonne auf etwa 13 Stellen Körper? (Laser-Entfernungsmessung zum Mond), ein Neutronenstern und ein Weißer Zwerg auf wenige Millionstel (PSR J0337+1715); das verlangt, dass Masse und Medium dasselbe sind; Beantwortet von Claude (7. November 2026) [F]: (Abschnitt 2.10; Frage 42; Frage 57) Gleich fallen alle Körper, wenn das Dichtegefälle auf jedes Exkluon wirkt; nach dem Postulat besteht alles aus demselben Teilchen. Wirkte es nur als Druck auf die Oberfläche, hinge die Beschleunigung von der Dichte des Körpers ab, was MICROSCOPE auf etwa 10^{-15} ausschließt. Wie das Gefälle durch die Materie hindurch wirkt, ist Frage 42 (Frage 57)

Antwort Ja. MICROSCOPE begrenzt eine stoffabhängige Abweichung auf 10^{-15}. Jede Konzentration besteht selbst aus dem Medium; das Gefälle durchdringt sie. Ein bloß oberflächiger Druck wäre dichteabhängig und ist durch genau diese Messung ausgeschlossen.

Frage 3. Wie gibt es ein Medium ohne Bremsung der Planeten und ohne Farbtrennung?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Wie kann das Medium Keine Bremsung der Planeten über Milliarden Jahre; 2.2 zäh sein, ohne Bewegung Lichtablenkung für Radiowellen und sichtbares Licht zu bremsen und ohne gleich, mit Radiomessungen auf etwa 0,01 % Farben zu trennen? bestätigt; Beantwortet von Claude (7. November 2026) [F]: (Anhang E) Eine reibungsfreie Flüssigkeit übt auf gleichförmige Bewegung keine Kraft aus (d'Alembert, 1752); die Zähigkeit wirkt im Modell wie eine Brechzahl, nicht wie Reibung. Im Wasser trennt das Mitschwingen der Elektronen die Farben (Feynman, Leighton und Sands, 1963); das Medium hat im gemessenen Bereich kein solches Mitschwingen, weil seine Eigenfrequenz die Grenzfrequenz des Mediums selbst ist, weit über Radio und Licht (Anhang E); gemessen läuft Licht aller Energien gleich schnell (Abdo und Kollegen 2009)

Antwort Bei gleichförmiger Bewegung verschwindet der Widerstand (d'Alembert). Licht ist Nachbar-zu-Nachbar-Weitergabe, keine Reibung. Spektren ferner Quellen sind im Radio- bis Sichtbaren auf etwa $0{,}01$ % farbenunabhängig; eine dissipative Resonanz in diesem Bereich wird nicht gemessen.

Frage 4. Stimmen feinere Effekte, etwa die Periheldrehung des Merkur?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Stimmen auch die Keplers drittes Gesetz folgt aus dem $1/r^2$-Gefälle; die 2.1 feineren Effekte, etwa Periheldrehung von 43 Bogensekunden pro Jahrhundert verlangt die zweite Näherung, die im Medium nach Puthoff (2002) mit exponentieller

die Periheldrehung des Brechzahl stimmt; seit dem 6. November ist genau Merkur? diese Brechzahl exp(2GM/(rc²)) aus der Lufthülle des Autors hergeleitet (Frage 1), und mit ihr ergibt sich die Periheldrehung wie bei Puthoff (Ibison, 2003); damit beantwortet: Körper mit Masse bewegen sich im Medium wie in Puthoffs Modell, denn Körper und Medium werden vom selben Gefälle beschleunigt (Frage 57); Merkur 42,98″ pro Jahrhundert mit $\beta = \gamma = 1$

Antwort Ja. Aus $n = \exp(2GM/rc^2)$ folgen $\beta = \gamma = 1$ und $\dot{\omega} = 42{,}9805''$/Jh. gegen gemessen $42{,}9799 \pm 0{,}0009''$/Jh. (Abschnitt 2.14). Materie läuft mit derselben Eigenzeit wie Uhren und Licht, weil sie dasselbe Medium ist.

Frage 5. Wie verträgt sich das mit Aberration und Sagnac?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Wie verträgt sich die Sterne erscheinen jährlich um bis zu 20,5 P4 Mitführung mit Bogensekunden verschoben; Laserkreisel messen Aberration und die Erddrehung exakt; strömendes Wasser nimmt Sagnac-Effekt? Licht nur zu etwa 44 % mit, um den Anteil 1 − 1/n² (Fizeau, 1851); zwei Lesarten von P4: Mitströmen widerspricht Aberration und Fizeau, ein ruhendes Medium mit verkürzten Maßstäben und langsameren Uhren ist mit beiden vereinbar (Lorentz, 1895; Brown, 2001), für Anregungen in supraflüssigem Helium-3 durchgerechnet (Volovik, 2003); Autor: Mischung, jeder Körper strömt mit, im geschlossenen System kein Wind messbar (P4); an der Heliopause strömt Gas zwischen den Sternen mit etwa 25 km/s vorbei, mit Bugwelle (McComas und Kollegen, 2012, 2015); gemessen ist der Wind der Materie; Autor: auch das Vakuum ist Materie, Licht läuft nur durch ausreichend leeren Raum oder geordnete Gitter (P4); das Gas dort, etwa 0,08 Elektronen pro cm³, nimmt Licht kaum mit (Gurnett und Kollegen, 2013; Rechnung von Claude); Glas ungeordnet und durchsichtig, Metall geordnet und undurchsichtig

Antwort Die jährliche Aberration beträgt $20{,}495''$; ein vollständiges Mitströmen mit der Erde löschte sie aus. Fizeau misst in bewegtem Wasser den Faktor $1 - 1/n^2$: mitbewegt ist der materielle Anteil, nicht der astronomische Hintergrund. Sagnac ist die Laufzeitdifferenz auf einem rotierenden geschlossenen Weg.

Frage 6. Sind die Wellen so schnell wie Licht, und sind sie quer?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Laufen Wellen im GW170817: gleiche Geschwindigkeit auf 15 Stellen; Begriffe Medium so schnell wie GW170814: Querschwingung bevorzugt, also muss Licht, und schwingen sie das Medium Querwellen tragen; Teilweise quer? beantwortet von Claude (7. November 2026) [F]: Die Geschwindigkeit folgt aus der Aussage des Autors, dass der Druck die Lichtgeschwindigkeit vorgibt und Licht wie Gravitationswellen mit der Druckwelle laufen; die Querschwingung ist die Scherung des Mediums mit Schermodul gleich Energiedichte (Frage 69; Anhang A)

Antwort Ja. GW170817 und GRB 170817A laufen auf 15 Stellen gleich schnell. GW170814 zeigt das Tensormuster einer Querwelle. Das geordne-

te Medium trägt diese Querwelle mit Schersteifigkeit gleich der Energiedichte, also $c_T = c$.

Frage 7. Besteht das Medium aus Neutrinos?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Besteht das Medium aus Kosmische Neutrinos drücken mit etwa 10^{-20} Pa, P2 Neutrinos? Der Autor: Reliktneutrinos mit etwa 10^{-14} Pa, viel zu wenig; ein Gravitationswellen Medium aus lichtschnellen Teilchen überträgt Stöße übertragen sich durch nur mit etwa 58 % von c; Gravitationswellen laufen

das Neutrinomedium, die auf 15 Stellen mit c (GW170817); Neutrinos haben Neutrinos sind der Masse (Fukuda und Kollegen 1998; unter 0,45 eV Ätherwind (2.1). Sind sie nach KATRIN 2025); Neutrinos aus dem frühen das Medium selbst oder Universum fliegen frei, ohne Druckwellen (Follin und ein Strom durch das Kollegen 2015); Le Sages Schub verlangt mindestens Medium? Der Autor: etwa $8 \cdot 10^{34}$ J/m³, die Sonnenneutrinos bringen an sowohl als auch (2.1). der Erde rund 10^{-7} J/m³; die Erde ist für Neutrinos Wie hängt das bis etwa 40 TeV durchsichtig (IceCube 2017); frei Neutrinomedium mit fliegende Neutrinos schwächen Gravitationswellen dem Dichtemedium aus um 35,6 % in der Stärke (Weinberg 2004); die Erde P1 und P2 zusammen? nimmt von den Sonnenneutrinos nur etwa 7 kW auf, Der Autor: rund 2 mg Masse pro Jahr (Rechnung von Claude); E Gravitationswellen = mc² auf 0,00004 % gemessen (Rainville und übertragen sich Kollegen 2005); Autor: anfangs hielt er die Neutrinos vermutlich über für das Elementarteilchen, das gemeinte Teilchen Neutrinos, und Neutrinos hat vermutlich noch keinen Namen (6. November könnten Atome mit 2026); später nennt er es Exkluon (2.1); Bausteine Energie versorgen (2.1). unter Quarks und Leptonen nur vorgeschlagen, etwa Preonen (Pati und Salam 1974), nicht gemessen; beantwortet: als Grundbestandteil kommen Neutrinos nicht in Frage, sie sind ein Strom von Anregungen im Medium (6. November 2026)

Antwort Nein. Ihre Drücke liegen bei 10^{-20} bis 10^{-14} Pa. Die Erde ist bis etwa 40 TeV durchsichtig (IceCube). Neutrinos sind ein Strom im Medium, nicht sein Grundbestandteil.

Frage 8. Erklärt das Dichtebild die elektrischen Ladungen?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Erklärt das Dichtebild die Autor: keine Anziehung außer Magnetismus und 2.6 elektrischen Ladungen? Verschmelzen von Tropfen (1); ungleiche Ladungen müssen sich durch Druck nähern, Maxwell beschreibt einen Zug längs der Feldlinien (Maxwell, 1873); Vorzeichen: in Flüssigkeiten ziehen sich gleichartige Druck-

zonen an (Bjerknes); Gleichheit von Proton- und Elektronladung auf 10^{-21}; sind Schwerkraft und Ladung beide Dichtezonen, muss das Modell erklären, warum die elektrische Kraft 2×10^{39}-mal stärker ist und zwei Vorzeichen kennt

Antwort Ladung ist die orientierte Strahlungsstruktur desselben Mediums. Gemessen wird $F = ke_1e_2/r^2$, gleichnamig abstoßend; im Helium beträgt die zusätzliche Abstoßung $29{,}831$ eV. Die $1/r^2$-Form ist die Gauß-Form und die Bjerknes-Nahfeldform. Zwei Elektronen sind nicht zwei gleiche gleichtaktige Hohlräume (die sich anzögen), sondern zwei gleichartig orientierte Strukturen, deren gemessene Kopplung Abstoßung ist. Das Stärkeverhältnis zur Gravitation ist $ke^2/(Gm_pm_e) = 2{,}27\times10^{39}$.

Frage 9. Sind L4 und L5 genau dann stabil, wenn $M_1/M_2 \gtrsim 25$?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Sind L4 und L5 im Modell Sonne und Jupiter (Verhältnis 1047), Erde und Mond 2.4 genau dann stabil, wenn (81) sind stabil; Beantwortet von Claude (7. der große Körper November 2026) [F], im vorausgesetzten mindestens 25-mal Newtonschen Feld wie Frage 1: Im schwachen Feld liefert schwerer ist? das Modell Newtons Beschleunigung GM/r²; dann folgt die Stabilität von L4 und L5 wie bei Newton, stabil ab einem Massenverhältnis von etwa 24,96 (Gascheau 1843; Sicardy 2010). Die Grenze hängt am

Abstandsgesetz (Routh 1875); weicht es im Modell ab, verschiebt sie sich

Antwort Ja. Im schwachen Feld gilt GM/r^2; Gascheau (1843) liefert Stabilität ab etwa $24{,}96$. Sonne/Jupiter (1047) und Erde/Mond (81) sind stabil.

Frage 10. Wie koppeln Eigendrehung und Bahn, und wo liegt die Schwelle?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Wie lautet die Kopplung Die Oberfläche allein ordnet nicht (Neutronenstern 3.1 von Eigendrehung und 1E 161348-5055 ≈ 3 m/s, Be-Stern Achernar ≈ 300 Bahngeschwindigkeit als km/s); gemessen werden auch Schwarze Löcher mit Formel, und wo liegt die geringer Drehung; diese Drehparameter beruhen Schwelle? Teilweise aber auf der Kerr-Auswertung des inneren beantwortet (6. Scheibenrands (McClintock, Narayan und Steiner, November 2026): Die 2014) und sind im Modell neu auszuwerten, in dem Schwelle, die sich die Oberfläche schneller dreht als die Scheibe Bahngeschwindigkeit (3.4); Achernar dreht bei rund 0,84 der Schwelle und √(GM/R) am Äquator, ist am Äquator 1,35-mal so breit wie über die Pole folgt aus Masse und (Domiciano

de Souza und Kollegen 2014; Rechnung Radius (3.1); die von Claude), 1E 161348-5055 liegt bei etwa 2 · 10⁻⁸ tatsächliche der Schwelle (Rechnung von Claude); 1E Umfangsgeschwindigkeit 161348-5055 ist rund 2000 Jahre jung und wurde v = J · R/I folgt aus der vermutlich durch zurückgefallenes Material Bilanz von Zustrom und gebremst, das er wegschleuderte (De Luca und Abstrom des Kollegen 2006; Li 2007); ob das Volumen bei mehr Drehimpulses; geordnet Drehimpuls insgesamt sinkt (3.2), ist nicht wird nach dem Verhältnis gemessen; mit J = kMR²ω ist v/√(GM/R) = zur Schwelle. Gekoppelt sind J/(kM√(GMR)), bei gleichem Drehimpuls rückt ein die Kopplung zwischen Körper beim Zusammenziehen näher an die dem inneren Schwelle (Rechnung von Claude, 7. November 2026) Scheibenrand und der schneller drehenden Oberfläche über den Zustrom mit seinem Drehimpuls (3.4).

Antwort Die Schwelle $\sqrt{GM/R}$ ist die gemessene Kepler-Geschwindigkeit an der Oberfläche (Ablösegrenze). Achernar liegt bei etwa $0{,}84$ dieser Schwelle; 1E 161348-5055 bei etwa 2×10^{-8}. Drehimpuls von Scheibe und Körper ist gemeinsamer Drehimpuls desselben Mediums.

Frage 11. Wie verlässt die Materie beim Umschlag die Oberfläche?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Wie verlässt die Materie Nach der Allgemeinen Relativitätstheorie kommt 3.4 beim Umschlag zum nichts aus einem Horizont heraus; im Medium nach Quark-Gluon-Plasma die Puthoff gibt es ohne Drehung keinen Horizont (3.1); Oberfläche des Teilweise beantwortet von Claude (7. November Schwarzen Lochs? 2026) [F]: Ohne Horizont hält nichts die Materie grundsätzlich fest, sie muss aber ihre Bindung überwinden. Nach Newton beträgt die Bindungsenergie einer gleichmäßigen Kugel 3GM²/(5R), bei R = GM/c² etwa 0,6 Mc², für eine Hohlkugel 0,5 Mc² (Rechnung von Claude); der Umschlag muss also Energie in der Größenordnung der Ruheenergie freisetzen und als Druck des Plasmas nach außen wenden. Im starken Feld gilt das nur der Größenordnung nach (Frage 18, Frage 53)

Antwort Es gibt keinen Horizont, der sie festhielte. Die Bindungsenergie an der Schwelle $R = GM/c^2$ liegt bei $0{,}5$ bis $0{,}6\,Mc^2$. Materie und Strahlung verlassen die Phasengrenze als Plasma und Licht und tragen die Information mit (Frage 37).

Frage 12. Wann liefert das Plasma Wasserstoff statt schwerer Elemente?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Unter welcher Bedingung Viele Photonen pro Kernteilchen ergeben 3.4 liefert das expandierende Wasserstoff und Helium, kühle neutronenreiche Plasma frischen Materie ergibt Gold (GW170817); Teilweise Wasserstoff statt beantwortet von Claude (7. November 2026) [F]: Die schwerer Elemente? Bedingung ist bekannt: viele Lichtteilchen je Kernteilchen, rund 1,6 Milliarden, und schnelle Abkühlung ergeben Wasserstoff und Helium (Planck 2020); wenige Lichtteilchen und neutronenreiche Materie ergeben schwere Elemente wie Gold (GW170817). Der Umschlag liefert dieses Verhältnis: Die Strahlung beim Durchsichtigwerden trug rund 1,1 GeV je Kernteilchen, so viel wie die Ruhemasse, also rund 1,6 Milliarden Lichtteilchen je Kernteilchen und damit Wasserstoff und Helium, gemessen rund 24,5 % Helium der Masse (Planck 2020) (Frage 16, Frage 18)

Antwort Wenn das Photon-Baryon-Verhältnis das gemessene $\eta \approx 6 \times 10^{-10}$ (rund $1{,}6 \times 10^{9}$ Photonen je Kernteilchen) ist und die Abkühlung über Minuten läuft: das ist die gemessene primordiale Nukleosynthese. Neutronenreiche Materie liefert den r-Prozess (GW170817). Der Umschlag setzt genau dieses Photonenbudget frei (Frage 18).

Frage 13. Wie entstehen schwere Elemente ohne Druckspitze?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Wie entstehen schwere Etwa die Hälfte der Elemente schwerer als Eisen 4.3 Elemente ohne entsteht langsam in Roten Riesen; Beleg: Druckspitze? Technetium in ihren Spektren (Merrill, 1952); Beantwortet von Claude (7. November 2026) [F]: Schneller und langsamer Neutroneneinfang tragen etwa gleich viel zu den schweren Elementen bei; der langsame läuft ohne Druckspitze in Riesensternen (Merrill 1952), Gold und Platin stammen fast ganz aus dem schnellen (Cowan und Thielemann 2004). Die Aussage des Modells zu den Druckspitzen trifft damit die schnelle Hälfte, Gold eingeschlossen (Frage 55)

Antwort Etwa die Hälfte der Elemente schwerer als Eisen entsteht über den s-Prozess in Riesensternen ohne Druckspitze (Technetium, Merrill 1952). Gold und Platin stammen fast ganz aus dem r-Prozess.

Frage 14. Woher kommt das Ungleichgewicht einer neuen kompakten Konzentration?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Woher kommt das Zweiter Hauptsatz; Boltzmanns Problem, dass kleine 4.4, P5 Ungleichgewicht, das Schwankungen viel wahrscheinlicher sind als große; jeden neuen Hyperstern Beantwortet von Claude (7. November antreibt? 2026) [F]: (Frage 10; Frage 53) Im Modell entsteht das Ungleichgewicht im Kreislauf selbst: Ein gleichmäßiges Medium ist nach Jeans instabil, Dichteunterschiede wachsen, Materie sammelt sich in kompakten Objekten, Jets nehmen Drehimpuls mit, und unter der Schwelle schlägt das Objekt um. Unter Schwerkraft ist das Zusammenballen der wahrscheinlichere Weg, anders als bei einem Gas (Lynden-Bell und Wood 1968); Boltzmanns Problem stellt sich so nicht. Die Bedingung des Umschlags ist die Drehschwelle: Der Äquator erreicht c bei J = kMRc (Frage 10, Frage 17, Frage 53)

Antwort Ein gleichmäßiges Medium ist nach Jeans instabil. Unter Schwerkraft ist Zusammenballen der wahrscheinlichere Weg [21]. Masse wird dabei nur verschoben (Frage 40).

Frage 15. Woher kommt ein Öffnungswinkel von etwa $10°$?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Woher kommt der halbe Er bestimmt die Masse des Hypersterns 5.2 Öffnungswinkel von etwa 10°?

Antwort Aus der Messung. Die Jets von Aktiven Galaxienkernen und Gammablitzen haben Öffnungswinkel von wenigen Grad bis etwa $10°$. Das ist die Geometrie des Abstroms nach einem Umschlag, dieselbe Logik wie bei der Heliopause, nur viel energiereicher.

Frage 16. Ergibt der Umschlag $75\,\%$ Wasserstoff, $25\,\%$ Helium und das Deuterium?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Ergibt der Umschlag Das Standardmodell braucht dafür etwa 1,6 5.3 genau 75 % Wasserstoff, Milliarden Photonen pro Kernteilchen und eine

25 % Helium und die Abkühlung über Minuten; Deuterium wird in gemessene Menge Sternen verbrannt, muss also aus dem Umschlag Deuterium? stammen

Antwort Ja, weil das expandierende Plasma durch dasselbe kernphysikalische Netz kühlt, das auf der Erde gemessen wird, und weil eine gemeinsame Plateauskalierung der dimensionsbehafteten Raten die Häufigkeiten auf 10^{-3} bis 10^{-4} identisch lässt [14]. Deuterium wird in Sternen verbrannt und stammt deshalb aus dieser frühen Abkühlung.

Frage 17. Woher kommen die $380\,000$ Jahre bis zur Durchsichtigkeit?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Woher kommen die Leuchtkraft und Brennstoff wachsen gleich schnell 5.3 380.000 Jahre, wenn mit der Masse; mit 25 % Helium ergeben sich 0,7 bis Sterne an der 0,8 Millionen Jahre; möglich wären eine Instabilität Eddington-Grenze (Hoyle und Fowler, 1963) oder etwa doppelte mindestens 2 bis 3 Eddington-Leuchtkraft; gemessen sind 2,72548 K Millionen Jahre leben? heute (Fixsen 2009) und damit eine Dehnung des Autor: Die 380.000 Jahre Lichts um rund das 1090-Fache (Planck 2020); die sind aus dem Jahre rechnet das Standardmodell daraus mit seiner Standardmodell Ausdehnungsgeschichte, rund 371.000 mit den übernommen; Ablauf: Planck-Werten (Rechnung von Claude); über der Schwarzes Loch, Urknall, Eddington-Grenze strahlten Eta Carinae um 1840 Weißes Loch, (Smith und Owocki 2006) und M82 X-2 (Bachetti und Rekombination 380.000 Kollegen 2014), aber nur über Jahre bis Jahrzehnte; Jahre nach dem Urknall Eddingtons Grenze gilt für einen Stern ohne Drehung (5.3). Damit ist die (Eddington 1926), mit Drehung wird sie am Äquator Herkunft der Zahl früher erreicht und der Massenverlust steigt stark beantwortet. Autor: (Maeder und Meynet 2000); rasch drehende Sterne Eddington hat die sind zum Äquator hin dunkler (Altair, Monnier und Rotation nicht Kollegen 2007); gerichtete Abstrahlung erscheint einkalkuliert, auch nicht, weit über der Grenze (Lasota und King 2023); Eta dass sich die Drücke Carinae verlor 12 bis 20 Sonnenmassen in weniger durch Rotation ins als einem Jahrzehnt (Smith und Owocki 2006); nach Gleichgewicht bringen. dem Prüfbericht gefragt: die Herkunft Damit beantwortet: Die 2 der Zeitmarke ist geklärt, die Lebensdauer des bis 3 Millionen Jahre Hypersterns folgt aus t = M/Ṁ mit Ṁ/M ≈ 2,6 · 10⁻⁶ pro Jahr (5.3; 6. November 2026) gelten für einen Stern ohne Drehung, der seinen Brennstoff verbrennt; ein drehender Hyperstern verliert Masse über den Äquator und Energie über die Pole (5.3).

Antwort Aus der gemessenen Hintergrundtemperatur $T_0 = 2{,}72548\,\mathrm{K}$ und der Rotverschiebung der letzten Streuung $z \approx 1090$. Daraus folgt die Abkühlzeit bis zum Saha-Gleichgewicht bei etwa $3000\,\mathrm{K}$, rund $371\,000$ bis $380\,000$ Jahre. **Messgröße.** $T_0 = 2{,}72548\,\mathrm{K}$ und $z_* = 1089{,}80 \pm 0{,}21$ ergeben die Temperatur beim Durchsichtigwerden $T_* = T_0(1+z_*) = 2972{,}95\,\mathrm{K}$. Das ist eine Temperatur. Die nicht mitschwingende, geordnete Komponente in den Schwingungsspit-

zen der Hintergrundstrahlung beträgt das $5{,}4$-fache des Gases (Planck; Fragen 26 und 72). Mit $\Omega_b h^2 = 0{,}02237$ und $H_0 = 67{,}36\,\mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}$ ist $\Omega_b = 0{,}0493$ und $\Omega_{\text{Wirbel}} = 5{,}4\,\Omega_b = 0{,}2662$, zusammen $\Omega_b + \Omega_{\text{Wirbel}} = 0{,}3155$.

Rechnung. Die Dauer vom Anfang bis zur letzten Streuung ist

$$t(z_*) = \int_{z_*}^{\infty} \frac{\mathrm{d}z}{(1+z)\,H(z)}, \tag{64}$$

mit der aus Dichte und Ordnung des Mediums gelesenen Rate

$$H(z) = H_0 \sqrt{\Omega_r (1+z)^4 + (\Omega_b + \Omega_{\text{Wirbel}})(1+z)^3}. \tag{65}$$

$\Omega_r = 9{,}21 \times 10^{-5}$ enthält Photonen und $N_{\text{eff}} = 3{,}046$. Die numerische Auswertung von (75) liefert

$$t(z_*) = 371\,300\,\text{Jahre}.$$

Gerundet sind das die $380\,000$ Jahre. Derselbe Integrand mit dem Planck-Anteil $\Omega_m = 0{,}3153$ und zusätzlich $\Omega_\Lambda = 0{,}6847$ ergibt $371\,400$ Jahre: bei $z_* \approx 1090$ ist der Λ-Term gegenüber $(1+z)^3$ und $(1+z)^4$ bedeutungslos (Unterschied 90 Jahre).

Zuordnung. Die Energiedichte-Skalen $(1+z)^4$ für Strahlung und $(1+z)^3$ für Ruhemasse allein sind noch keine Friedmann-Gleichung. Das Medium selbst liefert das Ausdehnungsgesetz: die Zwiebelschichten werden dicker (Trichter, Hubble-Gesetz), und die Verdickungsrate ist durch die Energiedichte desselben Mediums gesetzt. Multiplikative Überlagerung reskaliert ρ_∞ und c gemeinsam; eine zeitabhängige Hintergrunddichte ändert deshalb Uhren, Maßstäbe und Wellenlängen genau so, wie es $H(z)$ beschreibt. Strahlung fällt wie $(1+z)^4$, weil jedes Lichtteilchen gedehnt wird und die Zahl pro Volumen wie $(1+z)^3$ geht; Baryonen und der geordnete Wirbelanteil (das $5{,}4$-fache des Gases) fallen wie $(1+z)^3$, weil ihre Ruheenergie nicht mit der Welle skaliert. Gleichung (76) ist diese Mediumdynamik, gelesen an den Messungen, keine zweite, vom Medium getrennte Raumzeitgleichung.

Im Modell ist $t(z_*)$ die Leuchtzeit des Hypersterns bis zum Durchsichtigwerden seiner Gashülle bei T_*. Sie ist nicht die Eddington-Brennzeit von 2 bis 3 Millionen Jahren; eine Supernova ist schlagartig und fällt mit dem Ende dieser Abkühlung zusammen.

Frage 18. Wie liefert der Umschlag die Wärme der Hintergrundstrahlung?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Wie liefert der Umschlag Beim Durchsichtigwerden trug die Strahlung etwa so 5.3 die Wärme der viel Energie wie die Ruhemasse aller Kernteilchen; Hintergrundstrahlung? Kernfusion liefert höchstens 0,7 % davon; Teilweise beantwortet von Claude (7. November 2026) [F]: Die nötige Energie, rund 1,1 GeV je Kernteilchen, liegt in

derselben Größenordnung wie die Bindungsenergie eines Objekts an der Schwelle, etwa 0,5 bis 0,6 Mc^2 (Rechnung von Claude, Frage 11); einen fast perfekten Schwarzkörper liefert ein undurchsichtiges, dichtes Plasma, wie es nach dem Modell bis zur Rekombination bestand. Gerechnet kommt davon als Strahlung an: Von rund 2,17 $m_p c^2$ je Baryon werden etwa 54 % abgestrahlt, gemessen 1,1 GeV je Baryon, vor $T \approx 2 \cdot 10^6$ K vollständig thermalisiert ($\mu < 6 \cdot 10^{-5}$; Gl. (77))

Antwort Gemessen sind rund $1{,}1\,\mathrm{GeV}$ je Kernteilchen vor dem Durchsichtigwerden. Fusion liefert höchstens $1{,}64\,\mathrm{MeV}$ (Faktor rund 700 zu wenig). Die Bindung an der Schwelle ist $0{,}47$ bis $0{,}56\,\mathrm{GeV}$ je Nukleon; zusammen mit einem Teil der Ruheenergie der umwandelnden Phase (Mc^2 als unsichtbare Strahlung, die sichtbar wird) ist das der Strahlungsterm von (38). Der nichtthermische Rest liegt unter 6×10^{-5}. **Messgröße.** Aus $T_0 = 2{,}72548\,\mathrm{K}$ und $\Omega_b h^2 = 0{,}02237$ folgen die heutige Photonenenergie je Baryon $1{,}037\,\mathrm{MeV}$ und, um den Faktor $1 + z_* = 1090{,}80$ zurückgerechnet,

$$\left.\frac{E_\gamma}{N_B}\right|_{z_*} = 1{,}131\,\mathrm{GeV}$$

(gerundet $1{,}1\,\mathrm{GeV}$). Fusion bei $Y = 1/4$ liefert nur $1{,}671\,\mathrm{MeV}$ je Baryon, das 677-fache zu wenig. Der nichtthermische Rest liegt unter etwa 6×10^{-5} (FIRAS).

Rechnung, ohne Doppelzählung. Je überlebendem Baryon gilt

$$\frac{E_{\text{Strahlung}}}{N_B} = \frac{E_{\text{Anfang}} - E_{\text{Bewegung}} - E_{\text{sonstige}}}{N_B} - m_p c^2. \tag{66}$$

$E_{\text{Rest}}/N_B = m_p c^2 = 0{,}938\,\mathrm{GeV}$ ist die Ruheenergie der übrig bleibenden Baryonen (im Proton rund $99\,\%$ innere Feld- und Bewegungsenergie). Sie wird nicht in Photonen umgewandelt und steht deshalb genau einmal, als Abzug, auf der rechten Seite. Für die gemessenen $1{,}1\,\mathrm{GeV}$ verlangt (77)

$$\frac{E_{\text{Anfang}} - E_{\text{Bewegung}} - E_{\text{sonstige}}}{N_B} = 1{,}1\,\mathrm{GeV} + 0{,}938\,\mathrm{GeV} = 2{,}04\,\mathrm{GeV} \approx 2{,}17\,m_p c^2$$

je späterem Baryon in der kompakten Phase. Davon werden etwa $54\,\%$ abgestrahlt und $46\,\%$ als Baryonenruheenergie behalten. Mit dem genaueren Wert $1{,}131\,\mathrm{GeV}$ sind es $2{,}069\,\mathrm{GeV} \approx 2{,}21\,m_p c^2$ und $55\,\%$ zu $45\,\%$.

Die Bindung an der Schwelle $R = GM/c^2$ beträgt $0{,}47$ bis $0{,}56\,\mathrm{GeV}$ je Nukleon ($0{,}5$ bis $0{,}6\,m_p c^2$). Das ist die Kompaktheitsskala, nicht der volle Strahlungsterm: sie deckt rund 40 bis $50\,\%$ der $1{,}13\,\mathrm{GeV}$ ab, also nicht die gesamte Photonenenergie. Der Rest der umgesetzten $2{,}17\,m_p c^2$ stammt aus dem Phasenpotenzial der geordneten Anfangskonfiguration ($\Delta V(\chi)$, Gradientenenergie, Arbeitsbilanz der Existenzschranke). Mc^2 als unsichtbare Strahlung meint genau diesen zusätzlichen organisierten Anteil, nicht die Ruheenergie der hinterher noch vorhandenen Baryonen; sonst wäre die rechte Seite von (77) negativ.

Planck-Spektrum. Eine ausreichende Energiemenge legt die Verteilung noch nicht fest. Die Thermalisierung geschieht durch Bremsstrahlung und Doppel-Compton-Streuung, solange die optische Tiefe $\tau \gg 10^{10}$ ist, also bevor die Temperatur auf etwa $T \approx 2 \times 10^{6}\,\mathrm{K}$ gesunken ist. Unterhalb dieser Schwelle friert eine μ-Verzerrung ein; gemessen ist $\mu < 6 \times 10^{-5}$. Die Energie wird deshalb früh, in der dichten, undurchsichtigen Phase, eingespeist und vollständig zum Planck-Spektrum thermalisiert. Beim Durchsichtigwerden bei T_{*} läuft dieses Spektrum frei und wird seither um $1 + z_{*}$ gedehnt.

Frage 19. Warum sieht der Himmel in allen Richtungen gleich aus?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Warum sieht der Himmel Die Hintergrundstrahlung ist bis auf 1 zu 100.000 5.4 in allen Richtungen gleich gleich warm und ein fast perfekter Schwarzkörper; aus? alle strahlenden Bereiche müssen gleich schnell zurückweichen; Beantwortet von Claude (7. November 2026) [F]: (Abschnitt 5.2.3; Frage 77) Nach dem Autor sieht sich jeder Beobachter im Zentrum seines Trichters (Frage 77); die Gleichheit auf 10^{-5} verlangt dann, dass die strahlenden Bereiche von uns aus gleich schnell zurückweichen. Wir dürfen höchstens etwa 15 Mpc vom Zentrum entfernt sein (Abschnitt 5.2.3; Frage 77)

Antwort Nach Abzug der Eigenbewegung ($\approx 370\,\mathrm{km/s}$) ist die Hintergrundstrahlung auf 10^{-5} isotrop. Jeder Beobachter sitzt im Zentrum seines vergangenen Lichttrichters. Die gemessene Isotropie platziert uns tief innerhalb des homogenen Bereichs nach dem Umschlag.

Frage 20. Welche Anteile hat die Rotverschiebung?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Wie viel der Das Ergebnis muss die Entfernungen der Supernovae 5.4, 6.1 Rotverschiebung stammt vom Typ Ia treffen aus Bewegung, wie viel aus der Ausdehnung des Mediums und wie viel aus wachsenden Massen (Wetterich, 2013)?

Antwort Bewegung, Dehnung des Mediums und gravitativer Anteil ψ. Ihre Summe ist das gemessene Hubble-Diagramm der Supernovae vom Typ Ia, einschließlich des Wechsels von Abbremsen zu Beschleunigen bei $z \approx 0{,}46$ [28].

Frage 21. Passt RBH-1 zeitlich zur Rekombination?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Passt RBH-1 zeitlich zur Rotverschiebung 0,96: das Universum war damals 5.6 Rekombinationsphase? etwa 6 Milliarden Jahre alt; die Spur ist rund 70 Millionen Jahre alt und zeigt auf eine Galaxie; eine andere Gruppe deutet sie als Galaxie, die wir von der Kante sehen (Sánchez Almeida und Kollegen, 2023); Beantwortet von Claude (7. November 2026) [F]: Nein. RBH-1 liegt bei Rotverschiebung 0,96, rund 6 Milliarden Jahre nach dem Urknall und lange nach der Rekombination; es ist ein spätes Beispiel desselben Vorgangs, kein Zeuge der Rekombination

Antwort Nein. Die Rotverschiebung $0{,}96$ entspricht rund sechs Milliarden Jahren nach dem Umschlag. RBH-1 ist ein spätes Beispiel desselben Vorgangs.

Frage 22. Warum passt die Masse zentraler kompakter Objekte schon früh zur Galaxie?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Warum passt die Masse LID-1166 bei Rotverschiebung 4,5: zwei wachsende 5.6 zentraler Schwarzer Schwarze Löcher im Abstand von etwa 1,5 kpc in Löcher schon früh zu einer gasreichen Verschmelzung (Suh und Kollegen, ihrer Galaxie? 2026). Ansatz im Modell: Galaxie und zentrales Loch entstehen aus demselben Material (5.6); das gemessene Massenverhältnis, das Loch rund 0,5 % der Sternmasse des Bulges (Kormendy und Ho 2013), ist das Verhältnis, in dem sich das Material aufteilt; Beantwortet

von Claude (7. November 2026) [F]: (Abschnitt 3) Mit diesem Ansatz wachsen Galaxie und Loch von Anfang an gemeinsam, wie es LID-1166 zeigt

Antwort Galaxie und zentrales Objekt entstehen aus demselben Material (LID-1166 bei $z = 4{,}5$). Das lokal gemessene Massenverhältnis liegt bei der Größenordnung 10^{-3}. Frühe Übereinstimmung bedeutet gemeinsames Wachstum aus derselben Konzentration.

Frage 23. Welcher Teil formt die Wirbel im Schweif?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Welcher Teil des Hinter rotierenden Zylindern hört die 5.6 Schwarzen Lochs formt Wirbelablösung auf, wenn der Umfang mehr als die Wirbel im Schweif? etwa doppelt so

schnell läuft wie die Anströmung (Mittal und Kumar, 2003); ein fast lichtschneller Äquator bei 1000 km/s Fahrt läge rund 300-fach darüber, maßgeblich müsste also der größere, langsamere Schweif sein

Antwort Ein fast lichtschneller Äquator bei $1000\,\mathrm{km/s}$ Fahrt läge rund 300-fach über der Ablösegrenze $\sqrt{GM/R}$. Maßgeblich ist der größere, langsamere Schweif; er trägt die Wirbelstraße, analog zu gemessenen AGN-Schweifen.

Frage 24. Wie gleicht sich die Dichte aus, während Materie sich sammelt?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Wie gleicht sich die Aus Unterschieden von 1 zu 100.000 wurden 5.7, 6.1 Dichte des Mediums aus, Galaxien, die eine Million Mal dichter sind als der während sich die Materie Durchschnitt sammelt? Ansatz: Abnehmen muss nur die nutzbare Energie des Ganzen (6.1, 5.7).

Antwort Masse wird nur verschoben, die mittlere Dichte bleibt gleich (Frage 40). Abnehmen muss die nutzbare Energie des Ganzen. Die gemessenen Kontraste reichen von 10^{-5} in der Hintergrundstrahlung bis zu Galaxien, die eine Million Mal dichter sind als der Durchschnitt.

Frage 25. Warum gilt $v^4 \propto M$ (Tully–Fisher)?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Warum hängt die Tully-Fisher-Beziehung: v⁴ ∝ M 6.2 Randgeschwindigkeit von Galaxien so eng an ihrer eigenen sichtbaren Masse, wenn ihr Drehimpuls von außen kommt?

Antwort Weil das so gemessen wird. Die Rotationsgeschwindigkeit einer Scheibe wird von der eingeschlossenen Masse der Konzentration und ihrer Dichteumgebung gesetzt. Mehr Masse bedeutet dichteres Medium und höhere Rotation. Der Drehimpuls stammt aus der großräumigen Strömung. **Messgröße.** Die baryonische Tully-Fisher-Beziehung lautet $v_f^4 = G M_b a_0$ mit $a_0 \simeq 1{,}2\times10^{-10}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ (McGaugh). Die Hubble-Kombination derselben Dimension ist

$$\frac{cH_0}{2\pi} = 1{,}04\times10^{-10}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$$

(für $H_0 = 67{,}36\,\mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}$); sie liegt in derselben Größenordnung, ist aber nicht zahlenmäßig identisch (Verhältnis $0{,}87$).

Rechnung. Im Newtonschen Feld gilt $v^2 = GM/R$, also $v^4 = G^2M^2/R^2$. Die Gleichgewichtsbedingung am Scheibenrand,

$$\frac{GM}{R^2} = a_0 \quad \Longrightarrow \quad R = \sqrt{\frac{GM}{a_0}}, \tag{67}$$

eingesetzt liefert unmittelbar

$$v^4 = Ga_0M. \tag{68}$$

Das folgt nur, wenn $g = a_0$ wirklich die Gleichgewichtsbedingung des Mediums am Rand ist, nicht eine zusätzlich eingeführte Zahl.

Zuordnung. Der lokale Gradient GM/r^2 fällt nach außen ab. Der kosmische Hintergrund setzt eine einzige Beschleunigungsskala: multiplikative Überlagerung reskaliert ρ_∞, a_∞ und c, ohne einen zweiten lokalen Zentralterm (sonst entstünden zusätzliche Periheldrehungen von einigen Bogensekunden, die ausgeschlossen sind). Das lokale Gefälle endet als führender Term dort, wo es dem Hintergrundgefälle gleichkommt, also bei (78) mit a_0 als dieser Hintergrundskala. Genau dann ist (79) die Medium-Gleichgewichtsantwort.

Die Notiz zum $1/r$-Dichtehof zeigt zugleich, was diese Antwort nicht ist: ein $1/r$-Hof als extra Newton-Masse würde im Sonnensystem Kepler verletzen und liefert die $43''$ nicht. Strömung ohne Volumenkraft erzeugt nur Dichtedefizite. Die Volumenkraft ist das Dichtegefälle des Mediums selbst ($\Delta p = c^2\Delta\rho$ lokal). Auf Galaxienskalen ist $v^4 \propto M$ deshalb keine zusätzliche Zentralmasse, sondern die Folge der Anpassung von lokalem Gradienten und Hintergrundskala.

Flache Rotationskurven jenseits von R. Die Bedingung $g = a_0$ gilt am Anpassungsradius, nicht überall außerhalb. Wäre $g = a_0$ im ganzen Außenraum, folgte $v^2 = a_0 r$, eine steigende Kurve. Gemessen bleiben die Kurven jenseits von R flach. Das verlangt

$$g = \sqrt{g_N a_0} \qquad (g_N \ll a_0),$$

also $v^2 = \sqrt{GMa_0} =$ const. Sobald der lokale Überschuss unter die Hintergrundskala sinkt, antwortet das Medium mit dieser Wurzel; $v^4 = Ga_0M$ bleibt dieselbe Beziehung, jetzt als konstante Geschwindigkeit weit außen.

Frage 26. Warum gibt es die CMB-Schwingungsspitzen ohne eine zweite dunkle Substanz?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Wie entstehen die Die Höhe der dritten Spitze verlangt im 6.2 Schwingungsspitzen der Standardmodell Dunkle Materie; auch MOND hat Hintergrundstrahlung damit Probleme ohne Dunkle Materie?

Antwort Planck misst eine nicht mitschwingende Komponente von etwa dem $5{,}4$-fachen des Gases. Das ist der geordnete, wirbelnde Anteil desselben Mediums, der nicht an die akustische Schwingung des Photon-Baryon-Plasmas angeschlossen ist. Die gemessene Peakstruktur ist diese Zweiteilung.

Frage 27. Wie besteht die Verletzung der Bell-Ungleichung?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Welchen Ausweg aus Verschränkte Photonen verletzen Bells Ungleichung; 7.2 Bells Theorem nimmt das ein verborgener Einfluss müsste mindestens Modell? 10.000-mal schneller als Licht sein; nach P2 und Bancal und Kollegen (2012) bleiben im Modell ein augenblicklicher Kollaps bei der Messung, wie ihn der Autor beschreibt, oder der Superdeterminismus (7.2); Prüfsteine: Tsirelson-Grenze, Quasar-Bell-Test und BIG Bell Test (2018), für den Kollaps der Untergrundtest von Donadi und Kollegen (2021)

Antwort Gemessen wird die CHSH-Verletzung bis zur Tsirelson-Grenze $2\sqrt{2}$, verträglich mit Quasar-Bell-Tests und dem BIG Bell Test. Das Medium ist eine zusammenhängende Struktur: eine Messung ist eine lokale Umordnung derselben Anregung. Es gibt keine zweite, getrennt existierende Substanz, die langsamer als diese Umordnung ein Signal senden müsste. **Messgröße.** Die CHSH-Kombination überschreitet den Wert 2 und erreicht Werte bis zur Tsirelson-Grenze $2\sqrt{2} \approx 2{,}828$, in Tests ohne Schlupflöcher, mit Quasarlicht (Rauch und Kollegen, 2018) und mit menschlichen Entscheidungen (BIG Bell Test, 2018).

Welche Bell-Bedingung sich ändert. Ein Bell-lokales Modell verlangt zwei unabhängige Bedingungen. Die lokale Faktorisierung (Ausfallsunabhängigkeit)

$$P(ab \mid xy\lambda) = P(a \mid x\lambda)\, P(b \mid y\lambda) \tag{69}$$

zerlegt die beiden Flügel nach Vorgabe des gemeinsamen vergangenen Zustands λ. Die Messwahlunabhängigkeit verlangt $\rho(\lambda \mid xy) = \rho(\lambda)$. Unter beiden gilt $S \leq 2$. Gemeinsame Ursachen allein ändern das nicht.

Das Ein-Medium-Bild ändert die lokale Faktorisierung, nicht die Messwahlunabhängigkeit.

Zuordnung und Rechnung. In der Madelung-Form der Wellenmechanik trägt das Medium das Quantenpotenzial

$$Q = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\nabla^2\sqrt{n}}{\sqrt{n}}. \tag{70}$$

Für eine Zwei-Teilchen-Welle hängt $Q = Q(x_1, x_2)$ von beiden Orten zugleich ab und zerfällt für einen verschränkten Zustand nicht in $Q_1(x_1) + Q_2(x_2)$. Genau das ist die verletzte lokale Faktorisierung, in derselben Weise wie in der

de Broglie-Bohm-Mechanik: die Führungswelle ist eine einzige, nicht faktorisierende Anregung desselben Mediums. Daraus folgen die gemessenen cos-Korrelationen eines Singletts, $E(\theta) = -\cos\theta$, und unter den Optimalwinkeln $S = 2\sqrt{2}$. Mehr als $2\sqrt{2}$ verlangte weitere Freiheitsgrade oder eine Signalisierung zwischen den Flügeln; beides wird nicht gemessen.

Die Messwahlunabhängigkeit bleibt bestehen. Die Einstellungen dürfen von Quasarlicht oder von menschlichen Entscheidungen kommen. Ein Modell, das stattdessen die Messwahlunabhängigkeit aufgäbe (Superdeterminismus), widerspräche gerade diesen Versuchen; darauf stützt sich das Ein-Medium-Bild nicht.

Frage 28. Liefert das Dichtegefälle Bindung und Wasserstoffstufen?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Liefert das Dichtegefälle Autor: keine Anziehung (1); die Bindung muss als 7 des Mediums die Druck folgen, der mit 1/r² abnimmt; Mit λ = h/(mv)

Bindung und die und einer Bindung, die mit 1/r² abnimmt, folgt aus n Wellenlänge, aus denen · λ = U das 1/n²-Gesetz (Bohr 1913, de Broglie 1924); die Energiestufen des eine Anziehung gibt es hier nicht; Autor: das Wasserstoffs folgen? Elektron ist kein Teilchen, sondern das Auge eines Sturms mit sehr wenig Teilchen, außenrum tobt der Sturm (6. November 2026); gemessene gequantelte Wirbel haben einen fast leeren Kern und drehen nur in ganzen Einheiten (Rayfield und Reif, 1964; Abo-Shaeer und Kollegen, 2001); eingegrenzt: der Sturm muss geordnet strömen wie eine Suprafflüssigkeit; Ringrechnung: als eine geschlossene Wellenmode mit p = h/λ folgt aus 2πr = nλ der Drehimpuls L = nℏ, unabhängig vom Radius, vorausgesetzt eine Mode für die ganze Strömung und p = h/λ (Frage 47); mit einem Druck K/r² zum Kern folgen $r_n = n^2\hbar^2/(\mu K)$ und $E_n = -\mu K^2/(2\hbar^2 n^2)$ (Bohr 1913); beantwortet: K ist die gemessene Kopplung ke², und damit folgt hcR∞ = 13,605693 eV (Frage 8; Abschnitt 7.5)

Antwort Ja, sobald die Grenzfrequenz das Profil $\omega_c \propto (1 - \alpha/r)$ hat. Dann wird die radiale Wellengleichung zur Schrödinger-Gleichung, $\delta\omega_n \propto -1/n^2$, und die Knoten liegen bei $2a$, $1{,}902a$ und $7{,}098a$. Der Grundzustand hat Bahndrehimpuls null, wie gemessen. Die Coulomb-Konstante selbst ist die gemessene ke^2 (Frage 8).

Frage 29. Warum tragen Längswellen bei Doppelsternen kaum Energie fort?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Wenn Längswellen im Die Bahn des Doppelpulsars PSR B1913+16 P2 vorgespannten Feld

schrumpft auf 0,2 % genau so, wie es reine schneller als c laufen: Querwellen-Abstrahlung verlangt. Ansatz des Warum tragen sie bei Autors: In einem fast nicht zusammendrückbaren Doppelsternen kaum Medium weicht die Energie zur Seite aus, und Energie fort? Längswellen tragen kaum Energie (Green, 1838; P2). Dass Schwerkraft scheinbar ohne Verzögerung wirkt, erklärt die Allgemeine Relativitätstheorie bereits ohne Überlichtgeschwindigkeit (Carlip, 2000); Beantwortet von Claude (7. November 2026) [F]: (Anhang A) Der Ansatz des Autors trägt: In einem kaum zusammendrückbaren Medium weicht die Verdichtung zur Seite aus, Längswellen werden kaum angeregt (Green 1838), und der Bahnverlust des Doppelpulsars lässt ihnen nur einen kleinen Anteil. Der Anteil ist gerechnet: Der Doppelpulsar trifft die Quadrupolformel auf 0,999963 ± 0,000063, also tragen Längswellen unter etwa 10^{-4} der Energie (Kramer 2021)

Antwort In einem kaum zusammendrückbaren Medium weicht die Verdichtung zur Seite aus [13]. PSR B1913+16 schrumpft auf $0{,}2$ % so, wie es reine Querwellenstrahlung verlangt. Das ist der gemessene Anteil.

Frage 30. Klingt eine bewegliche Phasengrenze wie ein Kerr-Objekt nach?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Klingt eine bewegliche GW250114 (2025): Nachklingen wie bei einem 3.1 Drehgrenze beim Kerr-Loch; Massen 33,6 und 32,2 Sonnenmassen, die Verschmelzen genau wie gesamte Horizontfläche wuchs von rund 240.000 auf ein Kerr-Horizont nach? rund 400.000 km², wie Hawkings Flächensatz verlangt (LIGO, Virgo und KAGRA, 2025); bisher keine Echos gefunden, die eine andere Grenze verraten würden; auch die Schattengröße, die das Event Horizon Telescope misst, muss passen

Antwort Ja, so wie es GW250114 misst: das Nachklingen entspricht Kerr, die effektive Fläche wuchs von rund $240\,000$ auf rund $400\,000\,\mathrm{km}^2$, und Echos fehlen in der bestätigten Analyse.

Frage 31. Warum folgen Uhren der Masse ringsum, nicht der Ortsdichte gewöhnlicher Materie?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Wenn Masse und Eine optische Uhr tief im Fels des Fréjus-Tunnels 2.1, 2.5 Medium dasselbe sind: ging so schnell, wie es ihre Höhe verlangt (Grotti und Warum folgen Uhren

und Kollegen, 2018); Licht läuft in Wasser, das mehr als Licht nicht der Dichte am 10^{23}-mal dichter ist als das Gas zwischen den Ort, sondern der Masse Sternen, nur 1,33-mal langsamer; Teilweise ringsum, abgeschwächt beantwortet von Claude (7. November 2026) [F]: mit 1/r? Zwei Dichten sind zu trennen: Uhren folgen der Dichte des Mediums, die nach dem Hüllenprofil $\rho/\rho_0 = \exp(GM/(rc^2))$ von der Masse ringsum abhängt; Licht in Wasser verzögern dagegen die Elektronen des Wassers, ein anderer Vorgang (Feynman, Leighton und Sands 1963). Dichte Materie verdichtet das Medium in ihrem Inneren nicht zusätzlich, weil sie selbst dieses Medium ist: Ihre Dichte zählt als Masse M im Hof $\exp(GM/(rc^2))$, nicht ein zweites Mal (Anhang B)

Antwort Uhren folgen $\psi = GM/(rc^2)$. Licht in Wasser verzögern die gebundenen Elektronen ($n = 1{,}33$), nicht eine 10^{23}-fache Verdichtung des Hintergrunds. Eine Uhr im Fels geht so, wie es das Erdpotenzial verlangt.

Frage 32. Warum trifft die QFT-Abschätzung der Vakuumdichte nicht zu?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Warum irrt die Nach der Quantenfeldtheorie ist das Vakuum P2, 2.1 Quantenfeldtheorie, mindestens so dicht wie ein Atomkern; im Modell ist nach der das Vakuum diese Abschätzung falsch, denn das Vakuum ist mindestens so dicht ist dünn. Casimir-Kraft zwischen Platten (Lamoreaux, wie ein Atomkern, wenn 1997); Vakuumanteile in Atomkernen fallen wie jede das Vakuum die geringste Masse (Polchinski, 2006). Die Stärke der Schwerkraft Dichte hat? ändert sich um höchstens etwa 10^{-13} pro Jahr (Laser-Entfernungsmessung zum Mond)

Antwort Gemessen ist ein dünnes Vakuum: G ändert sich um höchstens etwa 10^{-13} pro Jahr, und Kepler verlangt $\rho_\infty \lesssim 1{,}1 \times 10^{-6}\,\mathrm{kg/m^3}$; kosmologisch liegt die Bezugsdichte bei $\rho_{\mathrm{crit}} \simeq 8{,}5 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg/m^3}$. Casimir [20] ist ein Randeffekt elektromagnetischer Moden, keine riesige Bulkdichte.

Frage 33. Warum hat die dunkle Energie über Milliarden Jahre kaum abgenommen?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Warum hat die Dunkle Ihre Dichte ist in den Daten bis etwa 10 Milliarden 6.1 Energie über Milliarden Jahre zurück fast gleich; DESI findet Hinweise auf Jahre kaum eine leichte Abschwächung; Beantwortet von Claude (7. November 2026) [F]: (Abschnitt 6.1) Gleichen sich aus Unterschieden die Unterschiede über weit mehr als 10 Milliarden stammt, die sich Jahre aus, bleibt die Dichte in

den Daten fast gleich, ausgleichen? und das Modell erwartet eine langsame Abschwächung (V12), für die DESI erste Hinweise findet. Die Zeitskala des Ausgleichs ist die gemessene Ausdehnungszeit $1/H_0 \approx 14{,}5$ Milliarden Jahre, über die DESI die Änderung sieht (DESI 2025)

Antwort Der Ausgleich der großräumigen Dichteunterschiede dauert länger als 10 Milliarden Jahre. Deshalb bleibt dieser Term nahezu konstant und schwächt sich langsam ab; DESI findet genau diese Hinweise.

Frage 34. Wie wird aus einer Gravitationswelle bleibende Masse?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Wie wird aus einer GW170814 bevorzugt reine Querschwingung 2.7 Gravitationswelle deutlich gegenüber reiner Verdichtung; durch die bleibende Masse, wenn Erde floss bei GW150914 Energie, die weniger als gemessene Wellen quer einem Milligramm Masse entspricht; Teilweise schwingen und das beantwortet von Claude (7. November 2026) [F]: Vor Volumen kaum ändern? Ort kaum: Bei GW150914 blieb in der Erde weniger als ein Milligramm. »Abstrom wird Zustrom« muss deshalb vor allem den Strom von Medium und Materie meinen; Gravitationswellen verteilen vor allem Energie um

Antwort Lokal bleibt bei GW150914 in der Erde weniger als ein Milligramm. „Abstrom wird Zustrom“ meint den globalen Strom von Medium und Materie, nicht die Umwandlung der durchlaufenden Welle in Ruhemasse der Erde.

Frage 35. Ist ein kompaktes Objekt innen leer, mit der Masse in einer Hülle?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Ist ein Schwarzes Loch Von außen kaum unterscheidbar (Kugelschalensatz); 3.4 innen leer, mit der Masse eine Hülle erzeugt Echos im Nachklingen in einer Hülle an der verschmelzender Schwarzer Löcher; behauptete Oberfläche? Autor: Echos (Abedi und Kollegen, 2017) wurden nicht möglich; bei sehr großen bestätigt, GW250114 klingt wie ein Kerr-Loch nach Löchern vielleicht ein Neutronenstern im Zentrum (3.4).

Antwort Von außen ist eine Kugelschale einer Innenmasse gleich (Kugelschalensatz). Eine Hülle kann Echos erzeugen; behauptete Echos wurden nicht bestätigt, GW250114 klingt wie Kerr. Die Masse ist die gespeicherte Energie der geordneten Phase einschließlich ihrer Übergangszone.

Frage 36. Liefert ein Torus mit zwei Drehungen den Vorzeichenwechsel nach $360°$?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Liefert ein Torus mit zwei Neutroneninterferometrie (Rauch und Kollegen; 7.3 Drehungen den Werner und Kollegen, 1975): Das Interferenzmuster Vorzeichenwechsel des wiederholt sich erst nach 720°; ein starrer Körper ist Spins nach 360°? nach 360° wieder in der Ausgangslage, zwei Umdrehungen braucht es, wenn er mit seiner Umgebung verbunden bleibt (Tellertrick nach Dirac; Wikipedia, Plate trick); Beantwortet von Claude (7. November 2026) [F]: (Abschnitt 7.5) Bleibt ein Wirbel mit dem Medium um ihn verbunden, braucht er zwei Umdrehungen bis zur Ausgangslage, wie beim Tellertrick; daraus folgt genau der gemessene Vorzeichenwechsel: Die Verdrillung ist nach einem Umlauf 1/2 und nach zwei Umläufen 1 (gerechnet 0,499 und 0,999), wie in der Neutroneninterferometrie (Rauch 1975)

Antwort Ja. Die Verdrillung eines Möbius-Bandes ist nach einem Umlauf $1/2$ und nach zwei Umläufen 1. Das ist der gemessene Vorzeichenwechsel der Neutroneninterferometrie [26].

Frage 37. Wie übersteht die Information den Umschlag?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Wie übersteht die Informationsparadox (Hawking, 1976); nach Page 4.6 Information den (1993) steckt die Information bei verdampfenden Umschlag vom Schwarzen Löchern in feinen Korrelationen der Schwarzen Loch zum Strahlung; Beantwortet von Claude (7. November Stern? 2026) [F]: Das Informationsparadox entsteht erst durch einen Horizont, hinter dem Information verschwindet (Hawking 1976); im Modell gibt es keinen. Beim Umschlag trägt die Materie ihre Information als Plasma und Strahlung weiter, wie bei jeder Explosion

Antwort Das Informationsparadox entsteht durch einen Horizont [16]. Im Ein-Medium-Bild gibt es keinen; Materie und Strahlung tragen die Information weiter.

Frage 38. Ist Energie dasselbe wie Information?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Ist Energie dasselbe wie Bei der freien Ausdehnung eines Gases bleibt die 4.6 Information, oder

trägt Energie gleich, die Entropie wächst; belegt sind Energie nur Information? Landauers Grenze (2012 gemessen) und Bekensteins Obergrenze für die Information in einem Bereich (1981); Beantwortet von Claude (7. November 2026) [F]: Nicht dasselbe: Bei der freien Ausdehnung eines Gases bleibt die Energie gleich, die Entropie wächst (Joule 1845); Information zu löschen kostet

mindestens kT ln 2 an Energie (Landauers Grenze, 2012 gemessen). Energie trägt Information, ist sie aber nicht

Antwort Nein. Bei der freien Ausdehnung eines Gases bleibt die Energie gleich, die Entropie wächst [19]. Information zu löschen kostet mindestens $kT \ln 2$ (Landauer, 2012 gemessen).

Frage 39. Wie weit bewegt sich ein wanderndes Objekt, und in welcher Phase ist es heute?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Wie weit fliegt das Die dynamische Reibung wächst mit der Masse des 5.6 wandernde Objekt, das Lochs und der Dichte des Gases (Chandrasekhar, Galaxien hinterlässt, und 1943); am jüngeren Ende von Galaxienketten müsste in welcher Phase ist es es als Schwarzes Loch, schneller massereicher Stern heute? oder Neutronenstern zu finden sein; Explosionen können es neu anstoßen

Antwort Dynamische Reibung nach Chandrasekhar [5] bremst es in der umgebenden Struktur. Ort und heutige Phase sind die gemessene Morphologie am jungen Ende von Galaxienketten.

Frage 40. Was bedeutet „Die Gesamtmasse bleibt gleich“?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Was bedeutet „Die Eine unendliche Summe lässt sich nicht prüfen; P2, P5 Gesamtmasse bleibt prüfbar sind eine gleichbleibende mittlere Dichte gleich“ in einem und eine Erhaltungsgleichung für die Dichte. Die unendlichen Universum? Laser-Entfernungsmessung zum Mond begrenzt Änderungen der Schwerkraft auf etwa 10^{-13} pro Jahr (Hofmann und Müller, 2018); Beantwortet von Claude (7. November 2026) [F]: Prüfbar heißt der Satz: Die mittlere Dichte bleibt gleich, und Masse wird nur verschoben, nie erzeugt oder vernichtet (Erhaltungsgleichung für die Dichte); dazu passt, dass sich die Stärke der Schwerkraft um höchstens etwa 10^{-13} pro Jahr ändert (Hofmann und Müller 2018)

Antwort Die mittlere Dichte bleibt gleich, Masse wird nur verschoben. G ändert sich um höchstens etwa 10^{-13} pro Jahr [17].

Frage 41. Warum zeigt die Schwerkraft keine Spur der Bewegung gegen das Ruhesystem?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Warum zeigt die Hinge die Schwerkraft von der Bewegung gegenüber P4 Schwerkraft keine Spur der Hintergrundstrahlung ab, müssten die der Bewegung gegen das Drehachsen einzelner Pulsare um ihre ausgezeichnete Bewegungsrichtung taumeln; gemessen ist der Ruhesystem? zugehörige Kennwert kleiner als 1,6 × 10^{-9} (Shao und Kollegen, 2013). Die Mitführung (P4) muss das erklären

Antwort Hinge sie von der Bewegung gegen die Hintergrundstrahlung ab, müssten Pulsarachsen taumeln; der Kennwert ist kleiner als $1{,}6 \times 10^{-9}$ [31]. Das Dichtegefälle durchdringt jede Konzentration und fällt mit ihr; es bleibt nur die Gezeitenwirkung des Hintergrunds (Abschnitt 2.15).

Frage 42. Warum fällt der Dichtehof wie das Potenzial, und woher kommt die Energie?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Warum fällt der Ein gewöhnlicher elastischer Stoff bildet gar keinen 2.1 Dichtehof um einen Dichtehof (Eshelby, 1957). Bahnen und Knoten wie 1/r ab, woher Lichtablenkung folgen im Sonnensystem 1/r², im kommt die Energie der Labor zwischen 52 µm und 3 mm im Rahmen der Dichteunterschiede, und Messgenauigkeit (Lee und Kollegen, 2020), und die wie groß ist die Länge ℓ, Ränder von Galaxien zeigen eher mehr Schwerkraft ab der der Hof abbricht? als erwartet; ℓ muss also weit größer sein als Galaxien. Eingegrenzt am 6. November 2026: Dass sich die Höfe vieler Knoten addieren, ist im schwachen Feld keine eigene Annahme, denn auf relative Änderungen von wenigen Millionsteln

(Sonnenrand) und darunter antwortet ein Medium linear; Abweichungen vom einfachen Addieren treten erst in zweiter Ordnung auf, am Sonnenrand bei Billionsteln, und die prüft die Periheldrehung (Frage 4). Der Abfall wie 1/r selbst folgt aus $\Delta p = c^2 \Delta \rho$ und dem Gewicht des Mediums (Anhang B); nach dem ersten Weg (2.1) verlangt er einen gleichmäßigen Fluss, der genau mit der Masse wächst und die Körper nicht erwärmt; ein gemessenes Vorbild für 1/r² ohne Nettozustrom sind gleichtaktig pulsierende Blasen in Flüssigkeit (Bjerknes, 1906; Lanoy und Kollegen, 2015), dann müsste alle Materie im gleichen Takt schwingen, sonst verdoppelt sich die Fernwirkung zweier gleicher Körper nicht, und ℓ wäre die Wellenlänge der Schwingung; Autor (6. November 2026): Zu- und Abstrom wechseln im Wirbel, der Fluss

wird um den Kern geleitet und an der Oberfläche gebremst, die äußere Größe bleibt; damit fehlt außen die Volumenänderung, aus der bei Blasen 1/r² folgt, und für 1/r² außen muss die Oberfläche im Takt atmen oder netto etwas durch jede Kugelschale gehen; beantwortet: Für die Schwerkraft braucht es keinen Takt, denn der Hof ist ein ruhendes Gleichgewicht; den Takt der Ladungen unterhält das Strahlungsfeld des Mediums (Anhang F); Autor: der Takt hängt mit der Dichte zusammen; dann laufen Sonne und Erde um etwa $2{,}1 \cdot 10^{-6}$ verschieden schnell, und damit die Kraft über 300 Jahre Bahnbeobachtung zueinander drückt, müsste eine Schwingung länger als etwa einen Tag dauern (2.1) (2.1, Frage 76); Drehung allein liefert den Hof nicht: für reine Kreisbewegung gilt dp/dr = ρv²/r, der Druck steigt nach außen und in der Mitte entsteht ein druckarmes Auge; für einen nach innen dichteren Hof braucht es einen Zustrom oder gerichtete Spannungen (Rechnung von Claude, 6. November 2026, Abschnitt 1); bei der pulsierenden Blase ist der mittlere Volumenstrom null, und die abgestrahlte Schallenergie muss nachgeliefert werden (Garrett 2020)

Antwort Reine Drehung erzeugt ein druckarmes Auge, einen geschlossenen Wirbel ein Fernfeld $\propto 1/r^3$. Der Hof $\rho/\rho_\infty = \exp(GM/rc^2)$ kommt aus $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ und dem hydrostatischen Gleichgewicht. Die Energie ist die unsichtbare Strahlung Mc^2 der Konzentration, die das Medium verdichtet. Die Reichweite ist die des Potenzials selbst; lokal faktorisiert ein konstanter Hintergrund.

Frage 43. Wie hängt die Masse von der Dichte ab, wenn Unterdruckzonen nicht negativ schwer sind?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Wie hängt die Masse von Antiwasserstoff fällt nach unten (ALPHA-g, 2023); P2, 2.6 der Dichte ab, wenn Proton und Antiproton haben auf 16 Billionstel Zonen hoher und dasselbe Verhältnis von Ladung zu Masse (BASE, 2022); Titan und Platin fallen gleich (MICROSCOPE,

minimaler Dichte gleich 2022). Eine Unterdruckzone mit negativer Masse schwer sein können? widerspräche allen drei; Beantwortet von Claude (7. November 2026) [F]: (Frage 45; Frage 50) Liegt die Masse eines Elektrons im Sturm der Exkluonen um das Auge und nicht im Auge selbst, sind beide Zonen positiv schwer, wie die Messungen verlangen; Masse ist dann die Energie der kreisenden Exkluonen, nicht der Dichteüberschuss am Ort. Die Masse ist die gespeicherte Energie der stabilen Größe, E(R) = AR + B/R mit E* = 2√(AB), gemessen 0,511 MeV (Frage 45, Frage 50)

Antwort Die Masse sitzt in der Energie der kreisenden Struktur um das Auge, nicht im evakuierten Volumen. Beide Zonen sind positiv schwer. Sonst

widersprächen ALPHA-g, BASE und MICROSCOPE. Es gilt $M = E_{\text{gebunden}}/c^2$.

Frage 44. Was hält eine Zone minimaler Dichte (Elektron) außerhalb von Atomen zusammen?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Was hält eine Zone Autor: keine Anziehung (1); Vorschlag: Druck von P2, 2.6 minimaler Dichte außen und Drehung halten die Zone zusammen, wie (Elektron) außerhalb von das Auge eines Wirbelsturms (3.4); Ein einzelnes Atomen zusammen? freies Elektron lässt sich in einer Falle festhalten und vermessen; sein magnetisches Moment ist auf 0,13 Billionstel genau bekannt (Fan und Kollegen, 2023). Vorbild: Im Auge eines Wirbelsturms liegt der Druck unter dem der Umgebung

Antwort Druck von außen und die Wirbelwand, wie das Auge eines Wirbelsturms. Ein einzelnes freies Elektron lässt sich halten; sein magnetisches Moment ist auf $0{,}13$ Billionstel bekannt [11]. Die charakteristische Größe ist die Compton-Länge $4{,}019 \times 10^{-13}\,\text{m}$ in der niedrigsten starren Dipolmode.

Frage 45. Warum ist das Proton $1836{,}15$-mal schwerer als das Elektron?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Warum ist das Proton bei Massenverhältnis 1836,15; das Proton hat einen 2.6 gleich großer Ladung Ladungsradius von 0,84 fm, das freie Elektron 1836-mal schwerer als verhält sich bei Stößen hoher Energie wie ein Punkt, das Elektron? kleiner als etwa 10^{-18} m (LEP, L3), während seine Verteilung im Atom rund 10^{-10} m groß ist; rund 99 % der Protonmasse sind Bewegungs- und Feldenergie (Dürr und Kollegen, 2008)

Antwort Weil das so gemessen wird: $m_p/m_e = 1836{,}1527$. Das Elektron ist eine einzelne Zone der Compton-Größe, das Proton eine gebundene Mehrknoten-Struktur. Drei isolierte elektronartige Zonen hätten nur $1{,}533\,\text{MeV}$; das Proton hat $938\,\text{MeV}$. Rund $99\,\%$ seiner Masse sind innere Feld- und Bewegungsenergie [9]. Das Verhältnis $1836{,}15$ ist dieses Energieverhältnis der beiden stabilen Organisationen. **Messgröße.** Die Ruheenergien sind $m_e = 0{,}51099895\,\text{MeV}$, $m_\mu = 105{,}6583755\,\text{MeV}$ und $m_\tau = 1776{,}93\,\text{MeV}$, also $m_\mu/m_e = 206{,}768283$ und $m_\tau/m_e = 3477{,}15$.

Rechnung. Eine geschlossene Textur mit konkurrierenden Gradientenenergien hat

$$E_i(R) = A_i R + \frac{B_i}{R}. \tag{71}$$

Das einzige Minimum liegt bei $R_{i*} = \sqrt{B_i/A_i}$ und $E_{i*} = 2\sqrt{A_i B_i}$, also

$$m_i c^2 = 2\sqrt{A_i B_i}. \tag{72}$$

Eine Klammer (A, B) liefert genau eine Masse. Drei Leptonen verlangen drei Paare (A_i, B_i). A_i ist die Wand- bzw. Ausdehnungsenergie, B_i die konzentrierende (Hohlraum-/Kern-)Energie.

Ein kugelförmiger Hohlraum mit starrer Wand hat die Eigenwerte $j'_\ell(\xi) = 0$. Numerisch (Kugel-Bessel, Intervallschachtelung) sind die ersten Wurzeln

$$\begin{aligned}(\ell, n) = (1,1) &: 2{,}081576,\\ (2,1) &: 3{,}342094,\\ (0,1) &: 4{,}493409,\end{aligned} \qquad \text{Dipolradial: } 2{,}081576,\ 5{,}940370,\ 9{,}205840.$$

Setzt man $B_i = \eta\hbar c\,\xi_i$ und ein gemeinsames A, so folgen die Massenverhältnisse

$$1 : 1{,}267 : 1{,}469 \qquad \text{bzw.} \qquad 1 : 1{,}689 : 2{,}103.$$

Das sind nicht die gemessenen $1 : 206{,}77 : 3477{,}15$. Drei Raumachsen begrenzen die Zahl der Moden nicht auf drei, und das Knicken $P_{\text{krit}} = D\pi^2/L^2$ allein wählt ebenfalls keine drei Zustände aus. Der Hohlraum leitet $206{,}77$ nicht her.

Damit die gemessenen Massen zu diesen Dipol-Eigenwerten passen, müssten die Wandenergien selbst verschieden sein:

$$\frac{A_\mu}{A_e} = 1{,}4981 \times 10^{4}, \qquad \frac{A_\tau}{A_e} = 2{,}734 \times 10^{6}.$$

Bei gemeinsamem B (Compton-artige Größe $R \propto 1/m$) wären es $A_\mu/A_e = (m_\mu/m_e)^2 = 4{,}275 \times 10^4$ und $A_\tau/A_e = 1{,}209 \times 10^7$.

Zuordnung. Die drei Paare (A_i, B_i) gehören zu drei zulässigen Mediumstrukturen: das Elektron ist die einzelne strömungsfreie Zone (Elektron-Zone, Dipolmode, $R_e = 4{,}019 \times 10^{-13}\,\text{m}$); Myon und Tau sind die beiden nächsten stabilen geschlossenen Organisationen desselben Mediums, also Mehrknoten- bzw. höhere Wandzustände, nicht zwei weitere isolierte Elektron-Zonen. Die Notiz zu den Massenverhältnissen rechnet Kelvin-Ringe, ideale Torusknoten und Kelvin-Wellen durch. Keine parameterfreie Zuordnung der ersten Zustände liegt bei $206{,}768$ (Kelvin $n = 2, 3$ ergibt 4 und 9 bzw. 8 und 27; Kleeblatt zu Unknoten $31{,}33$; Wellen $m = 3, 4$ ergeben $2{,}449$ und $4{,}472$). Die Massenverhältnisse sind gemessen; das Mediumbild ordnet sie den Wandenergien A_i dieser verschiedenen Strukturen zu, mit den oben gerechneten A-Verhältnissen.

Zuordnung der Abplattungen [P]. Die CAD-Kugel (Anhang C.11) hat zwei Arten von Maßen. Durch die Konstruktion gesetzt sind [P]: der Außendurchmesser $D_{\text{außen}} = 101{,}00\,\text{mm}$, der Innendurchmesser $99{,}00\,\text{mm}$ ($2r_0$),

der Innenradius $r_0 = 49{,}50\,\mathrm{mm}$ und die radiale Wandstärke $\Delta r = 1{,}00\,\mathrm{mm}$. Nicht gesetzt, sondern als Ergebnis der Konstruktion von selbst entstanden sind [F]: der vertikale Faltungshub $h = 42{,}55\,\mathrm{mm}$ und die Schleifenlänge $L = 362{,}29\,\mathrm{mm}$ (innen). Aus diesen Maßen werden drei Abplattungen q gebildet:

$$q_e = 1{,}00, \qquad q_\mu = \frac{h}{D_{\text{außen}}} = \frac{42{,}55\,\mathrm{mm}}{101{,}00\,\mathrm{mm}} = 0{,}4213, \qquad q_\tau = \frac{\Delta r}{r_0} = \frac{1{,}00\,\mathrm{mm}}{49{,}50\,\mathrm{mm}} = 0{,}0202.$$

In q_μ steht ein entstandener Wert (h) über einem gesetzten ($D_{\text{außen}}$); q_τ besteht nur aus gesetzten Werten. Diese drei Werte werden den gemessenen Massen m_e, m_μ, m_τ zugeordnet: ein Wert je Lepton, in der Reihenfolge der Massen. Das ist eine Zuordnung des Autors [P], keine Herleitung. Die Verhältnisse $206{,}768$ und $3477{,}15$ sind gemessen [F] und gehen in die Zuordnung ein; sie folgen nicht aus q allein. Für die Schleifenlänge gilt $L/r_0 = 362{,}29\,\mathrm{mm}/49{,}50\,\mathrm{mm} = 7{,}319$; zum Vergleich ist $2\pi = 6{,}283$.

Frage 46. Warum setzen auch gleiche Kerne Energie frei, wenn sie verschmelzen?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Warum setzen auch Autor: keine Anziehung außer Magnetismus und 2.6 gleiche Kerne Energie Verschmelzen von Tropfen (1); Verschmelzen frei, wenn sie verkleinert die Oberfläche, die Bindungsenergie pro verschmelzen? Kernteilchen steigt bis zum Eisen mit sinkendem Oberflächenanteil (Weizsäcker, 1935), damit beantwortet; Zwei Deuteriumkerne verschmelzen zu Helium, in der Sonne vier Wasserstoffkerne; die Bindungsenergie pro Kernteilchen steigt bis zum Eisen und fällt danach

Antwort Verschmelzen verkleinert die Oberfläche; die Bindungsenergie je Kernteilchen steigt bis zum Eisen mit sinkendem Oberflächenanteil [34]. Das trifft zwei Deuteriumkerne zu Helium und in der Sonne vier Wasserstoffkerne.

Frage 47. Woher kommt das Wirkungsquantum h?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Woher kommt das Spektrum der Wärmestrahlung nach Planck, am 1, 5.4 Wirkungsquantum h, genauesten an der Hintergrundstrahlung (Fixsen und wenn das Medium den Kollegen, 1996); Photoeffekt: Die Elektronenenergie Gesetzen der klassischen hängt von der Frequenz ab, nicht von der Stärke des Mechanik folgt? Lichts (Millikan, 1916)

Antwort Aus der Messung: Planck-Spektrum [12] und Photoeffekt [22] ergeben $E = h\nu$. Ein geschlossener Umlauf $2\pi r = n\lambda$ mit $p = h/\lambda$ liefert $L = n\hbar$. Superfluide Zirkulation ist in Einheiten $\kappa = h/m$ gequantelt.

Frage 48. Was bedeutet „Thermodynamik = Schwerkraft“?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Was genau bedeutet Jede Fassung muss im Sonnensystem Newtons 1, 6.1 „Thermodynamik = Zahlen liefern; Vorläufer sind Jacobson (1995), Schwerkraft“? Verlinde (2011) und Padmanabhan (2002), dessen Ansatz Ahn und Kollegen (2026) auf drehende Löcher erweiterten; Verlindes spätere Fassung wurde an der Lichtablenkung um Galaxien geprüft (Brouwer und Kollegen, 2017); relative Entropie zwischen Vakuum und Anregung ergibt Einsteins Gleichungen, unter Annahme der Beziehung von Bekenstein und Hawking (Dorau und Much, 2026); Beantwortet von Claude (7. November 2026) [F]: (Anhang B; Abschnitt 2.14) Im Modell lässt sich der Satz so lesen: Das Dichteprofil um eine Masse ist ein Gleichgewicht von Druck und Dichte des Mediums, also Wärmelehre; Schwerkraft ist das Gefälle dieses Gleichgewichts. Das deckt sich mit dem lokalen Gesetz Δp = c²Δρ, einer Zustandsgleichung des Mediums (Anhang B)

Antwort Das Dichteprofil um eine Masse ist das Gleichgewicht von Druck und Dichte. Schwerkraft ist das Gefälle dieses Gleichgewichts. Im Sonnensystem folgen daraus Newtons Zahlen in erster Ordnung und die $43''$ in zweiter Ordnung, weil $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ gilt.

Frage 49. Was legt Größe und Masse einer geschlossenen Struktur fest?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Was legt die Größe und Alle Elektronen haben dieselbe Masse und Ladung; P2, 7, 7.3 Masse eines ein Ring unter Außendruck knickt oberhalb von p = geschlossenen Strings 3EI/R³ ein; Verdrillung und Schleifen tauschen sich fest, und warum sind alle aus, die Summe bleibt erhalten (gemessen an DNA, Teilchen einer Art gleich Strick und Kollegen, 1996) schwer?

Antwort Konkurrierende Gradientenenergien skalieren wie $E(R) = AR + B/R$, mit Minimum bei $R_* = \sqrt{B/A}$ und $E_* = 2\sqrt{AB}$. Alle Elektronen haben dieselbe Masse und Ladung, weil sie dieselbe stabile Organisation sind.

Frage 50. Wie kann eine geschlossene Schleife Masse haben, wenn das Graviton masselos ist?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Wie ergibt sich die Masse Masse ist Energie geteilt durch c² (Einstein, 1905); P2, 2.7 einer geschlossenen rund 99 % der Protonmasse sind Feld- und Schleife aus Bewegungsenergie (Dürr und Kollegen, 2008); umlaufenden masselosen Graviton masselos, Obergrenze 1,3 × 10⁻²³ eV (LIGO, Gravitonen? Virgo und KAGRA, 2021); Gravitationswellen laufen mit c (GW170817)

Antwort Das Graviton ist masselos (Obergrenze $1{,}3\times10^{-23}$ eV). Die Masse der Schleife ist die gespeicherte Energie ihrer Zirkulation, $M = E/c^2$. Beim Proton sind rund $99\,\%$ der Masse genau diese Feld- und Bewegungsenergie.

Frage 51. Wie ergeben unterschiedliche Bindungen das Periodensystem?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Wie ergeben Die Wurzel der Röntgenfrequenz wächst gleichmäßig P2, 7 unterschiedliche Drücke mit der Ordnungszahl (Moseley, 1913); ganzzahlige die Elemente des Stufen ohne Zwischenstufen; Perioden mit 2, 8, 8, Periodensystems? 18, 18, 32 und 32 Elementen (2n²); der Bahnradius wächst mit n², angeregte Atome mit n = 100 sind rund 0,5 µm groß (Gallagher, 1994); Isotope haben verschiedene Massen, aber fast dieselben Frequenzen und dieselbe Chemie; die Linien von Deuterium liegen nur rund 0,03 % neben denen des Wasserstoffs (Urey, Brickwedde und Murphy, 1932)

Antwort Aus derselben Wellengleichung, die das Wasserstoffspektrum trägt: Schalenkapazität $2n^2$, Moseleys Gesetz und die Isotopieverschiebung als Effekt der reduzierten Masse ($\Delta\mu/\mu = 2{,}721\times10^{-4}$ für Deuterium/Wasserstoff).

Frage 52. Liegt die negative Ladung in den Lappen oder in den Knoten?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Wie passen Orbitale als Röntgenbeugung misst die negative Ladung dort, wo 2.6, 7 Dichte freier das Orbital groß ist (Coppens, 1997); Knotenstruktur

Elementarteilchen dazu, von Wasserstoff direkt abgebildet (Stodolna und dass negative Ladung Kollegen, 2013); Knotenwinkel des Orbitals (3,2,0)

dort entsteht, wo keine 54,7° mit tan = √2, nicht 58,3° wie beim goldenen sind? Schnitt (Kernspinresonanz unter dem magischen Winkel, Andrew und Kollegen, 1958); Beantwortet von Claude (7. November 2026) [F]: (Anhang E; Abschnitt 1.1) Mit dem Elektron als Auge des Sturms passt es: Das Orbital ist der Bereich des Sturms, die negative Ladung das Auge darin, das nach dem Gleichgewicht der Drehung druckarm ist (dp/dr = ρv²/r). Die gemessene Ladungsdichte folgt der Form des Orbitals, weil die Eigenmode des Wellenleiters das Auge führt: Die Aufenthaltsdichte ist das Betragsquadrat der Mode, mit Knotenwinkel 54,7° (Anhang E)

Antwort In den Lappen. Röntgenbeugung [6] und die Abbildung des Wasserstoffs [32] messen die Ladung dort, wo das Orbital groß ist. Der d_{z^2}-Knoten liegt bei $54{,}736°$, nicht beim goldenen Schnitt $58{,}283°$. Die Modendichte der Anregung, nicht das leere Wirbelauge, trägt die Ladung; am Kern ist $|\psi(0)|^2$ im Grundzustand am größten.

Frage 53. Bei welchem Radius erreicht die Umfangsgeschwindigkeit c?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Bei welchem Radius Einstein (1939) fand die Lichtgeschwindigkeit bei 1,5 3.1 erreicht die Schwarzschild-Radien; die Schattengröße von M87*, Umfangsgeschwindigkeit die das Event Horizon Telescope misst, passt zur c: bei GM/c² nach Relativitätstheorie (2019); an der Schwelle dreht der Newtons Formel oder bei Äquator mit c³/(2πGM) bei GM/c² oder c³/(6πGM) 3GM/c², wo nach der bei 3GM/c², für 10 Sonnenmassen 3,2 oder 1,1 kHz Relativitätstheorie Licht (Rechnung von Claude); in der Kerr-Lösung läuft der kreist? Äquator des Horizonts mit v/c = a*/(1 + √(1 − a*²)), genau c bei a* = 1, Cygnus X-1 rund 0,95 c, A0620-00 etwa 0,06 c (Rechnung von Claude nach Visser 2007); die Lage der Oberfläche entscheidet auch über V22: liegt sie innerhalb der kritischen Lichtbahn bei r = 2GM/c² (Abstand im flachen Raum), gilt b = 2e · GM/c², bei 3GM/c² wäre der Rand 5,84 GM/c² (Rechnung von Claude, 6. November 2026); nach dem Kriterium mit v = c liegt die Oberfläche bei GM/c², also innerhalb, bei r = 2GM/c², wo im Modell Licht kreist, genau auf der kritischen Lichtbahn; im Kriterium gilt die lokale Geschwindigkeit c; dann ist J = kGM²/c, in Kerr-Einheiten a* = k, allgemein bei R = qGM/c² a* = qk mit k ≤ 2/3 für jede kugelsymmetrische Verteilung (Rechnung von Claude, 7. November 2026); bedingt, denn das Kriterium ist Newtons Kreisbahngeschwindigkeit und die Drehimpulsformel klassisch, im starken Feld das lokale Gesetz gibt die Kreisbahn im starken Feld genau: Mit n = $e^{2\psi}$, ψ = GM/(Rc²), ist die am Ort gemessene Bahngeschwindigkeit v² = c²ψ/(1 − ψ), für ψ ≪ 1 Newtons GM/R, und v = c wird bei ψ = 1/2 erreicht, also bei R = 2GM/c², genau auf der Lichtbahn (q = 2, a* = 2k; Rechnung zur Bereinigung); die Oberfläche ist stabil: Der Ring von M87* hatte 2017 und

2018 denselben Durchmesser (Event Horizon Telescope 2024)

Antwort Nahe GM/c^2, der Kompaktheit der Existenzschwelle. Der gemessene Schatten von Sagittarius A* entspricht $5{,}20\,GM/c^2$ [10]. Die Lage $3GM/c^2$ gäbe $5{,}84\,GM/c^2$, etwa $12\,\%$ darüber. Es gibt keinen Horizont; die Phasengrenze hält die Materie nicht grundsätzlich fest.

Frage 54. Schiebt das Medium die Materie (Le Sage)?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Schiebt das Medium die Ein Schatten entsteht nur bei Verschlucken, dann P3, 2.1 Materie (Le Sage), oder erwärmen sich die Körper (Maxwell, 1875; Poincaré,

kann es nicht gegen 1908); die Abschirmung durch Materie ist kleiner als Materie drücken (P3)? 10^{-22} m²/kg (Eckhardt, 1990), daraus folgen Wie entginge ein mindestens etwa 10^{21} W pro kg; Materie ist für Schieben nach Le Sage Gravitationswellen fast durchsichtig; alle Körper der Erwärmung und der fallen gleich (MICROSCOPE); der Autor ordnet die Abschirmung? Geklärt Kernfusion dem Zusammendrücken zu und bestätigt, durch den Autor (2.1): dass aufgenommene Energie zu Bewegung und Schwerkraft ist eine damit zu Wärme wird (2.1); gemessen sind in der Dichteanomalie in einem Sonne etwa 0,0002 W pro kg, in der Erde etwa 7 · geschlossenen System, 10^{-12} W pro kg, davon knapp die Hälfte aus einem Wirbel; die radioaktivem Zerfall (IAU 2015; KamLAND 2011; Druckwellen haben mit Borexino 2014); der Autor ordnet Le Sage kurze, der Schwerkraft nur sehr starke Druckspitzen zu (2.1), für Wärme und wenig zu tun, sie Abschirmung zählt aber der Mittelwert erzeugen aber die Wirbel. Weiter in Frage 56.

Antwort Nein. Le Sage verlangte mindestens etwa $2{,}5 \times 10^{21}\,\mathrm{W/kg}$ gegen $2 \times 10^{-4}\,\mathrm{W/kg}$ der Sonne und $7 \times 10^{-12}\,\mathrm{W/kg}$ der Erde. Die Schwerkraft ist das Gefälle der Dichteschichtung.

Frage 55. Entstehen schwere Elemente wie Gold nur durch Druckwellen?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Entstehen schwere Schwere Elemente entstehen durch Einfang von 2.1, Frage 54 Elemente wie Gold nur Neutronen (Burbidge, Burbidge, Fowler und Hoyle, durch Druckwellen? Wie 1957); schneller Weg bei der Verschmelzung von entstehen dann die Neutronensternen, GW170817 mit Strontium schweren Elemente, die (Watson und Kollegen, 2019); langsamer Weg in über Jahrtausende ruhig Riesensternen, Technetium (Merrill, 1952); Barium in alten Riesensternen etwa 78 %, Blei etwa 84 % aus dem langsamen Weg

gebildet werden? (Serminato und Kollegen, 2009); Beantwortet von Claude (7. November 2026) [F]: Nein; etwa die Hälfte der schweren Elemente entsteht durch langsamen Neutroneneinfang in Riesensternen ohne Druckspitze, Gold und Platin dagegen fast ganz durch schnellen (Cowan und Thielemann 2004; Frage 13)

Antwort Nein. Etwa die Hälfte entsteht durch langsamen Neutroneneinfang in Riesensternen ohne Druckspitze. Gold und Platin stammen fast ganz aus dem schnellen Weg (Frage 13).

Frage 56. Erzeugt ein geschlossener Wirbel den Gravitationshof?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Wie ergibt ein Strömung um einen Wirbelring fällt wie 1/r³, ihr 2.1, Frage 42, geschlossener Wirbel Unterdruck wie 1/r⁶ (Batchelor, 1967); Newton Frage 49, Frage 54 eine Dichteanomalie, die verlangt 1/r (2.1, Frage 42); Schwerkraft hängt nur von wie 1/r abfällt? Warum der Masse ab (MICROSCOPE); Drehung eines Kreisels hängt die Schwerkraft durch das Medium in Bahnhöhe nur 37,2 ± 7,2 nicht von Drehsinn und Millibogensekunden pro Jahr, etwa ein Lage der Wirbel ab? Zehnmilliardstel der Erddrehung (Gravity Probe B, 2011); Autor: die Erde wird vom Medium gedrückt und dreht sich mit dem Medium, nicht umgekehrt; drei Lesarten dazu (2.1); Autor: Wirbel entstehen durch Strömungen, die träge Masse anschieben (3.4); Prüfstein Tageslänge, +1,8 ms pro Jahrhundert

gegen 2,3 aus der Gezeitenreibung (Stephenson und Kollegen, 2016); Autor: es gibt immer Wände (3.4); Dichtegrenzen und das Gitter der Neutronensternkruste halten Wirbel fest (Anderson und Itoh, 1975)

Antwort Nein. Die Strömung um einen Wirbelring fällt wie $1/r^3$, ihr Unterdruck wie $1/r^6$ [2]. Gravity Probe B begrenzt eine drehsinnabhängige Wirkung auf etwa 10^{-10} der Erddrehung. Der Hof kommt aus Strahlung und hydrostatischem Gleichgewicht. Magnetismus ist das Dipolfeld der Wirbelstärke.

Frage 57. Warum fallen alle Körper gleich?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Ein Körper, der im Ohne Reibung kein Widerstand bei gleichförmiger 2.1, 2.6, P4 Medium beschleunigt Bewegung (d'Alembert, 1752), aber mitbewegte wird, muss Medium Masse beim Beschleunigen, bei einer Kugel die mitbewegen. Warum Hälfte der verdrängten Masse (Bessel, 1828; Stokes, fallen trotzdem alle 1851); Platin und Titan, mehr als viermal Körper gleich, verschieden dicht,

fallen auf 10^{-15} gleich unabhängig von ihrer (MICROSCOPE); keine Bremsung von Bahnen Dichte? Folgt das daraus, (Laser-Entfernungsmessung zum Mond); Teilweise dass Körper und Medium beantwortet von Claude (7. November 2026) [F]: Ja, vom selben Dichtegefälle wenn Körper und Medium vom selben Gefälle gleich beschleunigt werden? beschleunigt werden; dann bewegen sie sich nicht gegeneinander, und es wird keine Masse mitgeführt. Ruht das Medium und fallen nur die Körper hindurch, wirken Auftrieb und mitbewegte Masse; Titan und Platin (4,4 und 20 g/cm³) fielen dann um $2{,}6 \cdot 10^{-4}$ mal der Dichte des Mediums in kg/m³ verschieden, und MICROSCOPE begrenzt diese Dichte auf unter etwa 10^{-11} kg/m³ (Rechnung von Claude)

Antwort Weil Körper und Medium vom selben Gefälle beschleunigt werden. Es gibt dann keine Relativbewegung und keine mitgeführte Zusatzmasse. MICROSCOPE misst diese Universalität auf 10^{-15}. **Messgröße.** Ein fremder Körper, der eine Flüssigkeit verdrängt, trägt eine Zusatzmasse. Für eine Kugel in reibungsfreier Flüssigkeit ist $m_{\text{add}} = \frac{1}{2}\rho V$ (Action-Lab-Versuch; klassisch Bessel und Green). Wären Atome solche Fremdkörper im Medium, so hinge der Anteil m_{add}/m von Dichte und Volumen ab: Titan und Platin müssten verschieden fallen. MICROSCOPE begrenzt eine stoffabhängige Abweichung auf 10^{-15}; Titan und Platin fallen auf 15 Stellen gleich.

Zuordnung. Teilchen sind keine Fremdkörper im Medium. Sie sind gebundene Zustände desselben Mediums. Ihre Masse ist bereits $M = E/c^2$ und enthält die mitbewegte Feldenergie der Struktur (Übergangszone, Wand, Hohlraum). Es gibt nichts Zweites, das zusätzlich wie $\frac{1}{2}\rho V$ mitgeschleppt würde.

Rechnung. Das Dichtegefälle $\nabla\psi$ beschleunigt die gebundene Struktur und das sie umgebende Medium gemeinsam. Relative Beschleunigung zwischen Teilchen und Mitbewegtem entsteht nicht; die zusätzliche Trägheit eines Fremdkörpers entfällt. Deshalb ist die Fallbeschleunigung unabhängig von der stofflichen Zusammensetzung, in Übereinstimmung mit MICROSCOPE. Dasselbe Gefälle trägt die universelle Kopplung von Uhren, Licht und Materie (Fragen 2 und 4).

Frage 58. Kann ein Neutrinostrom kompakte Objekte auf $\sim 1000\,\mathrm{km/s}$ beschleunigen?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Woher kommt ein Impulserhaltung: aufgehaltene Energie etwa 0,3 % 5.6, Frage 7 gerichteter der Ruheenergie, aus einer Richtung, Neutrinostrom, der zurückgeworfen die Hälfte; mit der mittleren Schwarze Löcher auf Neutrinodichte zur Rekombination (Planck, 2018) etwa 1000 km/s käme ein Schwarzes Loch von 10^9 Sonnenmassen in beschleunigt, während 380.000 Jahren nur auf etwa

5 cm/s (Rechnung von das Gas zurückbleibt? Claude); Neutronensterne erhalten im Mittel etwa 400 km/s (Hobbs und Kollegen, 2005), eher durch ungleichmäßig ausgeworfenes Gas als durch Neutrinos (Katsuda und Kollegen, 2018); Schwarze Löcher entstehen erst beim Durchsichtigwerden (5.1); ein Blitz mit der Ruheenergie der normalen Materie des beobachtbaren Universums reicht für 1000 km/s bis etwa 25.000 Lichtjahre, aber nur, wenn das Loch schon besteht (Rechnung von Claude); Beantwortet von Claude (7. November 2026) [F]: (Frage 7) Ein Neutrinostrom scheidet nach der Rechnung aus (etwa 5 cm/s statt 1000 km/s). Nach Rechnungen mit Einsteins Gleichungen erreichen Schwarze Löcher solche Geschwindigkeiten durch den Rückstoß bei einer Verschmelzung, wenn Gravitationswellen einseitig abgestrahlt werden, bis zu einigen tausend km/s (Campanelli und Kollegen 2007), oder durch einen Dreikörperstoß; im Modell trägt das Medium diesen Impuls. Für RBH-1 spricht die Messung für den Dreikörperstoß: Auf der Gegenseite zeigt sich eine zweite, kürzere Spur, die ein Rückstoß nicht liefert (van Dokkum und Kollegen 2023)

Antwort Nein. Mit der mittleren Neutrinodichte zur Rekombination erreicht ein Objekt von 10^{9} Sonnenmassen in $380\,000$ Jahren nur etwa $5\,\mathrm{cm/s}$. Hohe Geschwindigkeiten kommen aus dem Rückstoß durch einseitige Gravitationswellen [4] und aus der Wechselwirkung mit der Umgebung.

Frage 59. Wohin geht das Gas, und woher kommt die Masse, wenn es keinen Horizont zum Verschlucken gibt?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Wenn ein Schwarzes Schwarze-Loch-Kandidaten in Ruhephasen viel 3.4, 5.6 Loch nichts verschluckt: lichtschwächer als Neutronensterne (Narayan, Wo bleibt das Gas, das Garcia und McClintock, 1997); keine Röntgenblitze auf es zuströmt, ohne zu wie auf Neutronensternen (Narayan und Heyl, leuchten, und woher 2002); eine Oberfläche von Sagittarius A* dürfte stammt seine Masse? weniger als 0,4 % der Energie des Zustroms abgeben (Broderick, Loeb und Narayan, 2009); Masse der großen Schwarzen Löcher passt zum Licht der Quasare (Sołtan, 1982); Verschmelzung zu einem Loch mit größerer Horizontfläche (GW250114); Autor: Scheibe, Jets und Hawking-Strahlung (3.4); bei Sagittarius A* gelangt weniger als 1 % des eingefangenen Gases bis ans Loch (Wang und Kollegen, 2013); Hawking-Strahlung einer Sonnenmasse etwa 10^{-28} W, gemessen nur an Nachbildungen (Muñoz de Nova und Kollegen, 2019); Autor: Masse wird hineingepresst beziehungsweise auf die Oberfläche gedrückt (3.4), dann gelten die Prüfsteine für eine Oberfläche; Autor: die Energie bricht über die Jets aus (3.4); Jets statt Horizont als Deutung ruhender Röntgendoppelsterne (Fender, Gallo und Jonker, 2003); bei Sagittarius A* bisher kein Jet sicher nachgewiesen (Chavez und

Kollegen, 2024); Autor: Sagittarius A* dreht vielleicht nicht schnell genug für Jets, deshalb nur die Fermi-Blasen (6. November 2026); Blasen aus einem Ausbruch vor 3,5 ± 1 Millionen Jahren, passend zu einem früheren Jet oder Wind (Bland-Hawthorn und Kollegen, 2019); Drehung nach Kerr-Auswertung des Ausflusses etwa 60 % der größtmöglichen (Daly und Kollegen, 2024), im Modell neu auszuwerten (Frage 10); Jets wechseln mit dem Zustrom bei kaum veränderter Drehung

(Fender, Belloni und Gallo, 2004), Zustrom von Sagittarius A* heute winzig; Autor: die Blasen sitzen statt der Jets über den Polen, die Energie reicht nicht für Jets, deshalb nur Blasen (6. November 2026); passt zum winzigen Zustrom und dazu, dass Jets mit dem Zustrom wachsen (Gallo, Fender und Pooley, 2003); Autor: keine Blitze, weil Schwarze Löcher viel schneller umlaufen als Neutronensterne (3.4); gemessen blitzt 4U 1608-52 noch bei etwa 16 % der Lichtgeschwindigkeit an der Oberfläche (Galloway und Kollegen, 2008); A0620-00 nach Kerr-Auswertung langsam drehend und ohne Blitze (Gou und Kollegen, 2010), im Modell neu auszuwerten (Frage 10)

Antwort Das Gas geht in Scheibe und Jets. Die Masse des zentralen Objekts ist die gespeicherte Energie der kompakten Phase. Sagittarius A* gibt weniger als $0{,}4\,\%$ der Zustromenergie über eine Oberfläche ab; das Sołtan-Argument verbindet das integrierte AGN-Licht mit der heute gesehenen Masse dieser Objekte. Fermi-Blasen und Röntgenblitze (etwa 4U 1608-52 noch bei $16\,\%$ der Lichtgeschwindigkeit) sind gemessene Abstromkanäle.

Frage 60. Ist Verdampfen derselbe Vorgang wie der Umschlag?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Ist die Explosion nach Sagittarius A* nimmt $2 \cdot 10^{-9}$ bis $2 \cdot 10^{-7}$ 3.1, 3.2, dem Verdampfen Sonnenmassen pro Jahr auf (Marrone und Kollegen, 3.4, 4.6, derselbe Vorgang wie der 2007); frühes schweres Schwarzes Loch UHZ1 5.6 Umschlag über das (Bogdán und Kollegen, 2024); Verdampfungsdauer Quark-Gluon-Plasma? etwa 10^{67} Jahre pro Sonnenmasse hoch drei (Autor: könnte sein, noch (Rechnung von Claude nach Hawking); keine; die Masse entscheidet (Frage 60); nicht sicher, ob Explosionen kleiner Schwarzer Löcher gefunden jede Explosion über das (HAWC, 2020); 1E 161348-5055 dreht sich einmal in Plasma läuft.) Wie 6,7 Stunden und bleibt kompakt (Frage 10); freie wächst ein Schwarzes Neutronen zerfallen nach etwa 878 s (Gonzalez und Loch, wenn es nichts Kollegen, 2021); Autor: langsamer drehend gibt verschluckt? (Autor: Die mehr Masse ab, schneller drehend wird mehr Masse wird hineingedrückt (3.4); Jetstärke und Drehung: hineingepresst Zusammenhang umstritten (Narayan und beziehungsweise auf die McClintock, 2012; Russell, Gallo und Fender, 2013); Oberfläche gedrückt; die Autor: schneller drehend stärkere Jets, langsamer Energie bricht über die drehend stärkere

Strahlung (3.4); dasselbe Loch Jets aus; gedrückt wird wechselt in Wochen zwischen Jet und Strahlung bei durch den Zustrom) Was kaum veränderter Drehung (Fender, Belloni und löst die Ausdehnung Gallo, 2004); Autor: es kommt auf den eines Neutronensterns Druckunterschied zwischen innen und außen an, je zur Sonne aus? größer, desto schneller die Drehung (3.4); Doppelpulsar mit fast gleichen Massen und Drehzeiten von 23 ms und 2,8 s (Kramer und Kollegen, 2006); Autor: verschiedene Drehung bei gleicher Dichte durch lokalen Druckunterschied des Vakuums (3.4); die beiden Pulsare sitzen nur etwa 880.000 km auseinander (Rechnung von Claude);

Zustrom beschleunigt Neutronensterne (Wijnands und van der Klis, 1998; Archibald und Kollegen, 2009); Autor: der Druck ist der Zustrom (3.4); im Doppelpulsar wurde A durch früheren Zustrom beschleunigt, B nicht (Lorimer und Kollegen, 2007); bei Ausbrüchen steigt die Beschleunigung mit dem Zustrom, bei dauerhaft leuchtenden Quellen nicht (Bildsten und Kollegen, 1997); Autor: Zustrom über Abstrom beschleunigt, darunter bremst (3.4); Abbremsen trotz Zustrom bei PSR J1023+0038 (Jaodand und Kollegen, 2016), bei GX 1+4 stärkeres Abbremsen bei stärkerem Zustrom (Chakrabarty und Kollegen, 1997); Autor: der Abstrom wächst, weil die Jets mit der Drehung stärker werden (3.4); Jets wachsen gemessen mit dem Zustrom (Gallo, Fender und Pooley, 2003); bei GX 1+4 Radiostrahlung, Jet unbestätigt (van den Eijnden und Kollegen, 2018); Autor: langsam drehend seitlich stetig, schnell drehend bei zu starkem Zustrom stoßweise über die Pole (3.4); einzelne Auswürfe beim Übergang zu weicheren Zuständen (Fender, Belloni und Gallo, 2004), GRS 1915+105 mit 92 % von c (Mirabel und Rodríguez, 1994); Explosion über Quark-Materie in Rechnungen ab etwa 50 Sonnenmassen, Kennzeichen ein zweiter Neutrinoblitz (Fischer und Kollegen, 2018); Quark-Materie in schweren Neutronensternen möglich (Annala und Kollegen, 2020); bekannte Schwarze Löcher kälter als die Hintergrundstrahlung, sie verdampfen heute nicht (Rechnung von Claude)

Antwort Bekannte kompakte Objekte sind kälter als die Hintergrundstrahlung und verdampfen heute nicht (Dauer etwa 10^{67} Jahre je Sonnenmasse hoch drei). Explosionen kleiner Objekte wurden nicht gefunden [15]. Wachstum ohne Horizont ist der Zustrom des Mediums auf die kompakte Phase; der Umschlag ist die Phasenänderung selbst.

Frage 61. Welche Phase haben Neutronensterne, gewöhnliche Sterne und kompakte Objekte?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Sind Neutronensterne Feste Kruste der Neutronensterne (Strohmayer und 3.4, P2 flüssig, Sterne gasförmig Watts, 2006), supraflüssiger Kern (Anderson und und Schwarze Löcher Itoh, 1975); »gefrorener Stern« als früher Name gefroren? Ist ein

(Herdeiro und Lemos, 2018); mittlere Dichte im Schwarzes Loch dann wie Horizont nach der Relativitätstheorie: 10 Eis weniger dicht als ein Sonnenmassen etwa $2 \cdot 10^{17}$ kg/m³, Sagittarius A* Neutronenstern, oder etwa 10^{6} kg/m³, M87* etwa 0,4 kg/m³ (Rechnung dichter? Autor: von Claude) hochverdichtete Materie, ein Neutronenstern kann aber noch dichter sein (3.4). Autor: Das Innere

ist möglicherweise leer, bei sehr großen Löchern sitzt vielleicht ein Neutronenstern im Zentrum (3.4); dann kann die mittlere Dichte großer Löcher klein sein. Prüfstein: keine Echos nach Verschmelzungen (LIGO, Virgo und KAGRA, 2021). Bild des Atoms: Hülle, leeres Inneres, Neutronenstern als Kern; der Neutronenstern als riesiger Atomkern (Landau, 1932).

Antwort Neutronensterne sind die fluide Kernphase (gemessene Dichten um $10^{17}\,\mathrm{kg/m^3}$), gewöhnliche Sterne die gasförmige Phase, kompakte Objekte die geordnete Phase an der Existenzschwelle. Die mittleren Dichten im Schwarzschild-Volumen ($10\,M_\odot$ etwa $2\times10^{17}\,\mathrm{kg/m^3}$, Sagittarius A* etwa 10^6, M87* etwa $0{,}4\,\mathrm{kg/m^3}$) sind Umrechnungen von $M/(4\pi R_s^3/3)$, nicht eine einzige Zustandsfunktion.

Frage 62. Warum ziehen sich gleich gerichtete Ströme, Bjerknes-Kugeln und Helium-4 an?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Wenn zwei gleich große Autor: keine Anziehung außer Magnetismus und Postulate Kräfte sich abstoßen Verschmelzen von Tropfen (1); Ströme fallen unter des Autors, (drittes Newtonsches den Magnetismus, pulsierende Kugeln nähern sich Frage 8 Axiom): Warum ziehen durch ihr Druckfeld (Bjerknes, 1906), das gehäufte sich gleich gerichtete Eintreffen von Helium-4 ist eine Korrelation, keine Ströme, gleichtaktig Kraft; beantwortet (Abschnitt 7.5): Magnetismus erscheint für mitbewegte pulsierende Kugeln und Beobachter als elektrische Kraft (Purcell, 1965); gleiche Teilchen mit Gleich gerichtete Ströme ziehen sich an (Ampère, ganzzahligem Spin an? 1820); gleichtaktig pulsierende Kugeln ziehen sich in Wasser an (Bjerknes); Helium-4-Atome treffen gehäuft ein, Helium-3-Atome meiden einander (Jeltes und Kollegen, 2007); passend: gleichnamige Ladungen stoßen sich ab, Kernteilchen unter etwa 1 fm ebenfalls (Jastrow, 1951); Autor: Postulat 1 ist das dritte Newtonsche Axiom, kein Postulat (6. November 2026); danach sind Kraft und Gegenkraft auch beim Annähern gleich groß, die drei Fälle widersprechen dem Axiom nicht; bei der Schwerkraft sind Kraft und Gegenkraft für Aluminium und Eisen auf $3{,}9 \cdot 10^{-14}$ gleich (Singh und Kollegen, 2023); der Punkt zu Purcell ist beantwortet: Magnetismus und elektrische Kraft sind dieselbe orientierte Zirkulation in zwei Schnitten (Abschnitt 7.5)

Antwort Weil das so gemessen wird. Kraft und Gegenkraft bleiben gleich groß. Gleich gerichtete Ströme sind gleich orientierte Zirkulationen (Ampère). Gleichtaktige Bjerknes-Kugeln ziehen sich an; zwei Elektronen stoßen sich ab und sind deshalb nicht als gleichtaktige Hohlräume zu lesen (Frage 8). Superfluides Helium-4 ist eine kohärente Organisation desselben Mediums. Für mitbewegte Beobachter erscheint Magnetismus als elektrische Kraft (Purcell): dasselbe orientierte Medium in einem anderen Schnitt.

Frage 63. Wie hält Bindungsenergie einen Neutronenstern zusammen?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Wie hält Autor: keine Anziehung außer Magnetismus und 3.4, 2.6, Bindungsenergie einen Verschmelzen von Tropfen (1); Neutronensterne hält Postulat Neutronenstern die Schwerkraft, im Modell ihr Druck (Oppenheimer zusammen, wenn reine und Volkoff, 1939); Zwei Neutronen sind nicht

Neutronen nicht gebunden, Fluor endet bei 31, Neon bei 34 gebunden sind? Welche Kernteilchen (Ahn und Kollegen, 2019); Top-Quark Quarks sind flüssig, zerfällt vor jeder Bindung (Particle Data Group, gefroren oder gasförmig, 2024); schwere Quarkpaare schmelzen im Plasma und warum zeigen sich der Reihe nach (CMS-Kollaboration, 2012); Übergang im Quark-Gluon-Plasma bei etwa 156 MeV (HotQCD-Kollaboration, 2019); Quarks als Einheiten? Fluss folgt der Zahl der Quarks (PHENIX-Kollaboration, 2007); Plasma ist eine stark wechselwirkende Flüssigkeit (PHENIX und Kollegen, 2005); Autor: wo etwas fließt, gibt es Wirbel und Schleifen, und es gibt immer Wände (3.4); das Plasma ist die am stärksten wirbelnde bekannte Flüssigkeit (STAR-Kollaboration, 2017); beantwortet: Ladungen 2/3 und −1/3 gemessen über das Verhältnis R, nur in ganzzahligen Summen gebunden, Massen von 2,2 MeV bis 173 GeV als Energien stabiler Größen (Frage 63); Autor: dauerhaft wird ein Wirbelsystem mit einer gewissen Anzahl Teilchen, wenn der Zug geschlossen ist, dann relativ unabhängig vom äußeren System (Nachtrag vom 6. November 2026); Wirbellinien enden nicht, sondern schließen sich (Helmholtz 1858; Kelvin 1869); Wirbelringe mit einem Umlaufquant in supraflüssigem Helium (Rayfield und Reif 1964); Beryllium-8 zerfällt mit $8{,}19 \cdot 10^{-17}$ s Halbwertszeit in zwei Heliumkerne (Wikipedia, Beryllium-8); freies Neutron etwa 878 s (Gonzalez und Kollegen 2021), in stabilen Kernen beständig

Antwort Den Neutronenstern hält die Schwerkraft bzw. der Druck [24], nicht die Bindung zweier Neutronen. Die Quarkladungen $+2/3$ und $-1/3$ und die Massen von $2{,}2$ MeV bis 173 GeV sind die gemessenen Untereinheiten der Proton-Mehrknoten-Struktur, nicht Zufälle eines Orbitals (Frage 64).

Frage 64. Sind $+2/3$ und $-1/3$ im d_{z^2}-Orbital mehr als ein Zufall?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Ist die Übereinstimmung cos²θ − 1/3 ist an der Achse +2/3, im Ring −1/3, im 7, 2.6, Frage 52 der Werte +2/3 und −1/3 Mittel null; dreimal senkrecht +2/3 − 1/3 − 1/3 = 0 im dz²-Orbital mit den wie beim Neutron, für das Proton (+1) kein eigenes Quarkladungen mehr als Orbital, jedes d-Orbital ergibt dreimal senkrecht null; ein Zufall? Warum sin²θ − 1/3 ergibt +2/3, +2/3, −1/3, ist aber das kommen in der gespiegelte Orbital plus überall 1/3 und entspricht Zeichnung mit a = 2/3 dem Tausch von Up und Down, q zu 1/3 − q und b = 1/3 die Orbitale (Rechnung von Claude nach einem Hinweis von zum Vorschein? Gemini); Knoten bei 54,7°, nicht 58,3° (Andrew, Bradbury und Eades, 1958); a/b = 2 und (a + b)/a = 1,5 sind Fibonacci-Näherungen, nicht φ

Antwort Nein. $\cos^2\theta - 1/3$ ist an der Achse $+2/3$ und im Ring $-1/3$, weil der Kugelmittel von $\cos^2\theta$ genau $1/3$ ist. $a/b = 2$ und $(a+b)/a = 1{,}5$ sind nicht φ; der Knoten liegt bei $54{,}7°$, nicht bei $58{,}3°$.

Frage 65. Welche Rotation hält die Sonne?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Wenn zwei gegenläufige Autor: Das System muss sich unter Druck und Postulate Kräfte sich nur durch Gegendruck zwingend ausgleichen, das geht nur des Autors, Rotation ausgleichen: durch Rotation, gemeint ist die auf den 3.1, 3.4 Welche Rotation hält Orbitalbahnen; Energie von außen trifft eher

einen Körper wie die Teilchen, die vom Kern zur Hülle laufen, Sonne im Gleichgewicht, Geisterfahrer (6. November 2026); Atome, die der sich kaum dreht? einem Lichtstrahl entgegenlaufen, nehmen mehr Autor: beides, die Licht auf und werden gebremst (Hänsch und Eigendrehung des Schawlow, 1975), jedes aufgenommene Körpers und die jedes Lichtteilchen ändert die Bahndrehung um eine Atoms. Dreht sich auch Einheit (Beth, 1936); gemessen bleibt der das Versum als Ganzes? Drehimpuls eines abgeschlossenen Systems Autor: Es hat schon nach erhalten, innere Kräfte erzeugen Wirbel und dem Urknall stark an Gegenwirbel, Ausgleich auch durch Wärme, Drehung verloren, Leuchten, Schwingung und Pauli-Druck; unter Druck passend zur Erhaltung paaren sich die Elektronen des Eisens gegenläufig, des Drehimpulses beim Spin von S = 2 auf S = 0 (Badro und Kollegen, 2003); Ausdehnen (Frage 66). bei ausgeglichenem Zu- und Abstrom bleiben nur Zentrum oder instabiler Sattel (Strogatz, 1994); Elektronenpaare mit entgegengesetztem Spin (Pauli, 1925); die Drehung der Sonne trägt nur etwa $2 \cdot 10^{-5}$ des Gleichgewichts, die der Erde etwa $3 \cdot 10^{-3}$ (Rechnung von Claude); Spin ½ jedes Elektrons, Protons und Neutrons

(Stern und Gerlach, 1922; Uhlenbeck und Goudsmit, 1925); keine Drehung des beobachtbaren Universums nachgewiesen, Grenze 4,7 · 10⁻¹¹ der Ausdehnungsrate (Saadeh und Kollegen, 2016); Autor: Es gibt keine Sterne ohne Drehung, ein zu langsam drehender Stern kollabiert unter dem Druck des Vakuums (5.3); γ Equulei dreht sich einmal in rund 97 Jahren und ist stabil (Bychkov und Kollegen, 2016); Autor: Volumen, Dichte und Drehimpuls spielen eine Rolle, weniger Zustrom heißt weniger Druck, mehr Zustrom mehr Druck und Gegendruck; ein einzeln stehender Stern braucht daher wenig Drehung; nach dem Kollaps dreht sich der Rest schnell, der Crab-Pulsar rund 30-mal pro Sekunde (Comella und Kollegen, 1969)

Antwort Keine makroskopische. Die Eigendrehung der Sonne trägt nur etwa 2×10^{-5} des hydrostatischen Gleichgewichts; γ Equulei ist bei rund 97 Jahren Periode stabil. Die Sonne steht im Druck-Dichte-Gleichgewicht desselben Mediums.

Frage 66. Dehnt sich das Versum streng linear aus?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Dehnt sich das Versum Produkt aus Ausdehnungsrate und Alter 0,96 ± 0,01 5, 6.1, P5 nahezu linear aus wie (Avelino und Kirshner, 2016); Wechsel von eine Supernova? Wie Abbremsen zu Beschleunigen bei z ≈ 0,46 (Riess und passt dazu, dass die Kollegen, 2004); streng lineare Ausdehnung bei Ausdehnung erst Supernovae und Galaxienmuster zusammen deutlich langsamer und dann benachteiligt (Shafer, 2015); Supernova-Trümmer schneller wurde? dehnen sich gleichmäßig aus (Thorstensen und Kollegen, 2001); Vorbild Milne (1935); Autor: träge

Materieklumpen werden ständig weiter beschleunigt (5); ein ständiger Schub erklärt die frühe Abbremsung nicht, Vorschlag: Dichtegefälle zwischen den Klumpen; Autor: die Gaswolken aus 380.000 Jahren Auswurf bremsen und werden zu Sternen gedrückt (5); Hülle höchstens 380.000 Lichtjahre weit (Rechnung von Claude); nur etwa 6 % der normalen Materie in Sternen (Fukugita und Peebles, 2004); Sternentstehung am stärksten 3,5 Milliarden Jahre nach dem Urknall (Madau und Dickinson, 2014); Autor: die Grenze wandert mit, die Wolken müssen vielleicht fast lichtschnell werden, um zu verschmelzen (5); Kerne verschmelzen bei über 99,99 % von c (PHENIX und Kollegen, 2005), Sterne entstehen dagegen in kalten Wolken bei wenigen km/s (Bergin und Tafalla, 2007; Fukui und Kollegen, 2021); Autor: beides, schnellere Druckwellen schieben die trägen Wolken zusammen wie ein Lkw mit 200 km/h eine Autoschlange mit 50 km/h (5); Wellen höchstens mit c (GW170817), Wolken also klar darunter; schnelle Front schiebt Gas zu Schalen mit neuen Sternen (Elmegreen und Lada, 1977); Sterne entstehen im Ausstrom eines Schwarzen Lochs (Maiolino und Kollegen, 2017);

Stoßfronten von 5 bis 70 km/s lösen Kollaps aus, schnellere nicht (Boss und Kollegen, 2010)

Antwort Nein. Streng lineare Ausdehnung ist durch Supernovae und Großraumstruktur benachteiligt [30]. Beobachtet ist der Wechsel von Abbremsen zu Beschleunigen bei $z \approx 0{,}46$ [28]. Das Hubble-Diagramm der Supernovae vom Typ Ia ist die gemessene Ausdehnung des Mediums nach dem Umschlag.

Frage 67. Warum zerfallen manche Kerne schneller, und warum altern sie nicht?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Warum zerfallen manche Spaltung schneller mit wachsendem Z²/A: Uran-238 3.4, Frage 63 Atome schneller als 8,4 · 10¹⁵ Jahre, Californium-252 86 Jahre, andere, und warum Rutherfordium-252 60 ns (Bohr und Wheeler, 1939); altern Kerne nicht wie Alphazerfall schneller mit höherer Zerfallsenergie Seifenblasen? Woher (Geiger und Nuttall, 1911; Gamow, 1928); Zerfall kommen die zufälligen exponentiell, Kerne altern nicht (Norman und Störungen, die einen Kollegen, 1988); keine jährliche Schwankung mit Kern zerfallen lassen? dem Sonnenabstand (Pommé und Kollegen, 2016); nacktes Rhenium-187 zerfällt in 32,9 Jahren statt 42 Milliarden (Bosch und Kollegen, 1996); Seifenblasen altern durch Abfließen und platzen durch zufällige Störungen (Poulain und Kollegen, 2018); $B^0 \to \mu^+\mu^-$ (1,14 +0,42/−0,39) · 10^{-10} bei (1,03 ± 0,05) · 10^{-10} im Standardmodell, 3,2σ (LHCb-Kollaboration, 2026)

Antwort Z^2/A, Geiger–Nuttall und der gedächtnislose Zerfall sind gemessen [3, 23]. Eine jährliche Schwankung mit dem Sonnenabstand wird nicht gefunden [25]. Die Zerfallsrate ist eine Eigenschaft der inneren Mehrknoten-Struktur, kein seifenblasenartiges Altern.

Frage 68. Wie entstehen Bindung, Pauli-Prinzip und Tunneln?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Wie wird aus der Überlagerung addiert Ausschläge mit Phase, 7.1, 2.6, Überlagerung zweier Interferenz einzelner Elektronen (Tonomura und Frage 67 Orbitale eine Bindung, Kollegen, 1989); Licht mit $h\nu = E_2 - E_1$ (Bohr, 1913); und warum nur bei Bindung im Wasserstoffmolekül rund 4,5 eV, nur bei entgegengesetzten Spins, entgegengesetzten Spins (Heitler und London, 1927; wenn die magnetische Hölsch und Kollegen, 2019); magnetische Energie Energie dafür rund der Spins mindestens rund 10^4-mal kleiner 10.000-mal zu klein ist?

(Rechnung von Claude); Tunnelwiderstand Wie kommt ein Teilchen exponentiell mit der Spaltbreite (Binnig und ganz oder gar nicht durch Kollegen, 1982); verhinderte Totalreflexion als eine Wand? Gegenstück (Zhu und Kollegen, 1986); Tropfen tunneln unvorhersagbar, Wahrscheinlichkeit exponentiell mit der Schwellenbreite (Eddi und Kollegen, 2009); Autor: es wirkt nie eine Kraft allein, das Pauli-Prinzip spielt mit; Bindung aus Interferenz, die die Bewegungsenergie senkt (Ruedenberg, 1962); Heliummolekül fast ungebunden, etwa 10^{-7} eV (Grisenti und Kollegen, 2000); Sauerstoff mit zwei ungepaarten Elektronen magnetisch (OpenStax); beantwortet: Pauli-Prinzip aus den zwei Umlaufsinnen Γ und $-\Gamma$ einer Mode (Anhang C)

Antwort Die Bindung im Wasserstoffmolekül beträgt rund $4{,}5\,\mathrm{eV}$ und nur bei entgegengesetzten Spins; die magnetische Spinenergie ist mindestens 10^{4}-mal zu klein. Die Bindung ist die Überlagerung zweier Elektron-Zonen im gemeinsamen Grenzfrequenzprofil. Zwei gleiche Anregungen besetzen nicht denselben Zustand (Pauli, gemessen). Tunneln ist die Weitergabe eines ganzen Quantums $h\nu$ durch eine Wand, deren Grenzfrequenz lokal über der Energie liegt.

Frage 69. Wie trägt das Medium tensorielle Querwellen mit c?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Ist das Vakuum ein festes Autor: Vakuum = materielles Gitter, Potenzial ∞ 1, 2.2, P2, Gitter, eine Flüssigkeit geladen; Masse = stationäre Verspannung im Gitter; P3 (Superfluid) oder beides Energie = Veränderung der Geometrie des Gitters; zugleich? (Autor: Der im Notizbuch auch »Superfluid«; Licht ist eine Raum ist leer und flach, Querwelle, Querwellen trägt ein fester Stoff; darin eine Flüssigkeit Lichtgeschwindigkeit auf etwa 10^{-18} unter Druck.) Licht läuft richtungsunabhängig (Nagel und Kollegen, 2015); nach dem Autor nur im Vakuumenergie gemessen klein (Weinberg, 1989); Nichts (1). Wie trägt die Autor: Raum (Gitter) leer und flach, darin eine Flüssigkeit die Flüssigkeit verschiedener Dichte, alles unter Druck, Gravitationswellen als vor dem Urknall bis zum Flüssigwerden verdichtet, Querwellen in seither in Ausdehnung; Raum gemessen flach, ΩK = Tensorform, und warum 0,001 ± 0,002 (Planck-Kollaboration, 2020); laufen sie so schnell wie Quark-Gluon-Plasma flüssig (PHENIX und Kollegen, Licht? 2005); Stärke der Schwerkraft ändert sich um höchstens etwa 10^{-13} pro Jahr (Hofmann und Müller, 2018); in einer reibungsfreien Flüssigkeit laufen nur Längswellen; Autor: so viele Explosionen, dass sich alle Wellen überlagern, und frontal zusammenlaufende Längswellen werden zu zwei Querwellen gleicher Energie; gemessen: Schallwellen laufen durcheinander hindurch,

Querwellen kommen nicht durch den flüssigen äußeren Erdkern (Iredale, 2024), Umwandlung nur an Grenzflächen fester Stoffe (Zoeppritz, 1919);

Querwellen in Flüssigkeiten mit Drehung (Trägheitswellen) oder Magnetfeld (Alfvén, 1942); Autor: das Vakuummedium heißt Feldenergie, praktisch alles dreht sich und hat ein Magnetfeld, die Felder sind alle unterschiedlich; Weltall als Ganzes ohne messbare Drehung (Saadeh und Kollegen, 2016); Neutron mit, Neutrino ohne gemessenes magnetisches Moment (Alvarez und Bloch, 1940; XENONnT, 2022); kein messbares Feld allein aus Drehung (Blackett, 1952); Autor: Licht breitet sich nur im Nichts aus und wird absorbiert oder umgelenkt, sobald es auf etwas trifft; Brechzahl aus Streuung an Molekülen (Feynman, Leighton und Sands, 1963); Gravitationswellen gleich schnell wie Licht (GW170817) und Tensorwellen (LIGO- und Virgo-Kollaborationen, 2017); Autor: Licht entsteht gleichzeitig mit den Gravitationswellen und bewegt sich mit ihnen; Gammablitz 1,74 ± 0,05 s nach den Gravitationswellen (LIGO, Virgo, Fermi und INTEGRAL, 2017); Schwerefeld eines Lichtpulses läuft mit ihm (Aichelburg und Sexl, 1971); Autor: Querwellen sind die Wellen, die nach frontalem Zusammenstoß zur Seite laufen (Bild zur LHCb-Messung); Elektron und Positron ergeben zwei Gammaquanten von je 511 keV in entgegengesetzter Richtung (Aurengo, La radioactivité); Ausbreitung im Radius erklärt 1/r, nicht die Schwingungsrichtung; eine ebene Verschiebungswelle dehnt nie quer zur Laufrichtung, wie es die Tensorform verlangt (Rechnung von Claude); Autor: der Raum ist hart, weil unbiegsam, das Medium biegsam; Autor: das Medium trägt die Gravitationswellen wie eine Atmosphäre den Schall; als Träger passt das: Entfernung aus der Wellenstärke passt zu NGC 4993, 70 (+12/−8) km/s pro Megaparsec (LIGO- und Virgo-Kollaborationen und Kollegen, 2017); Schall schwingt aber längs, reine Skalarschwingung etwa tausendfach benachteiligt (GW170814); innere Schwerewellen in geschichteter Luft schwingen quer, unter der

Auftriebsfrequenz N (University of Waterloo, AMATH 463); Querschwingungen eines Wirbelgitters gemessen (Coddington und Kollegen, 2003); Querwellen mit c verlangen Schersteifigkeit gleich Energiedichte (Rechnung von Claude); gemessen ist die Schwingungsform, der Träger ist das eine Medium; Autor: der Druck gibt die Lichtgeschwindigkeit vor, Licht läuft mit der Druckwelle, daher gleich schnell wie die Gravitationswellen; Gravitationswellen kommen aus allen Richtungen, jede Materie strahlt sie ab, Abstrom wird Zustrom (6. November 2026); Hintergrund gemessen, gemeinsame Schwankung von 67 Pulsaren nach dem Hellings-Downs-Muster, etwa 3,5 bis 4σ (NANOGrav 2023); Autor: natürlich gibt es Schwingungen aus einer Richtung, zwei schwache Schallwellen gehen durcheinander hindurch, zwei genau aufeinander gerichtete Schallkanonen brechen zur Seite aus (6. November 2026); die Stoßzone ist ein Quadrupol, die Quelle von Gravitationswellen; Zusammenlaufendes breitet sich senkrecht aus (Taylor 1960); Quadrupole erzeugen in Luft gewöhnlichen Längsschall (Lighthill 1952); das Medium gibt die Querschwingung als Scherung weiter (Anhang A); Autor: Schallwellen mit Radio- und Gammawellen vergleichen (6. November 2026); Radio- und Gammawellen beide mit c, quer, zwei Schwingungsformen um 90°, nur die Frequenz verschieden, je Quant etwa Faktor

10^{11} (Rechnung von Claude); Radiowellen von freien Elektronen verzögert, wachsend mit der Elektronendichte, fallend mit dem Quadrat der Frequenz (Lorimer, 2005); Gravitationswellen wie Licht mit c, quer, zwei Schwingungsformen, aber um 45° gedreht (GW170814); damit dieselbe Frage wie beim Licht, Vektor- gegenüber Tensormuster folgt aus der Quelle: Ladung strahlt als Dipol, Masse erst als Quadrupol (Anhang A)

Antwort Eine reibungsfreie Flüssigkeit trägt nur Längswellen; der äußere Erdkern lässt keine Querwellen durch. GW170814 verlangt das Tensormuster, GW170817 dieselbe Laufzeit wie das Licht. Das geordnete Medium antwortet deshalb mit Schersteifigkeit gleich der Energiedichte, $c_T = c$. Zusätzliche longitudinale Polarisation ist unterdrückt.

Frage 70. Wie viel Licht entsteht bei der Verschmelzung zweier kompakter Objekte?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Wie viel Licht entsteht GW150914: Gammalicht unter einem Millionstel der 1, 3.4, V19, bei der Verschmelzung Energie der Gravitationswellen (Savchenko und Frage 59 zweier Schwarzer Löcher, Kollegen, 2016); im Standardbild Licht nur mit Gas in und in welchen Farben? der Nähe, etwa in Gasscheiben aktiver (Autor: durch die Galaxienkerne (McKernan und Kollegen, 2019); möglicher Lichtausbruch nach S190521g (Graham und Kollegen, 2020); Oberflächen Schwarzer Löcher

extremen Druckspitzen (Frage 59); Autor: es gibt keine Schwarzen Löcher ohne sehr viel.) Gas, das Licht entsteht als Gammastrahlung und wird durch den Dopplereffekt zu sichtbarem Licht und Radiowellen gedehnt; Gammastrahlung zu grünem Licht braucht etwa 440.000-fache Dehnung (Rechnung von Claude), GRB 090423 kam bei Rotverschiebung 8,2 noch als Gammastrahlung an (Tanvir und Kollegen, 2009); in der Sonne wird Gammastrahlung durch Absorption und neue Aussendung zu sichtbarem Licht; Autor: Gammastrahlung wird auch durch das Feld gebremst; sehr energiereiche Gammastrahlung wird vom Licht zwischen den Galaxien geschwächt (Ackermann und Kollegen, 2012), Gammastrahlung unter 2 MeV kommt noch aus Rotverschiebung 8,2 an (Tanvir und Kollegen, 2009); Autor bestätigt die Einordnung: gebremst heißt absorbiert und geschwächt, sichtbar wird Gammastrahlung vor allem durch Absorption und neue Aussendung

Antwort Bei GW150914 lag Gammalicht unter einem Millionstel der Gravitationswellenenergie [29]. GRB 090423 kam bei $z = 8{,}2$ noch als Gammastrahlung an. Licht entsteht in Materieprozessen und beim kosmischen Umschlag, nicht als generische Begleitung jeder solchen Verschmelzung.

Frage 71. Wie hängen frühe Dichteschwankungen mit den Gravitationswellen zusammen?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Wie hängen die frühen Gravitationswellen tragen auf großen Winkeln 5.3, 2.7, Dichteschwankungen mit weniger als 3,6 % der Stärke der V17, V18 den Gravitationswellen Dichteschwankungen (BICEP/Keck 2021); Zahl der zusammen? Haben die freien Teilchenarten 2,99 ± 0,17, erwartet etwa 3,04 Wellen das Medium (Planck 2020), daraus Gravitationswellen beim selbst verdichtet (Lesart Durchsichtigwerden höchstens etwa 7 % der A), oder stammen beide Strahlungsenergie (Rechnung von Claude); Lesart A aus denselben verlangt einen Verdichtungsanteil von mindestens Druckwellen des etwa dem Fünffachen der Querschwingung Umschlags (Lesart B)? (Rechnung von Claude), gemessene Welcher Teil der Gravitationswellen schwingen überwiegend quer Längswellen wurde zu (GW170814; V17); frei fliegende Neutrinos Querwellen? (Autor: Die schwächen Gravitationswellen um 35,6 % (Weinberg frühen 2004); Spektralindex 0,965 ± 0,004 (Planck 2020); Dichteschwankungen Phasenübergänge erzeugen Gravitationswellen vor müssen etwas mit der allem durch Druckwellen (Hindmarsh und Kollegen Dichte der 2014); Hintergrund in den Laufzeiten der Pulsare Gravitationswellen zu tun (NANOGrav 2023), Phasenübergänge passen mit haben.) Autor: Die ersten Bayes-Faktoren 10 bis 100, abhängig von Annahmen Gravitationswellen (Afzal und Kollegen 2023) entstanden beim Umschlag, dann bei der Kernfusion; die

Dichteunterschiede stecken in Wirbeln, die schon vor der Rekombination bestanden (5.3, 5.5). Damit Lesart B; der Anteil der Umwandlung liegt unter der B-Moden-Grenze r < 0,036 (BICEP/Keck 2021).

Antwort BICEP/Keck begrenzt den Tensoranteil auf weniger als $3{,}6$ %. Beide sind gemeinsame Druckwellen des Umschlags, nicht eine nachträgliche Verdichtung des Mediums durch die Wellen selbst.

Frage 72. Verhalten sich die Wirbel wie die nicht mitschwingende Masse?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Verhalten sich die Wirbel Nicht mitschwingende Masse etwa 5,4-mal so viel 5.5, 5.6, vor der Rekombination wie das Gas (Planck 2020: 0,120 und 0,0224); Gas 6.2, Frage 58 wie die nicht beim Durchsichtigwerden bis auf 10^{-5} gleichmäßig; mitschwingende Masse, Wachstum durch Schwerkraft höchstens im Maß der die Planck misst? Wie Ausdehnung, bis Rotverschiebung 14,3 etwa 70-fach werden aus (Rechnung von Claude); JADES-GS-z14-0 leuchtete Dichteun-

terschieden von 290 Millionen Jahre nach dem Anfang (Carniani und 10^{-5} bis zu den ersten Kollegen 2024); nach der Rekombination kann Gas Galaxien Unterschiede ab etwa 10^{5} Sonnenmassen zusammenfallen um 1? (Autor: Die Wirbel (Barkana und Loeb 2001); Beschleunigung der bestanden Wirbel: Frage 58; im frühen Universum mehr wahrscheinlich schon vor massereiche Galaxien als vorhergesagt, nach dem der Rekombination und Bericht von Welt der Physik etwa doppelt so viele wurden dann schlagartig (Chworowsky und Kollegen 2024); Little Red Dots: verdichtet und einzeln meist ohne nachweisbare Sterne (Chen und beschleunigt.) Kollegen 2025; Juodžbalis und Kollegen 2025), gemittelt über 217 eine kompakte Sternhülle von etwa 10^{9} Sonnenmassen (Zhang und Kollegen 2026); Autor: entweder keine Sterne, oder erst sichtbar, wenn genug Masse abgegeben ist, aus der Sterne entstehen; Prüfstein: ein mit der Zeit sinkendes Verhältnis von Schwarzem Loch zu Sternen, bei $z \approx 7$ über 2, nah nach erster Schätzung etwa 10^{-3} (Ji und Kollegen 2025); Autor: Little Red Dots waren schon Wirbel im Hyperstern, bei der Rekombination extrem verdichtet; die Zeiten des Standardmodells gelten auch im Modell; das fernste bei $z = 9{,}288$ nach rund 520 Millionen Jahren (Taylor und Kollegen 2025)

Antwort Ja: der geordnete, wirbelnde Anteil desselben Mediums schwingt nicht mit dem Photon-Baryon-Plasma mit. Planck misst diesen Anteil als etwa das $5{,}4$-fache des Gases. Die Peakstruktur der Hintergrundstrahlung ist genau diese Trennung.

Frage 73. Was geschieht mit der Weginformation am Doppelspalt und beim Quantenradierer?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Wie zerstört eine Rückstoß zu klein, Verlust durch die Korrelation mit 7.1, 7.2 Weginformation das dem Wegdetektor (Dürr, Nonn und Rempe 1998); Muster am Doppelspalt, das Muster kehrt beim Löschen der Weginformation auch ohne merklichen zurück (Walborn und Kollegen 2002);

Rückstoß, und wie bringt Wärmestrahlung heißer C70-Moleküle zerstört es, das Löschen der um 3000 K vollständig (Hackermüller und Kollegen Information es zurück? 2004); Restgas zerstört es exponentiell mit dem (Autor: Wie gemessen Druck (Hornberger und Kollegen 2003); Doppelspalt wird, ist entscheidend; mit hüpfenden Tropfen nicht sauber wiederholbar ein Sensor im Weg (Andersen, Bohr und Kollegen 2015); bei Dürr, Nonn verändert das Feld.) und Rempe speicherte der innere Zustand des Autor: Es muss kein Stoß Atoms den Weg (Ma, Kofler und Zeilinger 2016); sein; der Detektor hat Felder, die auf beide Wege wirken, verschieben das Masse und ein Muster nur: Schwerkraft bei Neutronen (Colella, Energiefeld, und jede

Overhauser und Werner 1975), abgeschirmter noch so kleine Änderung Magnet bei Elektronen (Tonomura und Kollegen ist ein Quantensprung 1986); beim Quantenradierer erscheint das Muster (7.1). Damit erste Hälfte in den gemeinsam mit dem Partnerphoton gezählten beantwortet; Treffern (Walborn und Kollegen 2002) die zweite Hälfte ebenso: Die Auswahl nach dem Partnerphoton sortiert die Treffer in Teilmengen, deren jede ein Muster zeigt (7.2).

Antwort Ein Detektor verändert das Feld der Anregung; der Rückstoß allein ist zu klein [8]. Die Weginformation ist eine Markierung der Mediumanregung. Wird die Markierung gelöscht, kehrt das Muster in den Koinzidenzen zurück [33], weil die unmarkierte Anregung wieder die volle Welle desselben Mediums ist.

Frage 74. Wird die Innenbewegung bei weniger Außendruck schneller?

Fragestellung und Messung aus dem Entwurf Wird die Bewegung im Freie Ausdehnung in einen leeren Behälter ändert 3.2, 2.5, Inneren der Materie bei die Temperatur nicht (Joule 1845); Elektronen auf V16 weniger Außendruck größeren Bahnen sind langsamer (Bohr 1913; schneller, weil die Rydberg-Atome, Gallagher 1994); Wärmestrahlung Teilchen mehr Platz hängt nur von Temperatur und Oberfläche ab haben, oder weil die (Stefan-Boltzmann); zwischen leitenden Platten lebt Energie der ein Rydberg-Atom mindestens 20-mal länger (Hulet, nachlassenden Drehung Hilfer und Kleppner 1985); ohne 1 bar wächst Stahl ins Innere geht? Gibt um etwa $6 \cdot 10^{-7}$, Wasser um etwa $4{,}5 \cdot 10^{-5}$ seines Materie im Vakuum dann Volumens (Rechnung von Claude); bei erhaltenem mehr Strahlung ab? Drehimpuls sinkt die Drehenergie mit wachsendem (Autor: Die Materie Volumen dehnt sich aus, die

Antwort Nein. Freie Ausdehnung ändert die Temperatur nicht [19]. Elektronen auf größeren Bahnen sind langsamer (Bohr, Rydberg). Mehr Strahlung im Vakuum steht gegen Stefan–Boltzmann und gegen die längere Lebensdauer von Rydberg-Atomen zwischen Platten [18].

Frage 75. Gilt „unterschiedliche Dichte stößt sich ab“ auch für Ladungen?

Antwort Für gewöhnliche Materialien entscheidet die Struktur, nicht die naive Masse pro Volumen (Alkohol/Wasser, Plateau; Olivenöl $n = 1{,}47$ gegen Wasser $1{,}33$, Lorentz–Lorenz). Für Ladungen gilt das gemessene Coulomb-Gesetz (Frage 8). Die klassische Larmor-Sturzzeit $1{,}556 \times 10^{-11}$ s zeigt, dass

das Elektron keine klassische Kreisbahn ist, sondern eine stehende Anregung.

Frage 76. Warum bleibt ein Gitter gleich geladener Teilchen bei kleinen Schwingungen geordnet?

Antwort Gekühlte Ionen bilden einen Kristall und gehen erst bei schwächerer Kühlung in eine Wolke über [7]. Chaos entsteht bei Instabilität oder nachgelieferter Energie, nicht schon durch eine beliebig kleine Schwingung.

Frage 77. Wo liegt das Zentrum, und wie weit dürfen wir davon entfernt sein?

Antwort Jeder Beobachter sitzt im Zentrum seines Lichttrichters. Nach Abzug der Eigenbewegung ist der Himmel auf 10^{-5} isotrop. Eine vergleichbare Rechnung verlangt einen Abstand näher als etwa $15\,\mathrm{Mpc}$ zu einem geometrischen Zentrum [1]; die gemessene Isotropie platziert uns tief innerhalb des homogenen Bereichs. Der Dipol der Hintergrundstrahlung ist unsere Bewegung von etwa $370\,\mathrm{km/s}$.

Frage 78. Welche drei Mediumstrukturen legen A_i, B_i der Leptonen fest?

Messgröße. Die Ruheenergien sind $m_e = 0{,}51099895\,\mathrm{MeV}$, $m_\mu = 105{,}6583755\,\mathrm{MeV}$ und $m_\tau = 1776{,}93\,\mathrm{MeV}$, also $m_\mu/m_e = 206{,}768283$ und $m_\tau/m_e = 3477{,}15$.

Rechnung. Eine geschlossene Textur mit konkurrierenden Gradientenenergien hat

$$E_i(R) = A_i R + \frac{B_i}{R}. \tag{73}$$

Das einzige Minimum liegt bei $R_{i*} = \sqrt{B_i/A_i}$ und $E_{i*} = 2\sqrt{A_i B_i}$, also

$$m_i c^2 = 2\sqrt{A_i B_i}. \tag{74}$$

Eine Klammer (A, B) liefert genau eine Masse. Drei Leptonen verlangen drei Paare (A_i, B_i). A_i ist die Wand- bzw. Ausdehnungsenergie, B_i die konzentrierende (Hohlraum-/Kern-)Energie.

Ein kugelförmiger Hohlraum mit starrer Wand hat die Eigenwerte $j'_\ell(\xi) = 0$. Numerisch (Kugel-Bessel, Intervallschachtelung) sind die ersten Wurzeln

$$(\ell, n) = (1,1) : 2{,}081576, \quad (2,1) : 3{,}342094, \quad (0,1) : 4{,}493409, \qquad \text{Dipolradial: } 2{,}081576,\ 5{,}940370,\ 9{,}205840.$$

Setzt man $B_i = \eta\hbar c\,\xi_i$ und ein gemeinsames A, so folgen die Massenverhältnisse

$$1 : 1{,}267 : 1{,}469 \qquad \text{bzw.} \qquad 1 : 1{,}689 : 2{,}103.$$

Das sind nicht die gemessenen $1 : 206{,}77 : 3477{,}15$. Drei Raumachsen begrenzen die Zahl der Moden nicht auf drei, und das Knicken $P_{\text{krit}} = D\pi^2/L^2$ allein wählt ebenfalls keine drei Zustände aus. Der Hohlraum leitet $206{,}77$ nicht her.

Damit die gemessenen Massen zu diesen Dipol-Eigenwerten passen, müssten die Wandenergien selbst verschieden sein:

$$\frac{A_\mu}{A_e} = 1{,}4981 \times 10^{4}, \qquad \frac{A_\tau}{A_e} = 2{,}734 \times 10^{6}.$$

Bei gemeinsamem B (Compton-artige Größe $R \propto 1/m$) wären es $A_\mu/A_e = (m_\mu/m_e)^2 = 4{,}275 \times 10^4$ und $A_\tau/A_e = 1{,}209 \times 10^7$.

Zuordnung. Die drei Paare (A_i, B_i) gehören zu drei zulässigen Mediumstrukturen: das Elektron ist die einzelne strömungsfreie Zone (Elektron-Zone, Dipolmode, $R_e = 4{,}019 \times 10^{-13}\,\text{m}$); Myon und Tau sind die beiden nächsten stabilen geschlossenen Organisationen desselben Mediums, also Mehrknoten- bzw. höhere Wandzustände, nicht zwei weitere isolierte Elektron-Zonen. Die Notiz zu den Massenverhältnissen rechnet Kelvin-Ringe, ideale Torusknoten und Kelvin-Wellen durch. Keine parameterfreie Zuordnung der ersten Zustände liegt bei $206{,}768$ (Kelvin $n = 2, 3$ ergibt 4 und 9 bzw. 8 und 27; Kleeblatt zu Unknoten $31{,}33$; Wellen $m = 3, 4$ ergeben $2{,}449$ und $4{,}472$). Die Massenverhältnisse sind gemessen; das Mediumbild ordnet sie den Wandenergien A_i dieser verschiedenen Strukturen zu, mit den oben gerechneten A-Verhältnissen.

Zuordnung der Abplattungen [P]. Die CAD-Kugel (Anhang C.11) hat zwei Arten von Maßen. Durch die Konstruktion gesetzt sind [P]: der Außendurchmesser $D_{\text{außen}} = 101{,}00\,\text{mm}$, der Innendurchmesser $99{,}00\,\text{mm}$ ($2r_0$), der Innenradius $r_0 = 49{,}50\,\text{mm}$ und die radiale Wandstärke $\Delta r = 1{,}00\,\text{mm}$. Nicht gesetzt, sondern als Ergebnis der Konstruktion von selbst entstanden sind [F]: der vertikale Faltungshub $h = 42{,}55\,\text{mm}$ und die Schleifenlänge $L = 362{,}29\,\text{mm}$ (innen). Aus diesen Maßen werden drei Abplattungen q gebildet:

$$q_e = 1{,}00, \qquad q_\mu = \frac{h}{D_{\text{außen}}} = \frac{42{,}55\,\text{mm}}{101{,}00\,\text{mm}} = 0{,}4213, \qquad q_\tau = \frac{\Delta r}{r_0} = \frac{1{,}00\,\text{mm}}{49{,}50\,\text{mm}} = 0{,}0202.$$

In q_μ steht ein entstandener Wert (h) über einem gesetzten ($D_{\text{außen}}$); q_τ besteht nur aus gesetzten Werten. Diese drei Werte werden den gemesse-

nen Massen m_e, m_μ, m_τ zugeordnet: ein Wert je Lepton, in der Reihenfolge der Massen. Das ist eine Zuordnung des Autors [P], keine Herleitung. Die Verhältnisse $206{,}768$ und $3477{,}15$ sind gemessen [F] und gehen in die Zuordnung ein; sie folgen nicht aus q allein. Für die Schleifenlänge gilt $L/r_0 = 362{,}29\,\mathrm{mm}/49{,}50\,\mathrm{mm} = 7{,}319$; zum Vergleich ist $2\pi = 6{,}283$.

Frage 79. Wie wird aus T_* und $H(z)$ die Dauer von $380\,000$ Jahren?

Messgröße. $T_0 = 2{,}72548\,\mathrm{K}$ und $z_* = 1089{,}80 \pm 0{,}21$ ergeben die Temperatur beim Durchsichtigwerden $T_* = T_0(1+z_*) = 2972{,}95\,\mathrm{K}$. Das ist eine Temperatur. Die nicht mitschwingende, geordnete Komponente in den Schwingungsspitzen der Hintergrundstrahlung beträgt das $5{,}4$-fache des Gases (Planck; Fragen 26 und 72). Mit $\Omega_b h^2 = 0{,}02237$ und $H_0 = 67{,}36\,\mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}$ ist $\Omega_b = 0{,}0493$ und $\Omega_{\text{Wirbel}} = 5{,}4\,\Omega_b = 0{,}2662$, zusammen $\Omega_b + \Omega_{\text{Wirbel}} = 0{,}3155$.

Rechnung. Die Dauer vom Anfang bis zur letzten Streuung ist

$$t(z_*) = \int_{z_*}^{\infty} \frac{\mathrm{d}z}{(1+z)\,H(z)}, \tag{75}$$

mit der aus Dichte und Ordnung des Mediums gelesenen Rate

$$H(z) = H_0 \sqrt{\Omega_r (1+z)^4 + (\Omega_b + \Omega_{\text{Wirbel}})(1+z)^3}. \tag{76}$$

$\Omega_r = 9{,}21 \times 10^{-5}$ enthält Photonen und $N_{\text{eff}} = 3{,}046$. Die numerische Auswertung von (75) liefert

$$t(z_*) = 371\,300\,\text{Jahre}.$$

Gerundet sind das die $380\,000$ Jahre. Derselbe Integrand mit dem Planck-Anteil $\Omega_m = 0{,}3153$ und zusätzlich $\Omega_\Lambda = 0{,}6847$ ergibt $371\,400$ Jahre: bei $z_* \approx 1090$ ist der Λ-Term gegenüber $(1+z)^3$ und $(1+z)^4$ bedeutungslos (Unterschied 90 Jahre).

Zuordnung. Die Energiedichte-Skalen $(1+z)^4$ für Strahlung und $(1+z)^3$ für Ruhemasse allein sind noch keine Friedmann-Gleichung. Das Medium selbst liefert das Ausdehnungsgesetz: die Zwiebelschichten werden dicker (Trichter, Hubble-Gesetz), und die Verdickungsrate ist durch die Energiedichte desselben Mediums gesetzt. Multiplikative Überlagerung reskaliert ρ_∞ und c gemeinsam; eine zeitabhängige Hintergrunddichte ändert deshalb Uhren, Maßstäbe und Wellenlängen genau so, wie es $H(z)$ beschreibt. Strahlung fällt wie $(1+z)^4$, weil jedes Lichtteilchen gedehnt wird und die Zahl pro Volumen wie $(1+z)^3$ geht; Baryonen und der geordnete Wirbelanteil (das $5{,}4$-fache des Gases) fallen wie $(1+z)^3$, weil ihre Ruheenergie nicht mit der Welle skaliert. Gleichung (76) ist diese Mediumdynamik, gelesen an den Messungen, keine zweite, vom Medium getrennte Raumzeitgleichung.

Im Modell ist $t(z_*)$ die Leuchtzeit des Hypersterns bis zum Durchsichtigwerden seiner Gashülle bei T_*. Sie ist nicht die Eddington-Brennzeit von

2 bis 3 Millionen Jahren; eine Supernova ist schlagartig und fällt mit dem Ende dieser Abkühlung zusammen.

Frage 80. Wie lautet die Energiebilanz der Hintergrundstrahlung je Baryon?

Messgröße. Aus $T_0 = 2{,}72548\,\mathrm{K}$ und $\Omega_b h^2 = 0{,}02237$ folgen die heutige Photonenenergie je Baryon $1{,}037\,\mathrm{MeV}$ und, um den Faktor $1 + z_* = 1090{,}80$ zurückgerechnet,

$$\left.\frac{E_\gamma}{N_B}\right|_{z_*} = 1{,}131\,\mathrm{GeV}$$

(gerundet $1{,}1\,\mathrm{GeV}$). Fusion bei $Y = 1/4$ liefert nur $1{,}671\,\mathrm{MeV}$ je Baryon, das 677-fache zu wenig. Der nichtthermische Rest liegt unter etwa 6×10^{-5} (FIRAS).

Rechnung, ohne Doppelzählung. Je überlebendem Baryon gilt

$$\frac{E_{\text{Strahlung}}}{N_B} = \frac{E_{\text{Anfang}} - E_{\text{Bewegung}} - E_{\text{sonstige}}}{N_B} - m_p c^2. \tag{77}$$

$E_{\text{Rest}}/N_B = m_p c^2 = 0{,}938\,\mathrm{GeV}$ ist die Ruheenergie der übrig bleibenden Baryonen (im Proton rund 99 % innere Feld- und Bewegungsenergie). Sie wird nicht in Photonen umgewandelt und steht deshalb genau einmal, als Abzug, auf der rechten Seite. Für die gemessenen $1{,}1\,\mathrm{GeV}$ verlangt (77)

$$\frac{E_{\text{Anfang}} - E_{\text{Bewegung}} - E_{\text{sonstige}}}{N_B} = 1{,}1\,\mathrm{GeV} + 0{,}938\,\mathrm{GeV} = 2{,}04\,\mathrm{GeV} \approx 2{,}17\, m_p c^2$$

je späterem Baryon in der kompakten Phase. Davon werden etwa 54 % abgestrahlt und 46 % als Baryonenruheenergie behalten. Mit dem genaueren Wert $1{,}131\,\mathrm{GeV}$ sind es $2{,}069\,\mathrm{GeV} \approx 2{,}21\, m_p c^2$ und 55 % zu 45 %.

Die Bindung an der Schwelle $R = GM/c^2$ beträgt $0{,}47$ bis $0{,}56\,\mathrm{GeV}$ je Nukleon ($0{,}5$ bis $0{,}6\, m_p c^2$). Das ist die Kompaktheitsskala, nicht der volle Strahlungsterm: sie deckt rund 40 bis 50 % der $1{,}13\,\mathrm{GeV}$ ab, also nicht die gesamte Photonenenergie. Der Rest der umgesetzten $2{,}17\, m_p c^2$ stammt aus dem Phasenpotenzial der geordneten Anfangskonfiguration ($\Delta V(\chi)$, Gradientenenergie, Arbeitsbilanz der Existenzschranke). Mc^2 als unsichtbare Strahlung meint genau diesen zusätzlichen organisierten Anteil, nicht die Ruheenergie der hinterher noch vorhandenen Baryonen; sonst wäre die rechte Seite von (77) negativ.

Planck-Spektrum. Eine ausreichende Energiemenge legt die Verteilung noch nicht fest. Die Thermalisierung geschieht durch Bremsstrahlung und Doppel-Compton-Streuung, solange die optische Tiefe $\tau \gg 10^{10}$ ist, also bevor die Temperatur auf etwa $T \approx 2 \times 10^6\,\mathrm{K}$ gesunken ist. Unterhalb dieser Schwelle friert eine μ-Verzerrung ein; gemessen ist $\mu < 6 \times 10^{-5}$. Die Energie wird deshalb früh, in der dichten, undurchsichtigen Phase, eingespeist und vollständig zum Planck-Spektrum thermalisiert. Beim Durchsichtigwerden bei T_* läuft dieses Spektrum frei und wird seither um $1 + z_*$ gedehnt.

Frage 81. Warum gilt $v^4 = Ga_0M$, und was gilt jenseits von R?

Messgröße. Die baryonische Tully-Fisher-Beziehung lautet $v_f^4 = GM_b a_0$ mit $a_0 \simeq 1{,}2\times10^{-10}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ (McGaugh). Die Hubble-Kombination derselben Dimension ist

$$\frac{cH_0}{2\pi} = 1{,}04\times10^{-10}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$$

(für $H_0 = 67{,}36\,\mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}$); sie liegt in derselben Größenordnung, ist aber nicht zahlenmäßig identisch (Verhältnis $0{,}87$).

Rechnung. Im Newtonschen Feld gilt $v^2 = GM/R$, also $v^4 = G^2M^2/R^2$. Die Gleichgewichtsbedingung am Scheibenrand,

$$\frac{GM}{R^2} = a_0 \quad\Longrightarrow\quad R = \sqrt{\frac{GM}{a_0}}, \tag{78}$$

eingesetzt liefert unmittelbar

$$v^4 = Ga_0M. \tag{79}$$

Das folgt nur, wenn $g = a_0$ wirklich die Gleichgewichtsbedingung des Mediums am Rand ist, nicht eine zusätzlich eingeführte Zahl.

Zuordnung. Der lokale Gradient GM/r^2 fällt nach außen ab. Der kosmische Hintergrund setzt eine einzige Beschleunigungsskala: multiplikative Überlagerung reskaliert ρ_∞, a_∞ und c, ohne einen zweiten lokalen Zentralterm (sonst entstünden zusätzliche Periheldrehungen von einigen Bogensekunden, die ausgeschlossen sind). Das lokale Gefälle endet als führender Term dort, wo es dem Hintergrundgefälle gleichkommt, also bei (78) mit a_0 als dieser Hintergrundskala. Genau dann ist (79) die Medium-Gleichgewichtsantwort.

Die Notiz zum $1/r$-Dichtehof zeigt zugleich, was diese Antwort nicht ist: ein $1/r$-Hof als extra Newton-Masse würde im Sonnensystem Kepler verletzen und liefert die $43''$ nicht. Strömung ohne Volumenkraft erzeugt nur Dichtedefizite. Die Volumenkraft ist das Dichtegefälle des Mediums selbst ($\Delta p = c^2\Delta\rho$ lokal). Auf Galaxienskalen ist $v^4 \propto M$ deshalb keine zusätzliche Zentralmasse, sondern die Folge der Anpassung von lokalem Gradienten und Hintergrundskala.

Flache Rotationskurven jenseits von R. Die Bedingung $g = a_0$ gilt am Anpassungsradius, nicht überall außerhalb. Wäre $g = a_0$ im ganzen Außenraum, folgte $v^2 = a_0 r$, eine steigende Kurve. Gemessen bleiben die Kurven jenseits von R flach. Das verlangt

$$g = \sqrt{g_N a_0} \qquad (g_N \ll a_0),$$

also $v^2 = \sqrt{GMa_0} = \text{const}$. Sobald der lokale Überschuss unter die Hintergrundskala sinkt, antwortet das Medium mit dieser Wurzel; $v^4 = Ga_0M$ bleibt dieselbe Beziehung, jetzt als konstante Geschwindigkeit weit außen.

Frage 82. Welche Bell-Bedingung ändert das Madelung-Potenzial?

Messgröße. Die CHSH-Kombination überschreitet den Wert 2 und erreicht Werte bis zur Tsirelson-Grenze $2\sqrt{2} \approx 2{,}828$, in Tests ohne Schlupflöcher, mit Quasarlicht (Rauch und Kollegen, 2018) und mit menschlichen Entscheidungen (BIG Bell Test, 2018).

Welche Bell-Bedingung sich ändert. Ein Bell-lokales Modell verlangt zwei unabhängige Bedingungen. Die lokale Faktorisierung (Ausfallsunabhängigkeit)

$$P(ab \mid xy\lambda) = P(a \mid x\lambda)\, P(b \mid y\lambda) \tag{80}$$

zerlegt die beiden Flügel nach Vorgabe des gemeinsamen vergangenen Zustands λ. Die Messwahlunabhängigkeit verlangt $\rho(\lambda \mid xy) = \rho(\lambda)$. Unter beiden gilt $S \le 2$. Gemeinsame Ursachen allein ändern das nicht.

Das Ein-Medium-Bild ändert die lokale Faktorisierung, nicht die Messwahlunabhängigkeit.

Zuordnung und Rechnung. In der Madelung-Form der Wellenmechanik trägt das Medium das Quantenpotenzial

$$Q = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\nabla^2\sqrt{n}}{\sqrt{n}}. \tag{81}$$

Für eine Zwei-Teilchen-Welle hängt $Q = Q(x_1, x_2)$ von beiden Orten zugleich ab und zerfällt für einen verschränkten Zustand nicht in $Q_1(x_1) + Q_2(x_2)$. Genau das ist die verletzte lokale Faktorisierung, in derselben Weise wie in der de Broglie-Bohm-Mechanik: die Führungswelle ist eine einzige, nicht faktorisierende Anregung desselben Mediums. Daraus folgen die gemessenen cos-Korrelationen eines Singletts, $E(\theta) = -\cos\theta$, und unter den Optimalwinkeln $S = 2\sqrt{2}$. Mehr als $2\sqrt{2}$ verlangte weitere Freiheitsgrade oder eine Signalisierung zwischen den Flügeln; beides wird nicht gemessen.

Die Messwahlunabhängigkeit bleibt bestehen. Die Einstellungen dürfen von Quasarlicht oder von menschlichen Entscheidungen kommen. Ein Modell, das stattdessen die Messwahlunabhängigkeit aufgäbe (Superdeterminismus), widerspräche gerade diesen Versuchen; darauf stützt sich das Ein-Medium-Bild nicht.

Frage 57a. Warum erzeugt die Zusatzmasse $\frac{1}{2}\rho V$ keinen Unterschied zwischen Titan und Platin?

Messgröße. Ein fremder Körper, der eine Flüssigkeit verdrängt, trägt eine Zusatzmasse. Für eine Kugel in reibungsfreier Flüssigkeit ist $m_{\text{add}} = \frac{1}{2}\rho V$ (Action-Lab-Versuch; klassisch Bessel und Green). Wären Atome solche

Fremdkörper im Medium, so hinge der Anteil m_{add}/m von Dichte und Volumen ab: Titan und Platin müssten verschieden fallen. MICROSCOPE begrenzt eine stoffabhängige Abweichung auf 10^{-15}; Titan und Platin fallen auf 15 Stellen gleich.

Zuordnung. Teilchen sind keine Fremdkörper im Medium. Sie sind gebundene Zustände desselben Mediums. Ihre Masse ist bereits $M = E/c^2$ und enthält die mitbewegte Feldenergie der Struktur (Übergangszone, Wand, Hohlraum). Es gibt nichts Zweites, das zusätzlich wie $\frac{1}{2}\rho V$ mitgeschleppt würde.

Rechnung. Das Dichtegefälle $\nabla\psi$ beschleunigt die gebundene Struktur und das sie umgebende Medium gemeinsam. Relative Beschleunigung zwischen Teilchen und Mitbewegtem entsteht nicht; die zusätzliche Trägheit eines Fremdkörpers entfällt. Deshalb ist die Fallbeschleunigung unabhängig von der stofflichen Zusammensetzung, in Übereinstimmung mit MICROSCOPE. Dasselbe Gefälle trägt die universelle Kopplung von Uhren, Licht und Materie (Fragen 2 und 4).

Anhänge

A Existenzschranke für Zwei-Phasen-Gleichgewichte

Zusammenfassung. Wir untersuchen ein newtonisches Modell eines selbstgravitierenden Mediums mit einem skalaren Ordnungsparameter, das Phasen-Polytrop. Eine polytrope Zustandsgleichung vom Typ $n = 1$ wird an ein doppelmuldiges Vakuumpotential gekoppelt. Das Modell ist ein mathematischer Vorläufer einer kosmologischen Arbeit des Autors; die vorliegende Untersuchung beschränkt sich auf die Existenz statischer Gleichgewichte und zieht keine kosmologischen Schlüsse.

Aus der Feldgleichung leiten wir eine exakte Arbeitsbilanz her. Für monotone Profile folgt daraus eine notwendige Schranke für einen positiven Zwei-Phasen-Zweig, bei dem das Zentrum im falschen und der Außenraum im wahren Vakuum liegt. Bei starker Kopplung ($A = 0{,}6$, $b = 0{,}2$) ist die Schranke bereits für Zentraldichten $\nu_0 = 3$ verletzt. Ein Schießverfahren findet in diesem Bereich keinen positiven Zweig. Der reguläre negative Zweig existiert als vakuumangepasstes Gleichgewicht und bleibt nahe am wahren Vakuum. Nur Lösungen mit kleinem Robin-Residuum und $\chi(L) \approx \chi_v$ werten wir als Gleichgewichte, und zwar nach der praktischen Konvergenzklasse B ($|R| \lesssim 10^{-4}$). Klasse A ($|R| < 10^{-6}$) ist eine theoretische Klasse und wegen der Empfindlichkeit des Schießproblems in der Praxis nicht robust erreichbar. Ein Barrierenplateau mit $R \approx 2{,}28$ ist kein Gleichgewicht.

Eine gezielte Suche im durch die Schranke nicht ausgeschlossenen Fenster — kleine Kopplung a, ausreichend große Zentraldichte und schwache Gravitation — liefert mindestens ein sauber konvergiertes Zwei-Phasen-Gleichgewicht. Die Arbeitsbilanz und die anisotrope hydrostatische Gleichgewichtsbedingung werden numerisch bestätigt. Eine schwach-relativistische, konform flache Erweiterung, die die Einsteinschen Gleichungen nicht löst, verschiebt den regulären Zweig nur schwach und erzeugt bei starker Kopplung ebenfalls keinen positiven Zweig. Zusätzlich integrieren wir die Außenraum-Feldgleichung der konformen Metrik und erhalten $e^{-2\varepsilon u} = 1 - 2\varepsilon g m_R/\xi$. Der kritische Lichtstoßparameter dieser Außenlösung ist $8\,\mathrm{G}M/c^2$, nicht der Wert $2e\,\mathrm{G}M/c^2$ der exponentiellen Vergleichsmetrik $\psi = \mu/r$. Die tensorielle Mode des Mediums ist seine transversale Scherung. Gemessen sind ihre Geschwindigkeit c (GW170817) und ihre reine Tensorpolarisation (GW170814); wir rechnen ihre TT-Projektion und ihre Kopp-

lung an ein Interferometer aus.

Stichwörter: Phasen-Polytrop, Ordnungsparameter, Existenzschranke, Arbeitsbilanz, anisotrope Sterne, Zwei-Phasen-Gleichgewicht, Qualitätsklasse.

Bemerkung 1 (Stellung im Buch nach der Umstellung auf $\Delta p = c^2 \Delta\rho$). Dieser Anhang rechnet mit einem Polytrop vom Index $n = 1$, also mit $p = K n^2$. Das ist das frühere zweite Gesetz einer „dichten Phase“. Das Buch hat es fallen gelassen, weil es Merkur $35{,}82''$ statt $42{,}98''$ pro Jahrhundert gibt (Anhang J, Fall (a); Abschnitt B.1.1). Im ganzen Medium gilt jetzt $\Delta p = c^2 \Delta\rho$. Der Anhang bleibt als mathematisches Vergleichsmodell stehen; seine Zahlen gehören zu diesem Modell, nicht zum Gesetz des Mediums.

Was sich mit $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ ändert, in drei Sätzen. Erstens: Das Schließungsgesetz (83) wird, mit derselben Skalierung ($2Kn_c$ ersetzt durch $m_0 c^2$), $\nu = \nu_0\, e^{w + a(\chi - \chi_0)}$. Die Dichte wird nie null. Ein selbstgravitierendes Medium mit diesem Gesetz hat deshalb keine Oberfläche; es ist die isotherme Kugel, deren Dichte außen wie $1/r^2$ fällt und deren Masse unbegrenzt wächst [1]. Ein Zwei-Phasen-Gleichgewicht mit materiefreiem Außenraum, wie es dieser Anhang sucht, gibt es mit diesem Gesetz nicht. Zweitens: Die Arbeitsschranke (102) wird unter denselben Annahmen (χ monoton, $w \le 0$) zu $W_{\max,\mathrm{lin}} = (b\nu_0/a)\big(1 - e^{-a(\chi_0 - \chi_v)}\big) \le b\nu_0/a$. Bei starker Kopplung ($a = 6$, $b = 0{,}2$, $\nu_0 = 3$) sind das höchstens $0{,}1$ gegen $\Delta V_{\mathrm{vac}} \approx 0{,}398$; der positive Zweig bleibt ausgeschlossen, wie mit dem Polytrop ($0{,}150$). Drittens: Die Außenlösung dieses Modells ($8\,\mathrm{G}M/c^2$, $+54\,\%$) ist durch den Schatten von Sagittarius A* ausgeschlossen (Abschnitt A.7.1); das Gesetz $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ gibt $2e\,\mathrm{G}M/c^2$ und liegt innerhalb der Messung. Das Zahlenbeispiel des gefundenen Gleichgewichts ($\nu_0 = 4$, $a = 0{,}4$, …) wird nicht übertragen; es bleibt ein Ergebnis des Vergleichsmodells.

A.1 Einleitung

Statische, selbstgravitierende Gleichgewichte sind ein klassischer Gegenstand der theoretischen Astrophysik. Das einfachste vollständige Modell ist der Polytrop, dessen sphärisch-symmetrische newtonische Gleichungen auf die Lane-Emden-Gleichung führen [1]. Ergänzt man die Materie um zusätzliche Felder oder um eine nichttriviale Phasentrennung, so entsteht eine wesentlich reichere Zweigstruktur. Bekannte Beispiele sind Bosonensterne aus selbstgravitierenden skalaren Feldern [2, 3, 4], Q-Bälle und Dünnwand-Konfigurationen in Potentialen mit mehreren Minima [5, 6], hybride kompakte Sterne mit Quark-Hadron-Übergang [7] sowie anisotrope fluide Konfigurationen [8, 9]. Verwandte integrale Hindernisse kennt man von Dericks Theorem und von Virialidentitäten [10]. Konzeptionell benachbart, aber physikalisch anders gebaut, sind Gravasterne, in denen ein Vakuumkondensat das Innere eines kompakten Objekts ersetzt [11].

Die vorliegende Arbeit untersucht ein vergleichsweise sparsam parametrisiertes Kontinuumsmodell, das Phasen-Polytrop: ein skalares Gravitationsfeld mit universeller metrischer Kopplung an ein selbstgravitierendes Medium mit polytroper Zustandsgleichung vom Index $n = 1$ und einem reellen Ordnungsparameter χ. Das Phasenpotential ist $W(\chi) = \lambda(\chi^2 - 1)^2/4$, die Materiekopplung ist linear, $-h(n - n_c)\chi$. Das Modell wurde als mathematischer Vorläufer einer umfassenderen Hypothese formuliert, in der ein kompakter Körper einen Phasenübergang durchläuft [12]. Wir erwähnen diesen Zusammenhang nur, um die Herkunft des Modells zu kennzeichnen. Alle Aussagen dieser Arbeit betreffen ausschließlich die Existenz und die Struktur statischer Gleichgewichte des Phasen-Polytrop-Systems. Kosmologische Folgerungen ziehen wir nicht.

Die zentrale Frage lautet: Gibt es neben dem regulären Zweig, bei dem χ überall nahe am wahren Vakuum bleibt, einen positiven Zwei-Phasen-Zweig, der im Zentrum das falsche Vakuum besetzt und im Außenraum in das wahre Vakuum übergeht? Wir beantworten diese Frage in drei Schritten. Erstens leiten wir eine exakte Arbeitsbilanz der Feldgleichung her und gewinnen daraus eine notwendige Existenzschranke. Zweitens prüfen wir die Schranke und die Zweigstruktur mit einem Schießverfahren, das den Yukawa-Ausläufer im Außenraum durch eine Robin-Bedingung erzwingt. Drittens wiederholen wir die Suche in einer schwach-relativistischen, konform flachen Erweiterung. Diese Erweiterung ist ein wirksamer Ansatz und keine Lösung der Einsteinschen Gleichungen. Die Messungen, an denen eine vollständige Behandlung zu messen ist, beantwortet derselbe Band: im Sonnensystem (Merkur, Lichtablenkung, Shapiro, $\beta = \gamma = 1$) das lokale Gesetz $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ mit $n = e^{2\psi}$ (Anhang J und Abschnitt 2.9), im starken Feld der Schatten von Sagittarius A* (Abschnitt A.7.1). Anschließend untersuchen wir die analytische Außenlösung derselben Metrik und ihre kritische Lichtbahn sowie die tensorielle Mode des Mediums, ihre TT-Projektion und ihre Kopplung an die Detektoren.

Der Rest der Arbeit ist wie folgt gegliedert. Abschnitt A.2 stellt das dimensionslose Modell, das Vakuumpotential und die Randbedingungen dar. Abschnitt A.3 enthält die Arbeitsbilanz, die Existenzschranke und die $\mathbb{Z}_2$-Symmetrie. Abschnitt A.4 beschreibt das numerische Verfahren, die Qualitätsklassen und die Verifikation. Abschnitt A.5 berichtet die Zweigstruktur, die Profile und den Drucktensor. Abschnitt A.6 behandelt die schwach-relativistische Erweiterung. Abschnitt A.7 leitet die Außenlösung her und vergleicht zwei kritische Lichtbahnen. Abschnitt A.8 rechnet die tensorielle Mode, ihre TT-Projektion und die Antwort eines Interferometers. Abschnitte A.9 und A.10 diskutieren die Grenzen und fassen zusammen. Anhang A.11 dokumentiert die Taylor-Koeffizienten am Zentrum.

A.2 Modell

A.2.1 Physikalischer Ausgangspunkt

Das Modell beschreibt ein skalares Gravitationsfeld mit universeller metrischer Kopplung, ergänzt um einen reellen Ordnungsparameter. Das Phasenpotential ist

$$W(\chi) = \frac{\lambda}{4}(\chi^2 - 1)^2, \tag{82}$$

die lineare Materiekopplung lautet $-h(n - n_c)\chi$. Die universelle metrische Kopplung bedeutet, dass das Gravitationspotential u — und in der schwachrelativistischen Erweiterung der konforme Faktor $e^{\varepsilon u}$ — an Ruhemasse und Feldenergie gleichermaßen koppelt. Im Außenraum $n = 0$ erzeugt die lineare Kopplung die Neigung des unten eingeführten dimensionslosen Vakuumpotentials.

A.2.2 Dimensionslose Gleichungen

Wir arbeiten in dimensionslosen Variablen. Der physikalische Radius ist $r = \ell\xi$ mit der Feldlänge $\ell = \sqrt{\kappa_\chi/\lambda}$. Die Feldfunktionen sind das auf das Zentrum bezogene Gravitationspotential $w = u - u(0)$, die eingeschlossene Masse m, der Ordnungsparameter χ und die Teilchendichte $\nu = n/n_c$. Innerhalb der Materie gilt das algebraische Schließungsgesetz

$$\nu = \Theta_{\mathrm{Mat}}\,\max\bigl(0,\, \nu_0 + w + a(\chi - \chi_0)\bigr), \tag{83}$$

wobei $\Theta_{\mathrm{Mat}} = 1$ für $\xi < \xi_R$ und $\Theta_{\mathrm{Mat}} = 0$ sonst. Die Oberfläche ξ_R ist durch die erste Nullstelle von ν definiert. Im Außenraum setzen wir $\nu = 0$.

Die newtonischen Feldgleichungen lauten

$$\begin{aligned} w' &= -\frac{g\,m}{\xi^2}, \qquad & m' &= \xi^2\nu, \qquad & \chi' &= \kappa, \\ \kappa' &= -\frac{2}{\xi}\,\kappa + \chi(\chi^2 - 1) - b(\nu - 1). \end{aligned} \tag{84}$$

Ein Strich bezeichnet die Ableitung nach ξ. Die Kopplungen sind

$$a = \frac{h}{2Kn_c}, \qquad b = \frac{hn_c}{\lambda}, \qquad g = \frac{2\pi G m_0^2 \ell^2}{K}, \qquad A = \frac{ab}{2}. \tag{85}$$

Die Größe A misst die Stärke der Dichte-Feld-Kopplung in Kombination mit der Selbstwechselwirkung von χ. Für $A > 0$ haben a und b dasselbe Vorzeichen. Dieser Fall ist mit einem Gradientenenergie-Funktional verträglich, in dem der Feldbeitrag zum Druck positiv ist (Abschnitt A.3.1).

A.2.3 Vakuumpotential

Das dimensionslose Vakuumpotential entsteht aus W/λ zuzüglich der auf $n = 0$ ausgewerteten linearen Kopplung,

$$V_{\mathrm{vac}}(\chi) = \frac{1}{4}(\chi^2 - 1)^2 + b\chi, \qquad \frac{\mathrm{d}V_{\mathrm{vac}}}{\mathrm{d}\chi} = \chi(\chi^2 - 1) + b, \tag{86}$$

mit $b = hn_c/\lambda$. Die Phasengleichung in (84) lässt sich damit als

$$\chi'' + \frac{2}{\xi}\chi' = \frac{\mathrm{d}V_{\mathrm{vac}}}{\mathrm{d}\chi} - b\nu \tag{87}$$

schreiben, denn $\chi(\chi^2-1)-b(\nu-1) = \mathrm{d}V_{\mathrm{vac}}/\mathrm{d}\chi - b\nu$. Die kritischen Punkte von V_{vac} erfüllen die kubische Gleichung

$$\chi^3 - \chi + b = 0. \tag{88}$$

Drei reelle Wurzeln — und damit zwei lokale Minima, getrennt durch eine Barriere — existieren genau dann, wenn

$$|b| < b_{\mathrm{crit}} = \frac{2}{3\sqrt{3}} \approx 0{,}3849. \tag{89}$$

Für $b > 0$ ist das wahre Vakuum χ_v die kleinste Wurzel. Die Krümmung am Vakuum definiert die Yukawa-Masse $\mu_v = \sqrt{3\chi_v^2 - 1}$; lokale Stabilität verlangt $\mu_v^2 > 0$. Im Referenzfall $b = 0{,}2$ gilt numerisch

$$\chi_v \approx -1{,}08803, \qquad \mu_v \approx 1{,}59733, \qquad V_{\mathrm{vac}}(\chi_v) \approx -0{,}20916, \tag{90}$$

mit Barriere bei $\chi_{\mathrm{B}} \approx 0{,}20915$ und Metastabilem (falsches Vakuum) bei $\chi_+ \approx 0{,}87889$. Abbildung 19(a) zeigt das Potential. Für $|b| > b_{\mathrm{crit}}$ bleibt nur ein einziges Minimum; ein Zwei-Phasen-Übergang im engeren Sinn ist dann nicht möglich.

Wir setzen $U_{\mathrm{vac}}(\chi) = V_{\mathrm{vac}}(\chi) - V_{\mathrm{vac}}(\chi_v) \geq 0$ relativ zum wahren Vakuum. Insbesondere ist $\Delta V_{\mathrm{vac}}(\chi_0) = V_{\mathrm{vac}}(\chi_0) - V_{\mathrm{vac}}(\chi_v) = U_{\mathrm{vac}}(\chi_0)$. Für $\chi_0 = 1$ und $b = 0{,}2$ gilt $\Delta V_{\mathrm{vac}} \approx 0{,}40916$; vom Metastabilen aus ist $\Delta V_{\mathrm{vac}}(\chi_+) \approx 0{,}3979$.

A.2.4 Randbedingungen und regulärer Start

Am Zentrum verlangen wir Regularität,

$$w(0) = 0, \qquad m(0) = 0, \qquad \chi(0) = \chi_0, \qquad \chi'(0) = 0. \tag{91}$$

Im räumlichen Unendlichen soll das Feld in das wahre Vakuum fallen und das Potential verschwinden: $\chi \to \chi_v$, $\chi' \to 0$, $u \to 0$. An der Oberfläche gilt $\nu(\xi_R) = 0$.

Wegen der Koordinatensingularität bei $\xi = 0$ starten wir die Integration mit einer geraden Taylor-Entwicklung. Bis zur Ordnung ξ^4 bzw. ξ^5 lautet sie

$$\begin{aligned} w(\xi) &= c_2\xi^2 + c_4\xi^4 + \mathcal{O}(\xi^6), \\ m(\xi) &= m_3\xi^3 + m_5\xi^5 + \mathcal{O}(\xi^7), \\ \chi(\xi) &= \chi_0 + d_2\xi^2 + d_4\xi^4 + \mathcal{O}(\xi^6), \end{aligned} \tag{92}$$

mit den Koeffizienten

$$\begin{aligned} s_0 &= \chi_0(\chi_0^2 - 1) - b(\nu_0 - 1), \\ c_2 &= -\frac{g\nu_0}{6}, & c_4 &= \frac{g(g\nu_0 - as_0)}{120}, \\ m_3 &= \frac{\nu_0}{3}, & m_5 &= -\frac{g\nu_0 - as_0}{30}, \\ d_2 &= \frac{s_0}{6}, & d_4 &= \frac{(3\chi_0^2 - 1 - ab)\, s_0 + bg\nu_0}{120}. \end{aligned} \tag{93}$$

Diese Ausdrücke wurden symbolisch gegen das Differentialgleichungssystem geprüft (Anhang A.11). Es besteht kein Widerspruch zur Implementierung im verwendeten Integrator.

A.2.5 $\mathbb{Z}_2$-Symmetrie

Das System ist invariant unter

$$(a, b, \chi) \;\longmapsto\; (-a, -b, -\chi). \tag{94}$$

Insbesondere bildet diese Abbildung einen negativen regulären Zweig auf einen positiven regulären Zweig des vorzeichenvertauschten Modells ab. Der Fall $b \to -b$ bei festem a ergibt $A < 0$ und liegt außerhalb der variationskonsistenten Klasse $A > 0$; wir kommen in Abschnitt A.5.6 darauf zurück.

A.3 Analytische Ergebnisse

A.3.1 Drucktensor und hydrostatisches Gleichgewicht

In Einheiten von $2Kn_c^2$ ist der anisotrope Drucktensor

$$\begin{aligned} p_r &= \frac{\nu^2}{2} + \frac{a}{b}\Big(\frac{(\chi')^2}{2} - U_{\text{vac}}\Big), \\ p_t &= \frac{\nu^2}{2} + \frac{a}{b}\Big(-\frac{(\chi')^2}{2} - U_{\text{vac}}\Big). \end{aligned} \tag{95}$$

Die Anisotropie folgt unmittelbar:

$$p_r - p_t = \frac{a}{b}(\chi')^2 = \frac{2A}{b^2}(\chi')^2. \tag{96}$$

Für $A > 0$ gilt $p_r - p_t \geq 0$. Der zentrale Radialdruck auf einem regulären Zweig ist

$$p_r(0) = \frac{\nu_0^2}{2} - \frac{a}{b}\, U_{\mathrm{vac}}(\chi_0). \tag{97}$$

Differenziert man p_r und setzt die Feldgleichung (87) sowie $\nu' = w' + a\chi'$ ein, so folgt die anisotrope hydrostatische Gleichgewichtsbedingung

$$\frac{\mathrm{d}p_r}{\mathrm{d}\xi} + \frac{2}{\xi}(p_r - p_t) = \nu\, w' = -\frac{gm\nu}{\xi^2}. \tag{98}$$

Diese Identität ist eine Konsistenzbedingung zwischen Drucktensor, Phasengleichung und Newton-Gesetz. Wir prüfen sie in Abschnitt A.4.3 numerisch.

A.3.2 Arbeitsbilanz

Satz 1 (Arbeitsbilanz)**.** Jedes reguläre Gleichgewicht, das im Unendlichen gegen das wahre Vakuum fällt, erfüllt

$$\int_0^\infty \frac{2}{\xi}(\chi')^2\,\mathrm{d}\xi + \big[V_{\mathrm{vac}}(\chi_0) - V_{\mathrm{vac}}(\chi_v)\big] = -b\int_0^{\xi_R} \nu\,\chi'\,\mathrm{d}\xi. \tag{99}$$

Herleitung. Wir multiplizieren (87) mit χ' und integrieren von 0 bis ∞. Der kinetische Term ergibt $\int \chi'\chi''\,\mathrm{d}\xi = \tfrac{1}{2}\big[(\chi')^2\big]_0^\infty = 0$, weil $\chi'(0) = 0$ und $\chi' \to 0$ im Unendlichen. Der Potentialterm ist ein vollständiges Differential, $\int (\mathrm{d}V_{\mathrm{vac}}/\mathrm{d}\chi)\,\chi'\,\mathrm{d}\xi = V_{\mathrm{vac}}(\chi_v) - V_{\mathrm{vac}}(\chi_0)$. Der Quellterm liefert $-b\int \nu\chi'\,\mathrm{d}\xi$; außerhalb von ξ_R verschwindet ν. Umstellen ergibt (99). □

Das Dämpfungsintegral $\int_0^\infty (2/\xi)(\chi')^2\,\mathrm{d}\xi$ ist nichtnegativ. Es entspricht der geometrischen Reibung der radialen Laplace-Operators in drei Dimensionen und ist das konkrete Gegenstück zu den Skalierungsobstruktionen vom Derrick-Typ [10], hier jedoch in Gegenwart von Gravitation und eines endlichen Materiesterns.

Bemerkung 2. Die Vorzeichen in (99) folgen direkt aus (87). Insbesondere steht das Dämpfungsintegral auf derselben Seite wie $\Delta V_{\mathrm{vac}}(\chi_0)$. Eine Vertauschung dieses Vorzeichens wäre mit der Feldgleichung unvereinbar.

A.3.3 Existenzschranke für den positiven Zwei-Phasen-Zweig

Ein positiver Zwei-Phasen-Zweig im Sinne dieser Arbeit erfüllt $\chi_0 > 0$ und $\chi_v < 0$ (für $b > 0$) und interpoliert monoton zwischen beiden Mulden, $\chi' \leq 0$. Wegen $w' = -gm/\xi^2 \leq 0$ und $w(0) = 0$ gilt $w \leq 0$. Zusammen mit $a > 0$ und $\chi \leq \chi_0$ folgt

$$\nu = \nu_0 + w + a(\chi - \chi_0) \leq \nu_0 + a(\chi - \chi_0). \tag{100}$$

Die rechte Seite von (99) ist dann

$$-b\int_0^{\xi_R}\nu\chi'\,\mathrm{d}\xi = b\int_0^{\xi_R}\nu(-\chi')\,\mathrm{d}\xi \le b\int_{\chi_R}^{\chi_0}\big(\nu_0 + a(\chi-\chi_0)\big)\,\mathrm{d}\chi, \tag{101}$$

wobei $\chi_R = \chi(\xi_R)$. Das letzte Integral wertet zu $\nu_0\Delta\chi - (a/2)(\Delta\chi)^2$ aus, mit $\Delta\chi = \chi_0 - \chi_R \ge 0$. Die Randbedingung $\nu(\xi_R) = 0$ liefert außerdem $\Delta\chi = (\nu_0 + w(\xi_R))/a \le \nu_0/a$. Das quadratische Polynom in $\Delta\chi$ nimmt auf diesem Intervall sein Maximum bei $\Delta\chi = \nu_0/a$ an. Damit gilt

$$-b\int_0^{\xi_R}\nu\chi'\,\mathrm{d}\xi \le W_{\max} := \frac{b\nu_0^2}{2a} = \frac{b^2\nu_0^2}{4A}. \tag{102}$$

Satz 2 (Notwendige Existenzschranke)**.** Ein monotoner positiver Zwei-Phasen-Zweig mit $a>0$, $b>0$ und $A>0$ kann nur existieren, wenn

$$W_{\max} > \Delta V_{\mathrm{vac}}(\chi_0) + \int_0^{\infty}\frac{2}{\xi}(\chi')^2\,\mathrm{d}\xi \ge \Delta V_{\mathrm{vac}}(\chi_0). \tag{103}$$

Die Schranke ist notwendig, nicht hinreichend. Bereits die schwächere Bedingung $W_{\max} > \Delta V_{\mathrm{vac}}(\chi_0)$ schließt große Teile des Parameterraums aus.

Für die Referenzkopplung $b = 0{,}2$, $A = 0{,}6$ (also $a = 6$) ist $W_{\max} = \nu_0^2/60$. Bei $\nu_0 = 3$ folgt $W_{\max} = 0{,}150$, während $\Delta V_{\mathrm{vac}}(1) \approx 0{,}409$ und $\Delta V_{\mathrm{vac}}(\chi_+) \approx 0{,}398$ betragen. Der positive Zweig ist damit ausgeschlossen. Abbildung 19(b) zeigt diese Lage.

Derselbe Mechanismus lässt sich kinematisch lesen. Aus $\nu(\xi_R) = 0$ und $w \le 0$ folgt die Oberflächenabschätzung

$$\Delta\chi = \chi_0 - \chi(\xi_R) \le \frac{\nu_0}{a}. \tag{104}$$

Im Referenzfall $a = 6$, $\nu_0 = 3$ ist $\Delta\chi \le 0{,}5$. Startet man nahe $\chi_0 \approx 1$, so bleibt $\chi(\xi_R) \ge 0{,}5$ auf der falschen Seite der Barriere ($\chi_{\mathrm{B}} \approx 0{,}21$). Die Materie schneidet ab, bevor das Feld die Barriere überwinden kann.

Die Bedingung $W_{\max} > \Delta V_{\mathrm{vac}}$ mit $\Delta V_{\mathrm{vac}} \approx 0{,}4$ und $b = 0{,}2$ verlangt $\nu_0 > 2\sqrt{a}$. Zusammen mit der Zwei-Mulden-Bedingung (89) und dem Wunsch nach nicht zu starker Gravitation ergibt sich ein grobes Suchfenster

$$a \lesssim 0{,}5\ldots1, \qquad b \in \big(0,\, b_{\mathrm{crit}}\big), \qquad A \in [0{,}05,\, 0{,}25], \qquad g \lesssim 0{,}1\ldots0{,}3, \tag{105}$$

bei hinreichend großem ν_0. Ob in diesem Fenster tatsächlich Lösungen liegen, ist eine numerische Frage; wir beantworten sie in Abschnitt A.5.5.

A.4 Numerisches Verfahren

A.4.1 Schießverfahren

Wir integrieren (84) mit einem Runge-Kutta-Verfahren hoher Ordnung (DOP853) vom Taylor-Start (92) bei $\xi_{\min} = 10^{-4}$ bis zur ersten Nullstelle

von ν. Anschließend setzen wir die Vakuumgleichung

$$\chi'' + \frac{2}{\xi}\chi' = \frac{\mathrm{d}V_{\mathrm{vac}}}{\mathrm{d}\chi} \tag{106}$$

bis zu einem Abschneideradius $L_{\mathrm{eff}} = \max(L, \xi_R + 8/\mu_v)$ fort. Die linearisierte Vakuumgleichung um χ_v besitzt den abfallenden Yukawa-Ausläufer $(\chi - \chi_v) \propto e^{-\mu_v \xi}/\xi$. Die dazu gehörige Robin-Bedingung definiert das Schießresiduum

$$R = \chi'(L) + \Big(\mu_v + \frac{1}{L}\Big)\big(\chi(L) - \chi_v\big). \tag{107}$$

Eine Gleichgewichtslösung ist eine Nullstelle von $R(\chi_0)$. Wir suchen sie durch Vorzeichenwechsel auf einem χ_0-Gitter und anschließende Brent-Nullstellensuche.

Zwei numerische Phänomene verdienen eine ausdrückliche Warnung. Erstens existieren ausgedehnte Plateaus, auf denen das Außenfeld nahe der Barriere mit $\chi' \approx 0$ endet. Dort gilt $R \approx (\mu_v + 1/L)(\chi_{\mathrm{end}} - \chi_v) \approx 2{,}28$ im Referenzfall $b = 0{,}2$ und $L \approx 15$. Ein solches Residuum ist kein Gleichgewicht. Zweitens kann die echte Nullstelle zwischen zwei divergenten Schießmoden (Feldexplosion nach $\pm\infty$) auf einem extrem schmalen χ_0-Intervall liegen. Der Integrator findet sie dennoch, sobald ein Vorzeichenwechsel vorliegt; benachbarte Startwerte im Abstand 10^{-6} explodieren bereits.

A.4.2 Qualitätsklassen

Wir werten eine Schießtrajektorie nur dann als Gleichgewicht, wenn sie vakuumangepasst ist. Dazu klassifizieren wir nach dem Robin-Residuum und der Vakuumnähe am äußeren Integrationsende:

- Klasse A (theoretische Klasse): $|R| < 10^{-6}$ und $|\chi(L) - \chi_v| < 0{,}15$,
- Klasse B (praktische Konvergenzklasse): $|R| < 10^{-3}$ und $|\chi(L) - \chi_v| < 0{,}30$,
- Klasse C: $|R| < 10^{-1}$ und $|\chi(L) - \chi_v| < 0{,}50$,
- Klasse D: sonst.

Am Referenzpunkt messen wir bei $L = 15$ eine lineare Empfindlichkeit $|\mathrm{d}R/\mathrm{d}\chi_0| \sim 10^9$ (zentrale Differenzen mit Schritt 10^{-10}). Bereits $\Delta\chi_0 = 10^{-6}$ führt im Integrator zur Feldexplosion ($|\chi| = 6$). Bei dieser Empfindlichkeit ist die Schwelle $|R| < 10^{-6}$ in der Praxis nicht robust erreichbar; Residuenjitter liegt in derselben Größenordnung. Klasse A bleibt daher eine theoretische Klasse. Als Arbeitskriterium verwenden wir die praktische Konvergenzschwelle $|R| < 10^{-4}$ bei guter Vakuumübereinstimmung. Sie fällt in Klasse B, die wir als praktische Konvergenzklasse werten. Nur Lösungen der Klasse B — einschließlich solcher, die zusätzlich Klasse A erfüllen — zählen als Gleichgewichte. Die Klassen C und D, insbesondere das Barrierenplateau $R \approx 2{,}28$, zählen nicht. Ändert man L, so muss χ_0 neu optimiert

werden; engere Integratortoleranzen allein ändern R am gefundenen Fußpunkt kaum.

A.4.3 Verifikation

Im entkoppelten Grenzfall $A = b = 0$, $a = 0$, $g = 1$ reduziert sich das System auf den $n = 1$-Polytrop. Die exakte Lösung ist $\nu(\xi) = \nu_0 \sin\xi/\xi$ mit $\xi_R = \pi$. Der Integrator reproduziert ξ_R mit einem absoluten Fehler von 4×10^{-11} und das Dichteprofil mit einem maximalen absoluten Fehler von 1×10^{-10}.

Die Taylor-Koeffizienten (93) stimmen symbolisch mit der Potenzreihenlösung des Differentialgleichungssystems überein (Anhang A.11).

Auf dem unten bestimmten regulären Zweig ist die Arbeitsbilanz (99) mit einem relativen Fehler von $1{,}8 \times 10^{-5}$ erfüllt (absoluter Fehler $1{,}3 \times 10^{-7}$). Die hydrostatische Identität (98) hat einen medianen absoluten Residualfehler von $3{,}9 \times 10^{-6}$; das Maximum von etwa $6{,}5 \times 10^{-4}$ tritt nahe der Oberfläche auf, wo beide Seiten von (98) gegen null gehen. Die Anisotropieidentität (96) ist bis auf Rundungsfehler (10^{-16}) erfüllt.

A.5 Ergebnisse

Alle newtonischen Rechnungen dieses Abschnitts nutzen denselben Integrator wie die zugrunde liegende numerische Kampagne. Soweit nicht anders gesagt, ist der Referenzpunkt $b = 0{,}2$, $A = 0{,}6$ (also $a = 6$), $g = 1$, $\nu_0 = 1{,}2$.

A.5.1 Regulärer negativer Zweig

Im Referenzpunkt existiert genau ein Vorzeichenwechsel von $R(\chi_0)$ im negativen Fenster. Die zugehörige Nullstelle ist

$$\chi_0 = -1{,}02406741, \qquad \xi_R = 2{,}68338, \qquad m_R = 2{,}25496, \qquad \chi(\xi_R) = -1{,}08108. \tag{108}$$

Das Robin-Residuum beträgt $R \approx -2{,}2 \times 10^{-6}$. Das Feld am äußeren Integrationsende liegt bei $\chi = -1{,}08803$, also $|\chi(L) - \chi_v| \approx 7 \times 10^{-7}$. Das erfüllt die praktische Konvergenzschwelle $|R| < 10^{-4}$ klar und fällt in Klasse B. Die theoretische Klasse A ($|R| < 10^{-6}$) wird knapp verfehlt; wegen $|\mathrm{d}R/\mathrm{d}\chi_0| \sim 10^{9}$ verwenden wir sie nicht als Arbeitskriterium. Der Referenzpunkt $g = 1$, $a = 6$, $b = 0{,}2$, $\nu_0 = 1{,}2$ ist damit ein echtes Gleichgewicht der praktischen Klasse B, aber kein robustes Beispiel für Klasse A: die Anziehung im χ_0-Raum ist extrem schmal. Grobe Suchen finden statt der Nullstelle leicht die nicht konvergente Plateau-Familie mit $m_R \sim 108$ (Abschnitt A.5.2). Die Kompaktheit in Einheiten von ε ist $g m_R/\xi_R \approx 0{,}840$. Das punktweise Kriterium $3\chi^2 - 1 - 2A > 0$ bleibt entlang des gesamten Profils erfüllt (Minimum $0{,}946$).




Abbildung 17: Regulärer negativer Zweig bei $b = 0{,}2$, $A = 0{,}6$, $g = 1$, $\nu_0 = 1{,}2$. (a) Ordnungsparameter $\chi(\xi)$ und Vakuumwert χ_v. (b) Dichte $\nu(\xi)$. (c) Radial- und Tangentialdruck. (d) Anisotropie $p_r - p_t$. Die senkrechte Linie markiert die Materieoberfläche ξ_R. Vakuumangepasstes Gleichgewicht (praktische Klasse B).

Abbildung 17 zeigt die Profile. Der Ordnungsparameter weicht nur schwach von χ_v ab und fällt monoton. Die Dichte ähnelt einem leicht deformierten $n = 1$-Polytrop. Der Radialdruck bleibt positiv ($p_r(0) \approx 0{,}572$, Minimum im Inneren $\approx 9{,}6 \times 10^{-4}$). Eine Zugzone mit $\nu > 0$ und $p_r < 0$ tritt nicht auf. Der Tangentialdruck wird nahe der Oberfläche leicht negativ ($p_t^{(\min)} \approx -6 \times 10^{-3}$), weil die Anisotropie (96) p_t unter p_r drückt.

Die Arbeitsbilanz auf diesem Zweig ist numerisch klein, wie es bei einem Feld nahe am Vakuum sein muss: $\Delta V_{\mathrm{vac}}(\chi_0) \approx 0{,}00494$ und $\int (2/\xi)(\chi')^2 \,\mathrm{d}\xi \approx 0{,}00220$. Beide Seiten von (99) stimmen auf $1{,}3 \times 10^{-7}$ überein.

A.5.2 Nicht konvergente Trajektorien mit Residuum $R \approx 2{,}28$

Neben der echten Nullstelle existiert eine Familie von Schießtrajektorien mit $\chi_0 \approx -0{,}98$, großem Radius und einem nahezu konstanten Residuum




Abbildung 18: Robin-Residuum $R(\chi_0)$ im Referenzmodell $A = 0{,}6$, $b = 0{,}2$, $g = 1$. (a) Übersicht für $\nu_0 = 1{,}2$, 2 und 3. Im positiven χ_0-Bereich liegt R auf einem Plateau bei etwa $2{,}28$ und kreuzt die Null nicht. (b) Umgebung des regulären Zweigs bei $\nu_0 = 1{,}2$. Die Nullstelle (Marke) ist ein vakuumangepasstes Gleichgewicht der praktischen Klasse B; rechts schließt das Barrierenplateau der Klasse D an.

$R \approx 2{,}28$. Ein typischer Vertreter ist $\chi_0 \approx -0{,}982$, $\xi_R \approx 6{,}489$, $m_R \approx 109{,}5$, $\chi(\xi_R) \approx 0{,}154$, $\chi(L) \approx 0{,}282$. Diese Zahlen liegen nahe bei früher notierten Werten $(\xi_R, m_R, \chi_R, R) \approx (6{,}4656,\ 108{,}17,\ 0{,}15455,\ 2{,}2787)$. Das Residuum $2{,}28$ ist kein Konvergenzdefekt im engeren Sinn, sondern der analytische Plateauwert $(\mu_v + 1/L)(\chi_{\text{end}} - \chi_v)$ für ein Feld, das im Außenraum nahe der Barriere mit verschwindender Ableitung endet. Solche Trajektorien erfüllen die Yukawa-Bedingung nicht: sie gehören zur Klasse D und zählen nicht als Gleichgewichte. Insbesondere darf der früher notierte Wert $m_R \approx 108$ nicht als Masse eines Vakuumgleichgewichts verwendet werden.

Abbildung 18(b) zeigt, wie schmal die echte Nullstelle zwischen zwei divergenten Schießmoden liegt. Eine Verschiebung von χ_0 um nur 10^{-6} führt bereits zur Feldexplosion. Der Brent-Algorithmus findet die Nullstelle dennoch, weil R das Vorzeichen wechselt.

A.5.3 Reguläre Zweige auf einem kleinen Parametergitter

Auf dem Gitter $g \in \{0{,}3,\ 1\}$, $a \in \{0{,}5,\ 1,\ 3\}$, $b \in \{0{,}2,\ 0{,}3\}$, $\nu_0 \in \{1,\ 2\}$ (24 Punkte) besitzt genau ein Punkt keinen negativen Zweig mit Oberfläche. Die übrigen 23 Punkte liefern jeweils eine vakuumangepasste Lösung der praktischen Klasse B, mit $|\chi(L) - \chi_v|$ typischerweise unter 10^{-4}. Die theoretische Unterscheidung gegenüber Klasse A ist wegen des Residuenjitters nahe

10^{-6} nicht robust. Mit der praktischen Schwelle $|R| < 10^{-4}$ sind alle 23 akzeptable Gleichgewichte.

Zwei Vertreter, die in einer früheren Zählung besonders hervorgehoben wurden, bestätigen wir. Die Kompaktheiten geben wir nachgerechnet an; sie sind gegenüber jener Zählung vertauscht. Beide Lösungen sind lokal stabil nach $3\chi^2 - 1 - 2A > 0$, und eine Zugzone ($\nu > 0$ und $p_r < 0$) tritt nicht auf.

Tabelle 1: Zwei vakuumangepasste reguläre Zweige auf dem kleinen Parametergitter (praktische Klasse B). Die Kompaktheit ist gm_R/ξ_R.

g	a	b	ν_0	χ_0	ξ_R	m_R	gm_R/ξ_R	Klasse
0,3	0,5	0,2	2	−0,92164	5,633	35,93	1,914	B
0,3	3,0	0,2	2	−0,92918	5,111	25,75	1,512	B

A.5.4 Ausschluss des positiven Zweigs bei starker Kopplung

Für $A = 0{,}6$, $b = 0{,}2$, $g = 1$ und $\nu_0 \in \{1{,}2, 2, 3\}$ finden wir im Intervall $\chi_0 \in [0{,}15, 1{,}40]$ keinen Vorzeichenwechsel von R unter Trajektorien mit definierter Oberfläche (Abbildung 18(a)). Das minimale Betragsresiduum auf diesem Gitter liegt jeweils nahe $2{,}04$ bis $2{,}05$ und gehört zum Barrierenplateau. Zugleich ist die notwendige Schranke verletzt: $W_{\max}(\nu_0 = 1{,}2) = 0{,}024$, $W_{\max}(\nu_0 = 2) = 0{,}067$ und $W_{\max}(\nu_0 = 3) = 0{,}150$, sämtlich kleiner als $\Delta V_{\mathrm{vac}}(1) \approx 0{,}409$. Numerische Suche und analytische Schranke stimmen darin überein, dass es in diesem stark gekoppelten Bereich keinen positiven Zwei-Phasen-Zweig gibt.

A.5.5 Zwei-Phasen-Lösungen im erlaubten Fenster

Die Schranke (103) ist notwendig, nicht hinreichend. Wir haben daher ein bescheidenes Gitter im weniger ausgeschlossenen Fenster durchsucht: Kombinationen aus $a \in \{0{,}4, 0{,}5, 0{,}6, 0{,}8, 1{,}0\}$, $b \in \{0{,}2, 0{,}25, 0{,}3, 0{,}35\}$, $g \in \{0{,}05, 0{,}10, 0{,}30\}$ und $\nu_0 \in \{2, 3, 4, 5\}$, jeweils mit $|b| < b_{\mathrm{crit}}$. Viele dieser Punkte erfüllen $W_{\max} > \Delta V_{\mathrm{vac}}(1)$ und besitzen dennoch keinen Vorzeichenwechsel von R. In mindestens zwei Punkten existiert jedoch ein konvergierter positiver Zwei-Phasen-Zweig.

Der klarste Treffer, zugleich das natürliche Beispiel im erlaubten Fenster, ist

$$a = 0{,}4, \quad b = 0{,}2, \quad A = 0{,}04, \quad g = 0{,}1, \quad \nu_0 = 4, \tag{109}$$

mit

$$\chi_0 = 0{,}53459, \qquad \xi_R = 9{,}6483, \qquad m_R = 310{,}90, \qquad \chi(\xi_R) = -1{,}07940. \tag{110}$$




Abbildung 19: (a) Vakuumpotential $V_{\mathrm{vac}}(\chi)$ für $b = 0{,}2$, mit wahrem Vakuum χ_v, Barriere (Dreieck) und Metastabilem χ_+. (b) Arbeits-Schranke $W_{\max}(\nu_0) = b^2\nu_0^2/(4A)$ für $A = 0{,}6$. Die Marke bei $\nu_0 = 3$ liegt unter beiden Vergleichswerten $\Delta V_{\mathrm{vac}}(\chi_0 = 1)$ und $\Delta V_{\mathrm{vac}}(\chi_+)$.

Das Residuum beträgt $R \approx 2{,}9 \times 10^{-6}$, und es gilt $|\chi(L) - \chi_v| \approx 9 \times 10^{-7}$. Das erfüllt die praktische Schwelle $|R| < 10^{-4}$ und fällt in Klasse B. Das Feld endet bei $\chi = -1{,}08803 = \chi_v$. Es gilt $\chi_0 > 0 > \chi_v$, das Profil ist monoton fallend, und die Übergangsregion liegt im Innern des Sterns (Maximum von $|\chi'|$ bei $\xi \approx 2{,}00$, Halbwertsbreite $\approx 2{,}90$). Danach folgt eine ausgedehnte Hülle mit $\chi \approx \chi_v$ und polytropartig abfallender Dichte bis $\xi_R \approx 9{,}65$. Abbildung 20 zeigt die Profile.

Die Schranke ist hier komfortabel erfüllt: $W_{\max} = 4{,}00$ gegenüber $\Delta V_{\mathrm{vac}}(\chi_0) \approx 0{,}444$ und einem Dämpfungsintegral von $0{,}532$. Beide Seiten der Arbeitsbilanz stimmen auf 4×10^{-6} überein. Der Radialdruck bleibt positiv ($p_r(0) \approx 7{,}11$, Minimum $\approx 2{,}5 \times 10^{-5}$); eine Zugzone tritt nicht auf. Der Tangentialdruck wird in der Wandschicht geringfügig negativ. Die Kompaktheit in Einheiten von ε ist $gm_R/\xi_R \approx 3{,}22$.

Das punktweise Kriterium $3\chi^2 - 1 - 2A > 0$ wird in der Übergangsregion verletzt. Das ist für jede Konfiguration zu erwarten, die die Barriere durchquert, und ersetzt keine lineare Stabilitätsanalyse des Sterns.

Ein zweiter Treffer erscheint bei $a = 1$, $b = 0{,}35$, $A = 0{,}175$, $g = 0{,}1$, $\nu_0 = 4$, mit $\chi_0 \approx 1{,}085$, $\xi_R \approx 8{,}33$ und $m_R \approx 113$. Das Residuum ist mit $|R| \sim 10^{-2}$ Klasse C; wir werten diesen Punkt daher nur als Hinweis auf weitere Lösungen, nicht als gleichwertig kontrolliertes Gleichgewicht.




Abbildung 20: Konvergierter Zwei-Phasen-Zweig bei $a = 0{,}4$, $b = 0{,}2$, $g = 0{,}1$, $\nu_0 = 4$. (a) Der Ordnungsparameter fällt monoton von $\chi_0 > 0$ auf $\chi_v < 0$. (b) Dichte mit ausgedehnter Hülle. (c) Drücke; p_r bleibt positiv. (d) Die Anisotropie markiert die Übergangsregion im Innern. Vakuumangepasstes Gleichgewicht (Klasse B).

A.5.6 $\mathbb{Z}_2$-Test

Die Abbildung (94) reproduziert den Referenzzweig exakt. Aus $(a, b, \chi_0) = (6,\ 0{,}2,\ -1{,}02406741)$ wird $(-6,\ -0{,}2,\ +1{,}02406741)$, mit identischen Werten von ξ_R und m_R und mit $\chi_v \mapsto -\chi_v$.

Der Fall $a = 6$, $b = -0{,}2$ (also $A = -0{,}6$) besitzt numerisch ebenfalls eine Nullstelle, und zwar eine vorzeichenwechselnde Konfiguration ($\chi_0 \approx -0{,}814$, $\chi_v \approx +1{,}088$, $\xi_R \approx 5{,}54$, $m_R \approx 122{,}7$, $R \approx 8 \times 10^{-9}$). Hier ist $a/b < 0$, die Anisotropie (96) wechselt das Vorzeichen, und p_r wird im Innern negativ. Diese Lösung liegt außerhalb der Klasse $A > 0$, auf die sich die Druckinterpretation und die Schranke (103) beziehen. Wir werten sie als mathematische Beobachtung, nicht als physikalischen Zwei-Phasen-Zweig im Sinne dieser Arbeit.

A.6 Schwach-relativistische Erweiterung

A.6.1 Konform flacher Ansatz

Als wirksame, schwach-relativistische Erweiterung verwenden wir die konform flache Metrik

$$\mathrm{d}s^2 = -e^{-2\varepsilon u}\,c^2\mathrm{d}t^2 + e^{2\varepsilon u}\big(\mathrm{d}r^2 + r^2\mathrm{d}\Omega^2\big), \tag{111}$$

mit $\psi = \varepsilon u$ und

$$\varepsilon = \frac{2Kn_c}{m_0 c^2} = \Big(\frac{c_s}{c}\Big)^2 \lesssim 0{,}05. \tag{112}$$

Die Feldgleichungen lauten

$$\begin{aligned} m' &= \xi^2\,\tilde{\varepsilon},\\ \tilde{\varepsilon} &= \nu + \varepsilon\left(\frac{\nu^2}{2} + \frac{a}{b}\Big[e^{-2\varepsilon u}\frac{(\chi')^2}{2} + U_{\mathrm{vac}}\Big]\right),\\ u' &= -\frac{gm}{\xi^2}\,e^{2\varepsilon u},\\ e^{-2\varepsilon u}\left[\chi'' + \left(\frac{2}{\xi} + 2\varepsilon u'\right)\chi'\right] &= \chi(\chi^2-1) - b(\nu-1). \end{aligned} \tag{113}$$

Die Anisotropie erhält den Redshift-Faktor $(a/b)\,e^{-2\varepsilon u}(\chi')^2$. Im Außenraum frieren wir die Masse bei m_R ein und setzen

$$e^{-2\varepsilon u} = 1 - \frac{2\varepsilon g m_R}{\xi}, \tag{114}$$

solange $2\varepsilon g m_R/\xi_R < 1$ bleibt. Die Dichtebeziehung (83) behalten wir mit $w = u - u(0)$ bei. Der Zentralwert $u(0)$ wird so bestimmt, dass (114) an der Oberfläche gilt.

Wir betonen den näherungsweisen Charakter dieses Systems. Die Metrik (111) löst die Vakuum-Einstein-Gleichungen nicht; die isotrope Schwarzschild-Metrik hat eine andere Relation zwischen den tt- und rr-Koeffizienten. Ebenso vernachlässigt die Massefortsetzung (114) die Feldenergie außerhalb von ξ_R. Der Ansatz ist ein konsistentes Post-Newton-artiges Modell, kein Ersatz für ein Tolman-Oppenheimer-Volkoff-System mit skalarem Feld. Gemessen wird eine Metrik an zwei Stellen: im schwachen Feld durch β und γ, im starken Feld durch den Schattendurchmesser. Im schwachen Feld liefert das lokale Gesetz $\Delta p = c^2\Delta\rho$ des Mediums $\rho/\rho_\infty = e^{\psi}$ und $n = e^{2\psi}$, also $\beta = \gamma = 1$ und Merkurs $42{,}98''$ pro Jahrhundert (Anhang J); das ist die Messung (Cassini: $\gamma - 1 = (2{,}1 \pm 2{,}3)\times 10^{-5}$, MESSENGER: $\beta - 1 = (-2{,}7 \pm 3{,}9)\times 10^{-5}$). Im starken Feld gibt dieselbe Metrik den kritischen Stoßparameter $2e\,\mu$, also $+4{,}6\,\%$ gegenüber Schwarzschild; das liegt innerhalb der von der EHT-Kollaboration gemessenen Abweichung $\delta = -0{,}04^{+0{,}09}_{-0{,}10}$ (Abschnitt A.7.1). Das Polytrop $n = 1$ dieses Vergleichsmodells betrifft nur das Innere; im Buch trägt das lokale Gesetz das ganze Medium (Bemerkung 1).

Tabelle 2: Schwach-relativistische Fortsetzung des konvergierten regulären Zweigs ($b = 0{,}2$, $A = 0{,}6$, $g = 1$, $\nu_0 = 1{,}2$), jeweils neu optimiert und klassifiziert. Eine frühere ε-Tabelle auf der nicht konvergenten Familie mit $m_R \sim 108$ ist damit überholt.

ε	χ_0	ξ_R	m_R	$\lvert R\rvert$	$\lvert\chi(L)-\chi_v\rvert$	Klasse
0	$-1{,}0240674$	2,68338	2,25496	$3{,}3\times10^{-5}$	1×10^{-5}	B
0,001	$-1{,}0240683$	2,67973	2,24535	$1{,}1\times10^{-6}$	4×10^{-7}	B
0,005	$-1{,}0240716$	2,66529	2,20754	$1{,}9\times10^{-4}$	6×10^{-5}	B
0,010	$-1{,}0240756$	2,64757	2,16169	$1{,}5\times10^{-5}$	5×10^{-6}	B

A.6.2 Newton-Grenze und ε-Sequenz

Für $\varepsilon = 0$ reproduziert der relativistische Integrator am newtonischen Referenzpunkt die Größen ξ_R, m_R und $\chi(\xi_R)$ mit Abweichungen von $1{,}3\times10^{-11}$, $2{,}4\times10^{-10}$ und 2×10^{-13}. Das erfüllt die Sollgenauigkeit 10^{-10} für die Sternstruktur.

Eine Fortsetzung des konvergierten regulären Zweigs in ε, bei der χ_0 an jedem Punkt neu optimiert und die Qualität neu bestimmt wird, ergibt Tabelle 2. Sowohl ξ_R als auch m_R nehmen mit wachsendem ε leicht ab, um etwa $1{,}3\,\%$ bzw. $4{,}1\,\%$ zwischen $\varepsilon = 0$ und $\varepsilon = 0{,}01$. Alle vier Punkte sind vakuumangepasst und fallen in die praktische Klasse B ($\lvert\chi(L)-\chi_v\rvert \lesssim 10^{-4}$). Bei $\varepsilon = 0{,}005$ liegt $\lvert R\rvert$ etwas über der praktischen Schwelle 10^{-4}, bleibt aber innerhalb der Klassendefinition B ($\lvert R\rvert < 10^{-3}$) bei sehr guter Vakuumübereinstimmung. Die tatsächliche Kompaktheit ist $\varepsilon\, g m_R/\xi_R$; sie bleibt in diesem Bereich unter $0{,}02$. Für den echten regulären Zweig ist die newtonische Beschreibung daher eine kontrollierte Näherung, nicht bloß eine formale Rechnung.

Früher notierte Werte $\xi_R = 6{,}4656$, $6{,}4857$, $6{,}5679$ und $6{,}6748$ sowie $m_R = 108{,}17$, $109{,}85$, $116{,}91$ und $126{,}47$ gehören nach Abschnitt A.5.2 zur nicht konvergenten großräumigen Schießfamilie, nicht zum Robin-Gleichgewicht. Sie werden hier daher nicht als Gleichgewichtstabelle übernommen.

A.6.3 Positiver Zweig bei starker Kopplung

Wir haben den positiven χ_0-Bereich $[0{,}2,\ 1{,}3]$ erneut durchsucht, und zwar für $\nu_0 \in \{2,\ 3\}$, $\varepsilon \in \{0,\ 0{,}01,\ 0{,}03,\ 0{,}05\}$ sowie für beide Oberflächendefinitionen $\nu = 0$ und $p_r = 0$. In keinem der sechzehn Fälle tritt ein Vorzeichenwechsel von R auf. Für die Bedingung $\nu = 0$ liegt das minimale Betragsresiduum erneut nahe $2{,}04$ (Barrierenplateau). Eine Oberfläche $p_r = 0$ tritt in diesem Fenster gar nicht auf. Schwache Relativität erzeugt bei der starken Referenzkopplung also keinen positiven Zweig. Das ist mit der newtonischen Schranke verträglich, die bereits bei $\varepsilon = 0$ deutlich verletzt ist.




Abbildung 21: Fortsetzung des konvergierten regulären Zweigs in der schwach-relativistischen Erweiterung. (a) Oberflächenradius ξ_R. (b) eingeschlossene Masse m_R. Beide Größen nehmen mit ε leicht ab. Alle Punkte sind Klasse B.

A.7 Starkes Feld: Außenlösung und kritische Lichtbahn

Die konform flache Metrik (111) ist für beliebige Werte des konformen Faktors $\psi = \varepsilon u$ definiert, nicht nur für kleine ε. Im Materie-freien Außenraum ist $m = m_R$ konstant, und die Feldgleichung (113) reduziert sich auf

$$u' = -\frac{g m_R}{\xi^2}\, e^{2\varepsilon u}. \tag{115}$$

Setzt man $f = e^{-2\varepsilon u}$, so folgt $f' = -2\varepsilon f\, u'$ und damit $f' = 2\varepsilon g m_R/\xi^2$. Die Integration mit der Randbedingung $f \to 1$ für $\xi \to \infty$ (also $u \to 0$) liefert genau die bereits verwendete Außenlösung

$$e^{-2\varepsilon u} = 1 - \frac{2\varepsilon g m_R}{\xi} = 1 - \frac{2\mu}{\xi}, \tag{116}$$

solange $2\varepsilon g m_R/\xi_R < 1$ bleibt, damit f an der Oberfläche positiv ist. Hier ist $\mu = \varepsilon g m_R$ der dimensionslose Massenparameter; in physikalischen Einheiten entspricht er $G M/c^2 = \mu\,\ell$.

Diese Herleitung bestätigt (114). Sie zeigt zugleich, dass die Außenlösung des Modells nicht die exponentielle Form $\psi = \mu/\xi$ ist. Aus (116) folgt vielmehr $\psi = -\tfrac{1}{2}\ln(1 - 2\mu/\xi)$. Beide Ausdrücke stimmen in erster Ordnung überein, $\psi = \mu/\xi + \mathrm{O}((\mu/\xi)^2)$, unterscheiden sich aber im starken Feld.

Die Aussage, die Metrik besitze keinen Ereignishorizont, bedarf einer Unterscheidung. Für die exponentielle Vergleichsmetrik $\psi = \mu/r$ gilt $g_{tt} = -e^{-2\mu/r}c^2 \neq 0$ in jedem endlichen r; ein Horizont fehlt dort wirklich [13, 14].

Für die modelleigene Außenlösung (116) verschwindet f bei $\xi = 2\mu$. Dort divergiert g_{rr}, der Rotverschiebungsfaktor geht gegen null, die proper radiale Distanz zum Locus bleibt endlich, während der Flächenradius $\xi/\sqrt{f}$ divergiert. Das ist keine Schwarzschild-Sphäre endlicher Fläche, aber eine Entartung der Metrik. Liegt die Sternoberfläche außerhalb dieses Locus ($\xi_R > 2\mu$), so gehört die Entartung nicht zum physikalischen Außenraum. Innerhalb des Sterns gilt (116) ohnedies nicht. Innen rechnet dieses Vergleichsmodell mit dem Polytrop $n = 1$; das ist die Phasen-Polytrop-Lösung dieses Anhangs, deren schwach-relativistische Fortsetzung Abschnitt A.6 rechnet. Im Buch gilt im ganzen Medium das lokale Gesetz mit $n = e^{2\psi}$. Die Bedingung $2\mu/\xi_R < 1$ sichert nur, dass der Außenraum die Nullstelle von f nicht enthält.

A.7.1 Kritische Lichtbahn

Für eine statische, sphärisch-symmetrische Metrik $\mathrm{d}s^2 = -A\,c^2\mathrm{d}t^2 + B\,(\mathrm{d}r^2 + r^2\mathrm{d}\Omega^2)$ folgt aus $\mathrm{d}s^2 = 0$ der optische Brechungsindex $n = \sqrt{B/A}$. Entlang einer Lichtbahn ist $b_{\mathrm{ph}} = n\,r\sin\vartheta$ erhalten; am Umkehrpunkt gilt $\sin\vartheta = 1$, also $b_{\mathrm{ph}} = r\,n(r)$. Der kritische Stoßparameter ist das Minimum dieser Funktion,

$$b_{\mathrm{ph}}^{\mathrm{crit}} = \min_{r}\, r\,n(r). \tag{117}$$

Für $A = e^{-2\psi}$, $B = e^{2\psi}$ ist $n = e^{2\psi}$ und damit

$$b_{\mathrm{ph}}(r) = r\,e^{2\psi(r)}. \tag{118}$$

Für $A = e^{-\psi}$, $B = e^{\psi}$ wäre dagegen $n = e^{\psi}$. Die beiden Fälle unterscheiden sich um einen Faktor 2 im Exponenten, und dieser Faktor ist der Grund, warum die kritischen Stoßparameter $2e\mu$ bzw. $e\mu$ lauten. Rotation und Strahlungstransport werden hier nicht berücksichtigt; die jeweilige Vakuumform der Metrik wird bis zur kritischen Bahn als gültig angenommen.

Zwei Fälle sind zu trennen.

Exponentielle Vergleichsmetrik. Setzt man $\psi = \mu/r$ mit $\mu = \mathrm{G}M/c^2$, so ist $b_{\mathrm{ph}}(r) = r\exp(2\mu/r)$. Das Extremum liegt bei

$$r_c = 2\mu, \qquad b_{\mathrm{ph}}^{\mathrm{exp}} = 2e\,\mu \approx 5{,}4366\,\frac{\mathrm{G}M}{c^2}. \tag{119}$$

Im Schwarzschild-Fall gilt $b_{\mathrm{ph}}^{\mathrm{Schw}} = 3\sqrt{3}\,\mathrm{G}M/c^2 \approx 5{,}1962\,\mathrm{G}M/c^2$; die relative Abweichung beträgt etwa $4{,}6\,\%$. Dieses Ergebnis ist für die Yilmaz- bzw. exponentielle Metrik bekannt [13, 14]. Es setzt voraus, dass die Form $\psi = \mu/r$ bis zur kritischen Bahn gilt. Wie oben gezeigt, ist das nicht die Außenlösung des vorliegenden Modells.

Tabelle 3: Kritischer Lichtstoßparameter dreier statischer Metriken. Der Massenparameter ist $\mu = \mathrm{G}M/c^2$. Die erste Zeile ist die modelleigene Außenlösung (116); die zweite Zeile ist die exponentielle Vergleichsmetrik, nicht die Lösung der Feldgleichung (115).

Metrik	r_c	$b_{\mathrm{ph}}^{\mathrm{crit}}$	gegen Schwarzschild
Modell, $e^{-2\psi} = 1 - 2\mu/r$ (isotrop)	4μ	8μ	$+54\,\%$
Exponentiell, $\psi = \mu/r$ (isotrop)	2μ	$2e\mu \approx 5{,}4366\mu$	$+4{,}6\,\%$
Schwarzschild (arealer Radius)	3μ	$3\sqrt{3}\,\mu \approx 5{,}1962\mu$	—

Modelleigene Außenlösung. Mit $f = 1 - 2\mu/r$ ist $A = f$, $B = 1/f$ und damit $n = 1/f = 1/(1 - 2\mu/r)$, also $b_{\mathrm{ph}}(r) = r/f = r^2/(r - 2\mu)$. Die Ableitung verschwindet bei $r_c = 4\mu$ (außerhalb der Entartung $r = 2\mu$), und man erhält

$$b_{\mathrm{ph}}^{\mathrm{mod}} = \frac{4\mu}{1 - 2\mu/(4\mu)} = 8\mu = 8\,\frac{\mathrm{G}M}{c^2}. \tag{120}$$

Das liegt rund $54\,\%$ über dem Schwarzschild-Wert, nicht $4{,}6\,\%$. Das Modell impliziert (120), weil seine Feldgleichung auf (116) integriert, nicht auf $\psi = \mu/r$.

Eine kritische Bahn im Vakuum-Außenraum erfordert zusätzlich $r_c > \xi_R \ell$, also $4\mu > \xi_R$ bzw. $4\varepsilon g m_R/\xi_R > 1$. Für den konvergierten regulären Zweig ist $g m_R/\xi_R \approx 0{,}84$; selbst bei $\varepsilon = 0{,}05$ bleibt $4\varepsilon g m_R/\xi_R \approx 0{,}17 < 1$, die formale Photosphäre läge im Innern. Für den Zwei-Phasen-Zweig ($g m_R/\xi_R \approx 3{,}22$) wäre sie im Außenraum erst ab $\varepsilon \gtrsim 0{,}078$ erreichbar, zugleich begrenzt $2\varepsilon g m_R/\xi_R < 1$ das Fenster auf $\varepsilon \lesssim 0{,}16$. Im hier untersuchten Bereich $\varepsilon \le 0{,}05$ tritt daher keine Vakuum-Photosphäre auf.

Die Beobachtungen von Sagittarius A* durch das Event Horizon Telescope prüfen die Abweichung des Schattendurchmessers vom Schwarzschild-Wert, $\delta \equiv (d_{\mathrm{sh}}/d_{\mathrm{sh,Sch}}) - 1$. Für die Kalibration mit GRMHD und `eht-imaging` berichtet die Kollaboration $\delta = -0{,}04^{+0{,}09}_{-0{,}10}$ mit dem Keck-Masse-Abstand und $\delta = -0{,}08 \pm 0{,}09$ mit dem VLTI-Wert; die beobachtete Bildgröße liegt damit innerhalb von etwa $10\,\%$ der Kerr-Vorhersage [22]. Die Pointe für die vorliegende Rechnung ist eine andere: bei $\varepsilon \le 0{,}05$ liegt die Photosphäre im Innern des Sterns, sodass die Vakuum-Außenlösung dort nicht bis zur Photosphäre gilt. Für den regulären Zweig ist $4\varepsilon g m_R/\xi_R \approx 0{,}17 < 1$, und auch auf dem Zwei-Phasen-Zweig bleibt $4\varepsilon g m_R/\xi_R \approx 0{,}64 < 1$. Die Photosphäre läge dort erst ab $\varepsilon \gtrsim 0{,}078$ im Außenraum ($r_c = 4\mu > \xi_R \ell$). Der Vakuumwert 8μ ist in diesem Bereich daher keine anwendbare Vorhersage. Wäre die Vakuum-Außenlösung bis zur Photosphäre gültig, so läge 8μ ($+54\,\%$ gegenüber Schwarzschild) außerhalb der von der Kollaboration berichteten Abweichung. Das ist weder eine Beobachtungsschranke an ε noch eine Aussage über das Außenfeld eines Körpers im Medium. Die Beobachtungsaussage folgt aus dem lokalen Gesetz: Außerhalb der dichten Phase antwortet das Medium mit $\Delta p = c^2 \Delta\rho$, also mit der exponentiellen Metrik $\psi = \mu/r$ (zweite Zeile der Tabelle 3). Ihr kritischer Stoßparameter

$2e\,\mu \approx 5{,}44\,\mu$ liegt $4{,}6\,\%$ über Schwarzschild und damit innerhalb der gemessenen Bandbreite $\delta = -0{,}04^{+0{,}09}_{-0{,}10}$ (Keck); gegen den VLTI-Wert $\delta = -0{,}08 \pm 0{,}09$ sind es $1{,}4\,\sigma$. Der Wert 8μ der $\gamma = 2$-Außenlösung ($+54\,\%$) ist gemessen ausgeschlossen; das zeigt, dass der Außenraum eines kompakten Körpers nicht diesem Vergleichsmodell folgt, sondern dem Medium mit dem lokalen Gesetz.

A.8 Tensorielle Erweiterung des Mediums

Gemessen ist zuerst: Die Gravitationswelle GW170817 und der Gammablitz GRB 170817A trafen nach $\sim 1{,}3 \times 10^8$ Lichtjahren Laufweg mit $1{,}7\,\mathrm{s}$ Abstand ein; daraus folgt $-3 \times 10^{-15} \le c_g/c - 1 \le +7 \times 10^{-16}$, also $|c_g/c - 1| \lesssim 10^{-15}$ [16]. Das Drei-Detektor-Ereignis GW170814 bevorzugt rein tensorielle Polarisation gegenüber rein vektorieller mit einem Bayes-Faktor über 200 und gegenüber rein skalarer mit einem Bayes-Faktor über 1000 [15]. Der Bahnzerfall von Doppelpulsaren trifft die Quadrupolformel: PSR B1913+16 mit $\dot{P}_b^{\mathrm{gem}}/\dot{P}_b^{\mathrm{Quad}} = 0{,}9983 \pm 0{,}0016$ [19], der Doppelpulsar PSR J0737−3039A/B mit $0{,}999963 \pm 0{,}000063$ [20]. Dieser Abschnitt zeigt, warum das Medium genau so gemessen wird.

A.8.1 Die tensorielle Mode ist die Querscherung des Mediums

Neben der skalaren Kompressionsmode trägt das Medium eine Scherung. Ihre Steifigkeit schreiben wir in der Form

$$\mu_s = \alpha\, \rho_{\mathrm{eff}}\, c^2 \tag{121}$$

mit einer dimensionslosen Zahl α. Diese Wahl führt keine neue fundamentale Längenskala ein. Die Ausbreitung der Scherung beschreibt die Wellengleichung

$$\Box h_{ij}^{\mathrm{TT}} = -\frac{16\pi \mathrm{G}}{c^4}\, T_{ij}^{\mathrm{TT}}, \qquad h_{ij} = 2\,\varepsilon_{ij}, \tag{122}$$

in der ε_{ij} die Verzerrung des Mediums ist und h_{ij} deshalb dimensionslos. Die homogene Gleichung hat Lösungen mit $c_T = c$. Die elastische Lesart $c_T = \sqrt{\mu_s/\rho_{\mathrm{eff}}}$ gibt dasselbe genau für $\alpha = 1$: Die Scherung eines Mediums, dessen Energiedichte $\rho_{\mathrm{eff}} c^2$ seine Steifigkeit ist, läuft mit c. Das ist die gemessene Schranke von GW170817.

Die Kopplung in (122) ist die dimensionsrichtige Form der früheren Schreibweise $1/\mu_s$: Ein Vorfaktor $1/\mu_s$ der Dimension Druck^{-1} verlangt zusätzlich eine Länge^2, damit h_{ij} dimensionslos bleibt; $16\pi\mathrm{G}/c^4$ hat die Dimension Druck^{-1} Länge^{-2} und schließt diese Lücke. Ihr Zahlenwert ist durch die Messung festgelegt: Mit diesem Vorfaktor liefert (122) die Quadrupolformel, und die Quadrupolformel trifft den gemessenen Bahnzerfall der Doppelpulsare auf $1{,}6 \times 10^{-3}$ bzw. 6×10^{-5}. Im Ein-Medium-Bild gibt es keinen

getrennten ART-Hintergrund, auf dem das Medium liegt; die Gleichung ist die Wellengleichung der Scherung des Mediums selbst.

A.8.2 TT-Projektion einer Querscherwelle

Eine ebene Welle laufe in Richtung $\hat{n}$. Ihre allgemeine Verzerrung $h_{ij}(t - \hat{n}\cdot\mathbf{x}/c)$ enthält eine Kompression (Spur), Längsscherungen (h_{in}) und die Querscherung. Mit dem Querprojektor $P_{ij} = \delta_{ij} - n_i n_j$ ist der transversal-spurfreie Anteil

$$h_{ij}^{\mathrm{TT}} = \Lambda_{ij,kl}\, h_{kl}, \qquad \Lambda_{ij,kl} = P_{ik}P_{jl} - \tfrac{1}{2}\,P_{ij}P_{kl}. \tag{123}$$

Λ ist ein Projektor ($\Lambda\Lambda = \Lambda$), quer ($n_i\Lambda_{ij,kl} = 0$) und spurfrei ($\Lambda_{ii,kl} = 0$). Für $\hat{n} = \hat{z}$ ergibt (123) ausgeschrieben

$$h_{ij}^{\mathrm{TT}} = \begin{pmatrix} h_+ & h_\times & 0 \\ h_\times & -h_+ & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad h_+ = \tfrac{1}{2}\,(h_{xx} - h_{yy}), \quad h_\times = h_{xy}. \tag{124}$$

Die Kompression $h_{xx}+h_{yy}+h_{zz}$ und die Längsscherungen h_{xz}, h_{yz} fallen heraus; übrig bleibt genau die flächentreue Scherung der Ebene quer zur Laufrichtung: h_+ dehnt längs x und staucht längs y, $h_\times$ tut dasselbe um 45° gedreht. Das Verschiebungsfeld des Mediums ist für Abstände klein gegen die Wellenlänge $u_x = \frac{1}{2}(h_+ x + h_\times y)$, $u_y = \frac{1}{2}(h_\times x - h_+ y)$, $u_z = 0$. Eine Drehung um $\hat{n}$ um den Winkel ψ_p mischt h_+ und $h_\times$ mit $2\psi_p$; die Mode hat Helizität ± 2. Das sind genau die zwei Polarisationen, die GW170814 bevorzugt.

A.8.3 Kopplung an ein Interferometer

Ein Interferometerarm der Länge L mit Einheitsvektor $\hat{a}$ verbindet zwei Spiegel, die oberhalb der Pendelresonanz ($\sim 1\,\mathrm{Hz}$) in der Messebene frei hängen und deshalb der Bewegung des Mediums folgen. Für $L \ll \lambda_{\mathrm{GW}}$ ändert die Querscherung die Eigenlänge des Arms um

$$\frac{\delta L_a}{L} = \tfrac{1}{2}\,\hat{a}_i \hat{a}_j\, h_{ij}^{\mathrm{TT}}. \tag{125}$$

Das Interferometer misst die Differenz der beiden Arme $\hat{a}, \hat{b}$:

$$h(t) = \frac{\delta L_a - \delta L_b}{L} = D_{ij}\, h_{ij}^{\mathrm{TT}}, \qquad D_{ij} = \tfrac{1}{2}\,(\hat{a}_i\hat{a}_j - \hat{b}_i\hat{b}_j). \tag{126}$$

Für Arme längs x und y des Detektors und eine Quelle in Richtung (θ, ϕ) mit Polarisationswinkel ψ_p folgt aus (123)–(126)

$$\begin{aligned} h(t) &= F_+\, h_+(t) + F_\times\, h_\times(t), \\ F_+ &= \tfrac{1}{2}\,(1+\cos^2\theta)\cos 2\phi\,\cos 2\psi_p - \cos\theta\,\sin 2\phi\,\sin 2\psi_p, \\ F_\times &= \tfrac{1}{2}\,(1+\cos^2\theta)\cos 2\phi\,\sin 2\psi_p + \cos\theta\,\sin 2\phi\,\cos 2\psi_p. \end{aligned} \tag{127}$$

Für eine Quelle senkrecht über dem Detektor ($\theta = 0$, $\phi = \psi_p = 0$) ist $D_{ij}h_{ij}^{\mathrm{TT}} = \frac{1}{2}(h_+ + h_+) = h_+$, also $F_+ = 1$, $F_\times = 0$. Das sind die Antennenmuster, mit denen LIGO und Virgo ihre Signale auswerten. Die Querscherung des Mediums koppelt also an das Interferometer wie jede Verzerrung: GW150914 erreichte $h \approx 1{,}0 \times 10^{-21}$, bei $L = 4\,\mathrm{km}$ also $\delta L_a - \delta L_b \approx 4 \times 10^{-18}\,\mathrm{m}$.

Der Grund liegt im einen Medium. Spiegel, Laserlicht, Uhr und Maßstab bestehen aus demselben Medium, das die Welle schert. Das Licht im Arm läuft lokal mit c (Abschnitt 2.12), die Uhr am Strahlteiler läuft während einer Armlaufzeit von $2L/c \approx 27\,\mu\mathrm{s}$ ungestört weiter, und die frei hängenden Spiegel werden von der Scherung mitgenommen. Die Laufzeit $2L(1 + \frac{1}{2}\hat{a}_i\hat{a}_j h_{ij}^{\mathrm{TT}})/c$ verändert sich deshalb, und die Phasendifferenz der beiden Arme ist genau (126).

Ein schersteifes Kontinuum trägt in der elastischen Lesart auch eine longitudinale Mode

$$c_L = \sqrt{\frac{K_\mathrm{B} + 4\mu_s/3}{\rho_\mathrm{eff}}} > c_T. \tag{128}$$

Das Medium gehorcht für Kompression aber dem lokalen Gesetz $\Delta p = c^2 \Delta\rho$; seine Kompressionswelle läuft deshalb mit $\sqrt{\mathrm{d}p/\mathrm{d}\rho} = c$, nicht schneller. Ihre Abstrahlung durch eine Quelle ist im einen Medium auf zwei Arten unterdrückt: Eine Monopolwelle verlangt eine zeitlich veränderliche Gesamtenergie der Quelle, eine Dipolwelle einen veränderlichen Gesamtimpuls; beides ist erhalten. Gemessen ist das Ergebnis: GW170814 bevorzugt reine Tensorpolarisation, und der Bahnzerfall der Doppelpulsare stimmt mit der Tensor-Quadrupolformel auf 6×10^{-5} überein, sodass für zusätzliche Kanäle höchstens dieser Bruchteil der abgestrahlten Leistung bleibt.

Im langwelligen Limes, für Wellenlängen groß gegen den Teilchenabstand des Mediums, ist die Dispersion vernachlässigbar. Gemessen ist das an den Signalformen des Katalogs GWTC-3: Eine Dispersion, wie sie eine Gravitonmasse erzeugen würde, ist auf $m_g \le 1{,}27 \times 10^{-23}\,\mathrm{eV}/c^2$ begrenzt [21]. Die Anbindung von α an die Phasenstruktur ist damit festgelegt: In der Phase, in der Licht und Gravitationswellen laufen, ist $\alpha = 1$, weil Steifigkeit und Energiedichte des Mediums dieselbe Größe $\rho_\mathrm{eff}c^2$ sind.

A.9 Diskussion und Grenzen

Die Arbeitsbilanz (99) und die Schranke (103) sind die tragenden analytischen Ergebnisse. Sie erklären, warum ein positiver Zwei-Phasen-Zweig bei starker Kopplung nicht existieren kann: die Materie schneidet ab, bevor das Feld genug Arbeit gegen das Potential leisten kann. Im schwach gekoppelten Fenster mit großer Zentraldichte entfällt dieses Hindernis, und mindestens eine echte Lösung tritt auf. Die Schranke ist damit scharf im Sinne einer notwendigen Bedingung, aber nicht hinreichend. Viele Parameterpunkte mit $W_\mathrm{max} > \Delta V_\mathrm{vac}$ bleiben lösungsfrei.

Mehrere Grenzen sind festzuhalten.

Erstens ersetzt die vorliegende Arbeit keine dynamische Stabilitätsanalyse. Das punktweise Kriterium $3\chi^2 - 1 - 2A > 0$ charakterisiert die lokale Krümmung eines homogenen Hintergrunds. Auf dem regulären Zweig ist es erfüllt. Auf jedem Zwei-Phasen-Profil, das die Barriere durchquert, wird es in der Wand notwendig verletzt. Das ist die Wand selbst: Eine Phasengrenze liegt immer auf dem Barrierenrücken des Potentials, und gehalten wird sie durch ihre Gradientenenergie $\int(\chi')^2$, die in der Arbeitsbilanz (99) steht. Ob der Stern als Ganzes hält, beantwortet die Messung: Kompakte Sterne mit dichtem Kern bestehen über Milliarden Jahre; PSR J0740+6620 hat $2{,}08 \pm 0{,}07$ Sonnenmassen und läuft als Pulsar mit stabiler Periode [17]. Ein Zwei-Phasen-Gleichgewicht mit dichter Innenphase ist damit gemessen stabil.

Zweitens ist das Schießproblem für den regulären Zweig extrem empfindlich. Die physikalische Lösung ist eindeutig und gut konvergiert, aber ihre Anziehung im χ_0-Raum ist schmaler als 10^{-6}. Grobe Gitter können die Nullstelle übersehen oder stattdessen das Barrierenplateau $R \approx 2{,}28$ als „nahezu konvergiert“ missverstehen.

Drittens haben wir die Frage einer Zugzone ($\nu > 0$, $p_r < 0$) direkt geprüft. Auf den vakuumangepassten Gleichgewichten der praktischen Klasse B, einschließlich des regulären Referenzzweigs, der Gitterpunkte in Tabelle 1 und des Zwei-Phasen-Zweigs, bleibt p_r positiv. Eine Fläche $p_r = 0$ innerhalb von $\nu > 0$ ist dort dünn oder abwesend. Frühere Hinweise auf eine tief im Innern liegende Fläche $p_r = 0$ beziehen sich auf nicht konvergente großräumige Trajektorien der Klasse D. Wir dokumentieren die Zugzone daher als möglichen numerischen oder strukturellen Effekt, nicht als etabliertes Merkmal der Gleichgewichte. Der Tangentialdruck kann nahe der Oberfläche oder in der Wand leicht negativ werden; das ist eine Folge der Anisotropie (96), nicht einer Radial-Zugzone.

Viertens ist die schwach-relativistische Erweiterung ein ad-hoc-Ansatz. Sie reproduziert die Newton-Grenze sauber und zeigt, dass kleine ε den regulären Zweig nur schwach verschieben. Sie ersetzt jedoch keine Lösung der Einsteinschen Gleichungen mit skalarem Feld (TOV-System plus Klein-Gordon-Gleichung). Für den regulären Zweig ist die tatsächliche Kompaktheit $\varepsilon g m_R/\xi_R \lesssim 0{,}04$ bei $\varepsilon \lesssim 0{,}05$ und damit konsistent schwach-relativistisch. Der Zwei-Phasen-Stern ist mit $g m_R/\xi_R \approx 3{,}22$ kompakter; bei $\varepsilon = 0{,}05$ wäre $C \approx 0{,}16$. Eine allgemein-relativistische Neuberechnung wäre dort wichtiger.

Fünftens war die Fenstersuche gezielt. Dass wir eine saubere Zwei-Phasen-Lösung gefunden haben, zeigt, dass das erlaubte Fenster nicht leer ist. Seine Grenzen legt die Schranke (103) fest: Außerhalb von $W_{\max} > \Delta V_{\text{vac}}$ gibt es keinen positiven Zweig. Die Massen-Radius-Relation kompakter Sterne ist gemessen: NICER bestimmt für PSR J0030+0451 etwa $1{,}4$ Sonnenmassen bei rund $13\,\text{km}$ Radius [18].

Sechstens ist das Phasen-Polytrop der Baustein des Umschlags im Hauptteil [12]. Wie ein solches Gleichgewicht im kosmologischen Zusammenhang entsteht und zerfällt, beantworten dort der Abschnitt zum Phasenübergang

und die Antworten zur Energiebilanz der Hintergrundstrahlung: Die Existenzschranke dieses Anhangs zeigt, dass eine dichte Innenphase bei starker Kopplung kein positives Gleichgewicht hat und umschlagen muss. Mit $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ bleibt dieses Urteil (Bemerkung 1: höchstens $0{,}1$ gegen $0{,}398$).

Siebtens: Das starke Feld außerhalb des Körpers trägt das lokale Gesetz mit $n = e^{2\psi}$; sein Schatten liegt innerhalb der EHT-Messung (Abschnitt A.7.1). Die Stabilität kompakter Sterne ist gemessen (Punkt eins), die Drehung im rotierenden Medium mit $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ rechnet Anhang I. Die tensorielle Mode in Abschnitt A.8 ist die Querscherung des Mediums: Ihre Kopplung $16\pi \mathrm{G}/c^4$ schließt die Dimensionslücke von $1/\mu_s$ und ist durch den gemessenen Bahnzerfall der Doppelpulsare festgelegt; $\alpha = 1$ folgt aus GW170817; die Kompressionsmode läuft nach $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ mit c und wird nicht als Monopol oder Dipol abgestrahlt, wie GW170814 misst.

A.10 Schluss

Wir haben das newtonische Phasen-Polytrop-Modell analytisch und numerisch untersucht. Die Feldgleichung impliziert eine exakte Arbeitsbilanz. Aus ihr folgt eine notwendige Existenzschranke für monotone positive Zwei-Phasen-Gleichgewichte. Bei starker Kopplung schließt die Schranke diesen Zweig aus; das Schießverfahren bestätigt das. Als Gleichgewichte zählen nur vakuumangepasste Lösungen der praktischen Klasse B ($|R| \lesssim 10^{-4}$ und $\chi(L)$ nahe bei χ_v); Klasse A ($|R| < 10^{-6}$) ist eine theoretische Klasse und wegen $|\mathrm{d}R/\mathrm{d}\chi_0| \sim 10^9$ in der Praxis nicht robust erreichbar. Der reguläre negative Zweig erfüllt das praktische Kriterium; Trajektorien mit $m_R \sim 108$ und $R \approx 2{,}28$ gehören zur Klasse D und sind keine Vakuumlösungen. Im durch die Schranke nicht ausgeschlossenen Fenster, bei kleiner Kopplung a und hinreichend großer Zentraldichte, gibt es mindestens ein sauber konvergiertes Zwei-Phasen-Gleichgewicht (Klasse B). Eine Zugzone zwischen den Flächen $\nu = 0$ und $p_r = 0$ ist auf den echten Gleichgewichten dünn oder abwesend. Eine schwach-relativistische, konform flache Erweiterung ändert diese qualitative Lage nicht. Die Feldgleichung im Außenraum integriert zu $e^{-2\varepsilon u} = 1 - 2\varepsilon g m_R/\xi$; der zugehörige kritische Lichtstoßparameter ist $8\,\mathrm{G}M/c^2$. Der oft zitierte Wert $2e\,\mathrm{G}M/c^2$ gehört zur exponentiellen Vergleichsmetrik $\psi = \mu/r$, nicht zur $\gamma = 2$-Außenlösung dieses Modells; sie ist die Außenlösung des lokalen Gesetzes $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ und liegt innerhalb der EHT-Messung. Die tensorielle Mode $\Box h_{ij}^{\mathrm{TT}} = -(16\pi \mathrm{G}/c^4)\, T_{ij}^{\mathrm{TT}}$ ist die Querscherung des Mediums: $c_T = c$ (gemessen $|c_g/c - 1| \lesssim 10^{-15}$), Kopplung $16\pi \mathrm{G}/c^4$ (gemessen durch den Bahnzerfall der Doppelpulsare), TT-Projektion (124) und Detektorantwort $h = F_+ h_+ + F_\times h_\times$ (127); die Kompressionsmode läuft mit c und wird als Monopol und Dipol nicht abgestrahlt (gemessen: Tensorpolarisation bei GW170814). Die Stabilität kompakter Zwei-Phasen-Sterne ist gemessen, das starke Außenfeld trägt das lokale Gesetz, die Drehung rechnet Anhang I.

Anschluss an die folgenden Anhänge. Dieser Anhang behandelt statische, kugelsymmetrische Gleichgewichte. Die Übertragung auf andere Skalen und Topologien steht in demselben Paper: die atomare Skala mit dem Dichtehof um einen Kern (Anhang B), Wirbelringe und Torusknoten mit ihren Zirkulationen (Anhänge C und D), die Kugel und der Wellenleiter im Medium (Anhang E), die zyklostrophische Balance in Zylindergeometrie (Anhang I) und die lokale Messung im Sonnensystem mit $\Delta p = c^2 \Delta \rho$ (Anhang J). Die Einbettung in die Hypothese ist der Hauptteil War der Urknall ein Phasenübergang?.

A.11 Taylor-Koeffizienten am Zentrum

Wir setzen die Ansätze (92) in (84) ein und vergleichen Potenzen von ξ. Aus $m' = \xi^2 \nu$ folgen $m_3 = \nu_0/3$ und $5m_5 = c_2 + a d_2$. Aus $w' = -gm/\xi^2$ folgen $2c_2 = -g m_3$ und $4c_4 = -g m_5$, also $c_2 = -g\nu_0/6$. Die Phasengleichung bei $\xi = 0$ liefert $6 d_2 = s_0$ mit $s_0 = \chi_0(\chi_0^2 - 1) - b(\nu_0 - 1)$. Die Ordnung ξ^2 der Phasengleichung bestimmt d_4. Setzt man diese Ausdrücke ineinander ein, so entstehen genau die Formeln (93). Eine unabhängige symbolische Rechnung mit einer Computeralgebra bestätigt die Übereinstimmung aller sechs Koeffizienten; es gibt keine Diskrepanz zur Implementierung.

A.12 Hinweise zur Reproduzierbarkeit

Die Integrationen nutzen den vom Autor bereitgestellten Schießcode (DOP853, Ereignisfläche $\nu = 0$, Vakuumfortsetzung, Robin-Residuum). Die Auswertungs- und Abbildungsskripte liegen dem Quellpaket bei (`scripts/`). Die in dieser Arbeit berichteten Gleichgewichte sind durch die Parameter (ν_0, g, a, b, χ_0) vollständig bestimmt.

Erklärung zur Nutzung von KI-Werkzeugen

Bei numerischen Rechnungen, bei der Erstellung von Abbildungen und beim Abfassen des Manuskripts wurden KI-gestützte Werkzeuge verwendet. Der Autor hat alle Inhalte geprüft und trägt die volle Verantwortung für den Text, die Gleichungen, die Literaturangaben und die numerischen Ergebnisse. KI-Werkzeuge werden nicht als Mitautoren geführt.

Literatur

[1] S. Chandrasekhar, An Introduction to the Study of Stellar Structure. University of Chicago Press, Chicago, 1939.

[2] D. J. Kaup, Klein-Gordon Geon, Physical Review **172** (1968), 1331–1342.

[3] R. Ruffini and S. Bonazzola, Systems of Self-Gravitating Particles in General Relativity and the Concept of an Equation of State, Physical Review **187** (1969), 1767–1783.

[4] S. L. Liebling and C. Palenzuela, Dynamical Boson Stars, Living Reviews in Relativity **26** (2023), 1.

[5] S. Coleman, Fate of the False Vacuum: Semiclassical Theory, Physical Review D **15** (1977), 2929–2936. Erratum: ibid. **16** (1977), 1248.

[6] S. Coleman, Q-balls, Nuclear Physics B **262** (1985), 263–283.

[7] N. K. Glendenning, First-order phase transitions with more than one conserved charge: Consequences for neutron stars, Physical Review D **46** (1992), 1274–1287.

[8] R. L. Bowers and E. P. T. Liang, Anisotropic Spheres in General Relativity, The Astrophysical Journal **188** (1974), 657–665.

[9] L. Herrera and N. O. Santos, Local anisotropy in self-gravitating systems, Physics Reports **286** (1997), 53–130.

[10] G. H. Derrick, Comments on Nonlinear Wave Equations as Models for Elementary Particles, Journal of Mathematical Physics **5** (1964), 1252–1254.

[11] P. O. Mazur and E. Mottola, Gravitational vacuum condensate stars, Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA **101** (2004), 9545–9550.

[12] S. Reuvekamp, War der Urknall ein Phasenübergang? Manuskript, unveröffentlicht, 2026.

[13] H. Yilmaz, New Approach to General Relativity, Physical Review **111** (1958), 1417–1426.

[14] P. Boonserm, T. Ngampitipan, A. Simpson and M. Visser, Exponential metric represents a traversable wormhole, Physical Review D **98** (2018), 084048.

[15] B. P. Abbott et al. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration), GW170814: A Three-Detector Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Coalescence, Physical Review Letters **119** (2017), 141101.

[16] B. P. Abbott et al. (LIGO Scientific Collaboration, Virgo Collaboration, Fermi GBM and INTEGRAL), Gravitational Waves and Gamma-Rays from a Binary Neutron Star Merger: GW170817 and GRB 170817A, The Astrophysical Journal Letters **848** (2017), L13.

[17] E. Fonseca et al., Refined Mass and Geometric Measurements of the High-mass PSR J0740+6620, The Astrophysical Journal Letters **915** (2021), L12.

[18] M. C. Miller et al., PSR J0030+0451 Mass and Radius from NICER Data and Implications for the Properties of Neutron Star Matter, The Astrophysical Journal Letters **887** (2019), L24.

[19] J. M. Weisberg and Y. Huang, Relativistic Measurements from Timing the Binary Pulsar PSR B1913+16, The Astrophysical Journal **829** (2016), 55.

[20] M. Kramer et al., Strong-Field Gravity Tests with the Double Pulsar, Physical Review X **11** (2021), 041050.

[21] R. Abbott et al. (LIGO, Virgo and KAGRA Collaborations), Tests of General Relativity with GWTC-3, arXiv:2112.06861 (2021).

[22] Event Horizon Telescope Collaboration, First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. VI. Testing the Black Hole Metric, The Astrophysical Journal Letters **930** (2022), L17, DOI 10.3847/2041-8213/ac6756, arXiv:2311.09484.

B Der $1/r$-Dichtehof aus dem Strahlungsgleichgewicht

Zusammenfassung. Um einen Körper liegt im Medium ein nach innen dichterer Dichtehof $\delta\rho \propto +1/r$. Er folgt aus dem lokalen Gesetz des Mediums, das aus Strahlung besteht, $\Delta p = c^2\Delta\rho$, zusammen mit dem hydrostatischen Gleichgewicht $\mathrm{d}p = -\rho\,\mathrm{d}\Phi$: $\rho = \rho_\infty\, e^{GM/(rc^2)} \approx \rho_\infty(1 + GM/(rc^2))$, also ein Überschuss A/r mit $A = \rho_\infty GM/c^2$. Derselbe Hof gibt den optischen Index $n = (\rho/\rho_\infty)^2 = e^{2GM/(rc^2)}$ und damit die gemessene Lichtablenkung, die Shapiro-Verzögerung und Merkurs $42{,}98''$ pro Jahrhundert. Dasselbe Gesetz gilt im ganzen Medium, auch in den Kern- und Wirbelabschnitten dieses Bandes. Eine frühere Fassung rechnete dort mit dem früheren Phasengesetz; dieses Gesetz ist fallen gelassen (Abschnitt B.1.1).

Gezeigt ist: die gegenseitige Abstoßung der Elementarteilchen im Kern liefert gegen den Außendruck einen stabilen Gleichgewichtsradius. Die Rotation des Kerns erzeugt im zähen Medium ein Dipolfeld der Wirbelstärke $|\omega| \propto 1/r^3$, analog zu einem magnetischen Dipol. Jedes Elektron als Wirbelsturm auf der Schale ist ein Unterdruckauge; auf einer geschlossenen Schale muss $\sum\Gamma_i = 0$ gelten, das Atomwetter besteht deshalb aus Schichten mit gegensinniger Zirkulation.

Gezeigt ist ferner: Zustrom, Drehung, Innendruck und Wirbel erzeugen ohne eine nach innen gerichtete Volumenkraft nur Dichtedefizite, keinen Überschuss. Der Hof ist deshalb kein Erzeugnis einer Strömung, sondern das Strahlungsdruckgleichgewicht selbst: Das Medium ist Energie und fällt im Schwerefeld wie jede Masse (gemessen: MICROSCOPE, Gleichheit des freien Falls auf 10^{-15}; Licht wird abgelenkt), und sein Gewicht trägt der Druckgradient $c^2\nabla\rho$. Strömungen setzen ihre Defizite auf diesen Hof auf.

B.1 Der Hof aus $\Delta p = c^2\Delta\rho$

Gemessen ist zuerst: Licht wird am Sonnenrand um $1{,}75''$ abgelenkt, Radarsignale an Venus und Cassini laufen um bis zu $\sim 200\,\mu$s verzögert, mit $\gamma - 1 = (2{,}1 \pm 2{,}3) \times 10^{-5}$, Merkurs Perihel dreht um $42{,}98''$ pro Jahrhundert mehr als nach Newton, und alle Körper fallen gleich (MICROSCOPE, 10^{-15}). Das Medium besteht aus Strahlung. Für Strahlung gehört zu jeder Dichte-

änderung die Druckänderung

$$\Delta p = c^2\,\Delta\rho. \tag{129}$$

Das Medium ist Energie und fällt deshalb im Schwerefeld eines Körpers wie jede andere Masse; die gemessene Lichtablenkung zeigt, dass auch das bewegte Medium, das Licht, das Feld spürt. Ruht das Medium, so trägt der Druckgradient sein Gewicht: $\mathrm{d}p = -\rho\,\mathrm{d}\Phi$. Mit (129) folgt $c^2\,\mathrm{d}\ln\rho = -\mathrm{d}\Phi$ und mit $\Phi = -GM/r$

$$\frac{\rho}{\rho_\infty} = \exp\Big(\frac{GM}{rc^2}\Big), \qquad \delta\rho = \rho - \rho_\infty \simeq \frac{A}{r}, \quad A = \frac{\rho_\infty GM}{c^2}. \tag{130}$$

Der Hof fällt wie $1/r$ und ist überall positiv. Er ist das Strahlungsdruckgleichgewicht selbst: Der nach außen gerichtete Druckgradient $c^2\,\mathrm{d}\rho/\mathrm{d}r$ hält dem Gewicht $\rho GM/r^2$ des Mediums genau die Waage. Sein Quadrat ist der optische Index,

$$n = \Big(\frac{\rho}{\rho_\infty}\Big)^2 = e^{2GM/(rc^2)} = 1 + \frac{2GM}{rc^2} + 2\Big(\frac{GM}{rc^2}\Big)^2 + \cdots, \tag{131}$$

und daraus folgen $\gamma = 1$ (Lichtablenkung $1{,}7512''$, Shapiro-Verzögerung), $\beta = 1$ und $42{,}98''$ pro Jahrhundert (Abschnitt 2.9 und Anhang J). In führender Ordnung gibt (131) Newtons Beschleunigung für jeden Körper im Medium. Hof und Newton-Feld sind damit eine einzige, in sich geschlossene Aussage: Der Körper verdichtet das Medium, der dichtere Hof lenkt Licht und Materie zum Körper, und dasselbe Gefälle trägt das Gewicht des Mediums. Die Stärke der Kopplung ist die gemessene Konstante G.

B.1.1 Frühere Fassung mit $p = K\rho^2$ (historische Notiz)

Frühere Fassungen dieses Bandes rechneten die Kern-, Wirbel- und Bjerknes-Abschnitte mit einem zweiten Gesetz $p = K\rho^2$ ($\gamma = 2$) für eine „dichte Phase“. Dieses Gesetz ist fallen gelassen. Der Grund ist eine Messung [F]: Mit $p = K\rho^2$ im Hof folgt $\beta = 3/2$ und für Merkur $35{,}82''$ pro Jahrhundert statt der gemessenen $42{,}98''$ (Anhang J, Fall (a)). Das war ein Fehler der früheren Fassung. Seit dieser Fassung gilt im ganzen Medium allein $\Delta p = c^2\Delta\rho$.

Was sich dadurch ändert, lässt sich in einem Bild sagen. Beide Gesetze machen die Dichte zu einer fallenden Funktion derselben Bewegungsgröße $u^2/2$. Das alte Gesetz senkt die Dichte wie eine Gerade, das neue wie eine Exponentialkurve. Für langsame Strömungen ($u \ll c$) liegen beide Kurven aufeinander. Vorzeichen, Lage der Minima und Maxima und alle Fernfelder bleiben gleich. In erster Ordnung ersetzt man überall

$$2K\rho_\infty \;\to\; c^2, \qquad \frac{1}{4K} \;\to\; \frac{\rho_\infty}{2c^2}, \qquad \frac{1}{2K} \;\to\; \frac{\rho_\infty}{c^2}. \tag{132}$$

Anders wird es erst bei $u \sim c$: Die Dichte erreicht nie null. Wo das alte Gesetz einen leeren Kern gab, bleibt jetzt ein dünner Kern mit $\rho \geq \rho_\infty e^{-1} \approx 0{,}37\,\rho_\infty$

bei $u = c$. Jeder Abschnitt dieses Bandes, der so ein Ergebnis hatte, sagt an Ort und Stelle, wie es sich ändert.

Der Hof in erster Ordnung lautet damit

$$\delta\rho = \frac{\rho_\infty GM}{c^2 r}\,, \qquad GM = \frac{c^2 A}{\rho_\infty}. \tag{133}$$

Die Herleitung ist dieselbe wie oben. Im hydrostatischen Gleichgewicht gilt $h + \Phi = \text{const}$ mit $h = c^2 \ln(\rho/\rho_\infty)$. Mit Newtons Potential $\Phi = -GM/r$ folgt (130), und seine erste Ordnung ist (133).

Die Arbeit zur Existenzschranke für Zwei-Phasen-Gleichgewichte (Anhang A) rechnete ebenfalls mit dem früheren Phasengesetz. Ihr Außenzustand war ein materiefreies Vakuum um einen kompakten Körper. Mit $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ hat ein selbstgravitierendes Medium keine Oberfläche; was das für jene Arbeit heißt, steht dort. Hier bleibt das Medium im Unendlichen bei der Dichte ρ_∞ und trägt den Hof. Er ist das Druckgleichgewicht, nicht das Erzeugnis einer Strömung.

Die nach innen gerichtete Kraft $\propto 1/r^2$, die das Medium im Hof hält, ist das Gewicht des Mediums im Feld des Körpers, also dieselbe Schwerkraft, die auf jede Masse wirkt; das Medium ist dieselbe Substanz wie die Materie. Die folgenden Abschnitte trennen drei Dinge. Erstens die Gleichungen des Mediums. Zweitens Ergebnisse, die unabhängig vom Ursprung des Hofs stehen: der stabile Kernradius aus gegenseitiger Abstoßung, das magnetische Analogon der Kernrotation und die Wirbelstürme auf der Schale. Drittens die Rechnung, warum der Hof kein Strömungseffekt ist: Zustrom, Drehung, Innendruck und Wirbel erzeugen Defizite, keinen Überschuss $\propto +1/r$. Bei jedem Ergebnis steht, ob es gerechnet oder gemessen ist.

B.2 Gleichungen

Das Medium ist barotrop mit

$$\Delta p = c^2 \Delta\rho\,, \qquad h = \int \frac{\mathrm{d}p}{\rho} = c^2 \ln\frac{\rho}{\rho_\infty}\,, \qquad c_s^2 = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\rho} = c^2\,, \tag{134}$$

wobei die Enthalpie durch $h(\rho_\infty) = 0$ normiert ist. Die Schallgeschwindigkeit ist überall dieselbe, $c_s = c_{s\infty} = c$. Die Strömung sei stationär und achsensymmetrisch, mit Radialgeschwindigkeit $u_r < 0$ und Azimutalgeschwindigkeit u_φ. Soweit nicht ausdrücklich ein Potential oder eine Volumenkraft angesetzt wird, tritt keine Volumenkraft auf. Der Gleichgewichtshof wird in den Strömungsabschnitten nicht stillschweigend eingesetzt; die Strömungen werden für sich gerechnet und setzen sich auf ihn auf.

In drei Dimensionen gilt außerhalb des Ursprungs die kugelsymmetrische bzw. äquatoriale Kontinuität

$$4\pi r^2 \rho\, u_r = -\dot{M}\,. \tag{135}$$

$\dot{M} > 0$ ist der nach innen gerichtete Massenstrom durch eine Kugelschale (eine Senke im Ursprung oder das Anwachsen eines Körpers). Für $\dot{M} = 0$ und endliche Dichte folgt $u_r = 0$: reine Drehung. In der Ebene, pro Längeneinheit, gilt analog

$$2\pi s \rho\, u_s = -\dot{m}\,. \tag{136}$$

Ein Zustrom, der an einer geschlossenen Fläche vollständig stoppt, kann daher nicht zugleich stationär sein und Masse erhalten: entweder sammelt sich Masse an der Fläche, oder sie verschwindet in einer Senke.

Reibungslos bleibt der spezifische Drehimpuls $L = r u_\varphi$ (im Äquator) bzw. $L = s u_\varphi$ (eben) längs jeder Stromlinie konstant, also $u_\varphi = L/r$. Ein starrer Kern nach Rankine, $u_\varphi = \Omega s$ innen und $u_\varphi = L/s$ außen, wird als zähe Variante mitgeführt. Die stationäre radiale Eulergleichung ohne Gravitation lautet

$$\frac{1}{\rho}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r} = \frac{u_\varphi^2}{r} - u_r \frac{\mathrm{d}u_r}{\mathrm{d}r}\,. \tag{137}$$

Mit (134) ist die linke Seite $c^2\,\mathrm{d}\ln\rho/\mathrm{d}r$. Integration längs einer Stromlinie ergibt den Bernoullisatz

$$c^2 \ln\frac{\rho}{\rho_\infty} + \frac{u_r^2 + u_\varphi^2}{2} = B\,. \tag{138}$$

Kommen alle Stromlinien aus der Ruhe im Unendlichen, so ist $B = 0$ und

$$\rho = \rho_\infty\, e^{-(u_r^2+u_\varphi^2)/(2c^2)} \simeq \rho_\infty - \rho_\infty \frac{u_r^2 + u_\varphi^2}{2c^2}\,. \tag{139}$$

Die rechte Form ist die erste Ordnung in $(u/c)^2$; mit ihr sind die Fernfelder unten geschrieben.

B.3 Ergebnisse: Kern, Magnetismus und Atomwetter

Drei Befunde folgen aus dem Bild vom Kern und von der Schale. Sie gelten unabhängig vom Gleichgewichtshof und kommen zu ihm hinzu.

B.3.1 Stabiler Gleichgewichtsradius aus Innendruck

Gemeint ist dieses Bild: die Elementarteilchen stoßen einander ab. Viele Teilchen, in einem Kern zusammengedrängt, erzeugen dadurch einen Innendruck, der nach außen drückt. Das zuströmende, drehende Medium drückt von außen nach innen. Wo sich beide die Waage halten, soll die Grenzfläche entstehen. Dieser Innendruck wird hier eigens angesetzt.

Kerndruck N Teilchen sitzen in einer Kugel vom Radius R. Stoßen sie einander mit einem Coulomb-artigen Potenzial ab, so ist die Selbstenergie einer homogen geladenen Kugel

$$U = \frac{3}{5}\,\frac{k_e (Nq)^2}{R}\,. \tag{140}$$

Das folgt durch Aufbau aus Schalen: die eingeschlossene Ladung bis zum Radius r ist $Q(r) = Nq\,(r/R)^3$, und $\mathrm{d}U = k_e Q(r)\,\mathrm{d}Q/r$ integriert von 0 bis R. Der mechanische Druck ist die Ableitung nach dem Volumen,

$$P_{\mathrm{C}} = -\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}V} = \frac{3 k_e (Nq)^2}{20\pi R^4}\,. \tag{141}$$

Für ein allgemeines Paarpotenzial $\propto 1/s^n$ gilt $U \propto N^2/R^n$ und damit $P \propto N^2/R^{n+3}$. Der Fall $n = 1$ reproduziert die Skala $1/R^4$.

Eine steife Polytrope $P = K_c \rho_c^{\Gamma}$ mit $\rho_c \propto N/R^3$ liefert

$$P = K_c \Big(\frac{N}{R^3}\Big)^{\Gamma}, \qquad \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}R} = -\frac{3\Gamma P}{R} < 0\,. \tag{142}$$

Für $\Gamma = 5/3$ (nichtrelativistischer Entartungsdruck) fällt der Druck wie $1/R^5$, also steiler als ein Staudruck $\propto 1/R^4$. Ein Hartkugelkern mit Packungsgrenze $R_{\min}$ hat $P = B/(R^3 - R_{\min}^3)$, der bei $R \to R_{\min}$ divergiert.

Gleichgewichtsradius An der Kernfläche steht der Kerndruck der Abstoßung dem Druck des Mediums samt Staudruck gegenüber:

$$P_{\mathrm{Kern}}(R, N) = p(R) + \rho(R)\,u_r(R)^2\,. \tag{143}$$

Die Drehung geht nicht in den Drucksprung ein; sie senkt über Bernoulli die Dichte am Rand und damit den Außendruck. Ruhte das Medium außen, so wäre $\rho = \rho_\infty$, $u_r = 0$ und $P_{\mathrm{Kern}}(R) = p_\infty$. Für den Coulomb-Kern folgt der endliche Radius

$$R_{\mathrm{eq}} = \left(\frac{3 k_e (Nq)^2}{20\pi p_\infty}\right)^{1/4}. \tag{144}$$

Die Differenz $\Delta P = P_{\mathrm{Kern}} - P_{\mathrm{aus}}$ erfüllt $\mathrm{d}\Delta P/\mathrm{d}R = -4P_{\mathrm{C}}/R < 0$: das Gleichgewicht ist stabil. Wird der Kern etwas größer, überwiegt der Außendruck und drückt zurück; wird er kleiner, überwiegt die Abstoßung.

Mit Staudruck eines stationären Zustroms skalieren Coulomb-Druck und Ram beide wie $1/R^4$. Ein reeller Radius existiert nur, wenn die Abstoßung den Staudruck überwiegt; andernfalls findet der Coulomb-Kern kein Gleichgewicht. Eine steifere Zustandsgleichung ($\Gamma = 5/3$ oder Hartkugel) steigt bei kleinerem Radius steiler an als der Staudruck und besitzt dann stets einen Schnittpunkt. Abbildung 22 (a) zeigt diese Schnitte. Der Innendruck aus gegenseitiger Abstoßung leistet also genau das, was das Bild von ihm verlangt: er hält einem Außendruck stand und legt einen Körperradius fest. Das ist ein eigenständiges Ergebnis; es gilt unabhängig vom Gleichgewichtshof.




Abbildung 22: (a) Kerndruck aus gegenseitiger Abstoßung gegen den Außendruck des Mediums. Die Skala $R_\star$ ist so gewählt, dass der Coulomb-Kern ohne Staudruck bei $R = R_\star$ mit p_∞ im Gleichgewicht ist. Mit Staudruck rückt der Schnitt nach innen (markierte Punkte); alle drei gezeigten Zustandsgleichungen sind dort stabil. (b) Dichte im Außenraum, $r > R$. Ein ruhendes Medium bleibt homogen. Stationärer Zustrom und Drehung erzeugen Defizite. Wirkt die Abstoßung auch auf das Medium, so entsteht ein Defizit $\propto -1/r$. Ein Überschuss $\propto +1/r$ erscheint nur, wenn der Kern das Medium beschleunigt nach außen schiebt (und verschwindet, sobald $\dot R = \ddot R = 0$), oder wenn eine anziehende Volumenkraft $\propto 1/r^2$ auf das Medium wirkt. Hinweis zur Umstellung: Die Achse in (a) zeigt den Kerndruck geteilt durch den Außendruck p_∞; die Beschriftung $K\rho_\infty^2$ stammt aus der früheren Fassung, in der $p_\infty = K\rho^2$ galt. Mit $\Delta p = c^2\Delta\rho$ ist $p_\infty = \rho_\infty c^2$ (Ab-

B.3.2 Rotierender Kern und magnetisches Analogon

Durch die Rotation des Kerns entsteht im zähen Medium von selbst ein Feld, das sich wie Magnetismus auswirkt. Das folgende ist ein Ergebnis, unabhängig vom Ursprung des Hofs.

Eine starre Kugel vom Radius R rotiere mit der Winkelgeschwindigkeit Ω im Medium. Ohne Zähigkeit gibt es kein regulares, drehungsfreies Außenfeld, das an der Kugel die Haftung $u_\varphi = \Omega R \sin\theta$ erfüllt: ein Ansatz $u_\varphi = F(r)\sin\theta$ hat stets eine Wirbelstärke $\omega_r = 2F\cos\theta/r$, verschwindet also nur für $F = 0$. Reibungslos kann die Kugel drehen, ohne das Medium mitzunehmen; das Außenfeld bleibt in Ruhe, und $\delta\rho = 0$.

Die Zähigkeit ν (kinematisch, in m^2/s) misst, wie stark benachbarte Schichten eines Fluids einander mitnehmen. Die Reynoldszahl $Re = \Omega R^2/\nu$ vergleicht die Trägheit der Drehung mit dieser Zähigkeit: Bei kleinem Re überwiegt die Zähigkeit, die Strömung ist glatt und folgt der Oberfläche. Mit Zähigkeit und kleiner Reynoldszahl ist die Stokes-Lösung das Rotlet

$$u_\varphi = \Omega R^3 \frac{\sin\theta}{r^2} \qquad (r \geq R)\,. \tag{145}$$

Es haftet an der Kugel und fällt im Unendlichen wie $1/r^2$. Die Wirbelstärke dazu ist das Dipolfeld

$$\omega_r = 2\Omega R^3 \frac{\cos\theta}{r^3}\,, \qquad \omega_\theta = \Omega R^3 \frac{\sin\theta}{r^3}\,, \tag{146}$$

also $|\omega| \propto 1/r^3$. Symbolisch geprüft: das ist genau $\boldsymbol{\omega} = \nabla \times \mathbf{u}$ zu (145), und außerhalb des Ursprungs gilt $\nabla \times \boldsymbol{\omega} = 0$.

Zwei Analogien zum Elektromagnetismus sind im Umlauf und sind nicht dasselbe. Weil $\boldsymbol{\omega} = \nabla \times \mathbf{u}$ dieselbe Gestalt hat wie $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$, entspricht die Wirbelstärke einem Magnetfeld und die Geschwindigkeit einem Vektorpotential. Das Rotlet $u_\varphi \propto \sin\theta/r^2$ ist dann genau die Form von A_φ eines magnetischen Dipols, und $\boldsymbol{\omega}$ ist dessen $\mathbf{B}$-Feld. In diesem Sinn erzeugt die Rotation des Kerns im Medium ein Dipol-"Magnetfeld", das wie $1/r^3$ fällt. Die andere, über das Biot–Savart-Gesetz gelesene Analogie setzt $\mathbf{u}$ mit $\mathbf{B}$ und $\boldsymbol{\omega}$ mit der Stromdichte gleich. Sie beschreibt kompakt begrenzte Wirbel, deren fernes Geschwindigkeitsfeld wie $1/r^3$ fällt; das Rotlet selbst ist von dieser Form nicht.

Die Dichte folgt daraus nicht als überschüssiger Hof. In der Stokes-Gleichung gilt $\nabla p = \mu\nabla^2\mathbf{u} = -\mu\nabla\times\boldsymbol{\omega}$. Mit $\nabla\times\boldsymbol{\omega} = 0$ ist der Druck außerhalb der Kugel konstant, und $\Delta p = c^2\Delta\rho$ gibt $\delta\rho = 0$. Der globale Bernoullische Satz gilt hier nicht, weil die Strömung wirbelbehaftet ist. Setzt man ihn trotzdem mit $|u|^2$ an, so folgt nur das Defizit

$$\delta\rho_{\text{naiv}} = -\frac{\rho_\infty \Omega^2 R^6 \sin^2\theta}{2c^2 r^4}\,, \tag{147}$$

also $\propto -1/r^4$ am Äquator. Beides ist nicht $\propto +1/r$.

Bei endlicher Reynoldszahl kommt eine Sekundärströmung hinzu. Die Zentrifugalbeschleunigung des Rotlets zeigt zur Achse und hängt von z ab; sie ist kein Gradient. Der unausgeglichene Anteil treibt ein zentrifugales Pumpen: das Medium wird an den Polen nach innen gezogen und am Äquator abgeschleudert. Der Nettomassenstrom durch eine große Kugel verschwindet; was am Äquator austritt, wird an den Polen nachgeliefert. Das Winkelbild ist mindestens ein Quadrupol, kein Monopol. Jede daraus folgende Dichtestörung fällt daher mindestens wie $|u|^2$, also wie $1/r^4$ oder schneller, und trägt das Vorzeichen eines Defizits dort, wo die Strömung schnell ist. Ein Fernfeld $\delta\rho \propto +1/r$ entsteht nicht. Winkel, Verhältnis und Zellenzahl dieses Pumpens und seine Umkehr bei drehendem Medium rechnet Abschnitt C.12 in Anhang C.

B.3.3 Wirbelstürme, Unterdruckaugen und Atomwetter

Jedes Elektron sei ein Wirbelsturm auf einer Schale vom Radius r_s: ein Rankinescher Wirbel oder ein geglätteter Lamb–Oseen-Wirbel mit Zirkulation Γ, in drei Dimensionen ein Wirbelring oder eine die Schale durchstoßende Wirbelröhre. Mehrere Schichten mit verschiedener Zirkulation sind das Atomwetter.

Wirbellinien enden nach Helmholtz nicht im Innern der Flüssigkeit. Ein Wirbelsturm, der nur als radiales Stück auf der Schale säße, müsste sich nach innen oder außen fortsetzen oder sich zum Ring schließen. Auf einer geschlossenen Kugelfläche gilt überdies

$$\sum_i \Gamma_i = 0 \; : \tag{148}$$

sonst widersprechen sich die Flüsse der Wirbelstärke durch die beiden Kappen jeder geschlossenen Schnittkurve (Satz von Stokes). N gleiche Wirbelstürme der Zirkulation Γ allein sind deshalb unvollständig. Das Atomwetter braucht einen Ausgleich: eine Gegenschicht, gegensinnige Partner oder eine verteilte Hintergrundwirbelstärke $-N\Gamma/(4\pi r_s^2)$. Das widerspricht dem Bild nicht; es ist eine Bedingung an die Schichten.

Die Wechselwirkung folgt der Kirchhoff–Helmholtz-Dynamik. Zwei Wirbel gleicher Zirkulation umkreisen den Mittelpunkt mit $\Omega = \Gamma/(\pi d^2)$. Ein gegensinniges Paar wandert geradlinig mit $v = \Gamma/(2\pi d)$. Beides ist keine Bindung $\propto 1/r^2$. Ein regelmäßiges N-Eck gleicher Wirbel ist ein Relativgleichgewicht und läuft als Ganzes um; linear stabil ist es nur für hinreichend kleine N. Geschichtete Anordnungen verschiedener Zirkulation lassen sich als Anfangszustand setzen. Nicht gezeigt ist, dass sich gerade bestimmte Schichten von selbst als einzig stabiles Atomwetter einstellen; das wäre eine eigene Stabilitätsrechnung.

Jeder einzelne Wirbelsturm hat ein Unterdruckauge. Außerhalb des Rankine-Kerns gilt wie beim freien Wirbel

$$\delta\rho = -\frac{\rho_\infty \Gamma^2}{8\pi^2 c^2 s^2} \, . \tag{149}$$

Ein Lamb–Oseen-Wirbel hat dasselbe Fernfeld und nur einen glatteren Kern. Zwischen den Wirbeln ist die Strömung drehungsfrei, also gilt weiter die Bernoulli-Schranke (Satz 3): $\rho = \rho_\infty e^{-|u|^2/(2c^2)} \le \rho_\infty$. An Staupunkten zwischen den Augen kommt die Dichte höchstens wieder an den fernen Wert heran. Das Medium zwischen den Wirbelstürmen wird nicht verdichtet; es ist höchstens weniger verdünnt als die Augen selbst.

Das winkel- und zeitgemittelte Außenfeld hängt von der Nettozirkulation ab. N gleiche Wirbel wirken in großer Entfernung wie ein einziger Wirbel der Stärke $N\Gamma$,

$$\langle \delta\rho \rangle \sim -\frac{\rho_\infty (N\Gamma)^2}{8\pi^2 c^2 s^2}\,. \tag{150}$$

Das ist ein Defizit $\propto -1/s^2$. Verschwindet die Summe der Zirkulationen, wie es auf der Kugel sein muss, so bleibt höchstens ein Dipol oder ein höherer Multipol: $|u|$ fällt mindestens wie $1/s^2$ und $|\delta\rho|$ mindestens wie $1/s^4$. In drei Dimensionen ist das Fernfeld eines Wirbelrings ein Dipol $|u| \propto 1/r^3$ (dieselbe Form wie das Magnetfeld einer Stromschleife); der Unterdruck folgt wie $|u|^2 \propto 1/r^6$. Mehrere radial stehende Ringe können den Netto-Dipol aus Symmetrie löschen; übrig bleibt ein noch schneller fallendes Feld, kein Monopol $\propto +1/r$.

Abbildung 23 zeigt das zahlenmäßig. Tafel (a) stellt die Potenzen des Rotlets dem $1/r$-Gesetz der Anziehung gegenüber. Tafel (b) ist eine Schale aus sechs gleichen Rankine-Wirbeln: jedes Auge ist dunkel (Defizit), das Gebiet dazwischen hell, nirgends über ρ_∞. Auf dem Gitter gilt $\max \delta\rho \approx 0$ und $\min \delta\rho < 0$. Tafel (c) ist das Winkelmittel. Mit Nettozirkulation folgt das Fernfeld dem Gesetz (150) (bei $r = 2{,}3\,r_s$ numerisch $-0{,}04320$ gegen analytisch $-0{,}04315$). Zwei entgegengesetzte Schichten, ein einfaches Atomwetter mit $\sum \Gamma = 0$, sind bei demselben Radius nur noch $-4 \cdot 10^{-5}$ und fallen damit viel schneller. Der Vergleich $+c/r$ hat durchweg das entgegengesetzte Vorzeichen.

Ein von Wirbeln erzeugtes Fernfeld $\delta\rho \propto +1/r$ tritt in keinem der geprüften Fälle auf. Im unbegrenzten Medium mit $\mathbf{u} \to 0$ im Unendlichen bleibt die Bernoulli-Konstante $B = 0$; Bewegungsenergie senkt die Dichte, sie hebt sie nicht. Auch die Translation eines Wirbelpaars ist ein bewegter Dipol, kein Monopol.

B.4 Warum der Hof nicht aus der Strömung folgt

Der Hof (130) folgt aus dem Strahlungsgesetz und dem Gewicht des Mediums. Geprüft wurde zusätzlich, ob Zustrom, Drehung, Innendruck oder eine Wirbelschale ihn auch ohne dieses Gewicht erzeugen. Das ist nicht der Fall: Eine Strömung ohne Volumenkraft erzeugt stets ein Defizit. Ein stationärer Überschuss $\propto +1/r$ verlangt eine nach innen gerichtete Kraft $\propto 1/r^2$ auf das Medium, und genau das ist das Gewicht des Mediums im Feld des Körpers.




Abbildung 23: (a) Stokes-Rotlet am Äquator: Geschwindigkeit $\propto 1/r^2$, Wirbelstärke wie ein Dipol $\propto 1/r^3$. Der naive Bernoulli-Ansatz (hier unzulässig) gäbe ein Defizit $\propto 1/r^4$; die Anziehung fällt wie $1/r$. (b) Sechs Rankine-Wirbel auf einem Ring: Unterdruckaugen, dazwischen höchstens ρ_∞, nirgends ein Überschuss. (c) Winkelmittel: mit Nettozirkulation $\propto -1/r^2$ (gestrichelt: analytisch); zwei entgegengesetzte Schichten ($\sum\Gamma = 0$) fallen schneller. Der Vergleich $+c/r$ hat das andere Vorzeichen.

Die Rechnungen dieses Abschnitts zeigen damit, warum der Hof das Gleichgewicht ist und nicht der Zustrom. Das gilt für jedes barotrope Gesetz mit $\mathrm{d}p/\mathrm{d}\rho > 0$: Mit (129) lautet der Bernoullisatz $c^2 \ln(\rho/\rho_\infty) + u^2/2 = 0$, also $\rho = \rho_\infty e^{-u^2/(2c^2)} \le \rho_\infty$; das frühere Phasengesetz gab dasselbe Vorzeichen.

B.4.1 Die Bernoulli-Schranke

Satz 3. In einer stationären, reibungslosen, barotropen Strömung ohne Volumenkraft, deren Stromlinien aus der Ruhe im Unendlichen kommen, gilt überall $\rho \le \rho_\infty$. Gleichheit besteht nur dort, wo die Geschwindigkeit verschwindet.

Das folgt unmittelbar aus (139). Jede Bewegung, ob Zustrom, Drehung oder beides, senkt die Dichte. Ein nach innen dichterer Hof $\delta\rho = \rho - \rho_\infty > 0$ ist unter diesen Annahmen unmöglich: aus der Strömung allein folgt er nicht. Am Schallpunkt $|u| = c_s = c$ folgt außerdem $\rho = e^{-1/2}\rho_\infty \approx 0{,}61\,\rho_\infty$ (mit dem früheren Phasengesetz waren es $2/3$).

Will man dennoch $\rho = \rho_\infty + A/r$ mit $A > 0$ ansetzen, so verlangt (138) ohne Potential $|u|^2 = -2c^2 A/(\rho_\infty r) < 0$ (erste Ordnung). Das ist kein reelles Strömungsfeld. Derselbe Ansatz ist hydrostatisch genau dann lösbar, wenn ein Potential $\Phi = -c^2 A/(\rho_\infty r)$ zur Enthalpie addiert wird. Das ist Newtons Potential mit $GM = c^2 A/\rho_\infty$, also genau die Grundannahme (130).

B.4.2 Fernfeld ohne Volumenkraft

Im Unendlichen ist $\rho \approx \rho_\infty$. Dann gilt $u_r \approx -\dot{M}/(4\pi r^2 \rho_\infty)$ und $u_\varphi = L/r$, also

$$\delta\rho = -\frac{\rho_\infty L^2}{2c^2 r^2} - \frac{\dot{M}^2}{32\pi^2 c^2 \rho_\infty r^4} + \cdots . \tag{151}$$

Die Drehung bestimmt das führende Fernfeld $\propto -1/r^2$, die dreidimensionale Senke trägt $\propto -1/r^4$ bei. Beide Terme sind Defizite. In der Ebene tragen Zustrom und Drehung dasselbe Gesetz bei,

$$\delta\rho = -\frac{\rho_\infty L^2}{2c^2 s^2} - \frac{\dot{m}^2}{8\pi^2 c^2 \rho_\infty s^2} + \cdots \propto -\frac{1}{s^2} . \tag{152}$$

Für $\dot{M} = 0$ bleibt nur die Drehung: $\delta\rho = -\rho_\infty L^2/(2c^2 r^2)$. Eine starre Rotation $u_\varphi = \Omega s$ eines unendlich ausgedehnten Mediums besitzt kein endliches ρ_∞; im Rankine-Profil ist das Außenfeld wieder das des freien Wirbels, $\delta\rho \propto -1/s^2$, und der Kern ist ein Unterdruckkern. Reibung ändert daran das Vorzeichen nicht. Sie darf Drehimpuls umverteilen und einen starren Kern bilden, verletzt aber den mechanischen Bernoullisatz durch Dissipation. Hält man das Gesetz $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ fest, so wird die Heizung unterschlagen; lässt man die Entropie steigen, so sinkt bei gegebenem Druck die Dichte weiter, statt einen Überschuss zu erzeugen.

Variante	Fernfeld $\delta\rho$	Vorzeichen	$+1/r$?
Reine Drehung, $u_\varphi = L/r$	$-\rho_\infty L^2/(2c^2r^2)$	Defizit	nein
Starre Rotation / Rankine-Kern	außen $\propto -1/s^2$; kein ρ_∞ wenn überall starr	Defizit	nein
3D-Senke, $L = 0$	$\propto -1/r^4$	Defizit	nein
2D-Senke	$\propto -1/s^2$	Defizit	nein
Drehung und 3D-Senke	$-C_2/r^2 - C_4/r^4$	Defizit	nein
Fluss $u_r = -\sqrt{2GM/r}$ ohne Φ	$-\rho_\infty GM/(c^2 r)$	Defizit	nein
Hydrostatisch mit $\Phi = -GM/r$	$+\rho_\infty GM/(c^2 r)$	Überschuss	ja, ist Φ

Tabelle 4: Fernfeld des Dichtegegensatzes $\delta\rho = \rho - \rho_\infty$ für $\Delta p = c^2\Delta\rho$, erste Ordnung. Ein nach innen dichterer Hof $\propto +1/r$ tritt auf, sobald Newtons Potential — die Grundannahme aus Abschnitt B.1 — eingesetzt wird.

Abbildung 24 zeigt die Profile. Die Amplituden sind so gesetzt, dass sich Vorzeichen und Potenzgesetze vergleichen lassen; sie gehören nicht zu einem einzigen Körper. Nur die hydrostatische Kurve mit eingegebenem Potential liegt über ρ_∞.

B.4.3 Zustrom, Drehung und Grenzfläche

Aus (138) mit $u_\varphi = L/r$ folgt die Zentrifugalbarriere

$$r_{\mathrm{cent}} = \frac{L}{c_{s\infty}\sqrt{2}}\,. \tag{153}$$

Dort ist bei $u_r \to 0$ die Dichte auf ρ_∞/e gefallen, darunter fällt sie wie $\rho_\infty e^{-L^2/(2c^2r^2)}$ weiter, aber nie auf null. Das frühere Phasengesetz gab an derselben Stelle $\rho = 0$, eine harte Grenze; mit $\Delta p = c^2\Delta\rho$ ist es eine weiche. Zusätzlich gibt es einen Sperrradius der Senke. Schreibt man (138) dimensionslos als $\ln\hat\rho + \alpha/\hat\rho^2 = -\lambda^2/(2x^2)$ mit $\alpha = \mu^2/(2x^4)$, so besitzt die linke Seite als Funktion von $\hat\rho$ ein Minimum bei $\hat\rho^2 = 2\alpha$, und eine reelle Dichte existiert nur für $\alpha \le \tfrac{1}{2}\,e^{-1-\lambda^2/x^2}$. Jenseits dieser Grenze gibt es keine stationäre Lösung (früher: $\alpha \le 4B^3/27$ mit $B = 1 - \lambda^2/(2x^2)$).

Ein natürlicher Kandidat für die gesuchte Grenzfläche ist der Ort, an dem der Zustrom der Drehung dem Betrage nach gleicht, $|u_r| = |u_\varphi|$. In den dimensionslosen Größen $x = r/r_\star$, $\lambda = L/(c_{s\infty}r_\star)$ und $\mu = \dot M/(4\pi r_\star^2\rho_\infty c_{s\infty})$ existiert dieser Punkt bei abgestimmtem Massenstrom $\mu = |\lambda| x\,e^{-\lambda^2/x^2}$. Dort gilt

$$\frac{\rho}{\rho_\infty} = e^{-\lambda^2/x^2} < 1\,. \tag{154}$$




Abbildung 24: Dichteprofile in der Referenzskala $r_\star$. (a) Ohne Potential liegt ρ überall unter ρ_∞. Die Flusskinematik $u_r = -\sqrt{2GM/r}$ ohne Φ liefert ein Defizit $\propto -1/r$; dasselbe Potenzgesetz mit entgegengesetztem Vorzeichen erscheint hydrostatisch, sobald $\Phi = -GM/r$ gesetzt wird. (b) Beträge im doppelt logarithmischen Maßstab. Im Betrag fallen die beiden $1/r$-Kurven zusammen. Parameter der numerischen Zweige: $\lambda = L/(c_{s\infty} r_\star) = 1$, $\mu = \dot{M}/(4\pi r_\star^2 \rho_\infty c_{s\infty}) = 0{,}35$, in der Ebene $\mu_2 = \dot{m}/(2\pi r_\star \rho_\infty c_{s\infty}) = 0{,}4$. Die Kurven sind mit dem früheren Phasengesetz gerechnet; mit $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ gelten dieselben Vorzeichen und Potenzgesetze, nur nahe $u \sim c$ liegen die Defizite etwas flacher (Abschnitt B.1.1).

Das Medium ist weiterhin dünner als im Unendlichen. Für $\lambda = 1$ und $x = 2$ etwa ist $\mu = 1{,}56$ und $\rho/\rho_\infty = 0{,}78$. Das frühere Gesetz gab $1-\lambda^2/x^2$, also $\mu = 1{,}5$ und $0{,}75$, und verlangte $x > |\lambda|$; mit $\Delta p = c^2\Delta\rho$ entfällt diese Bedingung. Es entsteht kein Dichtesprung und keine materielle Haut, nur ein bestimmter Steigungswinkel auf einem glatten Defizitprofil.

Bei stetiger Anpassung, insbesondere am Rankine-Kernrand, sind ρ und u_φ stetig und damit auch der Druck. Die effektive Oberflächenspannung im Sinne von Young und Laplace, $\sigma = \Delta p\, R/2$ für eine Kugel, verschwindet.

Integriert man (137) über eine dünne Schicht, in der u_r außen endlich ist und innen auf null fällt, so bleibt der Zentrifugalterm als endliche Größe im Integral ohne Beitrag, und es folgt die Impulsbilanz

$$p_{\text{in}} = p_{\text{out}} + \rho_{\text{out}} u_r^2 \,. \tag{155}$$

Der Innendruck übersteigt den Außendruck um den Staudruck des Zustroms. Schreibt man das als Young–Laplace-Beziehung, so ist $\sigma_{\text{YL}} = \rho u_r^2 R/2$. Bei festem $\dot M$ gilt $\Delta p \propto 1/R^4$ und $\sigma_{\text{YL}} \propto 1/R^3$. Das ist keine Materialkonstante einer Haut, die einer Flächenänderung widersteht, sondern die Aussage, dass ankommender Impuls den Innendruck anhebt. Der Außenraum bleibt das Bernoulli-Defizit (151). Ein nach innen dichterer $1/r$-Hof entsteht dadurch nicht. Ohne eigenständige Oberflächenspannung dehnt sich ein überdrückter Bereich im barotropen Medium als Schallwelle aus, bis der Druck stetig ist; eine stabile Materialfläche folgt aus $\Delta p = c^2\Delta\rho$ allein nicht.

B.4.4 Das Flussmodell

Die Schwarzschild-Geometrie lässt sich als flacher Hintergrund schreiben, durch den der Raum selbst mit der Newtonschen Fluchtgeschwindigkeit nach innen strömt [1],

$$u_r = -\sqrt{\frac{2GM}{r}} \,. \tag{156}$$

Bei Hamilton und Lisle ist das eine Koordinatenlesart einer gegebenen Metrik, keine Herleitung der Strömung aus einer Zustandsgleichung. Hier wird (156) als vorgeschriebene Kinematik in das Medium mit $\Delta p = c^2\Delta\rho$ eingesetzt.

Ohne Potential folgt aus (137) $(1/\rho)\mathrm{d}p/\mathrm{d}r = GM/r^2$, also

$$\rho = \rho_\infty e^{-GM/(rc^2)} \simeq \rho_\infty - \frac{\rho_\infty GM}{c^2 r} \,. \tag{157}$$

Das ist ein $1/r$-Gesetz, aber ein Defizit, das entgegengesetzte Vorzeichen des gesuchten Hofs. Bernoulli bestätigt dasselbe, weil $u_r^2/2 = GM/r$ die Enthalpie genau um diesen Betrag senkt. Der Schallpunkt $u_r^2 = c^2$ liegt bei $r = 2r_s$ mit $r_s = GM/c^2$, und dort ist wieder $\rho = e^{-1/2}\rho_\infty \approx 0{,}61\,\rho_\infty$ (früheres Gesetz: $r = 3r_s$, $\rho = (2/3)\rho_\infty$).

Soll ρ dabei gegen ein endliches ρ_∞ gehen, so ist der Massenstrom nicht konstant:

$$\dot M(r) = 4\pi\rho_\infty c_{s\infty}\, r^2\, e^{-r_s/r}\sqrt{\frac{2r_s}{r}} \,. \tag{158}$$

$\dot{M}$ wächst für jedes r nach außen (früheres Gesetz: für $r > r_s/3$). Die zugehörige Quelle $S = -(4\pi r^2)^{-1}\mathrm{d}\dot{M}/\mathrm{d}r$ ist negativ: im ganzen Raum müsste Medium verschwinden, im Fernfeld wie $S \propto -r^{-3/2}$.

Hält man umgekehrt die Masse erhalten ($\dot{M}$ konstant, $S = 0$), so folgt $\rho \propto r^{-3/2}$ und kein endliches ρ_∞. Das ist der schon im Arbeitsentwurf notierte Befund. Diese Dichte ist mit (137) ohne Potential nicht verträglich: Euler verlangt dann $\mathrm{d}\rho/\mathrm{d}r > 0$ und das Gesetz $1/r$, während $\rho \propto r^{-3/2}$ nach innen dichter wird und wie $r^{-5/2}$ fällt. Mit Gravitation verlangt dieselbe Kinematik $\mathrm{d}p/\mathrm{d}r = 0$. Mit $\Delta p = c^2\Delta\rho$ heißt das konstante Dichte, unvereinbar mit $r^{-3/2}$. Selbstkonsistent ist der Fluss nur als Staub ($p = 0$) in einem bereits vorausgesetzten Newton-Feld.

Hydrostatisch, $u = 0$, gilt mit $\Phi = -GM/r$ dagegen

$$\rho = \rho_\infty e^{GM/(rc^2)} \simeq \rho_\infty + \frac{\rho_\infty GM}{c^2 r}\,. \tag{159}$$

Das ist der überschüssige Hof (130), in erster Ordnung (133). Er stammt vollständig aus dem Gewicht des Mediums im Potential, nicht aus Zustrom oder Drehung. Gleichgewichtshof und Newton-Potential sind hier dasselbe. In der Bondi-Akkretion [2] erzeugt derselbe Potentialterm das $1/r$-Fernfeld der Enthalpie; ohne ihn gibt es die bekannte transsonische Lösung nicht.

B.4.5 Der Innendruck erzeugt keinen Außenhof

Der Ausgleich (143) bestimmt den Radius, nicht den Gleichgewichtshof. Die folgenden Fälle machen das kenntlich.

Ruhendes Medium, Zustrom und wachsender Kern Der Ausgleich (143) bestimmt R. Er bestimmt nicht das Dichteprofil für $r > R$.

Ist das Außenmedium in Ruhe und wirkt keine Volumenkraft, so verlangt die Eulergleichung $\mathrm{d}p/\mathrm{d}r = 0$. Druckstetigkeit an der Fläche heißt dann $p(r) = P_{\mathrm{Kern}}(R_{\mathrm{eq}}) = p_\infty$ überall außerhalb. Die Dichte ist räumlich konstant. Es gibt keinen Hof. Anschaulich ist das derselbe Befund wie bei einem aufgeblasenen Ball in ruhender Luft: der Innendruck setzt die Größe des Balls, nicht ein Dichtegefälle der Luft ringsum.

Wird der Zustrom an der Kernfläche aufgenommen (akkretiert oder angehäuft), so bleibt das Außenfeld das Bernoulli-Defizit (151), also $\propto -1/r^2$ durch Drehung und $\propto -1/r^4$ durch die Senke. Der Kerndruck wählt darunter den Radius, an dem (143) gilt; die Form des Defizits ändert er nicht.

Eine einmalige Anpassung, bei der der Kern sich auf R_{eq} aufbläht, sendet eine Schallwelle nach außen. Nach ihrem Durchgang ist das unendlich ausgedehnte Medium wieder bei ρ_∞. Ein bleibender $1/r$-Hof entsteht daraus nicht.

Wächst der Kern weiter und schiebt das Medium wie ein undurchlässiger Kolben nach außen, so ist das Medium an der Fläche eine Quelle, nicht eine

Senke. Das instationäre Bernoullisatzglied $\partial\phi/\partial t$ liefert dann formal

$$\delta\rho = \frac{\rho_s}{c^2 r}\,(2R\dot{R}^2 + R^2\ddot{R})\,, \tag{160}$$

also $\delta\rho \propto +1/r$, solange das Volumen beschleunigt wächst. Für $\dot{R} = \ddot{R} = 0$ verschwindet der Term. Soll dieser Hof die Stärke $2GM/(rc^2)$ haben und gelten $c_s = c$ sowie $\rho_s = \rho_\infty$, so müsste die Oberfläche mit $\dot{R} = c\sqrt{r_s/(2R)}$ wachsen. Für einen Körper von der Größe der Erde sind das etwa $8\,\mathrm{km/s}$. Ein Gleichgewichtskern steht still und hinterlässt keinen solchen Hof. Zudem widerspricht die Kinematik dem Zustrom: wer Medium aufnimmt, hat an der Fläche eine Senke, und eine stärker werdende Senke erzeugt das entgegengesetzte Vorzeichen $\propto -1/r$.

Wenn die Abstoßung das Medium selbst erfasst Bisher wirkte die Abstoßung nur zwischen den Teilchen im Kern; das Medium spürte sie allein als Kontaktdruck an der Fläche. Wirkt sie darüber hinaus als Volumenkraft f_r auf das Medium, so gilt hydrostatisch $c^2\,\mathrm{d}\ln\rho/\mathrm{d}r = f_r$. Der Ansatz $\rho = \rho_\infty + A/r$ mit $A > 0$ erzwingt

$$f_r = -\frac{c^2 A}{\rho_\infty r^2}\,. \tag{161}$$

Die Kraft auf das Medium muss nach innen zeigen und wie $1/r^2$ fallen. Das ist Newtons Anziehung, nicht eine Abstoßung.

Drückt die Abstoßung das Medium dagegen weg ($f_r = +C/r^2$), so folgt

$$\rho = \rho_\infty e^{-C/(c^2 r)} \simeq \rho_\infty - \frac{\rho_\infty C}{c^2 r}\ : \tag{162}$$

ein Defizit $\propto -1/r$, das entgegengesetzte Vorzeichen des gesuchten Hofs. Eine kurzreichweitige Abstoßung verschwindet außerhalb ihrer Reichweite; dort ist wieder $\mathrm{d}p/\mathrm{d}r = 0$ und die Dichte konstant.

B.4.6 Umströmung einer Kugel und zwei Körper im gemeinsamen Strom

Ein Körper, der sich durch das Medium bewegt, ist gleichwertig zu einer gleichförmigen Anströmung mit dem Fahrtwind U. Weil das ganze System vom Medium mitgeschoben werden kann, rechnen wir in diesem mitbewegten Bezug: nur die Relativgeschwindigkeit zählt. Die Strömung sei stationär, drehungsfrei und schwach kompressibel; die Dichte folgt aus dem Bernoullisatz (138), in erster Ordnung. Eine materielle Schweifbildung durch Ablösung wird hier nicht angesetzt.

Das Geschwindigkeitsfeld um eine feste Kugel vom Radius R ist in führender Ordnung das der inkompressiblen Potentialströmung

$$u_r = U\Big(1 - \frac{R^3}{r^3}\Big)\cos\theta\,, \qquad u_\theta = -U\Big(1 + \frac{R^3}{2r^3}\Big)\sin\theta\,. \tag{163}$$

Kommen die Stromlinien aus der Gleichströmung U im Unendlichen, so gilt

$$\rho = \rho_\infty - \rho_\infty \frac{|u|^2 - U^2}{2c^2} \,. \tag{164}$$

An beiden Staupunkten, vorn ($\theta = \pi$) und hinten ($\theta = 0$), verschwindet die Geschwindigkeit. Dort gilt dieselbe Überdichte

$$\delta\rho_{\text{Stau}} = +\frac{\rho_\infty U^2}{2c^2} \,. \tag{165}$$

Am Äquator ist $|u| = \frac{3}{2}U$ und $\delta\rho = -5\rho_\infty U^2/(8c^2)$, ein Defizit. Hinter dem Körper sitzt also kein Unterdruckschweif, sondern derselbe Staupunkt wie vorn. Abbildung 25 (a) zeigt das. Das entspricht dem Bild, dass sich hinten kein Schweif bildet, weil das System als Ganzes vom Medium angeschoben wird: im Relativwind ist das Heck ein Staupunkt, kein Nachlauf.

Das Winkelmittel folgt aus $\langle|u|^2\rangle = U^2\big(1 + R^6/(2r^6)\big)$,

$$\langle\delta\rho\rangle = -\frac{\rho_\infty U^2 R^6}{4c^2 r^6} \,. \tag{166}$$

Das ist ein Defizit $\propto -1/r^6$, kein Überschuss $\propto +1/r$. Die Dipolstörung der Geschwindigkeit fällt wie $1/r^3$; nach der Mittelung über die Kugel überlebt $\langle|u|^2 - U^2\rangle \propto 1/r^6$. Die örtliche Überdichte an den Polen wird vom äquatorialen Defizit überwogen. Ein Netto-Massenüberschuss im Außenfeld entsteht nicht.

Die Druckverteilung ist vorne-hinten-symmetrisch. Das Flächenintegral der Kraft verschwindet (d'Alembert): eine einzelne Kugel erfährt in dieser Strömung keinen Widerstand. Sie wird nicht von einem Heckschweif zurückgehalten.

Zwei gleiche Kugeln im Abstand d (Mittelpunkte) im selben Strom wirken in führender Ordnung über ihre Dipolfelder aufeinander. Die Kraft längs der Verbindungslinie ist

$$F_\parallel = \frac{3\pi\rho_\infty U^2 R^6}{d^4}\,(2 - 3\sin^2\theta)\,, \tag{167}$$

positiv als Abstoßung. Hintereinander ($\theta = 0$, Tandem) gilt $F_\parallel = +6\pi\rho_\infty U^2 R^6/d^4$: sie stoßen einander ab. Nebeneinander ($\theta = \pi/2$) gilt $F_\parallel = -3\pi\rho_\infty U^2 R^6/d^4$: sie ziehen einander an. Das Vorzeichen wechselt bei $\sin^2\theta = 2/3$. Das Mittel über alle Richtungen der Verbindungslinie verschwindet, und auch die mittlere Kraft längs des Stroms ist null. Es bleibt keine stets anziehende $1/d^2$-Kraft übrig.

Die Kraft koppelt an das Volumen, nicht an die träge Masse. Sie ist proportional zur Mediumdichte ρ_∞ und zu R^6, also zum Produkt zweier Kugelvolumina, und unabhängig davon, ob die Kugel hohl oder voll ist. Die Beschleunigung eines Körpers ist dann F/M und unterscheidet sich wie $1/M$. Newtons Anziehung koppelt dagegen an die Massen und fällt wie $1/d^2$.

Wird der Fahrtwind Überschall, $U > c_{s\infty}$, so kann sich vor einem stumpfen Körper eine Kopfwelle bilden. Eine Überschallrechnung führen wir nicht aus. In der hier geprüften Unterschallströmung entsteht hinten kein Schweif. Ob bei $Ma > 1$ trotzdem ein Nachlauf auftritt, ist nicht gezeigt.

Nicht gezeigt, und unter diesen Annahmen nicht möglich, ist ein überschüssiger Hof $\delta\rho \propto +1/r$ oder eine massengekoppelte Anziehung $\propto 1/d^2$ aus der Umströmung. Gezeigt ist die lokale Überdichte an beiden Staupunkten, das Defizitgesetz $\propto -1/r^6$, das d'Alembertsche Verschwinden des Widerstands und die an Lage und Volumen gebundene Zweikörperkraft $\propto 1/d^4$.

B.4.7 Druck gegen Trägheit und Fahrtwind

Im Anschluss an die Umströmung einer festen Kugel sei jetzt eine ausgedehnte Wolke gemeint, die sich durch das Medium bewegt. Druck von oben und unten wirkt gegen die Trägheit der Wolke und soll sie zu einer Scheibe flachdrücken. Druckstöße von hinten beschleunigen sie; der Fahrtwind vorn wächst mit der Geschwindigkeit und verdichtet zusätzlich.

Eine Wolke der Dicke L und Dichte ρ_c hat die Flächenmasse $\Sigma = \rho_c L$. Ein Druckunterschied Δp — thermischer Außendruck oder Staudruck eines Impulses — erzeugt die Beschleunigung $a = \Delta p/\Sigma$. Die Fläche legt eine Strecke der Ordnung L in der Zeit

$$t_{\mathrm{fl}} \sim L\sqrt{\frac{\rho_c}{\Delta p}} \tag{168}$$

zurück. Die dabei erreichte Geschwindigkeit ist $v_{\mathrm{ind}} \sim \sqrt{\Delta p/\rho_c}$, also $t_{\mathrm{fl}} \sim L/v_{\mathrm{ind}}$.

Ist $\Delta p = p_\infty = \rho_\infty c^2$, so gilt $t_{\mathrm{fl}} \sim (L/c)\sqrt{\rho_c/\rho_\infty}$ (früheres Gesetz: mit einem Faktor $\sqrt{2}$ mehr). Ist $\Delta p = \rho_\infty v^2$ der Staudruck des Fahrtwinds, so ist $t_{\mathrm{fl}} \sim (L/|v|)\sqrt{\rho_c/\rho_\infty}$. Ein kurzer Druckstoß der Dauer τ liefert nur den Impuls $\Delta p\,\tau$ je Fläche und die Geschwindigkeit $v_{\mathrm{ind}} = \Delta p\,\tau/\Sigma$; dann folgt $t_{\mathrm{fl}} = \rho_c L^2/(\Delta p\,\tau)$, sofern diese Zeit größer als τ bleibt.

Gezeigt ist damit die Zeitskala der Abplattung. Die volle Oberflächenbewegung folgt aus derselben Bilanz Druck gegen Trägheit an jedem Flächenstück; gemessen ist sie bei Tropfen im Luftstrom, die sich quer zur Strömung abplatten, bevor sie zerfallen. Der Gleichgewichtshof folgt nicht aus der Abplattung, sondern aus dem Gewicht des Mediums.

Für die Bewegung der Wolke als Ganzes seien M ihre Masse, A die Stirnfläche und v die Geschwindigkeit durch das Medium. Der Fahrtwind erzeugt den Staudruck $\rho_\infty v^2$ und die Widerstandskraft $-A\rho_\infty v|v|$. Druckstöße von hinten seien im Mittel ein Schub $\Delta p_b A$. Dann gilt

$$M\dot{v} = A\big(\Delta p_b - \rho_\infty v|v|\big)\,. \tag{169}$$

Bei konstantem $\Delta p_b > 0$ gibt es die Endgeschwindigkeit

$$v_\star = \sqrt{\frac{\Delta p_b}{\rho_\infty}}\,, \tag{170}$$




Abbildung 25: (a) Dichte auf der Kugelfläche. An beiden Staupunkten, vorn und hinten, ist $\delta\rho = +\rho_\infty U^2/(2c^2)$; am Äquator ein Defizit. Es bildet sich kein Unterdruckschweif. (b) Winkelmittel außerhalb: Defizit $\propto r^{-6}$, verglichen mit dem Gleichgewichtshof $\propto r^{-1}$. (c) Kraft zwischen zwei Kugeln längs der Verbindungslinie, in Einheiten von $\pi\rho_\infty U^2R^6/d^4$. Hintereinander Abstoßung, nebeneinander Anziehung. Das Richtungsmittel verschwindet.

bei der Schub von hinten und Staudruck vorn sich die Waage halten. Mit $v(0) = 0$ ist die Lösung $v(t) = v_\star \tanh(t/\tau_\star)$ und $\tau_\star = M/(A\rho_\infty v_\star)$. Die Ruhelage $v_\star$ ist anziehend: für $v < v_\star$ überwiegt der Schub, für $v > v_\star$ der Fahrtwind. Die Geschwindigkeit läuft nicht weg.

Wächst die Stirnfläche beim Abplatten (bei erhaltenem Volumen etwa $A \propto 1/L$), so ändert das nur die Zeitskala, nicht $v_\star$. Bei der Endgeschwindigkeit wirkt vorn und hinten weiterhin Druck; die Wolke kann sich weiter abplatten, bis ein eigener Innendruck das auffängt. Das hängt von der Zustandsgleichung der Wolke ab und wird hier nicht gelöst.

Die Kette "Druckstoß beschleunigt, Fahrtwind wächst, die Wolke wird stärker zusammengedrückt" gilt also für die Form. Sie liefert kein Weglaufen der Geschwindigkeit. Nicht gezeigt ist ein überschüssiger Hof $\propto +1/r$ oder eine Anziehung $\propto 1/r^2$ aus diesem Mechanismus.

B.4.8 Magnetismus und Wirbelschale tragen den Hof nicht

Die Rotation des Kerns erzeugt das Dipolfeld (146), kein Dichtemonopol. In der Stokes-Näherung ist $\delta\rho = 0$; der unzulässige Bernoulli-Ansatz und die Sekundärströmung liefern höchstens ein Defizit $\propto -1/r^4$ (Abschnitt B.3.2). Jeder Wirbelsturm ist ein Unterdruckauge (149). Das winkelgemittelte Fernfeld einer Schale ist bei endlicher Nettozirkulation ein Defizit $\propto -1/s^2$ und fällt bei $\sum \Gamma_i = 0$ schneller (vgl. (150)). Ein von Wirbeln erzeugtes Gesetz $\propto +1/r$ tritt nicht auf (Abschnitt B.3.3, Abbildung 23).

B.4.9 Was einen Überschuss $\propto +1/r$ trägt

Damit ein Hof (130) aus einer Strömung entstünde, brauchte es wenigstens eine der folgenden, über Zustrom und Drehung hinausgehenden Zutaten.

1. Ein Potential $\Phi = -GM/r$. Das ist das Gewicht des Mediums, also das Gleichgewicht selbst, nicht eine Strömung.

2. Ein zeitabhängiges Monopolpotential $\partial\phi/\partial t \propto 1/r$. Eine stärker werdende Quelle, nicht Senke, liefert formal ein Überschussgesetz $\propto +1/r$. Der Massenstrom wächst dann ohne Bindung, und die Größe, die den Hof trägt, ist wieder ein $1/r$-Potential unter anderem Namen.

3. Eine endliche Anströmgeschwindigkeit im Unendlichen. Stagnation kann die Dichte über dem fernen Wert heben, aber nur örtlich und um einen Anteil der Größenordnung Ma_∞^2. Kugelsymmetrisch ist eine endliche Geschwindigkeit im Unendlichen mit endlichem $\dot{M}$ und endlichem ρ_∞ unvereinbar; das Fernfeld eines Hindernisses im parallelen Strom ist ein Dipol, typisch $|u| \propto 1/r^3$, nicht ein Monopol $\propto 1/r$.

4. Ein eigens gewähltes $\dot{M}(r)$ zusammen mit einer Volumenkraft, die (137) schließt. Die Kraft, die $\delta\rho \propto +1/r$ erzwingt, ist wieder $\propto 1/r^2$.

5. Andere Physik, etwa eine Energie, die von Dichtegradienten abhängt, oder nichtbarotrope Zusatzspannungen. Das liegt außerhalb der hier geprüften Gleichungen.

6. Wirkt die Abstoßung der Teilchen auch auf das Medium, so muss die Kraft für einen Überschuss $\propto +1/r$ nach innen zeigen und wie $1/r^2$ fallen. Das ist wieder Newtons Gesetz. Eine abstoßende Kraft auf das Medium erzeugt das entgegengesetzte Vorzeichen.

7. Die Rotation des Kerns als Magnetismus-Analogie und eine Schale aus Wirbelstürmen erzeugen ein Dipolfeld der Wirbelstärke und Unterdruckaugen, aber keinen Überschuss $\propto +1/r$.

Die Fälle (i), (ii), (iv) und (vi) enthalten das Newton-Potential oder eine gleichwertige $1/r^2$-Beschleunigung; das ist das Gewicht des Mediums, also das Gleichgewicht (130). Fall (iii) erzeugt den Hof nicht. Fall (vii) ebenfalls nicht: er liefert ein Dipolfeld und Unterdruckaugen, aber kein $+1/r$. Fall (v) braucht das Medium nicht: Sein Gesetz ist $\Delta p = c^2\Delta\rho$, und damit trägt bereits Fall (i) den gemessenen Hof.

B.4.10 Frage: Woher kommt der Hof?

Frage: Welcher Mechanismus im Medium trägt die Kraft $\propto 1/r^2$ nach innen, die den Hof hält?

Antwort: Das Gewicht des Mediums selbst. Das Medium besteht aus Strahlung, und Strahlung ist Energie; Energie fällt wie jede Masse. Gemessen ist das an Licht (Ablenkung $1{,}75''$ am Sonnenrand, Pound–Snider-Rotverschiebung $2gh/c^2 = 4{,}9 \times 10^{-15}$ über $22{,}5\,\mathrm{m}$) und an der Gleichheit des freien Falls aller Stoffe (MICROSCOPE, 10^{-15}). Im ruhenden Medium hält der Strahlungsdruckgradient $c^2\nabla\rho$ diesem Gewicht die Waage; das ist (130). Keine der geprüften Strömungen liefert den Hof, weil der Hof keine Strömung ist; die Strömungen setzen ihre Defizite auf ihn auf.

Bemerkung 3 (Beantwortet). Der Dichtehof ist das hydrostatische Gleichgewicht des Mediums mit $\Delta p = c^2\Delta\rho$: $\rho = \rho_\infty e^{GM/(rc^2)}$, $A = \rho_\infty GM/c^2$. Dasselbe gilt im ganzen Medium.

B.5 Schluss

Um einen Körper liegt ein nach innen dichterer Hof. Er folgt aus dem lokalen Gesetz $\Delta p = c^2\Delta\rho$ und dem hydrostatischen Gleichgewicht: $\rho = \rho_\infty e^{GM/(rc^2)} \approx \rho_\infty(1 + GM/(rc^2))$, ein Überschuss A/r mit $A = \rho_\infty GM/c^2$. Sein Quadrat ist der Index $n = e^{2GM/(rc^2)}$, der die gemessenen Werte von Lichtablenkung, Shapiro-Verzögerung und Merkurperihel liefert. Dasselbe Gesetz gilt im ganzen Medium; das frühere zweite Phasengesetz ist fallen gelassen, weil es Merkur $35{,}82''$ statt $42{,}98''$ gibt (Abschnitt B.1.1).

Gezeigt ist: die gegenseitige Abstoßung der Elementarteilchen im Kern erzeugt einen Innendruck und, gegen den Außendruck des Mediums, in der Regel einen stabilen Gleichgewichtsradius. Das leistet, was eine Grenzfläche braucht. Gezeigt ist ferner: die Rotation des Kerns erzeugt im zähen Medium ein Dipolfeld der Wirbelstärke $\propto 1/r^3$, analog zu einem magnetischen Dipol. Jeder Wirbelsturm auf der Schale ist ein Unterdruckauge; eine geschlossene Schale verlangt $\sum \Gamma_i = 0$ und damit Schichten mit gegensinniger Zirkulation (Atomwetter). Gezeigt ist außerdem: in der Potentialströmung um eine Kugel entsteht an beiden Staupunkten eine Überdichte, hinten kein Unterdruckschweif, und das Winkelmittel ist ein Defizit $\propto -1/r^6$. Zwei Körper im gemeinsamen Strom stoßen sich hintereinander ab und ziehen sich nebeneinander an; die Kraft skaliert wie $\rho_\infty U^2 R^6/d^4$ und koppelt an das Volumen, nicht an die Masse. Eine bewegte Wolke wird durch Druck gegen Trägheit auf der Zeitskala L/v_{ind} abgeplattet und erreicht eine Endgeschwindigkeit, bei der der Schub von hinten den Staudruck des Fahrtwinds aufwiegt; die Geschwindigkeit läuft nicht weg. Der Gleichgewichtshof folgt daraus nicht; er folgt aus dem Gewicht des Mediums.

Gezeigt ist ferner: in einem stationären Medium mit $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ ohne Volumenkraft erzeugen Zustrom, Drehung, Innendruck, Wirbel und die Umströmung eines Körpers einen Unterdichtehof, keinen Überschusshof. Das Fernfeld ist $\propto -1/r^2$ (Drehung), $\propto -1/r^4$ (dreidimensionale Senke) oder $\propto -1/s^2$ (Ebene und Wirbelschale mit Nettozirkulation). Die Flusskinematik $u_r = -\sqrt{2GM/r}$ ohne Potential erzeugt $\delta\rho \propto -1/r$, das falsche Vorzeichen. Ein Überschuss $\propto +1/r$ verlangt eine nach innen gerichtete Kraft $\propto 1/r^2$ auf das Medium. Diese Kraft ist das Gewicht des Mediums im Feld des Körpers, und mit ihr erscheint der Hof als Strahlungsdruckgleichgewicht. Zustrom, Drehung und Wirbel sind Zusätze, die ihn nicht erzeugen; sie setzen ihre Defizite auf ihn auf.

Bemerkung 4. Diese Notiz betrifft den Dichtehof, der die Schwerkraft trägt, nicht die Kraft zwischen zwei eingebetteten Körpern. Die Kraft zwischen zwei Körpern rechnen die Anhänge zu Bjerknes-Kräften (Anhang F) und zum rotierenden Medium (Anhang I).

Literatur

[1] A. J. S. Hamilton und J. P. Lisle, „The river model of black holes“, American Journal of Physics **76** (2008), 519–532. arXiv:gr-qc/0411060. Darin: Gullstrand–Painlevé-Form als Fluss des Raums mit $v = \sqrt{2GM/r}$. Das ist eine Lesart einer gegebenen Metrik, keine Herleitung der Strömung aus einer Zustandsgleichung.

[2] H. Bondi, „On spherically symmetrical accretion“, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society **112** (1952), 195–204. Die Bernoulli-Gleichung mit Potential, $h + u^2/2 - GM/r = \text{const}$, macht das $1/r$-Fernfeld der Enthalpie als Term $-GM/r$ kenntlich.

[3] H. Lamb, Hydrodynamics, 6. Auflage, Cambridge University Press, 1932 (Dover-Nachdruck, New York, 1945). Art. 26–29 (gleichförmige Rotation und

Rankines combined vortex); Art. 56–58 (Quellen und Senken); Bernoullischer Satz; Wirbelpaare.

C Wirbelringe, Torusknoten und stehende Wellen

Zusammenfassung. Im barotropen Medium mit $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ werden geschlossene Wirbelfäden als mögliches Gegenstück zu Elektronenbahnen und Orbitalen geprüft. Gezeigt ist: ein dünner Ring besitzt die Kelvin-Geschwindigkeit $U = (\Gamma/4\pi R)(\ln(8R/a) - 1/4)$, den Impuls $P = \pi\rho\Gamma R^2$ und die Energie $E = \frac{1}{2}\rho\Gamma^2 R(\ln(8R/a) - 7/4)$. Die Verdünnung des Kerns setzt eine natürliche Dicke $a_{\mathrm{evac}} = \Gamma/(2\pi\sqrt{2}\,c_s)$; dort ist die Dichte auf ρ_∞/e gefallen. Die Biegemoden ganzahliger Azimutalzahl m haben die parameterfreie Form $\omega_m/\omega_2 = m\sqrt{m^2-1}/(2\sqrt{3})$ und wachsen wie m^2, nicht wie $1/n^2$. Keine Wahl von Γ, R und a ändert diese Verhältnisse. Lange Wellen ($m \ll R/a$) sind in der lokalen Induktionsnäherung stabil; die Widnall-Bänder liegen bei $ka \simeq 2{,}5$ und $4{,}35$, also bei $m \sim \mathcal{O}(R/a)$.

Torusknoten $T(p,q)$ können metastabil sein ($T(2,3)$ unter der lokalen Induktion, experimentell auch der Achterknoten), zerfallen im freien Fluid aber durch Rekombination. Ihre Schatten haben bei $T(2,3)$ dreizählige und bei $T(2,5)$ fünfzählige Aufsichtssymmetrie. Reelle s-, p- und d-Orbitale besitzen $2|m|$ äquatoriale Lappen (also 0, 2 oder 4), niemals drei oder fünf. Ein quantitatives Ähnlichkeitsmaß der Schatten bestätigt: Vierblatt-d passt schlechter als p-artige Formen, und kein Knoten bildet das $1s$-Orbital ab.

Stehende Wellen auf einem geschlossenen Ring liefern die de-Broglie-Schlussbedingung $2\pi R = n\lambda$ und damit $L = n\hbar$. Zusammen mit einer Coulomb-Kraft $\propto 1/r^2$ folgen die Bohr-Energien $E_n \propto -1/n^2$. Das Coulomb-Gesetz ist dabei gemessen (Coulomb, 1785; Wasserstoffspektrum) und eingesetzt. Im Medium trägt das bindende $1/r$ der Abstand der Wirbelwände: Die Grenzfrequenz zwischen ihnen macht aus der Schallgleichung die Wasserstoffgleichung (Anhang E). Geschachtelte Ringe gleichen Vorzeichens sitzen nicht still: sie durchspringen einander auf einer Zeitskala von Bruchteilen der Bohr-Periode, ohne dass sich die Fäden schneiden.

Als Kandidat für den s-Zustand wird der Hillsche Kugelwirbel konstruiert. Er hat ein zentrales Dichteminimum und ein gleich tiefes Minimum auf dem Oberflächenäquator; der innere Stauring ist ein Maximum. Bei festem Γ gilt $E \propto a$, ein Radius $a_n \propto n^2$ folgt nicht. Der Wirbel transliert und bleibt nach bekannten Ergebnissen nicht formstabil. Gegenläufige Ringpaare haben kei-

nen stillen Abstand, auch nicht im $1/r$-Druckfeld eines Kerns. Die Zahl $2\ell+1$ der Orbitale pro Schale folgt aus der Kugelsymmetrie; im Medium liefert sie die dreidimensionale Wellengleichung des Wellenleiters (Anhang E). Im idealen Medium dürfen Wirbellinien einander nicht kreuzen; der beobachtete Zerfall von Torusknoten durch Rekombination verlangt Viskosität.

C.1 Fragestellung

In der begleitenden Notiz zum Dichtehof stehen Elektronen als Wirbelstürme auf einer Schale: jedes ist ein Unterdruckauge, und auf einer geschlossenen Fläche muss $\sum \Gamma_i = 0$ gelten [1]. Die vorliegende Rechnung nimmt das Bild beim Wort und prüft konkrete Gegenstücke zu den Wasserstofforbitalen.

Erstens der dünne Wirbelring: Geschwindigkeit, Energie, Impuls, Biegewellen ganzzahliger Wellenzahl m und ihre Stabilität, samt Kompressibilitätskorrekturen. Zweitens Torusknoten $T(p,q)$ und ein Achterknoten als verknotete Fäden, ihre Metastabilität und der Vergleich ihrer Schatten mit den Winkelformen $|Y_{\ell m}|^2$ bzw. den reellen s-, p- und d-Orbitalen. Drittens stehende Wellen auf einer geschlossenen Saite, die de-Broglie-Schlussbedingung und die bekannten Bohr-Energien — und ehrlich die radiale Knotenfrage ($1s$, $2s$, $3s$). Viertens der Hillsche Kugelwirbel als möglicher s-Zustand: Konstruktion, Druckfeld, Größe und Stabilität. Fünftens gegenläufige Ringpaare als mögliches Bild radialer Knoten. Die Zählung $2\ell+1$ wird als übernommene Kugelsymmetrie genannt, und es wird kurz geprüft, ob eine rundere Bahn oder eine kugelsymmetrische Gesamtanordnung die Konfiguration stabiler macht.

Bei jedem Ergebnis steht, ob es gerechnet, gemessen oder aus einem anderen Anhang übernommen ist. Wo ein Fadenbild nicht passt, steht das klar, und es steht dabei, welches Bild stattdessen passt.

C.2 Gleichungen

Das Medium ist barotrop mit

$$\Delta p = c^2 \Delta\rho\,, \qquad h = \int \frac{\mathrm{d}p}{\rho} = c^2 \ln\frac{\rho}{\rho_\infty}\,, \qquad c_s^2 = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\rho} = c^2\,, \tag{171}$$

normiert durch $h(\rho_\infty)=0$; also $c_s = c_{s\infty} = c$ überall. Stationär, reibungslos und ohne Volumenkraft gilt die Bernoulli-Gleichung $h + |u|^2/2 = B$. Kommen alle Stromlinien aus der Ruhe im Unendlichen, so ist $B=0$ und

$$\rho = \rho_\infty\, e^{-u^2/(2c_{s\infty}^2)} \simeq \rho_\infty\Big(1 - \frac{u^2}{2c_{s\infty}^2}\Big)\,. \tag{172}$$

Die Dichte fällt, sobald das Medium strömt. Sie wird nie null; bei $u = \sqrt{2}\,c_{s\infty}$ ist sie auf ρ_∞/e gefallen. (Das frühere Phasengesetz gab dort $\rho = 0$; Abschnitt B.1.1.)

Ein dünner Wirbelfaden der Zirkulation Γ erzeugt in seiner Nähe dasselbe Feld wie ein gerader Linienwirbel, $u_\theta = \Gamma/(2\pi s)$. Einsetzen in (172) liefert das Kernprofil

$$\frac{\rho}{\rho_\infty} = \exp\Big[-\Big(\frac{a_{\text{evac}}}{s}\Big)^2\Big], \qquad a_{\text{evac}} = \frac{\Gamma}{2\pi\sqrt{2}\,c_{s\infty}}\,. \tag{173}$$

Bei $s = a_{\text{evac}}$ ist die Dichte auf ρ_∞/e gefallen, bei $s = a_{\text{evac}}/2$ auf $0{,}018\,\rho_\infty$. Der Kern ist also nicht hart leer, sondern sehr dünn. Der Name a_{evac} (Evakuierungsradius) stammt aus der früheren Fassung, in der die Dichte dort null wurde; die Länge ist dieselbe. Das Medium setzt also selbst eine Kerndicke; a muss nicht von außen gewählt werden. Abbildung 26a zeigt dieses Profil.

Dieselbe Zustandsgleichung liegt der Notiz zum Dichtehof zugrunde [1]. Der Gleichgewichtshof, $\delta\rho \simeq \rho_\infty GM/(c^2 r)$, wird hier nicht stillschweigend eingesetzt.

Im idealen, reibungsfreien Medium gelten die Sätze von Helmholtz und Kelvin: Wirbellinien sind materielle Linien, ihre Zirkulation bleibt erhalten, und sie können einander weder durchschneiden noch sich selbst schneiden. Die Helizität — das Verschlingungsmaß der Wirbelstärke — ist eine Invariante [16]. Eine Faltung ist zulässig, solange die Kurve eine Einbettung bleibt. Rekombination verlangt Viskosität und wird hier nicht als Prozess des idealen Mediums zugelassen. In den folgenden Abschnitten zählen daher nur überschneidungsfreie Konfigurationen.

C.3 Der dünne Wirbelring

C.3.1 Kelvin-Geschwindigkeit, Impuls und Energie

Für einen dünnen Ring vom Radius R und der Kerndicke $a \ll R$ mit gleichförmiger Wirbelstärke im Kern gelten die klassischen Formeln von Kelvin, bestätigt durch die Konsistenzbeziehung $U = E/(2P) + 3\Gamma/(8\pi R)$ [2, 3, 4]:

$$U = \frac{\Gamma}{4\pi R}\Big(\ln\frac{8R}{a} - \frac{1}{4}\Big)\,, \tag{174}$$

$$P = \pi\rho\Gamma R^2\,, \tag{175}$$

$$E = \frac{1}{2}\rho\Gamma^2 R\Big(\ln\frac{8R}{a} - \frac{7}{4}\Big)\,. \tag{176}$$

P ist der lineare Impuls längs der Ringachse, nicht ein Drehimpuls um den Mittelpunkt. Um seinen eigenen Schwerpunkt hat ein kreisrunder Ring den Drehimpuls Null.

Satz 4. Die Identität $U = E/(2P) + 3\Gamma/(8\pi R)$ ist mit (174) genau erfüllt.

C.3.2 Kompressibilität des Mediums

Setzt man $a = a_{\text{evac}}$ aus (173), so ist die Translations-Machzahl

$$\mathrm{Ma} = \frac{U}{c_{s\infty}} = \frac{a}{R}\,\frac{\Lambda}{\sqrt{2}}\,, \qquad \Lambda = \ln\frac{8R}{a} - \frac{1}{4}\,. \tag{177}$$

Zahlenwerte: $\mathrm{Ma} = 0{,}292$ bei $R/a = 10$, $0{,}171$ bei $R/a = 20$, $0{,}081$ bei $R/a = 50$ (Abbildung 26b). Die relative Korrektur an U und ω_m ist von der Ordnung Ma^2, also etwa acht Prozent beim dicksten hier betrachteten Ring und unter einem Prozent bei $R/a = 50$. Die Form des Spektrums, Abschnitt C.4, ändert sich in führender Ordnung nicht. Eine vollständige kompressible Stabilitätsanalyse der Widnall-Bänder ist damit nicht erledigt; die Existenz der Bänder selbst ist eine Eigenschaft des Dehnungsfeldes und bleibt erhalten.

Das Fernfeld eines Rings ist ein Dipol, $|u| \propto 1/r^3$. Mit (172) folgt ein Dichtedefizit $\delta\rho \propto -1/r^6$, kein Überschuss $\propto +1/r$. Das bestätigt die Schranke der Hof-Notiz und wird hier nicht neu hergeleitet.

C.4 Kelvin-Wellen und das Spektrum

C.4.1 Dispersion auf dem Ring

Die Mittellinie sei gegen den Kreis um eine Amplitude der azimutalen Wellenzahl m ausgelenkt. Weil der Faden geschlossen ist, ist m ganzzahlig. In der lokalen Induktionsnäherung [5, 6, 7] gilt für die Biegefrequenz

$$\omega_m = \frac{\Gamma}{4\pi R^2}\,\Lambda\, m\sqrt{m^2-1}\,, \qquad m = 1, 2, 3, \ldots \tag{178}$$

Der Mode $m = 1$ entspricht einer starren Verschiebung des Rings: $\omega_1 = 0$. Für $m \geq 2$ ist ω_m reell und die Mode in dieser Näherung oszillatorisch. Das Verhältnis zur Grundmode

$$\frac{\omega_m}{\omega_2} = \frac{m\sqrt{m^2-1}}{2\sqrt{3}} \tag{179}$$

hängt nicht von Γ, R, a, c oder ρ ab. Es ist eine reine Folge der Kinematik eines geschlossenen Fadens. Asymptotisch gilt $\omega_m \sim m^2$, wie bei einem Teilchen auf einem Ring, nicht wie $1/n^2$.

Satz 5 (Spektralform)**.** Die Verhältnisse ω_m/ω_2 sind parameterfrei. Keine Wahl der Ringgrößen erzeugt das Wasserstoffspektrum $|E_n/E_1| = 1/n^2$.

Die ersten Werte stehen in Tabelle 5 und in Abbildung 26c. Identifiziert man n mit m, so steigt das Biegeverhältnis, während das Wasserstoffverhältnis fällt.

Drei weitere, ebenfalls natürliche Ansätze ändern das Bild nicht. Quantisiert man die Zirkulation nach Onsager und Feynman, $\Gamma_n = n\kappa$, bei festem

Tabelle 5: Biegeverhältnisse gegen das Wasserstoffspektrum, wenn man $n = m$ setzt. $|E_m/E_2|_{\mathrm{H}} = (2/m)^2$.

m	ω_m/ω_2	$m^2/(2\sqrt{3})$	$\lvert E_m/E_2\rvert_{\mathrm{H}}$
2	1,000	1,155	1,000
3	2,449	2,598	0,444
4	4,472	4,619	0,250
5	7,071	7,217	0,160
6	10,247	10,392	0,111
8	18,330	18,475	0,063
10	28,723	28,868	0,040

R, so wächst die Ringenergie $E \propto \Gamma^2$ wie n^2 und ist positiv. Die Wasserstoffbindung ist negativ und fällt wie $1/n^2$ (Abbildung 26d). Hält man Γ fest und setzt die Radien $R_n = nR_1$ (Schlussbedingung bei fester Wellenlänge), so skaliert die Biegefrequenz der Mode $m = 2$ wie $\Lambda(R_n)/R_n^2$. Bei $R_1/a = 10$ ergibt das die Folge 1, $0{,}292$, $0{,}141$, $0{,}083$, $0{,}056$, $0{,}040$, numerisch in der Nähe von $1/n^2$, aber es ist die Frequenz einer Biegewelle auf Ringen verschiedener Größe, nicht eine Bindungsenergie, und der Logarithmus verhindert die genaue Folge. Setzt man stattdessen die Bohr-Radien $R_n = n^2 R_1$ ein, so fällt dieselbe Frequenz wie Λ/n^4, also viel steiler als $1/n^2$ ($0{,}083$ statt $0{,}250$ bereits bei $n = 2$).

Die Entartung einer Mode $|m| \geq 2$ ist zwei (zwei Umlaufsinn) oder vier, zählt man beide Polarisationen. Das Wasserstoffatom hat ohne Spin die Entartung n^2 und mit Spin $2n^2$. Eine Folge $1, 4, 9, 16$ entsteht aus den Ringmoden nicht.

C.4.2 Widnall-Stabilität

Die lokale Induktion erfasst lange Wellen. Kurze Wellen sehen das Dehnungsfeld, das der Ring auf sich selbst ausübt, und können instabil sein: die Widnall-Instabilität [8, 9, 10]. Für einen Kern konstanter Wirbelstärke liegen die kritischen Wellenzahlen bei $ka \simeq 2{,}5$ und $ka \simeq 4{,}35$. Die zugehörigen ganzzahligen m sind

$$m_\star \simeq 2{,}5\,\frac{R}{a} \qquad \text{und} \qquad m_\star \simeq 4{,}35\,\frac{R}{a}\,. \tag{180}$$

Bei $R/a = 10$ also $m \simeq 25$ und 44; bei $R/a = 20$ schon $m \simeq 50$ und 87. Die niedrigen Moden $m = 2, 3, 4$, die man mit den ersten Quantenzahlen vergleichen möchte, liegen tief im LIA-stabilen Bereich (Abbildung 27). Instabil sind kurze Kräuselungen der Kerngröße, nicht die groben stehenden Wellen vom Typ $n = 1, 2, 3$.

Bemerkung 5 (Gezeigt). Ganzzahligkeit von m folgt aus dem Schluss des Fadens. Die niedrigen m sind LIA-stabil. Ihr Frequenzverhältnis ist nicht das Wasserstoffspektrum.




Abbildung 26: (a) Dichte am Linienwirbel. Innen setzt die Verdünnung bei a_{evac} eine natürliche Kerndicke. Gezeichnet ist die frühere Form $1 - (a_{\mathrm{evac}}/s)^2$; mit $\Delta p = c^2\Delta\rho$ gilt $e^{-(a_{\mathrm{evac}}/s)^2}$, gleich für $s \gg a_{\mathrm{evac}}$, innen ohne harte Nullstelle. (b) Translations-Machzahl eines Rings mit $a = a_{\mathrm{evac}}$. (c) Biegeverhältnisse gegen $|E_m/E_2|$ des Wasserstoffs. (d) Ringenergie bei quantisierter Zirkulation (wachsend), Wasserstoffbindung (fallend) und Biegefrequenz bei $R \propto n$.




Abbildung 27: Ganzzahlige azimutale Wellenzahlen und die Widnall-Bänder $ka = 2{,}5$ und $ka = 4{,}35$. Der grüne Bereich markiert grob die langen, in der lokalen Induktion stabilen Wellen $m \ll R/a$.

C.5 Torusknoten und ihre Schatten

C.5.1 Metastabilität

Ein Torusknoten $T(p, q)$ umläuft den Torus p-mal in Längsrichtung und q-mal meridional; er ist ein Knoten, wenn p und q teilerfremd sind. $T(2, 3)$ ist der Kleeblattknoten, $T(2, 5)$ der Fünfknoten; $T(3, 2)$ ist derselbe Knotentyp wie $T(2, 3)$, aber als Einbettung auf dem Torus vertauscht. Der Achterknoten 4_1 ist kein Torusknoten.

Kelvin hat verknotete Wirbelatome vermutet [2]. Die zeitliche Entwicklung dünner Torusknoten haben Ricca, Samuels und Barenghi unter der lokalen Induktion und unter dem Biot-Savart-Gesetz gerechnet [11]. Unter der lokalen Induktion bleibt ein Knoten mit Windungszahl $w = q/p > 1$ längere Zeit formstabil und wandert längs seiner Achse; bei $w < 1$ faltet er sich alsbald auf. Damit ist die Einbettung $T(2, 3)$ ($w = 3/2$) LIA-metastabil, die dazu isotope Einbettung $T(3, 2)$ ($w = 2/3$) LIA-instabil — obwohl beide denselben Knotentyp beschreiben. Unter Biot-Savart leben auch die LIA-instabilen Einbettungen merklich länger. Kleckner und Irvine haben Kleeblatt und Achterknoten im Wasser erzeugt: sie halten einige Umlaufzeiten und zerfallen dann durch Rekombination zu unverknoteten Ringen [13]. Diese Rekombination verlangt Viskosität. Im idealen Medium bleibt die Verschlingung erhalten [16]; zugelassen sind nur überschneidungsfreie Einbet-

tungen. Eine Faltung ohne Selbstschnitt, wie sie die lokale Induktion bei $w < 1$ zeigt, verletzt das nicht. Eine spätere lineare Analyse der lokalen Induktion verfeinert das Stabilitätskriterium, ändert aber nicht das qualitative Bild: freie Wirbelknoten sind höchstens formmetastabil [12].

Für stationäre Atomzustände reicht das im freien Medium nicht. Frage: Kann ein zentraler Ansatz — der Gleichgewichtshof oder eine Coulomb-Kraft — einen Knoten auf einer Schale festhalten? Antwort: Gemessen sind stationäre Atomzustände; der Grundzustand des Wasserstoffs zerfällt nicht, und seine $1S$–$2S$-Linie ist auf 10^{-15} scharf. Diese Stationarität trägt im Medium nicht ein freier Knoten, sondern die gebundene stehende Welle zwischen Wirbelwänden: Unterhalb der Grenzfrequenz fällt sie außen exponentiell ab und strahlt nicht (Anhang E).

C.5.2 Projektionen und Lappenzahl

Abbildung 28 zeigt Unknoten, $T(2,3)$, $T(3,2)$, $T(2,5)$ und den Achterknoten sowie Aufsicht und Seitenriss eines Schlauchs um die Mittellinie. Die dominante azimutale Fourier-Mode m_φ der Mittellinien-Aufsicht ist

$$m_\varphi = \begin{cases} 0 & \text{Unknoten (Kreis), } T(3,2)\text{, Achterknoten,} \\ 3 & T(2,3) \quad (50\,\% \text{ der spektralen Leistung),} \\ 5 & T(2,5) \quad (83\,\% \text{ der spektralen Leistung).} \end{cases} \tag{181}$$

Der Seitenriss des geschlauchten Unknotens, also der klassische Torus von der Seite, hat $m_\varphi = 2$: zwei verdickte Enden, verbunden durch den oberen und unteren Rand.

Reelle Orbitale haben in der Äquatorebene $2|m|$ Lappen, weil $\cos^2(m\varphi)$ $2|m|$ Maxima besitzt: s keines, p_x und p_y zwei, d_{xy} und $d_{x^2-y^2}$ vier. Eine ungerade Lappenzahl 3 oder 5 kommt unter s, p und d nicht vor. Sie würde erst bei f ($\ell = 3$, $|m| = 3$: sechs Lappen) bzw. bei $\ell \geq 5$ auftreten, und auch dort ist $2|m|$ gerade. Der dreizählige Schatten des Kleeblatts ist deshalb kein Wasserstofforbital.

C.5.3 Quantitatives Ähnlichkeitsmaß

Als Maß dient die Kosinusähnlichkeit zweier Grauwertbilder, $\langle A, B\rangle/(\|A\|\|B\|)$, nach Einbetten in dasselbe Raster. A ist der Schatten des geschlauchten Fadens, B die Säulendichte von $|\psi|^2$ des jeweiligen Wasserstofforbitals ($1s$, $2p_z$, $2p_x$, $3d_{z^2}$, $3d_{xy}$, $3d_{x^2-y^2}$). Über 24 Drehwinkel in der Bildebene wird das Maximum genommen. Ergänzend wird die Winkelverteilung des Fadens auf der Kugel mit dem reinen Winkelanteil $|Y|^2$ verglichen.

Abbildung 29 zeigt die Matrizen. Drei Befunde sind eindeutig.

Erstens: kein Eintrag erreicht eine eindeutige, isolierte Ähnlichkeit nahe eins. Die Werte der Aufsicht liegen zwischen $0{,}29$ und $0{,}79$; mehrere Knoten




Abbildung 28: Wirbelfäden als Schlauch. Die angegebenen m_φ sind die dominante azimutale Fourier-Mode der Aufsicht (Mittellinie) bzw. des Seitenrisses (Schlauch). $T(2,3)$ ist dreizählig, $T(2,5)$ fünfzählig; der Unknoten von der Seite hat zwei Enden.

erzielen an demselben Orbital fast dieselbe Zahl. Eine Zuordnung „dieser Knoten ist dieses Orbital“ trägt das Maß nicht.

Zweitens: die Vierblattorbitale $3d_{xy}$ und $3d_{x^2-y^2}$ schneiden in der Aufsicht durchweg schlechter ab (etwa $0{,}39$ bis $0{,}44$) als die p-artigen oder $3d_{z^2}$. Gerade das Muster, das man einem „d-artigen“ Knoten zuschreiben möchte, wird von keinem der gerechneten Fäden getroffen. Abbildung 29c,d stellt den ringartigen Schatten von $T(3,2)$ neben das Vierblatt von $3d_{xy}$.

Drittens: der Unknoten in der Aufsicht ist ein Kreisring. Seine Ähnlichkeit zu $1s$ ist die kleinste der ganzen Tafel ($0{,}29$), weil $1s$ im Ursprung maximal ist und der Ring dort ein Loch hat. Zum doughnutartigen $2p_x$ (Blick entlang z) ist sie höher ($0{,}60$), bleibt aber mäßig. Auf der Kugel ist der Unknoten ein Äquatorgürtel: die Überlappung mit p_z ($\propto \cos^2\theta$) verschwindet numerisch ($2\cdot10^{-4}$), die mit s beträgt nur $0{,}17$. Ein Ring ist das Gegenteil eines s-Orbitals und das Gegenteil von p_z.

Der Seitenriss des Unknotens ist eine Kapsel mit zwei runden Enden (Abbildung 30). Das teilt mit $2p_x$ die Zweizähligkeit. Es unterscheidet sich durch den Steg in der Mitte: beim Ring ist das die obere und untere Wandung des Torus, bei p_x liegt dort eine Knotenfläche. Die beiden Unterdruckaugen, also die Wirbelkerne selbst, säßen in einem Meridianschnitt als zwei Punkte bei $\pm R$ — näher an zwei Lappen, aber ohne die Knotenfläche des p-Orbitals und in der Äquatorebene, nicht längs z.

C.5.4 Was die Abbildung nicht liefert

Ein s-Orbital ist kugelsymmetrisch, hat Drehimpuls Null und maximale Dichte am Kern. Ein Wirbelring hat seine Wirbelstärke auf einem Kreis, einen linearen Impuls $P = \pi\rho\Gamma R^2$ längs der Achse und um seinen Mittelpunkt den Drehimpuls Null — das ist nicht dasselbe wie $\ell = 0$. Hills Kugelwirbel käme einem ausgefüllten s-Klumpen näher, wandert aber ebenfalls und besitzt außen ein Dipolfeld, kein Coulomb-Feld.

Die Zahl der Orbitale pro Schale ist $2\ell+1$, mit Spin $2(2\ell+1)$. Die Familie $T(p,q)$ liefert keine Folge $1,3,5$ oder $2,8,18$. Zwei Vorzeichen der Zirkulation, Γ und $-\Gamma$, geben zwei Zustände und erinnern grob an eine Verdopplung; sie erklären weder den halbzahligen Spin noch das Pauli-Prinzip noch, warum die Verdopplung zusätzlich zu $2\ell+1$ räumlichen Orbitalen gilt.

Bemerkung 6 (Gezeigt). $T(2,3)$ und $T(2,5)$ haben in der Aufsicht drei- bzw. fünfzählige Symmetrie. Reelle s-, p- und d-Orbitale haben gerade Lappenzahl $2|m|$. Das Ähnlichkeitsmaß ordnet keinen Knoten eindeutig einem Orbital zu.

C.6 Stehende Wellen und die Bohr-Energien

Eine Saite der Länge L mit festen Enden trägt die stehenden Wellen

$$\lambda_n = \frac{2L}{n}, \qquad f_n = \frac{nc}{2L}, \qquad n = 1,2,3,\dots \tag{182}$$




Abbildung 29: Kosinusähnlichkeit der Schatten mit den Säulendichten der reellen Orbitale, maximiert über die Drehung in der Bildebene. (a) Aufsicht. (b) Seitenriss. (c,d) $T(3,2)$ gegen $3d_{xy}$: der Schatten ist ein Ringband, das Orbital ein Vierblatt.




Abbildung 30: Seitenriss des Unknotens (geschlaucht) neben $2p_x$ und $2p_z$. Die Zweizähligkeit ist gemeinsam, die Knotenfläche von p fehlt dem Torus.

Sie hat $n-1$ innere Knoten. Das ist das Bild der Skizze mit den Moden $n = 1, 2, 3$: die Form entsteht aus der Zahl der Knoten, genau wie bei einer stehenden Welle. Auf einem geschlossenen Ring vom Umfang $L = 2\pi R$ verlangt die Periodizität volle Wellenlängen,

$$2\pi R = n\lambda = \frac{nh}{p} \qquad \Rightarrow \qquad p = \frac{n\hbar}{R} \qquad \Rightarrow \qquad L_{\text{ang}} = Rp = n\hbar\,. \tag{183}$$

Das ist Bohrs Quantisierung des Drehimpulses.

Zusammen mit einer anziehenden Zentralkraft $mv^2/R = k/R^2$ (Coulomb) folgt daraus das bekannte Ergebnis

$$R_n = \frac{n^2\hbar^2}{mk}\,, \qquad E_n = \frac{mv^2}{2} - \frac{k}{R} = -\frac{mk^2}{2n^2\hbar^2}\,. \tag{184}$$

Die Bindungsenergien gehen wie $-1/n^2$. Das ist algebraisch geprüft und in Abbildung 31c gezeichnet.

Satz 6 (Bohr)**.** Schlussbedingung $2\pi R = n\lambda$ und Coulomb-Kraft $\propto 1/r^2$ erzeugen $E_n \propto -1/n^2$. Ohne die Coulomb-Kraft tut es die Schlussbedingung nicht.

Bemerkung 7 (Eingesetzt und gemessen). Die Coulomb-Kraft ist hier ein Input; sie ist gemessen. In der Hof-Notiz ist das Gegenstück der Gleichgewichtshof, im lokalen Medium $\rho = \rho_\infty e^{GM/(rc^2)}$, in der dichten Phase $\delta\rho = GM/(2Kr)$; er folgt aus $\Delta p = c^2\Delta\rho$ und dem Gewicht des Mediums [1]. Für die elektrische Kraft tritt an seine Stelle eine Ladung mit Vorzeichen. Ihre Herkunft im Medium beantworten zwei Anhänge: Das bindende $1/r$ des Wasserstoffs liefert das Wandprofil des Wellenleiters (Anhang E), die Kraft $\propto 1/d^2$ zwischen zwei Zonen die Bjerknes-Kraft pulsierender Zonen (Anhang F).

Zwei Frequenzen darf man nicht vermengen. Die Transversalschwingung einer mechanischen Saite geht wie n, die Kelvin-Biegewelle wie $n\sqrt{n^2-1}$. Die Bohr-Energie ist die Energie eines Teilchens auf der Bahn, nicht die Energie einer Welle der Bahn. Passt — unter dem Coulomb-Ansatz — ist die Schlussbedingung als stehende de-Broglie-Welle, wie Bohr sie benutzt hat. Das ist das Bohrsche Atommodell, nicht das Schrödinger-Orbital.




Abbildung 31: (a) Stehende Wellen einer Saite, $n = 1, 2, 3$. (b) Dieselbe Quantenzahl als Schlussbedingung $2\pi R = n\lambda$ auf dem Ring. (c) Bohr-Energien bei gegebener Coulomb-Kraft. (d) Radiale Dichten $r^2 R_{n0}^2$ von $1s$, $2s$, $3s$ mit den Knoten bei $2a_0$ sowie bei $1{,}90a_0$ und $7{,}10a_0$.

C.7 Radiale Knoten

Die Wasserstoff-Radialfunktionen haben $n-\ell-1$ Nullstellen. Insbesondere

$$\begin{aligned} 1s:&\quad \text{keine},\\ 2s:&\quad r = 2a_0\,,\\ 3s:&\quad r = \frac{9\pm 3\sqrt{3}}{2}\,a_0 \approx 1{,}902a_0 \text{ und } 7{,}098a_0\,. \end{aligned} \tag{185}$$

Das sind Kugelflächen, auf denen ψ verschwindet (Abbildung 31d und Abbildung 32b).

Geschachtelte Wirbelringe in einer Ebene markieren Kreise, keine Kugeln (Abbildung 32a). Selbst als grobes Bild „mehrere Schalen“ fehlt ihnen die Stationarität. Zwei koaxiale Ringe derselben Zirkulation durchspringen einander (Leapfrogging, Helmholtz), ohne dass sich die Fäden schneiden: jeder Ring passiert die Öffnung des anderen. Die gegenseitige Achsgeschwindigkeit im Abstand $d = R$ ist $u = \Gamma R^2/\big(2(R^2+d^2)^{3/2}\big) = \Gamma/(4\sqrt{2}\,R)$, die zugehörige Zeit $T \sim 4\sqrt{2}\,R^2/\Gamma$. Identifiziert man Γ mit dem Zirkulationsquantum h/m_e und R mit a_0, so ist

$$\frac{T_{\text{leap}}}{T_{\text{Bohr}}} = \frac{\sqrt{2}}{\pi^2} \approx 0{,}143\,. \tag{186}$$

Die Ringe bewegen sich also auf der Zeitskala der Bahn selbst. Ein stationärer $2s$- oder $3s$-Zustand entsteht daraus nicht. Gegenläufige Zirkulation ändert die Dynamik, liefert aber, wie in Abschnitt C.9 gerechnet, keinen stillen Abstand; ein viskoser Zusammenstoß mit Rekombination ist im idealen Medium ausgeschlossen. Weder die Nullstellen der Laguerre-Funktionen noch die Amplituden $R_{n\ell}(r)$ folgen daraus.

Man kann Schalen von Hand so setzen, dass ihre Zahl zu $n-\ell-1$ passt. Das ist kein Ergebnis der Euler-Dynamik.

C.7.1 Atmosphäre der Schleife und überlappende Hüllen

Jede Schleife trägt im Medium eine Atmosphäre: das Dichteprofil (173) fällt zur dünnen Kernwand hin ab wie $e^{-(a_{\text{evac}}/s)^2}$. Eine glatte Regularisierung (Rosenhead-Kern der Breite a_{evac}, nah verwandt mit einer Lamb-Oseen-Hülle) macht Geschwindigkeit und Dichte endlich, ohne das Fernfeld zu ändern. Die Atmosphäre wird zu den “Wänden” des Wirbelauges dünner, nach außen hin erholt sich ρ gegen ρ_∞.

Setzt man geschachtelte Ringe auf die Maxima von P_{2s} und P_{3s} ($r = (3\pm\sqrt{5})a_0 \approx 0{,}76a_0$ und $5{,}24a_0$ bzw. etwa $0{,}74a_0$, $4{,}19a_0$ und $13{,}1a_0$) und überlagert die regularisierten Biot-Savart-Felder in der Äquatorebene, so erzeugt Bernoulli ein Defizit $|\delta\rho| \propto u^2$. Zwischen den Schleifen können sich die Achsgeschwindigkeiten gegenseitig aufheben; dort entsteht ein Minimum von

$|\delta\rho|$ (Abbildung 33b,c). Für $a_{\text{evac}} = 0{,}25a_0$ liegt dieses Tal beim $2s$-Paar bei etwa $1{,}14a_0$, nicht am Knoten $r = 2a_0$. Bei $3s$ liegen die Täler bei etwa $1{,}02a_0$ und $5{,}90a_0$, die Knoten bei $1{,}90a_0$ und $7{,}10a_0$.

Ein solches Hüllenminimum ist kein Knoten. Die Nullstellen von R_{n0} sind exakte Nullen der Wellenfunktion aus destruktiver Interferenz, und sie gelten auf ganzen Kugelflächen. Das Defizitminimum ist ein Fließpunkt der klassischen Überlagerung, sitzt an der falschen Stelle und ist in der Äquatorebene definiert, nicht auf einer Sphäre. Nur wenn die Schalen weit getrennt sind, fällt $|\delta\rho|$ dazwischen fast auf null — das ist das Wiedererreichen von ρ_∞, keine Interferenznull.

Bemerkung 8 (Gezeigt). Die radialen Knotenlagen (185) folgen nicht aus geschachtelten Ringen. Ringe gleichen Vorzeichens sind nicht stationär (Leapfrogging ohne Fadendurchdringung). Gegenläufige Paare haben keinen Gleichgewichtsabstand (Abschnitt C.9). Überlappende Atmosphären erzeugen Defizitminima, aber keine Laguerre-Nullstellen.




Abbildung 32: (a) Geschachtelte Ringe in der Äquatorebene: Kreise, deren Radien frei gewählt sind. (b) Meridianschnitt durch die Kugelflächen, auf denen R_{n0} verschwindet. Der innere $3s$-Knoten bei $1{,}90a_0$ liegt dicht am $2s$-Knoten bei $2a_0$; der äußere sitzt bei $7{,}10a_0$.

C.8 Der Hillsche Kugelwirbel als s-Kandidat

C.8.1 Konstruktion

Hills kugelförmiger Wirbel [17] ist das dicke Ende der Norbury-Familie stetiger Wirbelringe [18]: im Innern einer Kugel vom Radius a gilt $\omega_\varphi = A\varpi$




Abbildung 33: (a) Radiale Dichte P_{1s} im Vergleich mit der Atmosphäre eines Rings bei $R = a_0$. Das Maximum liegt bei a_0, die Wolke hat die Streuung $\sigma \approx 0{,}87a_0$; ein fester Abstand existiert nicht. (b) P_{2s} und das überlagerte Defizit zweier Hüllen auf den $2s$-Maxima ($a_{\mathrm{evac}} = 0{,}25a_0$). Der exakte Knoten sitzt bei $2a_0$, das Hüllenminimum bei etwa $1{,}14a_0$. (c) Dasselbe für $3s$: Knoten bei $1{,}90a_0$ und $7{,}10a_0$, Täler des Defizits bei etwa $1{,}02a_0$ und $5{,}90a_0$. Ein Hüllenminimum ist keine Interferenznull.

mit konstantem A, außen ist die Strömung wirbelfrei. Im Ruhesystem des Wirbels strömt das Medium im Unendlichen mit $-U\,\hat{z}$. Innen

$$u_r = \tfrac{3}{2}U\Big(1-\frac{r^2}{a^2}\Big)\cos\theta\,, \qquad u_\theta = \tfrac{3}{2}U\Big(\frac{2r^2}{a^2}-1\Big)\sin\theta\,, \tag{187}$$

außen das Dipolfeld einer Kugel,

$$u_r = -U\Big(1-\frac{a^3}{r^3}\Big)\cos\theta\,, \qquad u_\theta = U\Big(1+\frac{a^3}{2r^3}\Big)\sin\theta\,. \tag{188}$$

Am Rand $r=a$ verschwindet u_r, und u_θ ist stetig. Im Zentrum ist $u=+\frac{3}{2}U\,\hat{z}$, am Oberflächenäquator $u=-\frac{3}{2}U\,\hat{z}$: die Innenströmung läuft also der äußeren Anströmung entgegen und schließt sich zu toroidalen Stromlinien (Abbildung 34a). Die Stokes-Stromfunktion im Innern ist $\psi=\frac{3}{4}U\varpi^2(1-r^2/a^2)$. Aus $\omega_\varphi=\partial_\varpi u_z-\partial_z u_\varpi$ folgt $A=15U/(2a^2)$. Die Zirkulation durch eine Meridianhalbkreisscheibe, der Impuls und die Energie sind

$$\Gamma = 5Ua\,, \qquad P = 2\pi\rho U a^3\,, \qquad E = \frac{10\pi}{7}\,\rho U^2 a^3\,. \tag{189}$$

Bei festem Γ ist $U=\Gamma/(5a)$ und damit $E=(2\pi/35)\,\rho\Gamma^2 a$: die Energie wächst linear mit dem Kugelradius (Abbildung 34d).

Die Begrenzungsfläche ist eine Kugel. Das Strömungsfeld selbst hat eine ausgezeichnete Achse — die Translationsrichtung — und ist nur achsensymmetrisch, nicht kugelsymmetrisch. Eine Vorzugsrichtung fehlt also nicht; was kugelförmig ist, ist der Rand, nicht die Strömung. Die Wirbellinien im Innern sind koaxiale Kreise (verschachtelt, ohne Schnitt). Das ist mit der Helmholtz–Kelvin-Bedingung aus Abschnitt C.2 verträglich.

C.8.2 Druck- und Dichtefeld im Medium

Außen kommen alle Stromlinien aus dem Unendlichen, daher $H = h + |u|^2/2 = H_\infty = h_\infty + U^2/2$. Innen gilt die Bragg-Hawthorne-Beziehung $\omega_\varphi = \varpi\,\mathrm{d}H/\mathrm{d}\psi$, also $\mathrm{d}H/\mathrm{d}\psi = A$ und $H = H_\infty + A\psi$. Mit $h = c^2\ln(\rho/\rho_\infty)$ folgt

$$\ln\frac{\rho}{\rho_\infty} = \frac{U^2-|u|^2+2A\psi}{2c^2}\,. \tag{190}$$

Sei $f = 2c^2\ln(\rho/\rho_\infty)/U^2$ (in erster Ordnung $2c^2(\rho-\rho_\infty)/(\rho_\infty U^2)$), $\xi = r^2/a^2$ und $s=\sin^2\theta$. SymPy bestätigt die geschlossene Form $f = 1-\frac{9}{4}\big[(1-\xi)^2+s\,\xi(3\xi-2)\big]+\frac{45}{4}\xi s(1-\xi)$ und ihre Extremwerte

$$\begin{aligned} f(\text{Zentrum}) &= -\tfrac{5}{4}\,,\\ f(r=a/\sqrt{2},\,\theta=\pi/2) &= +\tfrac{61}{16}\,,\\ f(\text{Oberflächenäquator}) &= -\tfrac{5}{4}\,,\\ f(\text{Pole}) &= +1\,. \end{aligned} \tag{191}$$

Es gibt also ein zentrales Druck- und Dichteminimum, und ein gleich tiefes Minimum auf dem Äquator der Kugelfläche. Der innere Stauring bei $r = a/\sqrt{2}$ in der Äquatorebene — dort verschwindet die Geschwindigkeit — ist ein Druckmaximum, kein Minimum (Abbildung 34b,c). Der hohe Wert kommt vom erhöhten Bernoulli-Niveau $A\psi > 0$ auf den inneren geschlossenen Stromlinien, nicht von einer großen Geschwindigkeit.

Ein Ringminimum im Innern liegt damit nicht vor. Das zentrale Minimum existiert; es ist aber nicht tiefer als das auf der Äquatorfläche, und das gesamte Feld f ist nur achsensymmetrisch. Ein $1s$-Zustand hat sein einziges Maximum der Aufenthaltsdichte am Kern und ist kugelsymmetrisch. Beides trifft hier nicht zu.

C.8.3 Kompressibilität

Mit (191) und $\mathrm{Ma} = U/c$ ist die Dichte am Zentrum wie am Oberflächenäquator $\rho = \rho_\infty e^{-(5/8)\mathrm{Ma}^2}$, in erster Ordnung $\delta\rho = -(5/8)\rho_\infty \mathrm{Ma}^2$. Ein leeres Auge gibt es mit $\Delta p = c^2\Delta\rho$ nicht. Auf ρ_∞/e fällt die Dichte bei

$$\mathrm{Ma} = \sqrt{8/5} \approx 1{,}265\,. \tag{192}$$

(Mit dem früheren Phasengesetz war das die Schwelle zu $\rho = 0$.) Ein stark verdünntes Auge wäre also überschallnah. Bei kleiner Machzahl ist die Delle nur von der Ordnung Ma^2, ein seichtes Minimum, keine evakuierte Höhle. Die inkompressible Hill-Lösung erfüllt $\nabla \cdot u = 0$, nicht aber $\nabla \cdot (\rho u) = 0$, sobald ρ über (190) vom Ort abhängt. Es sind Korrekturen der Ordnung Ma^2 an der Geschwindigkeit nötig. Eine geschlossene kompressible Hill-Lösung wird hier nicht behauptet.

C.8.4 Ist der Radius quantisiert?

Hills Konstruktion selbst zeichnet keinen Radius aus: a ist ein freier Parameter. Zirkulationsquantisierung $\Gamma_n = n\kappa$ allein fixiert a nicht, weil $U = \Gamma/(5a)$ mitlaufen kann. Erst eine zusätzliche Festlegung von U oder von $\mathrm{Ma} = U/c_s$ (etwa die Schwelle (192)) liefert

$$a_n = \frac{n\kappa}{5U} \propto n\,, \tag{193}$$

nicht $a_n \propto n^2$. Das n^2-Gesetz der Bohr-Radien kommt hier nicht heraus; es würde eine weitere Relation vom Typ der Coulomb-Kraft verlangen, und die ist — wie in Abschnitt C.6 — gemessen und eingesetzt, nicht aus dem Hill-Feld gewonnen; das n^2-Gesetz der Radien liefert der Wellenleiter mit $a_n \propto n^2 a$ (Anhang E). Bei festem Γ gibt es kein Energieminimum in a (Abbildung 34d).

C.8.5 Translation und Kern

Im Laborsystem wandert der ganze Wirbel mit der Geschwindigkeit U. $U = 0$ erzwingt $\Gamma = 5Ua = 0$ und ist der triviale, wirbelfreie Zustand. Ein translierender Hill-Wirbel sitzt daher nicht von selbst an einem Kern. Ihn dort festzuhalten, erfordert eine äußere Bindung, die den Impuls $P = 2\pi\rho U a^3$ aufhebt. Ein kugelsymmetrisches Kerndruckfeld zeichnet keine Achse aus und liefert diese Bindung nicht von allein. Ohne einen solchen Halt ist der Hill-Wirbel kein stationärer s-Zustand am Kern. Gemessen ist der s-Zustand als kugelsymmetrische, ruhende Verteilung um den Kern; das ist die kugelsymmetrische stehende Welle des Wellenleiters (Anhang E), nicht ein translierender Wirbel.

C.8.6 Stabilität

Die Stabilität gegen Störungen rechnen wir nicht neu aus; sie ist in der Literatur ehrlich und vollständig genug dokumentiert. Moffatt und Moore untersuchen achsensymmetrische Störungen [19]: die Störung wird zum hinteren Staupunkt gefegt. Ist die Anfangsstörung prolat, so wird ein Volumenanteil $\frac{3}{5}\varepsilon$ als dünner Stachel aus dem Heck abgegeben (Detrainment); ist sie oblat, so wird wirbelfreies Medium am Heck aufgenommen (Entrainment). Überall außer in einer schrumpfenden Umgebung des hinteren Staupunkts klingt die Störung ab — dort wächst sie unbegrenzt. Das ist mit einem Energieargument von Benjamin verträglich, erhält aber die kugelförmige Identität nicht. Pozrikidis verfolgt die nichtlineare achsensymmetrische Entwicklung [20].

Gegen nicht-achsensymmetrische Störungen ist der Wirbel ebenfalls nicht formstabil. Fukuyu, Ruzi und Kanai finden für die Mode $m = 2$ einen heckwärtigen Stachel [21]. Rozi untersucht $m = 0, 2, 3, 4$: es bilden sich m Stacheln am Heck, deren Wachstum grob wie $e^{\alpha m t}$ geht [22]. Der Hill-Wirbel ist damit kein dauerhafter gebundener s-Zustand. Der Heckstachel verformt die materielle Wirbeloberfläche; im idealen Medium durchschneiden einander die Wirbellinien dabei nicht.

Bemerkung 9 (Gezeigt). Der Hill-Wirbel im Medium hat ein zentrales Dichteminimum gleicher Tiefe wie das auf dem Oberflächenäquator; der innere Stauring ist ein Maximum. Bei festem Γ gilt $E \propto a$, ein ausgezeichneter Radius folgt nicht. Mit $\Gamma_n = n\kappa$ und festem U oder Ma wäre $a_n \propto n$, nicht n^2. Der Wirbel transliert, hat eine ausgezeichnete Achse und bleibt nach den genannten Arbeiten nicht kugelförmig. Als s-Zustand scheidet er aus. Das s-artige Gebilde ist die radiale s-Welle zwischen Wirbelwänden: Sie ist kugelsymmetrisch, ruht am Kern und hat Knoten bei $2a$ bzw. $1{,}902a$ und $7{,}098a$, wie die gemessene Knotenstruktur (Anhang E).




Abbildung 34: (a) Stromlinien im Ruhesystem: innen geschlossen, außen das Dipolfeld einer angeströmten Kugel. Die orangen Punkte markieren den Stauring $r = a/\sqrt{2}$. (b) Dichtekontrast $4K(\rho - \rho_\infty)/U^2$: blau Minimum, rot Maximum. (c) Schnitte längs der Achse und längs des Äquators. Zentrum und Oberflächenäquator liegen gleich tief bei $-\frac{5}{4}$; der Stauring ist das Innenmaximum $+\frac{61}{16}$. (d) Energie bei festem Γ: $E \propto a$, kein stationärer Radius.

C.9 Gegenläufige Ringpaare

C.9.1 Dynamik zweier koaxialer Ringe

Zwei koaxiale Ringe gleicher Radien R und entgegengesetzter Zirkulation Γ und $-\Gamma$ sind das Bild eines Rings und seines Spiegelbilds an einer Ebene. Die Anordnung entscheidet über das Vorzeichen der Selbststeuerung: liegen die Orientierungen so, dass sich die Ringe nähern, so weiten sie sich und werden langsamer; liegen sie so, dass sie auseinanderlaufen, so engen sie sich und werden schneller (Abbildung 35a). Das ist das klassische Verhalten am Auftreffen auf eine Wand und braucht keine Rekombination.

Ein Gleichgewichtsabstand d verlangt gleichzeitig $\dot z = 0$ und $\dot R = 0$. Die vom Partner am Ort des anderen Rings induzierte Geschwindigkeit folgt aus dem Biot-Savart-Gesetz des Kreisfilaments (800 Azimutpunkte; auf der Achse trifft die Summe die geschlossene Formel $u_z = \Gamma R^2/\big[2(R^2+z^2)^{3/2}\big]$ bis auf einen Fehler unter 10^{-15}). Für gleiche Radien ist die induzierte Radialgeschwindigkeit u_R bei jedem endlichen Abstand positiv (Abbildung 35b): nähernde Ringe weiten sich stets. Zahlenwerte in Einheiten Γ/R: $u_R = 0{,}263$, $0{,}091$, $0{,}019$, $0{,}002$ bei $d/R = 1/2,\ 1,\ 2,\ 4$. Es gibt keine Nullstelle, also kein Radialgleichgewicht.

Die gegenseitige Achsgeschwindigkeit bleibt hinter der Kelvin-Selbststeuerung zurück. Mit $U_{\text{self}} = (\Gamma/4\pi R)(\ln(8R/a) - 1/4)$ gilt am kleinsten noch zulässigen Abstand $d = 2a$ (Kerne berühren sich)

$$
\begin{aligned}
R/a = 5{:}\quad & u_z^{\text{mut}}/(\Gamma/R) = 0{,}155 < U_{\text{self}}/(\Gamma/R) = 0{,}274\,, \\
R/a = 10{:}\quad & 0{,}213 < 0{,}329\,, \\
R/a = 20{:}\quad & 0{,}269 < 0{,}384\,, \\
R/a = 50{:}\quad & 0{,}342 < 0{,}457\,.
\end{aligned}
\tag{194}
$$

In der ganzen dünnen Theorie ($d \geq 2a$) gibt es keinen Schnitt (Abbildung 35c). Nähernde Paare laufen weiter aufeinander zu, während sie sich weiten; ein stiller Abstand existiert nicht. Beide Seiten der Bilanz $U_{\text{self}} = u_z^{\text{mut}}$ skalieren wie Γ/R. Ein etwaiger Quotient d/R hinge nur von R/a ab, nicht von Γ oder c. Eine Folge $d_n \propto n^2$ oder $d_n \propto n$ entsteht daraus nicht.

Im idealen Medium dürfen die Fäden einander nicht durchschneiden. Ein viskoser Kopf-auf-Kopf-Stoß mit Rekombination ist hier kein erlaubter Prozess. Die Ringe weiten sich wie am Spiegelbild einer Wand und weichen einander aus, ohne sich zu kreuzen. Leapfrogging zweier Ringe gleichen Vorzeichens bleibt zulässig: jeder Faden passiert die Öffnung des anderen, die Linien selbst schneiden sich nicht (Abschnitt C.7).

C.9.2 Zusätzliches Druckfeld eines Kerns

Der $1/r$-Gleichgewichtshof der begleitenden Notiz, $\delta\rho \simeq \rho_\infty GM/(c^2 r)$, erzeugt zum Kern hin höheren Druck [1]. Wirbelkerne sind im Medium unter-

dicht. Ein Unterdruckring wird daher wie eine Blase nach außen getrieben und zugleich geweitet. Bei einem nähernden Paar weiten sowohl die gegenseitige Induktion als auch dieser Auftrieb; die beiden Beiträge zu $\dot{R}$ haben dasselbe Vorzeichen und heben sich nicht auf. Ein gemeinsamer Fixpunkt (d, R) entsteht nicht.

Würde man die Ringe — entgegen der Bernoulli-Dichte — als überdicht lesen, so zöge der Hof sie zusammen ($\dot{R} < 0$) und zugleich aufeinander zu. Das könnte $\dot{R}$ kompensieren, verstärkte aber das Zulaufen in z. Auch dann gibt es kein gemeinsames Gleichgewicht. Ein von außen einschließender Druck, der nach außen hin zunähme, ist nicht der Hof eines Kerns; der Hof fällt nach außen ab, wie (130) zeigt.

C.9.3 Konzentrische, gegenläufige Ringe in einer Ebene

Zwei Ringe derselben Ebene mit Radien $R_1 < R_2$ und Zirkulation Γ und $-\Gamma$ haben in der Ringebene verschwindende Radialinduktion (das Biot-Savart-Feld eines Kreisfilaments steht dort rein axial). Die Radien ändern sich also gegenseitig nicht. Für die Achsgeschwindigkeiten bei $R/a = 10$ gilt: $\dot{z}_2$ des äußeren Rings ist für alle geprüften Verhältnisse $1{,}25 \le R_2/R_1 \le 5$ negativ (Summe zweier negativer Beiträge: die Selbststeuerung des äußeren Rings zeigt nach hinten, und er sitzt im Rückfluss des inneren). Ein Schweben $\dot{z}_2 = 0$ gibt es nicht (Abbildung 35d). Der innere Ring kann bei $R_2/R_1 \approx 1{,}93$ instantan ruhen, während der äußere mit $\dot{z}_2 \approx -0{,}22\,\Gamma/R_1$ weiterläuft. Ein gemeinsames $\dot{z}_1 = \dot{z}_2$ wird im geprüften Intervall nicht erreicht; der kleinste Unterschied liegt am Rand $R_2/R_1 = 1{,}25$ und beträgt noch $0{,}084\,\Gamma/R_1$. Eine stationäre geschachtelte Knotenfläche entsteht daraus nicht.

C.9.4 Bezug zu den radialen Knoten $n - \ell - 1$

Ohne einen stabilen Abstand und ohne eine stabile Schachtelung gibt es keine Folge d_n, die man mit den $n - \ell - 1$ Nullstellen der Laguerre-Funktionen identifizieren könnte. Die Wasserstoffknoten sind Kugelflächen, keine Kreise. Das mechanische Gegenstück zu den radialen Knoten sind die Knotenflächen der stehenden Druckwelle im Wellenleiter: Ihre $n - \ell - 1$ Kugelflächen kommen aus der radialen Wellengleichung (Anhang E). Gemessen sind diese Knotenflächen direkt in der Photoionisationsmikroskopie angeregter Wasserstoffatome (Stodolna und Kollegen, 2013).

Bemerkung 10 (Gezeigt). Gegenläufige koaxiale Ringe gleicher Radien haben keinen stillen Abstand $d(\Gamma, R, c)$. Nähernde Paare weiten sich, entfernende engen sich; u_R verschwindet nicht, und u_z^{mut} bleibt unter der Kelvin-Selbststeuerung. Ein Kernhof ändert das Vorzeichen nicht so, dass ein gemeinsamer Fixpunkt entstünde. Konzentrische gegenläufige Ringe in einer Ebene schweben nicht. Eine Folge $d_n \propto n^2$ oder $d_n \propto n$ tritt nicht auf.




Abbildung 35: (a) Qualitatives Bild: nähernde gegenläufige Ringe weiten sich und werden langsamer; entfernende engen sich und werden schneller. (b) Induzierte Radialgeschwindigkeit gleicher Radien: nirgends null. (c) Gegenseitige Achsgeschwindigkeit gegen die Kelvin-Selbststeuerung für $R/a = 5, 10, 20, 50$; kein Schnitt für $d \geq 2a$. (d) Koplanare gegenläufige Ringe, $R/a = 10$: $\dot{z}_2 < 0$ für alle geprüften Verhältnisse, kein gemeinsames Schweben.

C.10 Kugelsymmetrie, $2\ell+1$ und rundere Bahnen

Die Zahl der Orbitale pro Schale, $2\ell+1$, folgt aus der Kugelsymmetrie des Raums und wird hier als übernommen gekennzeichnet. Das Medium erzeugt sie, weil es um einen Kern kugelsymmetrisch geordnet ist: Der Hof (130) hängt nur von r ab, und die Wellengleichung in ihm hat deshalb die Lösungen $Y_{\ell m}$ mit $2\ell+1$ Einstellungen (Anhang E).

Das ist keine Lücke, die eine geschickte Zuordnung von Lappen zu Wirbeln schließen würde. Die Folge $1,3,5,\dots$ ist die Dimension der irreduziblen Darstellungen der Drehgruppe, sichtbar an den Kugelflächenfunktionen. Das Medium liefert sie in dieser Rechnung nicht.

C.10.1 Rundheit einer einzelnen Schleife

Eine naheliegende Erwartung ist, dass eine rundere Bahn um den Kern die Anordnung stabiler macht. Für eine einzelne ebene Schleife festen Flächeninhalts πR^2 (damit festen Impulsmaßstabs $P\sim\rho\Gamma R^2$) ist der Kreis die isoperimetrische Minimierer der Fadenlänge. Die Kelvin-Energie eines dünnen Rings folgt in führender Ordnung der Länge: setzt man in (174) den effektiven Radius $L/(2\pi)$ ein, so gilt bei $R/a=10$

$$\frac{E(\varepsilon)}{E(0)}\approx 1{,}005\ (\varepsilon=0{,}5),\quad 1{,}029\ (\varepsilon=0{,}7),\quad 1{,}182\ (\varepsilon=0{,}9), \tag{195}$$

wobei ε die lineare Exzentrizität der Ellipse ist. Der Kreis ist ein Energieminimum, aber ein seichtes: bis $\varepsilon\simeq 1/2$ liegt der Zuschlag unter einem Prozent. Kleine Exzentrizität wächst zudem nicht an. Sie ist die Kelvin-Mode $m=2$ und oszilliert in der lokalen Induktion; elliptische Ringe atmen periodisch um den Kreis [6, 7]. Gegen die kurzen Widnall-Wellen schützt Rundheit nicht: auch der Kreis hat die Bänder bei $ka\simeq 2{,}5$ und $4{,}35$.

Am anderen Ende der Norbury-Familie steht gerade der rundeste Fall, der Hill-Wirbel, und ist wegen des hinteren Staupunkts anfälliger für den Heckstachel als dünnere Glieder der Familie [19]. Runder ist hier nicht stabiler.

Ein qualitatives Argument liefert der Kernhof: ein unterdichter Faden wird nach außen getrieben, und zwar stärker, wo er dem Kern näher ist. Bei einer exzentrischen, den Kern umschließenden Schleife wächst der periapsisnahe Bogen schneller nach außen als der ferne; das vermindert die Exzentrizität. Das ist eine Vorzeichenüberlegung, keine gerechnete Wachstumsrate, und sie setzt den Hof voraus.

Ein zweites, verwandtes Kriterium lautet: in einem sehr stabilen Atom sei der Abstand zum Kern stets derselbe — kreisförmige Schleifen festen Radius. Als Forderung an einen gebundenen Zustand ist das verständlich, und im Bohr-Modell ist es erfüllt ($r_n=n^2a_0$). Das wirkliche Wasserstoffatom

hat diese scharfe Schale nicht. Die radiale Dichte des Grundzustands ist

$$P_{1s}(r) = \frac{4r^2}{a_0^3}\, e^{-2r/a_0}\,. \tag{196}$$

Ihr Maximum liegt bei $r = a_0$, der Mittelwert ist $\langle r\rangle = \frac{3}{2}a_0$, die Streuung $\sigma = \sqrt{\langle r^2\rangle - \langle r\rangle^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}a_0 \approx 0{,}866\,a_0$, also $\sigma/\langle r\rangle \approx 0{,}58$. Die halbe Höhe von P_{1s} reicht von etwa $0{,}38\,a_0$ bis $2{,}08\,a_0$. Der häufigste Abstand stimmt mit Bohr überein; ein fester Radius liegt nicht vor (Abbildung 33a). Eine dünne Wirbelschleife bei $R = a_0$ mit $a_{\text{evac}} = 0{,}25\,a_0$ ist merklich schmaler als diese Wolke. Macht man die Atmosphäre so breit wie σ, füllt der Kern den Innenraum und die Schleife hört auf, ein Ring festen Abstands zu sein. Auch die Elektronenwolken besonders stabiler Atome (Helium, Neon) sind räumlich ausgedehnt, keine unendlich dünnen Schalen.

C.10.2 Kugelsymmetrische Gesamtdichte und Edelgase

Im Wasserstoffatom ist die Winkelsumme einer abgeschlossenen Unterschale kugelsymmetrisch (Unsöldscher Satz): $\sum_{m=-\ell}^{\ell}|Y_{\ell m}|^2 = (2\ell+1)/(4\pi)$ [23]. Dasselbe gilt für eine halbgefüllte Unterschale mit je einem Elektron pro Orbital. Empirisch sind abgeschlossene Schalen — die Edelgase — besonders stabil; auch halbgefüllte Unterschalen zeigen eine extra Stabilität. Das ist ein quantenmechanischer und chemischer Befund, keine Aussage der Euler-Dynamik.

Eine einzelne Wirbelschleife oder ein Hill-Wirbel hat eine ausgezeichnete Achse. Ihre Dichte ist nicht kugelsymmetrisch: beim Hill-Wirbel liegen die Minima im Zentrum und auf dem Oberflächenäquator, die Pole sind Maxima (Abschnitt C.8). Um eine kugelsymmetrische Gesamtdichte im Sinne Unsölds nachzubauen, bräuchte man eine Überlagerung ohne Vorzugsachse, etwa $2\ell+1$ verschieden orientierte Kopien. Drei paarweise senkrechte Ringe gleichen Radius durch denselben Mittelpunkt schneiden einander. Das ist im idealen Medium verboten (Abschnitt C.2). Die naheliegende „Schalenfüllung“ durch gerichtete Ringe verträgt sich nicht mit der Helmholtz–Kelvin-Bedingung. Ob eine andere, überschneidungsfreie Anordnung — verkettete Ringe, ein Wirbelkristall auf einer Sphäre — besonders stabil wäre, beantwortet die Messung zusammen mit dem Wellenleiter: Gemessen sind die hohen Ionisierungsenergien der Edelgase (Helium $24{,}6\,\text{eV}$, Neon $21{,}6\,\text{eV}$). Im Medium ist eine Schale abgeschlossen, wenn alle $2\ell+1$ Moden einer Stufe mit gegensinnigen Paaren $\Gamma, -\Gamma$ besetzt sind: Dann gilt $\sum \Gamma_i = 0$ auf der Schale (Anhang B), und kein Nettowirbel bleibt, der an Nachbarn koppelt.

Bemerkung 11 (Gezeigt / gemessen / beantwortet). Für eine einzelne Schleife festen Flächeninhalts ist der Kreis das seichte Energieminimum; kleine Exzentrizität oszilliert, sie läuft nicht davon. Das ist ein teilweises Gegenstück zu „runder ist stabiler“, kein Schutz vor Widnall und kein Argument zugunsten des Hill-Wirbels. Die besondere Stabilität abgeschlossener Schalen (Unsöld, Edelgase) ist übernommenes Wissen über das Wasserstoffatom.

Eine kugelsymmetrische Gesamtkonfiguration ohne gekreuzte Wirbellinien ist die stehende Welle im Wellenleiter: Sie ist eine Druckmode, keine Linie, und kreuzt deshalb nichts (Anhang E). Ein fester Abstand zum Kern ist ein mögliches Stabilitätskriterium, trifft aber die Breite von P_{1s} nicht.

C.11 Nahtlinie auf der Kugel: Zeichnungswinkel und Flächenwinkel

Begriffe. Eine Zeichnung (Projektion) ist die ebene Ansicht der Kugel; dort misst man Winkel wie auf dem Blatt, ein ebenes Dreieck hat $180°$. Ein Kugeldreieck wird von drei Großkreisbögen auf der Kugeloberfläche begrenzt; seine Winkel misst man zwischen den Tangenten dieser Bögen. Ein Oktant (Kugelachtel) ist das Kugeldreieck mit drei rechten Winkeln, etwa zwischen Pol, Äquator bei $0°$ Länge und Äquator bei $90°$ Länge. Der Exzess eines Kugeldreiecks ist seine Winkelsumme minus $180°$; er ist gleich seiner Fläche, gemessen in Winkeln ($1\,\mathrm{sr} \mathrel{\widehat{=}} 57{,}3°$ bei $R = 1$). Diese Sätze der Kugelgeometrie (Girard, Gauß–Bonnet) sind gezeigte Geometrie.

Geometrie [F]. Die Kugel hat $R = 49{,}5\,\mathrm{mm}$ (CAD). Die Naht der Reihe 2 ist der Schnitt der Kugel mit dem Hyperbelzylinder

$$y^2 - z^2 = (0{,}1\,R)^2. \tag{197}$$

Von der Seite (Blick entlang x) ist die Naht eine Hyperbel, deren Äste auf den $45°$-Strahlen liegen (Abbildung 36). In der Zeichnung hat jedes Dreieck $180°$. Das Oktantendreieck aus Ansichtsmitte und den beiden Astenden ist gezeichnet $90°+45°+45° = 180°$, auf der Kugel $90°+90°+90° = 270°$. Der Exzess von $90°$ ist die Fläche des Oktanten. Das Dreieck aus Ansichtsmitte, Astende und Pol ist gezeichnet $45° + 67{,}5° + 67{,}5° = 180°$, auf der Kugel $45° + 90° + 90° = 225°$.

Die Naht umschließt zwei Oktanten. Ihre Winkelsumme ist $2 \times 270° = 540°$. Verteilt auf die acht Richtungen der Zeichnung ($0°, 45°, \ldots, 315°$) ergibt das

$$\frac{540°}{8} = 67{,}5° = 1{,}5 \times 45°. \tag{198}$$

Das ist eine Winkelsumme über eine Fläche. Um einen einzelnen Punkt herum misst man auch auf der Kugel immer $360°$, denn im ganz Kleinen ist die Fläche eben. Die echte Hyperbel mit Scheitel bei $0{,}1\,R$ ergibt $535{,}8°$ und $535{,}8°/8 = 66{,}97°$. Exakt $540°$ und $67{,}5°$ gelten im Grenzfall, in dem die Äste auf die $45°$-Großkreise zusammenrücken.

Damit gibt es zwei Zählungen desselben Weges:

	Zeichnung (Projektion)	Kugeloberfläche
1 Schritt	$45°$	$67{,}5°$
2 Schritte	$90°$	$135°$
4 Schritte	$180°$	$270°$
8 Schritte	$360°$	$540°$
16 Schritte	$720°$	$1080°$

Das Verhältnis ist $3 : 2 = 1{,}5$.




Abbildung 36: Reihe 2: Naht als Schnitt der Kugel $R = 49{,}5\,\text{mm}$ mit $y^2 - z^2 = (0{,}1\,R)^2$, in vier Ansichten (von der Seite, von vorne, von oben, schräg $45°$). Schwarz: Winkel in der Zeichnung (Summe $360°$); lila: Zählung auf der Kugeloberfläche, Faktor $1{,}5$ (Summe $540°$). Von der Seite liegen die Hyperbeläste auf den $45°$-Strahlen. Unten die gerechneten Kugeldreiecke: Oktant gezeichnet $180°$, auf der Kugel $269{,}4°$ (Grenzfall $270°$); umschlossene Fläche $535{,}8°$ (Grenzfall $540°$). Punktlisten und Ansichten als CSV/DXF: `cad/reihe2_flaechenwinkel_R49p5.zip` (`reihe2_naht1_3d.csv`, `reihe2_naht2_3d.csv`, `reihe2_seite.dxf`, `reihe2_vorne.dxf`, `reihe2_oben.dxf`, `reihe2_schraeg45.dxf`; Maße in mm).

Vorzeichenregel [F]. Nach einer Umdrehung in der Zeichnung ($360°$) steht die Zählung auf der Kugel bei $540° = 360° + 180°$. Das ist eine halbe Drehung zu viel: Der Zustand steht auf dem Kopf (-1). Nach zwei Umdrehungen ($720°$) steht sie bei $1080° = 3 \times 360°$: Der Zustand ist wieder deckungsgleich ($+1$). Das Muster -1 nach $360°$, $+1$ nach $720°$ ist genau das Muster des Spins $\frac{1}{2}$, und es folgt allein aus dem Faktor $1{,}5$, weil $1{,}5$ eine ganze plus eine halbe Drehung ist. Anders geschrieben: $\cos(1{,}5\,\theta)$ und $\cos(\theta/2)$ stimmen bei

allen Vielfachen von $360°$ überein, denn ihre Argumente unterscheiden sich um genau θ, also um volle Drehungen.

Zuordnung zum Elektron [P]. Dass das Elektron tatsächlich so gebaut ist, ist die Grundlage des Autors [P]. Sie stützt sich auf die Messung [F]: In der Neutroneninterferometrie kehrt die Phase eines Spin-$\frac{1}{2}$-Teilchens erst nach $720°$ (4π) zum Ausgangswert zurück, nach $360°$ hat sie das Vorzeichen gewechselt [26, 27]. Dieselbe 4π-Periode hat das Möbiusband mit seiner halben Verdrillung (Abschnitt D.9); die Naht hier liefert sie über die Winkelsumme der Kugeloberfläche.

C.11.1 Drei Nähte: zwei Hyperbeln und eine Sinusnaht

Zu den zwei roten Hyperbelnähten der Reihe 2 kommt eine dritte, blaue Naht (Abbildung 37). Sie liegt auf dem Großkreis der xz-Ebene, also mitten zwischen den beiden roten Ästen, und ist seitlich ausgelenkt um

$$\delta(\varphi) = A\sin(4\varphi), \qquad 0° \le \varphi < 360°. \tag{199}$$

Das ist eine Welle mit vier Bergen und vier Tälern. Sie kreuzt den Großkreis an genau acht Stellen, bei $0°, 45°, \dots, 315°$ in der Zeichnung und bei $0°, 67{,}5°, \dots, 472{,}5°$ in der lila Zählung auf der Kugeloberfläche [F]. Die Amplitude $A = 15°$ ist gesetzt [P]. Die blaue Naht berührt eine rote erst ab $A = 17{,}6°$; diese Grenze gilt für den gesetzten Scheitelabstand $0{,}1\,R$ der Hyperbeln. Bei $A = 15°$ bleibt ein kleinster Abstand von $0{,}0234\,R \approx 1{,}34°$ auf der Kugel [F]. Das ist reine Geometrie; eine physikalische Deutung der Naht ist damit nicht verbunden.

Die acht Nullstellen liegen auf der Oberfläche. Im Inneren der Kugel wechselt die Strömung eines Pumpkreislaufs auf einem Kreis nur viermal das Vorzeichen, und zwar bei $54{,}7°$, nicht bei $45°$ (Abschnitt C.12.2). Beide Angaben gelten, denn sie beschreiben verschiedene Flächen: die Haut der Kugel und einen Schnitt durch ihr Inneres.

C.12 Das Innenleben: ein Pumpkreislauf zwischen Kern und Hülle

Die Abschnitte bisher behandeln die Haut der Kugel. Dieser Abschnitt schaut hinein. Gerechnet ist eine einfache Anordnung: ein fester Kern vom Radius a mitten in einer Hülle vom Radius R, dazwischen das Medium. Das Bild dazu ist eine Teetasse mit einem Löffel in der Mitte. Was sich dreht, Kern oder Medium, entscheidet, wie der Tee umläuft.

C.12.1 Begriffe

- **Meridianschnitt**: der Schnitt längs der Drehachse, also die Seitenansicht. Der Polwinkel θ zählt von der Achse aus.




Abbildung 37: Reihe 2 mit drei Nähten auf der Kugel $R = 49{,}5\,\text{mm}$: zwei rote Hyperbelnähte ($y^2 - z^2 = (0{,}1\,R)^2$) und die blaue Sinusnaht $\delta = A\sin 4\varphi$ mit $A = 15°$ (gesetzt), in vier Ansichten. Blaue Kreise: die acht Nullstellen. Schwarz: Winkel in der Zeichnung (Summe $360°$); lila: Zählung auf der Kugeloberfläche (Faktor $1{,}5$, Summe $540°$). Kleinster Abstand blau–rot $0{,}0234\,R \approx 1{,}34°$.

- Ω_K ist die Drehgeschwindigkeit des Kerns, Ω_M die des Mediums an der Hülle.
- **Zähigkeit** ν und **Reynoldszahl** $Re = \Omega R^2/\nu$ sind in Abschnitt B.3.2 erklärt. Ω ist hier die Drehung, die den Kreislauf antreibt.
- **Stromfunktion** ψ: Ihre Höhenlinien sind die Stromlinien. Zwischen zwei Linien fließt überall dieselbe Menge, wie beim Hill-Wirbel (Abschnitt C.8). Wo die Linien dicht liegen, ist die Strömung schnell.
- $P_2(\cos\theta) = (3\cos^2\theta - 1)/2$ ist dieselbe Winkelfunktion wie beim dz²-Orbital in Kapitel 7. Sie ist null bei $\theta = 54{,}74°$, wo $\tan\theta = \sqrt{2}$ gilt.
- **Zelle**: ein geschlossener Umlauf im Meridianschnitt. Im Raum liegen die Stromlinien auf ineinander geschachtelten Ringflächen (Tori) um den Kern.

Das Medium folgt $\Delta p = c^2\Delta\rho$. Die Dichte ändert sich dann nur um den Bruchteil $(u/c)^2$. Für Strömungen weit unter c ist das praktisch nichts; das Medium verhält sich hier wie eine inkompressible Flüssigkeit [F]. Das Ergebnis hängt deshalb nur von der Zähigkeit ab. Dass das Medium in Scher-

zonen um einen Kern zäh ist, setzt dieser Abschnitt an [P]. Das widerspricht Abschnitt 2.2 nicht: Dort ziehen gleichmäßige Bahnen ohne Scherung ihre Bahn; Wärme entsteht dort erst, wo Schichten gegeneinander gleiten und Wirbel entstehen. Der Kernradius ist in den Abbildungen $a = 0{,}5\,R$ gesetzt [P]; die Winkel hängen nicht davon ab. Die Nähte auf der Haut (Abschnitt C.11.1) und die Strömung im Inneren sind getrennte Rechnungen; einen Zusammenhang zwischen ihnen setzt dieser Abschnitt nicht an.

C.12.2 Kern dreht, Medium ruht (Vergleichsfall)

Dreht sich nur der Kern, wirft er das Medium am Äquator nach außen, wie eine Zentrifuge. Das Medium strömt an der Hülle zu den Polen und wird über den Polen wieder zum Kern gesaugt. Abschnitt B.3.2 nennt diese Sekundärströmung das zentrifugale Pumpen. Für kleines Re lässt sie sich genau angeben [F]. Ohne Hülle hat Bickley sie 1938 berechnet [24]:

$$\psi = -\tfrac{1}{8}\,Re\,\Omega R^3\Big(1-\frac{R}{r}\Big)^2 \sin^2\theta\cos\theta, \tag{200}$$

hier mit R als Radius der drehenden Kugel. Mit Hülle bleibt die Winkelform gleich, $\psi = f(r)\sin^2\theta\cos\theta$; nur $f(r)$ ändert sich. Daraus folgt die radiale Geschwindigkeit

$$u_r = \frac{2f(r)}{r^2}\,P_2(\cos\theta). \tag{201}$$

Die Messungen und genaueren Rechnungen dazu stammen von Sawatzki, Zierep, Munson, Joseph, Wimmer und Dennis [25, 26, 27, 28, 29].

Was die Formel zeigt [F]:

- Vier Zellen im Meridianschnitt. Ihre Grenzen liegen auf der Achse und in der Äquatorebene, also bei $0°, 90°, 180°, 270°$.
- Die Strömung wechselt bei $54{,}74°$ die Richtung, nicht bei $45°$. Der Unterschied ist $9{,}7°$. Das Auge jeder Zelle liegt auf diesem Strahl.
- Pol und Äquator stehen im Verhältnis $+2/3 : -1/3$, also $2 : -1$. Das ist das Verhältnis $a : b$ der Zeichnung des Autors und dasselbe wie beim dz²-Orbital. Gemeinsam ist beiden die Funktion P_2 [F]. Dass beides dieselbe Ursache hat, ist eine Setzung [P].
- Auf einem Kreis um den Kern wechselt das Vorzeichen viermal: bei $54{,}7°, 125{,}3°, 234{,}7°, 305{,}3°$. In der lila Zählung der Kugeloberfläche (Faktor $1{,}5$, Abschnitt C.11) sind das $82{,}1°, 187{,}9°, 352{,}1°, 457{,}9°$.
- Bei größerem Re wird der Ausstrom am Äquator zu einem schmalen Strahl [29].
- Der Winkel hängt weder von R noch vom Kernradius ab. Er ist auf jeder Größe derselbe.

Acht Nullstellen bei $45°$ gibt die Rechnung im Inneren nicht. Die nächste Ordnung bringt die Winkelfunktion P_4 hinzu, mit Nullen bei $30{,}6°, 70{,}1°, 109{,}9°, 149{,}4°$. Auch das sind keine $45°$. Die acht Nullstellen der Sinusnaht (Abschnitt C.11.1) liegen auf der Oberfläche und sind dort reine Geometrie.




Abbildung 38: Pumpkreislauf, wenn der Kern dreht und das Medium ruht (kleines Re, Gl. 201). Vier Zellen im Meridianschnitt; Vorzeichenwechsel bei $54{,}74°$ ($\tan\theta = \sqrt{2}$); Pol zu Äquator $2 : -1$.

C.12.3 Medium dreht, Kern ruht: der Fall des Buchs

Im Buch kreist das Medium um ein Zentrum (Kapitel 3). Das entspricht dem umgekehrten Fall: Die Hülle nimmt das Medium mit, der Kern dreht langsamer oder gar nicht. Dann kehrt sich der Kreislauf um [F]. Das kennt jeder von der Teetasse: Nach dem Umrühren sammeln sich die Teeblätter in der Mitte am Boden. Am Boden bremst die Reibung den Tee, die Fliehkraft lässt dort nach, und der Druck von außen schiebt den Tee nach innen. Einstein hat das 1926 so erklärt [31]; Bödewadt hat die Strömung über einem festen Grund 1940 berechnet [32].

Für die Kugel heißt das [F]: Das Medium strömt in der Äquatorebene zum Kern hinein, am Kern zu den Polen und über den Polen nach außen ab. An der Hülle kehrt es zum Äquator zurück. Die Umkehr liegt genau bei $\Omega_K = \Omega_M$; dann steht der Kreislauf still. Das gilt für alle gerechneten Kernradien von $0{,}3\,R$ bis $0{,}9\,R$. Dreht der Kern gegen das Medium, entstehen bei $\Omega_K/\Omega_M \approx -1{,}56$ bis $-3{,}98$ acht Zellen statt vier. Der Winkel $54{,}74°$ und das Verhältnis $2 : -1$ bleiben in beiden Richtungen erhalten.

Damit ist eine Frage aus Abschnitt 2.5 (Strömung und Kollisionen am Schwarzen Loch) beantwortet, nämlich ob das Druckgefälle für einen Ausstrom an den Polen reicht: Im zähen Modell ja, sobald das Medium schneller dreht als der Kern [F]. Der Ausstrom wird schwächer, je näher Ω_K an Ω_M kommt.

Gemessen ist an Schwarzen Löchern [F]: Der Jet von M87 ist am Fuß breit und wird nach außen schmaler und schneller [33]. Die üblichen Modelle führen die Jets auf die Drehung des Lochs und Magnetfelder zurück [34, 35]. Im Bild des Buchs zieht die Drehung des Mediums am Äquator spiralförmig hinein und schiebt über die Pole hinaus [P].

Was die Rechnung nicht hergibt: Sie enthält keine Magnetfelder und kein Keplerprofil, also keine nach außen langsamer werdende Drehung wie in einer Akkretionsscheibe. Sie zeigt die Richtung des Kreislaufs, nicht die Stärke eines Jets.




Abbildung 39: Umkehr des Pumpkreislaufs. Links: Kern dreht, Medium ruht. Rechts: Medium dreht, Kern ruht; Einstrom in der Äquatorebene, Ausstrom über die Pole. Die Umkehr liegt bei $\Omega_K = \Omega_M$ (geprüft für Kernradien $0{,}3\,R$ bis $0{,}9\,R$).

C.12.4 Von oben gesehen: die Spirale

Von oben auf den Äquator geschaut, laufen die Teilchen nicht im Kreis, sondern in Spiralen. Die Drehung trägt sie herum, der Pumpkreislauf trägt sie hinein oder hinaus. Im Fall des Buchs liegt der Einzug am Kern, der Auszug an der Hülle. Die Steigung der Spirale ist das Verhältnis von Pumpen

zu Drehen. Sie wächst mit Re, denn das Pumpen wächst schneller als die Drehung [F].

Die Rechnung ergibt [F]:

- Eine Spirale mit einer mittleren Steigung von $17°$, wie die goldene Spirale, entsteht im Einzug bei $Re \approx 520$ bis 710, im Auszug bei 575 bis 750, je nach Stromfläche. Die Abbildung zeigt $Re = 521$.
- Ein Umlauf im Meridianschnitt dauert etwa $424/Re$ Umdrehungen.
- Die Steigung ändert sich längs der Bahn von $0°$ bis etwa $46°$. Die Bahn ist also keine logarithmische Spirale, denn deren Steigung ist überall gleich.
- Eine ausgezeichnete Reynoldszahl gibt es nicht. Die goldene Spirale ist ein Fall unter vielen. Das passt zu den gemessenen Steigungen von Spiralgalaxien zwischen $5°$ und $40°$ (Abschnitt 5.6).

Diese Werte von Re liegen außerhalb des Bereichs, in dem die Näherung für kleines Re sicher gilt. Sie sind eine Schätzung. Gemessen ist bei großem Re im Kugelspalt, dass sich drei bis fünf Spiralarme bilden [30]. Gemessen ist dort die Zahl der Arme, nicht die Steigung im ruhigen Grundzustand.




Abbildung 40: Bahnen im Fall des Buchs (Medium dreht), von oben auf den Äquator gesehen, bei $Re = 521$. Einzug am Kern, Auszug an der Hülle. Die Steigung ändert sich längs der Bahn von $0°$ bis etwa $46°$; die Bahn ist keine logarithmische Spirale.

C.12.5 Energie: wohin die Leistung geht

Wer das Medium dreht, muss gegen die Zähigkeit arbeiten. Mit der dynamischen Zähigkeit $\mu = \rho\nu$ überträgt das Medium zwischen Kern und Hülle das Drehmoment [F]

$$T = \frac{8\pi\mu a^3 R^3(\Omega_M - \Omega_K)}{R^3 - a^3}. \tag{202}$$

Die Hülle steckt die Leistung $P_M = T\Omega_M$ hinein. Davon kommt der Anteil Ω_K/Ω_M beim Kern als Drehung an. Der Rest, $1 - \Omega_K/\Omega_M$, wird zu Wärme. Ruht der Kern, wird alles zu Wärme; dreht er halb so schnell, je die Hälfte; bei $90\,\%$ gehen nur $10\,\%$ in Wärme.

Weitere Zahlen der Rechnung, in Einheiten der Grundleistung [F]:

- Das Pumpen kostet zusätzlich etwa $2 \cdot 10^{-5}\, Re^2$. Bei kleinem Re ist das wenig.
- Der Ausstrom über die Pole trägt etwa $5 \cdot 10^{-6}\, Re^2$ in der Spaltmitte und $1{,}5 \cdot 10^{-6}\, Re^2$ nahe der Hülle. Netto fließt Energie nach innen, denn der Kreislauf ist geschlossen.
- Bis das Medium nach dem Anwerfen voll mitläuft, vergehen $0{,}032$ bis $0{,}077\, R^2/\nu$. Eine einfache Schätzung gibt $0{,}015\, R^2/\nu$. Für Wasser in einer Kugel von $R = 49{,}5\,\mathrm{mm}$ sind das 78 bis 189 Sekunden.
- Kleines Re heißt für diese Wasserkugel $\Omega \ll 4 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{s}^{-1}$, also eine Umdrehung in weit mehr als vier Stunden.

Soll der Kreislauf dauernd laufen, braucht er Nachschub an Drehimpuls von außen, sonst kommt er zur Ruhe [F]. Im Bild des Buchs sammelt sich der Einstrom, bis er sich stoßweise über die Pole entlädt, wie ein Vulkan (Abschnitt 3.4) [P].

C.13 Übersicht

Tabelle 6: Was zum Wasserstoffatom passt, teilweise passt oder nicht passt. Gründe in einem Satz.

Gegenstand	Urteil	Grund
Ganzzahligkeit von m durch Schluss des Fadens	passt	ein geschlossener Faden erlaubt nur ganzzahlige azimutale Wellen.
Niedrige Biegemoden $m = 2, 3, 4$	passt	sie liegen tief unter den Widnall-Bändern $m \sim \mathcal{O}(R/a)$ und sind LIA-stabil.
Kelvin-Dipolfeld eines rotierenden bzw. wandernden Rings	passt	das Fernfeld fällt wie $1/r^3$, analog zu einem magnetischen Dipol der Hof-Notiz.

Gegenstand	Urteil	Grund
natürliche Kerndicke im Medium	passt	die Verdünnung setzt $a_{\mathrm{evac}} = \Gamma/(2\pi\sqrt{2}\,c_s)$, dort $\rho = \rho_\infty/e$.
stehende Wellen $n = 1, 2, 3$ als Formbild	passt teilweise	Knoten einer Saite erzeugen Blattformen; das ist das Bild stehender Wellen, noch nicht das $1/n^2$-Spektrum.
Bohr-Energien $E_n \propto -1/n^2$	passt	Schlussbedingung plus Coulomb-Kraft ergeben (184); Coulomb ist dabei gemessen und eingesetzt; im Medium trägt das Wandprofil das $1/r$ (Anhang E).
Biegespektrum ω_m/ω_2	passt nicht	parameterfrei $m\sqrt{m^2-1}/(2\sqrt{3})$, wächst wie m^2.
Ringenergie bei $\Gamma_n = n\kappa$	passt nicht	$E \propto n^2$ und positiv, Wasserstoff $E \propto -1/n^2$.
Entartung n^2 bzw. $2n^2$	passt nicht	Ringmoden haben Entartung 2 oder 4 je $\lvert m\rvert$.
s-Orbital ($\ell = 0$, Maximum am Kern)	passt nicht	der Ring sitzt auf einem Kreis, hat ein Loch in der Mitte und einen linearen Impuls; Winkelüberlapp mit s nur $0{,}17$.
p_z ($m = 0$, Lappen längs z)	passt nicht	der Äquatorgürtel eines Rings ist orthogonal zu p_z (Überlapp ≈ 0).
Seitenriss des Rings gegen p_x	passt teilweise	beide sind zweizählig; der Torus hat einen Steg, p_x eine Knotenfläche.
$T(2,3)$ gegen s, p, d	passt nicht	dreizählige Aufsicht; reelle s, p, d haben 0, 2 oder 4 Lappen.
$T(2,5)$ gegen s, p, d	passt nicht	fünfzählige Aufsicht, erst ab $\ell \geq 5$ überhaupt denkbar.
Vierblatt-d ($3d_{xy}$, $3d_{x^2-y^2}$)	passt nicht	Ähnlichkeit der Aufsicht nur $0{,}39$–$0{,}44$, durchweg schlechter als zu p-artigen Formen.
Zahl der Orbitale pro Schale $2\ell + 1$	beantwortet	folgt aus der Kugelsymmetrie des Hofs; die Wellengleichung im Wellenleiter liefert $2\ell + 1$ (Anhang E).
Spin und Pauli-Faktor 2	passt teilweise	Γ und $-\Gamma$ sind zwei Zustände, aber nicht Spin $\frac{1}{2}$ und nicht $2(2\ell + 1)$.
freie Torusknoten als stationäre Zustände	passt nicht	höchstens formmetastabil; Zerfall durch Rekombination verlangt Viskosität [11, 13, 16].
radiale Knoten $n - \ell - 1$	passt nicht	gleiche Zirkulation: Leapfrogging ohne Fadendurchdringung ($T_{\mathrm{leap}}/T_{\mathrm{Bohr}} \approx 0{,}14$); gegenläufig: kein Gleichgewichtsabstand d.

Gegenstand	Urteil	Grund
Hillscher Kugelwirbel als s-Zustand	passt nicht	Kugelrand, aber ausgezeichnete Achse; zentrales Minimum zugleich mit Oberflächenäquator; translierend; Heckstachel [19, 21, 22].
Größe des Hill-Wirbels	passt nicht	bei festem Γ ist $E \propto a$; mit $\Gamma_n = n\kappa$ und festem U oder Ma gilt $a_n \propto n$, nicht n^2.
gegenläufige koaxiale Ringpaare	passt nicht	$u_R \neq 0$, $u_z^{\mathrm{mut}} < U_{\mathrm{self}}$ für $d \geq 2a$; kein stiller Abstand.
Ringpaare im Kern-Druckfeld	passt nicht	Unterdruckringe werden vom Hof nach außen getrieben und geweitet; kein gemeinsamer Fixpunkt (d, R).
konzentrische gegenläufige Ringe	passt nicht	der äußere Ring hat $\dot{z} < 0$ für alle geprüften Radienverhältnisse; kein Schweben.
rundere Bahn / kugelsymmetrische Schale	passt teilweise	der Kreis minimiert seicht die Energie einer Schleife festen Flächeninhalts; Unsölds Kugelsumme und die Edelgasstabilität sind übernommen, keine Folge nichtschneidender Ringe.
fester Abstand zum Kern	passt teilweise	Bohr-Kreis und Maximum von P_{1s} bei a_0; die wirkliche Wolke hat $\sigma \approx 0{,}87 a_0$, kein scharfer Radius.
Hüllen überlappender Schleifen als Knoten	passt nicht	Defizitminima entstehen, liegen aber nicht auf den Laguerre-Nullstellen und sind keine exakten Nullen von ψ.
Pumpkreislauf im Inneren: Winkel $54{,}7^\circ$ und $2:-1$	passt	dieselbe Winkelfunktion P_2 wie beim dz^2-Orbital; gerechnet bei kleinem Re, gleich in beiden Drehrichtungen (Abschnitt C.12.2).
Ausstrom über die Pole, wenn das Medium dreht	passt teilweise	die Richtung folgt aus der Umkehr bei $\Omega_K = \Omega_M$; Magnetfelder und Jetstärke enthält die Rechnung nicht (Abschnitt C.12.3).
Goldene Spirale als Form des Einzugs	passt teilweise	mittlere Steigung 17° bei $Re \approx 520$ bis 710, aber nur ein Fall unter vielen und keine logarithmische Spirale (Abschnitt C.12.4).




Abbildung 41: Leistung im Pumpkreislauf: Aufteilung der eingebrachten Leistung in Drehung des Kerns (Ω_K/Ω_M) und Wärme ($1 - \Omega_K/\Omega_M$), Kosten des Pumpens und Anlaufzeit.

C.14 Schluss

Gezeigt ist: im Medium mit $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ ist ein dünner Wirbelring ein sauber definierter Gegenstand. Er hat Kelvins Geschwindigkeit, Impuls und Energie, eine natürliche Kerndicke aus der Verdünnung und Biegewellen ganzzahliger Wellenzahl m. Die niedrigen Moden sind stabil gegen die Widnall-Kräuselung. Die Form ihres Spektrums ist parameterfrei und ist nicht das Wasserstoffspektrum.

Gezeigt ist ferner: Torusknoten können metastabil sein, und ihre Schatten tragen wirklich eine ganzzahlige Zähligkeit — drei beim Kleeblatt, fünf beim Fünfknoten, zwei im Seitenriss des Unknotens. Genau diese Zähligkeiten treffen s, p und d nicht. Ein Ähnlichkeitsmaß der Schatten bestätigt das und ordnet keinen Faden einem Orbital eindeutig zu. Das s-Orbital, p_z und die Vierblatt-d bleiben ohne Gegenstück. Die Zahl $2\ell + 1$ wird als Kugelsymmetrie übernommen; die Wellengleichung im Wellenleiter liefert sie (Anhang E). Der Pauli-Faktor 2 ist gemessen (Stern–Gerlach, 1922: zwei Strahlen; Schalen mit $2, 8, 18$ Elektronen, also $2n^2$). Im Medium ist er das gegensinnige Paar $\Gamma, -\Gamma$: Eine geschlossene Schale verlangt $\sum \Gamma_i = 0$ (Anhang B), also besetzt jede Mode genau ein Paar.

Gezeigt ist außerdem: stehende Wellen auf einem geschlossenen Ring liefern die Bohr-Quantisierung $L = n\hbar$. Mit einer Coulomb-Kraft folgen die Energien $-1/n^2$. Das passt, weil Coulomb eingesetzt wird. Die Coulomb-Kraft ist gemessen; ihr Gegenstück in der Hof-Notiz ist der Gleichgewichtshof, der aus $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ und dem Gewicht des Mediums folgt.

Aus einer Strömung folgen weder die Coulomb-Kraft noch der $1/r$-Hof; der Hof ist das Druckgleichgewicht (Anhang B), das bindende $1/r$ des Atoms das Wandprofil des Wellenleiters, und dort steht auch das stationäre Gegenstück zu den radialen

Knoten von $2s$ und $3s$ (Anhang E).

Gezeigt ist ferner: der Hillsche Kugelwirbel hat im Medium ein zentrales Dichteminimum, aber kein tieferes Innenringminimum, keine quantisierte Größe $a_n \propto n^2$, keine Ruhe am Kern und nach der Literatur keine Formstabilität. Gegenläufige Ringpaare haben keinen Gleichgewichtsabstand, auch nicht mit dem Kernhof. Die Zahl $2\ell+1$ wird als Kugelsymmetrie des Raums übernommen; das Medium erzeugt sie, weil der Hof um den Kern kugelsymmetrisch ist und die Wellengleichung in ihm die $2\ell+1$ Lösungen $Y_{\ell m}$ hat (Anhang E). Eine einzelne Schleife bevorzugt seicht den Kreis, das ist aber weder Widnall-Stabilität noch die Edelgasstabilität; diese ist gemessen und folgt aus der vollständigen Paarbesetzung einer Schale mit $\sum \Gamma_i = 0$. Im idealen Medium dürfen Wirbellinien einander nicht kreuzen: Leapfrogging bleibt zulässig, die Rekombination von Torusknoten nicht.

Was sich für das Paper eignet, ist damit begrenzt und klar. Der Wirbelring, sein Dipolfeld, die natürliche Kerndicke, die ganzzahligen Biegemoden und das gegenläufige Atomwetter der Hof-Notiz sind echte Ergebnisse. Orbitale als Schatten von Torusknoten sind ein anschauliches Bild, keine Zuordnung, die die Rechnung trägt. Die Energien des Wasserstoffs kommen aus der Schlussbedingung erst, nachdem die gemessene Coulomb-Kraft eingesetzt ist. Den s-Zustand und die radialen Knoten tragen weder der Hill-Wirbel noch gegenläufige Ringpaare, sondern die stehende Welle im Wellenleiter zwischen Wirbelwänden (Anhang E). Ein fester Abstand zum Kern trifft die Breite von P_{1s} nicht, und überlappende Atmosphären erzeugen keine Laguerre-Knoten.

Im Inneren einer Kugel mit Kern treibt die Drehung einen Pumpkreislauf mit vier Zellen und dem Winkel $54{,}7^\circ$. Dreht das Medium schneller als der Kern, strömt es am Äquator hinein und über die Pole hinaus; von oben gesehen laufen die Bahnen in Spiralen, deren Steigung mit Re wächst (Abschnitt C.12).

Literatur

[1] S. Reuvekamp, „Der $1/r$-Dichtehof aus dem Strahlungsgleichgewicht. Kerngleichgewicht, magnetisches Analogon und warum der Hof kein Strömungseffekt ist“, Anhang B dieses Bandes, Notiz, 7. November 2026.

[2] W. Thomson (Lord Kelvin), „On vortex atoms“, Proceedings of the Royal Society of Edinburgh **6** (1867), 94–105; ders., „Vibrations of a columnar vortex“, Philosophical Magazine **10** (1880), 155–168.

[3] H. Lamb, Hydrodynamics, 6. Auflage, Cambridge University Press, 1932 (Dover-Nachdruck, New York, 1945). Art. 161–163 (Wirbelringe).

[4] P. G. Saffman, Vortex Dynamics, Cambridge University Press, 1992.

[5] L. S. Da Rios, „Sul moto d’un liquido indefinito con un filetto vorticoso di forma qualunque“, Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo **22** (1906), 117–135.

[6] R. J. Arms und F. R. Hama, „Localized-induction concept on a curved vortex and motion of an elliptic vortex ring“, Physics of Fluids **8** (1965), 553–559.

[7] T. Kambe und T. Takao, „Motion of distorted vortex rings“, Journal of the Physical Society of Japan **31** (1971), 591–599.

[8] S. E. Widnall und J. P. Sullivan, „On the stability of vortex rings“, Proceedings of the Royal Society A **332** (1973), 335–353.

[9] S. E. Widnall, D. B. Bliss und C.-Y. Tsai, „The instability of short waves on a vortex ring“, Journal of Fluid Mechanics **66** (1974), 35–47.

[10] S. E. Widnall und C.-Y. Tsai, „The instability of the thin vortex ring of constant vorticity“, Philosophical Transactions of the Royal Society A **287** (1977), 273–305.

[11] R. L. Ricca, D. C. Samuels und C. F. Barenghi, „Evolution of vortex knots“, Journal of Fluid Mechanics **391** (1999), 29–44.

[12] A. Calini, S. F. Keith und S. Lafortune, „Stability of small-amplitude torus knot solutions of the localized induction approximation“, Journal of Physics A **44** (2011), 335204.

[13] D. Kleckner und W. T. M. Irvine, „Creation and dynamics of knotted vortices“, Nature Physics **9** (2013), 253–258.

[14] N. Bohr, „On the constitution of atoms and molecules“, Philosophical Magazine **26** (1913), 1–25.

[15] H. von Helmholtz, „Über Integrale der hydrodynamischen Gleichungen, welche den Wirbelbewegungen entsprechen“, Journal für die reine und angewandte Mathematik **55** (1858), 25–55.

[16] H. K. Moffatt, „The degree of knottedness of tangled vortex lines“, Journal of Fluid Mechanics **35** (1969), 117–129.

[17] M. J. M. Hill, „On a spherical vortex“, Philosophical Transactions of the Royal Society A **185** (1894), 213–245.

[18] J. Norbury, „A family of steady vortex rings“, Journal of Fluid Mechanics **57** (1973), 417–431.

[19] H. K. Moffatt und D. W. Moore, „The response of Hill’s spherical vortex to a small axisymmetric disturbance“, Journal of Fluid Mechanics **87** (1978), 749–760.

[20] C. Pozrikidis, „The nonlinear instability of Hill’s vortex“, Journal of Fluid Mechanics **168** (1986), 337–367.

[21] A. Fukuyu, T. Ruzi und A. Kanai, „The response of Hill’s vortex to a small three dimensional disturbance“, Journal of the Physical Society of Japan **63** (1994), 510–527.

[22] T. Rozi, „Evolution of the surface of Hill’s vortex subjected to a small three-dimensional disturbance for the cases of $m = 0, 2, 3$ and 4“, Journal of the Physical Society of Japan **68** (1999), 2940–2955.

[23] A. Unsöld, „Beiträge zur Quantenmechanik der Atome“, Annalen der Physik **387** (1927), 355–393.

[24] W. G. Bickley, „The secondary flow due to a sphere rotating in a viscous fluid“, Philosophical Magazine **25** (1938), 746–752, doi:10.1080/14786443808562058.

[25] O. Sawatzki, „Das Strömungsfeld um eine rotierende Kugel“, Acta Mechanica **9** (1970), 159–214, doi:10.1007/BF01179821.

[26] O. Sawatzki und J. Zierep, „Das Stromfeld im Spalt zwischen zwei konzentrischen Kugelflächen, von denen die innere rotiert“, Acta Mechanica **9** (1970), 13–35, doi:10.1007/BF01176606.

[27] B. R. Munson und D. D. Joseph, „Viscous incompressible flow between concentric rotating spheres. Part 1. Basic flow“, Journal of Fluid Mechanics **49** (1971), 289–303, doi:10.1017/S0022112071002064.

[28] M. Wimmer, „Experiments on a viscous fluid flow between concentric rotating spheres“, Journal of Fluid Mechanics **78** (1976), 317–335, doi:10.1017/S0022112076002462.

[29] S. C. R. Dennis, S. N. Singh und D. B. Ingham, „The steady flow due to a rotating sphere at low and moderate Reynolds numbers“, Journal of Fluid Mechanics **101** (1980), 257–279, doi:10.1017/S0022112080001656.

[30] C. Egbers und H. J. Rath, „The existence of Taylor vortices and wide-gap instabilities in spherical Couette flow“, Acta Mechanica **111** (1995), 125–140, doi:10.1007/BF01376924.

[31] A. Einstein, „Die Ursache der Mäanderbildung der Flußläufe und des sogenannten Baerschen Gesetzes“, Die Naturwissenschaften **14** (1926), 223–224, doi:10.1007/BF01510300.

[32] U. T. Bödewadt, „Die Drehströmung über festem Grunde“, ZAMM **20** (1940), 241–253, doi:10.1002/zamm.19400200502.

[33] R. C. Walker, P. E. Hardee, F. B. Davies, C. Ly und W. Junor, „The structure and dynamics of the subparsec jet in M87 based on 50 VLBA observations over 17 years at 43 GHz“, The Astrophysical Journal **855** (2018), 128, doi:10.3847/1538-4357/aaafcc.

[34] R. D. Blandford und R. L. Znajek, „Electromagnetic extraction of energy from Kerr black holes“, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society **179** (1977), 433–456, doi:10.1093/mnras/179.3.433.

[35] Event Horizon Telescope Collaboration, „First M87 Event Horizon Telescope Results. V. Physical origin of the asymmetric ring“, The Astrophysical Journal Letters **875** (2019), L5, doi:10.3847/2041-8213/ab0f43.

D Wirbelabstoßung im Medium

Zusammenfassung. Die gegenseitige kinetische Energie zweier Wirbel im idealen unzusammendrückbaren Medium wird als Funktion des Abstands d gerechnet: für parallele Linienwirbel und für dünne Ringe, jeweils gleich- und gegensinnig, koaxial und nebeneinander. Gezeigt ist: für Linienwirbel gilt $E_{\mathrm{mut}} = -(\rho\Gamma_1\Gamma_2/2\pi)\ln d$ je Längeneinheit. Gleichsinnige Wirbel haben bei Annäherung die höhere Energie; die Ableitung $-\partial E/\partial d$ geht wie $1/d$, nicht wie die Coulomb-Kraft $1/d^2$. An gaußschen Kernen sättigt die Energie, die Kraft der Energieminimierung geht gegen null. Geschlossene Ringe wechselwirken wie Dipole: im Fernfeld ist $E_{\mathrm{mut}} \propto 1/d^3$ (koaxial positiv bei gleichem Vorzeichen, nebeneinander negativ), die zugehörige Kraft also wie $1/d^4$. Freie Wirbel folgen der Helmholtz–Kirchhoff-Dynamik und ändern d nicht von selbst: gleichsinnige Linienpaare umlaufen einander, gegensinnige wandern geradlinig, gleichsinnige koaxiale Ringe durchspringen einander. Festgehaltene Linienwirbel erfahren die Magnus-Kraft $\mathbf{F} = \rho\boldsymbol{\Gamma} \times \mathbf{U}$; gleichsinnige ziehen sich an, wie parallele Ströme, also mit umgekehrtem Vorzeichen zur Elektrostatik (wie schon die Bjerknes-Kraft). Eine Coulomb-Abstoßung $\propto 1/r$ entsteht in keiner gerechneten Konfiguration.

Wirbellinien können einander im idealen Medium nicht kreuzen (Helmholtz, Kelvin); Rekombination verlangt Viskosität. Die Helizität ist eine Invariante. Die Selbstverkettung eines Torusknotens $T(p,q)$ in der Torusrahmung ist $Sl = pq = Wr + Tw$ (Călugăreanu, hier numerisch geprüft). Ein Möbiusband hat die Verdrillung $Tw = \frac{1}{2}$ je Umlauf und kehrt erst nach 4π zur selben Seite zurück; das ist gezeigte Geometrie. Die Zuordnung zum Elektronspin $\frac{1}{2}$ stützt die Messung: Ein Spin-$\frac{1}{2}$-Teilchen kehrt gemessen erst nach 4π zur selben Phase zurück (Neutroneninterferometrie, Rauch und Kollegen sowie Werner und Kollegen, 1975), genau wie das Möbiusband. Der Satz vom Igel erzwingt zwei gegenüberliegende Wirbel auf einer Kugel. Die Isotopieverschiebung — Massenverschiebung $(\mu_D - \mu_H)/\mu_H = 2{,}721 \cdot 10^{-4}$ und Feldverschiebung $\propto |\psi(0)|^2 \Delta\langle r^2\rangle$ — ist ein gemessener Prüfstein, den jeder Kandidat aus Druck oder Knotengröße bestehen muss; bestanden wird er von der s-Welle des Wellenleiters, die am Kern maximal ist (Anhang E). Im Leitbild dieser Notiz ist der kleine Torusknoten der Kern, die präzedierende Rosette die Unterdruck-Schale — nicht das umgekehrte, und nicht maßstäblich ($R_p/a_0 \approx 1{,}6 \cdot 10^{-5}$). Physiker sagen „Elektron“ zu drei verschiedenen Zuständen des Mediums: frei (außerhalb von Atomen), als Schalen-Elektron (viele Grundteilchen in der Unterdruckzone) und am Kern (Einfang, β-Zerfall, Kontaktterm). Gemeinsam, wie gemessen: eine Elementarladung, Spin $\frac{1}{2}$ und m_e. Die Ladung ist dabei gemessen exakt gequantelt: Atome sind auf $10^{-21}\,e$ neutral (Bressi und Kollegen, 2011), freie und gebundene Elektronen tragen dieselbe Ladung e. Deshalb ist die Ladung keine Anzahl von Grundteilchen, sondern eine Eigenschaft der Struktur: eine geschlossene Unterdruckzone mit einem Umlauf, ganzzahlig wie die gemessene Quantelung der

Zirkulation in suprafluidem Helium (Vinen, 1961). Die Zahl der Grundteilchen in der Zone legt die Masse fest, nicht die Ladung. Das Zeitmittel der Schalen-Rosette verschwindet am Ursprung, während $|\psi_{1s}(0)|^2 = 1/(\pi a_0^3)$ am Kern maximal ist (Hyperfeinlinie, Elektroneneinfang). Ob ein nach innen übertragener Druck die kleine Kernfläche erreicht, wird als Kandidat abgeschätzt. Als Coulomb-Kandidat wird die sekundäre Bjerknes-Kraft getriebener Pulsatoren geprüft: verschiedene Eigenfrequenzen stoßen sich ab, wenn ω dazwischen liegt („gleich verbindet, ungleich trennt“); identische Elektronen bleiben gleichphasig und ziehen sich an. Eine stabile Gegenphase existiert für Selbstschwinger ohne starken gemeinsamen Treiber, als eine von zwei Wannen.

D.1 Fragestellung

In den begleitenden Notizen sind Elementarteilchen Anregungen eines einzigen barotropen Mediums $\Delta p = c^2 \Delta \rho$: Wirbel, Schwingungen, geschlossene Fäden [1, 2, 3, 4]. Eine stehende Regel lautet, dass sich Wirbel nicht kreuzen dürfen („keine Geisterfahrer“). Wo Orbitale oder Glockenkurven in der Ebene überlappen, soll das nur der zweidimensionale Schatten dreidimensionaler Fäden sein, die nebeneinander, hintereinander oder verschlungen verlaufen, ohne sich zu durchdringen.

Daraus entsteht die Frage, ob diese Hydrodynamik die Coulomb-Abstoßung gleicher Teilchen tragen kann: zwei Elektronen stoßen sich mit $k e^2 / d^2$ ab, stärker in der Nähe. Die Bjerknes-Notiz hat bereits gezeigt, dass gleichphasige identische Pulsatoren sich anziehen — das umgekehrte Vorzeichen [4, 5]. Hier wird der andere Kandidat geprüft: die gegenseitige kinetische Energie zweier Wirbel und die Kraft, die daraus folgt, wenn man sie als Potenzial liest oder die Wirbel festhält.

Das Leitbild, das diese Stücke zusammenhält, steht voran: ein winziger Torusknoten im Zentrum ist der Kern, eine geschlossene präzedierende Ellipse weit außen die Unterdruck-Schale (das Schalen-Elektron), dazwischen eine leere Lücke. Der Knoten ist nicht das Elektron. Die Wörter Grundteilchen, die drei Elektronen (frei, auf der Schale, am Kern) und Kern werden zu Beginn des Leitbilds festgehalten.

Weitere Stücke gehören dazu. Erstens die topologische Sperre gegen das Kreuzen (Helmholtz, Kelvin, Helizität) und die Energie, zwei Kerne zusammenzudrücken. Die Kullback–Leibler-Divergenz und die projizierte Überlappung S werden nur als Maße am Schatten geführt, nicht als dreidimensionale Kraft. Zweitens die (p, q)-Torusknoten als kleine Kernanregung, mit der zweiachsigen Mode der Massen-Notiz als Geometrie [3]. Drittens das Möbiusband: eine halbe Verdrillung, Rückkehr zur selben Seite erst nach 4π, und die Zerlegung $Sl = Wr + Tw$. Viertens der Satz vom Igel, das Zeitmittel der Schalen-Rosette gegen die Wasserstoffdichte, und die Isotopieverschiebung samt dem Kandidaten, dass ein Druck der Schale nach innen auf die kleine Kernfläche geht. Fünftens der Kandidat, die Coulomb-Abstoßung gleicher Elektronen aus der sekundären Bjerknes-Kraft getriebener Pulsatoren zu lesen, und die Frage, was die Phasensymmetrie zweier identischer Elektronen brechen kann.

Die Konstante der Zustandsgleichung ist c^2; das Zeichen K steht in diesem Anhang nur für das elliptische Integral. Die Coulomb-Konstante heißt k. Wellenzahlen heißen $q = \omega / c_s$. Bei jedem Ergebnis steht, ob es gerechnet, gemessen oder zugeordnet ist. Gezeigt heißt hier: gerechnet oder als Satz angewandt. Wo keine Coulomb-Form herauskommt, steht das klar, und es steht dabei, woher sie stattdessen kommt.

D.2 Leitbild

Begriffe. Physiker sagen „Elektron“ und meinen damit drei verschiedene Dinge. Im Medium sind das drei verschiedene Zustände.

Grundteilchen die Teilchen des Mediums selbst, die Exkluonen.

Freies Elektron das Elektron außerhalb von Atomen (Strahl, Röhre).

Schalen-Elektron viele Grundteilchen, die in der Unterdruckzone der Schale schwimmen. Die Punkte der Wolkenbilder sind in dieser Lesart diese Grundteilchen (Abbildung 50).

Elektron am Kern das, was Elektroneneinfang, β-Zerfall und die Kontaktdichte $|\psi(0)|^2$ meinen.

Kern der geschlossene Knotenwirbel im Zentrum (Abbildung 42).

Gemeinsam haben die drei Elektronen, wie gemessen: eine Elementarladung, Spin $\frac{1}{2}$ und die Masse m_e. Wie viele Grundteilchen genau eine gemessene Elementarladung ergeben, beantwortet die Quantelung: Die Ladung ist ein Umlauf der Zone, keine Anzahl. Die Standard-Quantenmechanik liest die Punkte einer Lehrbuchwolke als gezogene Aufenthaltsorte eines Elektrons.

Abbildung 42 fasst die Rollen zusammen. Im Zentrum sitzt ein kleiner Torusknoten — gezeichnet als $T(2,3)$ mit den räumlichen Über- und Unterkreuzungen — und dieser Knoten ist der Kern. Weit außen liegt eine geschlossene präzedierende Ellipse mit zehn Keulen, $r(\theta) = p/(1 + e\cos(k\theta))$, $k = N/(N+m) = 10/11$, $e = 0{,}4$ [3]. Das ist die Unterdruck-Schale: darin schwimmen viele Grundteilchen, das Schalen-Elektron. Ihr Periapsisabstand $r_{\min} = p/(1+e)$ ist positiv: zwischen Kernknoten und Rosette bleibt eine Kreisscheibe leer, keine Bahnlinie trifft den Ursprung.

Die Zeichnung ist nicht maßstäblich. Das wirkliche Größenverhältnis ist

$$\frac{R_p}{a_0} \approx 1{,}59 \cdot 10^{-5} \tag{203}$$

($R_p \approx 0{,}84\,\mathrm{fm}$, $a_0 \approx 5{,}29 \cdot 10^4\,\mathrm{fm}$). Auf einer maßstäblichen Figur wäre der Kern unsichtbar. Die Massen-Notiz hat dieselbe Knotengeometrie als Kandidaten für Leptonenmassen geprüft und die Verhältnisse $206{,}768$ und $3477{,}2$ nicht erhalten [3]. Das Leitbild hier setzt den kleinen Knoten nicht mit dem Elektron gleich. Das Zeitmittel dieser Rosette gegen die Wasserstoffdichte steht in Abschnitt D.11; der Kandidat, dass ein Druck der Schale nach innen auf die Kernfläche geht, in Abschnitt D.13; der Bjerknes-Kandidat für Coulomb in Abschnitt D.14.

D.3 Gleichungen

Das Medium ist barotrop mit

$$\Delta p = c^2 \Delta\rho\,, \qquad h = c^2 \ln\frac{\rho}{\rho_\infty}\,, \qquad c_s^2 = c^2\,. \tag{204}$$

Eine frühere Fassung rechnete hier mit dem Phasengesetz einer dichten Phase; die Ergebnisse dieses Anhangs hängen nur von der ersten Ordnung ab und bleiben gleich (Abschnitt B.1.1). Die Rechnungen zur Wechselwirkungsenergie gelten zuerst im idealen unzusammendrückbaren Grenzfall. Kompressible Korrekturen sind




Abbildung 42: Leitbild, nicht maßstäblich. Orange: kleiner Torusknoten mit korrekten Über-/Unterkreuzungen — das ist der Kern (geschlossener Knotenwirbel), nicht das Elektron. Blau: das Schalen-Elektron — viele Grundteilchen in der Unterdruck-Schale — gezeichnet als geschlossene präzedierende Ellipse mit zehn Keulen und leerer Mitte ($r_{\min} > 0$). Das wirkliche Verhältnis Kernradius/Bohr-Radius ist $R_p/a_0 \approx 1{,}6 \cdot 10^{-5}$.

vom Typ $\mathcal{O}((U/c_s)^2)$ und werden in Abschnitt D.6 beziffert; sie ändern die Multipolordnung nicht.

Im Unzusammendrückbaren folgt die Geschwindigkeit eines dünnen Wirbelfadens aus dem Biot–Savart-Gesetz

$$\mathbf{u}(\mathbf{x}) = \frac{\Gamma}{4\pi} \oint \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\ell} \times (\mathbf{x} - \mathbf{r})}{|\mathbf{x} - \mathbf{r}|^3} \,. \tag{205}$$

Die gegenseitige kinetische Energie zweier geschlossener Fäden ist das Neumann-Integral

$$E_{\mathrm{mut}} = \frac{\rho \Gamma_1 \Gamma_2}{4\pi} \oint \oint \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}_1 \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}_2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \,. \tag{206}$$

Das ist dieselbe Geometrie wie die Gegeninduktivität M zweier Stromschleifen,

$$E_{\mathrm{mut}} = \frac{\rho \Gamma_1 \Gamma_2}{\mu_0} \, M \,. \tag{207}$$

Die Analogie Wirbel–Strom hat dasselbe Vorzeichen wie die Magnetostatik und das umgekehrte zur Elektrostatik [12, 13].

Für zwei parallele Linienwirbel je Längeneinheit gilt

$$\frac{E_{\mathrm{mut}}}{L} = -\frac{\rho\Gamma_1\Gamma_2}{2\pi}\ln\frac{d}{\ell} = \frac{\rho\Gamma_1\Gamma_2}{2\pi}\ln\frac{\ell}{d}\,, \tag{208}$$

mit einem äußeren Vergleichslänge ℓ (etwa dem Kastenradius), der die Infrarotdivergenz des Logarithmus trägt. Gleichsinnige Zirkulation ($\Gamma_1\Gamma_2 > 0$) hat bei kleinem d die höhere Energie.

Gaußsche Kerne der Breite σ, $\omega = (\Gamma/(\pi\sigma^2))\exp(-r^2/\sigma^2)$, regularisieren den Ursprung. Symbolisch und numerisch geprüft ist

$$\frac{E_{\mathrm{mut}}}{\rho\Gamma_1\Gamma_2} = -\frac{1}{2\pi}\ln\frac{d}{\sigma} + \frac{1}{4\pi}\,\mathrm{Ei}\!\left(-\frac{d^2}{2\sigma^2}\right)\,, \tag{209}$$

endlich bei $d = 0$:

$$e(0) = \frac{\gamma_E - \ln 2}{4\pi} \approx -0{,}009226\,. \tag{210}$$

Die Ableitung lautet

$$\frac{1}{\rho\Gamma_1\Gamma_2}\frac{\partial E}{\partial d} = -\frac{1-\mathrm{e}^{-d^2/(2\sigma^2)}}{2\pi d}\,. \tag{211}$$

Liest man $F = -\partial E/\partial d$ als Kraft der Energieminimierung, so ist sie für gleichsinnige Wirbel eine Abstoßung $\propto 1/d$ im Bereich $d \gg \sigma$ und geht gegen null für $d \to 0$.

Die Sätze von Helmholtz und Kelvin bleiben in Kraft [9, 2]: Wirbellinien sind materielle Linien, ihre Zirkulation bleibt erhalten, und sie können einander im idealen Medium nicht durchschneiden. Die Helizität

$$H = \int \mathbf{u}\cdot\boldsymbol{\omega}\,\mathrm{d}V = \sum_i \Gamma_i^2\, Sl_i + 2\sum_{i<j}\Gamma_i\Gamma_j\, Lk_{ij} \tag{212}$$

ist eine Invariante [10, 11]. Die Selbstverkettung zerlegt sich nach Călugăreanu in Windung und Verdrillung,

$$Sl = Wr + Tw\,. \tag{213}$$

D.4 Linienwirbel

Abbildung 43a zeigt (209) für beide Vorzeichen. Gleichsinnig fällt die Energie mit wachsendem Abstand (der Logarithmus wird negativer); gegensinnig ist es umgekehrt. Vom Abstand 20σ auf 2σ steigt die gleichsinnige Energie um $\Delta e = 0{,}363$, gegen $(1/2\pi)\ln 10 = 0{,}366$ für Punktwirbel. Das ist ein logarithmischer Preis, kein Coulomb-Potenzial $1/d$.

Abbildung 43b zeigt $|F| = |-\partial E/\partial d|$. Im Fernfeld $d \gtrsim 5\sigma$ ist der lokale Exponent $-1{,}000$. Die Coulomb-Kraft $1/d^2$ ist steiler und wird von der Kurve nicht getroffen. Nahe am Kern, $d \sim \sigma$, biegt F ab und geht gegen null: vollständige Überlappung glatter Kerne ist ein glattes Maximum der Energie, keine divergente Wand.

Zwei Lesarten der Kraft dürfen nicht vermengt werden.

Bemerkung 12. Freie Linienwirbel bewegen sich mit der lokal induzierten Geschwindigkeit. Gleichsinnige umlaufen den gemeinsamen Wirbelschwerpunkt bei festem d; gegensinnige wandern geradlinig bei festem d (Abbildung 45a). Es gibt keine Radialbewegung und damit keine Coulomb-Bahn.




Abbildung 43: (a) Gegenseitige Energie zweier Linienwirbel mit gaußschen Kernen, in Einheiten $\rho\Gamma_1\Gamma_2$. Gleichsinnig liegt die Energie bei kleinem Abstand höher. Die punktierte Linie ist der unregularisierte Logarithmus. (b) Betrag von $F = -\partial E/\partial d$. Im Fernfeld wie $1/d$, nicht wie die Coulomb-Kraft $1/d^2$. Bei $d \to 0$ geht F gegen null.

Hält man die Wirbel fest (etwa angeheftet an Kern oder Hof), so übt das Medium die Magnus- bzw. Kutta–Joukowski-Kraft $\mathbf{F} = \rho\boldsymbol{\Gamma} \times \mathbf{U}$ aus. Für parallele Linien ist $|F| = \rho|\Gamma_1\Gamma_2|/(2\pi d)$, und gleichsinnige ziehen sich an. Das ist dasselbe Vorzeichen wie bei parallelen elektrischen Strömen und das umgekehrte zur Elektrostatik — analog zum Bjerknes-Vorzeichen [4].

Die dritte Lesart nimmt $F = -\nabla E$ und minimiert die kinetische Energie (wie in einem dissipativen Superfluid). Dann stoßen sich gleichsinnige Linienwirbel logarithmisch ab. Diese Dynamik ist nicht die ideale Euler-Gleichung: Helmholtz erhält die Abstände eines Paares, statt die Energie zu minimieren. Auch diese Lesart liefert $F \propto 1/d$, nicht $1/d^2$.

Keine der drei Lesarten trägt die dreidimensionale Coulomb-Kraft gleicher Ladungen.

D.5 Wirbelringe

Für zwei koaxiale Kreise der Radien R_1, R_2 im Abstand d ist (206) geschlossen auswertbar,

$$E_{\mathrm{mut}} = \rho\Gamma_1\Gamma_2\sqrt{R_1R_2}\,\frac{2}{k}\Big[\big(1-\tfrac{1}{2}k^2\big)K(k) - E(k)\Big], \tag{214}$$

mit $k^2 = 4R_1R_2/[(R_1+R_2)^2+d^2]$ und den vollständigen elliptischen Integralen K und E. Ein diskretes Neumann-Integral auf 900 Sehnen reproduziert (214) relativ auf mindestens 10^{-12}.

Im Fernfeld $d \gg R$ (gleiche Radien) gilt der Dipolterm

$$E_{\mathrm{mut}} = \frac{\rho \Gamma_1 \Gamma_2 \, \pi R^4}{2 d^3} \qquad \text{(koaxial)}\,. \tag{215}$$

Der gemessene Vorfaktor $e\, d^3/R^4$ ist $1{,}554$ gegen $\pi/2 \approx 1{,}571$ (Mittel über $d > 12R$). Der lokale Exponent von E_{mut} geht von $-0{,}69$ bei $d = 0{,}3R$ über $-1{,}45$ bei $d = R$ und $-2{,}51$ bei $d = 3R$ auf $-2{,}97$ bei $d = 15R$, gegen -3. Die Kraft $F = -\partial E/\partial d$ hat dort den Exponenten $-3{,}96$, gegen -4.

Zwei Ringe derselben Ebene, Mittelpunkte im Abstand $d > 2R$, werden durch das diskrete Neumann-Integral beschrieben. Im Fernfeld steht der äquatoriale Dipolterm

$$E_{\mathrm{mut}} = -\frac{\rho \Gamma_1 \Gamma_2 \, \pi R^4}{4 d^3} \qquad \text{(nebeneinander)}\,. \tag{216}$$

Der Vorfaktor ist $-0{,}793$ gegen $-\pi/4 \approx -0{,}785$; der Exponent von $|E_{\mathrm{mut}}|$ ist $-3{,}02$ bei $d = 15R$. Gleichsinnige Ringe haben hier negative gegenseitige Energie, koaxial positive: dieselbe Anisotropie wie zwei magnetische Dipole, kein Monopol $\propto 1/d$.




Abbildung 44: (a) Gegenseitige Energie zweier koaxialer Ringe gleichen Radius. Gleichsinnig positiv, im Fernfeld wie $1/d^3$. (b) Dieselben Ringe nebeneinander (parallele Achsen, gemeinsame Ebene). Gleichsinnig negativ, im Fernfeld wie $-1/d^3$. Die senkrechte Linie markiert die Berührung $d = 2R$.

Gleichsinnige koaxiale Ringe sitzen nicht still: der hintere wird enger und schneller, durchspringt den vorderen und die Rollen tauschen sich (Leapfrogging) [2]. Die am Filament induzierte Geschwindigkeit eines Rings vom Radius R bestätigt die Signatur. Am Ort eines zweiten Rings derselben Größe im Abstand $d = R$ ist die Radialkomponente $u_s = +0{,}0910\,\Gamma/R > 0$: der vordere Ring weitet sich. Die Achsenkomponente am Filament ist $u_z = 0{,}0768\,\Gamma/R$, kleiner als der Wert auf der Achse, $\Gamma R^2/(2(R^2+d^2)^{3/2}) = 0{,}1768\,\Gamma/R$. Bei gleichen, festgehaltenen Radien bleibt der Abstand d konstant, weil beide dieselbe u_z sehen; die freie Dynamik öffnet die Radien und liefert das Durchspringen, keine Coulomb-Bahn.




Abbildung 45: (a) Helmholtz-Bahnen zweier Linienwirbel. Gleichsinnig: gemeinsamer Umlauf bei festem Abstand. Gegensinnig: Translation bei festem Abstand. (b) Abstandsabhängigkeit von $|F|$, jeweils so normiert, dass der Wert bei $d = 1$ gleich 1 ist. Coulomb $1/d^2$, Linienwirbel $1/d$, Ring-Fernfeld $1/d^4$.

D.6 Kompressibilität

Im Medium setzt die Verdünnung des Kerns die Dicke $a = \Gamma/(2\pi\sqrt{2}\,c_s)$, dort ist $\rho = \rho_\infty/e$ [2]. Die Kelvin-Geschwindigkeit eines dünnen Rings ist $U = (\Gamma/4\pi R)(\ln(8R/a) - 1/4)$, also

$$\frac{U}{c_s} = \frac{a}{R}\,\frac{\Lambda}{\sqrt{2}}\,, \qquad \Lambda = \ln(8R/a) - \tfrac{1}{4}\,. \tag{217}$$

Zahlen: $U/c_s = 0{,}292$ bei $R/a = 10$, $0{,}171$ bei $R/a = 20$ und $0{,}081$ bei $R/a = 50$. Die inkompressible Näherung ist für schlanke Ringe kontrolliert, für dicke nur mäßig. Endliches c_s bringt Verzögerung und Schallabstrahlung der Ordnung M^2, aber kein Monopol in der Wirbel–Wirbel-Energie: $\nabla\cdot\boldsymbol{\omega} = 0$ bleibt bestehen, das Fernfeld eines geschlossenen Fadens bleibt ein Dipol $|\mathbf{u}| \propto 1/r^3$ [1]. Eine Lücke im Anregungsspektrum hat das reine Medium nicht.

D.7 Nichtkreuzen und der Schatten

Im idealen Medium können sich Wirbellinien weder selbst noch einander durchschneiden. Rekombination — der Zerfall verknoteter Ringe im Experiment — verlangt Viskosität [14, 2]. Die Helizität (212) ist dann streng erhalten.

Den Preis, zwei gleichsinnige Kerne von 20σ auf 2σ zusammenzudrücken, misst die logarithmische Differenz $\Delta E = 0{,}363\,\rho\Gamma_1\Gamma_2$ je Längeneinheit. Das ist keine Wand $\propto 1/d$ oder $1/d^2$, sondern derselbe Logarithmus wie (208), abgeschnitten an der Kerngröße. Eine harte Sperre gegen das Kreuzen setzt erst bei $d \sim 2a$ ein und bleibt eine topologische, keine Coulomb-Bedingung.

Die projizierten Glocken auf dem Papier sind ein anderes Objekt. Für zwei gleich breite Gaußkurven gilt

$$S = \exp\!\left(-\Delta\mu^2/(4\sigma^2)\right), \qquad D_{\mathrm{KL}} = \Delta\mu^2/(2\sigma^2)\,. \tag{218}$$

S ist groß, wenn die Schatten nah beieinanderliegen ($S(0) = 1$, $S(\sigma) = 0{,}779$, $S(2\sigma) = 0{,}368$). D_{KL} ist null bei Koinzidenz und wächst mit dem Abstand ($D_{\mathrm{KL}}(\sigma) = 1/2$, $D_{\mathrm{KL}}(2\sigma) = 2$). Die Kullback–Leibler-Divergenz misst also nicht eine Abstoßung in der Nähe; sie misst, wie verschieden zwei Verteilungen sind. Als Kraftgesetz taugt keines der beiden Maße: sie leben auf der Projektion.

Der Schatten täuscht. Ein und dieselbe Silhouette kann zu verschiedenen dreidimensionalen Kurven gehören. Abbildung 46b zeigt die Projektion einer geschlossenen Raumkurve ohne Über-/Unterinformation: der Knotentyp ist daraus nicht lesbar. Dieselbe Silhouette mit den tatsächlichen Höhen (Abbildung 46c) legt die Vorzeichen der Kreuzungen fest und damit Verkettung, Windung und Helizität. Ein anderes Hebungsmuster — etwa das Umlegen einer einzigen Kreuzung — macht aus dem Kleeblatt den Unknoten, bei identischem Schatten. Auch eine nicht geschlossene, gar nicht verknotete Schleife (ein verbogener Pfeifenreiniger) kann denselben Schatten werfen. Helizität und Verschlingungszahl hängen an den dreidimensionalen Kreuzungen, nicht an der Silhouette. Dass zwei Schatten sich überlappen, heißt nicht, dass die Fäden einander durchdringen.




Abbildung 46: (a) Überlappung S und Kullback–Leibler-Divergenz zweier gleich breiter Gaußkurven. S fällt mit dem Abstand, D_{KL} wächst. (b) Nur der Schatten einer geschlossenen Raumkurve: der Knotentyp bleibt unbestimmt. (c) Dieselbe Projektion mit den Über-/Unterkreuzungen der räumlichen Kurve. Die Zuordnung einer Silhouette zu einem Knotentyp ist ohne diese Information nicht erlaubt.

D.8 (p,q)-Torusknoten

Im Leitbild von Abschnitt D.2 ist der kleine Torusknoten der Kern. Die Helizität und die Selbstverkettung unten gelten für diesen Kernfaden; sie machen aus ihm kein Elektron. Das Schalen-Elektron sitzt auf der äußeren Rosette, deren Zone den Kern nicht trifft. Das Elektron am Kern ist ein anderer Zustand.

Die zweiachsige Mode der Massen-Notiz — gleichzeitige poloidale und toroidale Winkel $\omega_x : \omega_y = p : q$ — ist im Torusbild ein Torusknoten $T(p,q)$ [3]. Der Faden liegt auf einem Ringtorus (großer Radius R, kleiner Radius r, $R > r$), umläuft ihn p-mal längs und q-mal meridional und durchquert den Mittelpunkt nicht: der kleinste Abstand vom Ursprung ist $R - r$. Auf einem Horntorus $R = r$ trifft die Standardparametrisierung den Ursprung (hier $\min|\mathbf{r}| \sim 10^{-16}$ in der Diskretisierung). Das würde auf der Kernskala eine Linie durch die eigene Mitte des Knotens bedeuten. Deshalb bleibt der Ringtorus mit sichtbarer Öffnung das passende Bild für den Kernfaden (Abbildung 47a). Die Regel, dass keine Linie durch den Atomkern geht, betrifft die Elektronenschale: deren $r_{\min}$ liegt weit über der Kerngröße.

Die Selbstverkettung gegen eine Verschiebung nach wachsendem kleinem Radius — die natürliche Torusrahmung — ist das Gauss'sche Verschlingungsintegral. Gerechnet für $(p,q) \in \{(1,1),(1,2),(1,3),(2,3),(2,5),(3,4),(3,5)\}$ gilt

$$Sl\big(T(p,q)\big) = pq \tag{219}$$

auf mindestens vier geltende Ziffern (für $T(2,3)$: $Sl = 6{,}0001$). Mit (212) ist die Helizität einer einzelnen solchen Röhre

$$H = pq\,\Gamma^2\,, \tag{220}$$

solange keine extra innere Verdrillung zur Torusrahmung hinzukommt. Zwei geschachtelte $T(2,3)$ auf Tori mit $r = 0{,}22$ und $r = 0{,}48$ (bei $R = 1$) haben den Mindestabstand $0{,}230$ — genau die Differenz der kleinen Radien — und die Verkettung $Lk = 6$. In der Aufsicht überlappen sich ihre Schatten (Abbildung 47b); im Raum kreuzen sie sich nicht.

Die SU(2)-Parität dieser Moden ist in der Massen-Notiz gerechnet: beide Indizes ungerade ergibt den 4π-Typ, sonst den 2π-Typ [3]. Das ist eine Eigenschaft des Lifts, keine Herleitung des Elektronspins. Als Leptonenkandidat in der Massen-Notiz liefert dieselbe Geometrie die Verhältnisse $206{,}768$ und $3477{,}2$ nicht; im Leitbild hier ist der Knoten der Kern, nicht das Elektron.

D.9 Möbiusband und die Zerlegung $Sl = Wr + Tw$

Ein Möbiusband entsteht aus einem Streifen durch eine halbe Verdrillung ($180°$), bevor die Enden zusammengefügt werden. Der Streifen hat nur eine Seite und nur einen Rand. Ein Normalenvektor, der quer über das Band zeigt, kehrt nach einem Umlauf $\varphi = 2\pi$ entgegengesetzt zurück und erst nach zwei Umläufen, $\varphi = 4\pi$, in sich selbst (Abbildung 48). Das ist klassische Geometrie und hier nachgerechnet: die Verdrillung der Möbius-Rahmung eines planaren Kreises ist

$$Tw(2\pi) = \tfrac{1}{2}\,, \qquad Tw(4\pi) = 1 \tag{221}$$

(numerisch $0{,}4994$ und $0{,}9994$). Windung des planaren Kreises selbst ist $Wr = 0$.




Abbildung 47: (a) Ein $T(2,3)$ auf einem Ringtorus. Die Mitte bleibt leer; der Faden trifft den Ursprung nicht. (b) Zwei $T(2,3)$ auf geschachtelten Tori, nahezu in der Aufsicht. Die Schatten überlappen, der räumliche Mindestabstand bleibt die Differenz der kleinen Radien.

Dieselbe Zerlegung gilt für die Torusrahmung der Knoten aus Abschnitt D.8. Windung (Gauss-Integral der Kurve mit sich selbst) und Verdrillung (Linienintegral der Rahmung) addieren sich zur Selbstverkettung. Für $r/R = 0{,}32$ ist zum Beispiel

$$\begin{aligned} T(1,1):&\quad Wr = 0{,}008\,, \quad Tw = 0{,}992\,, \quad Wr + Tw = 1 = pq\,,\\ T(2,3):&\quad Wr = 3{,}213\,, \quad Tw = 2{,}787\,, \quad Wr + Tw = 6 = pq\,,\\ T(2,5):&\quad Wr = 6{,}047\,, \quad Tw = 3{,}953\,, \quad Wr + Tw = 10 = pq\,. \end{aligned} \tag{222}$$

Wr und Tw einzeln hängen vom Achsenverhältnis des Torus ab; ihre Summe, $Sl = pq$, nicht. Ein planarer Kreis mit Verschiebung senkrecht zur Ebene hat $Wr = Tw = Sl = 0$, wie verlangt.

Die Geometrie ist damit gezeigt: halbe Verdrillung, Rückkehr zur selben Seite nach 4π, und $Sl = Wr + Tw$. In der Massen-Notiz ist dieselbe 4π-Periodizität die Rückkehr in $\mathrm{SU}(2)$ und, im Toruslift, der fermionartige Typ wenn p und q beide ungerade sind [3]. Ein Wirbel, der am Medium hängt wie das Band im Gürteltrick, ist der natürliche Träger dieser Periodizität — im Unterschied zum freien starren Körper, der in $\mathrm{SO}(3)$ schon nach 2π zurückkehrt.

Bemerkung 13. Die Zuordnung „Möbiusband $\Rightarrow$ Elektronspin $\frac{1}{2}$“ stützt die Messung: Gemessen kehrt ein Spin-$\frac{1}{2}$-Teilchen erst nach einer Drehung um 4π zur selben Phase zurück (Neutroneninterferometrie, 1975), und der Betrag $\hbar/2$ ist gemessen (Stern–Gerlach, 1922; $g_e/2 = 1{,}00115965218$). Das Möbiusband ist die Geometrie mit genau dieser Periode. Formal wäre $H = \Gamma^2/2$ für einen planaren Faden mit $Wr = 0$ und $Tw = \frac{1}{2}$; das sieht aus wie ein halbes Helizitätsquantum, ist aber keine Herleitung von $\hbar/2$ und kein Massenspektrum; der Betrag $\hbar/2$ ist gemessen. Eine Wirbelröhre trägt die halbe Verdrillung, ohne ihre Einbettung als Schlauch zu verlieren: Die Röhre selbst bleibt orientierbar, die halbe Verdrillung sitzt als Linienmuster auf

(a) Möbiusband, halbe Verdrillung (b) Normalen: nach 2π umgekehrt, nach 4π gleich




Abbildung 48: (a) Möbiusband mit halber Verdrillung, Mittellinie orange. (b) Normalen der Rahmung längs der Mittellinie. Nach einem Umlauf 2π zeigt die Normale entgegengesetzt, nach 4π wieder gleich. Das ist die Geometrie des Gürteltricks und der $\mathrm{SU}(2)$-Periodizität.

ihrer Oberfläche, und eine solche Linie schließt sich erst nach zwei Umläufen, wie der Rand des Möbiusbands. Gemessen sind verdrillte und verknotete Wirbelröhren in Wasser, deren Helizität einschließlich der Verdrillung erhalten bleibt (Kleckner und Irvine, 2013; Scheeler und Kollegen, 2017). Gezeigt ist die Geometrie; der Spin ist gemessen.

D.10 Satz vom Igel

Auf der Zweitsphäre gibt es kein nirgends verschwindendes stetiges Tangentialfeld (Satz vom Igel). Äquivalent, nach Poincaré–Hopf: jedes stetige Tangentialfeld auf S^2 hat Singularitäten, deren Indizes sich zu $\chi(S^2) = 2$ addieren. Die starre Drehung einer Kugel realisiert das durch zwei Wirbel vom Index $+1$ an den Polen — gegenüber, nicht frei wählbar (Abbildung 49a). Zwei gegenüberliegende Wirbel auf einer Kugelfläche sind topologisch erzwungen, sobald die Strömung überall tangential zur Sphäre sein soll.

Das schließt an den Wirbeldipol der Hof-Notiz an [1]: Nord- und Südpol wie beim Magnetfeld, und $|\boldsymbol{\omega}| \propto 1/r^3$. Wirbellinien enden nach Helmholtz nicht im Innern der Flüssigkeit ($\nabla \cdot \boldsymbol{\omega} = 0$); magnetische Feldlinien enden nicht, weil $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ ist. Ein magnetischer Monopol ist nie gefunden worden. Die geschlossenen Dipollinien (Abbildung 49b) sind dasselbe Bild. Beides verbietet zugleich ein Coulomb-Monopol aus einem endenden Wirbelfaden: ein solcher Faden dürfte nicht aufhören.

Auf einer geschlossenen Kugelschale gilt überdies $\sum_i \Gamma_i = 0$ [1]. N gleiche Wirbelstürme allein sind unvollständig; es braucht einen Ausgleich. Das widerspricht dem Bild nicht, es beschränkt die Schichten.




Abbildung 49: (a) Tangentialströmung einer rotierenden Kugel: Stromlinien längs der Breitenkreise, Singularitäten an den beiden Polen. Der Satz vom Igel verlangt eine Indexsumme 2. (b) Geschlossene Dipollinien, außen durchgezogen, innen gestrichelt. Sie enden nicht ($\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 = \nabla \cdot \boldsymbol{\omega}$).

D.11 Zeitmittel der Schalen-Rosette

Die Unterdruck-Schale folgt im Leitbild der geschlossenen präzedierenden Ellipse

$$r(\theta) = \frac{p}{1 + e\cos(k\theta)}\,, \qquad k = \frac{N}{N+m}\,. \tag{223}$$

Für jede Zentralkraft gilt der Flächensatz, $\mathrm{d}t \propto r^2\,\mathrm{d}\theta$. Das Zeitmittel — die Punkte in Abbildung 50a — ist deshalb mit diesem Gewicht zu bilden. In diesem Bild sind das die Grundteilchen des Schalen-Elektrons, die in der Unterdruckzone schwimmen. Die Standard-Quantenmechanik liest dieselben Punkte einer Lehrbuchwolke als gezogene Aufenthaltsorte eines Elektrons.

Mit $N = 10$, $m = 1$, $e = 0{,}4$ ist $r_{\min}/r_{\max} = (1-e)/(1+e) = 3/7$. Die Rosette wird so skaliert, dass ihr Zeitmittel $\langle r\rangle$ mit dem Wasserstoff-$1s$-Wert $\langle r\rangle_{1s} = \tfrac{3}{2}a_0$ übereinstimmt. Dann folgt

$$r_{\max} = 1{,}944\,a_0\,, \qquad r_{\min} = 0{,}833\,a_0\,. \tag{224}$$

Innen, für $r < r_{\min}$, ist die Schale leer.

Die radiale Aufenthaltsdichte $P(r)$, normiert auf $\int_0^\infty P(r)\,\mathrm{d}r = 1$, steht in Abbildung 50b neben

$$4\pi r^2 |\psi_{1s}|^2 = \frac{4}{a_0}\Big(\frac{r}{a_0}\Big)^2 e^{-2r/a_0} \tag{225}$$

und dem $2s$-Gegenstück $4\pi r^2|\psi_{2s}|^2 = (1/(2a_0))(r/a_0)^2\big(1 - r/(2a_0)\big)^2 e^{-r/a_0}$. An den Umkehrpunkten $r_{\min}$ und $r_{\max}$ verschwindet die Radialgeschwindigkeit; $P(r)$ hat dort integrable Spitzen. Der $2s$-Zustand hat einen radialen Knoten und reicht weit über $2a_0$ hinaus; die eine Rosette endet bei $r_{\max} = 1{,}94\,a_0$ und kann ihn nicht tragen.

Das Lehrbuch-Radialmaß $4\pi r^2|\psi|^2$ verschwindet am Ursprung wegen des Volumenelements r^2, nicht weil $|\psi|^2$ verschwände. Die Dichte selbst ist am Kern maximal:

$$|\psi_{1s}(0)|^2 = \frac{1}{\pi a_0^3} = 0{,}318\,a_0^{-3}\,, \qquad |\psi_{2s}(0)|^2 = \frac{1}{8\pi a_0^3} = 0{,}0398\,a_0^{-3}\,. \tag{226}$$

Genau dieser Kontaktterm trägt die Hyperfeinaufspaltung des Wasserstoff-Grundzustands (21-cm-Linie) und den Elektroneneinfang (K-Einfang); derselbe Kernort meint auch den β-Zerfall. Das ist das Elektron am Kern, nicht das Schalen-Elektron. Die Rosette hat $n(r) = P(r)/(4\pi r^2) = 0$ für alle $r < r_{\min}$, insbesondere $n(0) = 0$ (Abbildung 50c); außerhalb der Lücke erreicht n_{ros} höchstens $0{,}138\,a_0^{-3}$. Eine Mittelung über die Orientierung der Bahnebene macht aus der planaren Wolke eine kugelsymmetrische, ändert $P(r)$ nicht und füllt das Loch nicht.

Gemessen ist das Elektron am Kern: Die Hyperfeinlinie bei $1420{,}405751768\,\text{MHz}$ und der Elektroneneinfang verlangen $|\psi_{1s}(0)|^2 = 1/(\pi a_0^3)$. Das Zeitmittel der Schale liefert dieses Elektron nicht; es liefert die s-Welle des Wellenleiters, die am Kern ihr Maximum hat (Anhang E). Gezeigt ist hier, dass die gezeichnete Schalen-Rosette am Kern streng verschwindet, während $|\psi_{1s}(0)|^2$ dort maximal ist.




Abbildung 50: (a) Zeitmittel der Rosette: Grundteilchen in der Unterdruck-Schale (Schalen-Elektron). Innen $r < r_{\min}$ leer, der Kern als Punkt. (Die Quantenmechanik liest solche Punkte als gezogene Orte eines Elektrons.) (b) Radiale Verteilung $P(r)$ gegen $4\pi r^2|\psi_{1s}|^2$ und $4\pi r^2|\psi_{2s}|^2$, skaliert auf $\langle r\rangle = \frac{3}{2}a_0$. Die Spitzen liegen an den Umkehrpunkten. (c) Dichte $n(r) = P(r)/(4\pi r^2)$. Am Kern ist $|\psi_{1s}(0)|^2 = 1/(\pi a_0^3)$ maximal; die Rosette ist dort null.

D.12 Isotopieverschiebung als Test

Jedes Bild, das verschiedene Isotope als verschiedene Knotengröße, Neutronenzahl oder als Druck auf eine kleine Kernfläche liest, muss die spektroskopische Isotopie-

verschiebung wiedergeben. Sie hat zwei Anteile, und beide sind gemessen.

Der Masseneffekt kommt aus der reduzierten Masse $\mu = m_e m_N/(m_e + m_N)$. Für wasserstoffartige Linien skalieren die Frequenzen in führender Ordnung mit μ. Mit den CODATA-Verhältnissen $m_p/m_e = 1836{,}15267343$ und $m_d/m_e = 3670{,}48296788$ folgt

$$\frac{\mu_D - \mu_H}{\mu_H} = 2{,}721 \cdot 10^{-4}\,, \qquad \frac{\mu_T - \mu_H}{\mu_H} = 3{,}626 \cdot 10^{-4}\,. \tag{227}$$

Das ist der relative Unterschied der Lyman-Linien zwischen Wasserstoff, Deuterium und Tritium (plus dem kleineren spezifischen Masseneffekt, der im Einelektronenatom verschwindet).

Der Feld- oder Volumeneffekt kommt vom endlichen Kern. In nichtrelativistischer Ordnung ist

$$\delta E_{\mathrm{FS}} = \frac{2\pi}{3}\, Z\, ke^2\, |\psi(0)|^2\, \Delta\langle r^2\rangle\,. \tag{228}$$

Er überwiegt bei schweren Atomen. Beim Wasserstoff ist er gegen den Masseneffekt winzig: mit $\Delta\langle r^2\rangle_{D-H} \approx 3{,}82\,\mathrm{fm}^2$ liegt die $1s$-Feldverschiebung bei $2{,}5 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{eV}$, relativ zur Lyman-$\alpha$-Energie $2{,}4 \cdot 10^{-9}$, also um den Faktor $9 \cdot 10^{-6}$ unter der Massenverschiebung (227).

Im Knotenbild hieße ein anderes Isotop ein anderer Kernknoten — größere Seillänge, andere Windungszahl oder mehr Neutronen. Dafür müsste erstens die Trägheitsmasse dieses Knotens proportional zur Isotopenmasse A sein, damit die Zweiteilchenkinematik die reduzierte Masse μ trägt. Zweitens müsste die Ausdehnung des Kernknotens den Elektronenzustand in einem Volumen der Kerngröße so verschieben, wie (228) es mit $|\psi(0)|^2\Delta\langle r^2\rangle$ verlangt, und bei leichten Atomen untergeordnet, bei schweren führend bleiben. Ein Druck, der nur auf eine kleine Fläche wirkt, muss beides gleichzeitig liefern. Die Druckübertragung wird in Abschnitt D.13 abgeschätzt. Den Test als Ganzes beantwortet die Messung: Die Isotopieverschiebung H–D der $1S$–$2S$-Linie ist auf $15\,\mathrm{Hz}$ gemessen ($670\,994\,334\,606\,\mathrm{Hz}$, Parthey und Kollegen, 2010) und durch reduzierte Masse plus Feldverschiebung erklärt. Im Medium ist die Feldverschiebung die Überlappung der s-Welle am Kern mit dem Kernvolumen, $|\psi(0)|^2\Delta\langle r^2\rangle$, und die Massenverschiebung die Mitbewegung des Kerns.

D.13 Druck geht auf die Fläche

Der Kandidat lautet: der Druck der Elektronenschale wird durch das Medium nach innen übertragen und konzentriert sich auf die kleine Kernfläche. Eine andere Kernfläche — ein anderes Isotop — könnte dann die Feldverschiebung (228) tragen. Hier die Abschätzung, ohne den Kandidaten zur Tatsache zu machen.

Im Innern einer kugelsymmetrischen, zeitunabhängigen Störung, regulär im Ursprung, ist die Lösung von $\nabla^2\delta p = 0$ räumlich konstant: die unphysikalische Lösung B/r fällt weg. Es gibt keine Bündelung auf die Kernfläche. Der Druck am Kern ist der Innendruck, von derselben Größenordnung wie der Schalendruck, nicht verstärkt um $(a_0/R_p)^2 \approx 4{,}0 \cdot 10^9$. Die Nettokraft auf den Kern verschwindet ($\oint p\,\mathbf{n}\,\mathrm{d}A = 0$ bei konstantem p). Was bleibt, ist eine isotrope Kompression.

Eine einzelne planare Rosette ist keine Kugelschale. In der Nähe des Ursprungs sind reguläre Lösungen der Laplace-Gleichung trotzdem analytisch: konstant plus quadratische Terme. Die Druckvariation über den Kern ist von der relativen Ordnung $(R_p/a_0)^2 \approx 2{,}53 \cdot 10^{-10}$. Das Zentrum eines Rings ist kein singulärer Punkt.

Für die Volumenarbeit $p\,\Delta V$ mit dem Effektivradius $R_p = \sqrt{\langle r^2\rangle}$ gilt

$$\Delta V = 2\pi R_p\,\Delta\langle r^2\rangle = 2{,}02\cdot 10^{-44}\,\mathrm{m}^3 \tag{229}$$

bei $\Delta\langle r^2\rangle_{D-H} = 3{,}82\,\mathrm{fm}^2$. Die atomare Druckskala ist $p_{\mathrm{at}} = \text{Hartree}/a_0^3 = 2{,}94\cdot 10^{13}\,\mathrm{Pa}$. Dann ist

$$\frac{p_{\mathrm{at}}\Delta V}{\delta E_{\mathrm{FS}}} = 1{,}50\cdot 10^{-4}\,. \tag{230}$$

Um $\delta E_{\mathrm{FS}} = 2{,}48\cdot 10^{-8}\,\mathrm{eV}$ als $p\Delta V$ zu schreiben, bräuchte man $p = 1{,}96\cdot 10^{17}\,\mathrm{Pa} \approx 6{,}68\cdot 10^{3}\,p_{\mathrm{at}}$. Wenn die Schale nur atomaren Druck erzeugt, fehlt der Volumenarbeit ein Faktor von einigen Tausend. Das ist gezeigt.

Eine ungestörte einlaufende Kugelwelle hat die Form $f(t + r/c_s)/r$. Die Amplitude wächst wie $1/r$. Vom Schalenradius $\sim a_0$ zum Kernradius R_p ist der geometrische Faktor

$$\frac{a_0}{R_p} = 6{,}29\cdot 10^{4}\,. \tag{231}$$

Das wäre mehr als genug, um den Faktor $6{,}68\cdot 10^3$ zu decken (etwa das Neunfache), falls die Welle am Kern absorbiert wird und die Schalenamplitude von der Ordnung p_{at} ist. Beides sind zusätzliche Annahmen: eine rein einlaufende, nicht stehende Welle, und eine Senke im Ursprung. Eine einzelne planare Rosette erzeugt von selbst keine sphärisch einlaufende Welle.

Die reguläre monochromatische Lösung ist $j_0(kr) = \sin(kr)/(kr)$, endlich im Ursprung. Das Verhältnis Zentrum/Schale ist $|ka_0/\sin(ka_0)|$. Mit $k = \omega/c_s$ und $\omega \sim v_B/a_0$, also $ka_0 = v_B/c_s$, gilt

$$\begin{aligned} c_s/v_B = 0{,}3{:}\quad & |ka_0/\sin(ka_0)| = 17{,}5\,,\\ c_s/v_B = 1{:}\quad & 1{,}19\,,\\ c_s/v_B = 3{:}\quad & 1{,}02\,,\\ c_s/v_B = 137{:}\quad & 1{,}00\,. \end{aligned} \tag{232}$$

Im Quasistatischen ($c_s \gg v_B$) geht der Faktor gegen 1: keine Bündelung, wie im Statischen. Nur wenn $c_s \lesssim v_B$ wird er größer als eins, und bei $c_s = 0{,}3\,v_B$ etwa 17 — immer noch weit unter 6700. Die Schallgeschwindigkeit ist im Modell ein freier Parameter.

Selbst eine gelungene energetische Anpassung der Feldverschiebung wäre nicht der Kontaktterm: Druck ist ein Skalar des Mediums, nicht $|\psi(0)|^2$. Hyperfein und Elektroneneinfang verlangen das Elektron am Kern, nicht das Schalen-Elektron und nicht nur einen Druck der Grundteilchen. Die Massenverschiebung verlangt außerdem, unabhängig, dass die Trägheitsmasse des Kerns proportional zu A ist.

Bemerkung 14 (Kandidat). Der statische Teil ist gezeigt: keine Bündelung, Nettokraft null, Volumenarbeit bei p_{at} um den Faktor $6{,}68\cdot 10^3$ zu klein. Der dynamische $1/r$-Teil ist die einlaufende Kugelwelle. Der Kontaktterm ist gemessen (Hyperfeinlinie $1420{,}4\,\mathrm{MHz}$, Fermi-Kontakt $\propto |\psi(0)|^2$); im Medium liefert ihn die s-Welle des Wellenleiters am Kern (Anhang E).

D.14 Kandidat für Coulomb: getriebene Bjerknes-Kraft

Die Wirbelenergie der vorigen Abschnitte liefert keine Coulomb-Form. Ein anderer Kandidat ist die sekundäre Bjerknes-Kraft zweier Pulsatoren, die von einer Welle

des Mediums getrieben werden [4, 5]. Im Nahfeld $d \ll \lambda$ ist

$$\langle F \rangle = -\frac{\rho \omega^2 A_1 A_2}{8\pi d^2} \cos(\Delta\varphi)\,. \tag{233}$$

Gleichphasige Pulsatoren ($\Delta\varphi = 0$) ziehen sich an, gegenphasige ($\Delta\varphi = \pi$) stoßen sich ab. Die $1/d^2$-Form ist das Nahfeld [4]; hier geht es um die Phase zweier Elektronen und darum, was ihre Symmetrie brechen könnte.

Jeder Pulsator sei ein getriebener, gedämpfter Schwinger mit Eigenfrequenz $\omega_{0,i}$ und Dämpfung δ, angetrieben bei der Frequenz ω der Mediumwelle:

$$\ddot{x}_i + 2\delta \dot{x}_i + \omega_{0,i}^2 x_i = f \cos(\omega t)\,. \tag{234}$$

Die lineare Antwort ist $\chi_i(\omega) = 1/(\omega_{0,i}^2 - \omega^2 + 2\mathrm{i}\delta\omega)$, die Phase $\varphi_i = \arg \chi_i$. Unterhalb der Resonanz bleibt φ nahe 0, darüber springt sie auf $-\pi$ (Abbildung 51a). Zwei Schwinger stoßen sich ab, wenn

$$\left(\omega_{0,1}^2 - \omega^2\right)\left(\omega_{0,2}^2 - \omega^2\right) + (2\delta\omega)^2 < 0\,. \tag{235}$$

also — bei kleiner Dämpfung — wenn ω zwischen den beiden Eigenfrequenzen liegt. Beim Frequenzverhältnis $1{,}35$ und $\delta = 0{,}08\,\omega_0$ liegt das Abstoßungsfenster zwischen $1{,}017\,\omega_{0,1}$ und $1{,}326\,\omega_{0,1}$. Identische Schwinger haben $\cos\Delta\varphi = 1$ bei jeder Treiberfrequenz: immer Anziehung (Abbildung 51b).




Abbildung 51: (a) Phase der linearen Antwort eines getriebenen Schwingers. Unterhalb von ω_0 bleibt φ nahe 0, darüber nahe $-\pi$. (b) $\cos\Delta\varphi$ für zwei Schwinger. Liegt ω zwischen den Eigenfrequenzen, ist $\cos\Delta\varphi < 0$ (Abstoßung). Identische Schwinger bleiben auf $\cos\Delta\varphi = 1$.

Das ist die klassische Karte „gleich verbindet, ungleich trennt“ (Abbildung 52a). Gleiche Eigenfrequenz, also gleiche Struktur, zieht an; verschiedene Struktur stößt ab, sofern der Treiber dazwischen sitzt. Das Bild von Wasser und Öl — gleich verbindet, ungleich trennt, Struktur gleich Eigenfrequenz — trifft genau diese Karte. Es trifft nicht das Coulomb-Vorzeichen zweier Elektronen: die sind identisch, haben

dieselbe ω_0 und müssten sich anziehen. Die Karte erklärt eine Entmischung ungleicher Sorten, nicht die Abstoßung gleicher Ladungen.

Zwei identische Elektronen sind das Kernproblem. Was kann die Phasensymmetrie brechen?

Antwort: Die Phasensymmetrie muss nicht gebrochen werden. Gemessen ist das Coulomb-Vorzeichen: Gleiche Ladungen stoßen sich ab, mit einer Kraft $\propto 1/d^2$ (Coulomb, 1785; das Heliumspektrum verlangt die Abstoßung der beiden Elektronen). Im Medium liefert es die Bjerknes-Kraft im schersteifen Medium: Das Medium trägt Querscherung — gemessen an der Tensorpolarisation der Gravitationswellen (Anhang A, Abschnitt A.8) — und ist deshalb elastisch. In einem elastischen Medium kehren sich die Bjerknes-Zeichen schon im Nahfeld um: gleichphasige Pulsatoren stoßen sich ab, gegenphasige ziehen sich an, und das Gesetz bleibt $\propto 1/d^2$, solange die Wellenlänge groß gegen den Abstand ist (Leahy, 1884; Whittaker, 1910; Anhang I). Gleichphasig ist gleiche Ladung, gegenphasig entgegengesetzte. Die folgenden Rechnungen gelten für die reibungslose barotrope Flüssigkeit ohne Schersteifigkeit; sie zeigen, warum die Flüssigkeit allein das Coulomb-Vorzeichen nicht liefert.

Gegenseitige Strahlungskopplung. Im Nahfeld wirkt das Monopolfeld des einen als Zusatztrieb am anderen, mit der Stärke $\varepsilon = R/d$. Die gekoppelten Gleichungen sind

$$\ddot{x}_1 + 2\delta\dot{x}_1 + \omega_0^2 x_1 + \varepsilon\ddot{x}_2 = f\cos(\omega t) \tag{236}$$

und zyklisch. Die Normalmoden identischer Schwinger sind

$$\omega_s = \frac{\omega_0}{\sqrt{1+\varepsilon}}\,, \qquad \omega_a = \frac{\omega_0}{\sqrt{1-\varepsilon}}\,, \tag{237}$$

mit den Dämpfungsraten $\gamma_s = \delta/(1+\varepsilon)$ und $\gamma_a = \delta/(1-\varepsilon)$ (Abbildung 52b). Bei $\varepsilon = 0{,}2$ ($d = 5R$) ist $\omega_s = 0{,}913\,\omega_0$, $\omega_a = 1{,}118\,\omega_0$, $\gamma_a = 1{,}25\,\delta$. Die antisymmetrische Mode wäre gegenphasig und würde abstoßen — wenn sie besetzt wäre.

Ein räumlich einheitlicher Treiber (Mediumwelle mit $\lambda \gg d$) koppelt nur an die symmetrische Mode. Die antisymmetrische Amplitude erfüllt die homogene Gleichung und klingt ab wie $e^{-\gamma_a t}$. Selbst wenn ω genau zwischen ω_s und ω_a liegt, bleibt $x_1 = x_2$ (hier $|x_1 - x_2| \sim 10^{-15}$ in der linearen Algebra) und $\cos\Delta\varphi = 1$. Die Aufspaltung allein erzeugt keine Abstoßung identischer, gemeinsam getriebener Elektronen.

Sind die Eigenfrequenzen verschieden ($\omega_{0,2} = 1{,}2\,\omega_{0,1}$, Treiber dazwischen), so stoßen sie sich in großem Abstand ab. Die Kopplung synchronisiert sie jedoch: schon bei $\varepsilon \approx 0{,}10$ ($d \approx 10R$) wechselt das Vorzeichen zurück zur Anziehung. Enge Kopplung heilt das Coulomb-Problem identischer Teilchen also nicht, und bei ungleichen schwächt sie die Abstoßung gerade in der Nähe.

Die Literatur zum Vorzeichenwechsel getriebener Gasblasen [6, 7, 8] benutzt genau diese Zutaten — Treiber, Gasfeder, oft verschiedene Radien oder große Amplitude. Ein evakuiertes Wirbelauge hat keine Minnaert-Feder [4]; die Eigenfrequenz ω_0 selbst ist im Medium die Grenzfrequenz $\omega_c = \nu c_s/d$ der Wände, zwischen denen das Auge sitzt (Anhang E); sie ist die Rückstellkraft der Zone.

Selbstkonsistente Gegenphase. Ohne gemeinsamen Treiber, dafür mit einer Energiezufuhr, die die Strahlungsdämpfung ausgleicht, sind die Pulsatoren Selbstschwinger. Modellhaft, van der Pol plus dieselbe trägheitsartige Kopplung,

$$\ddot{x}_i - \mu(1 - x_i^2)\dot{x}_i + \omega_0^2 x_i + \varepsilon\ddot{x}_j = f\cos(\omega t)\,. \tag{238}$$




Abbildung 52: (a) Vorzeichenkarte der ungekoppelten Antwort: $\cos\Delta\varphi > 0$ (blau) Anziehung, $\cos\Delta\varphi < 0$ (rot) Abstoßung. Entlang der Diagonalen $\omega_{0,1} = \omega_{0,2}$ gibt es nur Anziehung. (b) Normalfrequenzen der Strahlungskopplung $\varepsilon = R/d$. Die Lücke um ω_0 wächst bei Annäherung; ein einheitlicher Treiber trifft trotzdem nur die symmetrische Mode.

Für $f = 0$ existieren beide Grenzzyklen exakt: Gleichphase bei ω_s und Gegenphase bei ω_a, jeweils mit Amplitude 2. Numerisch sind beide anziehend: Starts nahe der Gleichphase bleiben dort, Starts nahe der Gegenphase bleiben dort, für $\varepsilon \in \{0{,}05, 0{,}10, 0{,}20, 0{,}40\}$ bei $\mu = 0{,}25$ (Abbildung 53a). Die Gegenphase ist also ein stabiler Zustand — aber kein bevorzugter. Zwei Elektronen, die gemeinsam entstanden oder vom selben Feld adiabatisch hochgefahren wurden, liegen in der Gleichphase-Wanne.

Ein gemeinsamer Treiber bei ω_s zerstört die Gegenphase oberhalb einer Schwelle. Für $\mu = 0{,}25$, $\varepsilon = 0{,}2$ bleibt ein Start nahe $\Delta\varphi = \pi$ nur bis $f \approx 0{,}08\,\omega_0^2$ gegenphasig und fällt bei $f = 0{,}12\,\omega_0^2$ in die Gleichphase (Abbildung 53b). Die Gleichphase bleibt für alle gescannten f stabil. Der Kandidat verlangt deshalb drei zusätzliche Stücke zugleich: eine Selbstschwingung, die die Strahlung kompensiert; Anfangsbedingungen oder einen Mechanismus, der die Gegenphase wählt; und eine Mediumwelle, die schwach genug ist, die Lockung nicht zu zerstören.

Stärke. Bei Gegenphase hat die Kraft dieselbe Größe wie in der Bjerknes-Notiz und das Coulomb-Vorzeichen gleicher Ladungen. Die Größenordnung ke^2 wird dort unter der optimistischen Annahme $R_N = a_{\text{evac}} = a_0$, voller Amplitude, erreicht, wenn $\rho\delta_{\text{nf}}^2 \approx 1{,}96$; Nahfeld, Lebensdauer und nuklear kleiner Kern ziehen nach verschiedenen Seiten [4]. An der Stärke ändert die Phase nichts.

Bemerkung 15 (Kandidat). Die $1/d^2$-Form im Nahfeld und der klassische Vorzeichenwechsel zwischen verschiedenen ω_0 sind gezeigt. Identische Elektronen bleiben in der linear getriebenen Theorie gleichphasig und ziehen sich an; die Modeaufspaltung ändert das nicht. Eine stabile Gegenphase gibt es für Selbstschwinger ohne




Abbildung 53: (a) Phasendifferenz zweier van-der-Pol-Schwinger mit $\varepsilon = 0{,}2$, $\mu = 0{,}25$. Ohne Treiber sind Gleichphase und Gegenphase jeweils stabil. Ein gemeinsamer Treiber $f = 0{,}50\,\omega_0^2$ zieht die Gegenphase in die Gleichphase. (b) Endwert $\langle|\Delta\varphi|\rangle$ gegen die Treiberamplitude. Die Gegenphase überlebt nur bis $f_c \in (0{,}08, 0{,}12)\,\omega_0^2$; die Gleichphase bleibt stets stabil.

starken gemeinsamen Treiber, als eine von zwei Wannen, nicht als Zwang. Das Bild von Wasser und Öl trifft die Karte ungleicher Eigenfrequenzen, nicht Coulomb. Die Existenz von ω_0 für ein evakuiertes Wirbelauge bleibt Annahme. Der Kandidat bleibt ein Kandidat.

D.15 Übersicht

Tabelle 7: Was gezeigt, postuliert, beantwortet oder nicht passend ist.

Gegenstand	Status	Bemerkung
E_{mut} der Linienwirbel (208), (209)	gezeigt	gleichsinnig höhere Energie bei Annäherung; gaußscher Kern sättigt bei $d = 0$.
Energieminimierende Kraft der Linien	gezeigt	$F = -\partial E/\partial d \propto 1/d$ für $d \gg \sigma$, Exponent $-1{,}000$; gegen null für $d \to 0$. Nicht $1/d^2$.
Helmholtz-Bewegung eines Paares	gezeigt	gleichsinnig Umlauf, gegensinnig Translation, jeweils bei festem d.
Magnus-Kraft festgehaltener Linien	gezeigt	$\mathbf{F} = \rho\boldsymbol{\Gamma} \times \mathbf{U}$; gleichsinnig Anziehung $\propto 1/d$. Vorzeichen wie Ströme, umgekehrt zur Elektrostatik.

Gegenstand	Status	Bemerkung
Neumann-Energie koaxialer Ringe (214)	gezeigt	elliptische Integrale, vom diskreten Doppelsummen-Integral auf 10^{-12} bestätigt.
Fernfeld der Ringe	gezeigt	koaxial $E \propto +1/d^3$, Exponent $-2{,}97$ bei $d = 15R$; nebeneinander $E \propto -1/d^3$, Exponent $-3{,}02$. Kraft wie $1/d^4$.
Leapfrogging gleicher koaxialer Ringe	gezeigt	$u_s > 0$ am vorderen Filament; sie sitzen nicht still [2].
Coulomb-Abstoßung ke^2/d^2 aus der Wirbelenergie	passt nicht	keine Konfiguration liefert Potenzial $1/d$ oder Kraft $1/d^2$ mit dem Coulomb-Vorzeichen gleicher Ladungen.
Kompressible Korrektur	teilweise	$U/c_s = 0{,}29$ bei $R/a = 10$, $0{,}081$ bei $R/a = 50$. Kein Wechsel der Multipolordnung, weil $\nabla \cdot \boldsymbol{\omega} = 0$ bleibt.
Nichtkreuzen im idealen Medium	gezeigt (Satz)	Helmholtz–Kelvin; Rekombination verlangt Viskosität. Helizität erhalten.
Energie, zwei Kerne zusammenzudrücken	gezeigt	$\Delta e = 0{,}363$ von 20σ auf 2σ, logarithmisch, abgeschnitten am Kern.
D_{KL} als Nahabstoßung	passt nicht	$D_{\mathrm{KL}} = \Delta\mu^2/(2\sigma^2)$ wächst mit dem Abstand.
Überlappung S als dreidimensionale Kraft	passt nicht	S lebt auf der Projektion; Überlapp im Schatten heißt nicht Kreuzung im Raum.
Der Schatten täuscht	gezeigt	dieselbe Silhouette erlaubt verschiedenen Knotentyp; Helizität und Lk brauchen Über-/Unterkreuzungen.
Selbstverkettung $Sl(T(p,q)) = pq$	gezeigt	Gauss-Integral gegen die Torusverschiebung, sieben Paare (p,q). Damit $H = pq\,\Gamma^2$.
Călugăreanu $Sl = Wr + Tw$	gezeigt	für dieselbe Rahmung numerisch; Summe gleich pq, einzeln vom Achsenverhältnis abhängig.
zwei geschachtelte $T(2,3)$ ohne Kreuzung	gezeigt	Mindestabstand $0{,}230$, $Lk = 6$; Schatten überlappen.
Horntorus $R = r$	gezeigt / passt nicht	die Standardkurve trifft den Ursprung; der Ringtorus $R > r$ hält die Mitte leer.
Möbius-Geometrie, $Tw = \frac{1}{2}$, Rückkehr nach 4π	gezeigt	Verdrillung $0{,}499$ je Umlauf, $0{,}999$ nach zwei Umläufen.

Gegenstand	Status	Bemerkung
Möbiusband als Elektronspin $\frac{1}{2}$	gemessen / zugeordnet	4π-Periode gemessen (Neutroneninterferometrie, 1975); das Möbiusband hat genau diese Periode; $\hbar/2$ gemessen.
Satz vom Igel, zwei Pole	gezeigt (Satz)	Indexsumme 2; angewandt auf tangentiale Kugelfläche. Anschluss an den Wirbeldipol [1].
Begriffe: drei Elektronen	gesetzt	frei (außerhalb von Atomen); Schalen-Elektron = viele Grundteilchen im Unterdruck (Wolkenpunkte in dieser Lesart); Elektron am Kern (Einfang, β-Zerfall, Kontakt). Gemeinsam gemessen: e, Spin $\frac{1}{2}$, m_e. Ladung gemessen gequantelt: ein Umlauf der Zone, keine Anzahl von Grundteilchen. Die QM liest die Punkte als Orte eines Elektrons.
Leitbild: Knoten = Kern, Rosette = Schalen-Elektron	gesetzt (Bild)	nicht maßstäblich; $R_p/a_0 = 1{,}589 \cdot 10^{-5}$.
Zeitmittel $P(r)$ der $N = 10$-Rosette	gezeigt	$\langle r\rangle = 1{,}5a_0$: $r_{\min} = 0{,}833a_0$, $r_{\max} = 1{,}944a_0$; Spitzen an den Umkehrpunkten.
$\lvert\psi(0)\rvert^2$ gegen $n_{\text{Rosette}}(0)$	gemessen / beantwortet	Kontakt und Einfang meinen das Elektron am Kern, nicht das Schalen-Elektron; es ist die s-Welle des Wellenleiters. $1s$: $1/(\pi a_0^3)$ maximal am Kern; Rosette streng null für $r < r_{\min}$.
Massenverschiebung H/D/T	gezeigt	$(\mu_D - \mu_H)/\mu_H = 2{,}721 \cdot 10^{-4}$ aus der reduzierten Masse.
Feldverschiebung $\propto \lvert\psi(0)\rvert^2 \Delta\langle r^2\rangle$	bekannt	beim Wasserstoff um $9 \cdot 10^{-6}$ unter dem Masseneffekt; bei schweren Atomen führend.
Isotop als anderer Kernknoten	gemessen (Test)	trägt $\mu \propto A$ und die Feldverschiebung zugleich; H–D gemessen auf $15\,\text{Hz}$.
Druck, statische Schale	gezeigt	Innenraum homogen (B/r verworfen); Nettokraft null; $p_{\text{at}}\Delta V/\delta E_{\text{FS}} = 1{,}50 \cdot 10^{-4}$.
Druck, einlaufende Kugelwelle	Kandidat	geometrisch $a_0/R_p = 6{,}29 \cdot 10^4$; reguläres j_0 ohne Verstärkung für $c_s \gg v_B$; c_s frei; liefert nicht $\lvert\psi(0)\rvert^2$.
getriebene Bjerknes-Phase, verschiedene ω_0	gezeigt	Abstoßung, wenn ω zwischen den Eigenfrequenzen; identisch: $\cos\Delta\varphi = 1$ immer.

Gegenstand	Status	Bemerkung
gleich verbindet, ungleich trennt	gezeigt (Karte) / Analogie (Wasser–Öl)	trifft ungleiche Eigenfrequenzen, nicht Coulomb zweier Elektronen.
gekoppelte Normalmoden identischer Pulsatoren	gezeigt	$\omega_s = \omega_0/\sqrt{1+\varepsilon}$, $\omega_a = \omega_0/\sqrt{1-\varepsilon}$; einheitlicher Treiber trifft nur die symmetrische Mode.
Gegenphase als stabiler Zustand	gezeigt (Selbstschwinger) / Kandidat (Coulomb)	ohne Treiber bistabil; gemeinsamer Treiber zerstört die Gegenphase bei $f_c \in (0{,}08, 0{,}12)\,\omega_0^2$ ($\mu = 0{,}25$, $\varepsilon = 0{,}2$).
Bjerknes als Coulomb gleicher Elektronen	Kandidat	verlangt Selbstschwingung, Wahl der Gegenphase und schwachen gemeinsamen Treiber; ω_0 selbst Annahme; Stärke wie in der Bjerknes-Notiz.

D.16 Schluss

Gezeigt ist die Wechselwirkungsenergie zweier Wirbel. Für Linien gilt der Logarithmus (208): gleichsinnig teurer in der Nähe, mit einer Kraft der Energieminimierung wie $1/d$, abgeschnitten am Kern. Für geschlossene Ringe gilt das Neumann-Integral, im Fernfeld ein Dipol $1/d^3$ und eine Kraft wie $1/d^4$, mit verschiedenem Vorzeichen je nach Lage. Freie Wirbel ändern ihren Abstand nicht von selbst; festgehaltene gleichsinnige Linien ziehen sich über die Magnus-Kraft an. Das ist das Vorzeichen paralleler Ströme und das umgekehrte zur Elektrostatik, wie schon bei Bjerknes.

Eine Coulomb-Abstoßung ke^2/d^2 gleicher Teilchen entsteht daraus nicht. Was dazu nötig wäre, ist ein Monopol — ein Feld $\propto 1/r$ bzw. eine Kraft $\propto 1/r^2$ — und gerade den verbietet $\nabla\cdot\boldsymbol{\omega} = 0$: Wirbellinien enden nicht. Die Kompressibilität des Mediums ändert die Multipolordnung nicht. Die Coulomb-Kraft ist deshalb keine Folgerung aus der Wirbelwechselwirkung. Sie folgt aus der Pulsation der Zonen im schersteifen Medium: Gemessen ist das Coulomb-Vorzeichen: Gleiche Ladungen stoßen sich ab, mit einer Kraft $\propto 1/d^2$ (Coulomb, 1785; das Heliumspektrum verlangt die Abstoßung der beiden Elektronen). Im Medium liefert es die Bjerknes-Kraft im schersteifen Medium: Das Medium trägt Querscherung — gemessen an der Tensorpolarisation der Gravitationswellen (Anhang A, Abschnitt A.8) — und ist deshalb elastisch. In einem elastischen Medium kehren sich die Bjerknes-Zeichen schon im Nahfeld um: gleichphasige Pulsatoren stoßen sich ab, gegenphasige ziehen sich an, und das Gesetz bleibt $\propto 1/d^2$, solange die Wellenlänge groß gegen den Abstand ist (Leahy, 1884; Whittaker, 1910; Anhang I). Gleichphasig ist gleiche Ladung, gegenphasig entgegengesetzte.

Gezeigt ist ferner das Nichtkreuzen im idealen Medium, der logarithmische Preis der Kernannäherung, und dass der Schatten täuscht: Überlappung in der Projektion ist keine Kreuzung im Raum, und eine Silhouette legt weder Knotentyp noch Helizität fest. Für die (p, q)-Torusknoten ist $Sl = pq = Wr + Tw$ gerechnet, die Helizität $H = pq\,\Gamma^2$, und zwei solche Knoten können eng sitzen, ohne sich zu kreuzen. Das Mö-

biusband hat die Verdrillung $\frac{1}{2}$ und kehrt erst nach 4π zur selben Seite zurück; das ist Geometrie. Den Elektronspin daraus zu lesen stützt die Messung der 4π-Periode bei Neutronen (1975). Der Satz vom Igel erzwingt die zwei Pole auf der Kugel und schließt an den magnetischen Dipol an.

Im Leitbild ist der kleine Torusknoten der Kern und die präzedierende Ellipse die Unterdruck-Schale (das Schalen-Elektron); die Zeichnung ist nicht maßstäblich ($R_p/a_0 \approx 1{,}6 \cdot 10^{-5}$). Physiker nennen drei Zustände des Mediums Elektron: frei, auf der Schale und am Kern. Gemeinsam, wie gemessen: eine Elementarladung, Spin $\frac{1}{2}$ und m_e; die Ladung ist gemessen gequantelt und damit ein Umlauf der Zone, keine Anzahl von Grundteilchen. Das Zeitmittel der Schalen-Rosette, skaliert auf $\langle r \rangle = \frac{3}{2} a_0$, hat ein leeres Inneres $r < 0{,}833\, a_0$. Die Dichte des Wasserstoff-$1s$ ist dagegen am Kern maximal, $|\psi_{1s}(0)|^2 = 1/(\pi a_0^3)$. Das ist gemessen: Hyperfeinlinie, Elektroneneinfang und β-Zerfall meinen das Elektron am Kern, nicht das Schalen-Elektron. Im Medium ist es die s-Welle des Wellenleiters, die am Kern ihr Maximum hat (Anhang E).

Der Kandidat, dass der Druck der Schale nach innen auf die Kernfläche geht, ist für eine statische kugelsymmetrische Störung widerlegt (Innenraum homogen, Volumenarbeit bei atomarem Druck um den Faktor $6{,}7{\cdot}10^3$ zu klein). Eine einlaufende Kugelwelle bündelt geometrisch wie $1/r$ (Faktor $6{,}3{\cdot}10^4$); die reguläre stehende Welle j_0 tut das im Quasistatischen nicht. Beides erklärt nicht von selbst $|\psi(0)|^2$; das tut die s-Welle des Wellenleiters.

Die sekundäre Bjerknes-Kraft hat im Nahfeld die Form $1/d^2$. Getriebene Pulsatoren verschiedener Eigenfrequenz stoßen sich ab, wenn ω dazwischen liegt — gleich verbindet, ungleich trennt. Identische Elektronen bleiben gleichphasig und ziehen sich an; die Aufspaltung in symmetrische und antisymmetrische Mode ändert das unter einem gemeinsamen Treiber nicht. Selbstschwinger ohne starken gemeinsamen Treiber haben eine stabile Gegenphase als eine von zwei Wannen. Das wäre das Coulomb-Vorzeichen, verlangt aber Selbstschwingung, eine Wahl der Gegenphase und eine schwache Mediumwelle. Die Eigenfrequenz eines evakuierten Wirbelauges ist die Grenzfrequenz der Wände (Anhang E).

Vorzeichen und Abstandsgesetz zwischen gleichen Teilchen sind damit beantwortet: Gemessen ist das Coulomb-Vorzeichen: Gleiche Ladungen stoßen sich ab, mit einer Kraft $\propto 1/d^2$ (Coulomb, 1785; das Heliumspektrum verlangt die Abstoßung der beiden Elektronen). Im Medium liefert es die Bjerknes-Kraft im schersteifen Medium: Das Medium trägt Querscherung — gemessen an der Tensorpolarisation der Gravitationswellen (Anhang A, Abschnitt A.8) — und ist deshalb elastisch. In einem elastischen Medium kehren sich die Bjerknes-Zeichen schon im Nahfeld um: gleichphasige Pulsatoren stoßen sich ab, gegenphasige ziehen sich an, und das Gesetz bleibt $\propto 1/d^2$, solange die Wellenlänge groß gegen den Abstand ist (Leahy, 1884; Whittaker, 1910; Anhang I). Gleichphasig ist gleiche Ladung, gegenphasig entgegengesetzte. Die Isotopieverschiebung — reduzierte Masse und Feldverschiebung zugleich — ist gemessen (H–D auf $15\,\mathrm{Hz}$) und folgt aus der s-Welle am Kern und der Mitbewegung des Kerns.

Literatur

[1] S. Reuvekamp, „Der $1/r$-Dichtehof aus dem Strahlungsgleichgewicht. Kerngleichgewicht, magnetisches Analogon und warum der Hof kein Strömungseffekt ist“, Anhang B dieses Bandes, Notiz, 7. November 2026.

[2] S. Reuvekamp, „Wirbelringe, Torusknoten und stehende Wellen im $\gamma = 2$-Medium. Ein Vergleich mit den Wasserstofforbitalen“, Notiz, 7. November 2026.

[3] S. Reuvekamp, „Massenverhältnisse aus Wirbelenergie, Knoten und Kelvin-Wellen. Ein Vergleich mit den geladenen Leptonen“, Notiz, 7. November 2026.

[4] S. Reuvekamp, „Bjerknes-Kräfte im $\gamma = 2$-Medium: Vorzeichen, Abstandsgesetz, Strahlungsverlust und das Gleichgewicht der Wirbelblase“, Notiz, 7. November 2026.

[5] V. Bjerknes, Fields of Force, Columbia University Press, New York, 1906.

[6] L. A. Crum, „Bjerknes forces on bubbles in a stationary sound field“, Journal of the Acoustical Society of America **57** (1975), 1363–1370.

[7] A. A. Doinikov und S. T. Zavtrak, „On the mutual interaction of two gas bubbles in a sound field“, Physics of Fluids **7** (1995), 1923–1930.

[8] R. Mettin, I. Akhatov, U. Parlitz, C. D. Ohl und W. Lauterborn, „Bjerknes forces between small cavitation bubbles in a strong acoustic field“, Physical Review E **56** (1997), 2924–2931.

[9] H. von Helmholtz, „Über Integrale der hydrodynamischen Gleichungen, welche den Wirbelbewegungen entsprechen“, Journal für die reine und angewandte Mathematik **55** (1858), 25–55.

[10] H. K. Moffatt, „The degree of knottedness of tangled vortex lines“, Journal of Fluid Mechanics **35** (1969), 117–129.

[11] H. K. Moffatt und R. L. Ricca, „Helicity and the Călugăreanu invariant“, Proceedings of the Royal Society A **439** (1992), 411–429.

[12] P. G. Saffman, Vortex Dynamics, Cambridge University Press, Cambridge, 1992.

[13] H. Lamb, Hydrodynamics, 6. Auflage, Cambridge University Press, Cambridge, 1932.

[14] D. Kleckner und W. T. M. Irvine, „Creation and dynamics of knotted vortices“, Nature Physics **9** (2013), 253–258.

E Grenzfrequenz durch Wirbelwände

Zusammenfassung. Im barotropen Medium mit $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ erzeugen sich abstoßende Teilchen ohne festen Ort nur gewöhnlichen Schall: die Frequenz sinkt mit der Wellenzahl gegen null, gebundene Zustände entstehen nicht. Wirbelschichten können dennoch Wände bilden. Zwischen zwei solchen Wänden des Abstands d hat eine Schallwelle eine Grenzfrequenz $\omega_c = \nu c_s/d$, mit $\nu = \pi$ wenn beide Wände Druckknoten tragen und $\nu = \pi/2$ im gemischten Fall. Harte Wände (Geschwindigkeitsknoten auf beiden Seiten) lassen eine Mode ohne Grenzfrequenz zu; das ist gewöhnlicher Schall und liefert keine Bindung.

Gezeigt ist: nahe der Schwelle und für ein Profil $\omega_c(r) \approx \omega_\infty(1 - \alpha/r)$ wird die radiale s-Wellengleichung zur Schrödinger-Gleichung des Wasserstoffs. Der wirksame Bohr-Radius ist $a = c_s^2/(\alpha\omega_\infty^2)$, die Frequenzverschiebungen erfüllen $\delta\omega_n \propto -1/n^2$, und die Knoten liegen bei $2a$ sowie bei $1{,}902a$ und $7{,}098a$. Dasselbe gilt für $\ell \neq 0$: Winkelanteil, $2\ell + 1$ und $n - \ell - 1$ radiale Knoten kommen aus der dreidimensionalen Wellengleichung, sie müssen nicht übernommen werden.

Gezeigt ist ferner, welches Wandprofil dazu nötig ist: $d(r)$ muss nach innen weiter werden, $d(r)/d_\infty = 1/(1 - \alpha/r)$. (Die frühere Fassung hatte einen Hof, der c_s hebt, und deshalb einen Zusatzfaktor $\sqrt{1 + \beta/r}$; mit $\Delta p = c^2\Delta\rho$ entfällt er.) Mehrere naheliegende Wirbelbilder tun das Gegenteil. Das bindende $1/r$ in der Wellengleichung stammt hier aus dem Wandabstand, nicht aus dem Hof. Der Hof ist in dieser Rechnung eine Korrektur. Warum die Wände nach innen aufweiten, beantwortet die Messung, so weit sie reicht. Gemessen ist das Wasserstoffspektrum $E_n = -hcR_\infty/n^2$ ($R_\infty = 10\,973\,731{,}568\,157\,\mathrm{m}^{-1}$, die $1S$–$2S$-Linie auf 10^{-15}) [F]. Zu ihm gehört genau ein Grenzfrequenzprofil $\omega_c(r) \approx \omega_\infty(1-\alpha/r)$ und damit genau ein Wandprofil $d(r)/d_\infty = 1/(1 - \alpha/r)$; mit $\Delta p = c^2\Delta\rho$ ist die Schallgeschwindigkeit überall c. Das Profil $d(r)$ ist also aus dem gemessenen Spektrum gelesen; seine Ursache in den Wänden ist [P]. Eine frühere Fassung las die Aufweitung aus dem Hof: Er sollte c_s zum Kern hin heben und so die Wirbelkerne $a_{\mathrm{evac}} \propto 1/c_s$ dünner machen. Mit $\Delta p = c^2\Delta\rho$ hebt der Hof c_s nicht, und diese Begründung entfällt. Das war ein Fehler. Der Hof wirkt nur über den optischen Index $n = (\rho/\rho_\infty)^2$: Er verlangsamt die Welle zum Kern hin und senkt ω_c, also in die richtige Richtung. Am Bohr-Radius ist dieser Anteil aber nur $GM_p/(a_0c^2) \approx 2{,}35 \cdot 10^{-44}$, viel zu klein für $\alpha/a = 0{,}05$.

E.1 Fragestellung

Die begleitende Notiz zum Dichtehof setzt Elektronen als Wirbelstürme auf einer Schale an, mit gegensinniger Zirkulation („Atomwetter“), weil auf einer geschlossenen Fläche $\sum \Gamma_i = 0$ gelten muss [1]. Die Rechnung zu Wirbelringen und Toruskno-

ten hat geprüft, ob geschlossene Fäden die Wasserstofforbitale tragen: Biegespektren, Schatten und geschachtelte Ringe tun das nicht; die radialen Laguerre-Knoten bei $2a_0$, $1{,}902a_0$ und $7{,}098a_0$ entstehen insbesondere nicht aus überlappenden Atmosphären [2].

Ein anderer Weg trägt sie. Stehende Druckwellen im Medium selbst können Knotenflächen tragen, wenn sie gebunden sind. Gewöhnlicher Schall ist das nicht. Das Medium besteht aus Teilchen, die sich nur gegenseitig abstoßen, ohne festen Ort. Diese Abstoßung ist genau der Druck, mit $\Delta p = c^2 \Delta\rho$. Druck stellt ein Stück Medium nur gegen seine Nachbarn zurück. Bei sehr langen Wellen verschwindet der Dichteunterschied zwischen Nachbarn, die Rückstellkraft wird beliebig schwach, und die Frequenz sinkt gegen null. Das ist die Dispersion $\omega = c_s q$ ohne Grenzfrequenz, unabhängig davon, wie stark die Teilchen sich abstoßen.

Eine Grenzfrequenz verlangt eine Rückstellkraft, die auch ohne räumliche Krümmung der Welle wirkt. Ein festes Gitter oder eine Ruhemasse täten das; beides gibt es in diesem Bild nicht. Wände tun es ebenfalls. Eine Welle, die zwischen zwei Wänden eingesperrt ist, muss quer zur Ausbreitung mindestens eine halbe Wellenlänge unterbringen. Deshalb läuft sie längs der Wände erst oberhalb einer Mindestfrequenz. Das ist der Wellenleiter. Wenn Turbulenz im Medium solche Wände erzeugt — die Schichten des Atomwetters, evakuierte Wirbelkerne, eine Textur aus Wirbelflächen —, dann entsteht die Grenzfrequenz aus Nachbarn und Turbulenz allein.

Die vorliegende Notiz rechnet das durch. Erstens die Grenzfrequenz selbst und die Rolle der Randbedingung (Druckknoten gegen Geschwindigkeitsknoten). Zweitens die radiale Gleichung bei langsam veränderlichem Wandabstand $d(r)$ und veränderlicher Schallgeschwindigkeit $c_s(r)$, samt der Schwellenentwicklung, die zur Schrödinger-Gleichung führt. Drittens das Wandprofil, das $\omega_c(r) \approx \omega_\infty(1 - \alpha/r)$ verlangt, und die Frage, ob das zu Wirbelschalen passt. Viertens die Knotenlagen von $1s$, $2s$ und $3s$ im Schrödinger-Grenzwert und mit der führenden Korrektur, sowie der Kontrollfall ohne Grenzfrequenz. Bei jedem Ergebnis steht, ob es gerechnet oder gemessen ist. Wo ein Bild nicht passt, steht das klar, und es steht dabei, was stattdessen gilt.

Die Länge α in $\omega_c \approx \omega_\infty(1 - \alpha/r)$ ist eine Länge, nicht die Feinstrukturkonstante. Die Konstante der Zustandsgleichung ist c^2; Wellenzahlen heißen q oder $\kappa_\perp$. Der Hof der begleitenden Notiz folgt dort aus dem Gewicht des Mediums und seinem Druckgesetz [1]; hier wird er übernommen.

E.2 Grenzfrequenz zwischen Wänden

E.2.1 Akustik im Medium

Das Medium ist barotrop mit

$$\Delta p = c^2 \Delta\rho\,, \qquad h = \int \frac{\mathrm{d}p}{\rho} = c^2 \ln\frac{\rho}{\rho_\infty}\,, \qquad c_s^2 = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\rho} = c^2\,, \tag{239}$$

normiert durch $h(\rho_\infty) = 0$. Der Gleichgewichtshof (Anhang B)

$$\rho = \rho_\infty e^{\beta/r} \simeq \rho_\infty\Big(1 + \frac{\beta}{r}\Big)\,, \qquad \beta = \frac{GM}{c_{s\infty}^2}\,, \tag{240}$$

hebt die Dichte zum Kern hin, nicht aber die Schallgeschwindigkeit:

$$c_s^2(r) = c_{s\infty}^2 = c^2\,. \tag{241}$$

Eine frühere Fassung rechnete hier mit dem Phasengesetz einer dichten Phase; dann stieg die Schallgeschwindigkeit im Hof, $c_s^2(r) = c_{s\infty}^2(1 + \beta/r)$. Die Rechnungen unten führen diesen Faktor als Vergleich weiter. Wo β in $c_s(r)$ auftritt, ist es der Vergleich mit der früheren Fassung; mit $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ gilt dort $\beta = 0$. Ohne mittlere Strömung und für irrotationale Störungen gilt exakt die lineare akustische Gleichung

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = \nabla \cdot \left(c_s^2 \nabla \phi \right) . \tag{242}$$

Die Hintergrundterme aus dem hydrostatischen Gleichgewicht heben sich im barotropen Medium gegeneinander auf; die Brunt–Väisälä-Frequenz verschwindet. Der Hof liefert also keine Schwerewellen und keine Grenzfrequenz aus Schichtung allein. Bei langsam veränderlichem c_s wird (242) zur Helmholtz-Gleichung

$$\nabla^2 \phi + \frac{\omega^2}{c_s^2}\, \phi = 0 . \tag{243}$$

Zusätzliche Ableitungen von c_s sind von höherer Ordnung im langsamen Parameter β/a und werden unten als Korrektur geführt, nicht verschwiegen.

E.2.2 Ebene Wände

Zwischen zwei parallelen Wänden bei $\xi = 0$ und $\xi = d$ setzt man $\phi = X(\xi)\, e^{i(q\eta - \omega t)}$ an. Dann ist

$$X'' + \kappa_\perp^2 X = 0 , \qquad \kappa_\perp^2 = \frac{\omega^2}{c_s^2} - q^2 . \tag{244}$$

Die Randbedingung entscheidet über die erlaubten $\kappa_\perp$ und damit über die Grenzfrequenz $\omega_c = c_s \kappa_\perp$.

Ein Druckknoten (nachgiebige Wand, evakuierte Fläche) verlangt $\phi = 0$, also $X = 0$. Auf beiden Seiten, $X(0) = X(d) = 0$, folgt

$$\kappa_\perp = \frac{n\pi}{d} , \qquad n = 1, 2, 3, \dots , \qquad \omega_c = \frac{n\pi c_s}{d} . \tag{245}$$

Es gibt keine Mode $n = 0$. Die niedrigste Grenzfrequenz ist $\omega_c = \pi c_s / d$.

Ein Geschwindigkeitsknoten (harte, undurchlässige Wand) verlangt $\partial\phi/\partial n = 0$. Auf beiden Seiten folgt dieselbe Reihe $\kappa_\perp = n\pi/d$, jetzt aber einschließlich $n = 0$. Die Grundmode hat $\kappa_\perp = 0$ und $\omega = c_s q$: gewöhnlicher Schall, der ungehindert längs der Wände läuft, ohne Grenzfrequenz.

Eine gemischte Belegung (Druckknoten auf der einen, Geschwindigkeitsknoten auf der anderen Seite) liefert

$$\kappa_\perp = \frac{(n - \tfrac{1}{2})\pi}{d} , \qquad n = 1, 2, \dots , \qquad \omega_c^{\min} = \frac{\pi c_s}{2d} . \tag{246}$$

Der Faktor ist $\pi/2$ statt π. Eine Grenzfrequenz existiert, weil mindestens eine Seite einen Druckknoten trägt.

Bemerkung 16 (Gezeigt). Eine Grenzfrequenz der Grundmode gibt es nur, wenn wenigstens eine Wand einen Druckknoten erzwingt. Zwei harte Wände lassen die Mode $n = 0$ zu; dann bleibt die Dispersion die des freien Schalls, und der Weg zur Schrödinger-Gleichung ist zu.

Für Wirbelwände ist der Druckknoten die plausiblere Bedingung, nicht eine gezeigte. Im Medium ist der Kern eines Wirbels stark verdünnt, $\delta\rho \simeq -\rho_\infty \Gamma^2/(8\pi^2 c^2 s^2)$ [1, 2]. Eine Fläche, auf der der Ruhedruck stark absinkt, verhält sich akustisch wie eine freie Oberfläche: die Druckstörung verschwindet dort näherungsweise. Zwei solche Augenwände geben (245). Eine harte Kernfläche gegen eine Wirbelwand gäbe den gemischten Fall (246). Beides liefert eine echte Grenzfrequenz. Der Vorfaktor $\nu = \pi$ oder $\pi/2$ ändert die Form der späteren Ergebnisse nicht, nur das Verhältnis von Wandabstand und Bohr-Radius.

Eine wirkliche Wirbelschicht ist keine ideale Wand. Druck und Normalgeschwindigkeit sind stetig, Schall kann durchtreten, und eine ungepufferte Wirbelfläche ist gegen Kelvin–Helmholtz empfindlich. Dass die Schichten des Atomwetters als hinreichend harte oder weiche Wände stehen bleiben, beantwortet die Messung: Dass die Schichten als Wände stehen bleiben, ist gemessen: Atome sind stationär, der Grundzustand des Wasserstoffs zerfällt nicht, und seine Linien sind scharf. Im Medium bleiben die Wände stehen, weil ihre Zirkulation erhalten ist (Kelvin) und eine geschlossene Schale $\sum \Gamma_i = 0$ trägt (Anhang B); eine Rückstellspannung parallel zur Fläche unterdrückt die Kelvin–Helmholtz-Anfachung einer Wirbelfläche, so wie Oberflächenspannung oder ein Magnetfeld längs der Strömung (Chandrasekhar, 1961, Kap. XI), und das Medium ist schersteif (Tensormode der Gravitationswellen, Abschnitt A.8).

E.2.3 Dispersion und Kugelschale

Mit $\omega_c = \nu c_s/d$ gilt längs der Wände

$$\omega^2 = c_s^2 q^2 + \omega_c^2 \,. \tag{247}$$

Das ist eine Klein-Gordon-Form: ω_c spielt die Rolle einer Ruhefrequenz. Gewöhnlicher Schall ist der Sonderfall $\omega_c = 0$. Knapp oberhalb der Schwelle, $\omega = \omega_c + \delta\omega$ mit $|\delta\omega| \ll \omega_c$, wird daraus

$$\delta\omega \approx \frac{c_s^2 q^2}{2\omega_c} \,, \tag{248}$$

also dieselbe Beziehung zwischen Frequenzverschiebung und Wellenzahlquadrat wie bei einem freien Teilchen (Abbildung 54).

In einer Kugelschale zwischen $r = a$ und $r = b$, Dicke $d = b - a$, reduziert die s-Welle die Helmholtz-Gleichung auf $u'' + (\omega/c_s)^2 u = 0$ mit $u = r\phi$. Druckknoten auf beiden Rändern liefern $u(a) = u(b) = 0$, also wieder $\omega = n\pi c_s/d$. Der Faktor ist derselbe wie in der Ebene. Eine einzelne dünne Schale bindet die Welle jedoch in radialer Richtung als Resonator und lässt sie winkelartig umlaufen; das diskrete Spektrum ist dann $\omega_n = n\pi c_s/d$, gleichabständig in n, nicht $\propto -1/n^2$. Die Wasserstoffform verlangt etwas anderes: eine Grenzfrequenz, die den ganzen Raum vom Kern bis ins Unendliche erfüllt und nach innen absinkt. Das ist das Bild einer Textur aus Wirbelwänden mit langsam veränderlichem Abstand $d(r)$, nicht das einer einzelnen Schale.




Abbildung 54: (a) Dispersion einer Leitungswelle mit Grenzfrequenz gegen gewöhnlichen Schall $\omega = c_s q$. Die Schwellenentwicklung (248) schmiegt sich an die Wellenleiterkurve nur nahe ω_c an. (b) Dieselbe Aussage gegen q^2: die Schrödinger-Form ist die Tangente am Ursprung.

E.3 Von der Grenzfrequenz zur Wasserstoffgleichung

E.3.1 Radiale Gleichung

Ändern sich d und c_s langsam gegenüber der transversalen Breite, so trägt die Welle am Ort r die lokale Grenzfrequenz $\omega_c(r) = \nu c_s(r)/d(r)$. Die Helmholtz-Gleichung wird zur dreidimensionalen Wellengleichung mit Ortsprofil

$$\nabla^2 \psi + \frac{\omega^2 - \omega_c^2(r)}{c_s^2(r)}\,\psi = 0\,. \tag{249}$$

Für s-Wellen, $\psi = \psi(r)$, ist das

$$\psi'' + \frac{2}{r}\psi' + \frac{\omega^2 - \omega_c^2(r)}{c_s^2(r)}\,\psi = 0\,. \tag{250}$$

Mit $u = r\psi$ fällt der erste Ableitungsterm weg,

$$u'' + \frac{\omega^2 - \omega_c^2(r)}{c_s^2(r)}\,u = 0\,. \tag{251}$$

Die adiabatischen Korrekturen aus $\mathrm{d}d/\mathrm{d}r$ und $\mathrm{d}c_s/\mathrm{d}r$ sind von der relativen Größe der langsamen Parameter α/a und β/a und werden mit diesen geführt. Für $\ell \neq 0$ tritt auf der linken Seite zusätzlich $-\ell(\ell+1)u/r^2$ auf. Das ist derselbe Zentrifugalterm wie in der radialen Schrödinger-Gleichung: die Kugelflächenfunktionen, die Entartung $2\ell+1$ und die Knotenzahl $n-\ell-1$ kommen aus der Drehsymmetrie des dreidimensionalen Raums. Anders als bei den Wirbelringen der begleitenden Notiz muss $2\ell+1$ hier nicht übernommen werden [2].

E.3.2 Die Bedingung für Wasserstoff

Die radiale Wasserstoffgleichung der s-Welle lautet, in Einheiten des Bohr-Radius a,

$$\frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}x^2} + \Big(-\frac{1}{n^2} + \frac{2}{x}\Big) u = 0\,, \qquad x = r/a\,. \tag{252}$$

Gleichung (251) nimmt genau diese Form an, sobald der Ortsanteil von $(\omega^2 - \omega_c^2)/c_s^2$ wie $2/(ar)$ fällt und der Rest eine negative Konstante ist.

Das geschieht exakt, wenn c_s konstant ist und

$$\omega_c^2(r) = \omega_\infty^2 - \frac{\gamma}{r} = \omega_\infty^2 \Big(1 - \frac{2\alpha}{r}\Big)\,, \qquad \gamma = 2\alpha\omega_\infty^2\,. \tag{253}$$

Dann ist

$$\frac{\omega^2 - \omega_c^2}{c_s^2} = \frac{\omega^2 - \omega_\infty^2}{c_s^2} + \frac{2\alpha\omega_\infty^2}{c_s^2 r}\,, \tag{254}$$

für jede Frequenz, nicht nur nahe der Schwelle. Vergleich mit (252) bestimmt den wirksamen Bohr-Radius

$$\frac{2}{a} = \frac{2\alpha\omega_\infty^2}{c_s^2} \qquad \Rightarrow \qquad a = \frac{c_s^2}{\alpha\omega_\infty^2} \tag{255}$$

und die Eigenwerte

$$\omega_n^2 = \omega_\infty^2 - \frac{c_s^2}{a^2 n^2} = \omega_\infty^2 - \frac{\alpha^2\omega_\infty^4}{c_s^2 n^2}\,. \tag{256}$$

Die Bindung sitzt unterhalb der Fernfeld-Grenzfrequenz, $\omega_n < \omega_\infty$. Das Spektrum von $\omega_n^2 - \omega_\infty^2$ ist exakt das Wasserstoffspektrum $\propto -1/n^2$.

Das in der Fragestellung genannte Profil $\omega_c(r) = \omega_\infty(1 - \alpha/r)$ ist die Entwicklung von (253) für $r \gg \alpha$:

$$\omega_c(r) = \omega_\infty \sqrt{1 - \frac{2\alpha}{r}} = \omega_\infty \Big(1 - \frac{\alpha}{r} + \cdots\Big)\,. \tag{257}$$

Setzt man die lineare Form ohne Wurzel ein, so entsteht ein zusätzliches Stück

$$\omega_c^2(r) = \omega_\infty^2 \Big(1 - \frac{2\alpha}{r} + \frac{\alpha^2}{r^2}\Big)\,, \tag{258}$$

also in (251) ein abstoßendes $1/r^2$. In den Einheiten $x = r/a$ und $\lambda = \alpha/a$ lautet die volle Gleichung zur linearen Form, bei konstantem c_s,

$$\frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}x^2} + \Big(\frac{\Omega^2 - 1}{\lambda} + \frac{2}{x} - \frac{\lambda}{x^2}\Big) u = 0\,, \qquad \Omega = \omega/\omega_\infty\,. \tag{259}$$

Das ist Wasserstoff plus der Zentrifugalterm eines effektiven Drehimpulses $\ell_{\mathrm{eff}}(\ell_{\mathrm{eff}} + 1) = \lambda$,

$$\ell_{\mathrm{eff}} = \frac{-1 + \sqrt{1 + 4\lambda}}{2}\,. \tag{260}$$

Die Eigenwerte und Knoten dieses Problems sind geschlossen bekannt (Abschnitt E.5). Für $\lambda \ll 1$ fällt die Korrektur gegen den Schrödinger-Grenzwert (252).

E.3.3 Schwellenentwicklung

Nahe ω_∞ gilt $\omega^2 - \omega_\infty^2 = 2\omega_\infty \delta\omega + \mathcal{O}(\delta\omega^2)$. Aus (254) und (255) folgt

$$\delta\omega_n = -\frac{c_s^2}{2\omega_\infty a^2 n^2} = -\frac{\alpha^2 \omega_\infty^3}{2c_s^2 n^2}\,. \tag{261}$$

Die Frequenzverschiebungen selbst gehen wie $-1/n^2$. Der Unterschied zwischen (256) und (261) ist die übliche Klein-Gordon-Korrektur: $\omega_n^2 - \omega_\infty^2$ ist exakt proportional zu $-1/n^2$, während $\delta\omega_n = \omega_n - \omega_\infty$ es in der Nähe der Schwelle wird. Die relative Abweichung ist von der Größe $|\delta\omega|/\omega_\infty = \lambda/(2n^2)$. Derselbe Parameter $\lambda = \alpha/a$ steuert die $1/r^2$-Korrektur, die Nähe zur Schwelle und, wie sich gleich zeigt, die adiabatische langsame Veränderung der Wände.

Bemerkung 17 (Gezeigt). Unter der Bedingung $\omega_c^2(r) = \omega_\infty^2 - \gamma/r$ und bei konstanter Schallgeschwindigkeit ist die radiale Gleichung exakt die des Wasserstoffs. Der Bohr-Radius ist (255), das Spektrum von $\omega_n^2 - \omega_\infty^2$ geht wie $-1/n^2$, und die Knoten sind die Laguerre-Nullstellen. Die lineare Form $\omega_c = \omega_\infty(1 - \alpha/r)$ fügt ein abstoßendes $1/r^2$ der Stärke $\lambda = \alpha/a$ hinzu. Beides ist gerechnet, nicht angenommen.

Verändert der Hof die Schallgeschwindigkeit, wie in der früheren Fassung, so steht $c_s^2(r) = c_{s\infty}^2(1+\beta/r)$ im Nenner von (251). Der Term $\omega^2/c_s^2(r)$ hängt dann zugleich von der Frequenz und vom Ort ab. Ein und dasselbe Potential für alle Niveaus n gibt es deshalb nur näherungsweise, wenn $\beta \ll a$ ist oder wenn alle betrachteten Zustände so nahe an der Schwelle liegen, dass $\omega \approx \omega_\infty$ für sie gemeinsam gilt. Das zweite ist bei kleinem λ automatisch erfüllt. Ein endliches β/a verschiebt die Knoten merklich; die Zahlen stehen in Abschnitt E.5.

Die Identifikation der Frequenzverschiebung mit einer Energie $E = \hbar\delta\omega$ ist gemessen: Jedes Lichtquant trägt $E = h\nu$ (Photoeffekt, Millikan, 1916; h ist seit 2019 exakt $6{,}62607015 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$). Licht ist ein Zustand desselben Mediums, und die Energie, die beim Übergang zwischen zwei Moden frei wird, trägt das Quant der Differenzfrequenz. Die Form $\propto -1/n^2$ und die Knotenlagen in Einheiten von a sind gezeigt; die Skala ist die gemessene Rydberg-Konstante, $hcR_\infty = 13{,}605\,693\,\mathrm{eV}$.

E.4 Das verlangte Wandabstandsprofil

E.4.1 Form von $d(r)$

Aus $\omega_c = \nu c_s/d$ und dem Ziel $\omega_c(r) = \omega_\infty(1 - \alpha/r)$ folgt, mit dem Hof (241),

$$\frac{d(r)}{d_\infty} = \frac{\sqrt{1+\beta/r}}{1-\alpha/r}\,, \qquad r > \alpha\,, \qquad d_\infty = \frac{\nu c_{s\infty}}{\omega_\infty}\,. \tag{262}$$

Mit $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ ist c_s überall c, also $\beta = 0$ in diesem Ausdruck, und es bleibt $d(r)/d_\infty = 1/(1-\alpha/r)$. Der Faktor $\sqrt{1+\beta/r}$ ist der Vergleich mit der früheren Fassung, in der der Hof c_s hob. Beide Faktoren sind für $r > \alpha$ größer als eins und wachsen nach innen. Der Wandabstand muss also zum Kern hin zunehmen. Im Fernfeld ist

$$\frac{d(r)}{d_\infty} = 1 + \frac{\alpha + \beta/2}{r} + \mathcal{O}(r^{-2})\,. \tag{263}$$

Bei $r = a$ und $\lambda = \alpha/a$, $\mu = \beta/a$ gilt $d(a)/d_\infty = \sqrt{1+\mu}/(1-\lambda)$. Für das kleine $\lambda = 0{,}05$, ohne Hof, sind die Wände am Bohr-Radius um fünf Prozent weiter als im Unendlichen; in der früheren Fassung mit $\mu = 0{,}10$ um zehn Prozent (Abbildung 55).

Das lineare Profil (257) ist nur für $r > \alpha$ sinnvoll. Bei $r = \alpha$ ginge d gegen unendlich, darunter wäre ω_c wieder ansteigend. Das ist ein Artefakt der global genommenen Linearisierung. Physikalisch kann (262) nur in einem Abstand von einigen α an aufwärts stehen. Für $\lambda \ll 1$ liegt die gesamte Wolke von $2s$ und $3s$ sicher darüber.

Aus (255) und $d_\infty = \nu c_s/\omega_\infty$ folgt das Verhältnis der Skalen

$$\frac{d_\infty}{a} = \nu\sqrt{\lambda}\,. \tag{264}$$

Für Druckknoten auf beiden Seiten ist $\nu = \pi$, also $d_\infty/a = \pi\sqrt{\lambda}$. Bei $\lambda = 0{,}05$ ist $d_\infty \approx 0{,}70\,a$, bei $\lambda = 0{,}10$ schon $d_\infty \approx a$. Eine saubere Trennung zwischen transversaler Weite und atomarem Radius verlangt $\lambda \ll 1/\pi^2 \approx 0{,}10$. Dasselbe λ hält die Wände langsam veränderlich: $|d'(a)| \approx \pi\lambda^{3/2}$ ist $0{,}035$ bei $\lambda = 0{,}05$ und $0{,}10$ bei $\lambda = 0{,}10$.




Abbildung 55: (a) Verlangter Wandabstand (262) für $\alpha = 0{,}05\,a$ und drei Hofstärken β. Nach innen muss d wachsen; am Punkt $r = \alpha$ divergiert die lineare Form. Die strichpunktierte Kurve ist die Kernverschmälerung $a_{\text{evac}} \propto 1/c_s$ bei dickem Kernanteil $\eta = 0{,}52$: sie trifft die verlangte Aufweitung nahe $r = a$, nicht die Divergenz. (b) Grenzfrequenz. Das Zielprofil sinkt zum Kern hin. Bei festem Wandabstand hebt der Hof ω_c an — die falsche Richtung. Die Kurven mit $\beta > 0$, die strichpunktierte Kernverschmälerung und die gestrichelten Kurven in (b) gehören zur früheren Fassung mit dem Phasengesetz. Mit $\Delta p = c^2\Delta\rho$ gilt $\beta = 0$ in c_s: In (a) bleibt die Kurve $\beta = 0$, in (b) bleibt ω_c bei festem Wandabstand konstant.

E.4.2 Passt das zu Wirbelschalen?

Hier passen mehrere naheliegende Bilder nicht, und das soll klar stehen.

Wären die Wände die Elektronenschalen selbst, mit Radien wie $n^2 a$, so wüchse ihr Abstand nach außen wie $(2n+1)a$. Dann fiele ω_c nach außen, nicht nach innen. Das ist das Gegenteil von (257).

Liefen die Wände längs Meridianen, wie die Schnitte einer Orange, so wüchse der physikalische Abstand wie r. Wieder wäre d innen enger, ω_c innen höher.

In der früheren Fassung hob eine Textur konstanter Wandweite im Hof $\omega_c = \nu c_s/d$ zum Kern hin an, weil c_s stieg (Abbildung 55b, gestrichelte Kurven); das war die falsche Richtung. Mit $\Delta p = c^2\Delta\rho$ ändert der Hof c_s nicht. Eine feste Wandweite gibt dann ein festes ω_c und bindet nicht.

In der früheren Fassung hatte ein Nachbarweg wenigstens die richtige Richtung. Die Verdünnungsdicke eines Wirbels ist $a_{\text{evac}} = \Gamma/(2\pi\sqrt{2}\,c_s)$ [2]. Im Hof wird c_s größer, die Kerne werden dünner, der freie Kanal zwischen zwei festen Mittellinien weiter. Mit dem Kernanteil $\eta = 2a_{\text{evac}}/d_c$ am Ort im Unendlichen ist

$$\frac{d(r)}{d_\infty} = \frac{1-\eta/\sqrt{1+\beta/r}}{1-\eta}\,. \tag{265}$$

Das kann eine Aufweitung von einigen Prozent bei $r = a$ liefern — passend zu $\lambda = 0{,}05$ —, wenn die Kerne einen merklichen Teil des Abstands füllen (etwa $\eta \approx 0{,}5$ bei $\beta = 0{,}10\,a$, oder $\eta \approx 0{,}15$ bei einem starken Hof $\beta = a$). Es kann nicht die Divergenz bei $r = \alpha$ liefern, und die Form ist nicht $1/(1-\alpha/r)$. Ein starker Hof, der die Kerne kräftig verschmälert, stört zugleich über $c_s(r)$ das Spektrum (Abschnitt E.5). Das ist ein Zielkonflikt, keine Ableitung. Mit $\Delta p = c^2\Delta\rho$ entfällt dieser Weg ganz: c_s steigt im Hof nicht, a_{evac} bleibt gleich, und in (265) gilt $d(r)/d_\infty = 1$.

Bemerkung 18 (Passt nicht / beantwortet). Das verlangte $d(r)$ wächst zum Kern hin. Bohrsche Schalen, Meridianwände und feste Wandweite im Hof tun das Gegenteil. Die Kernverschmälerung zeigte nur in der früheren Fassung in die richtige Richtung; mit $\Delta p = c^2\Delta\rho$ entfällt sie. Warum die Wände nach innen aufweiten, beantwortet die Messung, so weit sie reicht. Gemessen ist das Wasserstoffspektrum $E_n = -hcR_\infty/n^2$ ($R_\infty = 10\,973\,731{,}568\,157\,\mathrm{m}^{-1}$, die $1S$–$2S$-Linie auf 10^{-15}) [F]. Zu ihm gehört genau ein Grenzfrequenzprofil $\omega_c(r) \approx \omega_\infty(1-\alpha/r)$ und damit genau ein Wandprofil $d(r)/d_\infty = 1/(1-\alpha/r)$; mit $\Delta p = c^2\Delta\rho$ ist die Schallgeschwindigkeit überall c. Das Profil $d(r)$ ist also aus dem gemessenen Spektrum gelesen; seine Ursache in den Wänden ist [P]. Eine frühere Fassung las die Aufweitung aus dem Hof: Er sollte c_s zum Kern hin heben und so die Wirbelkerne $a_{\text{evac}} \propto 1/c_s$ dünner machen. Mit $\Delta p = c^2\Delta\rho$ hebt der Hof c_s nicht, und diese Begründung entfällt. Das war ein Fehler. Der Hof wirkt nur über den optischen Index $n = (\rho/\rho_\infty)^2$: Er verlangsamt die Welle zum Kern hin und senkt ω_c, also in die richtige Richtung. Am Bohr-Radius ist dieser Anteil aber nur $GM_p/(a_0c^2) \approx 2{,}35\cdot10^{-44}$, viel zu klein für $\alpha/a = 0{,}05$.

Ein zweiter Punkt soll ebenso klar stehen. Die Anziehung des Mediummodells ist der Gleichgewichtshof (240). In der Wellengleichung dieser Notiz stammt das bindende $1/r$ jedoch nicht aus dem Hof, sondern aus dem Wandabstand. In der früheren Fassung wirkte der Hof akustisch sogar entgegen: er hob c_s und damit, bei festem d, die Grenzfrequenz. Mit $\Delta p = c^2\Delta\rho$ hebt er c_s nicht. Was die Welle bindet, ist die Absenkung von ω_c durch eine nach innen weitere Führung. Der Hof ist das Druckgleichgewicht der begleitenden Notiz; im vorliegenden Wellenleiter wirkt er nur über den kleinen optischen Index.

E.5 Knotenlagen und der Fall ohne Grenzfrequenz

Die Wasserstoff-Radialfunktionen R_{n0} haben $n-1$ Nullstellen [3]. Mit $u = rR$ sind das dieselben Nullstellen,

$$\begin{aligned} 1s:&\quad \text{keine},\\ 2s:&\quad r = 2a\,,\\ 3s:&\quad r = \frac{9 \pm 3\sqrt{3}}{2}\,a \approx 1{,}902a \text{ und } 7{,}098a\,. \end{aligned} \tag{266}$$

Das Verhältnis der beiden $3s$-Knoten ist exakt $2+\sqrt{3} \approx 3{,}732$. Im Schrödinger-Grenzwert ($\lambda = 0$, $\mu = 0$, Gleichung (252)) reproduziert die numerische Integration diese Lagen auf drei Promille; die Werte selbst sind die bekannten Nullstellen der Laguerre-Polynome.

Die lineare Form (259) ist für $\mu = 0$ geschlossen lösbar. Mit ℓ_{eff} aus (260) und $N = n_r + \ell_{\text{eff}} + 1$ liegen die Knoten auf den Nullstellen von $L_{n_r}^{(2\ell_{\text{eff}}+1)}(2x/N)$. Für $\lambda = 0{,}05$ rückt der $2s$-Knoten auf $2{,}145a$ (sieben Prozent), die $3s$-Knoten auf $2{,}036a$ und $7{,}398a$. Bei $\lambda = 0{,}10$ sind es $2{,}283a$ sowie $2{,}163a$ und $7{,}679a$. Die Verschiebung geht nach außen, weil das zusätzliche $1/r^2$ abstößt. Das Spektrum bleibt von der Form $-1/N^2$, mit nicht ganzzahligem N; das Produkt $\varepsilon_n n^2$ weicht von -1 um zehn Prozent bei $\lambda = 0{,}05$ im Grundzustand ab und weniger in den höheren Zuständen (Tabelle 8).

Der folgende Fall gilt nur für die frühere Fassung, in der der Hof c_s hob; mit $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ ist $\beta = 0$, und es gelten die Zeilen ohne Hof. Ein Hof $\beta = 0{,}10\,a$ neben $\lambda = 0{,}05$ schiebt die Knoten weiter: $2s$ auf $2{,}49a$, $3s$ auf $2{,}36a$ und $8{,}12a$. Zugleich zerfällt die Reinheit von $-1/n^2$, $\varepsilon_n n^2$ läuft von $-0{,}79$ im Grundzustand auf $-0{,}91$ bei $n = 3$. Schon eine zehnprozentige Variation von c_s^2 über den Bohr-Radius ist also keine kleine Korrektur an den Knoten. Soll das Wasserstoffbild quantitativ stehen, muss der Hof auf der atomaren Skala schwach sein, $\beta \ll a$, oder in der Wellenleitung selbst kompensiert werden — das wäre eine weitere Annahme an $d(r)$.

Tabelle 8: Knotenlagen in Einheiten des wirksamen Bohr-Radius (255) und das Produkt εn^2, das im Wasserstofffall gleich -1 ist. Die Zeilen mit $\beta = 0$ sind die geschlossene Lösung von (259); die Zeile mit Hof ist numerisch integriert und gehört zur früheren Fassung (mit $\Delta p = c^2\Delta\rho$ gilt $\beta = 0$). Die letzte Zeile ist der Kontrollfall ohne Ortsprofil der Grenzfrequenz.

Fall	$2s$	$3s$ innen	$3s$ außen	Verhältnis	ε_1	$\varepsilon_2 \cdot 4$
Wasserstoff, $\lambda = \beta = 0$	2	1,902	7,098	3,732	-1	-1
$\alpha/a = 0{,}05$	2,145	2,036	7,398	3,634	$-0{,}911$	$-0{,}954$
$\alpha/a = 0{,}10$	2,283	2,163	7,679	3,551	$-0{,}839$	$-0{,}914$
$\alpha/a = 0{,}05$, $\beta = 0{,}10\,a$	2,488	2,360	8,124	3,442	$-0{,}786$	$-0{,}868$
Hohlraum j_0, keine $\omega_c(r)$	—	$R/3$	$2R/3$	2	—	—

E.5.1 Kontrollfall ohne Grenzfrequenz

Ohne Wände ist $\omega_c = 0$ und (251) wird zu $u'' + (\omega/c_s)^2 u = 0$. Regularität im Ursprung erzwingt $u = \sin(qr)$ mit $q = \omega/c_s$, also $\psi \propto j_0(qr)$. Das ist ein Kontinuum auslaufender oder stehender Kugelwellen. Es gibt keine gebundenen Zustände und kein diskretes Spektrum.

Setzt man künstlich eine harte Außenwand bei $r = R$ (Hohlraumresonator), so folgt $q_n = n\pi/R$ und $\omega_n = n\pi c_s/R$. Die Frequenzen liegen äquidistant in n, nicht wie $-1/n^2$. Die s-Mode mit zwei inneren Knoten ($3s$-artig) hat die Nullstellen $r = R/3$ und $r = 2R/3$. Ihr Verhältnis ist genau 2, gegen $2 + \sqrt{3} \approx 3{,}732$ beim Wasserstoff. Skaliert man beide Wellenfunktionen auf denselben äußeren Knoten, so sitzt der innere Wasserstoffknoten bei $0{,}268$ der äußeren Lage, der Hohlraumknoten bei $1/2$ (Abbildung 56c). Gleichabständige Bessel-Knoten sind nicht die Laguerre-Knoten. Ohne geeignet fallende Grenzfrequenz entsteht das Wasserstoffbild nicht.




Abbildung 56: (a) Radiale Funktionen $u = rR_{n0}$ des Wasserstoffs. Die senkrechten Linien markieren die Knoten (266). (b) Dieselben $2s$- und $3s$-Zustände (durchgezogen) gegen die volle lineare Form (259) bei $\alpha/a = 0{,}10$ (gestrichelt). Die Knoten rücken nach außen. (c) Kontrolle: der $3s$-Zustand gegen die j_0-Mode eines Hohlraums, beide auf den äußeren inneren Knoten skaliert. Die inneren Knoten liegen bei $0{,}268$ und $0{,}5$.

Bemerkung 19 (Gezeigt). Im Schrödinger-Grenzwert trägt die Welle exakt die Laguerre-Knoten des Wasserstoffs. Die führende Korrektur der linearen Form $\omega_c = \omega_\infty(1 - \alpha/r)$ verschiebt sie nach außen, um sieben Prozent am $2s$-Knoten bei $\alpha/a = 0{,}05$. Ohne Grenzfrequenz gibt es keine Bindung; ein künstlicher Hohlraum liefert gleichabständige Knoten im Verhältnis 2 statt $3{,}732$ und Frequenzen $\propto n$ statt $-1/n^2$.

E.6 Übersicht

Tabelle 9: Was gezeigt, gemessen oder beantwortet ist, und wo ein Bild nicht passt.

Gegenstand	Status	Bemerkung
akustische Gleichung (242) ohne Wände	gezeigt	gewöhnlicher Schall $\omega = c_s q$, keine Grenzfrequenz, keine Bindung. Der Hof erzeugt keine Schwerewellen.
Wellenleiter-Dispersion (247)	gezeigt	$\omega^2 = c_s^2 q^2 + \omega_c^2$ mit $\omega_c = \nu c_s / d$.
Faktor $\nu = \pi$ (beide Druckknoten) bzw. $\pi/2$ (gemischt)	gezeigt	Standard der Helmholtz-Gleichung; in der Kugelschale derselbe Faktor für die s-Welle.
zwei harte Wände	gezeigt / passt nicht	die Mode $n = 0$ hat keine Grenzfrequenz. Der Schrödinger-Weg ist dann zu.
Wirbelwände als Druckknoten	gemessen / zugeordnet	evakuierte Kerne legen es nahe; Atome sind gemessen stationär; Kelvin–Helmholtz unterdrückt die Schersteifigkeit des Mediums.
Schwellenentwicklung $\to$ Schrödinger	gezeigt	Gleichung (248) und, mit $\omega_c^2 = \omega_\infty^2 - \gamma/r$, die exakte Abbildung auf (252).
Bohr-Radius $a = c_s^2/(\alpha\omega_\infty^2)$	gezeigt	Vergleich der $1/r$-Koeffizienten, unabhängig von ν.
Spektrum $\delta\omega_n \propto -1/n^2$	gezeigt	exakt für $\omega_n^2 - \omega_\infty^2$ beim Profil (253); für $\delta\omega_n$ in der Schwellenentwicklung, Fehler $\lambda/(2n^2)$.
Laguerre-Knoten $2a$, $1{,}902a$, $7{,}098a$	gezeigt	im Schrödinger-Grenzwert exakt; bei $\alpha/a = 0{,}05$ um sieben Prozent nach außen verschoben.
$2\ell + 1$, $Y_{\ell m}$, Knotenzahl $n - \ell - 1$	gezeigt	folgen aus der dreidimensionalen Wellengleichung, keine übernommene Kugelsymmetrie.
verlangtes Profil $d(r)/d_\infty = 1/(1 - \alpha/r)$	gezeigt	d muss nach innen wachsen. Die Linearform divergiert bei $r = \alpha$.
Bohrsche Schalen oder Meridianwände als $d(r)$	passt nicht	ihr Abstand wächst nach außen, ω_c fiele nach außen.
fester Wandabstand im Hof	passt nicht	ein festes d gibt ein festes ω_c und bindet nicht (frühere Fassung: der Hof hob c_s und ω_c).
bindendes $1/r$ aus dem Hof	passt nicht	in dieser Wellengleichung stammt es aus $d(r)$. Der Hof wirkt nur über den optischen Index, am Bohr-Radius $2{,}35 \cdot 10^{-44}$.
Kernverschmälerung $a_{\text{evac}} \propto 1/c_s$	entfällt	mit $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ steigt c_s im Hof nicht; in der früheren Fassung: richtige Richtung, begrenzte Amplitude, nicht die Form $1/(1 - \alpha/r)$.

Gegenstand	Status	Bemerkung
warum die Wände nach innen aufweiten	beantwortet	$d(r)$ ist aus dem gemessenen Spektrum gelesen [F]; seine Ursache in den Wänden ist [P].
Hohlraum ohne $\omega_c(r)$	gezeigt	Knotenverhältnis 2 gegen $3{,}732$, Spektrum $\propto n$ gegen $-1/n^2$.
Rydberg-Skala, Identifikation $E=\hbar\delta\omega$	gemessen	die Form ist klassisch gezeigt; $E=h\nu$ und R_∞ sind gemessen.
Stationarität der Wirbelwände selbst	gemessen / beantwortet	Atome sind stationär; Zirkulation erhalten, $\sum\Gamma_i=0$, Schersteifigkeit gegen Kelvin–Helmholtz.

E.7 Schluss

Gezeigt ist: Wirbelwände können im Medium eine Grenzfrequenz erzeugen, ohne dass die Teilchen einen festen Ort brauchen. Die Dispersion ist $\omega^2=c_s^2q^2+\omega_c^2$ mit $\omega_c=\nu c_s/d$. Das gilt für Druckknoten auf den Wänden ($\nu=\pi$) und für die gemischte Belegung ($\nu=\pi/2$). Zwei harte Wände lassen eine Mode ohne Grenzfrequenz zu; dann bleibt gewöhnlicher Schall.

Gezeigt ist ferner: sinkt diese Grenzfrequenz nach innen wie $\omega_\infty(1-\alpha/r)$, so wird die radiale Wellengleichung nahe der Schwelle zur Schrödinger-Gleichung des Wasserstoffs. Der Bohr-Radius ist $a=c_s^2/(\alpha\omega_\infty^2)$, die Frequenzverschiebungen gehen wie $-1/n^2$, und die Knoten sitzen bei $2a$, $1{,}902a$ und $7{,}098a$. Für das Profil $\omega_c^2=\omega_\infty^2-\gamma/r$ ist die Abbildung sogar exakt, nicht nur nahe der Schwelle. Winkelanteil und $2\ell+1$ kommen aus der dreidimensionalen Gleichung. Die führende Korrektur der linearen Form verschiebt die Knoten nach außen, mäßig solange $\alpha\ll a$ ist. Ein Hof, der c_s auf der Skala von a merklich hebt, schiebt sie stärker und verdirbt die Reinheit von $-1/n^2$; mit $\Delta p=c^2\Delta\rho$ hebt der Hof c_s nicht, dieser Fall tritt also nicht ein.

Ohne Grenzfrequenz entsteht nichts davon. Freier Schall entläuft; ein Hohlraum liefert gleichabständige Bessel-Knoten im Verhältnis 2 und Frequenzen proportional zu n.

Der Abstand der Wände muss zum Kern hin wachsen. Bohrsche Schalen, Meridianwände und feste Weite im Hof tun das Gegenteil. Warum die Wände nach innen aufweiten, beantwortet die Messung, so weit sie reicht. Gemessen ist das Wasserstoffspektrum $E_n=-hcR_\infty/n^2$ ($R_\infty=10\,973\,731{,}568\,157\,\mathrm{m}^{-1}$, die $1S$–$2S$-Linie auf 10^{-15}) [F]. Zu ihm gehört genau ein Grenzfrequenzprofil $\omega_c(r)\approx\omega_\infty(1-\alpha/r)$ und damit genau ein Wandprofil $d(r)/d_\infty=1/(1-\alpha/r)$; mit $\Delta p=c^2\Delta\rho$ ist die Schallgeschwindigkeit überall c. Das Profil $d(r)$ ist also aus dem gemessenen Spektrum gelesen; seine Ursache in den Wänden ist [P]. Eine frühere Fassung las die Aufweitung aus dem Hof: Er sollte c_s zum Kern hin heben und so die Wirbelkerne $a_{\mathrm{evac}}\propto 1/c_s$ dünner machen. Mit $\Delta p=c^2\Delta\rho$ hebt der Hof c_s nicht, und diese Begründung entfällt. Das war ein Fehler. Der Hof wirkt nur über den optischen Index $n=(\rho/\rho_\infty)^2$: Er verlangsamt die Welle zum Kern hin und senkt ω_c, also in die richtige Richtung. Am Bohr-Radius ist dieser Anteil aber nur $GM_p/(a_0c^2)\approx 2{,}35\cdot10^{-44}$, viel zu klein für $\alpha/a=0{,}05$. In dieser Wellengleichung stammt das bindende $1/r$ aus dem Wandabstand, nicht aus dem Dichtehof; der Hof ist das Druckgleichgewicht der begleitenden Notiz. Dass die Schichten als Wände stehen bleiben, ist gemessen: Atome sind stationär, der Grundzustand des Wasserstoffs zerfällt nicht, und seine Linien sind scharf. Im Medium bleiben die Wän-

de stehen, weil ihre Zirkulation erhalten ist (Kelvin) und eine geschlossene Schale $\sum \Gamma_i = 0$ trägt (Anhang B); eine Rückstellspannung parallel zur Fläche unterdrückt die Kelvin–Helmholtz-Anfachung einer Wirbelfläche, so wie Oberflächenspannung oder ein Magnetfeld längs der Strömung (Chandrasekhar, 1961, Kap. XI), und das Medium ist schersteif (Tensormode der Gravitationswellen, Abschnitt A.8).

Literatur

[1] S. Reuvekamp, „Der $1/r$-Dichtehof aus dem Strahlungsgleichgewicht. Kerngleichgewicht, magnetisches Analogon und warum der Hof kein Strömungseffekt ist“, Anhang B dieses Bandes, Notiz, 7. November 2026.

[2] S. Reuvekamp, „Wirbelringe, Torusknoten und stehende Wellen im $\gamma = 2$-Medium. Ein Vergleich mit den Wasserstofforbitalen“, Notiz, 7. November 2026.

[3] E. Schrödinger, „Quantisierung als Eigenwertproblem“, Annalen der Physik **384** (1926), 361–376; **384** (1926), 489–527.

F Bjerknes-Kräfte im Medium

Zusammenfassung. Die mitschleppende Masse eines Körpers im Medium wirkt nur bei Beschleunigung und liefert kein Wandprofil $d(r)$. Deshalb wird geprüft, ob sekundäre Bjerknes-Kräfte zwischen pulsierenden Körpern im barotropen Medium $\Delta p = c^2\Delta\rho$ die fehlende Anziehung $\propto 1/r^2$ tragen können. Die Frequenz ω bleibt frei. Die Amplitude des Elektrons wird an den verdünnten Wirbelkern gebunden, $a_{\text{evac}} = \Gamma/(2\pi\sqrt{2}\,c_s)$, mit relativer Auslenkung $\varepsilon = \delta a/a_{\text{evac}} < 1$.

Gezeigt ist: gleichphasige Pulsatoren ziehen sich an, gegenphasige stoßen sich ab. Das ist das umgekehrte Vorzeichen der Elektrostatik (Bjerknes 1906). Ein statischer Über- oder Unterdruck erzeugt keine zeitgemittelte Bjerknes-Kraft. Zwei Elektronen gleicher Phase ziehen sich an — das Gegenteil der Coulomb-Abstoßung, die schon das Heliumspektrum verlangt. Die saubere $1/d^2$-Form gilt im Nahfeld $d \ll \lambda$, nicht im Fernfeld: dort oszilliert das Vorzeichen, und die Kraft fällt in führender Ordnung wie $1/d$. Eine pulsierende Kugel strahlt als Monopol; das Zeitmittel der Leistung ist $\langle P\rangle = \rho\omega^2 Q_0^2/(8\pi c_s)$. Der Gütefaktor aus der Zusatzmasse der Radialbewegung ist $1/(qR)$, die Energie fällt in $1/(2\pi qR)$ Perioden auf den e-ten Teil. Ohne Antrieb ist die Pulsation transient.

Ein Vorzeichenwechsel bei kleinem Abstand entsteht nicht aus dem Monopolterm bei fester Phase. Hintereinander kann die Umströmungskraft $\propto 1/d^4$ die Anziehung bei $d^* = \sqrt{3}\,U/(\omega\varepsilon)$ in eine Abstoßung kippen; nebeneinander kippt nichts. Mit $\Delta p = c^2\Delta\rho$ ist c_s im Hof konstant, also auch die Augengröße a_{evac}; die Bedingung „wo die Blasengröße stillsteht, steht der Abstand still“ zeichnet deshalb keinen Abstand aus. Ein bevorzugter Radius r^* aus Druckbilanz quer durchs Auge skaliert wie $\sqrt{n}$, nicht wie n^2, und ist instabil.

F.1 Fragestellung

In der Wellenleiter-Notiz senkt ein nach innen weiterer Wandabstand die Grenzfrequenz und kann so die Wasserstoffgleichung tragen [3]. Die mitschleppende Masse, die ein beschleunigter Körper im Medium mitnimmt, wirkt nur während der Beschleunigung. Sie liefert kein stationäres Profil $d(r)$. Deshalb wird hier ein anderer Träger der Anziehung $\propto 1/r^2$ geprüft: die sekundäre Bjerknes-Kraft zwischen zwei pulsierenden Körpern [4, 5].

Drei Setzungen stehen am Anfang und bleiben kenntlich. Die Pulsationsfrequenz ω ist ein freier Parameter, nicht die Grenzfrequenz der Wellenleiter-Notiz. Die Amplitude des Elektrons wird aus seiner Zirkulation Γ gewonnen: der verdünnte Wirbelkern hat im Medium den Radius $a_{\text{evac}} = \Gamma/(2\pi\sqrt{2}\,c_s)$ [2], und dieser Radius schwingt mit

$$a(t) = a_{\text{evac}}\big(1 + \varepsilon\cos(\omega t + \varphi)\big)\,, \qquad \varepsilon < 1\,. \tag{267}$$

In führender Ordnung ist die Volumenamplitude $A_e = 4\pi a_{\text{evac}}^3\varepsilon$. Der Kern wird als pulsierende Kugel vom Radius R_N und der relativen Amplitude ε_N angesetzt, $A_N =$

$4\pi R_N^3 \varepsilon_N$. Das Medium bleibt barotrop mit $\Delta p = c^2 \Delta\rho$; der Gleichgewichtshof ändert ρ nach (269), nicht c_s, tritt aber in der führenden Bjerknes-Formel nur als lokale Dichte auf. Alle Kräfte skalieren mit $\varepsilon_N \varepsilon_e \omega^2$. Als obere Schranke gelten $\varepsilon = 1$ und $R_N = a_{\text{evac}}$; als nukleare Schranke der Protonradius.

Zwei Rollen werden getrennt gehalten. Erstens das Coulomb-Analog: die zeitgemittelte Kraft zwischen Kern (Überdruckgebiet) und Elektron (Unterdruckauge) soll die Anziehung ke^2/d^2 der Bohr-Formel $R_n = n^2\hbar^2/(\mu k e^2)$ tragen. Zweitens das Bindungsanalog: gleichphasige Schalen benachbarter Atome als Träger einer molekularen Bindung. Innerhalb eines Atoms sollen sich die Elektronenwirbel nach der Helmholtz–Kelvin-Regel nicht kreuzen [2]; die Bjerknes-Anziehung zwischen ihnen wäre dann unterdrückt. Das liefert für sich nicht die Coulomb-Abstoßung, die das Heliumspektrum braucht; sie kommt aus der Schersteifigkeit des Mediums (Abschnitt F.7).

Hinzu kommen zwei Bilder. Im Nahfeld soll die Kraft „kippen“, analog zu zwei Ringmagneten, deren Feld sich in der Berührung umordnet. Und: wenn die Größe der Blase sich nicht ändert, ändert sich der Abstand zum Kern nicht. Das wird als Gleichgewichtsbedingung im Hof gelesen: der Bahnradius ist dort, wo das Auge seine Größe nicht ändert, weil der Unterdruck des Wirbels den Hofdruck die Waage hält. Geprüft wird, ob ein solches r^* existiert, ob es stabil ist, und ob es mit $\Gamma = nh/m_e$ wie $n^2 a_0$ skaliert.

Die Konstante der Zustandsgleichung ist c^2. Die Coulomb-Konstante heißt k, mit $ke^2 = 2{,}307 \cdot 10^{-28}\,\mathrm{J\,m}$. Wellenzahlen heißen $q = \omega/c_s$. Bei jedem Ergebnis steht, ob es gerechnet, gemessen oder zugeordnet ist.

F.2 Gleichungen

Das Medium ist barotrop mit

$$\Delta p = c^2 \Delta\rho\,, \qquad h = c^2 \ln\frac{\rho}{\rho_\infty}\,, \qquad c_s^2 = c^2\,. \tag{268}$$

Der Gleichgewichtshof [1] lautet

$$\rho = \rho_\infty e^{\beta/r} \simeq \rho_\infty\Big(1 + \frac{\beta}{r}\Big)\,, \qquad \beta = \frac{GM}{c_{s\infty}^2}\,, \qquad c_s(r) = c_{s\infty} = c\,. \tag{269}$$

Ein Wirbel der Zirkulation Γ verdünnt seinen Kern auf ρ_∞/e, wo $u = \Gamma/(2\pi s)$ den Wert $\sqrt{2}\,c_s$ erreicht,

$$a_{\text{evac}}(r) = \frac{\Gamma}{2\pi\sqrt{2}\,c_s(r)} = a_\infty\,, \qquad a_\infty = \frac{\Gamma}{2\pi\sqrt{2}\,c_{s\infty}}\,. \tag{270}$$

Die Augengröße hängt also nicht vom Abstand ab. Eine frühere Fassung rechnete mit dem Phasengesetz einer dichten Phase; dort stieg c_s im Hof, und es galt $a_{\text{evac}}(r) = a_\infty/\sqrt{1+\beta/r}$, zum Kern hin dünner. Mit $\Delta p = c^2\Delta\rho$ entfällt diese Kopplung.

Eine radial pulsierende Kugel vom Radius R erzeugt außen das Monopolpotential $\phi = -Q(t)/(4\pi r)$ mit dem Volumenstrom $Q = \dot V = 4\pi R^2 \dot R$. Die kinetische Energie der Außenströmung ist

$$T = \frac{1}{2}\big(4\pi\rho R^3\big)\dot R^2 = 2\pi\rho R^3 \dot R^2 = \frac{\rho Q^2}{8\pi R}\,. \tag{271}$$

Die zugehörige Masse der Radialbewegung ist $4\pi\rho R^3$, nicht die translatorische Zusatzmasse $\frac{1}{2}\rho V$. Für zwei Monopole im Abstand d kommt der Kreuzterm

$$T_{12} = \frac{\rho Q_1 Q_2}{4\pi d} \tag{272}$$

hinzu. Die Wechselwirkung verhält sich wie eine effektive Energie $-T_{12}$. Die Kraft längs der Verbindungslinie, positiv als Abstoßung, ist deshalb

$$F = -\frac{\rho}{4\pi d^2}\, Q_1 Q_2 = -\frac{\rho}{4\pi d^2}\, \dot V_1 \dot V_2 \,. \tag{273}$$

F.3 Vorzeichen

Für harmonische Volumina $V_i = A_i \cos(\omega t + \varphi_i)$ gilt $\langle \dot V_1 \dot V_2 \rangle = (\omega^2 A_1 A_2/2)\cos(\varphi_1 - \varphi_2)$, also

$$\langle F \rangle = -\frac{\rho \omega^2 A_1 A_2}{8\pi d^2}\, \cos(\Delta\varphi)\,, \qquad \Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2\,. \tag{274}$$

Gleichphasige Pulsatoren ($\Delta\varphi = 0$) ziehen sich an. Gegenphasige ($\Delta\varphi = \pi$) stoßen sich ab. Das hat Bjerknes selbst so festgehalten: zwischen Körpern gleicher Phase besteht eine scheinbare Anziehung, zwischen Körpern entgegengesetzter Phase eine scheinbare Abstoßung, proportional zum Produkt der Intensitäten und zum inversen Quadrat des Abstands [4]. Das Geschwindigkeitsfeld gleichphasiger Pulsatoren sieht aus wie das elektrische Feld gleichnamiger Ladungen — die Kraft hat jedoch das umgekehrte Vorzeichen. Das ist der von Bjerknes betonte Unterschied zur Elektrostatik.

Ein statischer Über- oder Unterdruck ist eine Verschiebung des mittleren Volumens, kein $\dot V$. Sein Beitrag zu (274) verschwindet. „Kern gleich Überdruck, Elektron gleich Unterdruck“ ist deshalb keine Phasenaussage und keine Bjerknes-Kraft, solange nicht zusätzlich eine Schwingung angesetzt wird.

Welche Phase Kern und Elektron haben, beantwortet die Messung: Kern und Elektron ziehen sich an, haben also entgegengesetzte Ladung. Im schersteifen Medium ziehen gegenphasige Pulsatoren einander an (Leahy, 1884; Abschnitt F.7); Kern und Elektron pulsieren gegenphasig. Für die reibungslose Flüssigkeit allein liegen zwei Lesarten nahe. Werden beide passiv von demselben Druckfeld angetrieben, so schrumpfen sie gemeinsam, wenn der äußere Druck steigt: sie sind gleichphasig und ziehen sich an. Das wäre für Kern und Elektron das gewünschte Vorzeichen. Identifiziert man dagegen Über- und Unterdruck mit entgegengesetzter Phase, so stoßen sich Kern und Elektron ab — das Gegenteil der Bindung.

Zwei Elektronen sind vom selben Typ. Natürlich pulsieren sie gleichphasig, ob man sie als zwei Unterdruckaugen oder als zwei passive Schwinger im selben Feld liest. Dann ziehen sie sich an. Dasselbe gilt für zwei Kerne. Tabelle 10 stellt das neben Coulomb.

Die zweite Rolle — molekulare Bindung — benutzt gerade diese gleichphasige Anziehung zwischen Schalen benachbarter Atome (Abschnitt F.8). Innerhalb eines Atoms soll dieselbe Anziehung nicht wirken, weil sich die Elektronenwirbel nicht begegnen: die Schalenordnung und die Regel, dass sich Wirbellinien im idealen Medium nicht kreuzen, halten sie auseinander [2]. Das unterdrückt eine Anziehung, ersetzt sie aber nicht durch die Abstoßung, die die Atomphysik braucht; diese liefert die Schersteifigkeit des Mediums: gleichphasige Pulsatoren stoßen sich dort ab (Abschnitt F.7). Im Helium liegt die erste Ionisierungsenergie bei $24{,}6\,\mathrm{eV}$, der

Tabelle 10: Vorzeichenkarte. Positiv gedacht als das, was Coulomb tut; Bjerknes bei vorgeschriebener Phase. Ein statischer Druckversatz liefert in keiner Spalte eine zeitgemittelte Kraft.

Paar	Coulomb	Bjerknes, gleichphasig	Bjerknes, gegenphasig
Kern–Elektron	Anziehung	Anziehung	Abstoßung
Elektron–Elektron	Abstoßung	Anziehung	Abstoßung
Kern–Kern	Abstoßung	Anziehung	Abstoßung

wasserstoffähnliche Wert für He^{+} bei $54{,}4\,\mathrm{eV}$. Der Unterschied von etwa $30\,\mathrm{eV}$ ist im Wesentlichen die Elektron–Elektron-Abstoßung. Wäre die e–e-Kraft null, so läge die Ionisierung nahe $54\,\mathrm{eV}$. Eine ununterdrückte Bjerknes-Anziehung würde die Elektronen zusätzlich zusammenziehen. Beides passt nicht zum Spektrum.

Bemerkung 20 (Gezeigt). Gleichphasig zieht an, gegenphasig stößt ab, Formel (274). Statischer Über- oder Unterdruck trägt nicht bei. Unter jeder natürlichen Zuordnung gleicher Teilchen zu gleicher Phase ziehen sich zwei Elektronen an. Das ist das umgekehrte Coulomb-Vorzeichen und lässt sich durch keine Wahl von ω oder ε wenden.

F.4 Abstandsgesetz

Im kompressiblen Medium läuft das Monopolpotential als auslaufende Kugelwelle, $\phi = -Q(t - r/c_s)/(4\pi r)$. Der Druck ist $p' = \rho\dot{Q}(t - r/c_s)/(4\pi r)$. Der Gradient enthält neben dem Nahfeldstück $1/r^2$ das Fernfeldstück $(1/c_s r)\,\partial_t$. Für harmonische Volumina folgt

$$\langle F\rangle = -\frac{\rho\omega^2 A_1 A_2}{8\pi d^2}\Big[\cos(\Delta\varphi + qd) + qd\,\sin(\Delta\varphi + qd)\Big]\,, \tag{275}$$

mit $q = \omega/c_s$ und $qd = \omega d/c_s$. Im Grenzwert $qd \to 0$ bleibt (274): die Kraft fällt wie $1/d^2$ und ändert ihr Vorzeichen nicht mit dem Abstand. Das ist das Nahfeld, $d \ll \lambda = 2\pi/q$, genauer $qd \ll 1$.

Im Fernfeld $qd \gg 1$ überwiegt der zweite Summand. Die Kraft fällt dann wie $1/d$ und ihr Vorzeichen folgt $\sin(\Delta\varphi + qd)$: es wechselt alle halbe Wellenlänge (Abbildung 57). Die Behauptung, die $1/d^2$-Form gelte, solange d groß gegen die Wellenlänge sei, ist umgekehrt. Groß gegen die Wellenlänge ist gerade der Bereich, in dem das Coulomb-Bild zerfällt.

Bemerkung 21 (Gezeigt). Die Coulomb-Form $1/d^2$ mit festem Vorzeichen ist das Nahfeld $qd \ll 1$. Im Fernfeld oszilliert das Vorzeichen, und die führende Ordnung ist $1/d$.

F.5 Kippt die Kraft im Nahfeld?

Das Bild zweier Ringmagnete, deren Feld sich in der Berührung umordnet, verlangt einen Vorzeichenwechsel bei kleinem Abstand. Der reine Monopolterm (274) bei fester Phase tut das nicht: er behält sein Vorzeichen bis zum Kontakt. Endliche Radien korrigieren die Größe um relative Stücke $\mathcal{O}((R/d)^2)$ aus der Mittelung des




Abbildung 57: (a) Kraft mal d^2, normiert. Im markierten Nahfeld geht der gleichphasige Verlauf gegen -1 (Anziehung) und der gegenphasige gegen $+1$. Danach wächst die Schwingung wie qd: die Kraft selbst geht wie $1/d$. (b) Dieselbe gleichphasige Kraft gegen d/λ, verglichen mit einem reinen $1/d^2$. Hinter etwa einer viertel Wellenlänge löst sich die Kurve von Coulomb und wechselt das Vorzeichen.

Feldes $1/r$ über die Kugelfläche. Bei Berührung, $d \simeq R_1 + R_2$, ist das eine Korrektur der Ordnung eins, kein Vorzeichenwechsel.

Ein bekannter Vorzeichenwechsel der Literatur betrifft getriebene Blasen in der Nähe ihrer Minnaert-Resonanz [5, 6, 7]. Dort ist die Phase nicht vorgeschrieben. Sie folgt aus dem äußeren Schallfeld und aus der Kopplung der beiden Schwinger, und diese Kopplung wächst mit $1/d$. Bei genügend kleinem Abstand kann einer der beiden durch die Resonanz geschoben werden; dann wird aus Gleichphasigkeit Gegenphasigkeit, und die Kraft dreht um. Das verlangt zwei zusätzliche Annahmen, die hier nicht gesetzt sind: ein äußeres Treiberfeld und eine Gasfeder. Ein evakuiertes Wirbelauge hat keine Minnaert-Feder — eine leere Höhle will kollabieren (Rayleigh), die Stabilität kommt aus der Drehung, mit einer natürlichen Skala $\omega \sim c_s/a_{\mathrm{evac}}$. Eine resonante, vom Abstand abhängige Phase braucht das Medium für das Coulomb-Vorzeichen nicht: Im schersteifen Medium stoßen gleichphasige Pulsatoren einander schon ohne Resonanz ab (Leahy, 1884).

Eine zweite, hier schon gerechnete Kraft kann hintereinander wirklich kippen. Zwei Körper im gemeinsamen Strom wirken über ihre Dipolfelder mit [1]

$$F_\parallel = \frac{3\pi\rho_\infty U^2 R^6}{d^4}\,(2 - 3\sin^2\theta)\,, \tag{276}$$

positiv als Abstoßung. Hintereinander ($\theta = 0$) ist das $+6\pi\rho U^2 R^6/d^4$, nebeneinander $-3\pi\rho U^2 R^6/d^4$. Das Richtungsmittel verschwindet. Überlagert man die gleichphasige Bjerknes-Anziehung $F = -k_{\mathrm{eff}}/d^2$ mit $k_{\mathrm{eff}} = 2\pi\rho\omega^2\varepsilon^2 R^6$ (gleiche Radien, $\varepsilon_N = \varepsilon_e = \varepsilon$), so gilt hintereinander

$$F = -\frac{k_{\mathrm{eff}}}{d^2} + \frac{6\pi\rho U^2 R^6}{d^4}\,, \qquad d^* = \sqrt{3}\,\frac{U}{\omega\varepsilon}\,. \tag{277}$$

Für $d > d^*$ überwiegt die Anziehung, für $d < d^*$ die Abstoßung. Das zugehörige Potential $V = -k_{\mathrm{eff}}/d + C/(3d^3)$ hat bei d^* ein Minimum. Nebeneinander ziehen beide Stücke an: es gibt kein d^* und kein Minimum (Abbildung 58).




Abbildung 58: (a) Hintereinander: die Bjerknes-Anziehung und die abstoßende $1/d^4$-Umströmung kreuzen bei d^*. Weiter außen zieht die Summe an, weiter innen stößt sie ab. (b) Nebeneinander ziehen beide Beiträge an; ein Kippen findet nicht statt. Die Kurven gelten für das Beispiel $U/(\omega\varepsilon R) = 2$.

Diese Kippung ist kein Coulomb-Gesetz. Coulomb hält sein Vorzeichen auf jeder Skala und ist isotrop. Hier hängt das Vorzeichen vom Winkel ab, und das Richtungsmittel der $1/d^4$-Kraft ist null. Soll die Bjerknes-Form bei $d \sim a_0$ zugleich überwiegen und im Nahfeld bleiben, so muss $U/\varepsilon \ll \omega a_0 \ll c_s$, also $U/\varepsilon \ll c_s$ gelten. Für U von der Größe der Bohr-Geschwindigkeit und $c_s = v_{\mathrm{Bohr}}/\sqrt{2}$, wie sie zu $a_{\mathrm{evac}} = a_0$ und $\Gamma = h/m_e$ gehört, ist dieses Fenster leer.

Magnus- und Rotlet-Wechselwirkung sind kein zentrales $1/d^2$. Der Rotlet eines drehenden Kerns fällt wie das Feld eines magnetischen Dipols [1]; zwei solche Dipole wirken wie $1/d^4$ und wechseln das Vorzeichen mit der Lage, nicht plötzlich mit einem radialen d^* bei fester Lage. Eine Überlagerung mit Bjerknes hätte formal wieder ein d^*, dessen Wert aber vom unbestimmten Moment abhängt und hier nicht festgelegt wird.

Bemerkung 22 (Gezeigt). Bei fester Phase gibt der Monopolterm kein Nahfeld-Kippen. Hintereinander existiert ein $d^* = \sqrt{3}\,U/(\omega\varepsilon)$ aus der $1/d^4$-Umströmung; nebeneinander nicht. Ein resonantes Kippen nach Crum, Doinikov und Mettin verlangt Treiber und Feder, die hier nicht gesetzt sind.

F.6 Strahlungsverlust

Eine pulsierende Kugel ist ein akustischer Monopol. Im Fernfeld gilt $p = \rho\dot{Q}(t - r/c_s)/(4\pi r)$ und $u_r = \dot{Q}(t - r/c_s)/(4\pi c_s r)$. Die Momentanleistung durch eine große

Sphäre ist $\rho\dot{Q}^2/(4\pi c_s)$. Mit $Q = Q_0\cos(\omega t)$ ist $\langle\dot{Q}^2\rangle = \omega^2 Q_0^2/2$, also

$$\langle P\rangle = \frac{\rho\omega^2 Q_0^2}{8\pi c_s}\,. \tag{278}$$

Ohne Zeitmittel stünde 4π im Nenner; das Mittel über die Periode liefert den Faktor $1/2$. Bei fester Volumenamplitude A ist $Q_0 = \omega A$ und $\langle P\rangle \propto \omega^4 A^2$. Das ist dieselbe Frequenzpotenz, die oft mit Rayleigh-Streuung verbunden wird; hier ist es Monopolstrahlung, keine Dipolstreuung einer einlaufenden Welle.

Die gespeicherte Energie der Radialbewegung sei die eines schwach gedämpften Schwingers, das Doppelte der mittleren Zusatzmasse-Energie $\langle T\rangle = \rho Q_0^2/(16\pi R)$, also $E = \rho Q_0^2/(8\pi R)$. Der Gütefaktor ist

$$Q_f = \frac{\omega E}{\langle P\rangle} = \frac{c_s}{\omega R} = \frac{1}{qR}\,. \tag{279}$$

Die Energie fällt wie $e^{-\omega t/Q_f}$ und erreicht $1/e$ nach

$$N = \frac{Q_f}{2\pi} = \frac{1}{2\pi qR} \tag{280}$$

Perioden. Für $qR = 0{,}1$ sind das $1{,}6$ Perioden, für $qR = 0{,}01$ sechzehn. Die Pulsation ist ohne äußeren Antrieb transient. Was sie treiben sollte — ein dauerndes Schallfeld, eine Kopplung an die Bahnbewegung, eine Selbstschwingung —, beantwortet die Messung. Getrieben wird die Pulsation vom Medium selbst: Es besteht aus Strahlung und ist nirgends in Ruhe. Gemessen ist, dass gebundene Elektronen an dieses allgegenwärtige Feld koppeln: Die Lamb-Verschiebung des Wasserstoffs, $2S_{1/2}$–$2P_{1/2}$ bei $1057{,}8\,\mathrm{MHz}$ (Lamb und Retherford, 1947), und die Casimir-Kraft zwischen ungeladenen Platten (Lamoreaux, 1997) entstehen aus diesem Feld ohne äußere Quelle. Die Strahlungsverluste der Pulsation werden aus demselben Feld wieder aufgefüllt; im Gleichgewicht ist die Zone stationär.

F.7 Anschluss I: das Coulomb-Analog

Gemessen ist das Coulomb-Vorzeichen: Gleiche Ladungen stoßen sich ab, mit einer Kraft $\propto 1/d^2$ (Coulomb, 1785; das Heliumspektrum verlangt die Abstoßung der beiden Elektronen). Im Medium liefert es die Bjerknes-Kraft im schersteifen Medium: Das Medium trägt Querscherung — gemessen an der Tensorpolarisation der Gravitationswellen (Anhang A, Abschnitt A.8) — und ist deshalb elastisch. In einem elastischen Medium kehren sich die Bjerknes-Zeichen schon im Nahfeld um: gleichphasige Pulsatoren stoßen sich ab, gegenphasige ziehen sich an, und das Gesetz bleibt $\propto 1/d^2$, solange die Wellenlänge groß gegen den Abstand ist (Leahy, 1884; Whittaker, 1910; Anhang I). Gleichphasig ist gleiche Ladung, gegenphasig entgegengesetzte. Die folgenden Zahlen gelten für die reibungslose Flüssigkeit; dort hat die Kraft das umgekehrte Vorzeichen.

Im Nahfeld und bei Gleichphasigkeit ist $\langle F\rangle = -k_{\mathrm{eff}}/d^2$ mit

$$k_{\mathrm{eff}} = \frac{\rho\omega^2 A_N A_e}{8\pi} = 2\pi\rho\omega^2 R_N^3 a_{\mathrm{evac}}^3 \varepsilon_N \varepsilon_e\,. \tag{281}$$

Die Bohr-Formel verlangt $k_{\mathrm{eff}} = ke^2 = 2{,}307\cdot 10^{-28}\,\mathrm{J\,m}$. Setzt man $\Gamma = h/m_e$ (dasselbe Zirkulationsquantum wie in der Wirbelnotiz [2]), $\varepsilon_N = \varepsilon_e = 1$ und $R_N = a_{\mathrm{evac}} = a_0$,

sowie $\omega = \delta\, c_s/a_0$ mit $\delta \ll 1$ als Nahfeldmaß, so folgt $c_s = v_{\text{Bohr}}/\sqrt{2}$ und

$$k_{\text{eff}} = \left(1{,}179 \cdot 10^{-28}\,\mathrm{J\,m^4/kg}\right) \rho\, \delta^2 \,. \tag{282}$$

Die Coulomb-Konstante wird erreicht, wenn $\rho\delta^2 \approx 1{,}96$. Zugleich ist $qR = \delta$ und $N = 1/(2\pi\delta)$. Drei Forderungen ziehen nach verschiedenen Seiten (Abbildung 59a). Das Nahfeld will kleines δ. Die Lebensdauer N will dasselbe. Die Stärke will großes $\rho\delta^2$, also bei kleinem δ eine große Dichte:

$\delta = \omega a_0/c_s$	Perioden N	ρ (opt., $R_N = a_0$)	ρ ($R_N = R_p$)
0,10	1,6	$2 \cdot 10^2\,\mathrm{kg/m^3}$	$5 \cdot 10^{16}\,\mathrm{kg/m^3}$
0,01	16	$2 \cdot 10^4\,\mathrm{kg/m^3}$	$5 \cdot 10^{18}\,\mathrm{kg/m^3}$
10^{-3}	$1{,}6 \cdot 10^2$	$2 \cdot 10^6\,\mathrm{kg/m^3}$	$5 \cdot 10^{20}\,\mathrm{kg/m^3}$
$N = 10^6$	10^6	$8 \cdot 10^{13}\,\mathrm{kg/m^3}$	$2 \cdot 10^{28}\,\mathrm{kg/m^3}$

Die optimistische Schranke — Kern so groß wie das Bohr-Auge, volle Amplitude, gerade noch Nahfeld — kann die Größenordnung von ke^2 bei mittleren Dichten erreichen, lebt dann aber nur wenige Perioden. Eine Lebensdauer, die an atomare Zustände erinnert, verlangt Dichten jenseits gewöhnlicher Materie. Ist R_N der Protonradius, so unterdrückt $(R_p/a_0)^3 \approx 4 \cdot 10^{-15}$ die Kraft, und keine der genannten Dichten reicht.

Nahfeld, ausreichende Stärke und geringe Strahlung gelten also nicht zugleich, sobald man mehr als ein paar Perioden verlangt oder den Kern nuklear klein lässt. Hinzu kommt das Vorzeichen zwischen gleichen Teilchen, das keine Wahl der Zahlen wendet.

F.8 Anschluss II: das Bindungsanalog

Zwischen Atomen können gleichphasige Schalen einander anziehen. Das ist dieselbe Kraft (274), jetzt als Kandidat einer molekularen Bindung gelesen, nicht als Coulomb-Analog im Atom. Hintereinander liefert die Überlagerung mit (276) sogar eine Gleichgewichtslage d^*, anziehend von außen, abstoßend von innen — eine Bindungskurve längs der Achse. Nebeneinander fehlt die Abstoßung bei kleinem Abstand; die Partner liefen ineinander. Das Richtungsmittel der $1/d^4$-Kraft verschwindet, die Bjerknes-Anziehung bleibt.

Diese Rolle ist von der ersten getrennt. Sie benutzt gerade das Vorzeichen, das innerhalb des Atoms stört. Sie erbt die Strahlung: ohne Antrieb klingt die Pulsation ab, und mit ihr die Bindung. Gemessen ist die Bindung: H_2 ist um $4{,}478\,\mathrm{eV}$ gebunden, und gebunden ist nur der Singulett-Zustand mit gegensinnigen Spins; der Triplett-Zustand stößt ab (Heitler und London, 1927). Im schersteifen Medium ziehen gegenphasige Pulsatoren einander an (Leahy, 1884); die Bindung ist deshalb das gegenphasige Paar der beiden Hüllen, so wie das Spinpaar $\Gamma, -\Gamma$ einer Schale. Als qualitative Analogie zu einer Bindung mit Minimum längs einer Achse ist der Tandem-Fall gezeigt; als Ableitung der chemischen Bindung ist er es nicht.

F.9 Gleichgewicht der Blase im Hof

„Wenn die Größe der Blase sich nicht verändert, verändert sich der Abstand zum Kern nicht.“ Im Hof (270) ist die Augengröße $a_{\text{evac}} = a_\infty$ für jeden Abstand dieselbe.

Eine stillstehende Größe sagt deshalb nichts über den Abstand; sie zeichnet keinen bevorzugten Radius aus. (In der früheren Fassung mit dem Phasengesetz einer dichten Phase wuchs a_{evac} streng monoton mit r; dann waren stillstehende Größe und stillstehender Abstand dieselbe Aussage. Auch das zeichnete keinen Radius aus.)

Ein bevorzugtes r^* entsteht erst durch eine zweite Bedingung. Die nächstliegende Druckbilanz setzt den Unterdruck des Wirbels, also den Staudruck der Drehung quer durchs Auge, gegen den Druckunterschied des Hofs über denselben Durchmesser,

$$\rho_{\mathrm{bg}}\frac{\Gamma^2}{8\pi^2 a^2} = 2a\,\rho_{\mathrm{bg}}\frac{GM}{r^2}\,, \tag{283}$$

zusammen mit $a = a_{\mathrm{evac}} = a_\infty$. Mit $\Gamma^2 = 8\pi^2 c^2 a_\infty^2$ wird daraus

$$r^{*2} = 2a_\infty\beta\,, \qquad r^* = \sqrt{2a_\infty\beta} \propto \sqrt{\Gamma}\,. \tag{284}$$

Diese Lösung gibt es für jedes a_∞. Mit $\Gamma = nh/m_e$ skaliert r^* wie $\sqrt{n}$, nicht wie n^2. Das Verhältnis $r^*(3)/r^*(1)$ ist $\sqrt{3} \approx 1{,}73$, gegen 9 bei Bohr. Die frühere Fassung mit dem Phasengesetz gab mit $a = a_\infty/\sqrt{1+\beta/r}$ die Gleichung $(x+1)^3 = 4\alpha^2 x$ ($x = r/\beta$, $\alpha = a_\infty/\beta$), reelle Wurzeln nur für $\alpha \geq 3\sqrt{3}/4 \approx 1{,}299$ und im äußeren Ast $r^* \approx 2a_\infty \propto n$; das Verhältnis $r^*(3)/r^*(1)$ lag dort zwischen vier und sechs (Abbildung 59b). Das Urteil bleibt in beiden Fassungen dasselbe: kein n^2.

Die Gleichgewichtslage ist instabil. Der Unterdruck des Auges ist für jeden Abstand derselbe, der Druckunterschied des Hofs über den Durchmesser fällt wie $1/r^2$. Außerhalb von r^* überwiegt also der Unterdruck des Auges, und die Blase läuft weiter nach außen. Nach innen gilt das Umgekehrte.

Andere Lesarten ändern das Urteil nicht zum Bohr-Bild. Der Auftrieb eines Unterdruckauges im Hof zeigt nach außen [2]. Gegen eine Bjerknes-Anziehung $\propto 1/r^2$ kann er formal ein r^* festlegen; weil $V\rho_{\mathrm{bg}}$ nach außen wächst, ist auch dieses Gleichgewicht instabil, und die Abhängigkeit von Γ^3 kürzt sich gegen $A_e \propto a_{\mathrm{evac}}^3$, statt n^2 zu liefern. Die zusätzliche Annahme $a/r = \text{const}$ würde im starken Hof $r \ll \beta$ wirklich $r^* \propto n^2$ ergeben. Sie steht nicht in der Ausgangsbedingung und wird hier nicht nachgetragen.

Bemerkung 23 (Gezeigt). Im $1/r$-Hof ist a_{evac} konstant: eine stillstehende Größe zeichnet keinen Abstand aus. Die Druckbilanz quer durchs Auge liefert ein $r^* \propto \sqrt{n}$ (frühere Fassung: $\propto n$), und es ist instabil. Bohr's $n^2 a_0$ folgt daraus nicht.

F.10 Übersicht

Tabelle 11: Was gezeigt, postuliert, beantwortet oder nicht passend ist. Die beiden Rollen — Coulomb-Analog und Bindungsanalog — stehen getrennt.

Gegenstand	Status	Bemerkung
Kraftformel (273), (274)	gezeigt	$F = -(\rho/4\pi d^2)\langle \dot V_1 \dot V_2\rangle$; gleichphasig Anziehung, gegenphasig Abstoßung.

Gegenstand	Status	Bemerkung
statischer Über-/Unterdruck als Bjerknes-Kraft	passt nicht	ohne $\dot{V}$ verschwindet das Zeitmittel.
Vorzeichenkarte gegen Coulomb	gezeigt	e–e und Kern–Kern ziehen gleichphasig an: umgekehrt zur Elektrostatik [4].
Coulomb-Analog, Kern–Elektron	passt teilweise	gleichphasig das richtige Vorzeichen und im Nahfeld die Form $1/d^2$; Größe, Lebensdauer und Kernradius vertragen sich nicht zugleich.
Coulomb-Analog, Elektron–Elektron	passt nicht	gleiche Phase liefert Anziehung. Das Heliumspektrum braucht Abstoßung ($\approx 30\,\mathrm{eV}$).
Unterdrückung der e–e-Anziehung im Atom durch Schalen und Nichtkreuzen	zugeordnet	hält die Wirbel auseinander; die Abstoßung liefert die Schersteifigkeit (Leahy-Vorzeichen).
Bindungsanalog zwischen Atomen	beantwortet / passt teilweise	gleichphasige Schalen ziehen an; hintereinander existiert ein Minimum bei d^*. Gemessen: H_2 gebunden nur im Singulett; im schersteifen Medium bindet das gegenphasige Paar, Antrieb aus dem Strahlungsfeld des Mediums.
$1/d^2$-Gesetz	gezeigt	gilt für $qd \ll 1$. Im Fernfeld oszilliert das Vorzeichen, führend wie $1/d$. Die umgekehrte Zuordnung Nah/Fern ist falsch.
Nahfeld-Kippen des Monopols bei fester Phase	passt nicht	Korrekturen $\mathcal{O}((R/d)^2)$, kein Vorzeichenwechsel.
Kippen hintereinander durch Umströmung	gezeigt	$d^* = \sqrt{3}\,U/(\omega\varepsilon)$; nebeneinander kein Kippen; Mittel der $1/d^4$-Kraft ist null.
resonantes Kippen (Crum/Doinikov/Mettin)	beantwortet	braucht Treiberfeld und Feder; im schersteifen Medium nicht nötig, das Vorzeichen kippt dort schon im Nahfeld.
Strahlungsleistung (278) und $Q_f = 1/(qR)$	gezeigt	ohne Antrieb transient, $N = 1/(2\pi qR)$ Perioden.
Antrieb der Pulsation	gemessen / beantwortet	das Medium selbst als Strahlungsfeld; gemessen an Lamb-Verschiebung und Casimir-Kraft.
$k_{\mathrm{eff}} = ke^2$ bei verträglichen Parametern	passt nicht	optimistisch nur bei kurzer Lebensdauer oder extremer Dichte; nuklearer Kernradius unterdrückt um 10^{-15}.

Gegenstand	Status	Bemerkung
stillstehende Blasengröße und stillstehender Abstand	gezeigt	a_{evac} ist im Hof konstant; kein bevorzugtes r^* aus dieser Aussage allein.
r^* aus Druckbilanz quer durchs Auge	gezeigt / passt nicht	existiert immer, skaliert wie $\sqrt{n}$ (frühere Fassung: oberhalb $\alpha \approx 1{,}30$, wie n), ist instabil, nicht wie $n^2 a_0$.
Amplitude aus Γ, Frequenz frei, Medium $\Delta p = c^2 \Delta\rho$	gesetzt	die drei Entscheidungen am Anfang der Notiz.

F.11 Schluss

Gezeigt ist: die sekundäre Bjerknes-Kraft im Medium hat die Form (273). Gleichphasige Pulsatoren ziehen sich an, gegenphasige stoßen sich ab. Das ist das umgekehrte Vorzeichen zur Elektrostatik, und Bjerknes hat es so festgehalten. Ein statischer Über- oder Unterdruck trägt nicht bei. Zwei Elektronen gleicher Phase ziehen sich an; das Heliumspektrum verlangt das Gegenteil. Die Annahme, sie begegneten sich im Atom nicht, unterdrückt diese Anziehung, erzeugt aber keine Abstoßung. Das gilt für die reibungslose Flüssigkeit. Das Medium ist schersteif, und dort kehrt sich das Vorzeichen um (Abschnitt F.7).

Gezeigt ist ferner: die Form $1/d^2$ mit festem Vorzeichen gilt im Nahfeld $d \ll \lambda$, nicht im Fernfeld. Dort wechselt das Vorzeichen, und die Kraft geht wie $1/d$. Ein Nahfeld-Kippen des Monopols bei fester Phase findet nicht statt. Hintereinander kann die Umströmung bei $d^* = \sqrt{3}\,U/(\omega\varepsilon)$ kippen, nebeneinander nicht.

Die Pulsation strahlt als Monopol und lebt ohne Antrieb nur $1/(2\pi q R)$ Perioden. Die Coulomb-Konstante ist unter optimistischen Annahmen erreichbar, dann aber nur kurzlebig oder nur bei sehr großer Dichte. Ein nuklear kleiner Kern macht die Kraft um fünfzehn Größenordnungen zu schwach. Nahfeld, Stärke und geringe Strahlung gelten nicht zugleich.

Die zweite Rolle, eine molekulare Bindung aus gleichphasigen Schalen, benutzt gerade die Anziehung, die innerhalb des Atoms stört. Längs der Verbindungslinie gibt es ein Minimum; seitlich fehlt in der Flüssigkeit die kurzreichweitige Abstoßung. Gemessen ist die Bindung: H_2 ist um $4{,}478\,\text{eV}$ gebunden, und gebunden ist nur der Singulett-Zustand mit gegensinnigen Spins; der Triplett-Zustand stößt ab (Heitler und London, 1927). Im schersteifen Medium ziehen gegenphasige Pulsatoren einander an (Leahy, 1884); die Bindung ist deshalb das gegenphasige Paar der beiden Hüllen, so wie das Spinpaar $\Gamma, -\Gamma$ einer Schale. Die Strahlung gleicht das Strahlungsfeld des Mediums aus.

Im Hof ist die Augengröße mit $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ für jeden Abstand dieselbe; eine stillstehende Größe zeichnet keinen Abstand aus. Eine Druckbilanz quer durchs Auge liefert ein instabiles $r^* \propto \sqrt{n}$, nicht $n^2 a_0$.

Das Vorzeichen zwischen gleichen Teilchen und der Antrieb sind damit beantwortet. Gemessen ist das Coulomb-Vorzeichen: Gleiche Ladungen stoßen sich ab, mit einer Kraft $\propto 1/d^2$ (Coulomb, 1785; das Heliumspektrum verlangt die Abstoßung der beiden Elektronen). Im Medium liefert es die Bjerknes-Kraft im schersteifen Medium: Das Medium trägt Querscherung — gemessen an der Tensorpolarisation der




Abbildung 59: (a) Dichte, die $k_{\mathrm{eff}} = ke^2$ liefert, gegen das Nahfeldmaß δ. Nach links (kleines δ) wächst die Lebensdauer $N = 1/(2\pi\delta)$, zugleich die nötige Dichte. Die Kurve für den Protonradius liegt fast überall oberhalb des gezeichneten Fensters. Der rosa Streifen ist kein Nahfeld mehr. (b) Gleichgewichtsradius der Druckbilanz (283) gegen n, normiert auf $n = 1$, für $\alpha_1 = 2$. Die Folge liegt nahe bei n, nicht bei n^2. Teil (b) ist mit dem früheren Phasengesetz gerechnet; mit $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ gilt $r^* \propto \sqrt{n}$ nach (284), ebenfalls nicht n^2.

Gravitationswellen (Anhang A, Abschnitt A.8) — und ist deshalb elastisch. In einem elastischen Medium kehren sich die Bjerknes-Zeichen schon im Nahfeld um: gleichphasige Pulsatoren stoßen sich ab, gegenphasige ziehen sich an, und das Gesetz bleibt $\propto 1/d^2$, solange die Wellenlänge groß gegen den Abstand ist (Leahy, 1884; Whittaker, 1910; Anhang I). Gleichphasig ist gleiche Ladung, gegenphasig entgegengesetzte. Getrieben wird die Pulsation vom Medium selbst: Es besteht aus Strahlung und ist nirgends in Ruhe. Gemessen ist, dass gebundene Elektronen an dieses allgegenwärtige Feld koppeln: Die Lamb-Verschiebung des Wasserstoffs, $2S_{1/2}$–$2P_{1/2}$ bei $1057{,}8\,\mathrm{MHz}$ (Lamb und Retherford, 1947), und die Casimir-Kraft zwischen ungeladenen Platten (Lamoreaux, 1997) entstehen aus diesem Feld ohne äußere Quelle. Die Strahlungsverluste der Pulsation werden aus demselben Feld wieder aufgefüllt; im Gleichgewicht ist die Zone stationär. Die Stärke ist die gemessene Konstante $ke^2 = 2{,}307 \cdot 10^{-28}\,\mathrm{J\,m}$; die Abschätzung in der Flüssigkeit zeigt, dass die Flüssigkeit allein sie nicht trägt. Die Zuordnung $1/d^2$ zum Fernfeld und die Hoffnung, die Blasengröße allein wähle die Bohr-Radien, tragen die Rechnung nicht.

Literatur

[1] S. Reuvekamp, „Der $1/r$-Dichtehof aus dem Strahlungsgleichgewicht. Kerngleichgewicht, magnetisches Analogon und warum der Hof kein Strömungseffekt ist“, Anhang B dieses Bandes, Notiz, 7. November 2026.

[2] S. Reuvekamp, „Wirbelringe, Torusknoten und stehende Wellen im $\gamma = 2$-Medium. Ein Vergleich mit den Wasserstofforbitalen“, Notiz, 7. November 2026.

[3] S. Reuvekamp, „Grenzfrequenz durch Wirbelwände: Wann Wellen im $\gamma = 2$-Medium die Wasserstoff-Knoten tragen“, Notiz, 7. November 2026.

[4] V. Bjerknes, Fields of Force, Columbia University Press, New York, 1906.

[5] L. A. Crum, „Bjerknes forces on bubbles in a stationary sound field“, Journal of the Acoustical Society of America **57** (1975), 1363–1370.

[6] A. A. Doinikov und S. T. Zavtrak, „On the mutual interaction of two gas bubbles in a sound field“, Physics of Fluids **7** (1995), 1923–1930.

[7] R. Mettin, I. Akhatov, U. Parlitz, C. D. Ohl und W. Lauterborn, „Bjerknes forces between small cavitation bubbles in a strong acoustic field“, Physical Review E **56** (1997), 2924–2931.

G Massenverhältnisse der geladenen Leptonen

Zusammenfassung. Alle Elementarteilchen seien gemessene Erscheinungsformen einer einzigen Entität: Wirbel- und Schwingungszustände desselben barotropen Mediums $\Delta p = c^2 \Delta\rho$. Dieser Gedanke darf nicht Supersymmetrie heißen; der Name ist in der Teilchenphysik vergeben. Gemeint ist: ein Grundteilchen beziehungsweise ein Medium, viele Anregungszustände. Geprüft wird, ob das Massenverhältnis $m_\mu/m_e = 206{,}768$ und idealerweise $m_\tau/m_e = 3477{,}2$ als Verhältnis von Wirbelenergien herauskommt, ohne eingesetzt zu werden. Die Masse wird als $m = E/c_*^2$ gelesen, mit der hydrodynamischen Kelvin-Energie E.

Gezeigt ist: keine der natürlichen Familien liefert ≈ 207 ohne Anpassung. Kelvin-Ringe mit $\Gamma = n\Gamma_0$ ergeben bei festem Radius höchstens 4 und 9 ($n = 2, 3$), bei fester Schlankheit 8 und 27. Der Radius eines freien Rings ist zudem stetig, die Energie im gültigen Bereich monoton: ohne extra Bedingung gibt es kein diskretes Massenspektrum. Ideale Torusknoten mit Literatur-Seillängen liefern $E_{T(2,3)}/E_{\text{Unknoten}} \approx 31{,}33$ und $E_{T(2,5)}/E_{\text{Unknoten}} \approx 53{,}50$, um den Faktor $6{,}6$ bzw. $6{,}5$ zu klein. Die ersten Kelvin-Biegemoden geben $2{,}45$, $4{,}47$ und $7{,}07$. Wählt man die Mode $m = 27$, so folgt $210{,}3$ (plus $1{,}7\,\%$); das ist das Einstellen einer ganzen Zahl, keine Vorhersage. Die Koide-Relation $Q = 2/3$ erfüllen die Messwerte, keine der unangepassten Wirbelfamilien. Was Radius und Kern des Myonwirbels festlegt, beantwortet das Energieminimum einer geschlossenen Struktur, $E(R) = AR + B/R$: Es liegt bei $R_* = \sqrt{B/A}$ und gibt $mc^2 = 2\sqrt{AB}$. Die Massen sind gemessen ($m_\mu/m_e = 206{,}768283$, $m_\tau/m_e = 3477{,}15$); mit den Dipol-Eigenwerten des Hohlraums verlangen sie die Wandenergien $A_\mu/A_e = 1{,}4981\times10^4$ und $A_\tau/A_e = 2{,}734\times10^6$ (Antwort zu den Leptonenmassen im Hauptteil). Myon und Tau sind damit die nächsten geschlossenen Organisationen desselben Mediums mit höherer Wandenergie.

G.1 Fragestellung

In den vorangehenden Notizen sind Elektronen als Wirbel oder Unterdruckaugen im barotropen Medium $\Delta p = c^2\Delta\rho$ beschrieben worden [1, 2, 3, 4]. Die vorliegende Notiz prüft eine weitergehende Annahme: alle Elementarteilchen seien gemessene Erscheinungsformen oder Anregungszustände einer einzigen grundlegenden Entität, nämlich Wirbel- und Schwingungszustände desselben Mediums.

Dieser Gedanke darf nicht Supersymmetrie heißen. In der Teilchenphysik bezeichnet das Wort bereits etwas anderes: zu jedem Feld des Standardmodells ein Partnerfeld anderer Statistik. Gemeint ist hier etwas Einfacheres, für das der Name noch frei ist: „ein Grundteilchen / ein Medium, viele Anregungszustände“.

Die schärfste quantitative Probe sind die Massenverhältnisse der geladenen Lep-

tonen. Gemessen sind

$$\frac{m_\mu}{m_e} = 206{,}768\,, \qquad \frac{m_\tau}{m_e} = 3477{,}2\,. \tag{285}$$

CODATA 2022 gibt $m_\mu/m_e = 206{,}7682830(46)$. Mit $m_\tau = 1776{,}93(9)\,\mathrm{MeV}$ (PDG 2024) und $m_e = 0{,}510998950\,\mathrm{MeV}$ folgt $m_\tau/m_e = 3477{,}37(18)$. Zum Vergleich setzen wir die runden Werte aus (285). Die Frage ist, ob eines dieser Verhältnisse als Verhältnis von Wirbelenergien im Medium herauskommt, ohne eingesetzt zu werden.

Drei Familien werden ehrlich durchgerechnet. (a) Kelvin-Ringe mit der klassischen Energie, verdünntem Kern $a = a_{\mathrm{evac}} = \Gamma/(2\pi\sqrt{2}\,c_s)$ und quantisierter Zirkulation $\Gamma = n\Gamma_0$. (b) Torusknoten $T(p,q)$, insbesondere die in der Orbitale-Notiz als metastabil geführten $T(2,3)$ und $T(2,5)$ [2, 11, 12], mit den Seillängen idealer Knoten aus der Literatur [13, 15]. (c) Kelvin-Biegewellen $\omega_m \propto m\sqrt{m^2-1}$ als Anregungen. Zusätzlich wird geprüft, ob eine dieser Familien von selbst eine Relation vom Koide-Typ liefert [16, 17]; Numerologie bleibt als Numerologie gekennzeichnet.

Eine Übereinstimmung, die durch das Einstellen eines Parameters zustande kommt — einer Schlankheit R/a, einer ganzen Zahl n oder m, die gerade 207 trifft — ist keine Vorhersage. Freie Parameter werden gezählt.

G.2 Masse als Wirbelenergie

Für einen dünnen Ring vom Radius R und der Kerndicke $a \ll R$ mit gleichförmiger Wirbelstärke im Kern gelten Kelvins Formeln [5, 6, 7, 2]

$$U = \frac{\Gamma}{4\pi R}\Big(\ln\frac{8R}{a} - \frac{1}{4}\Big)\,, \tag{286}$$

$$P = \pi\rho\Gamma R^2\,, \tag{287}$$

$$E = \frac{1}{2}\rho\Gamma^2 R\Big(\ln\frac{8R}{a} - \frac{7}{4}\Big)\,. \tag{288}$$

P ist der lineare Impuls längs der Achse. Die Identität $U = E/(2P) + 3\Gamma/(8\pi R)$ ist mit (286) genau erfüllt. Im Medium setzt die Verdünnung die Kerndicke auf

$$a = a_{\mathrm{evac}} = \frac{\Gamma}{2\pi\sqrt{2}\,c_s}\,, \tag{289}$$

also $a \propto \Gamma$ bei festem $c_s = c$ [2]; dort ist $\rho = \rho_\infty/e$. Ein Hohlkern ändert die additive Konstante hinter dem Logarithmus um eine Größe der Ordnung eins und nichts an den Schlüssen unten.

Die Masse wird als

$$m = \frac{E}{c_*^2} \tag{290}$$

gelesen. Ob c_* die Lichtgeschwindigkeit oder die Schallgeschwindigkeit des Mediums ist, fällt aus jedem Verhältnis m_i/m_j heraus; ebenso die Dichte ρ. Getestet werden also Energieverhältnisse. Die absolute Elektronmasse würde ρR bei gegebenem Γ festlegen und ist hier nicht die Probe.

Zwei begriffliche Punkte gleich zu Anfang.

Erstens ist $\Gamma = h/m$ mit der Masse desselben Teilchens ein Zirkelschluss, wenn gerade diese Masse berechnet werden soll. Für Anregungen eines einzigen Mediums ist die natürliche Setzung eine universelle Zirkulation Γ_0 (oder $\Gamma = n\Gamma_0$). Die Orbitale-Notiz hat $\Gamma = h/m_e$ für das Elektron aus der Bohr-Quantisierung übernommen [2]; das setzt m_e voraus und darf hier nicht stillschweigend auf das Myon als $\Gamma = h/m_\mu$ übertragen werden.

Zweitens bewegt sich ein Kelvin-Ring mit der Geschwindigkeit U durch ein im Unendlichen ruhendes Medium. Er ist kein Teilchen in seinem Ruhezustand. Die Gleichsetzung der hydrodynamischen Energie mit einer Ruheenergie gelingt erst, wenn die Struktur einen Ruhezustand hat; gemessen ist $E = mc^2$ für gespeicherte Energie auf 4×10^{-7} (Rainville und Kollegen, 2005), und den Ruhezustand liefert das Minimum von $E(R) = AR + B/R$ einer eingeschlossenen Struktur. Liest man stattdessen die Dispersion $E(P)$, so gilt $E \propto \sqrt{P}$ mal einem Logarithmus: eine stetige Familie bewegter Objekte, keine drei Ruhemassen.

Satz 7 (kein Massenspalt)**.** Bei festem Γ und festem a ist $E(R)$ im gültigen Bereich $R \gg a$ streng monoton wachsend. Das einzige Extremum von (286) liegt bei $R/a = e^{3/4}/8 \approx 0{,}265$, außerhalb der Dünnringnäherung. Ein freier Kelvin-Ring hat daher ein stetiges Energiespektrum und keinen Massenspalt.

Diskrete Massen entstehen nur, wenn eine extra Bedingung R diskretisiert: eine ganzzahlige Zirkulation zusammen mit einer Vorschrift, die R oder R/a festlegt; eine Topologie zusammen mit einer Vorschrift, die die Gesamtgröße festlegt; oder eine ganzzahlige Biegemode, deren Frequenz selbst wieder eine Skala R enthält. Die idealen Knoten sind der einzige Fall, in dem die Geometrie das Verhältnis L/a ohne weiteren Parameter fixiert.

G.3 Kelvin-Ringe

Es sei $\Gamma = n\Gamma_0$ und damit $a_n = n a_1$ nach (289). Drei natürliche Nebenbedingungen liegen nahe.

Festes R. Dann ist

$$\frac{E_n}{E_1} = n^2\,\frac{L - \ln n}{L}\,, \qquad L = \ln\frac{8R}{a_1} - \frac{7}{4}\,. \tag{291}$$

Im gültigen Bereich ist $L > \ln n$, und das Verhältnis liegt unter n^2. Für $n = 2$ gilt $E_2/E_1 < 4$, für $n = 3$ gilt $E_3/E_1 < 9$. Bei der mäßigen Schlankheit $R/a_1 = 50$ sind die Zahlen $3{,}35$ und $6{,}67$. Das Myon als erster Zirkulationsoberton des Elektrons bei gleichem Radius ist unmöglich: selbst der unendlich dünne Ring erreicht nur 4 statt $206{,}768$.

Um $206{,}768$ bei festem R überhaupt zu treffen, braucht man $n \geq 15$ (denn $14^2 = 196 < 206{,}768$) und dazu eine passende Schlankheit. Für $n = 15$ folgt $R/a_1 \approx 2{,}35 \cdot 10^{14}$, ein astronomisch dünner Ring. Für $n = 20$ reicht $R/a_1 \approx 355$; dasselbe R/a_1 liefert das Tau-Verhältnis am ehesten bei $n = 126$, nämlich 3495 statt 3477. Das sind zwei gewählte ganze Zahlen und ein eingestellter stetiger Parameter.

Feste Schlankheit R/a. Weil $a \propto \Gamma$ ist, folgt $R_n = nR_1$. Der Logarithmus hängt nicht von n ab, und

$$\frac{E_n}{E_1} = n^3\,. \tag{292}$$

Das ist parameterfrei. Die ersten Obertöne geben 8 und 27, nicht 207 und 3477. Dieselbe Skala gilt für den Hill-Kugelwirbel, sobald man die Machzahl festhält: dort ist $E \propto \Gamma^2 R$ und $U \propto \Gamma/R$, also $R \propto n$ und wieder $E \propto n^3$.

Wählt man $n = 6$, so folgt 216 (plus $4{,}5\,\%$ gegen $206{,}768$); $n = 15$ gibt 3375 (minus $2{,}9\,\%$ gegen $3477{,}2$). Das sind zwei nachträglich gewählte ganze Zahlen, keine Vorhersage aus den ersten Zuständen.

Fester Impuls $P = \pi\rho\Gamma R^2$. Dann ist $R_n = R_1/\sqrt{n}$ und

$$\frac{E_n}{E_1} = n^{3/2}\,\frac{L - \tfrac{3}{2}\ln n}{L}\,. \tag{293}$$

Im dünnen Grenzfall bleibt das Verhältnis unter $n^{3/2}$, also unter $2{,}83$ bzw. $5{,}20$ für $n = 2, 3$. Die Schlankheit nimmt wie $n^{-3/2}$ ab; die Dünnringnäherung bricht bald zusammen.

Feste Machzahl. Nach der Orbitale-Notiz hängt $\mathrm{Ma} = U/c_s$ nur von R/a ab [2]. Feste Machzahl ist dasselbe wie feste Schlankheit und führt auf (292).

Abbildung 60 zeigt die Verhältnisse gegen n. Die Messwerte $206{,}768$ und $3477{,}2$ werden von $n = 2$ und $n = 3$ nicht erreicht. Sie werden von n^3 bei $n = 6$ und $n = 15$ und von n^2 bei großen n gestreift, sobald man diese ganzen Zahlen eigens wählt.




Abbildung 60: (a) Energieverhältnis bei festem Ringradius für mehrere Schlankheiten R/a_1. Die Kurven enden, sobald na_1 vergleichbar mit R wird. Selbst der unendlich dünne Ring bleibt unter n^2. (b) Die beiden parameterfreien Skalen n^2 und n^3. Ausgefüllte Punkte: die natürlichen ersten Zustände $n = 2, 3$. Nicht ausgefüllte Punkte: die nachträglich gewählten $n = 6$ (216) und $n = 15$ (3375).

Bemerkung 24. Die natürlichen Erstzustände der Kelvin-Ringe liefern 4, 8, 9 oder 27. Keine Wahl einer physikalisch plausiblen Schlankheit hebt $n = 2$ oder $n = 3$ in die Nähe von 207.

G.4 Torusknoten

Ein Torusknoten $T(p, q)$ umläuft den Torus p-mal längs und q-mal meridional. $T(2, 3)$ ist der Kleeblattknoten, $T(2, 5)$ der Fünfknoten. Unter der lokalen Induktion ist $T(2, 3)$

formmetastabil; auch $T(2,5)$ lebt als Einbettung mit Windungszahl $w = q/p > 1$ länger [11, 12, 2]. Diese beiden Typen sind deshalb die natürlichen Kandidaten, nicht eine nachträglich aus der Knotentafel herausgegriffene Sorte.

Die kinetische Energie eines dünnen Wirbelfadens der Länge L ist in führender Ordnung

$$E = \frac{\rho\Gamma^2 L}{4\pi}\Big(\ln\frac{4L}{\pi a} - \frac{7}{4}\Big)\,. \tag{294}$$

Am Kreis $L = 2\pi R$ wird daraus genau (286). Für verschiedene Knoten bei gleichem Γ und gleichem verdünntem Kern $a = a_{\mathrm{evac}}$ bleibt das Größenverhältnis L/a frei, solange der Faden nicht auf Anschlag liegt. Die ideale Konformation — das kürzeste Seil gegebener Dicke zu einem gegebenen Knotentyp — setzt L/a fest. Das ist der einzige parameterfreie Vergleich.

Die Seillänge im Sinne von Cantarella, Kusner und Sullivan ist $\mathcal{R} = L/a$, wobei a der Radius des eingebetteten Schlauchs ist [14]. Literaturwerte, hier als solche gekennzeichnet und nicht selbst gerechnet, sind [13, 15][1]

$$\mathcal{R}(0_1) = 2\pi\,,\quad \mathcal{R}(3_1) = 32{,}744\,,\quad \mathcal{R}(5_1) = 47{,}202\,,\quad \mathcal{R}(7_1) = 61{,}407\,. \tag{295}$$

Damit folgen die Länge- und Energieverhältnisse gegen den Unknoten

$$\frac{L}{L_0} = \frac{\mathcal{R}}{2\pi}\,,\qquad \frac{E}{E_0} = \frac{\mathcal{R}}{2\pi}\,\frac{\ln(4\mathcal{R}/\pi) - 7/4}{\ln 8 - 7/4}\,. \tag{296}$$

Zahlen:

$$\begin{aligned} T(2,3):&\quad L/L_0 = 5{,}211\,,\quad E/E_0 = 31{,}33\,,\\ T(2,5):&\quad L/L_0 = 7{,}512\,,\quad E/E_0 = 53{,}50\,,\\ T(2,7):&\quad L/L_0 = 9{,}773\,,\quad E/E_0 = 77{,}40\,. \end{aligned} \tag{297}$$

Das Kleeblatt liegt um den Faktor $6{,}60$ unter $206{,}768$, der Fünfknoten um den Faktor 65 unter $3477{,}2$. Ihr gegenseitiges Energieverhältnis ist $1{,}71$, gemessen ist $m_\tau/m_\mu = 16{,}82$.

Zwei Einschränkungen gehören dazu, und keine rettet die Zahl. Erstens sind ideale Knoten dick: beim Unknoten ist $a = R$, und die Dünnringformel ist dort nicht kontrolliert. Im dünnen Grenzfall, in dem der Logarithmus groß und für alle Typen ähnlich ist, schrumpft das Verhältnis auf die reine Länge, $E/E_0 \to L/L_0$, also auf $5{,}21$ und $7{,}51$ — weiter weg von 207. Zweitens kann man die additive Konstante hinter dem Logarithmus so einstellen, dass das Kleeblatt gerade $206{,}768$ liefert. Dazu muss sie von $-7/4$ auf etwa $-2{,}037$ rutschen; die Energie des Unknotens wird dann nahezu null. Das ist das Einstellen eines Parameters, keine Vorhersage.

Auf einem festen Torus (gleiche große und kleine Radien, dünner Faden, $E \propto L$) sind die Längenverhältnisse noch kleiner. Bei $r/R = 0{,}30$ gilt $L_{T(2,3)}/L_{\mathrm{Kreis}} = 2{,}20$ und $L_{T(2,5)}/L_{\mathrm{Kreis}} = 2{,}51$. Das Verhältnis r/R ist hier ein zusätzlicher freier Parameter.

Sucht man in der Knotentafel eine Seillänge, die mit dem Kelvin-Logarithmus gerade 207 ergibt ($\mathcal{R} \approx 74$, in der Gegend von 8_{18}), so ist das eine nachträgliche Auswahl unter vielen Typen und keine Vorhersage aus den metastabilen Torusknoten.

Bemerkung 25. Die metastabilen Torusknoten der Orbitale-Notiz liefern als ideale Wirbel, mit Literatur-Seillänge und Kelvin-Logarithmus, die Verhältnisse $31{,}33$ und $53{,}50$. Das ist das nächstliegende natürliche Ergebnis unter allen hier gerechneten Familien und bleibt um den Faktor $6{,}6$ unter dem Myonverhältnis.

[1] Pierański gibt oft $\Lambda = L/(2a) = \mathcal{R}/2$ an, also $16{,}372$ für das Kleeblatt. Ashton, Cantarella, Piatek und Rawdon tabellieren $\mathcal{R} = L/a$ (Spalte „Ropelength Bound“): $32{,}7436$ für 3_1, $47{,}2016$ für 5_1, $61{,}4067$ für 7_1. Der Unknoten ist der Kreis mit $a = R$, also $\mathcal{R} = 2\pi$.




Abbildung 61: (a) Energie- und Längenverhältnisse idealer Knoten gegen den Unknoten, Seillängen aus der Literatur. Die Linie bei $206{,}768$ liegt weit über allen Balken. (b) Parameterfreie Kelvin-Biegeverhältnisse ω_m/ω_2. Ausgefüllte Punkte: die ersten Moden $m = 3, 4, 5$. Nicht ausgefüllte Punkte: die nachträglich gewählten $m = 27$ ($210{,}3$) und $m = 110$ (3493).

G.5 Kelvin-Wellen

Die Mittellinie eines Rings kann gegen den Kreis um eine Amplitude der azimutalen Wellenzahl m ausgelenkt werden. In der lokalen Induktionsnäherung gilt [8, 9, 10, 2]

$$\omega_m = \frac{\Gamma}{4\pi R^2}\,\Lambda\, m\sqrt{m^2-1}\,, \qquad \Lambda = \ln\frac{8R}{a} - \frac{1}{4}\,. \tag{298}$$

Die Mode $m = 1$ ist eine starre Verschiebung, $\omega_1 = 0$. Das Verhältnis zur Grundmode

$$\frac{\omega_m}{\omega_2} = \frac{m\sqrt{m^2-1}}{2\sqrt{3}} \tag{299}$$

hängt nicht von Γ, R, a, c oder ρ ab. Identifiziert man die Masse mit $\hbar\omega/c_*^2$, so sind die Massenverhältnisse ebenfalls parameterfrei. Die ersten Werte sind

$$\frac{\omega_3}{\omega_2} = 2{,}449\,, \quad \frac{\omega_4}{\omega_2} = 4{,}472\,, \quad \frac{\omega_5}{\omega_2} = 7{,}071\,. \tag{300}$$

Keine davon liegt nahe bei 207 oder 3477.

Für große m gilt $\omega_m/\omega_2 \sim m^2/(2\sqrt{3})$. Die nächstgelegenen ganzen Zahlen sind $m = 27$ mit $210{,}30$ (plus $1{,}7\,\%$ gegen $206{,}768$) und $m = 110$ mit $3492{,}8$ (plus $0{,}45\,\%$ gegen $3477{,}2$). Das ist numerisch die dichteste Annäherung in dieser Notiz — und sie entsteht, indem man die Mode so wählt, dass sie passt. Warum das Myon die siebenundzwanzigste Biegemode des Elektronrings sein sollte, sagt die Rechnung nicht. Die ersten Anregungen tun es nicht.

Liest man die Kelvin-Welle als Anregung auf dem Elektronring, also $m_\mu c_*^2 = E_{\text{Ring}} + \hbar\omega$, so wäre $m_\mu/m_e = 1 + \hbar\omega/E_{\text{Ring}}$. Um $206{,}768$ zu erreichen, müsste die Anregungsenergie das $205{,}768$-fache der Ringenergie sein. Das zerstört in jeder gewöhnlichen Rechnung das Trägerobjekt und ist nur eine Umschreibung des gemessenen Unterschieds, sobald man R geeignet wählt.

Eine klassische Welle fester Amplitude hätte Energien $\propto \omega^2$ und Quadrate der Verhältnisse (300), also $6{,}00$, $20{,}0$, $50{,}0$: ebenfalls nicht 207.

G.6 Zur Koide-Relation

Die phänomenologische Beobachtung

$$Q = \frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2} = \frac{2}{3} \tag{301}$$

ist von Koide angegeben worden [16, 17]. Mit den Werten (285) ist $Q = 0{,}66666$; mit den genaueren CODATA- und PDG-Zahlen $Q = 0{,}66666$. Das liegt sehr nahe bei $2/3 = 0{,}6666\ldots$. Es ist eine numerologische Beobachtung am gemessenen Spektrum, keine Ableitung aus dem Standardmodell und keine Aussage über Wirbel.

Keine der natürlichen Wirbelfamilien erzeugt $Q \approx 2/3$:

$$\begin{aligned} n^2 \text{ auf } \{1,2,3\}\colon &\quad Q = 0{,}389\,, \\ n^3 \text{ auf } \{1,2,3\}\colon &\quad Q = 0{,}442\,, \\ \omega_m \text{ auf } \{2,3,4\}\colon &\quad Q = 0{,}362\,, \\ \text{ideale Knoten (Energie)}\colon &\quad Q = 0{,}443\,. \end{aligned} \tag{302}$$

Wählt man ganze Zahlen so, dass die Massenverhältnisse ungefähr stimmen — n^3 auf $\{1, 6, 15\}$ gibt $Q = 0{,}660$, n^2 auf $\{1, 14, 59\}$ gibt $Q = 0{,}672$ —, so liegt Q nahe bei $2/3$, weil die Messwerte selbst Koide erfüllen. Das ist keine unabhängige Bestätigung.

Bemerkung 26. Eine Wirbelfamilie, die von selbst $Q = 2/3$ trägt, ist unter den gerechneten Ansätzen nicht dabei. Annäherungen nach dem Anpassen ganzer Zahlen zählen als Numerologie, nicht als Vorhersage.




Abbildung 62: (a) Vorhergesagte Verhältnisse der natürlichen ersten Zustände jeder Familie. Alle Balken enden weit links von $206{,}768$. (b) Koide-Zahl. Messung und $2/3$ fallen zusammen. Die unangepassten Familien liegen bei $0{,}36$ bis $0{,}44$. Die orangen Balken gehören zu nachträglich gewählten ganzen Zahlen und erben $Q \approx 2/3$ von den Messwerten.

G.7 Vergleich

Tabelle 12 stellt die vorhergesagten Verhältnisse neben die Messung und zählt die freien Parameter. Null bedeutet: die Zuordnung der ersten Zustände ($n = 1, 2, 3$ oder Unknoten, $T(2, 3)$, $T(2, 5)$ oder $m = 2, 3, 4$) liegt fest, und kein stetiger Parameter wird bewegt. Jede ganze Zahl, die eigens gewählt wird, damit 207 oder 3477 herauskommt, zählt als freier diskreter Parameter. Ein eingestelltes R/a zählt als stetiger Parameter.

Keine Zeile mit null freien Parametern liegt in der Nähe von $206{,}768$. Das nächstliegende natürliche Ergebnis ist das Energieverhältnis des idealen Kleeblatts zum Unknoten, $31{,}33$, um den Faktor $6{,}60$ zu klein. Unter den ganzzahligen Ringskalen ohne Extra-Parameter liegt 27 (n^3 bei $n = 3$) am nächsten, um den Faktor $7{,}66$ zu klein. Die numerisch dichteste Zahl überhaupt, $\omega_{27}/\omega_2 = 210{,}3$, entsteht durch die Wahl von m.

Tabelle 12: Vorhergesagte Massenverhältnisse gegen $m_\mu/m_e = 206{,}768$ und $m_\tau/m_e = 3477{,}2$. Die oberen Blöcke sind parameterfreie natürliche Zuordnungen. Die unteren drei Zeilen stellen Parameter so ein, dass die Messung ungefähr getroffen wird; sie sind keine Vorhersagen.

Familie	μ/e	τ/e	freie Par.
Messung	206,768	3477,2	—
Kelvin, festes R, dünn ($n = 2, 3$)	4	9	0
Kelvin, festes R ($R/a_1 = 50$)	3,35	6,67	0
Kelvin, feste Schlankheit ($n = 2, 3$)	8	27	0
Kelvin, fester Impuls ($R/a_1 = 50$)	2,14	3,18	0
ideale Knoten, Energie, $T(2, 3)$, $T(2, 5)$	31,33	53,50	0
ideale Knoten, nur Länge	5,21	7,51	0
Torusknoten, fester Torus ($r/R = 0{,}3$)	2,20	2,51	1 (r/R)
Kelvin-Wellen ($m = 3, 4$)	2,449	4,472	0
Kelvin n^3, $n = 6$ und $n = 15$ gewählt	216	3375	$2\,\mathbb{Z}$
Kelvin-Wellen, $m = 27$ und $m = 110$ gewählt	210,3	3493	$2\,\mathbb{Z}$
Kelvin, festes R, $n = 20$, $R/a_1 \approx 355$	206,768	3495 ($n = 126$)	1 stetig $+ 2\,\mathbb{Z}$

G.8 Übersicht

Tabelle 13: Gegenstand, Status und kurze Begründung. Getrennt gehalten sind die Setzung (ein Medium, viele Anregungen), die drei Wirbelfamilien, die Koide-Beobachtung und der Wellenleiter-Anhang.

Gegenstand	Status	Bemerkung
alle Elementarteilchen als Anregungen eines Mediums	Grundlage [P] / gemessen	die Grundlage des Autors; gemessen ist die Umwandlung von Masse in Strahlung und zurück ($e^+e^- \to \gamma\gamma$ mit je 511 keV, Paarerzeugung).
Bezeichnung „Supersymmetrie“	passt nicht	der Name ist in der Teilchenphysik vergeben. Besser: ein Grundteilchen / ein Medium, viele Anregungszustände.
Masse $= E/c_*^2$ aus der Wirbelenergie	gemessen / zugeordnet	$E = mc^2$ gemessen auf 4×10^{-7}; Verhältnisse unabhängig von c_* und ρ; den Ruhezustand liefert das Minimum von $AR + B/R$.
$\Gamma = n\Gamma_0$ universell, nicht h/m_{Teilchen}	gesetzt	sonst stünde die gesuchte Masse auf beiden Seiten.
Kerndicke $a = a_{\text{evac}}$	übernommen	aus der Orbitale-Notiz, $\Delta p = c^2 \Delta\rho$.

Gegenstand	Status	Bemerkung
stetiges R gibt stetige Masse	gezeigt	$E(R)$ ist für $R \gg a$ streng monoton; kein Massenspalt ohne extra Bedingung.
Kelvin $n = 2, 3$, festes R	gezeigt / passt nicht	höchstens 4 und 9, bei $R/a_1 = 50$ nur $3{,}35$ und $6{,}67$.
Kelvin $n = 2, 3$, feste Schlankheit	gezeigt / passt nicht	parameterfrei n^3, also 8 und 27; dasselbe für den Hill-Wirbel bei fester Machzahl.
Kelvin, fester Impuls	gezeigt / passt nicht	unter $n^{3/2}$, also unter $2{,}83$ und $5{,}20$.
ideale Knoten $T(2,3)$, $T(2,5)$	gezeigt / passt nicht	Seillängen aus der Literatur; Energieverhältnisse $31{,}33$ und $53{,}50$, Faktor $6{,}6$ bzw. 65 zu klein. Nächstliegendes natürliches Ergebnis.
Torusknoten auf festem Torus	gezeigt / passt nicht	Längenverhältnisse ≈ 2 bis 3, zusätzlich abhängig von r/R.
Kelvin-Wellen, erste Moden	gezeigt / passt nicht	parameterfrei $2{,}449$, $4{,}472$, $7{,}071$.
Kelvin-Welle $m = 27$ bzw. $m = 110$	keine Vorhersage	$210{,}3$ (plus $1{,}7\,\%$) und 3493 (plus $0{,}45\,\%$); die Mode wird passend gewählt.
Koide $Q = 2/3$ aus einer Wirbelfamilie	passt nicht	natürliche Familien: $Q \approx 0{,}36$ bis $0{,}44$. Annäherung nach Wahl ganzer Zahlen erbt Q von der Messung und ist Numerologie.
was R oder den Kern des Myonwirbels festlegt	beantwortet	das Minimum $R_* = \sqrt{B/A}$; $A_\mu/A_e = 1{,}4981 \times 10^4$ aus der gemessenen Masse.
Wellenleiter-Spektrum $m_n^2 = m_\infty^2 - \Delta^2/n^2$	übernommen / gezeigt	aus der Wellenleiter-Notiz, $n = n_r + \ell + 1$; Masse als $\hbar\omega/c^2$.
Anpassung von m_∞ und Δ an e und μ	keine Vorhersage	zwei Parameter, zwei Messwerte; $m_\infty \approx \Delta \approx 122\,\mathrm{MeV}$. Zwei freie Größen legen zwei Punkte immer auf eine Gerade.
Tau als Mode $n = 3$	gezeigt / passt nicht	vorhergesagt $115{,}03\,\mathrm{MeV}$, gemessen $1776{,}93\,\mathrm{MeV}$.
Schranke $m_n < m_\infty$	gezeigt / passt nicht	keine Mode überschreitet $\approx 122\,\mathrm{MeV}$, unabhängig von n und ℓ. Das Tau hat keinen Platz: strukturelle Widerlegung.
Leptonen = Moden des Vakuum-Wellenleiters	passt nicht	zweiter Negativbefund neben den Kelvin-Ringen.
Spin $\frac{1}{2}$ mit $\ell = 0$ verwechselt	passt nicht	Spin ist Eigendrehimpuls, nicht Bahndrehimpuls; die Schranke gilt ohnehin unabhängig von ℓ. Hier nicht bemüht.

Gegenstand	Status	Bemerkung
gleichzeitige Drehungen $\Omega = \omega(1,1,0)$	gezeigt	eine Drehung um die Diagonale mit $\lvert\Omega\rvert = \sqrt{2}\,\omega$; Winkel $2\pi\sqrt{2}$ je x-Zyklus. Auf der Skizze steht $\pi\sqrt{2} = 4{,}44288$ (Diagonalwinkel nach einem halben x-Umlauf, zugleich x-Winkel je $\mathrm{SO}(3)$-Umlauf um die Diagonale). $\sqrt{2}$ ist irrational: keine exakte Rückkehr nach ganzen x-Zyklen.
Rückkehr in $\mathrm{SO}(3)$ / $\mathrm{SU}(2)$	gezeigt	$\mathrm{SO}(3)$: $2\pi/\lvert\Omega\rvert = \pi\sqrt{2}/\omega$; $\mathrm{SU}(2)$: das Doppelte, also 4π um die Diagonale.
aufeinanderfolgende statt gleichzeitige Drehungen	gezeigt	endliche Komposition ist nicht die Diagonale mit Faktor $\sqrt{2}$; nur infinitesimal gilt $\Phi \sim \alpha\sqrt{2}$. Für $\alpha = \pi$ entsteht eine Drehung um π um die z-Achse.
welches Bild für einen Wirbel gilt	gezeigt	Wirbel ist materielle Linie (Helmholtz, Kelvin); relevant ist die gleichzeitige poloidale und toroidale Wicklung (Torus/Hopf), nicht der freie starre Körper.
(p,q)-Moden, $\mathrm{SU}(2)$-Parität	gezeigt	im Torusbild fermionartig (4π), wenn p und q beide ungerade sind, sonst bosonartig (2π). $q \to -q$ (Gegenlauf) ändert den Typ nicht. Im starren Bild gibt es diese Spalte nicht: stets 2π in $\mathrm{SO}(3)$ und 4π in $\mathrm{SU}(2)$ um die eine Achse $\Omega \propto (p,q,0)$.
starre Energie $\propto p^2 + q^2$	gezeigt / passt nicht	$E/E_{(1,1)} = (p^2+q^2)/2$ ergibt 1, 2,5, 5, 6,5, 8,5, 12,5, 13 für die ersten Moden. Keine Zuordnung zu 206,77 und 3477,2. Eine Mode passend zu wählen ist ein freier diskreter Parameter.
ideale Knoten derselben Familie	gezeigt / passt nicht	$T(1,q)$ ist der Unknoten (Verhältnis 1); $T(2,3)$/Unknoten $= 31{,}33$.
Gleichlauf / Gegenlauf (Inspin / Antispin)	gezeigt	$1{:}n$ Gleichlauf: $n-1$ Blätter (Epitrochoid); Gegenlauf: $n+1$ Blätter (Hypotrochoid). Starr: Energie und $\lvert L\rvert$ gleich. Bahn, Einheitsradien, $n > 1$: $\langle E\rangle$ gleich, $\langle L\rangle = 1+n$ gegen $1-n$. Bei $n=1$ ist $\langle E\rangle$ verschieden (4 gegen 2).
Rosenkurven $r = \cos((n/d)\theta)$	gezeigt / nicht die Skizze	alle diese Kurven gehen durch den Ursprung. In der Skizze geht niemals eine Linie durch den Kern.
begrenzte Form $r = r_0 + A\cos(k\theta)$ und Trochoiden mit Lücke	gezeigt	$r_0 > A$ bzw. $R \neq \rho$ ergibt $r_{\min} > 0$.

Gegenstand	Status	Bemerkung
präzedierende Ellipsen (Rosetten)	gezeigt	$r = p/(1 + e\cos(k\theta))$, $k = N/(N+m)$; N Keulen, $r_{\min} > 0$. Skizze: $N = 5$, 8, 10.
Bertrand / $1/r$-Hof ohne Präzession	gezeigt	nur $V \propto -1/r$ und $V \propto r^2$ schließen alle gebundenen Bahnen. Der Gleichgewichtshof ist das Newton-Potenzial: Kepler-Ellipsen, keine Rosette.
Rosette braucht eine Störung	gezeigt	Zusatz β/r^2: $\Delta\varphi = 2\pi(1/\gamma - 1)$, $\gamma = \sqrt{1 + 2\mu\beta/L^2}$. Zusatz α/r^3: kreisnah $\Delta\varphi \approx -6\pi\alpha/(Kr^2)$. Schließung $\Delta\varphi = 2\pi m/N$.
$2\pi/4\pi$ aus der Parität von m?	passt nicht	nicht eindeutig. Zwei naheliegende $\mathrm{SU}(2)$-Lifte ordnen die Parität von m entgegengesetzt zu. Die ebene Schließung der Rosette ist unabhängig davon.
Rosetten als Massenspektrum	passt nicht	Kepler-Energie hängt von der Halbachse ab, nicht von (N, m). Sommerfeld liefert eine Aufspaltung der Ordnung α^2, nicht 207.

G.9 Schluss

Gezeigt ist: aus den Wirbelenergien des Mediums folgt das Massenverhältnis $206{,}768$ nicht, solange man keinen Parameter darauf einstellt. Kelvin-Ringe mit den ersten Zirkulationsquantenzahlen liefern 4, 8, 9 oder 27. Ideale Torusknoten mit den Seillängen der Literatur liefern $31{,}33$ und $53{,}50$. Kelvin-Biegewellen liefern in den ersten Moden $2{,}45$, $4{,}47$ und $7{,}07$. Das nächstliegende natürliche Ergebnis ist das Energieverhältnis des idealen Kleeblatts zum Unknoten, um den Faktor $6{,}6$ zu klein. Die numerisch dichteste Zahl, $210{,}3$ aus der Mode $m = 27$, entsteht durch die Wahl dieser Mode.

Hinzu kommt ein grundsätzlicheres Hindernis. Ein freier Kelvin-Ring hat einen stetigen Radius, und seine Energie wächst mit dem Radius. Ohne eine Bedingung, die R diskretisiert, gibt es kein diskretes Massenspektrum, unabhängig davon, welches Verhältnis man sich wünscht. Die idealen Knoten diskretisieren zwar den Typ. Warum gerade die stramme Konformation vorliegt, beantwortet die Energie: Die Energie eines dünnen Wirbels wächst mit seiner Länge, also zieht sich ein Knoten zusammen, bis die Dicke der Röhre ihn aufhält; das ist die ideale, stramme Konformation kleinster Länge bei fester Dicke. In der strammen Konformation fehlt der Faktor $6{,}6$; ihn trägt die höhere Wandenergie A_μ des Myons.

Die Aussage, alle Elementarteilchen seien Anregungszustände eines einzigen Mediums, ist die Grundlage des Autors [P]; gemessen ist die Umwandlung von Masse in Strahlung und zurück. Sie sollte nicht Supersymmetrie heißen. Was Radius und Kern des Myonwirbels festlegt, beantwortet das Energieminimum einer geschlossenen Struktur, $E(R) = AR + B/R$: Es liegt bei $R_* = \sqrt{B/A}$ und gibt $mc^2 = 2\sqrt{AB}$.

Die Massen sind gemessen ($m_\mu/m_e = 206{,}768283$, $m_\tau/m_e = 3477{,}15$); mit den Dipol-Eigenwerten des Hohlraums verlangen sie die Wandenergien $A_\mu/A_e = 1{,}4981 \times 10^4$ und $A_\tau/A_e = 2{,}734 \times 10^6$ (Antwort zu den Leptonenmassen im Hauptteil). Myon und Tau sind damit die nächsten geschlossenen Organisationen desselben Mediums mit höherer Wandenergie. Die Zuordnung „erster Oberton“, „Kleeblatt“ oder „erste Biegemode“ trägt diese Zahl nicht.

Ein zweiter Negativbefund steht im Anhang G.10. Identifiziert man die Leptonen mit den Moden des Vakuum-Wellenleiters, so legen Elektron und Myon die beiden Parameter fest ($m_\infty \approx \Delta \approx 122\,\mathrm{MeV}$); das ist keine Vorhersage. Das Tau wird bei $115\,\mathrm{MeV}$ erwartet und bei $1777\,\mathrm{MeV}$ gemessen. Schärfer: keine Mode kann m_∞ überschreiten. Das Tau hat bei keinem n und keinem ℓ Platz.

Auch die (p,q)-Drehmoden und die präzedierenden Rosetten des Anhangs G.11 tragen die Zahl 207 nicht. Die starre Energie skaliert wie p^2+q^2 und liefert für die ersten Moden 1, $2{,}5$, 5, $6{,}5$, $8{,}5$, $12{,}5$, 13. Gleichlauf und Gegenlauf derselben Ratio haben (für $n>1$) dieselbe mittlere Bahnenergie; der ideale Knoten $T(1,n)$ ist der Unknoten. Die Kepler-Energie einer Rosette hängt von der großen Halbachse ab, nicht von der Keulenzahl; Sommerfeld spaltet um α^2, nicht um 207. Eine nachträgliche Wahl großer Indizes, damit ein Verhältnis passt, ist keine Vorhersage.

G.10 Leptonen als Moden des Vakuum-Wellenleiters

Die Wellenleiter-Notiz trägt mit einem Profil der Grenzfrequenz $\omega_c^2(r) = \omega_\infty^2(1-2\alpha/r)$ die radiale Wasserstoffgleichung [3]. Die Eigenfrequenzen sind

$$\omega_n^2 = \omega_\infty^2 - \frac{c_s^2}{a^2 n^2}\,, \tag{303}$$

wobei $n = n_r + \ell + 1$ die Hauptquantenzahl ist ($n_r = 0,1,2,\dots$ zählt die radialen Anregungen über dem Zentrifugalminimum). Die Bindung sitzt unterhalb der Fernfeld-Grenzfrequenz, $\omega_n < \omega_\infty$. Liest man die Ruhemasse als $m = \hbar\omega/c^2$, so folgt

$$m_n^2 = m_\infty^2 - \frac{\Delta^2}{n^2}\,, \tag{304}$$

mit $m_\infty = \hbar\omega_\infty/c^2$ und $\Delta = \hbar c_s/(ac^2)$. Die Massen wachsen mit n und häufen sich unterhalb von m_∞. Die Hypothese dieses Anhangs ist: die geladenen Leptonen seien die ersten Moden dieses Vakuum-Wellenleiters ($n = 1,2,3$).

Die Parameter. Zwei freie Größen legen zwei Punkte immer auf eine Gerade — hier die Gerade m^2 gegen $1/n^2$. Setzt man das Elektron auf $n=1$ und das Myon auf $n=2$, so folgt

$$\Delta^2 = \frac{4}{3}\bigl(m_\mu^2 - m_e^2\bigr)\,, \qquad m_\infty^2 = m_e^2 + \Delta^2\,. \tag{305}$$

Mit den PDG-Werten $m_e = 0{,}51099895\,\mathrm{MeV}$ und $m_\mu = 105{,}6583755\,\mathrm{MeV}$ ist

$$\Delta = 122{,}002\,\mathrm{MeV}\,, \qquad m_\infty = 122{,}003\,\mathrm{MeV}\,. \tag{306}$$

Die beiden Zahlen liegen so nahe beieinander, weil $m_e \ll m_\mu$ ist; führend gilt $m_\infty \approx \Delta \approx (2/\sqrt{3})\,m_\mu$. Elektron und Myon liegen per Konstruktion auf der Kurve.

Die beiden Parameter m_∞ und Δ werden durch Elektron und Myon festgelegt; sie sind damit nicht vorhergesagt. Die Vorhersage betrifft ausschließlich das Tau (und die schwereren Leptonen, die es nicht gibt).

Der Test. Für $n = 3$ folgt

$$m_\tau^{\text{vorhergesagt}} = \sqrt{m_\infty^2 - \Delta^2/9} = 115{,}026\,\text{MeV}\,. \tag{307}$$

Gemessen ist $m_\tau = 1776{,}93\,\text{MeV}$. Die Vorhersage liegt um den Faktor $15{,}4$ daneben und ist damit widerlegt.

Die Grenze.

Satz 8 (obere Schranke)**. Es gilt $m_n < m_\infty \approx 122{,}0\,\text{MeV}$ für jedes n und jedes ℓ.** Die Moden häufen sich unterhalb von m_∞. Das Tau mit $1776{,}93\,\text{MeV}$ hat bei keiner Wahl der Quantenzahlen Platz.

Aus (304) folgt $m_n < m_\infty$ für jedes endliche n, und $m_n \to m_\infty$ von unten für $n \to \infty$. Weil $n = n_r + \ell + 1$ jede Kombination aus Radialanregung und Bahndrehimpuls durchläuft, gilt dieselbe Schranke unabhängig von ℓ. Ein größeres ℓ erhöht nur das kleinste erlaubte n auf $\ell + 1$ und schiebt die Mode näher an m_∞, niemals darüber. Das ist eine strukturelle Widerlegung, nicht bloß eine numerische Abweichung um einen Faktor fünfzehn (Abbildung 63).

Dieselbe Aussage gilt, welche zwei Leptonen die Parameter auch festlegen. Ein nach oben durch m_∞ beschränktes Spektrum erreicht das Tau nur, wenn $m_\infty > 1776{,}93\,\text{MeV}$ ist. Wäre das Tau der Häufungspunkt $n \to \infty$, also $m_\infty = m_\tau$, und bliebe das Elektron bei $n = 1$, so läge die Mode $n = 2$ bei $\sqrt{m_\tau^2 - (m_\tau^2 - m_e^2)/4} = 1538{,}87\,\text{MeV}$, nicht beim Myon ($105{,}658\,\text{MeV}$). Das Myon hätte keine ganze Zahl n: es müsste bei $n \approx 1{,}002$ sitzen. Hebt man die Decke hoch genug, dass das Tau irgendeinen Platz findet, und hält das Elektron bei $n = 1$, so springt der erste Schritt $n = 2$ bereits auf mindestens $1539\,\text{MeV}$. Zwischen $0{,}511$ und $1539\,\text{MeV}$ liegt keine weitere ganzzahlige Mode. Elektron und Myon passen dann nicht mehr zusammen.

Die Konsequenz. Die Hypothese, die geladenen Leptonen seien Moden dieses Wellenleiters, ist widerlegt. Das ist ein zweiter ehrlicher Negativbefund neben den Kelvin-Ringen des Hauptteils.

Der Spin. Spin $\frac{1}{2}$ ist Eigendrehimpuls, nicht Bahndrehimpuls ℓ. Aus dem Spin $\frac{1}{2}$ des Elektrons folgt nicht $\ell = 0$; im Wasserstoffatom hat der Grundzustand $\ell = 0$ und trotzdem Spin $\frac{1}{2}$. An dieser Schranke ändert das nichts, denn sie gilt unabhängig von ℓ. Der Spin wird hier nicht bemüht, um die Widerlegung zu umgehen. Die Geometrie gleichzeitiger Drehungen, die (p, q)-Moden, Gleich- und Gegenlauf und die präzedierenden Rosetten stehen im Anhang G.11; auch sie liefern das Massenverhältnis $206{,}768$ nicht.

G.11 Gleichzeitige Drehungen, (p, q)-Moden und Rosetten

Die skizzierte Geometrie ist eine Kugel mit drei paarweise senkrechten Großkreisen und die Bemerkung: wenn sich die Kugel einmal um die x-Achse dreht, drehe




Abbildung 63: Massenspektrum (304), nachdem m_∞ und Δ an Elektron ($n = 1$) und Myon ($n = 2$) angepasst wurden. Die Mode $n = 3$ liegt bei $115{,}03\,\mathrm{MeV}$, die weiteren Moden häufen sich unterhalb von $m_\infty = 122{,}00\,\mathrm{MeV}$. Das gemessene Tau ($1776{,}93\,\mathrm{MeV}$) liegt in dem Bereich, in dem es keine Mode gibt.

sie sich gleichzeitig einmal um die y-Achse. Das sind zwei gleich große, gleichzeitige Winkelgeschwindigkeiten. Dieser Anhang prüft die Zusammensetzung, die Verallgemeinerung auf rationale Verhältnisse $p{:}q$, den Gleich- und Gegenlauf und die präzedierenden Ellipsen der Skizze — Rosetten mit leerem Innenkreis, nicht Rosenkurven durch den Kern. Die Massenverhältnisse $206{,}768$ und $3477{,}2$ kommen dabei nicht heraus.

G.11.1 Zusammensetzung und der Faktor $\sqrt{2}$

Zwei gleichzeitige Winkelgeschwindigkeiten gleicher Stärke ω um $\hat{\mathbf{e}}_x$ und $\hat{\mathbf{e}}_y$ addieren sich vektoriell:

$$\boldsymbol{\Omega} = \omega(1, 1, 0)\,, \qquad |\boldsymbol{\Omega}| = \sqrt{2}\,\omega\,. \tag{308}$$

Ein starrer Körper dreht sich also um die eine Achse, die Winkelhalbierende (die Diagonale in der xy-Ebene), mit der Rate $\sqrt{2}\,\omega$ (Abbildung 64). Während einer x-Periode $T = 2\pi/\omega$ dreht er sich um die Diagonale um den Winkel

$$|\boldsymbol{\Omega}|\,T = 2\pi\sqrt{2} \approx 8{,}88577\,. \tag{309}$$

Auf der Skizze steht $\pi\sqrt{2} = 4{,}44288$. Diese Zahl ist beides: der Diagonalwinkel nach einem halben x-Umlauf (Zeit π/ω) und der vom x-Anteil zurückgelegte Winkel während einer vollen $\mathrm{SO}(3)$-Umdrehung um die Diagonale, denn $\omega \cdot (2\pi/|\boldsymbol{\Omega}|) = 2\pi/\sqrt{2} = \pi\sqrt{2}$.

Weil $\sqrt{2}$ irrational ist, gibt es keine ganzen Zahlen $k, m \geq 1$ mit $k \cdot 2\pi = m \cdot 2\pi/\sqrt{2}$. Nach einer ganzen Zahl von x-Zyklen ist der Diagonalwinkel $k \cdot 2\pi\sqrt{2}$ niemals ein Vielfaches von 2π und auch nicht von 4π. Der starre Körper selbst kehrt dennoch periodisch zurück: die Rückkehrzeit in $\mathrm{SO}(3)$ ist $2\pi/|\boldsymbol{\Omega}| = \pi\sqrt{2}/\omega$, in $\mathrm{SU}(2)$ das Doppelte, also ein Diagonalwinkel von 4π.

Was der Faktor $\sqrt{2}$ physikalisch bedeutet, ist damit benannt und begrenzt. Gegenüber einer einzelnen Achse der Rate ω gilt $|\mathbf{L}| = I|\boldsymbol{\Omega}| = \sqrt{2}\,I\omega$ und $E = \tfrac{1}{2}I|\boldsymbol{\Omega}|^2 = I\omega^2 =$

$2 \cdot (\frac{1}{2} I\omega^2)$. Gezeigt ist die Zusammensetzung. Diese Faktoren sind keine Massenverhältnisse der Leptonen: $\sqrt{2} \approx 1{,}414$, 2, $\pi\sqrt{2} \approx 4{,}443$ und $2\pi\sqrt{2} \approx 8{,}886$ sind alle weit von $206{,}768$ entfernt.




Abbildung 64: Gleichzeitige gleiche Drehungen um x und y. (a) Die Winkelgeschwindigkeiten addieren sich zu $\boldsymbol{\Omega} = \omega(1,1,0)$ mit $|\boldsymbol{\Omega}| = \sqrt{2}\,\omega$. (b) Die Kugel dreht sich um diese eine Diagonale. Die Rückkehr in $\mathrm{SO}(3)$ erfolgt nach dem Diagonalwinkel 2π, in $\mathrm{SU}(2)$ nach 4π.

G.11.2 Drei Bilder: gleichzeitig, nacheinander, Torus

Dasselbe Wort „zwei Drehungen“ meint drei verschiedene Dinge.

Erstens die gleichzeitigen Winkelgeschwindigkeiten des starren Körpers, soeben. Es gibt nur eine Achse, die Diagonale, und eine Rate $\sqrt{2}\,\omega$.

Zweitens die Hintereinanderausführung endlicher Drehungen: zuerst um den Winkel α um die x-Achse, danach um denselben Winkel um die y-Achse. Das Produkt ist wieder eine einzelne Drehung, aber nicht um die Diagonale und nicht um $\alpha\sqrt{2}$. Der Skalarteil des zusammengesetzten Quaternions ist $\cos^2(\alpha/2)$, also $\Phi = 2\arccos(\cos^2(\alpha/2))$. Für $\alpha = \pi$ ist das eine Drehung um π um die z-Achse. Der Faktor $\sqrt{2}$ erscheint nur infinitesimal: $\Phi \sim \alpha\sqrt{2}$ für $\alpha \to 0$. Endliche aufeinanderfolgende Drehungen sind nicht dasselbe wie gleichzeitige Winkelgeschwindigkeiten.

Drittens ein Flüssigkeitsteilchen oder ein Prop, der gleichzeitig eine poloidale und eine toroidale Winkelkoordinate durchläuft, etwa auf einem $1{:}1$-Torus. Das sind zwei unabhängige Winkel, keine starre Drehung um eine feste Achse. Der Weg $\gamma(t) = (e^{it}, e^{it})/\sqrt{2}$ auf dem Clifford-Torus in $S^3 \simeq \mathrm{SU}(2)$ ist eine Hopf-Faser: $\gamma(t+\pi) = -\gamma(t)$ und $\gamma(t+2\pi) = \gamma(t)$. Das ist der Fall geschlossener $(1,1)$-Bahnen mit 4π-Spinorperiodizität.

Für einen Wirbel im Medium gilt das dritte Bild, nicht das erste. Nach Helmholtz und Kelvin ist ein Wirbel eine materielle Linie des Mediums selbst; die umgebende Flüssigkeit verbindet ihn mit dem Rest des Raums, analog zu den Bändern des

Gürteltricks. Die natürliche Bewegung ist eine gleichzeitige poloidale und toroidale Wicklung. Das starre $\sqrt{2}$ an der Diagonale bleibt eine kinematische Analogie für einen starren Körper mit zwei auferlegten Raten. Der Spin $\frac{1}{2}$ ist gemessen: Ein Spin-$\frac{1}{2}$-Teilchen kehrt erst nach 4π zur selben Phase zurück (Neutroneninterferometrie, 1975); im Medium trägt diese Periode der Wirbel, der wie das Band im Gürteltrick am Medium hängt.

G.11.3 (p,q)-Moden

Die beiden Raten müssen nicht gleich sein; sie können in Moden stehen, $\omega_x : \omega_y = p : q$ mit teilerfremden ganzen Zahlen. Im starren Bild ist das weiterhin eine einzelne Drehung, $\boldsymbol{\Omega} = \omega(p,q,0)$ mit $|\boldsymbol{\Omega}| = \omega\sqrt{p^2+q^2}$. Energie und Drehmomentbetrag skalieren wie

$$\frac{E}{E_{(1,1)}} = \frac{p^2+q^2}{2}\,, \qquad \frac{|\mathbf{L}|}{|\mathbf{L}|_{(1,1)}} = \sqrt{\frac{p^2+q^2}{2}}\,. \tag{310}$$

Die Periodizität um diese eine Achse bleibt die gewöhnliche: 2π in $\mathrm{SO}(3)$, 4π in $\mathrm{SU}(2)$. Eine zusätzliche Paritätsspalte gibt es hier nicht.

Im Torusbild sind die geschlossenen (p,q)-Wege die Torusknoten und die Hopf–Seifert-Fasern. Der Lift $\gamma(t) = (e^{ipt}, e^{iqt})/\sqrt{2}$ in $S^3 \simeq \mathrm{SU}(2)$ hat eine andere Alternative. Sind p und q beide ungerade, so gilt $\gamma(\pi) = -\gamma(0)$ und $\gamma(2\pi) = \gamma(0)$: der Weg trifft den Antipoden nach der halben Parameterzeit. Solche Moden heißen hier fermionartig (720°, 4π-Typ). Ist eine der beiden Zahlen gerade, so gibt es kein τ mit $\gamma(\tau) = -\gamma(0)$; der Weg schließt sich bei 2π, ohne den Antipoden zu treffen. Diese Moden heißen bosonartig (360°, 2π-Typ). Das Vorzeichen von q ändert das nicht: $e^{-iq\tau} = -1$ gilt genau dann, wenn $e^{iq\tau} = -1$. Gleichlauf (p,q) und Gegenlauf $(p,-q)$ haben denselben Typ.

Das ist eine Eigenschaft des Lifts, keine Herleitung des Elektronspins. Insbesondere ist die Mode $T(2,3)$ (das Kleeblatt) nach dieser Parität bosonartig, während $(1,1)$ und $(1,3)$ fermionartig sind.

Tabelle 14: (p,q)-Moden. Der Typ gilt im Torusbild (Abschnitt G.11.3). Die starre Energie ist parameterfrei durch (310) festgelegt. Ideale Knotenenergien sind die Verhältnisse aus Abschnitt G.4, wo eine Literatur-Seillänge vorliegt; $T(1,q)$ ist der Unknoten.

(p,q)	Typ	$E/E_{(1,1)}$	$\lvert L\rvert/\lvert L\rvert_{(1,1)}$	ideale Knotenenergie
$(1,1)$	fermionartig	1	1	1 (Unknoten)
$(1,2)$	bosonartig	2,5	1,581	1
$(1,3)$	fermionartig	5	2,236	1
$(2,3)$	bosonartig	6,5	2,550	31,33
$(1,4)$	bosonartig	8,5	2,915	1
$(3,4)$	bosonartig	12,5	3,536	—
$(1,5)$	fermionartig	13	3,606	1
$(2,5)$	bosonartig	14,5	3,808	53,50
$(3,5)$	fermionartig	17	4,123	—

Keine dieser natürlichen Zuordnungen ergibt $1 : 206{,}77 : 3477{,}2$. Die nächstliegende Knotenzahl bleibt $31{,}33$, um den Faktor $6{,}6$ zu klein. Eine nachträgliche Wahl

großer p, q, damit ein Verhältnis nahe 207 liegt, ist das Einstellen eines diskreten Parameters und keine Vorhersage; dasselbe gilt bereits für die Kelvin-Welle $m = 27$.

G.11.4 Gleichlauf und Gegenlauf

Dieselben Verhältnisse lassen sich als Poi-Blumen lesen: ein Prop dreht sich um die Hand, die Hand um die Schulter, mit den Ratios $1{:}1$, $1{:}2$, $1{:}3$, $1{:}4$, $1{:}5$.[2] Gleichlauf (Inspin) bedeutet gleichen Drehsinn; die Bahn ist epitrochoidenartig (eine Kreisbewegung rollt außen um die andere) und hat $n - 1$ Blätter. Gegenlauf (Antispin) bedeutet entgegengesetzten Drehsinn; die Bahn ist hypotrochoidenartig (innen rollend) und hat $n + 1$ Blätter. Für $n = 1$ ist der Gleichlauf der Kreis ohne Blatt (der Prop zeigt stets nach außen) und der Gegenlauf die Strecke durch den Ursprung — das Tusi-Paar, die klassische zweiblättrige Entartung.

Die Zuordnung zu den Torusmoden ist Gleichlauf $1{:}n \leftrightarrow (1, n)$ und Gegenlauf $1{:}n \leftrightarrow (1, -n)$. Der $\mathrm{SU}(2)$-Typ hängt nicht vom Vorzeichen ab: $1{:}1$, $1{:}3$ und $1{:}5$ sind fermionartig, $1{:}2$ und $1{:}4$ bosonartig, jeweils in beiden Drehsinnen (Abbildung 65).




Abbildung 65: Poi-Blumen für die Ratios $1{:}1$ bis $1{:}5$, gleiche Arm- und Prop-Länge. Oben Gleichlauf (Inspin, gleicher Drehsinn, epitrochoidenartig, $n - 1$ Blätter), unten Gegenlauf (Antispin, entgegengesetzter Drehsinn, hypotrochoidenartig, $n+1$ Blätter). Der gestrichelte Kreis ist die Bahn der Hand.

Bei gleichen Längen $R = \rho$ gehen einige dieser Blumen durch den Ursprung; der Gegenlauf $1{:}1$ ist die Strecke durch den Kern. Wird $R > \rho$ gewählt, bleibt eine Kreisscheibe vom Radius $R - \rho$ leer, bei gleichen Blattzahlen (Abbildung 67, rechts).

Energie und Drehimpuls unterscheiden sich je nach Bild. Im starren Bild ist $|\mathbf{\Omega}| = \omega\sqrt{1 + n^2}$ für $(1, n)$ und für $(1, -n)$ dasselbe; Energie und $|\mathbf{L}|$ kennen den Drehsinn nicht. Auch die ideale Knotenenergie unterscheidet sie nicht: $T(1, \pm n)$ ist für jedes n der Unknoten.

[2] Solche Kurven zeigt etwa die Poi-Darstellung auf `http://spinscience.xyz/flowers/`.

In der Bahnebene mit gleichen Radien $R = r = 1$ und $\omega_{\text{Hand}} = 1$, $\omega_{\text{Prop}} = n$ ist $z(t) = e^{it} + e^{\pm int}$. Die zeitlich gemittelte kinetische Energie $\langle|\dot z|^2\rangle$ ist für $n > 1$ auf beiden Seiten $1 + n^2$. Nur der Fall $n = 1$ spaltet: Gleichlauf (Kreis vom Radius 2) hat $\langle E\rangle = 4$, Gegenlauf (Strecke) hat $\langle E\rangle = 2$, weil sich die beiden Bewegungen im Gleichlauf kohärent addieren. Der mittlere Drehimpuls um den Ursprung, $\langle L\rangle = \langle \mathrm{Im}(\bar z\,\dot z)\rangle$, ist verschieden:

$$L_{\text{Gl}}(t) = (1+n)\big(1+\cos((n-1)t)\big)\,, \qquad L_{\text{Geg}}(t) = (1-n)\big(1+\cos((n+1)t)\big)\,. \tag{311}$$

Für $n > 1$ folgen die Mittel $\langle L\rangle_{\text{Gl}} = 1+n$ und $\langle L\rangle_{\text{Geg}} = 1-n$; ihr Unterschied ist $2n$, ihr Betragsverhältnis $(n-1)/(n+1)$. Für $n = 1$ ist $\langle L\rangle_{\text{Gl}} = 4$ und $\langle L\rangle_{\text{Geg}} = 0$. Der Gegenlauf trägt also weniger (für $n > 1$: entgegengesetzten) Drehimpuls um das gemeinsame Zentrum, bei gleicher mittlerer Bahnenergie.

Tabelle 15: Gleichlauf und Gegenlauf der Ratio $1{:}n$. Der Typ gilt für $(1, \pm n)$ gemeinsam. $E_{\text{starr}}/E_{1:1} = (1+n^2)/2$. Die Bahnwerte sind $\langle|\dot z|^2\rangle$ und $\langle \mathrm{Im}(\bar z\,\dot z)\rangle$ bei Einheitsradien und $\omega_{\text{Hand}} = 1$.

$1{:}n$	Bl. Gl.	Bl. Geg.	Typ	E_{starr}	$\langle E\rangle_{\text{Gl}}$	$\langle E\rangle_{\text{Geg}}$	$\langle L\rangle_{\text{Gl}}$	$\langle L\rangle_{\text{Geg}}$
1:1	0 (Kreis)	2 (Strecke)	fermionartig	1	4	2	4	0
1:2	1	3	bosonartig	2,5	5	5	3	−1
1:3	2	4	fermionartig	5	10	10	4	−2
1:4	3	5	bosonartig	8,5	17	17	5	−3
1:5	4	6	fermionartig	13	26	26	6	−4

G.11.5 Präzedierende Ellipsen

Die Rosenkurven $r = \cos((n/d)\theta)$ des vorigen Ansatzes gehen alle durch den Ursprung. Die Skizze ist anders: es geht niemals eine Linie durch den Kern. Gezeichnet sind präzedierende Ellipsen, also Rosetten mit leerem Innenkreis und etwa fünf, acht und zehn Keulen, vom Typ der Sommerfeldschen Bahnen und der Merkur-Präzession.

Eine Kepler-Ellipse mit einem Brennpunkt im Kraftzentrum hat die Polarform

$$r(\theta) = \frac{p}{1 + e\cos\theta}\,, \qquad 0 < e < 1\,. \tag{312}$$

Der Periapsisabstand $r_{\min} = p/(1+e)$ ist positiv: zwischen Kern und Bahn bleibt eine Kreisscheibe leer. Läuft die Apsidenlinie pro radialer Periode (von Periapsis zu Periapsis) um den Winkel $\Delta\varphi$ rechtläufig weiter, so entsteht

$$r(\theta) = \frac{p}{1 + e\cos(k\theta)}\,, \qquad k = \frac{2\pi}{2\pi + \Delta\varphi}\,. \tag{313}$$

Mit der Schließungsbedingung der Skizze, $\Delta\varphi = 2\pi\, m/N$ und teilerfremden ganzen Zahlen $N, m \geq 1$, folgt

$$k = \frac{N}{N+m}\,. \tag{314}$$

Die Bahn schließt sich nach N Keulen: N Radialperioden, während deren der Fahrstrahl $N + m$-mal um den Kern läuft. Für $m = 1$ sind das die Rosetten mit $N = 5$, 8, 10 ($\Delta\varphi = 72°$, $45°$, $36°$).




Abbildung 66: Präzedierende Ellipsen (313) mit leerem Innenkreis, nach der Skizze. Oben die ungestörte Kepler-Ellipse ($k = 1$, keine Präzession) sowie $N = 5$ und $N = 8$; unten $N = 10$, 3 und 6, jeweils mit $m = 1$. Der gestrichelte Kreis markiert $r_{\min} = p/(1+e) > 0$; der Kern (Punkt) wird von keiner Bahnlinie getroffen.

Abbildung 66 zeigt diese Familie zusammen mit der ungestörten Kepler-Ellipse und zwei weiteren geschlossenen Rosetten; der gestrichelte Kreis ist $r = r_{\min} > 0$. In den Rechnungen ist $e = 0{,}4$, also $r_{\min}/r_{\max} = (1-e)/(1+e) = 3/7$.

Geometrie der Schließung: das Verhältnis von Radial- zu Azimutalfrequenz muss rational sein,

$$\frac{\omega_r}{\omega_\varphi} = \frac{N}{N+m}\,. \tag{315}$$

Das ist die Bedingung, dass nach N radialen Perioden der Azimut um $2\pi(N+m)$ weitergelaufen ist.

Physik der Schließung: nach Bertrand sind die einzigen zentralen Potenziale, in denen alle gebundenen Bahnen geschlossen sind, das Kepler-Potenzial $V \propto -1/r$ und der isotrope Oszillator $V \propto r^2$ [18]. Im Medium ist der $1/r$-Gleichgewichtshof dieselbe Aussage wie das Newton-Potenzial $\Phi = -GM/r$ [1]. Dann gibt es keine Präzession: jede gebundene Bahn ist eine Kepler-Ellipse mit einem Brennpunkt im

Zentrum ($k=1$, eine Keule). Eine Rosette mit $N>1$ verlangt eine Störung dieses Potenzials, etwa einen relativistischen Zusatz proportional zu $1/r^3$ oder einen endlichen Kern, der das reine $1/r$ bei kleinen Abständen abschneidet.

Für eine Kreisbahn vom Radius r im Potenzial V ist der Azimutwinkel zwischen aufeinanderfolgenden Periapsiden

$$\Delta\theta = \frac{2\pi}{\sqrt{3 + rV''(r)/V'(r)}}\,, \qquad \Delta\varphi = \Delta\theta - 2\pi\,. \tag{316}$$

Beim reinen Kepler-Potenzial $V=-K/r$ gilt $rV''/V'=-2$, also $\Delta\varphi=0$.

Ein Zusatz β/r^2 (Kraftstörung $\propto 1/r^3$) lässt sich in das Zentrifugalglied ziehen und ist exakt lösbar. Die Bahn ist (313) mit

$$\gamma = \sqrt{1 + \frac{2\mu\beta}{L^2}}\,, \qquad \Delta\varphi = 2\pi\big(1/\gamma - 1\big)\,, \tag{317}$$

wobei μ die Teilchenmasse ist und der Bahnparameter k in (313) gleich γ gesetzt wird. Für kleine β und eine Kreisbahn der Kepler-Bedingung $L^2=\mu K r$ wird daraus $\Delta\varphi \approx -2\pi\beta/(Kr)$. Rechtläufige Präzession ($\Delta\varphi>0$) verlangt $\beta<0$.

Ein Zusatz α/r^3 liefert in derselben kreisnahen Rechnung

$$\Delta\varphi \approx -\frac{6\pi\alpha}{Kr^2}\,. \tag{318}$$

Die Periheldrehung des Merkur in der allgemeinen Relativität, $\Delta\varphi = 6\pi GM/(c^2 a(1-e^2))$ je Umlauf, ist der klassische Fall eines solchen Glieds. Die Bedingung für eine N-keulige Schließung bleibt in beiden Störungen $\Delta\varphi = 2\pi m/N$, also $\gamma = N/(N+m)$ im Fall β/r^2.

Historisch ist das Sommerfelds Feinstruktur [19]: die relativistische Kepler-Bewegung erzeugt präzedierende Ellipsen, und die alte Quantentheorie spaltet das Niveau n nach der inneren Quantenzahl $k_{\mathrm S}=1,\dots,n$ (später $j+\tfrac12$). Die ℓ-Aufspaltung ist von der Ordnung $\alpha^2 \approx 5{\cdot}10^{-5}$ und wird in Lehrbuchfiguren übertrieben gezeichnet. Die wirkliche Präzession ist winzig, also N sehr groß. Die Skizze mit $N=5$, 8 und 10 hat denselben geometrischen Typ, nicht dieselbe physikalische Größe.

Abbildung der Rosette auf die (p,q)-Moden: N zählt die radialen Zyklen, $N+m$ die Umläufe um den Kern, also $(p,q)=(N,\,N+m)$. Für $m=1$ sind das die Paare $(5,6)$, $(8,9)$, $(10,11)$. Im Torus-SU(2)-Lift aus Abschnitt G.11.3 sind p und q beide ungerade genau dann, wenn m gerade ist (und die Zahlen nach Kürzen ungerade bleiben). Dann wäre die Mode fermionartig bei geradem m und bosonartig bei ungeradem m.

Ein anderer Lift fragt nach der gedrehten Apsidenlinie: bei geometrischer Schließung hat sie den Winkel $2\pi m$ überstrichen. Das SU(2)-Bild dieser Drehung ist $(-1)^m$, also fermionartig bei ungeradem m und bosonartig bei geradem m.

Die beiden Zuordnungen widersprechen einander in jedem geprüften Fall. Aus der Parität von m folgt daher nicht eindeutig ein 2π- oder 4π-Typ „wie im SU(2)-Lift“. Es kommt darauf an, welche Größe man hebt. Die Rosette in der Ebene schließt sich unabhängig davon nach einem endlichen Winkel; das ist gewöhnliche geometrische Periodizität, keine Spinorperiode.

Was Geometrie ist: die Kurven (313), die Schließungsbedingung (314), der leere Innenkreis $r_{\min}>0$ und dass die Skizze diesen Typ zeigt. Was Physik ist: Bertrands Satz, der $1/r$-Hof als Newton-Potenzial ohne Präzession, die Notwendigkeit einer Störung und die Formeln für $\Delta\varphi$. Keiner der beiden Lifte legt den Elektronspin eindeutig fest, und die Quantenzahlen (N,m) tragen die Leptonmassen nicht. Der Spin ist gemessen (4π-Periode), die Massen ordnet das Minimum $E=AR+B/R$ mit den gemessenen Wandenergie-Verhältnissen zu.

Bemerkung (Rosenkurven durch den Kern). Die Familie $r(\theta) = \cos((n/d)\theta)$ bleibt eine andere Kurve. Nach Kürzen gilt die Schließungsperiode πd, falls n und d beide ungerade sind, sonst $2\pi d$; die Blattzahl ist n bzw. $2n$. Jede solche Rhodonea geht durch den Ursprung — das ist nicht die Skizze. Zwei verwandte Formen halten den Kern frei: die versetzte Schwingung $r = r_0 + A\cos(k\theta)$ mit $r_0 > A > 0$, und die Epi- bzw. Hypotrochoiden $z = Re^{it} + \rho e^{\pm int}$ mit $R \neq \rho$, bei denen $r_{\min} = |R - \rho| > 0$ ist (Abbildung 67). Sie können einer Rosette äußerlich ähneln, sind aber keine Kepler-Ellipsen (der Ursprung ist kein Brennpunkt).




Abbildung 67: Drei ebene Familien. Links eine Rhodonea: jede Linie trifft den Kern — nicht die Skizze. Mitte die begrenzte Form $r = r_0 + A\cos(k\theta)$ mit $r_0 > A$. Rechts ein Gegenlauf $1{:}4$ mit ungleichen Radien $R > \rho$. In den beiden rechten Tafeln bleibt eine Kreisscheibe um den Kern leer.

G.11.6 Massenverhältnisse

Geprüft wird, ob eine natürliche Zuordnung von Moden die Reihe $e : \mu : \tau = 1 : 206{,}77 : 3477{,}2$ trifft. Die starre Familie liefert über (310) die Verhältnisse 1, $2{,}5$, 5, $6{,}5$, $8{,}5$, $12{,}5$, 13, $14{,}5$, 17. Dieselben Zahlen erscheinen als $E_{\text{starr}}/E_{1:1}$ der Poi-Blumen $1{:}n$. Die Bahnenergie $\langle|\dot{z}|^2\rangle = 1 + n^2$ $(n > 1)$ ist 5, 10, 17, 26 und unterscheidet Gleichlauf nicht von Gegenlauf. Bei den idealen Knoten bleibt $T(1, n)$ der Unknoten; das Kleeblatt $T(2, 3)$ liefert $31{,}33$.

Die Rosetten ändern das nicht. Die Kepler-Energie $E = -K/(2a)$ hängt von der großen Halbachse ab, nicht von (N, m). Schließung quantisiert das Frequenzverhältnis, nicht die Energie: bei festem Störparameter β liegt $\gamma = N/(N + m)$ eine Bedingung an L, und E bleibt stetig. Erst eine extra Quantisierung (Sommerfeld) diskretisiert E und erzeugt die Feinstruktur des Wasserstoffs, eine relative Aufspaltung der Ordnung α^2, nicht das Verhältnis 207. Die Bindungsenergien $E_n \propto 1/n^2$ gäben außerdem $1 : \frac{1}{4} : \frac{1}{9}$, also die falsche Hierarchie.

Keine dieser Zuordnungen gibt $206{,}77$ oder $3477{,}2$. Drei Moden nachträglich so zu wählen, dass die Verhältnisse passen, heißt, diskrete Indizes einzustellen. Das ist Numerologie, keine Vorhersage.

Gezeigt sind Zusammensetzung und Faktor $\sqrt{2}$, die (p,q)-Klassifikation, Gleich- und Gegenlauf, und dass die Skizze präzedierende Ellipsen mit leerem Kern ist, die im reinen $1/r$-Hof nicht entstehen. Eine Massenformel liefert die Rosette nicht; die Massen trägt $E = AR + B/R$ mit den Wandenergien A_i.

Literatur

[1] S. Reuvekamp, „Der $1/r$-Dichtehof aus dem Strahlungsgleichgewicht. Kerngleichgewicht, magnetisches Analogon und warum der Hof kein Strömungseffekt ist“, Anhang B dieses Bandes, Notiz, 7. November 2026.

[2] S. Reuvekamp, „Wirbelringe, Torusknoten und stehende Wellen im $\gamma = 2$-Medium. Ein Vergleich mit den Wasserstofforbitalen“, Notiz, 7. November 2026.

[3] S. Reuvekamp, „Grenzfrequenz durch Wirbelwände: Wann Wellen im $\gamma = 2$-Medium die Wasserstoff-Knoten tragen“, Notiz, 7. November 2026.

[4] S. Reuvekamp, „Bjerknes-Kräfte im $\gamma = 2$-Medium: Vorzeichen, Abstandsgesetz, Strahlungsverlust und das Gleichgewicht der Wirbelblase“, Notiz, 7. November 2026.

[5] W. Thomson (Lord Kelvin), „On vortex atoms“, Proceedings of the Royal Society of Edinburgh **6** (1867), 94–105.

[6] H. Lamb, Hydrodynamics, 6. Auflage, Cambridge University Press, 1932 (Dover-Nachdruck, New York, 1945). Art. 161–163 (Wirbelringe).

[7] P. G. Saffman, Vortex Dynamics, Cambridge University Press, 1992.

[8] L. S. Da Rios, „Sul moto di un liquido indefinito con un filetto vorticoso di forma qualunque“, Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo **22** (1906), 117–135.

[9] R. J. Arms und F. R. Hama, „Localized-induction concept on a curved vortex and motion of an elliptic vortex ring“, Physics of Fluids **8** (1965), 553–559.

[10] T. Kambe und T. Takao, „Motion of distorted vortex rings“, Journal of the Physical Society of Japan **31** (1971), 591–599.

[11] R. L. Ricca, D. C. Samuels und C. F. Barenghi, „Evolution of vortex knots“, Journal of Fluid Mechanics **391** (1999), 29–44.

[12] A. Calini, S. F. Keith und S. Lafortune, „Stability of small-amplitude torus knot solutions of the localized induction approximation“, Journal of Physics A **44** (2011), 335204.

[13] P. Pierański, „In search of ideal knots“, in: A. Stasiak, V. Katritch und L. H. Kauffman (Hrsg.), Ideal Knots, World Scientific, Singapore, 1998, S. 20–41.

[14] J. Cantarella, R. B. Kusner und J. M. Sullivan, „On the minimum ropelength of knots and links“, Inventiones Mathematicae **150** (2002), 257–286.

[15] T. Ashton, J. Cantarella, M. Piatek und E. Rawdon, „Knot tightening by constrained gradient descent“, Experimental Mathematics **20** (2011), 57–90.

[16] Y. Koide, „Fermion–boson two-body model of quarks and leptons and Cabibbo mixing“, Lettere al Nuovo Cimento **34** (1982), 201–205.

[17] Y. Koide, „A fermion–boson composite model of quarks and leptons“, Physics Letters B **120** (1983), 161–165.

[18] J. Bertrand, „Théorème relatif au mouvement d’un point attiré vers un centre fixe“, Comptes Rendus de l’Académie des Sciences **77** (1873), 849–853.

[19] A. Sommerfeld, „Zur Quantentheorie der Spektrallinien“, Annalen der Physik **51** (1916), 1–94, 125–167.

H Die strömungsfreie Zone als Elektron

Zusammenfassung. Im barotropen Medium $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ ist ein Elektron eine strömungsfreie Zone: darin bewegen sich die Grundteilchen frei, wechseln oft die Richtung und vibrieren deshalb. Die umgebende Strömung erzeugt die Wirbelwand, die die Zone hält. Drei Zustände tragen denselben Namen: das freie Elektron, das Schalen-Elektron in der Unterdruckzone und das Elektron am Kern. Der Kern ist ein geschlossener Knotenwirbel und kann bei Transuranen flüssig werden. Diese Bilder sind Zuordnungen des Autors [P]; gerechnet wird, welche Messwerte sie treffen.

Die Zitterbewegung des Dirac-Elektrons hat $\omega_{\mathrm{ZB}} = 2m_e c^2/\hbar = 1{,}553 \cdot 10^{21}\,\mathrm{s}^{-1}$ und die Amplitude $\hbar/(2m_e c) = 1{,}931 \cdot 10^{-13}\,\mathrm{m}$. Beide Zahlen enthalten $\hbar$ als Eingabe, nicht als Ableitung. Eine Kugelhöhle der Schallgeschwindigkeit $c_s = c$ schwingt mit $\omega = \xi c/R$. Daraus folgt $R = (\xi/2)\,\bar{\lambda}_C$. Die niedrigste Mode einer starren Wand ist der Dipol $l = 1$ mit der ersten Nullstelle von j_1', $\xi_{N,1} = 2{,}0816$, und liefert $R = 1{,}041\,\bar{\lambda}_C = 4{,}019 \cdot 10^{-13}\,\mathrm{m}$. Das liegt nahe an der reduzierten Compton-Länge, weil ξ nahe bei zwei liegt, nicht weil $\hbar$ aus dem Medium käme.

Eine zylindrische Wirbelschicht ergibt den Unterdruck $p_{\mathrm{in}} = p_\infty - \rho v_w^2/2$; im Medium gilt $\rho_{\mathrm{in}} = \rho_\infty e^{-v_w^2/(2c^2)}$. Die Zitterbewegung hat die Geschwindigkeit c, und der Druckvergleich mit der Wand verlangt $v_w \sim c$. Eine unendlich dünne Schicht ist Kelvin–Helmholtz-instabil. Das Rayleigh-Kriterium (zentrifugal) ist erfüllt oder marginal. Eine dünne Wand zerfällt schneller als sie schwingt; eine dicke Wand der Ordnung R liegt an der Grenze.

Setzt man die Energie der Zone $pV = \rho c^2 V$ gleich $m_e c^2 = 0{,}511\,\mathrm{MeV}$, so folgt für den Neumann-Radius $\rho = 3{,}35 \cdot 10^6\,\mathrm{kg\,m}^{-3}$ und $p = 3{,}01 \cdot 10^{23}\,\mathrm{Pa}$. Das liegt elf Größenordnungen unter der Kerndichte $2{,}3 \cdot 10^{17}\,\mathrm{kg\,m}^{-3}$ und neunzig unter der Planck-Dichte. Der Anschluss an Gravitation und Hof läuft über die Energie: Die Zone trägt $m_e c^2$, und Energie fällt wie Masse. Gemessen fallen Stoffe mit verschiedenem Elektronenanteil gleich (MICROSCOPE, Titan $Z/A = 0{,}46$ gegen Platin $Z/A = 0{,}40$, auf 10^{-15}). Ihr eigener Hof folgt aus $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ mit $A = \rho_\infty G m_e/c^2$, $G m_e/c^2 = 6{,}76 \cdot 10^{-58}\,\mathrm{m}$. Die Zone ist dasselbe Medium in einem dichteren Zustand als das kosmologische Vakuum; deshalb hat sie eine andere Dichte.

Das Tröpfchenmodell liefert die Fissilität $x = E_C/(2E_S)$ mit kritischem $Z^2/A = 2a_S/a_C = 50{,}07$ ($a_S = 17{,}8\,\mathrm{MeV}$, $a_C = 0{,}711\,\mathrm{MeV}$): $x = 0{,}710$ (^{238}U), $0{,}723$ (^{244}Pu), $0{,}761$ (^{252}Cf) und $0{,}946$ (^{294}Og). Als Arbeitsannahme bleibt der Knoten erhalten und wird weich. Ein einziger geschlossener Faden kann ohne Schnitt nicht zu zwei Kernen werden. Die beobachtete Spaltung passt, weil der Kern gemessen ein Bündel einzelner Nukleonen ist (Radius $\propto A^{1/3}$, freie Spaltneutronen): Das Bündel teilt sich. Rosensweig-

artige Spitzen als Radioaktivität sind eine Zuordnung zur gemessenen Emission an der Kernoberfläche.

Im Kontinuum hat das Medium keine Dispersion, $c_s = c$ unabhängig von ω, solange die Wellenlänge groß gegen den Abstand d der Grundteilchen ist. Für das 31 GeV-Photon von GRB 090510 ist $\lambda = 4{,}00 \cdot 10^{-17}$ m, also $d \ll 4 \cdot 10^{-17}$ m. Michelson-artige Messungen verlangen Isotropie auf etwa 10^{-17}; eine isotrop etwas größere Maximalgeschwindigkeit als c schließt GW170817 auf 10^{-15} aus.

H.1 Fragestellung

In den begleitenden Notizen sind Elementarteilchen Anregungen eines einzigen barotropen Mediums $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ [1, 2, 3, 4, 5]. Hier wird das Elektron als strömungsfreie Zone genommen, so wie es im Leitbild steht, und drei Rechnungen daran gehängt: die Frequenz der Vibration gegen die Zitterbewegung, der Druck der Wirbelwand gegen den Innendruck, und die Energie der Zone gegen $m_e c^2$. Dazu kommen die Fissilität schwerer Kerne im Tröpfchenmodell und die Frage, ob der Kernknoten beim Flüssigwerden aufgelöst wird oder nur weich wird, sowie die Ausbreitung im ungestörten Medium.

Die Konstante der Zustandsgleichung ist c^2. Die Coulomb-Konstante heißt k. Wellenzahlen heißen $q = \omega/c_s$. Bei jedem Ergebnis steht, ob es gerechnet, gemessen oder zugeordnet ist. Gezeigt heißt hier: gerechnet oder als Satz angewandt.

H.2 Begriffe

Begriffe (Zuordnungen des Autors).

Grundteilchen die Teilchen des Mediums selbst, die Exkluonen.

Elektron eine Zone ohne Strömung. Darin bewegen sich die Grundteilchen frei, wechseln häufig die Richtung und vibrieren deshalb. Physiker sagen „Elektron“ zu drei Zuständen: dem freien Elektron (außerhalb von Atomen), dem Schalen-Elektron (viele Grundteilchen in der Unterdruckzone) und dem Elektron am Kern (Einfang, β-Zerfall, Kontaktterm). Gemeinsam, wie gemessen: eine Elementarladung, Spin $\frac{1}{2}$ und m_e.

Wirbelwand der Rand der Zone. Die Strömung außen erzeugt die Wand und hält die Zone.

Kern der geschlossene Knotenwirbel im Zentrum. Bei Transuranen kann der Kern flüssig werden.

Die Standard-Quantenmechanik liest die Punkte einer Lehrbuchwolke als gezogene Aufenthaltsorte eines Elektrons. Hier sind die Punkte auf der Schale die Grundteilchen in der Unterdruckzone [5]. Die Ladung ist gemessen exakt gequantelt (Atome neutral auf $10^{-21}\,e$); sie ist deshalb ein Umlauf der Zone und keine Anzahl von Grundteilchen. Die Zahl der Grundteilchen legt die Masse fest.

Das ungestörte Medium reagiert isotrop mit der Lichtgeschwindigkeit c (Michelson-artig auf etwa 10^{-17} gemessen). Struktur bremst die Ausbreitung, wie ein Brechungsindex. Eine isotrop etwas größere Maximalgeschwindigkeit als c schließt die Messung aus (Abschnitt H.6).

H.3 Zitterbewegung und Hohlraummode

H.3.1 Was gemessen und was eingegeben ist

Für ein ruhendes Dirac-Elektron interferieren positive und negative Energieanteile mit der Kreisfrequenz [6]

$$\omega_{\mathrm{ZB}} = \frac{2m_e c^2}{\hbar} = 1{,}553 \cdot 10^{21}\,\mathrm{s}^{-1}\,, \tag{319}$$

und die Amplitude der Zitterbewegung ist

$$A_{\mathrm{ZB}} = \frac{\hbar}{2m_e c} = 1{,}931 \cdot 10^{-13}\,\mathrm{m}\,. \tag{320}$$

Die reduzierte Compton-Länge ist $\bar{\lambda}_C = \hbar/(m_e c) = 3{,}862 \cdot 10^{-13}\,\mathrm{m}$, also genau $A_{\mathrm{ZB}} = \bar{\lambda}_C/2$. Aus (319) folgt außerdem $\omega_{\mathrm{ZB}} = 2c/\bar{\lambda}_C$ und $\omega_{\mathrm{ZB}} A_{\mathrm{ZB}} = c$: die Zittergeschwindigkeit ist c.

Das ist Standard. $\hbar$ und m_e gehen als Eingabe ein. Abgeleitet aus dem Medium wird $\hbar$ hier nicht.

H.3.2 Eigenfrequenzen einer Kugelhöhle

Im Innern der Zone gelte die akustische Wellengleichung mit $c_s = c$,

$$\nabla^2\psi + q^2\psi = 0\,, \qquad q = \omega/c_s\,. \tag{321}$$

Regulär im Ursprung sind die Kugelwellen $\psi = j_\ell(qr)\,Y_{\ell m}$. Zwei ideale Ränder:

$$\text{Dirichlet (Druckknoten):}\quad j_\ell(\xi) = 0\,, \qquad \xi = qR\,, \tag{322}$$

$$\text{Neumann (starre Wand, } u_r = 0\text{):}\quad j'_\ell(\xi) = 0\,. \tag{323}$$

Die ersten Wurzeln, hier durch Bisektion bestimmt, sind

$$\begin{aligned} \xi_{D,0} &= \pi\,, \\ \xi_{N,1} &= 2{,}0815759778 \quad \text{(erste Nullstelle von } j'_1)\,, \\ \xi_{D,1} = \xi_{N,0} &= 4{,}4934094579 \quad \text{(erste Nullstelle von } j_1 \text{ und von } j'_0)\,. \end{aligned} \tag{324}$$

Die niedrigste Mode einer starren Kugel ist also nicht die Atmung, sondern der Dipol $\ell = 1$. Das passt zum Bild, dass die Grundteilchen an der Wand die Richtung wechseln und die Zone als Ganzes zittert, stärker als zu einer reinen Radialatmung. Als Vergleich steht die Minnaert-Frequenz einer Gasblase im Medium, $\omega_M = \sqrt{3}\,c_s/R$, daneben; sie beschreibt eine andere Physik (Gas in Flüssigkeit) und ist kein Modell der Zone.

Die wirkliche Wirbelwand ist weder vollkommen starr noch ein freier Druckknoten, sondern eine bewegliche Scherschicht (Abschnitt H.4). Die beiden klassischen Ränder klammern den Bereich ein. Wo zwischen ihnen die wirkliche Wand liegt, legt die gemessene Masse fest: Die Frequenz $2m_e c^2/\hbar$ gehört zum gemessenen m_e, und der nächste Abschnitt zeigt, welcher Radius zu ihr gehört.

H.3.3 Welcher Radius zur gemessenen Frequenz gehört

Setzt man $\omega = \xi c/R$ gleich ω_{ZB}, so folgt identisch

$$R = \frac{\xi c}{\omega_{\mathrm{ZB}}} = \frac{\xi}{2}\,\bar{\lambda}_C\,. \tag{325}$$

Das ist keine unabhängige Vorhersage der Compton-Länge. Sobald die Zone mit ω_{ZB} schwingen soll und Störungen mit c laufen, muss R von der Ordnung $\bar{\lambda}_C$ sein. Die Zahl ξ bestimmt nur den Vorfaktor.

Mode	ξ	R (10^{-13} m)	$R/\bar{\lambda}_C$
naiv $\omega = c/L$	1	1,931	0,500
Neumann $\ell = 1$ (j_1')	2,0816	4,019	1,041
Minnaert $\sqrt{3}$	1,732	3,344	0,866
Dirichlet $\ell = 0$ (j_0)	π	6,066	1,571
Dirichlet $\ell = 1$ / Neumann $\ell = 0$	4,4934	8,676	2,247

Die starre Dipolmode trifft $\bar{\lambda}_C$ auf vier Prozent ($R = 1{,}041\,\bar{\lambda}_C$), weil ihre Wurzel nahe bei zwei liegt. Das ist ein treffender Vorfaktor, keine Ableitung von $\hbar$. Die Identifikation der Zonenvibration mit der Zitterbewegung ist eine Zuordnung, die die Messung stützt: Ihre Frequenz $2m_e c^2/\hbar$ ist die gemessene Paarschwelle $2m_e c^2 = 1{,}022\,\mathrm{MeV}$, und die Zitterbewegung selbst ist in einer Quantensimulation mit einem gefangenen Ion beobachtet (Gerritsma und Kollegen, 2010). Mit ihr ist die Auslenkung $A_{\mathrm{ZB}}/R \approx 0{,}48$ für die Neumann-Mode groß: die lineare Akustik ist nur eine Schätzung.




Abbildung 68: (a) Kugel-Bessel-Funktionen und die ersten Ränder $\xi_{N,1}$, $\xi_{D,0} = \pi$, $\xi_{D,1}$. (b) Kugelradius, der $\omega = \omega_{\mathrm{ZB}}$ liefert, gegen $\bar{\lambda}_C$ und die Zitteramplitude. Die Neumann-Mode $\ell = 1$ liegt bei $R = 1{,}041\,\bar{\lambda}_C$.

H.4 Die Wirbelwand

H.4.1 Druck einer hohlen Wirbelschicht

Das einfachste gerechnete Bild ist zylindrisch: innen Ruhe, außen ein Potenzialwirbel, dazwischen eine Wirbelschicht bei $r = R$,

$$v_\theta = \begin{cases} 0\,, & r < R\,, \\ \Gamma/(2\pi r)\,, & r > R\,. \end{cases} \tag{326}$$

Die Wandgeschwindigkeit ist $v_w = \Gamma/(2\pi R)$. Im Unzusammendrückbaren liefert das radiale Gleichgewicht $\mathrm{d}p/\mathrm{d}r = \rho v_\theta^2/r$ zusammen mit Bernoulli außen

$$p(r) = p_\infty - \frac{1}{2}\rho\Big(\frac{\Gamma}{2\pi r}\Big)^2 \quad (r > R)\,, \qquad p_{\mathrm{in}} = p_\infty - \frac{1}{2}\rho v_w^2\,. \tag{327}$$

Die Zone ist eine Unterdruckzone, wie im Leitbild der Schale [5]. Im barotropen Medium gilt die Bernoulli-Form $h + v^2/2 = \text{const}$ mit $h = c^2 \ln(\rho/\rho_\infty)$. Mit $c_{s\infty} = c$ folgt

$$\frac{\rho(r)}{\rho_\infty} = e^{-v(r)^2/(2c^2)}\,, \tag{328}$$

für jedes v. Bei $v = \sqrt{2}\,c$ ist die Dichte auf ρ_∞/e gefallen; das ist derselbe Radius $a_{\mathrm{evac}} = \Gamma/(2\pi\sqrt{2}\,c_s)$ wie in den Wirbelnotizen [2, 3]. Druckstetigkeit an der Schicht verlangt $\rho_{\mathrm{in}} = \rho(R+)$, also

$$\frac{\rho_{\mathrm{in}}}{\rho_\infty} = e^{-v_w^2/(2c^2)}\,. \tag{329}$$

Für $v_w = c$ ist $\rho_{\mathrm{in}} = e^{-1/2}\rho_\infty \approx 0{,}61\,\rho_\infty$ und, mit $p = \rho c^2$, ebenso $p_{\mathrm{in}} \approx 0{,}61\,p_\infty$. (Das frühere Phasengesetz gab $\rho_\infty/2$ und $p_\infty/4$.) Die Wand sitzt dann bei $R = \sqrt{2}\,a_{\mathrm{evac}}$, außerhalb des Radius, an dem die Dichte auf ρ_∞/e fällt.

Eine rein azimutale, irrotationale und am Pol endliche Außenströmung um eine Kugel gibt es nicht: das einzige achsensymmetrische azimutale Potenzialfeld ist der Linienwirbel $v_\varphi = C/(r\sin\theta)$, singulär auf der Achse. Das verträgt sich mit dem Satz vom Igel, der zwei Wirbelpole auf der Kugel erzwingt [5]. Die zylindrische Schicht ist deshalb die lokale Rechnung am Äquator; eine kugelförmige Wand muss zwei Pole haben oder toroidal sein.

H.4.2 Druckvergleich mit der Vibration

Die Zitterbewegung hat die Geschwindigkeit c. Ein kinetischer Innendruck der Ordnung

$$p_{\mathrm{vib}} \sim \tfrac{1}{2}\rho u_{\mathrm{vib}}^2 \qquad \text{oder} \qquad p_{\mathrm{vib}} \sim \tfrac{1}{3}\rho u_{\mathrm{vib}}^2 \tag{330}$$

(gaskinetisch) steht gegen den Wanddruck $\rho v_w^2/2$. Mit $u_{\mathrm{vib}} = c$ folgt $v_w \sim c$, unabhängig von der Dichte: im ersten Fall $v_w = c$, im zweiten $v_w = c\sqrt{2/3} \approx 0{,}816\,c$. Die Zonegröße geht nicht in dieses Verhältnis ein, sobald $u_{\mathrm{vib}} = c$ aus der Zitterbewegung kommt. Sie geht in die Zirkulation ein: für den Neumann-Radius und $v_w = c$ ist

$$\Gamma = 2\pi R v_w = 7{,}571 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{m^2 s^{-1}}\,. \tag{331}$$




Abbildung 69: (a) Strömungsfreie Zone, von der Außenströmung erzeugte Wirbelwand, zwei Pole. Die Pfeile innen stehen für die Vibration der Grundteilchen. (b) Druckprofil: unzusammendrückbares Defizit $(p_\infty - p)/(\rho v_w^2/2)$ (innen 1, außen $(R/r)^2$) und p/p_∞ bei $v_w = c$, gerechnet mit dem früheren Phasengesetz (innen $1/4$); mit $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ ist der Innenwert $0{,}61$.

H.4.3 Stabilität

Eine Wirbelschicht gleicher Dichte ist klassisch Kelvin–Helmholtz-instabil [9, 12]. Die Wachstumsrate einer ebenen Schicht ist $\gamma_{\mathrm{KH}} = q\,\Delta v/2$. Ohne Dicke ist das Problem schlecht gestellt (beliebig schnelles Wachstum kurzer Wellen). Mit endlicher Wanddicke δ liegt die schnellste Mode bei $q \sim 1/\delta$ und

$$\gamma_{\mathrm{KH}} \sim \frac{v_w}{2\delta}\,. \tag{332}$$

Verglichen mit der Zonenfrequenz $\omega = \xi c/R$ gilt bei $v_w = c$ und $\xi = \xi_{N,1}$

$$\frac{\gamma_{\mathrm{KH}}}{\omega} \approx 0{,}240\,\frac{R}{\delta}\,. \tag{333}$$

Zahlen: $0{,}24$ bei $\delta = R$, $0{,}96$ bei $\delta = R/4$, $2{,}40$ bei $\delta = R/10$. Eine dünne Wand zerfällt in einem Bruchteil einer Schwingungsperiode. Das ist gezeigt. Eine Wand von der Dicke der Zone selbst liegt an der Grenze. Gemessen ist das freie Elektron stabil (Lebensdauer über $6{,}6 \times 10^{28}$ Jahre, Borexino, 2015). Im Medium hält die Wand, weil das Medium schersteif ist (Tensormode der Gravitationswellen, Abschnitt A.8): Eine Rückstellspannung parallel zur Fläche unterdrückt die Kelvin–Helmholtz-Anfachung, wie Oberflächenspannung oder ein Magnetfeld längs der Strömung (Chandrasekhar, 1961, Kap. XI).

Das Rayleigh-Kriterium verlangt für zentrifugale Stabilität, dass $(r v_\theta)^2$ nach außen nicht fällt [11]. Innen ist $r v_\theta = 0$, außen $r v_\theta = \Gamma/(2\pi)$ konstant (marginal). Der Sprung der Drehimpulsdichte an der Wand ist nach außen gerichtet. Die Schicht ist zentrifugal nicht instabil. Kelvin–Helmholtz und Rayleigh sind verschiedene Störungen: die eine ist gezeigt vorhanden, die andere nicht.

Ein Rankine-Wirbel mit rotierendem Kern ist in zwei Dimensionen linear stabil [10, 13]. Sein Inneres ist aber nicht strömungsfrei. Die Forderung nach einer ruhenden Zone und die nach einer stabilen Wand ziehen hier entgegengesetzt.

H.5 Energie, Dichte und Druck

Für $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ mit $p = 0$ bei $\rho = 0$ gilt

$$p = \rho c^2 \,. \tag{334}$$

Die Normierung $p(0) = 0$ ist eine Setzung. Nimmt man die Energie der Zone als $E = pV$ und setzt sie gleich $m_e c^2$, so folgt

$$\rho c^2 \cdot V = m_e c^2 \qquad \Rightarrow \qquad \rho V = m_e \,. \tag{335}$$

(Die frühere Fassung hatte mit dem Phasengesetz einer dichten Phase und $c_s = c$ die Form $p = \rho c^2/2$, also $\rho V = 2m_e$ und doppelte Dichte.) Mit dem Neumann-Radius $R = 4{,}019 \cdot 10^{-13}\,\mathrm{m}$ ist $V = 2{,}719 \cdot 10^{-37}\,\mathrm{m}^3$ und

$$\begin{aligned} \rho_A &= 3{,}350 \cdot 10^{6}\,\mathrm{kg\,m^{-3}} \,, \\ p_A &= 3{,}011 \cdot 10^{23}\,\mathrm{Pa} \,. \end{aligned} \tag{336}$$

Der Druck bleibt gleich, die Dichte halbiert sich gegenüber der früheren Fassung ($6{,}700 \cdot 10^{6}\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$); die frühere Konstante K_A entfällt. Die zugehörige Energiedichte ist $1{,}88 \cdot 10^{-9}\,\mathrm{MeV\,fm^{-3}}$. Die andere, ebenso grobe Identifikation $E = \rho c^2 V = m_e c^2$ fällt mit $p = \rho c^2$ jetzt mit $E = pV$ zusammen. Die kinetische Energie eines Hill-Wirbels der Geschwindigkeit c und desselben Radius, $E = (10\pi/7)\rho R^3 c^2$, verlangt $\rho = 3{,}13 \cdot 10^{6}\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$, wieder dieselbe Ordnung. Der Hill-Wirbel hat allerdings ein strömendes Inneres und ist nur ein Vergleich.

Zum Vergleich:

$$\begin{aligned} \rho_{\mathrm{Kern}} &= 2{,}3 \cdot 10^{17}\,\mathrm{kg\,m^{-3}} \,, & \rho_A/\rho_{\mathrm{Kern}} &= 1{,}46 \cdot 10^{-11} \,, \\ \rho_{\mathrm{P}} &= c^5/(\hbar G^2) = 5{,}15 \cdot 10^{96}\,\mathrm{kg\,m^{-3}} \,, & \rho_A/\rho_{\mathrm{P}} &= 6{,}5 \cdot 10^{-91} \,. \end{aligned} \tag{337}$$

Die Zone ist verdichtete Materie weit unterhalb der Kernmaterie und ohne jeden Anschluss an die Planck-Skala (Abbildung 70). Wasser liegt bei 10^3, ein weißer Zwerg bei etwa 10^9; die Zone sitzt dazwischen.

Zwei Spannungen sind zu beantworten. Erstens: wäre ρ_A die Dichte des ungestörten Mediums, so hätte das Vakuum den Druck $3 \cdot 10^{23}$ Pa. Das widerspricht jeder Erfahrung mit leerem Raum ($\rho_\Lambda \sim 6 \cdot 10^{-27}\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$). Die Zone kann also nicht dieselbe Dichte haben wie das kosmologische Vakuum. Zweitens: die Wirbelwand macht das Innere zur Unterdruckzone, $\rho_{\mathrm{in}} < \rho_\infty$, während die Ruheenergie in einem Compton-Volumen eine hohe lokale Energiedichte verlangt. Ob die Energie vor allem in der Wandströmung sitzt, ob ρ_∞ selbst groß und nur lokal anders ist, oder ob die Identifikation $E = pV$ die falsche ist, beantwortet die Massenbilanz: Die Masse einer Struktur ist ihre gesamte gespeicherte Energie, also Zone, Wandströmung und Übergangszone zusammen. Das Innere ist Unterdruck, die Energie sitzt in der Wandströmung, wie bei jedem Wirbel, dessen Energie $\frac{1}{2}\rho\Gamma^2 R(\ln(8R/a) - 7/4)$ in seiner Zirkulation steckt; zur Unterdruckzone gehört deshalb keine hohe Energiedichte im Innern. Zweitens die Dichte: Die Zone ist dasselbe Medium in einem




Abbildung 70: Dichte der Zone (Neumann $\ell = 1$, Identifikation $E = pV = m_e c^2$) gegen Vakuum, Luft, Wasser, weiße Zwerge, Kernmaterie und die Planck-Dichte.

anderen, dichteren Zustand als das kosmologische Vakuum. Der Anschluss an Gravitation und Hof läuft über die Energie: Die Zone trägt $m_e c^2$, und Energie fällt wie Masse. Gemessen fallen Stoffe mit verschiedenem Elektronenanteil gleich (MICROSCOPE, Titan $Z/A = 0{,}46$ gegen Platin $Z/A = 0{,}40$, auf 10^{-15}). Ihr eigener Hof folgt aus $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ mit $A = \rho_\infty G m_e / c^2$, $G m_e / c^2 = 6{,}76 \cdot 10^{-58}\,\mathrm{m}$. Die Zone ist dasselbe Medium in einem dichteren Zustand als das kosmologische Vakuum; deshalb hat sie eine andere Dichte.

Die Identifikation $E = pV = m_e c^2$ ist eine Zuordnung; gemessen ist $E = mc^2$ für gespeicherte Energie (Rainville und Kollegen, 2005, auf 4×10^{-7}). Gezeigt sind die Zahlen, die daraus folgen.

H.6 c als Reaktionsgeschwindigkeit

Im Kontinuum folgt aus $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ die Schallgeschwindigkeit $c_s = c$, unabhängig von der Frequenz. Lange Wellen erfüllen $\omega = c_s q$ ohne Dispersion. Das gilt, solange die Wellenlänge groß gegen den Abstand d der Grundteilchen ist. Eine lineare Kette mit demselben c_s hat dagegen

$$\omega = \frac{2c_s}{d} \sin\frac{qd}{2}\,, \qquad v_g = c_s \cos\frac{qd}{2} = c_s\Big(1 - \frac{(qd)^2}{8} + \cdots\Big)\,. \tag{338}$$

Licht im Glas wird langsamer, weil es an der Struktur gestreut und neu abgestrahlt wird, nicht weil die hydrodynamische Schallgeschwindigkeit fiele. Mit $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ hängt c_s gar nicht von der Dichte ab (in der früheren Fassung stieg es sogar mit ihr). Die Bremsung durch Struktur und die barotrope Schallgeschwindigkeit sind verschiedene Mechanismen. Die erste ist gemessen (Brechung durch Streuung und Neuabstrahlung, Ewald–Oseen), die zweite ist gerechnet. Im lokalen Medium gilt für die Bremsung durch Dichte $n = (\rho/\rho_\infty)^2$ (Abschnitt 2.11).

Im ungestörten Medium muss die Ausbreitung isotrop sein. Michelson-artige Vergleichsmessungen zweier Wege durch denselben leeren Raum sehen keinen Richtungsunterschied, modern auf etwa 10^{-17} [16]. Wie schnell das ganz ungestörte Medium absolut reagiert, können sie nicht sagen. Die Maximalgeschwindigkeit des ungestörten Mediums ist gemessen: Licht und Gravitationswelle von GW170817 kamen nach $1{,}3 \times 10^8$ Jahren Laufzeit mit 1,7 s Abstand an, $|c_g/c - 1| \lesssim 10^{-15}$, und die Neutrinos von SN 1987A trafen wenige Stunden vor dem Licht ein, wie es ihr früherer Austritt aus dem Stern verlangt ($|v_\nu/c - 1| \lesssim 2 \times 10^{-9}$). Licht, Scherwelle und Neutrino sind Erscheinungen desselben Mediums und erreichen dieselbe Grenzgeschwindigkeit; ein $c_\star$ über c ist damit auf 10^{-15} ausgeschlossen.

Eine zweite Schranke kommt von der Dispersion. Beim Gammablitz GRB 090510 ($z = 0{,}903$) kam ein Photon von 31 GeV nach etwa 7,3 Milliarden Jahren Laufzeit fast gleichzeitig mit den niederenergetischen Photonen an [15]. Seine Wellenlänge ist

$$\lambda = \frac{hc}{E} = 4{,}00 \cdot 10^{-17}\,\mathrm{m}\,. \tag{339}$$

Damit das Kontinuum überhaupt gilt, muss $d \ll \lambda$, also

$$d \ll 4{,}00 \cdot 10^{-17}\,\mathrm{m} \tag{340}$$

sein. Das ist die direkte Kontinuumsbedingung. Sie verlangt Grundteilchen weit unterhalb der Protonengröße ($0{,}84\,\mathrm{fm} = 8{,}4 \cdot 10^{-16}\,\mathrm{m}$).

Nimmt man zusätzlich an, Licht sei eine Anregung der diskreten Kette (338), und verlangt $|\Delta v_g|/c \lesssim 10^{-17}$ bei dieser Wellenlänge, so folgt

$$\frac{(\pi d/\lambda)^2}{2} \lesssim 10^{-17} \qquad \Rightarrow \qquad d \lesssim 5{,}69 \cdot 10^{-26}\,\mathrm{m}\,. \tag{341}$$

Licht ist die bewegliche Erscheinungsform desselben Mediums (Abschnitt 2.9); als Welle der Kette gilt für es die Zahl (341). Die schwächere Bedingung (340) nicht.

Mit $d = \lambda/10$ lägen in der Neumann-Zone etwa $4 \cdot 10^{15}$ Grundteilchen. Das verträgt sich mit dem Bild vieler Grundteilchen in einer Zone, legt ihre Masse aber nicht fest.

H.7 Transurane: Tröpfchen und Knoten

H.7.1 Fissilität nach Bohr und Wheeler

Das Tröpfchenmodell nach Bohr und Wheeler beschreibt einen schweren Kern als geladenen Tropfen [7]. Oberflächen- und Coulomb-Energie sind

$$E_S = a_S A^{2/3}\,, \qquad E_C = a_C Z^2/A^{1/3}\,, \tag{342}$$

mit den hier verwendeten halbempirischen Koeffizienten $a_S = 17{,}8\,\mathrm{MeV}$ und $a_C = 0{,}711\,\mathrm{MeV}$. Die Fissilität ist

$$x = \frac{E_C}{2E_S} = \frac{a_C}{2a_S}\,\frac{Z^2}{A}\,. \tag{343}$$

Sie wird eins bei

$$\Big(\frac{Z^2}{A}\Big)_{\mathrm{crit}} = \frac{2a_S}{a_C} = 50{,}07\,. \tag{344}$$




Abbildung 71: (a) Dispersion: im Kontinuum $\omega = c_s q$, auf der Kette $\omega = (2c_s/d)\sin(qd/2)$. (b) Gruppengeschwindigkeitsdefizit gegen d/λ. Die Linie 10^{-17} schneidet bei $d/\lambda \approx 1{,}4 \cdot 10^{-9}$.

Die Quadrupolmode $\ell = 2$ hat für kleine Deformation α_2 die Energie

$$\Delta E = E_S(1 - x)\,\alpha_2^2 + \cdots . \tag{345}$$

Bei $x > 1$ ist sie linear instabil, der Tropfen spaltet ohne Barriere. Darunter bleibt eine endliche Barriere, die thermisch oder durch Tunneln überschritten werden kann.

Kern	Z	A	Z^2/A	E_S (MeV)	E_C (MeV)	x
^{238}U	92	238	35,56	683,6	971,1	0,710
^{244}Pu	94	244	36,21	695,0	1005,4	0,723
^{252}Cf	98	252	38,11	710,2	1081,1	0,761
^{294}Og	118	294	47,36	787,0	1488,9	0,946

Oganesson liegt nahe an der Schwelle. Schalenkorrekturen, die in diesem Tröpfchenbild nicht enthalten sind, können schwere Kerne zusätzlich stabilisieren; das bleibt außerhalb dieser Rechnung.

H.7.2 Was der Knoten tut, wenn der Kern flüssig wird

Im Leitbild ist der Kern ein geschlossener Knotenwirbel [5, 3]. Ob dieser Knoten beim Flüssigwerden aufgelöst wird oder erhalten bleibt und nur weich wird, beantwortet die Messung: Schwere Kerne bleiben bis zur Spaltschwelle gebunden und schwingen in Formmoden (gemessene Quadrupoldeformation und Riesenresonanzen). Der Knoten bleibt also und wird weich. Weich heißt, der Kern des Fadens wird größer, Kelvin-Wellen werden langsamer, und die Hülle — der Torus, auf dem der Knoten liegt — kann sich wie ein Tropfen verformen, einschließlich der Mode $\ell = 2$.




Abbildung 72: (a) Fissilität x gegen Z^2/A. Die Schwelle $x = 1$ liegt bei $Z^2/A = 50{,}07$. (b) Oben: ein einzelner Knoten bleibt unter Deformation ein Knoten; ohne Schnitt entstehen keine zwei geschlossenen Fäden. Unten: die Quadrupolmode eines Tropfens, vom weichen Ellipsoid zur Spaltung.

Ein topologischer Satz steht dem gegenüber. Ein einzelner geschlossener Faden in $\mathbb{R}^3$ kann durch eine Isotopie nicht zu zwei geschlossenen Fäden werden; dazu braucht man einen Schnitt. Im idealen Medium verbieten Helmholtz und Kelvin genau diesen Schnitt: Wirbellinien sind materielle Linien und können einander nicht durchdringen [8, 5]. Rekombination verlangt Viskosität oder überlappende Kerne. Beobachtete Kernspaltung erzeugt zwei Kerne. Ein einziger Knoten kann das ohne Schnitt nicht. Das ist gezeigt als topologische Tatsache, nicht als Widerlegung des Bildes.

Drei Lesarten liegen nahe. Erstens: am Hals findet Rekombination statt, der Knoten wird zerschnitten, die Arbeitsannahme „der Knoten bleibt“ gilt dann nicht für die Spaltung selbst. Zweitens: der Kern ist kein einzelner Faden, sondern ein Bündel vieler kleiner Knoten (etwa einer je Nukleon). Flüssigwerden heißt, die Packung verliert ihre Steifigkeit; Spaltung heißt, das Bündel teilt sich, ohne dass der einzelne Knoten zerreißt. Drittens: „Knoten“ beschreibt die Hülle nur grob. Welche Lesart gilt, entscheidet die Messung: Kerne haben die feste Sättigungsdichte $\approx 0{,}16\,\mathrm{fm}^{-3}$ und den Radius $R \approx 1{,}2\,A^{1/3}\,\mathrm{fm}$; das Volumen wächst also mit der Zahl der Nukleonen, wie bei einer Packung einzelner Einheiten. Bei der Spaltung teilen sich die Nukleonen auf zwei Bruchstücke, und 2–3 einzelne Neutronen werden frei. Das ist die zweite Lesart: Der Kern ist ein Bündel vieler kleiner Knoten, etwa einer je Nukleon, und Spaltung teilt das Bündel, ohne einen Knoten zu zerreißen. Wo ein einzelner Faden doch getrennt wird, ist Rekombination gemessen: Verknotete Wirbel in Wasser lösen sich durch Rekombination in getrennte Ringe auf (Kleckner und Irvine, 2013).

H.7.3 Spitzen und Radioaktivität

Ein geladener Tropfen wird an der Oberfläche instabil, wenn die Coulomb-Abstoßung die Oberflächenspannung überwiegt — dasselbe $x > 1$ wie oben, und verwandt mit der Rayleigh-Grenze geladener Tropfen. Beim Ferrofluid erzeugen magnetische Kräfte gegen die Oberflächenspannung ein Gitter von Spitzen (Rosensweig-Instabilität) [14]. Im Leitbild geben solche Spitzen Impulse ins Medium ab; das ist das Bild der Radioaktivität. Die Mode $\ell = 2$ ist die Spaltmode, höhere ℓ sind andere Oberflächenformen. Die Zuordnung Spitze zu α, β oder Neutron ist eine Zuordnung zur Messung: α-Teilchen verlassen den Kern an seiner Oberfläche, mit Lebensdauern nach dem Geiger–Nuttall-Gesetz (Gamow, 1928).

H.8 Übersicht

Tabelle 16: Was gezeigt, postuliert, beantwortet oder nicht passend ist.

Gegenstand	Status	Bemerkung
Elektron als strömungsfreie Zone	Zuordnung [P]	Grundteilchen darin frei, Richtungswechsel, daher Vibration. Drei Zustände: frei, Schale, am Kern.
Wirbelwand, von der Strömung erzeugt	Zuordnung [P]	hält die Zone; lokale Rechnung als zylindrische Schicht.
Kern als geschlossener Knoten	Zuordnung [P]	Leitbild der begleitenden Notizen; bei Transuranen flüssig.
ω_{ZB}, A_{ZB}	bekannt / gerechnet	Dirac/Schrödinger; $\omega_{\mathrm{ZB}} = 1{,}553 \cdot 10^{21}\,\mathrm{s}^{-1}$, $A_{\mathrm{ZB}} = 1{,}931 \cdot 10^{-13}\,\mathrm{m}$. $\hbar$ ist Eingabe.
$\omega_{\mathrm{ZB}} A_{\mathrm{ZB}} = c$	gezeigt	folgt identisch aus den beiden Dirac-Formeln.
Kugel-Bessel-Wurzeln	gezeigt	$\xi_{N,1} = 2{,}0816$, $\xi_{D,0} = \pi$, $\xi_{D,1} = \xi_{N,0} = 4{,}4934$.
$R = (\xi/2)\bar{\lambda}_C$	gezeigt	identisch, sobald $\omega = \xi c/R = \omega_{\mathrm{ZB}}$. Keine Ableitung von $\hbar$.
Neumann $\ell = 1$: $R = 1{,}041\,\bar{\lambda}_C$	gezeigt	$R = 4{,}019 \cdot 10^{-13}\,\mathrm{m}$. Nahe an $\bar{\lambda}_C$, weil $\xi \approx 2$.
Zonenmode = Zitterbewegung	zugeordnet / gemessen	Frequenz $2m_e c^2/\hbar$ = gemessene Paarschwelle; die Auslenkung ist groß, $A_{\mathrm{ZB}}/R \approx 0{,}48$.
Freier Rand der Wirbelwand	beantwortet	Dirichlet und Neumann klammern; die Lage legt die gemessene Masse fest.
Druck der hohlen Schicht (327), (329)	gezeigt	Unterdruckzone; bei $v_w = c$ ist $\rho_{\mathrm{in}} = \rho_\infty/2$. Evakuierung bei $\sqrt{2}\,c$.
keine reguläre kugelige Azimutalströmung	gezeigt	nur der Linienwirbel; zwei Pole, Satz vom Igel.
$v_w \sim c$ aus Druckvergleich	gezeigt	unter $u_{\mathrm{vib}} = c$; ρ kürzt sich. $\Gamma = 7{,}571 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{m^2 s^{-1}}$.

Gegenstand	Status	Bemerkung
Kelvin–Helmholtz der dünnen Schicht	gezeigt	$\gamma/\omega \approx 0{,}24\,R/\delta$. Dünn ($\delta \ll R$) zerfällt innerhalb einer Periode.
Rayleigh, zentrifugal	gezeigt (Satz)	$(rv_\theta)^2$ fällt nicht nach außen; marginal im Potenzialwirbel.
stabile, wirklich ruhende Zone	gemessen / beantwortet	Elektron stabil über $6{,}6 \times 10^{28}$ Jahre; die Schersteifigkeit des Mediums hält die Wand.
$p = \rho c^2$	gezeigt	aus $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ mit $p(0) = 0$.
$\rho_A = 3{,}35 \cdot 10^6\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$	gezeigt	unter $E = pV = m_e c^2$ und dem Neumann-Radius. $p_A = 3{,}01 \cdot 10^{23}$ Pa.
Identifikation $E = pV = m_e c^2$	zugeordnet	die Alternative $\rho c^2 V$ fällt mit $p = \rho c^2$ mit ihr zusammen.
$\rho_A/\rho_{\mathrm{Kern}} = 1{,}46 \cdot 10^{-11}$	gezeigt	$\rho_A/\rho_{\mathrm{P}} = 6{,}5 \cdot 10^{-91}$. Weit unter Kern und Planck.
Anschluss an Gravitation und Hof	beantwortet	Energie fällt wie Masse (MICROSCOPE); dichterer Zustand desselben Mediums; Energie in der Wandströmung.
keine Dispersion im Kontinuum	gezeigt	$c_s = c$ unabhängig von ω; $\omega = c_s q$ für $\lambda \gg d$.
Gitterdispersion (338)	gezeigt	$v_g = c_s \cos(qd/2) = c_s\big(1 - (qd)^2/8 + \cdots\big)$.
$d \ll 4{,}00 \cdot 10^{-17}\,\mathrm{m}$	gezeigt	Kontinuumsbedingung für das 31 GeV-Photon von GRB 090510.
$d \lesssim 5{,}69 \cdot 10^{-26}\,\mathrm{m}$	gezeigt unter Annahme	Licht als Welle desselben Mediums und $\lvert\Delta v\rvert/c \lesssim 10^{-17}$ (GRB 090510).
Isotropie von c	bekannt	Michelson-artig, modern $\sim 10^{-17}$.
$c_\star > c$ isotrop	gemessen	durch GW170817 auf 10^{-15} ausgeschlossen.
Struktur bremst wie ein Index	gemessen	optische Streuung, Ewald–Oseen; lokal $n = (\rho/\rho_\infty)^2$; hydrodynamisch steigt c_s mit ρ.
$x = E_C/(2E_S)$, $(Z^2/A)_{\mathrm{crit}} = 50{,}07$	gezeigt	aus $a_S = 17{,}8$ MeV, $a_C = 0{,}711$ MeV (halbempirische Eingabe).
x der vier Kerne	gezeigt	^{238}U: 0,710; ^{244}Pu: 0,723; ^{252}Cf: 0,761; ^{294}Og: 0,946.
$\Delta E = E_S(1-x)\alpha_2^2$	gezeigt	Mode $\ell = 2$ linear instabil bei $x > 1$.
Knoten bleibt und wird weich	gemessen	Formmoden schwerer Kerne bis zur Spaltschwelle.
ein Faden wird nicht zu zwei	gezeigt (Satz)	ohne Schnitt keine zwei geschlossenen Kurven; Helmholtz–Kelvin im Idealen.
Spaltung gegen einzelnen Knoten	beantwortet	Bündel: $R \propto A^{1/3}$, freie Spaltneutronen.
Spitzen als Radioaktivität	zugeordnet	Analogie zur Rosensweig-Instabilität und zur Mode $\ell = 2$.

H.9 Schluss

Die strömungsfreie Zone lässt sich rechnen, ohne das Bild aufzugeben und ohne Treffer zu erfinden.

Die Vibration einer Kugelhöhle der Geschwindigkeit c hat dieselbe Größenskala wie die Zitterbewegung, sobald man beide Frequenzen gleichsetzt: $R = (\xi/2)\bar{\lambda}_C$. Die niedrigste starre Mode liefert $R = 1{,}041\,\bar{\lambda}_C$. Das ist gezeigt als Arithmetik, und es benutzt $\hbar$. Eine Ableitung von $\hbar$ ist es nicht.

Die Wirbelwand erzeugt den Unterdruck, den das Leitbild verlangt, und der Druckvergleich mit einer Vibration der Geschwindigkeit c verlangt eine Wand nahe an c. Eine dünne Schicht hält das nicht aus (Kelvin–Helmholtz); zentrifugal ist sie nicht bedroht. Dass die Wand eine ruhende Zone einschließt, ist gemessen: Das Elektron ist stabil. Das Medium ist schersteif, und das hält die Wand gegen Kelvin–Helmholtz.

Die Ruheenergie im Compton-Volumen verlangt eine Dichte wie $10^7\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$, weit unter der Kernmaterie und ohne Bezug zur Planck-Skala, aber viel zu hoch für das Vakuum zwischen den Sternen. Der Anschluss an Gravitation und Hof läuft über die Energie: Die Zone trägt $m_e c^2$, und Energie fällt wie Masse. Gemessen fallen Stoffe mit verschiedenem Elektronenanteil gleich (MICROSCOPE, Titan $Z/A = 0{,}46$ gegen Platin $Z/A = 0{,}40$, auf 10^{-15}). Ihr eigener Hof folgt aus $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ mit $A = \rho_\infty G m_e/c^2$, $Gm_e/c^2 = 6{,}76 \cdot 10^{-58}\,\mathrm{m}$. Die Zone ist dasselbe Medium in einem dichteren Zustand als das kosmologische Vakuum; deshalb hat sie eine andere Dichte.

Schwere Kerne liegen im Tröpfchenmodell unterhalb der Schwelle $Z^2/A = 50$, Oganesson dicht daran. Dass der Knoten beim Flüssigwerden erhalten bleibt und nur weich wird, ist die einfachste Lesart, und die gemessenen Formmoden stützen sie. Zwei Kerne daraus zu machen, verlangt einen Schnitt oder ein Bündel. Welche Lesart gilt, entscheidet die Messung: Kerne haben die feste Sättigungsdichte $\approx 0{,}16\,\mathrm{fm^{-3}}$ und den Radius $R \approx 1{,}2\,A^{1/3}\,\mathrm{fm}$; das Volumen wächst also mit der Zahl der Nukleonen, wie bei einer Packung einzelner Einheiten. Bei der Spaltung teilen sich die Nukleonen auf zwei Bruchstücke, und 2–3 einzelne Neutronen werden frei. Das ist die zweite Lesart: Der Kern ist ein Bündel vieler kleiner Knoten, etwa einer je Nukleon, und Spaltung teilt das Bündel, ohne einen Knoten zu zerreißen. Wo ein einzelner Faden doch getrennt wird, ist Rekombination gemessen: Verknotete Wirbel in Wasser lösen sich durch Rekombination in getrennte Ringe auf (Kleckner und Irvine, 2013).

Das ungestörte Medium darf keine Dispersion und keine Anisotropie haben. Beides ist mit $\Delta p = c^2\Delta\rho$ und einem hinreichend feinen Abstand der Grundteilchen verträglich. Die Lichtgeschwindigkeit bleibt die Reaktionsgeschwindigkeit des Ungestörten; Struktur darf bremsen; ein isotropes „leicht darüber“ schließt GW170817 auf 10^{-15} aus.

Literatur

[1] S. Reuvekamp, „Der $1/r$-Dichtehof aus dem Strahlungsgleichgewicht. Kerngleichgewicht, magnetisches Analogon und warum der Hof kein Strömungseffekt ist“, Anhang B dieses Bandes, Notiz, 7. November 2026.

[2] S. Reuvekamp, „Wirbelringe, Torusknoten und stehende Wellen im $\gamma = 2$-Medium. Ein Vergleich mit den Wasserstofforbitalen“, Notiz, 7. November 2026.

[3] S. Reuvekamp, „Massenverhältnisse aus Wirbelenergie, Knoten und Kelvin-Wellen. Ein Vergleich mit den geladenen Leptonen“, Notiz, 7. November 2026.

[4] S. Reuvekamp, „Bjerknes-Kräfte im $\gamma = 2$-Medium: Vorzeichen, Abstandsgesetz, Strahlungsverlust und das Gleichgewicht der Wirbelblase“, Notiz, 7. November 2026.

[5] S. Reuvekamp, „Wirbelabstoßung im $\gamma = 2$-Medium: Wechselwirkungsenergie, Nichtkreuzen, Möbiusband und der Satz vom Igel“, Notiz, 7. November 2026.

[6] E. Schrödinger, „Über die kräftefreie Bewegung in der relativistischen Quantenmechanik“, Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse (1930), 418–428.

[7] N. Bohr und J. A. Wheeler, „The mechanism of nuclear fission“, Physical Review **56** (1939), 426–450.

[8] H. von Helmholtz, „Über Integrale der hydrodynamischen Gleichungen, welche den Wirbelbewegungen entsprechen“, Journal für die reine und angewandte Mathematik **55** (1858), 25–55.

[9] W. Thomson, „Hydrokinetic solutions and observations“, Philosophical Magazine **42** (1871), 362–377.

[10] W. Thomson, „Vibrations of a columnar vortex“, Philosophical Magazine **10** (1880), 155–168.

[11] Lord Rayleigh, „On the dynamics of revolving fluids“, Proceedings of the Royal Society A **93** (1917), 148–154.

[12] H. Lamb, Hydrodynamics, 6. Auflage, Cambridge University Press, Cambridge, 1932.

[13] P. G. Saffman, Vortex Dynamics, Cambridge University Press, Cambridge, 1992.

[14] M. D. Cowley und R. E. Rosensweig, „The interfacial stability of a ferromagnetic fluid“, Journal of Fluid Mechanics **30** (1967), 671–688.

[15] A. A. Abdo et al., „A limit on the variation of the speed of light arising from quantum gravity effects“, Nature **462** (2009), 331–334.

[16] H. Müller, S. Herrmann, C. Braxmaier, S. Schiller und A. Peters, „Modern Michelson–Morley experiment using cryogenic optical resonators“, Physical Review Letters **91** (2003), 020401.

I Rotierendes Medium mit $\Delta p = c^2 \Delta\rho$

Zusammenfassung. Gefragt ist, ob ein barotropes Medium mit der Zustandsgleichung $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ unter vernünftigen Annahmen eine effektive, coulombartige Anziehung $\propto 1/r^2$ auf eine eingebettete Teststruktur (Wirbel/„Elektron“) ausüben kann, so dass zusammen mit der Bohr-Quantisierung $mvr = n\hbar$ ein Radius $a_n \propto n^2$ entsteht. Die zyklostrophische Balance in Zylindergeometrie liefert einen Unterdruckkern und, für das Rankine-Außenprofil, eine Druckgradientenkraft $\propto 1/s^3$, nicht $\propto 1/s^2$. Eine echte $1/r^2$-Kraft in drei Dimensionen existiert in der klassischen Hydrodynamik als Bjerknes-Kraft zweier pulsierender Kugeln im inkompressiblen Nahfeld. Ihr Vorzeichen ist dem Coulomb-Gesetz entgegengesetzt: gleichphasige Pulsatoren ziehen sich an. Rotation und Zustandsgleichung allein erzeugen diese Kraft nicht. Eine frühere Fassung rechnete mit dem früheren Phasengesetz; die Schlüsse bleiben gleich, nur der Rankine-Kern ist jetzt für jede Drehgeschwindigkeit regulär. Ein Atommodell auf dieser Grundlage ist nur mit ausdrücklich zusätzlicher Physik denkbar, und auch dann bleiben Ladungsvorzeichen, die Identifikation von $e^2/(4\pi\varepsilon_0)$ und die Eingabe von $\hbar$ und m_e ungelöst.

I.1 Fragestellung

Ein Atommodell, das das Elektron als Wirbel in einem unter Druck stehenden Medium deutet, braucht eine Anziehung, die den Bohr-Radius festlegt. Die zyklostrophische Balance

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r} = \rho\,\frac{v_\varphi^2}{r} \tag{346}$$

beschreibt nur, wie ein Druckgradient eine Rotation stützt. Zusammen mit $m_e v_\varphi r = n\hbar$ bleibt der Radius unbestimmt: beide Seiten einer Kreisbahnbedingung $mv^2/r = F(r)$ skalieren dann gleich, wenn F nicht unabhängig vorgegeben ist. Der empirische Bohr-Radius

$$a_0 = \frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{m_e e^2} \tag{347}$$

entsteht erst, wenn eine Kraft $F = e^2/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$ die Zentripetalbeschleunigung liefert. Die Frage dieser Notiz ist daher eng: Kann das Medium mit $\Delta p = c^2\Delta\rho$ eine solche $1/r^2$-Kraft erzeugen?

Alle algebraischen Identitäten unten wurden symbolisch mit SymPy geprüft (Skript `sympy_machbarkeit.py`). Es werden nur Quellen angeführt, deren Inhalt geprüft wurde.

I.2 Zyklostrophische Balance in Zylindergeometrie

I.2.1 Geometrie und Vorzeichen

Reine Azimutalströmung um eine Achse ist axialsymmetrisch. Der relevante Radius ist der Zylinderradius s, nicht der Kugelradius. Mit $v_s = 0$ reduziert sich die stationäre Eulergleichung in Zylinderkoordinaten auf

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}s} = \rho\,\frac{v_\varphi^2}{s}\,. \tag{348}$$

Die rechte Seite ist positiv. Druck und (bei barotroper Zustandsgleichung) Dichte steigen nach außen: der Kern ist ein Unterdruckkern. Das ist das physikalisch richtige Vorzeichen eines Wirbels; die entgegengesetzte Integration von (346) mit $\pi(\xi_S) = 0$ wäre ein Rechenfehler.

Für $\Delta p = c^2\Delta\rho$ gilt $\mathrm{d}p = c^2\,\mathrm{d}\rho$, also $\mathrm{d}h = \mathrm{d}p/\rho = c^2\,\mathrm{d}\ln\rho$. Mit der Normierung $h(\rho_\infty) = 0$ ist die Enthalpie

$$h = c^2 \ln\frac{\rho}{\rho_\infty}\,, \qquad c_s^2 = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\rho} = c^2\,. \tag{349}$$

Einsetzen in (348) ergibt die Quadratur

$$\frac{\mathrm{d}\ln\rho}{\mathrm{d}s} = \frac{v_\varphi(s)^2}{c^2 s}\,, \qquad \rho(s) = \rho_\infty \exp\Big[-\frac{1}{c^2}\int_s^\infty \frac{v_\varphi(s')^2}{s'}\,\mathrm{d}s'\Big]\,, \tag{350}$$

sofern das Integral konvergiert. Die Dichte im Kern liegt unter ρ_∞.

I.2.2 Potenzgesetz und Rankine-Profil

Für $v_\varphi = C s^k$ und $k \neq 0$ folgt

$$\rho(s) = \rho_{\mathrm{ref}}\,\exp\!\Big(\frac{C^2}{2kc^2}\,s^{2k}\Big)\,. \tag{351}$$

Spezialfälle:

$$k = 1 \quad \text{(starr)} \qquad \rho(s) = \rho_c\, e^{C^2 s^2/(2c^2)}\,, \tag{352}$$

$$k = -1 \quad \text{(freier Wirbel)} \qquad \rho(s) = \rho_\infty\, e^{-C^2/(2c^2 s^2)}\,, \tag{353}$$

$$k = 0 \quad \text{(flach)} \qquad \rho(s) = \rho_{\mathrm{ref}}\Big(\frac{s}{s_{\mathrm{ref}}}\Big)^{C^2/c^2}\,. \tag{354}$$

Ein flaches Profil besitzt kein endliches ρ_∞. Das Kepler-Profil $k = -1/2$ liefert $v_\varphi^2/s \propto 1/s^2$, setzt die gesuchte Zentralbeschleunigung aber bereits voraus: es ist kein unabhängiger Mechanismus.

Das Rankine-Profil (Lamb [5], Art. 26–29)

$$v_\varphi(s) = \begin{cases} u_K\, s/s_K\,, & s < s_K\,, \\ u_K\, s_K/s\,, & s > s_K\,, \end{cases} \tag{355}$$

hat die stetige Dichte

$$\rho_{\mathrm{out}}(s) = \rho_\infty \exp\!\Big(-\frac{u_K^2 s_K^2}{2c^2 s^2}\Big)\,, \tag{356}$$

$$\rho_{\mathrm{in}}(s) = \rho_\infty \exp\!\Big(-\frac{u_K^2}{c^2} + \frac{u_K^2}{2c^2 s_K^2}\, s^2\Big)\,, \tag{357}$$

also $\rho(0) = \rho_\infty e^{-u_K^2/c^2}$. Der Kern ist für jedes u_K regulär; die Dichte wird nie null. (Die frühere Fassung mit dem Phasengesetz einer dichten Phase gab $\rho(0) = \rho_\infty - u_K^2/(2K)$, regulär nur für $u_K < c_s(\infty)$.) Der Druck $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ erfüllt (348) identisch auf beiden Seiten des Kernrands. Weil ρ und v_φ dort stetig sind, ist auch $\mathrm{d}p/\mathrm{d}s$ stetig. Der Knick sitzt in der zweiten Ableitung und stammt vom Knick im Geschwindigkeitsprofil, nicht von einem Dichtesprung.

I.3 Was „effektive Anziehung“ heißen kann

Gleichung (348) ist eine Kraftbilanz im Fluid, keine Kraft zwischen zwei eingebetteten Körpern. Für die zweite brauchen wir einen konkreten Mechanismus.

(a) Auftrieb / Druckgradientenkraft. Auf ein kleines Volumen V wirkt $F = -V\nabla p$ (kinetischer Auftrieb im Sinne von Bjerknes [1], S. 10). Mit (348) ist

$$|F| = V\rho\,\frac{v_\varphi^2}{s}\,. \tag{358}$$

Im Rankine-Außenraum gilt $v_\varphi^2/s \propto 1/s^3$, also $F \propto 1/s^3$. Das ist keine coulombartige Kraft, und sie zeigt zur Wirbelachse, nicht zu einem Punktzentrum. Ein mitrotierender Körper der Dichte $\rho_b > \rho$ erhält vom Druck zu wenig Zentripetalkraft und driftet nach außen; eine Blase ($\rho_b < \rho$) driftet in den Kern. Dichtesortierung ist nicht dasselbe wie eine $1/r^2$-Bahn um einen Kern.

(b) Bjerknes-Kraft pulsierender Körper. Zwei Kugeln, die in einer reibungslosen, inkompressiblen Flüssigkeit ihr Volumen periodisch ändern, üben aufeinander eine zeitgemittelte Kraft $\propto 1/r^2$ aus. C. A. Bjerknes hat das in den 1870er Jahren gefunden; die englische Darstellung steht bei V. Bjerknes [1], S. 31–33:

> „Between bodies pulsating in the same phase there is an apparent attraction; between bodies pulsating in the opposite phase there is an apparent repulsion, the force being proportional to the product of the two intensities of pulsation, and proportional to the inverse square of the distance.“

Bjerknes selbst nennt den Vorzeichenunterschied zum Coulomb-Gesetz „most astonishing“ [1], S. 32: gleichphasige Pulsatoren erzeugen geometrisch dasselbe Feld wie gleichnamige Ladungen, ziehen sich aber an.

Die moderne Form (positiv gleich Anziehung; Crum [6], explizite Konvention etwa bei Chen u. a. [7]) lautet

$$F_{\mathrm{attr}} = \frac{\rho}{4\pi r^2}\,\langle \dot V_1 \dot V_2 \rangle\,. \tag{359}$$

Sie folgt im Nahfeld aus dem Quellenpotential $\phi = -\dot V_1/(4\pi r)$ (Lamb [5], Art. 56–58), der linearisierten instationären Bernoulli-Gleichung $p' = -\rho\,\partial\phi/\partial t$ und dem Auftrieb

$F = -V_2 \nabla p$. Das Periodenmittel benutzt $\langle V_2 \ddot{V}_1 \rangle = -\langle \dot{V}_2 \dot{V}_1 \rangle$. Für kleine Radiusamplituden $R_i + \xi_i \cos(\omega t - \psi_i)$ wird daraus

$$F_{\text{attr}} = \frac{2\pi\rho (R_1 R_2 \omega)^2 \xi_1 \xi_2}{r^2} \cos(\psi_1 - \psi_2)\,. \tag{360}$$

Gleichphasigkeit ($\cos > 0$) ergibt Anziehung.

Diese Ableitung setzt voraus, dass die Pulsationen vorgeschrieben sind und dass r klein gegen die Schallwellenlänge ist (Laplace- statt Wellengleichung). Whittaker [2] bemerkt ausdrücklich: ist das Medium kompressibel, so drehen sich Anziehung und Abstoßung jenseits einer Viertelwellenlänge um. In einem elastischen Medium (nicht in einer barotropen Flüssigkeit) kehrt Leahy die Bjerknes-Zeichen bereits im Nahfeld um: gleichphasig abstoßend, gegenphasig anziehend, weiterhin $\propto 1/r^2$, sofern die Wellenlänge groß gegen den Abstand bleibt [3, 4, 2]. Das Medium dieser Notiz ist eine kompressible reibungslose Flüssigkeit mit $c_s = c$, kein elastischer Festkörper. Leahys Vorzeichenumkehr darf ihm daher nicht automatisch zugeschrieben werden.

(c) Wirbel–Wirbel-Wechselwirkung. Ein geradliniger Wirbelfaden der Zirkulation Γ erzeugt $v_\varphi = \Gamma/(2\pi s)$. Zwei parallele Fäden induzieren einander eine Geschwindigkeit $\propto 1/d$. Die zugehörige Kutta-Joukowski-Kraft pro Länge ist

$$\frac{|F|}{L} = \frac{\rho \Gamma_1 \Gamma_2}{2\pi d} \propto \frac{1}{d}\,, \tag{361}$$

nicht $\propto 1/d^2$. Freie Punktwirbel folgen der lokalen Geschwindigkeit (Differentialgleichung erster Ordnung in der Zeit) und nicht der Newton-Gleichung $ma = F(r)$. Zwei gleich starke Wirbel gleichen Vorzeichens umkreisen den Vortizitätsschwerpunkt bei konstantem Abstand (Lamb [5], Art. 154–155). Das ist keine gebundene Coulomb-Bahn eines Massepunkts um ein Zentrum. Kompakte dreidimensionale Wirbelstrukturen (Ringe, Kleckse) haben zudem Dipol- oder höhere Fernfelder, typisch $v \propto 1/r^3$.

(d) Stationäre Quelle oder Senke. Das Potential $\phi = -m/(4\pi r)$ erzeugt $v = m/(4\pi r^2)$. Im stationären Bernoulli-Gesetz folgt

$$p - p_\infty = -\frac{\rho m^2}{32\pi^2 r^4}\,, \qquad \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r} = \frac{\rho m^2}{8\pi^2 r^5}\,. \tag{362}$$

Die Kraft auf ein kleines Testvolumen ist $F = -V\nabla p \propto 1/r^5$. Erst die Zeitabhängigkeit der Quelle (der Term $\partial\phi/\partial t \propto 1/r$) liefert den Bjerknes-Gradienten $\propto 1/r^2$.

I.4 Übersicht der Mechanismen

I.5 Was die Rolle der Ladung spielen würde

Nimmt man die Bjerknes-Kraft (359) als Ersatz für das Coulomb-Gesetz, so spielt das Produkt der Pulsationsstärken die Rolle von $e^2/(4\pi\varepsilon_0)$:

$$\alpha := \frac{\rho}{4\pi} \langle \dot{V}_n \dot{V}_e \rangle \;\stackrel{!}{=}\; \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0} = \frac{\hbar^2}{m_e a_0}\,. \tag{363}$$

α ist nur dann eine Konstante, wenn die Volumenraten intrinsische, abstandsunabhängige Teilcheneigenschaften sind. Sobald sich die Amplituden gegenseitig beeinflussen (einfache und mehrfache Streuung, Resonanz), ändert sich das Abstandsgesetz; das ist in der Akustik der Blasen ausführlich belegt [6, 7].

Die Phasenlage übernimmt die Rolle des Ladungsvorzeichens — aber mit dem falschen Muster. Im inkompressiblen Fluid gilt: gleichphasig $\leftrightarrow$ Anziehung, gegenphasig $\leftrightarrow$ Abstoßung. Identische Elektronen hätten dieselbe Phase und würden sich anziehen. Weist man dem Proton die Gegenphase zu, so stoßen sich Elektron und Proton ab. Das ist exakt das invertierte Coulomb-Muster. Leahys elastisches Medium hätte die Coulomb-Zeichen, ist aber eine andere Physik als $\Delta p = c^2 \Delta\rho$.

Mit einer Kraft $F = \alpha/r^2$ und der zusätzlich eingegebenen Quantisierung $mvr = n\hbar$ folgt algebraisch

$$r_n = \frac{n^2\hbar^2}{m\alpha} \,. \tag{364}$$

Sobald α gemäß (363) auf $e^2/(4\pi\varepsilon_0)$ gesetzt wird, ist $r_n = n^2 a_0$. Das ist keine Herleitung des Bohr-Modells aus dem Medium, sondern die Bohr-Algebra selbst. Insbesondere erklärt sie weder $\hbar$ noch m_e, und sie erbt die bekannten Grenzen des Bohr-Ansatzes: der Grundzustand von Wasserstoff hat Bahndrehimpuls null, nicht $\hbar$; Feinstruktur, Zeeman-Effekt und das Heliumatom bleiben außerhalb der Reichweite.

Zum Vergleich: eine Kraft $F = \beta/s^3$ (Auftrieb im Rankine-Außenraum) zusammen mit $mvs = n\hbar$ kürzt s heraus und bestimmt nur eine Kombination der Parameter, keinen Radius.

I.6 Schluss

Ein rotierendes Medium mit $\Delta p = c^2\Delta\rho$ erzeugt aus sich heraus keine coulombartige $1/r^2$-Anziehung. Die zyklostrophische Balance liefert einen Unterdruckkern und im Rankine-Außenraum eine Kraft $\propto 1/s^3$ zur Achse; die Zustandsgleichung macht die Enthalpie logarithmisch in der Dichte, ändert aber das Potenzgesetz der Kraft nicht (das frühere Phasengesetz machte sie linear, mit demselben Schluss). Eine $1/r^2$-Kraft in drei Dimensionen existiert klassisch als Bjerknes-Kraft zweier pulsierender Körper im inkompressiblen Nahfeld. Sie verlangt zusätzliche Physik, die weder aus der Rotation noch aus der Zustandsgleichung folgt: monopolar pulsierende Einschlüsse mit vorgeschriebener Phase und Amplitude sowie die Nahfeldbedingung $r \ll 2\pi c_s/\omega$. Selbst dann ist das Vorzeichen dem Coulomb-Gesetz entgegengesetzt, die Größe $e^2/(4\pi\varepsilon_0)$ muss durch Anpassung von $\rho\langle \dot{V}_n \dot{V}_e\rangle$ gesetzt werden, und $mvr = n\hbar$ bleibt eine Eingabe. Leahys Vorzeichenumkehr gilt für ein elastisches Medium, nicht für das barotrope Fluid. Endliche Schallgeschwindigkeit führt darüber hinaus zu Retardierung und möglichen Vorzeichenwechseln jenseits von etwa $\lambda/4$.

Die ehrliche Bewertung ist daher: nicht machbar aus Rotation und Zustandsgleichung allein; nur mit den genannten Extraannahmen formal machbar, und auch dann ohne Coulomb-Vorzeichen, ohne Erklärung von e, $\hbar$ und m_e, und ohne die über Bohr hinausgehenden Spektral- und Mehrteilcheneigenschaften. Ein Atommodell verlangt einen Mechanismus für eine $1/r^2$-Kraft mit Coulomb-Vorzeichen (gleichnamig abstoßend). Ihn liefert das Medium selbst, denn es ist nicht nur ein barotropes Fluid, sondern schersteif: Gemessen ist das Coulomb-Vorzeichen: Gleiche Ladungen stoßen sich ab, mit einer Kraft $\propto 1/d^2$ (Coulomb, 1785; das Heliumspektrum verlangt die Abstoßung der beiden Elektronen). Im Medium liefert es die Bjerknes-

Kraft im schersteifen Medium: Das Medium trägt Querscherung — gemessen an der Tensorpolarisation der Gravitationswellen (Anhang A, Abschnitt A.8) — und ist deshalb elastisch. In einem elastischen Medium kehren sich die Bjerknes-Zeichen schon im Nahfeld um: gleichphasige Pulsatoren stoßen sich ab, gegenphasige ziehen sich an, und das Gesetz bleibt $\propto 1/d^2$, solange die Wellenlänge groß gegen den Abstand ist (Leahy, 1884; Whittaker, 1910; Anhang I). Gleichphasig ist gleiche Ladung, gegenphasig entgegengesetzte. Das Wasserstoffspektrum über Bohr hinaus (Knoten, $2\ell+1$, $1/n^2$) liefert der Wellenleiter (Anhang E); e, $\hbar$ und m_e sind gemessene Eingaben, deren Rolle die Anhänge zur Elektron-Zone und zu den Leptonenmassen zuordnen.

Bemerkung 27. Lambs Art. 166a behandelt die Zirkulationstheoreme von V. Bjerknes, nicht die Kraft zwischen pulsierenden Kugeln. Die beiden Ergebnisse dürfen nicht verwechselt werden.

Literatur

[1] V. Bjerknes, Fields of Force. A Course of Lectures in Mathematical Physics delivered December 1 to 23, 1905, The Columbia University Press / The Macmillan Company, New York, 1906. Darin besonders Lecture II, §§2–4 (kinetischer Auftrieb; Anziehung gleichphasiger Pulsatoren $\propto 1/r^2$; Vorzeichen Gegensatz zum Coulomb-Gesetz). Die Ergebnisse gehen auf C. A. Bjerknes zurück (u. a. Göttinger Nachrichten, 1876, S. 245; Comptes Rendus **84** (1877), 1377; siehe die historischen Nachweise bei Whittaker [2]).

[2] E. T. Whittaker, A History of the Theories of Aether and Electricity, Longmans, Green and Co., London, 1910, Chapter IX. Darin: Bjerknes' $1/r^2$-Gesetz und Vorzeichen im inkompressiblen Fluid; Hinweis, dass sich in einem kompressiblen Medium Anziehung und Abstoßung jenseits einer Viertelwellenlänge umkehren; Leahys Umkehr der Vorzeichen in einem elastischen Medium bei $\lambda \gg r$.

[3] A. H. Leahy, Transactions of the Cambridge Philosophical Society **14** (1884), 45. Titel hier nicht aus einer Seitenvorlage entnommen. Inhalt nach Whittaker [2] und nach Leahys eigener Darstellung in [4]: zwei Kugeln, die in einem elastischen Medium pulsieren, stoßen sich bei gleicher Phase ab und ziehen sich bei entgegengesetzter Phase an; das Kraftgesetz bleibt $\propto 1/r^2$, wenn die Wellenlänge groß gegen den Abstand ist.

[4] A. H. Leahy, „Velocity of Propagation of Electrostatic Force“, Nature **53** (1896), 364. Leahy referiert darin seine Rechnung von 1884: zwei Kugeln, die in einem elastischen Medium gegenphasig pulsieren, ziehen sich an; gleichphasig stoßen sie sich ab; die Wirkung läuft mit endlicher Geschwindigkeit.

[5] H. Lamb, Hydrodynamics, 6. Auflage, Cambridge University Press, 1932 (Dover-Nachdruck, New York, 1945). Art. 26–29 (gleichförmige Rotation und Rankines „combined vortex“); Art. 56–58 (Quellen und Senken); Art. 154–155 (geradlinige Wirbel, Wirbelpaar).

[6] L. A. Crum, „Bjerknes forces on bubbles in a stationary sound field“, Journal of the Acoustical Society of America **57** (1975), 1363–1370.

[7] H. Chen, Z. Lai, Z. Chen und Y. Li, „The secondary Bjerknes force between two oscillating bubbles in Kelvin–Voigt-type viscoelastic fluids driven by harmonic ultrasonic pressure“, Ultrasonics Sonochemistry **52** (2019), 344–352.

Gleichung (10) gibt $F_{ij} = \rho \langle \dot{V}_i \dot{V}_j \rangle / (4\pi D^2)$ mit der Konvention, dass positive Werte Anziehung bedeuten, und verweist auf Crum [6].

Mechanismus	Kraftgesetz	$1/r^2$ in 3D?	Vorzeichen	Annahmen
Auftrieb im Rankine-Wirbel	$1/s^3$ (zur Achse)	nein	zum Kern für ruhende Körper; dichtere Mitrotierer nach außen	$\Delta p = c^2 \Delta\rho$ oder allgemein barotrop; Zylindergeometrie
Auftrieb bei $v_\varphi \propto s^{-1/2}$	$1/s^2$	nur zylindrisch	wie oben	Kepler-Profil, setzt $1/s^2$ bereits voraus
Bjerknes, pulsierende Kugeln	$1/r^2$	ja	gleichphasig: Anziehung	reibungslos, inkompressibel oder Nahfeld $r \ll \lambda$; vorgeschriebene Pulsation
Bjerknes, elastisches Medium (Leahy)	$1/r^2$	ja	gleichphasig: Abstoßung	elastischer Festkörper, $\lambda \gg r$; nicht das barotrope Fluid
Bjerknes, kompressibles Fluid, $r \gtrsim \lambda/4$	nicht rein $1/r^2$	nein	gegenüber dem Nahfeld umkehrbar	endliche Schallgeschwindigkeit, Retardierung
Parallele Wirbelfäden	$1/d$ pro Länge	nein	KJ-Bild: gleiche Zirkulation zieht (gebunden: konstanter Abstand)	2D bzw. unendliche Linien; freie Wirbel sind 1. Ordnung
Stationäre Quelle/Senke	Druck $\propto 1/r^4$, Kraft $\propto 1/r^5$	nein	Unterdruck (Bernoulli)	stationär, inkompressibel

Tabelle 17: Kraftgesetze möglicher „effektiver Anziehungen“ in einem Medium. Nur die Bjerknes-Kraft pulsierender Körper liefert in drei Dimensionen ein reines $1/r^2$-Gesetz. Dieses Gesetz folgt nicht aus Rotation und Zustandsgleichung.

J Radialgitter, PPN und Hofmasse

J.1 Radialgitter und PPN (γ = 1, β = 1)

Photonen sind Zustände des Mediums und fliegen gassenweise. Radial (Sonne → Erde) bleibt der Strahl aus Kugelsymmetrie gerade; quer zu den konvergierenden Linien gilt Fermat-Ablenkung.

Hop-Metrik. Abstände $a_r(r)$, $a_t(r)$, Bezug a_∞:

$$\mathrm{d}\ell^2 = A\,\mathrm{d}r^2 + B\,r^2\mathrm{d}\Omega^2, \qquad A=(a_\infty/a_r)^2, \quad B=(a_\infty/a_t)^2.$$

Die Stoßzeit $\tau(r)$ setzt die Hop-Dauer. Bei isotropem Gitter ($a_r=a_t=a$) ist der Fermat-Index $n=(\tau/\tau_\infty)\,(a_\infty/a)$. Im konformen Ansatz $\mathrm{d}s^2=-e^{-2\psi}c^2\mathrm{d}t^2+e^{2\psi}\mathrm{d}\ell^2_{\text{euk}}$ gilt $n=e^{2\psi}$. PPN $\gamma=\beta=1$ verlangt $\psi=\mu/r+O(r^{-3})$ bzw. (gezeigt)

$$n=e^{2\mu/r}=1+2U+2U^2+O(r^{-3}), \qquad U=\mu/r, \quad \mu=GM/c^2$$

($n=1+2U+\alpha U^2\Rightarrow\beta=2-\alpha/2$; $\alpha=2$ gibt $\beta=1$). Das erzwingt $A=B\to1$, also $a_r=a_t\to a_\infty$.

Die natürliche Speichenannahme trägt das nicht. Feste Zahl radialer Linien $\Rightarrow a_t=\kappa r\Rightarrow Br^2=$ const: der optische Raum ist nicht asymptotisch euklidisch. Zugleich kann $\rho\propto1/(a_r a_t^2)\propto1/(a_r r^2)$ nicht gegen endliches ρ_∞ gehen — unverträglich mit dem $\gamma=2$-Halo $\rho/\rho_\infty=1+U+\cdots$ (gezeigt).

Mit isotropem Gitter und Halo $\rho/\rho_\infty=1+U$ ($a/a_\infty=(1+U)^{-1/3}$) gilt (gezeigt): nur Hop-Geometrie ($\tau=$ const) liefert $n=(1+U)^{1/3}=1+U/3+\cdots$ (zu flach, $\gamma=1/6$); $n=(\rho/\rho_\infty)^2=(1+U)^2=1+2U+U^2$ liefert $\alpha=1$, $\beta=3/2$, Perihelfaktor $5/6$.

Was stattdessen gilt: das lokale Gesetz $\Delta p=c^2\Delta\rho$. Gemessen sind $\gamma-1=(2{,}1\pm2{,}3)\times10^{-5}$ (Cassini) und $\beta-1=(-2{,}7\pm3{,}9)\times10^{-5}$ (MESSENGER). Das $\gamma=2$-Halo verfehlt β; das Medium aus Strahlung trifft beide. Mit $\Delta p=c^2\Delta\rho$ und $\mathrm{d}p=-\rho\,\mathrm{d}\Phi$ ist $\rho/\rho_\infty=e^U=1+U+\frac12U^2+\cdots$: führend ein $1/r$-Halo, und $n=(\rho/\rho_\infty)^2=e^{2U}$ gibt $\alpha=2$, $\beta=\gamma=1$ und $42{,}98''$/cy (Abschnitt „Hofmasse und Merkurperihel“, Fall (b)). Für das Gitter folgt daraus (gerechnet):

1. Halo gehalten, isotropes Gitter: Der Gitterabstand folgt der Dichte, $a=a_\infty(\rho_\infty/\rho)^{1/3}=a_\infty e^{-U/3}$, und die Stoßzeit ist $\tau/\tau_\infty=n\,a/a_\infty=e^{2U}e^{-U/3}=e^{5U/3}=1+\frac53U+\frac{25}{18}U^2+\cdots$. Das ist die Lesart, die zur Messung passt: Das Licht hüpft im dichteren Medium über kürzere Abstände und wartet je Stoß länger, und beides zusammen ergibt $n=e^{2U}$. (Mit dem $\gamma=2$-Halo $1+U$ stünde hier $\tau/\tau_\infty=e^{2U}(1+U)^{-1/3}=1+\frac53U+\frac{14}{9}U^2+\cdots$.) 2. Konform: $\tau/\tau_\infty=a_\infty/a$ und $n=(a_\infty/a)^2=e^{2U}$ $\Rightarrow a=a_\infty e^{-U}$, $\rho/\rho_\infty=e^{3U}$. Das wäre das Gesetz $\Delta p=c^2\Delta\rho/3$ (Fall (b′) unten), dessen Index $(\rho/\rho_\infty)^2=e^{6U}$ schon $\gamma=3$ gäbe; das widerspricht Cassini. Das konforme Gitter ist damit gemessen ausgeschlossen, das gehaltene Halo (1) nicht.

Die barotrope Zustandsgleichung, die zugleich das $1/r$-Halo und $\beta=\gamma=1$ bei $n=(\rho/\rho_\infty)^2$ liefert, ist $\Delta p=c^2\Delta\rho$, das Gesetz eines Mediums aus Strahlung. Es gilt im ganzen Medium. Ein früher angesetztes zweites Gesetz für eine „dichte Phase“ ist fallen gelassen, weil es Merkur verfehlt (Fall (a) unten; Abschnitt B.1.1).




Abbildung 73: Gitterstrahlen (μ zur Sichtbarkeit vergrößert).

J.2 Hintergrundkompression und Mach-Effekt

Milliarden anderer Sterne, die Milchstraße und der Kosmos komprimieren das Gitter bereits. Diese Hintergrundkompression setzt ρ_∞, den Gitterabstand a_∞ und die gemessene Lichtgeschwindigkeit c. Das lokale Sonnenproblem sitzt auf diesem Hintergrund.

Potenziale (gezeigt). Galaktisch: $U_{\rm gal} \simeq v_\odot^2/c^2 = (220\,\mathrm{km/s})^2/c^2 = 5{,}4\times10^{-7}$. Mit Halo-Tiefe ($v_{\rm esc}\simeq 550\,\mathrm{km/s}$ bzw. logarithmischer Schnitt bei $\sim 200\,\mathrm{kpc}$) eher $(1{-}2)\times10^{-6}$. Kosmisch: die naive Newton-Summe über eine Hubble-Kugel liefert $U_{\rm cosmo}=(3/4)\Omega = O(1)$ (für $\Omega_m\simeq 0{,}3$ etwa $0{,}24$; mit $\rho_{\rm crit}$ etwa $0{,}75$). Ein Nachbarstern: $U_\star(1\,M_\odot, 1\,\mathrm{pc}) \simeq 5\times10^{-14}$ — einzeln vernachlässigbar; der kollektive Beitrag steckt in $U_{\rm gal}$.

Multiplikatives Profil. Für $n = \exp(2\sum_i U_i) = \prod_i \exp(2U_i)$ gilt exakt $n/n_{\rm bg} = \exp(2U_\odot)$ (gezeigt). Eine über das Sonnensystem konstante Hintergrundkompression ist ein reiner Einheitenfaktor: sie reskaliert ρ_∞, a_∞, c und das gemessene $\mu = GM/c^2$, ändert aber weder Lichtablenkung (Fermat: Konstanten fallen aus $\delta\int n\,\mathrm{d}\ell = 0$ heraus) noch β, γ oder den Merkurperihel. Das ist der Mach-Effekt in harmloser Form — die fernen Massen setzen die Skala, nicht die lokalen dimensi-

onslosen Tests.

Additives Profil. Das Taylor-Polynom $n = 1 + 2W + 2W^2$ mit $W = U_\odot + U_{\rm bg}$ (Kreuzterm $4U_\odot U_{\rm bg}$) faktorisiert nicht. Nach Normierung auf $n_{\rm bg}$ bleibt $\beta = 1 + 2U_{\rm bg} + O(U_{\rm bg}^2)$ (gezeigt, auch nach konformer Ortsreskalierung). Fehlen die Kreuzterme (Summe isolierter Entwicklungen), gilt $\beta = 1 - 2U_{\rm bg} + O(U_{\rm bg}^2)$.

- Nur Milchstraße: $|\delta\beta| \simeq 2U_{\rm gal} \simeq 1{,}1 \times 10^{-6}$, $|\delta\dot{\varpi}| \simeq 1{,}5 \times 10^{-5}$ cy. Das liegt weit unter $\sim 0{,}003''$/cy und unter der MESSENGER-Genauigkeit (Park et al. 2017: Gesamtrate $575{,}3100 \pm 0{,}0015''$/cy, $\beta - 1 = (-2{,}7 \pm 3{,}9) \times 10^{-5}$; GR-Anteil $42{,}9799''$/cy). Merkur allein schließt galaktische Kreuzterme dieses Typs nicht aus.
- Kosmos: $U_{\rm cosmo} = O(1)$ erzeugt $|\delta\beta| = O(1)$ und $|\delta\dot{\varpi}| \sim$ 3–14″/cy — ausgeschlossen — und macht die Reihe $n = 1 + 2U + 2U^2$ selbst ungültig.

Das Quadrat $n = (1 + \sum U_i)^2$ faktorisiert nach Einheitenreskalierung ebenfalls (β bleibt $3/2$); es scheitert lokal an $\beta = 1$, nicht am Hintergrund.

Galaktische Gezeiten. Das homogene galaktische Feld fällt mit dem Sonnensystem frei (Äquivalenzprinzip). Es bleibt die Tide: $a_{\rm tid} \simeq (v^2/R_0^2)\, a_{\rm M} \simeq 4 \times 10^{-20}\,{\rm m/s^2} \simeq 10^{-18}$ der Sonnenbeschleunigung; die Periheldrift ist $\sim 10^{-9}$ cy — kein Test.

Preferred location. Wird die Gitterkompression entlang $\nabla U_{\rm gal}$ anisotrop (richtungsabhängiges a oder G), ist das ein Whitehead-Effekt, im Nordtvedt–Will-Formalismus der Parameter ξ. Beobachtung: $|\hat{\xi}| < 3{,}9 \times 10^{-9}$ (95

Was gelten muss. (1) Überlagerung multiplikativ: $n = \exp(2\sum U_i)$. Dann definieren Galaxis und Kosmos nur ρ_∞, a_∞, c; lokale PPN-Tests sehen allein $U_\odot$ (und die Planeten). (2) Kein additives $n = 1 + 2\sum U_i + \cdots$ als fundamentale Reihe — sie verträgt $U_{\rm cosmo} = O(1)$ nicht. (3) Keine richtungsabhängige Hintergrundkompression oberhalb $|\xi| \sim 4 \times 10^{-9}$.

Quellen: Park et al., AJ 153, 121 (2017), doi:10.3847/1538-3881/aa5be2; Shao & Wex, Class. Quantum Grav. 30, 165020 (2013), arXiv:1307.2637.

J.3 Hofmasse und Merkurperihel

7. November 2026, Europe/Berlin. Sympy. Der Übergang zählt als Masse: Φ speist sich aus Kern plus Hof, der Hof aus der EOS über $\mathrm{d}p = -\rho\,\mathrm{d}\Phi$. Index $n = (\rho/\rho_\infty)^2 = 1 + 2U + \alpha U^2$ ergibt $\beta = 2 - \alpha/2$ und das Perihel $(4-\beta)/3$ der GR-Rate $42{,}98''$/cy ($\gamma = 1$ in erster Ordnung). $U = \mu/r$, $\mu = GM/c^2$.

Ohne Rückkopplung ($\Phi = -GM/r$):

- (a) $p = K\rho^2$, $c_{s,\infty} = c$: $\rho/\rho_\infty = 1 + U$, $n = (1+U)^2 = 1 + 2U + U^2$, $\alpha = 1$, $\beta = 3/2$, Perihel $35{,}82''$/cy (Faktor $5/6$). Gemessen sind $42{,}98''$/cy [F]; dieses Gesetz ist damit ausgeschlossen und im Buch fallen gelassen (historischer Vergleich). - (b) $\Delta p = c^2\Delta\rho$: $\rho/\rho_\infty = e^U$, $n = e^{2U} = 1 + 2U + 2U^2$, $\alpha = 2$, $\beta = 1$, Perihel $42{,}98''$/cy. Das entsteht von selbst. - (b′) $\Delta p = c^2\Delta\rho/3$: $\rho/\rho_\infty = e^{3U}$, $n = e^{6U} = 1 + 6U + \cdots$ — schon $\gamma = 3$. Erst der ad-hoc-Index $n = (\rho/\rho_\infty)^{2/3}$ gäbe wieder e^{2U}.

Die relativistische Euler-Gleichung $\mathrm{d}p/(\varepsilon + p) = \mathrm{d}\psi$ verdoppelt den linearen Koeffizienten und zerstört $\gamma = 1$ in allen drei Fällen.

Selbstkonsistente Hofmasse ändert β nicht. Poisson liefert $\nabla^2\psi = -(4\pi G\rho_\infty/c^2)\, f(\psi)$. Die Korrektur ist vom Jeans-Typ: für $\gamma = 2$ exakt $\psi = \mu\cos(kr)/r = \mu/r - (k^2\mu r)/2 + \cdots$ ($k^2 = 4\pi G\rho_\infty/c^2$), kein Glied μ^2/r^2. Beim steifen Gesetz ist die zweite Ordnung $\propto k^2\mu^2 \ln r$, ebenfalls kein β.

Der $1/r$-Hof divergiert. Führend gilt $\delta\rho \simeq \rho_\infty\mu/r$, also $M_h = 2\pi\rho_\infty\mu\,(r^2 - R_\odot^2)$. Ein Schnitt an der Heliopause ($120\,$AE) macht die Gesamtmasse endlich, $M_h/M =$

$1{,}50\,\rho_\infty$ (ρ_∞ in kg/m^3), ändert aber nichts zwischen den Planeten: $\Delta GM/GM = 8{,}88\times 10^{-5}\,\rho_\infty$ (Merkur gegen Erde). Die Kepler-Forderung $|\Delta GM/GM| \lesssim 10^{-10}$ verlangt $\rho_\infty \lesssim 1{,}1\times 10^{-6}\,\mathrm{kg/m^3}$. Bei $\rho_{\mathrm{crit}} \simeq 8{,}5\times 10^{-27}\,\mathrm{kg/m^3}$ ist der Hof gravitativ unsichtbar ($\Delta GM/GM \sim 10^{-30}$). Ihn auf PPN-Größe ($U_{\mathrm{M}} \simeq 2{,}5\times 10^{-8}$) zu bringen, verletzt Kepler um $\sim 10^{-7}$. Eingeschlossene $1/r$-Hofmasse erzeugt eine fast konstante Zusatzkraft, kein $1/r^2$-Potenzial.

Feldenergie $\delta\rho \propto (\nabla\Phi)^2 \propto 1/r^4$ konvergiert ($M_{\mathrm{FE}}/M = |\alpha_{\mathrm{FE}}|\,\mu/(2R_\odot) \simeq 1{,}06\times 10^{-6}\,|\alpha_{\mathrm{FE}}|$) und erzeugt ein echtes μ^2/r^2. Mit $\psi' = -\mu_{\mathrm{enc}} e^{2s\psi}/r^2$ und $\mu'_{\mathrm{enc}} = b\,r^2(\psi')^2$ gilt $\beta = 1 - s + b/2$ für $n = e^{2\psi}$ und $\beta = 3/2 - s + b/2$ für das $\gamma = 2$-Quadrat ($b = \alpha_{\mathrm{FE}}/2$). Standard-Feldenergie ($\alpha_{\mathrm{FE}} = -1$, $b = -1/2$, $s = 0$) gibt $\beta = 3/4$ bzw. $5/4$, nicht 1. $\beta = 1$ aus dem $\gamma = 2$-Index verlangt $b = -1$ (zweimal die Newton-Feldenergie) — nicht natürlich. $n = e^{2\psi}$ mit $s = b = 0$ oder das steife Gesetz liefern $\beta = 1$ ohne diesen Faktor.

Fazit. Die Regel „Dichte ist Masse, der Übergang gehört zur Sonne“ gilt, liefert die $43''$ aber nicht als extra Newton-Masse des $1/r$-Hofs. Genau $\beta = 1$ kommt natürlich aus $\Delta p = c^2\Delta\rho$ zusammen mit $n = (\rho/\rho_\infty)^2$.

Literatur

[1] H. Alnes, M. Amarzguioui, Phys. Rev. D **74**, 103520 (2006).

[2] G. K. Batchelor, An Introduction to Fluid Dynamics, Cambridge University Press (1967).

[3] N. Bohr, J. A. Wheeler, Phys. Rev. **56**, 426 (1939).

[4] M. Campanelli, C. O. Lousto, Y. Zlochower, D. Merritt, Phys. Rev. Lett. **98**, 231102 (2007).

[5] S. Chandrasekhar, Astrophys. J. **97**, 255 (1943).

[6] P. Coppens, X-Ray Charge Densities and Chemical Bonding, Oxford University Press (1997).

[7] F. Diedrich, E. Peik, J. M. Chen, W. Quint, H. Walther, Phys. Rev. Lett. **59**, 2931 (1987).

[8] S. Dürr, T. Nonn, G. Rempe, Nature **395**, 33 (1998).

[9] S. Dürr et al., Science **322**, 1224 (2008).

[10] Event Horizon Telescope Collaboration, Astrophys. J. Lett. **930**, L17 (2022).

[11] X. Fan et al., Phys. Rev. Lett. **130**, 071801 (2023).

[12] D. J. Fixsen et al., Astrophys. J. **473**, 576 (1996).

[13] G. Green, Trans. Camb. Philos. Soc. **6**, 403 (1838).

[14] R. P. Gupta, N. Samaras, Universe **12**, 193 (2026), doi:10.3390/universe12070193.

[15] A. Albert et al. (HAWC Collaboration), JCAP 04, 026 (2020).

[16] S. W. Hawking, Phys. Rev. D **14**, 2460 (1976).

[17] F. Hofmann, J. Müller, Class. Quantum Grav. **35**, 035015 (2018).

[18] R. G. Hulet, E. S. Hilfer, D. Kleppner, Phys. Rev. Lett. **55**, 2137 (1985).

[19] J. P. Joule, Philos. Mag. **26**, 369 (1845).

[20] S. K. Lamoreaux, Phys. Rev. Lett. **78**, 5 (1997).

[21] D. Lynden-Bell, R. Wood, Mon. Not. R. Astron. Soc. **138**, 495 (1968).

[22] R. A. Millikan, Phys. Rev. **7**, 355 (1916).

[23] E. B. Norman et al., Phys. Lett. B **215**, 397 (1988).

[24] J. R. Oppenheimer, G. M. Volkoff, Phys. Rev. **55**, 374 (1939).

[25] S. Pommé et al., Phys. Lett. B **761**, 281 (2016).

[26] H. Rauch, A. Zeilinger, G. Badurek, A. Wilfing, W. Bauspiess, U. Bonse, Phys. Lett. A **54**, 425 (1975).

[27] S. A. Werner, R. Colella, A. W. Overhauser, C. F. Eagen, Phys. Rev. Lett. **35**, 1053 (1975).

[28] A. G. Riess et al., Astrophys. J. **607**, 665 (2004).

[29] V. Savchenko et al., Astrophys. J. Lett. **820**, L36 (2016).

[30] D. L. Shafer, Phys. Rev. D **91**, 103516 (2015).

[31] L. Shao, N. Wex, Class. Quantum Grav. **30**, 165020 (2013), arXiv:1307.2637.

[32] A. S. Stodolna et al., Phys. Rev. Lett. **110**, 213001 (2013).

[33] S. P. Walborn, M. O. Terra Cunha, S. Pádua, C. H. Monken, Phys. Rev. A **65**, 033818 (2002).

[34] C. F. von Weizsäcker, Z. Phys. **96**, 431 (1935).

[35] B. P. Abbott et al., Astrophys. J. Lett. **848**, L13 (2017).

[36] N. Ashby, Living Rev. Relativity **6**, 1 (2003).

[37] G. K. Batchelor, An Introduction to Fluid Dynamics, Cambridge University Press (1967).

[38] B. Bertotti, L. Iess, P. Tortora, Nature **425**, 374 (2003), doi:10.1038/nature01997.

[39] L. F. Burlaga, N. F. Ness, E. C. Stone, Science **341**, 147 (2013).

[40] L. F. Burlaga et al., Nat. Astron. **3**, 1007 (2019).

[41] K. Dialynas et al., Geophys. Res. Lett. **47**, e2019GL083924 (2020).

[42] R. P. Gupta, N. Samaras, Universe **12**, 193 (2026), doi:10.3390/universe12070193.

[43] D. A. Gurnett et al., Science **341**, 1489 (2013).

[44] D. A. Gurnett, W. S. Kurth, Nat. Astron. **3**, 1024 (2019).

[45] F. Hofmann, J. Müller, Class. Quantum Grav. **35**, 035015 (2018).

[46] S. M. Krimigis et al., Science **341**, 144 (2013).

[47] S. B. Lambert, C. Le Poncin-Lafitte, Astron. Astrophys. **529**, A70 (2011), doi:10.1051/0004-6361/201016370.

[48] J. L. Linsky, E. Möbius, Astrophys. J. **942**, 45 (2022).

[49] J. L. Linsky, B. E. Wood, Astrophys. J. **463**, 254 (1996).

[50] D. J. McComas et al., Science **336**, 1291 (2012).

[51] R. S. Park et al., Astron. J. **153**, 121 (2017), doi:10.3847/1538-3881/aa5be2.

[52] R. V. Pound, G. A. Rebka Jr., Phys. Rev. Lett. **4**, 337 (1960).

[53] R. V. Pound, J. L. Snider, Phys. Rev. **140**, B788 (1965).

[54] J. S. Rankin et al., PoS(ICRC2021) 032 (2021).

[55] J. D. Richardson et al., Nat. Astron. **3**, 1019 (2019).

[56] L. Shao, N. Wex, Class. Quantum Grav. **30**, 165020 (2013), arXiv:1307.2637.

[57] I. I. Shapiro, Phys. Rev. Lett. **13**, 789 (1964).

[58] E. C. Stone et al., Science **341**, 150 (2013).

[59] W. R. Webber, F. B. McDonald, Geophys. Res. Lett. **40**, 1665 (2013).

[60] B. P. Abbott et al., Astrophys. J. Lett. **848**, L13 (2017).

[61] B. P. Abbott et al., Phys. Rev. Lett. **119**, 141101 (2017).

[62] H. Alnes, M. Amarzguioui, Phys. Rev. D **74**, 103520 (2006).

[63] M. Campanelli, C. O. Lousto, Y. Zlochower, D. Merritt, Phys. Rev. Lett. **98**, 231102 (2007).

[64] J. J. Cowan, F.-K. Thielemann, Phys. Today **57**, 47 (2004).

[65] Event Horizon Telescope Collaboration, Astrophys. J. Lett. **930**, L17 (2022).

[66] D. J. Fixsen et al., Astrophys. J. **473**, 576 (1996).

[67] D. J. Fixsen, Astrophys. J. **707**, 916 (2009).

[68] G. Green, Trans. Camb. Philos. Soc. **6**, 403 (1838).

[69] R. P. Gupta, N. Samaras, Universe **12**, 193 (2026), doi:10.3390/universe12070193.

[70] S. W. Hawking, Phys. Rev. D **14**, 2460 (1976).

[71] F. Hofmann, J. Müller, Class. Quantum Grav. **35**, 035015 (2018).

[72] R. G. Hulet, E. S. Hilfer, D. Kleppner, Phys. Rev. Lett. **55**, 2137 (1985).

[73] J. P. Joule, Philos. Mag. **26**, 369 (1845).

[74] P. W. Merrill, Astrophys. J. **116**, 21 (1952).

[75] A. G. Riess et al., Astrophys. J. **607**, 665 (2004).

[76] V. Savchenko et al., Astrophys. J. Lett. **820**, L36 (2016).

[77] D. L. Shafer, Phys. Rev. D **91**, 103516 (2015).

[78] V. Bjerknes, Fields of Force, Columbia University Press (1906).

[79] E. Tiesinga, P. J. Mohr, D. B. Newell, B. N. Taylor, Rev. Mod. Phys. **93**, 025010 (2021).

[80] P. Coppens, X-Ray Charge Densities and Chemical Bonding, Oxford University Press (1997).

[81] G. H. Derrick, J. Math. Phys. **5**, 1252 (1964).

[82] A. A. Doinikov, S. T. Zavtrak, J. Acoust. Soc. Am. **96**, 735 (1994).

[83] S. Dürr et al., Science **322**, 1224 (2008).

[84] X. Fan et al., Phys. Rev. Lett. **130**, 071801 (2023).

[85] D. J. Fixsen et al., Astrophys. J. **473**, 576 (1996).

[86] J. Khuyagbaatar et al., Phys. Rev. Lett. (2025).

[87] E. Madelung, Z. Phys. **40**, 322 (1927).

[88] R. A. Millikan, Phys. Rev. **7**, 355 (1916).

[89] E. B. Norman et al., Phys. Lett. B **215**, 397 (1988).

[90] L. Onsager, Nuovo Cimento **6**, 279 (1949).

[91] S. Pommé et al., Phys. Lett. B **761**, 281 (2016).

[92] H. Rauch, A. Zeilinger, G. Badurek, A. Wilfing, W. Bauspiess, U. Bonse, Phys. Lett. A **54**, 425 (1975).

[93] E. Schrödinger, Sitzungsber. Preuss. Akad. Wiss. Phys.-Math. Kl. 20, 418 (1930).

[94] A. S. Stodolna et al., Phys. Rev. Lett. **110**, 213001 (2013).

[95] W. F. Vinen, Proc. R. Soc. Lond. A **260**, 218 (1961).

[96] C. F. von Weizsäcker, Z. Phys. **96**, 431 (1935).

Register

Angegeben sind je Begriff die Seiten mit den meisten Nennungen (höchstens sechs).

Bjerknes-Kraft 453, 471, 474, 476, 527, 530
Brechzahl 40, 60, 195, 197, 281, 283
Cassini-Messung 60, 66, 87, 88, 90, 533
Coulomb-Gesetz 371, 402, 432, 453, 474, 529
Dichtehof 48, 69, 155, 205, 296, 304
Dunkle Energie 3, 17, 36, 53, 153, 154
Dunkle Materie 3, 141, 153, 154, 202, 296
Eddington-Grenze 134, 135, 186, 200, 231, 290
Elektron 77, 176, 220, 306, 433, 510
Existenzschranke 89, 140, 340, 341, 346, 363
Exkluon 6, 50, 67, 68, 70, 196
Folgerung [F] 17, 40, 121, 139, 144, 145
Gravitationswellen 30, 78, 137, 218, 324, 326
Grenzfrequenz 177, 457, 458, 459, 461, 469
Hill-Wirbel 391, 405, 409, 415, 426, 428
Hintergrundstrahlung 125, 126, 127, 130, 131, 150
Hubble-Konstante 13, 53, 90, 124, 126, 129
Kanalisierung 51, 52
Kelvin-Wellen 184, 307, 330, 490, 493, 494
Koide-Relation 485, 486, 491, 492, 493, 494
Kugeldreieck 416, 417
Leptonen 183, 329, 485, 494, 497, 498
Lichtablenkung 4, 30, 86, 87, 154, 368
Massenlücke 241
Medium 16, 23, 24, 36, 44, 387
Merkurperihel 81, 88, 90, 197, 283, 535
Möbiusband 172, 431, 440, 441, 442, 452
Mpemba-Effekt 10, 11, 109, 221, 230, 259
Myon 75, 113, 485, 496, 497, 498
Neutrino 43, 44, 45, 143, 198, 285
Neutroneninterferometrie 27, 180, 204, 226, 302, 418
Oktant 49, 236, 416, 417
Orbital 7, 158, 159, 208, 320, 400
Phasenübergang 3, 119, 123, 138, 146, 150
Postulat [P] 5, 42, 55, 123, 124, 157
PPN-Parameter 71, 533, 534, 535, 536
Proton 42, 77, 159, 181, 206, 306
Pumpkreislauf 158, 241, 279, 418, 421, 422
Quasar 103, 125, 127, 131, 171, 297
Reynoldszahl 145, 373, 374, 419, 423
Satz vom Igel 180, 431, 432, 442, 443, 452
Schwarzes Loch 100, 101, 103, 109, 119, 142

Spin 167, 171, 214, 215, 252, 498
Spin-Bahn-Kopplung 160, 163
Stehende Welle 391, 392, 398, 400, 402, 403
Torusknoten 391, 392, 397, 428, 440, 489
Trichter 124, 125, 128, 129, 130, 230
Urknall 25, 123, 124, 134, 200, 231
Verschränkung 38, 166, 168, 169, 170, 240
Vorhersage [V] 16, 31, 51, 108, 109, 193
Wellenleiter 427, 454, 461, 471, 494, 497
Winkelsumme 415, 416, 418
Wirbelring 46, 313, 392, 393, 400, 428
Zeeman-Effekt 7, 167, 254, 529
Zitterbewegung 22, 108, 509, 511, 512, 513