

a
A1 All paired patients (n = 29)
64 higher in tumour | 287 higher in non−malignant
−log10 FDR
log2 fold change
MUC5B
CD14
CRNN
FMO2
VSIG2
PIGR
MIA
BPIFB1
AC098973.2
HPV16−E6
MAGEA4
KRT1
MAGEA6
HOXC8
NTS
MAGEA1
SHOX2
b
A2 HPV+ patients (n = 17)
30 higher in tumour | 171 higher in non−malignant
MEF2C
HSD17B2
NEFM
COX7A1
SHOX2
MUC5B
EREG
NEURL1
KLK5
TAF7L
HOXD1
NTS
TGM3
RP11−173G1.1
HPV16−E6
RP11−338I21.1
c
A3 HPV− patients (n = 12)
16 higher in tumour | 40 higher in non−malign
CP
ZNF667−AS1
TFF1
PLA2G4F
MIA
STATH
CNTN1
MAGEA6
HOXC10
HOXC8
VSIG2
SHOX2
PIGR
MUC5B
MAGEA4
FOXD1
d
B HPV+ vs HPV− tumour cells (31 vs 39 patients, study−adjusted)
400 higher in HPV+ | 452 higher in HPV−
SMC1B
SYNGR3
ZFR2
KRTDAP
MIR9−3HG
SYCP2
STAG3
MEI1
EREG
MMP2
HTRA1
KLHL35
VCAM1
MMP1
CDA
IGFBP6
SIM2
CXCL14
INHBA
NNMT
CDKN2A
e
DE genes per comparison
right = higher in tumour / HPV+
left = higher in non−malignant / HPV−
A1 all
287
64
A2 HPV+
171
30
A3 HPV−
40
16
A4 HPV+ vs HPV− change
2
1
B HPV+ vs HPV−
452
400
Genes (FDR < 0.05, |log2FC| >= 1)