

## *Pemphigus* spp.

(Pulgón del álamo)

Puedes encontrar más información acerca de esta plaga siguiendo este [enlace](#).

### ¿A quién ataca?

Ataca a chopos jóvenes, principalmente. Los árboles de clones de *Populus* × *euramericana* parecen ser más susceptibles.

### ¿Cómo identificarlo?

El adulto es muy pequeño (1-3 mm) y, más aún, las ninfas. Por tanto, es más fácilmente identificable por los daños que ocasiona.

Se reconoce, principalmente, por las agallas (“bultos”) que genera en el peciolo de la hoja. Esta agalla es hueca y de aproximadamente un 1 cm de diámetro (**Figs. 1 y 2**).

### ¿Qué daños causa?

Las ninfas viven dentro de las agallas inducidas por el adulto, succionando la savia de la planta.

Salvo ataques generalizados, el daño es más estético que económico. La succión de la savia puede favorecer la defoliación prematura de las hojas de la planta afectadas.

### ¿Cuándo verlo?

Las agallas son visibles desde la primavera, durante todo el período vegetativo.



**Figura 1.**

(Fuente:

<https://candide.com/img/d024b01f-c655-4458-b387-b5736ef8>

1b0e/cropped/616x493)



**Figura 2**