

Saperda populnea

(Saperda pequeña)

¿A quién ataca?

Ataca a chopos jóvenes en plantaciones y también a plantas de vivero.

¿Cómo identificarlo?

El adulto mide 1-1,5 cm de longitud. Presenta el cuerpo marrón-grisáceo con manchas amarillentas en las alas. Las antenas son casi tan largas como el cuerpo y anilladas (**Fig. 1**).

Los árboles atacados presentan un abultamiento característico en la zona en la que penetró la larva. El adulto sale al exterior haciendo un agujero circular en ese abultamiento (**Fig. 2**).

Las galerías internas realizadas por las larvas tienen virutas finas de madera.

¿Qué daños causa?

Las galerías larvarias favorecen la rotura de los troncos por el viento. Asimismo, originan debilitamiento del árbol y disminución de su crecimiento.

¿Cuándo verlo?

Los adultos son visibles en mayo/junio. Los abultamientos en el tronco son visibles desde comienzos de julio.

Puedes encontrar más información acerca de esta plaga siguiendo este [enlace](#).



Figura 1



Figura 2

(Fuente:
[https://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm
?imgnum=1231165#](https://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1231165#))