

## *Archips xylosteana*

(Oruga cigarrera del chopo)

### ¿A quién ataca?

Ataca a chopos de todas las edades.

### ¿Cómo identificarlo?

Puesta de huevos en forma de plastones blanquecinos de en torno a 1 cm de diámetro. Puesta en el tronco o ramas gruesas (**Fig. 1**).

Las orugas son verdosas, a veces con tonos amarillentos o violáceos, con la cabeza color pardo brillante (**Fig. 2**).

Refugios en forma de canuto que hacen las orugas enrollando y sujetando las hojas con hilos de seda ("cigarros", de ahí su nombre vulgar). En este refugio permanecen protegidas (**Fig. 3**).

### ¿Qué daños causa?

Las orugas se alimentan de las hojas e incluso de las yemas recién brotadas. Defoliaciones intensas generan una pérdida del crecimiento en grosor.

### ¿Cuándo verlo?

Las larvas pueden apreciarse desde mediados de marzo a finales de mayo. El adulto puede encontrarse de primeros de mayo a mediados de julio.

Puedes encontrar más información acerca de esta plaga en este [enlace](#).



**Figura 1**



**Figura 2**

(Fuente:

[https://bibliotecavirtual.aragon.es/repos/es/catalogo\\_imagenes/grupo.do?path=3714818](https://bibliotecavirtual.aragon.es/repos/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=3714818))



**Figura 3**

(Fuente Figs. 1 y 3:

[http://www.juntaex.es/files/cms/con03/uploaded\\_fichas/SectoresTematicos/Agricultura/SanidadVegetal/FichasTecnicas/61.pdf](http://www.juntaex.es/files/cms/con03/uploaded_fichas/SectoresTematicos/Agricultura/SanidadVegetal/FichasTecnicas/61.pdf))