

Cryptorhynchus lapathi

(Gorgojo perforador del chopo)

Puedes encontrar más información acerca de esta plaga siguiendo este [enlace](http://insecta.pro/taxonomy/855426).

¿A quién ataca?

Ataca a chopos de todas las edades, si bien en chopos adultos los daños no son importantes.

¿Cómo identificarlo?

El adulto mide 1 cm de longitud, con el cuerpo pardo-marrón claro y con una trompa como boca (**Fig. 1**).

Las larvas son difíciles de observar ya que están en el interior del árbol alimentándose de madera.

Los árboles atacados presentan pequeñas incisiones en el tronco de las que surgen virutas finas de madera mezcladas con exudaciones de savia (**Fig. 2**).

¿Qué daños causa?

Los adultos realizan picaduras de alimentación en los brotes jóvenes, provocando la muerte de los mismos.

Las larvas excavan galerías en la madera, que pueden anillar completamente los chopos jóvenes y matarlos. Los árboles jóvenes se pueden tronchar fácilmente por acción del viento.

¿Cuándo verlo?

Desde comienzos de otoño hasta el mes de junio puede verse las incisiones en el tronco con exudaciones de virutas finas y savia.



Figura 1

(Fuente: <http://insecta.pro/taxonomy/855426>)



Figura 2