

## *Crepidodera* spp.

### ¿A quién ataca?

Ataca a chopos de todas las edades. Varias especies posibles causantes de daño (*C. aurata*, *C. lamina*, *C. aurea*, *C. fulvicornis*, etc.).

### ¿Cómo identificarlo?

El adulto es un escarabajo de 2,5-4 mm de aspecto redondeado y color metalizado, en ocasiones cobrizo (**Figs. 1 y 2**).

### ¿Qué daños causa?

Tanto las larvas como los adultos se alimentan de las hojas del árbol. Para ello agujerean el limbo de la hoja, al principio son agujeros pequeños y luego cada vez más grandes (**Fig. 3**).

### ¿Cuándo verlo?

Los adultos pueden encontrarse frecuentemente sobre las hojas desde la primavera hasta el comienzo del verano. Los agujeros son visibles durante todo el período de crecimiento.

### ¿Con qué se puede confundir?

Con *Phratora laticollis* (escarabajo del chopo, ver **ficha**), pero *P. laticollis* presenta coloraciones más oscuras y no cobrizas. Además, no producen defoliaciones en forma de agujeros, sino que respetan la epidermis del haz.

Puedes encontrar más información acerca de esta plaga siguiendo este [enlace](#).



**Figura 1**



**Figura 2**

(Fuente: <http://crisomelidosibericos.com/>)



**Figura 3**

(Fuente: Zúbrick et al. (2013))