

数理逻辑考题

1. 简答题 (20)

(1). 给出一组逻辑联结词完备集。

$\{\wedge, \vee, \neg\}, \{\wedge, \neg\}, \{\vee, \neg\}, \{\neg, \rightarrow\}$

(2). 在自然数论域, $Q(x)$ 表示 x 是自然数, 在整数论域, $Q(x)$, 表示 x 是整数。
在自然数论域和整数论域上分别求下列命题的逻辑真值。

$\forall x(Q(x) \rightarrow 0 \leq x)$ (自然数论域: 1, 整数论域: 0)

$\exists x(Q(x) \wedge \forall y(Q(y) \rightarrow x \leq y))$ (自然数论域: 1, 整数论域: 0)

$\forall x \forall y(Q(x) \wedge Q(y) \rightarrow x+y=y+x)$ (自然数论域: 1, 整数论域: 1)

$\forall x \forall y(Q(x) \wedge Q(y) \rightarrow x+y \leq y)$ (自然数论域: 0, 整数论域: 0)

(3). 定义: 对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$, 对于任何 n , 当 $n > N$ 时, 都有 $|x_n - b| < \varepsilon$,
则称序列 $\{x_n\}$ 的极限是 b , 记为 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b$

用谓词合式公式表示定义 (谓词符号, 运算符: \forall 和 \rightarrow)

$\forall \varepsilon (\varepsilon > 0 \rightarrow \exists N (N > 0 \wedge \forall n (n > N \rightarrow |x_n - b| < \varepsilon)))$

(4). 给出可靠性和完备性定理

可靠性定理: 若 $\Gamma \vdash Q$, 则 $\Gamma \models Q$ 。

完备性定理: 若 $\Gamma \models Q$, 则 $\Gamma \vdash Q$ 。

(5). 在自然数理论中, 仅保持等谓词 ($=$), 后继函数和数学归纳法, 是否是完备的?

是

2. 论述题 (20)

(A). 命题逻辑合式公式

(1). 符号 0 和 1 是合式公式;

(2). 原子公式是合式公式;

(3). 若 Q, R 是合式公式, 则 $(\neg Q)$ 、 $(Q \wedge R)$ 、 $(Q \vee R)$ 、 $(Q \rightarrow R)$ 、 $(Q \leftrightarrow R)$ 、 $(Q \oplus R)$ 是合式公式;

(4). 只有有限次应用(1)–(3)构成的公式是合式公式。

(B). 谓词逻辑合式公式

合式公式是按如下规则构成的有穷长符号串。

(1). 若是 t_1, \dots, t_n 项, Q_i^n 是 n 元谓词, 则 $Q_i^n(t_1, \dots, t_n)$ 是合式公式。

(2). 若 Q 是合式公式, 则 $(\neg Q)$ 是合式公式;

(3). 若 Q 和 R 是合式公式, 则 $(Q \wedge R)$ 、 $(Q \vee R)$ 、 $(Q \rightarrow R)$ 、 $(Q \leftrightarrow R)$ 及 $(Q \oplus R)$ 是合式公式;

(4). 若 Q 是合式公式, x 是变元, 则 $(\forall x Q)$ 及 $(\exists x Q)$ 是合式公式。

(5). 只有有限次应用(1)–(4)构成的公式是合式公式。

(C).谓词合式公式意义

给定一阶语言 L , 结构 $S=\langle D, I \rangle$ 和赋值函数 $\sigma: V \rightarrow D$, t_1, t_2, \dots, t_n 是项。在模型 $M=\langle S, \sigma \rangle$ 下, 公式 P, Q, R 的语义是确定的逻辑真值。

- (1) 若 P 是 $Q(t_1, t_2, \dots, t_n)$, 则 $\sigma(P) = Q^I(\sigma(t_1), \sigma(t_2), \dots, \sigma(t_n))$ 。
- (2) 若 P 是 $\neg Q$, 则 $\sigma(\neg Q) = \neg \sigma(Q)$ 。
- (3) 若 P 是 $Q \wedge R$, 则 $\sigma(Q \wedge R) = \sigma(Q) \wedge \sigma(R)$ 。
- (4) 若 P 是 $Q \vee R$, 则 $\sigma(Q \vee R) = \sigma(Q) \vee \sigma(R)$ 。
- (5) 若 P 是 $Q \rightarrow R$, 则 $\sigma(Q \rightarrow R) = \sigma(Q) \rightarrow \sigma(R)$ 。
- (6) 若 P 是 $Q \leftrightarrow R$, 则 $\sigma(Q \leftrightarrow R) = \sigma(Q) \leftrightarrow \sigma(R)$ 。
- (7) 若 P 是 $Q \oplus R$, 则 $\sigma(Q \oplus R) = \sigma(Q) \oplus \sigma(R)$ 。
- (8) 若 P 是 $\forall x Q(x)$, 则

$$\sigma(\forall x Q(x)) = \begin{cases} 1 & \text{若对于每个 } d \in D_1, \text{ 有 } \sigma(x) = d, \text{ 使得 } Q^I(x)[x/d] = 1 \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$$

- (9) 若 P 是 $\exists x Q(x)$, 则

$$\sigma(\exists x Q(x)) = \begin{cases} 1 & \text{若存在 } d \in D_1, \text{ 有 } \sigma(x) = d, \text{ 使得 } Q^I(x)[x/d] = 1 \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$$

(D).表述可满足性与有效性

给定一阶语言 L 和它的公式 Q , 如果存在模型 $M=\langle S, \sigma \rangle$, 使得 $\sigma(Q)=1$ 成立, 则称公式 Q 关于模型 $\langle S, \sigma \rangle$ 是可满足的, 简称 Q 可满足, 也称模型 $\langle S, \sigma \rangle$ 满足 Q , 记为 $\models_M Q$ 。

若合式公式 Q 对于一阶语言 L 的任意模型 $M=\langle S, \sigma \rangle$ 均可满足, 即对任意结构 S 和任意赋值 σ 成立, 则称公式集合 Q 是永真的或有效的, 记为 $\models Q$ 。

(E).表述谓词公理证明

定义 设 Γ 是合式公式集, Q 是合式公式, 有推理步骤 A_1, A_2, \dots, A_n , 公式序列 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 其中

$$A_1 = \alpha_1$$

$$A_2 = \alpha_2$$

....

$$A_n = \alpha_n \quad (\alpha_n = Q)$$

每个 α_k 满足以下条件之一,

- (1) α_k 是公理;
- (2) $\alpha_k \in \Gamma$;
- (3) 有 $i, j < k$ $\alpha_k = \alpha_i \rightarrow \alpha_j$ 由 α_i, α_j 用 MP 规则推出。

则称它为 Q 的从 Γ 的一个推演(演绎), 记为 $\Gamma \vdash Q$ 。

如果 $\Gamma \vdash Q$, 并且有推理步骤 A_1, A_2, \dots, A_n , 则 A_1, A_2, \dots, A_n 称为的一个证明。

3. (10)

(1).求命题合式公式 $(P \vee Q \rightarrow R) \rightarrow P$ 主合取范式。

$$\Leftrightarrow (\neg(p \vee q) \vee r) \rightarrow p$$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg(p \vee q) \vee r) \vee p$$

$$\Leftrightarrow (p \vee q) \wedge \neg r \vee p$$

$$\Leftrightarrow (p \vee q \vee p) \wedge (\neg r \vee p)$$

$$\Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (\neg r \vee p)$$

合取范式

(2).设下面是数字逻辑部件译码器功能真值表，给出输出 $y_7 \sim y_0$ 的逻辑表达式。

使能	输入			输出							
E	x_2	x_1	x_0	y_7	y_6	y_5	y_4	y_3	y_2	y_1	y_0
0	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

$$y_0 = E \wedge \neg x_2 \wedge \neg x_1 \wedge \neg x_0$$

$$y_1 = E \wedge \neg x_2 \wedge \neg x_1 \wedge x_0$$

$$y_2 = E \wedge \neg x_2 \wedge x_1 \wedge \neg x_0$$

$$y_3 = E \wedge \neg x_2 \wedge x_1 \wedge x_0$$

$$y_4 = E \wedge x_2 \wedge \neg x_1 \wedge \neg x_0$$

$$y_5 = E \wedge x_2 \wedge \neg x_1 \wedge x_0$$

$$y_6 = E \wedge x_2 \wedge x_1 \wedge \neg x_0$$

$$y_7 = E \wedge x_2 \wedge x_1 \wedge x_0$$

4 (20)

(1). 用命题逻辑语义方法判断下列推论是否成立？若命题成立，给出证明；若命题不成立给出反例。

$$((p \rightarrow q) \wedge p) \vdash q$$

证明：

若真值赋值 v , 使 $v(p)=1$, 并且 $v(p \rightarrow q)=1$, 则 $v(p) \rightarrow v(q)=1$, 所以, $v(q)=1$ 。

所以, $((p \rightarrow q) \wedge p) \vdash q$

$$((p \rightarrow q) \wedge \neg p) \vdash \neg q$$

(2).用谓词逻辑语义方法判断下列推论是否成立？

$$\exists x \forall y Q(x, y) \vdash \forall y \exists x Q(x, y)$$

因为 $v(\exists x \forall y Q(x, y))=1$, 所以 $v(\forall y Q(c, y))=1$, 因此, 对于所有 y , 有 $v(Q(c, y))=1$ 。

所以, 对于所有 y , 有 $v(\exists x Q(x, y))=1$ 。

所以, 有 $v(\forall y \exists x Q(x, y))=1$ 。

因此, $\exists x \forall y Q(x, y) \vdash \forall y \exists x Q(x, y)$

$$\forall x \exists y Q(x, y) \vdash \exists y \forall x Q(x, y)$$

5.用公理方法证明 (20)

$$(1). P \rightarrow (Q \rightarrow R), Q \vdash P \rightarrow R$$

证明:

$$A_1 = P \rightarrow (Q \rightarrow R)$$

$$A_2 = (P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \rightarrow ((P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R))$$

$$A_3 = (P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)$$

$$A_4 = Q \rightarrow (P \rightarrow Q)$$

$$A_5 = Q$$

$$A_6 = P \rightarrow Q$$

$$A_7 = P \rightarrow R$$

(2).选择

$$\vdash \forall x Q(x) \rightarrow \forall y Q(y) \quad (y \text{ 不在 } Q \text{ 中出现})$$

证明:

$$A_1 = \forall x Q(x) \rightarrow Q(y)$$

$$A_2 = \forall y (\forall x Q(x) \rightarrow Q(y))$$

$$A_3 = \forall y (\forall x Q(x) \rightarrow Q(y)) \rightarrow (\forall x Q(x) \rightarrow \forall y Q(y))$$

$$A_4 = \forall x Q(x) \rightarrow \forall y Q(y)$$

$$\vdash \forall x \forall y R(x, y) \rightarrow \forall x R(x, x)$$

证明:

$$A_1 = \forall x \forall y R(x, y) \rightarrow \forall y R(x, y)$$

$$A_2 = \forall y R(x, y) \rightarrow R(x, x)$$

$$A_3 = \forall x \forall y R(x, y) \rightarrow R(x, x)$$

$$A_4 = \forall x (\forall x \forall y R(x, y) \rightarrow R(x, x))$$

$$A_5 = \forall x (\forall x \forall y R(x, y) \rightarrow R(x, x)) \rightarrow (\forall x \forall y R(x, y) \rightarrow \forall x R(x, x)) \quad A_4$$

$$A_6 = \forall x \forall y R(x, y) \rightarrow \forall x R(x, x)$$

6.归结法求证 (10)

$$P \wedge Q \rightarrow R \vdash (P \rightarrow R) \vee (Q \rightarrow R)$$

证明:

$$(P \wedge Q \rightarrow R) \wedge \neg((P \rightarrow R) \vee (Q \rightarrow R))$$

$$\Leftrightarrow (\neg(P \wedge Q) \vee R) \wedge \neg(\neg P \vee \neg Q \vee R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge P \wedge Q \wedge \neg R$$

因为 $(P \wedge Q \rightarrow R) \wedge \neg((P \rightarrow R) \vee (Q \rightarrow R))$ 的合取范式 $(\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge P \wedge Q \wedge \neg R$

所以子句集合

$$\Omega = \{P, Q, \neg R, \neg P \vee \neg Q \vee R\}$$

$$Q_1 = \neg P \vee \neg Q \vee R \quad Q_1 \in \Omega$$

$$Q_2 = P \quad Q_2 \in \Omega$$

$$Q_3 = \neg Q \vee R \quad Q_3 = (Q_1 \neg P) \vee (Q_2 \neg P)$$

$$Q_4 = Q \quad Q_4 \in \Omega$$

$$Q_5 = R \quad Q_5 = (Q_3 \neg Q) \vee (Q_4 \neg Q)$$

$$Q_6 = \neg R \quad Q_6 \in \Omega$$

$$Q_7 = \square \quad Q_7 = (Q_5 \neg R) \vee (Q_6 \neg R)$$

$$\text{因此 } P \wedge Q \rightarrow R \vdash (P \rightarrow R) \vee (Q \rightarrow R)$$

证毕