

ANOVA test

Yuri Cossich Lavinas

April, 2016

Contents

Summary	1
Experimental design	1
Statistical Analysis	1
Conclusions	6

Summary

O objeto é descobrir se existem variações ente os métodos e quais são as variáveis mais influentes.

Os métodos utilizados para comparação são o *gaModel* e a versão com listas. Para cada um dos métodos temos algumas variações nas variáveis utilizadas. Variamos os anos (2005-2010), as regiões (Kanto, EastJapan, Touhoku e Kansai), a profundidade (<25km, <60km, <100km) e finalmente o catálogo utilizado (JMA X métodoJanelaJMA).

Experimental design

Vou utilizar o ANOVA para nos dados obtidos para verificar qual composição de variáveis e métodos mais influenciam no resultado final.

Para isso executei o *gaModel* e *versão com Listas* para cada conjunto de variáveis 10 vezes. Cada grupo para um método é composto por: região, ano, profundidade e catálogo. Um grupo para um cenário será chamado cenário de execução.

Após as execuções vou aplicar o ANOVA em uma *data.frame* composto pelos dados das **médias dos melhores indivíduos da última geração** para cada cenário de execução.

Caso uma variável esteja fora do intervalo de confiança ($P < 0.05$), vou aplicar novamente o ANOVA retirando essa variável do teste.

Aplico um teste post hoc nos resultados do ANOVA para especificar quais são os grupos que diferem. O teste utilizado foi o Tukey teste.

Statistical Analysis

Começo a análise carregando o *data.frame* com os dados, seguindo para a aplicação do teste ANOVA e finalizando com o uso do Tukey teste.

```
#Loading data
load("data.Rda")
#Primeira vez aplicando ANOVA
resultANOVA = aov(finalData$loglikeValues~finalData$model+finalData$depths+finalData$years+finalData$region)
summary(resultANOVA)
```


```
##              Df      Sum Sq   Mean Sq  F value Pr(>F)
## finalData$model      3 560157617 186719206 1282.742 <2e-16 ***
## finalData$depths     2  30470265  15235133  104.664 <2e-16 ***
## finalData$years       5   1860545    372109    2.556 0.0257 *
## finalData$regions     3 306892155 102297385  702.772 <2e-16 ***
## Residuals           2866 417182410    145563
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
#Segunda vez aplicando ANOVA, como a variável years influencia menos os dados foram removidos do teste .
resultANOVA = aov(finalData$loglikeValues~finalData$model+finalData$depths+finalData$regions)
summary(resultANOVA)
```


```
##              Df      Sum Sq   Mean Sq  F value Pr(>F)
## finalData$model      3 560157617 186719206 1279.3 <2e-16 ***
## finalData$depths     2  30470265  15235133  104.4 <2e-16 ***
## finalData$regions     3 306892155 102297385  700.9 <2e-16 ***
## Residuals           2871 419042955    145957
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
#Especificando quais são os grupos que diferem
tuk = TukeyHSD(resultANOVA)
#Variáveis para configuração do gráfico
# par(mfrow=c(2,2))
op <- par(mar = c(5,12,4,2) + 0.1)
#Função para gerar o gráfico
plot(tuk,las=1)
```


95% family-wise confidence level



95% family-wise confidence level



95% family-wise confidence level



```
#Mostrando os resultados também em texto
print(tuk)
```

```
## Tukey multiple comparisons of means
## 95% family-wise confidence level
##
## Fit: aov(formula = finalData$loglikeValues ~ finalData$model + finalData$depths + finalData$regions)
##
## $`finalData$model`
##          diff          lwr          upr p adj
## lista-gaModel      499.8954  448.13652  551.6544    0
## gaModelCluster-gaModel    133.3367   81.57777  185.0956    0
## listaCluster-gaModel    1137.7082 1085.94930 1189.4671    0
## gaModelCluster-lista    -366.5588 -418.31768 -314.7998    0
## listaCluster-lista      637.8128  586.05385  689.5717    0
## listaCluster-gaModelCluster 1004.3715  952.61261 1056.1305    0
##
## $`finalData$depths`
##          diff          lwr          upr p adj
## 25-100 250.06673  209.1765  290.95700 0e+00
## 60-100 151.67471  110.7844  192.56498 0e+00
## 60-25  -98.39202 -139.2823 -57.50176 1e-07
##
## $`finalData$regions`
##          diff          lwr          upr p adj
## Kansai-Kanto    300.1009  248.3419  351.8598    0
```

## Tohoku-Kanto	657.1879	605.4289	708.9468	0
## EastJapan-Kanto	-209.7388	-261.4978	-157.9799	0
## Tohoku-Kansai	357.0870	305.3281	408.8459	0
## EastJapan-Kansai	-509.8397	-561.5986	-458.0808	0
## EastJapan-Tohoku	-866.9267	-918.6856	-815.1678	0

Conclusions