

UNIVERSIDAD CENTRAL
FACTORES DESENCADENANTES PREDOMINANTES EN REGISTROS DE IDEACIÓN
SUICIDA EN ADOLESCENTES DE BOGOTÁ, 2017–2025

Wilber Jonatan Plazas Murcia y Paola Yate Cuervo

CONTEXTO

La conducta suicida es un problema de salud pública que requiere vigilancia y análisis constantes. En Bogotá D. C., la Secretaría Distrital de Salud hace seguimiento a estos eventos por medio del Subsistema de Vigilancia Epidemiológica de la Conducta Suicida (SISVECOS).

Para este estudio se utilizó la base de datos publicada por el Observatorio de Salud de Bogotá, SaluData. El archivo reúne 274.648 registros de ideación suicida e intento de suicidio notificados entre 2011 y 2025. Cada registro contiene la clasificación de la conducta, datos sociodemográficos como sexo, nivel educativo y ciclo vital, e información sobre la localidad de residencia y la UPZ.

La base incluye nueve variables binarias relacionadas con los factores registrados al momento de la notificación: enfermedades dolorosas, maltrato sexual, muerte de un familiar, conflicto de pareja, problemas económicos, problemas escolares, problemas jurídicos, problemas laborales y suicidio de un amigo. En estas variables, 1 indica que el factor está presente y 0 que está ausente. Los factores no son excluyentes. Por esta razón, una misma notificación puede tener varios factores marcados.

El análisis se concentró en las notificaciones de ideación suicida de adolescentes entre 12 y 17 años registradas de 2017 a 2025. Se excluyeron los intentos de suicidio y los registros que no cumplían estos criterios. La población final quedó conformada por 53.887 notificaciones.

Con estos datos se calcularon las frecuencias y proporciones globales y anuales de los nueve factores. Luego se aplicaron pruebas estadísticas para establecer si existían diferencias entre sus proporciones. Los resultados permiten identificar los tres factores predominantes dentro de las notificaciones analizadas, pero no establecen relaciones causales.

¿Qué factores desencadenantes predominan en los registros de ideación suicida notificados en adolescentes de 12 a 17 años en Bogotá entre 2017 y 2025?

ANÁLISIS DESCRIPTIVO

El análisis descriptivo compara la frecuencia y la proporción de los nueve factores en el periodo estudiado. Los resultados globales y anuales permiten reconocer cuáles aparecen con mayor frecuencia y cómo cambia su participación entre 2017 y 2025.

Los factores más frecuentes están relacionados con el entorno escolar, las situaciones de violencia y las relaciones interpersonales. En cambio, los problemas laborales y jurídicos aparecen con menor frecuencia en las notificaciones analizadas.




Figura 1. Proporción global de los nueve factores en 53.887 notificaciones.

Los problemas escolares son el factor registrado con mayor frecuencia, con 27.243 casos (50,56 %). Le siguen el maltrato sexual, con 6.899 casos (12,80 %), y el conflicto de pareja, con 3.832 casos (7,11 %). Los problemas laborales y jurídicos presentan las proporciones globales más bajas.




Figura 2. Proporción anual de cada factor. Cada celda usa como denominador las notificaciones del año.

Los problemas escolares predominan durante el periodo y alcanzan su mayor proporción en 2020 (65,2 %). El maltrato sexual llega a su valor más alto en 2019 (32,6 %) y luego disminuye hasta 9,5 % en 2025. El conflicto de pareja alcanza 19,5 % en 2018 y termina en 6,9 % en 2025. Los porcentajes de cada año no tienen que sumar 100 %, porque una notificación puede incluir varios factores o no registrar ninguno de los nueve.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Prueba Q de Cochran

La prueba Q de Cochran evalúa si los nueve factores tienen la misma proporción global en las 53.887 notificaciones. Esta prueba es adecuada porque las variables son binarias y se observan en los mismos registros. Su resultado indica si existe una diferencia general, pero no señala cuáles factores son diferentes.

Hipótesis nula H0: los nueve factores presentan la misma proporción de registros con valor 1.

Hipótesis alternativa H1: al menos uno de los factores presenta una proporción diferente.

	Estadístico Q	Grados de libertad	p-valor	N utilizado	Decisión
0	124083.018397	8	< 0,001	53887	Rechazar H0

Decisión: el p-valor es menor que 0,05, por lo que se rechaza H0. Las proporciones globales de los nueve factores no son iguales. Este resultado muestra una diferencia general entre los factores, pero no implica una relación causal.

Selección de los tres factores predominantes

El ranking usa la proporción global como criterio principal y la persistencia anual como criterio de desempate. De acuerdo con esta regla, los tres primeros factores son problemas escolares, maltrato sexual y conflicto de pareja.




Figura 3. Evolución anual de los tres factores con mayor proporción global.

La evolución anual también muestra el predominio de los problemas escolares. Aunque su proporción cambia de un año a otro, se mantiene por encima de los otros dos factores desde 2019. En el resultado global, el maltrato sexual ocupa el segundo lugar y el conflicto de pareja el tercero.

Prueba de McNemar

Después del resultado de Cochran, la prueba de McNemar compara por parejas las proporciones de los tres factores principales en las mismas notificaciones. Como se realizan tres comparaciones, se aplica el ajuste de Holm para controlar el riesgo de obtener una diferencia significativa solo por repetir la prueba.

- **Hipótesis nula H0:** los dos factores comparados presentan la misma proporción.
- **Hipótesis alternativa H1:** los dos factores comparados presentan proporciones diferentes.
- **Regla de decisión:** se rechaza H0 cuando el p-valor ajustado mediante Holm es menor que 0,05.

	Factor A	Factor B	Estadístico	p-valor	N utilizado	p-valor ajustado (Holm)	Decisión
0	Problemas escolares	Maltrato sexual	13784.479682	< 0,001	53887	< 0,001	Rechazar H0
1	Problemas escolares	Conflicto de pareja	18847.477388	< 0,001	53887	< 0,001	Rechazar H0
2	Maltrato sexual	Conflicto de pareja	930.451945	< 0,001	53887	< 0,001	Rechazar H0

Se rechaza H0 en las tres comparaciones. Esto significa que los problemas escolares, el maltrato sexual y el conflicto de pareja tienen proporciones diferentes entre sí, incluso después de aplicar el ajuste de Holm.

CONCLUSIONES

De las 53.887 notificaciones analizadas, 27.243 registraron problemas escolares (50,56 %), 6.899 maltrato sexual (12,80 %) y 3.832 conflicto de pareja (7,11 %). Estos fueron los tres factores con mayor proporción global. La prueba Q de Cochran mostró que las proporciones de los nueve factores no son iguales ($p < 0,001$). Las comparaciones de McNemar, ajustadas con el método de Holm, también encontraron diferencias entre los tres factores principales (p ajustado $< 0,001$).

En las notificaciones de ideación suicida de adolescentes entre 12 y 17 años, los factores que predominan son los problemas escolares, el maltrato sexual y el conflicto de pareja. Los problemas escolares presentan una diferencia amplia frente a los demás y requieren especial atención en futuros análisis. Estos hallazgos describen la información registrada en SISVECOS. No demuestran que los factores sean causas de la ideación suicida ni representan todos los casos ocurridos en Bogotá.

REFERENCIAS

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. (s. f.). *Conducta suicida en Bogotá D. C.* Observatorio de Salud de Bogotá, SaluData. <https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/indicadores/conducta-suicida/>

DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Se utilizó asistencia de inteligencia artificial como apoyo para revisar, depurar y documentar el código. El contenido final fue revisado y adaptado por los autores.