



Clique-Width: Harnessing the Power of Atoms

Narzędzie do rozwiązywania wielu problemów jednocześnie?

Paulina Brzęcka

13 października 2024



Wiele trudnych problemów z grafami można rozwiązać, ograniczając dane wejściowe do jakiejś klasy grafów. Dwa główne pytania brzmią:

- Dla jakich klas grafów problem grafowy jest wykonalny?
- Dla jakich klas grafów jest on trudny obliczeniowo?





Idealnie byłoby, gdybyśmy chcieli odpowiedzieć na te pytania w odniesieniu do dużego zestawu problemów jednocześnie, zamiast rozważać poszczególne problemy jeden po drugim.

Parametry szerokości grafu pomagają w umożliwieniu takich wyników. Klasa grafów ma ograniczoną szerokość, jeśli istnieje stała c taka, że szerokość wszystkich jej elementów wynosi co najwyżej c .

Podgraf indukowany.

Jest to graf, którego zbiór wierzchołków jest zawarty (jest podzbiorem) w zbiorze wierzchołków grafu G , a zbiór krawędzi składa się ze wszystkich krawędzi grafu G , których końce należą do zbioru wierzchołków podgrafu.

Przykłady






Klasa grafów heredytalnych (dziedzicznych).

Klasa jest dziedziczna wtedy i tylko wtedy, gdy może być scharakteryzowana przez unikalny zbiór H minimalnych, zabronionych podgrafów indukowanych.

Graf G jest H -wolny jeśli G nie ma podgrafu indukowanego, izomorficznego do H .

Graf G jest (H_1, \dots, H_p) -wolny jeśli G nie ma podgrafów indukowanych, izomorficznych do H_i dla każdego i .

Przykłady




Szerokość kliki.

Szerokość kliki grafu G , oznaczona jako $cw(G)$, to minimalna liczba etykiet potrzebnych do skonstruowania G przy użyciu czterech następujących operacji:

- utworzenie nowego grafu składającego się z pojedynczego wierzchołka v z etykietą i ;
- przyjęcie sumy rozłącznej dwóch grafów oznaczonych etykietami G_1 i G_2 ;
- dodanie krawędzi pomiędzy każdym wierzchołkiem o etykiecie i a każdym wierzchołkiem o etykiecie j ($i \neq j$);
- oznaczenie każdego wierzchołka etykietą i tak, aby miał etykietę j .

Klasa grafów G ma ograniczoną szerokość kliki, jeśli istnieje stała c taka, że $cw(G) \leq c$ dla każdego $G \in \mathcal{G}$; w przeciwnym razie szerokość kliki G jest nieograniczona.



Przykłady



Atom.

Spójny graf, który nie posiada grafu rozpinającego będącego kliką.

Przykłady







Wiele klasycznych problemów grafowych, między innymi:

- Kolorowanie
- Minimalne dopełnienie
- Maksymalna klika
- Maksymalny ważony zbiór niezależny
- Maksymalne indukowane dopasowanie

są rozwiązywalne w czasie wielomianowym na grafie dziedzicznym klasy G wtedy i tylko wtedy, gdy ma to miejsce w przypadku atomów G .

Twierdzenie

*Klasa atomów $(2P_2, \overline{P_2 + P_3})$ -wolnych ma ograniczoną szerokość kliki
(mając na uwadze że klasa grafów $(2P_2, \overline{P_2 + P_3})$ -wolnych ma
nieograniczoną szerokość kliki)*



Twierdzenie

Klasa atomów $(2P_2, \overline{P_2 + P_3})$ -wolnych ma ograniczoną szerokość kliki (mając na uwadze że klasa grafów $(2P_2, \overline{P_2 + P_3})$ -wolnych ma nieograniczoną szerokość kliki)

Dowód.

Podejście opiera się na trzech następujących twierdzeniach:

- $(2P_2, \overline{P_2 + P_3})$ -wolnych atomów z indukowanym C_5 ma ograniczoną szerokość kliki.
- $(2P_2, \overline{P_2 + P_3})$ -wolnych atomów z indukowanym C_4 ma ograniczoną szerokość kliki.
- $(C_4, C_5, 2P_2, \overline{P_2 + P_3})$ -wolnych atomów ma ograniczoną szerokość kliki.

Lemat


Klasa atomów $(2P_2, \overline{P_2 + P_3})$ -wolnych atomów z indukowanym C_5 ma ograniczoną szerokość kliki.

Dowód.

Niech G będzie atomem wolnym od $(2P_2, \overline{P_2 + P_3})$, który zawiera indukowany cykl $C = v_1, \dots, v_5$. Wprowadzamy następujące oznaczenia: dla $S \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5\}$, niech V_S oznacza zbiór wierzchołków $x \in V(G) \setminus V(C)$, takich że $N(x) \cap V(C) = \{v_i \mid i \in S\}$. Rozważamy możliwe wartości S .


Twierdzenie

$V_i \cup V_{i,i+1} \cup V_{i-1,i+1}$ *jest puste dla każdego i .*




Twierdzenie

Zbiory $V_\emptyset \cup V_{i,i+2}$ dla każdego i są niezależne.




Twierdzenie

Dla każdego i , $|V_{i,i+1,i+3} \cup V_{i,i+1,i+2,i+3}| \leq 1$.




Twierdzenie

Dla każdego i istnieje co najwyżej jedna krawędź między $V_{i,i+2}$ a $V_{i,i-2}$.




Twierdzenie

Dla każdego i , $V_{i,i+2}$ jest pełne w stosunku do $V_{i-1,i+1} \cup V_{i+1,i+3}$.



Twierdzenie

Jeżeli $x \in V_{1,2,3,4,5}$, to x jest pełne w stosunku do $V(G) \setminus \{x\}$. W szczególności, $V_{1,2,3,4,5}$ jest kliką.



Dowód.

Z powyższych twierdzeń wynika, że odpowiednia liczba operacji na G (usunięcia wierzchołków, komplementacje podgrafów, komplementacje dwudzielne) prowadzi do grafu, który ma ograniczoną szerokość kliki. \square

Lemat


Klasa atomów $(2P_2, \overline{P_2 + P_3})$ -wolnych atomów z indukowanym C_4 ma ograniczoną szerokość kliki.

Dowód.

Załóżmy, że G jest atomem wolnym od $(2P_2, P_2 + P_3)$, który zawiera indukowany cykl $C = v_1, v_2, v_3, v_4$. Na mocy wcześniejszego lematu, możemy założyć, że G jest wolny od C_5 . Dla $S \subseteq \{1, 2, 3, 4\}$, niech V_S oznacza zbiór wierzchołków $x \in V(G) \setminus V(C)$, takich że $N(x) \cap V(C) = \{v_i \mid i \in S\}$.


Twierdzenie

Dla każdego i , $V_{i,i+1,i+2}$ jest pusty.




Twierdzenie

Zbiór $V_\emptyset \cup V_i \cup V_{i+1} \cup V_{i,i+1}$ jest niezależny dla każdego i .




Twierdzenie

Dla każdego i , zbiory $V_{i,i+1} \cup V_{i,i+2}$ i $V_{i,i+1} \cup V_{i+1,i+3}$ są niezależne.




Twierdzenie

Graf $G[V_{1,2,3,4}]$ jest wolny od $P_1 + P_2$, a więc ma ograniczoną szerokość kliki.




Twierdzenie

Dla $i \in \{1, 2\}$, $V_{i,i+2}$ jest pełne względem $V_{1,2,3,4}$.




Twierdzenie

Dla każdego i , albo $V_{i-1} \cup V_{i-1,i}$, albo $V_{i,i+1} \cup V_{i+1}$ jest puste.




Twierdzenie

Jeżeli $x \in V_\emptyset$, to x ma co najmniej dwóch sąsiadów w jednym z $V_{1,3}$ lub $V_{2,4}$ i jest antykompletny względem drugiego zbioru. Ponadto, x jest pełny względem $V_{1,2,3,4}$.




Twierdzenie

Dla każdego $i \in \{1, 2\}$, $|V_{i,i+1} \cup V_{i+2,i+3}| \leq 2$.



Twierdzenie

Dla każdego $i \in \{1, 2, 3, 4\}$, V_i jest pełne względem $V_{1,2,3,4}$, a co najwyżej jeden wierzchołek z $V_{i,i+2}$ ma sąsiadów w V_i .



Dowód.

Na podstawie powyższych twierdzeń, odpowiednia liczba operacji (usunięcia wierzchołków, komplementacje podgrafów i komplementacje dwudzielne) prowadzi do grafu o ograniczonej szerokości kliki. □

Twierdzenie

Klasa atomów $(2P_2, \overline{P_2 + P_3})$ -wolnych ma ograniczoną szerokość kliki (mając na uwadze że klasa grafów $(2P_2, \overline{P_2 + P_3})$ -wolnych ma nieograniczoną szerokość kliki)

Dowód.

Klasa grafów podzielnych to klasa grafów wolnych od $(C_4, C_5, 2P_2)$. Ponieważ grafy podzielne tworzą podklasę klasy grafów wolnych od $(2P_2, \overline{P_2 + P_3})$, a grafy podzielne mają nieograniczoną szerokość kliki, wynika z tego, że grafy wolne od $(2P_2, \overline{P_2 + P_3})$ również mają nieograniczoną szerokość kliki. Przypomnijmy, że atomy podzielne są grafami pełnymi, a zatem ich szerokość kliki wynosi co najwyżej 2. Atomy wolne od $(2P_2, \overline{P_2 + P_3})$, które nie są podzielne, muszą zatem zawierać indukowany C_4 lub C_5 . □

1. Klasa atomów w G ma ograniczoną szerokość kliki, jeśli jest równoważna klasie grafów wolnych od (H_1, H_2) , gdzie spełniony jest jeden z następujących warunków:
 - (i) H_1 lub $H_2 \subseteq_i P_4$
 - (ii) $H_1 = K_s$ i $H_2 = tP_1$ dla pewnych $s, t \geq 1$
 - (iii) $H_1 \subseteq_i \text{paw}$ i $H_2 \subseteq_i K_{1,3} + 3P_1, K_{1,3} + P_2, P_1 + P_2 + P_3, P_1 + P_5, P_1 + S_{1,1,2}, P_2 + P_4, P_6, S_{1,1,3}$ lub $S_{1,2,2}$
 - (iv) $H_1 \subseteq_i \text{diamond}$ i $H_2 \subseteq_i P_1 + 2P_2, 3P_1 + P_2$ lub $P_2 + P_3$
 - (v) $H_1 \subseteq_i \text{gem}$ i $H_2 \subseteq_i P_1 + P_4$ lub P_5
 - (vi) $H_1 \subseteq_i K_3 + P_1$ i $H_2 \subseteq_i K_{1,3}$
 - (vii) $H_1 \subseteq_i \overline{2P_1 + P_3}$ i $H_2 \subseteq_i 2P_1 + P_3$
2. Klasa atomów w G ma ograniczoną szerokość kliki, jeśli G jest podklasą klasy:
 - (i) grafów wolnych od $(P_6, \overline{2P_2})$
 - (ii) grafów wolnych od $(2P_2, \overline{P_2 + P_3})$

1. Klasa atomów w G ma nieograniczoną szerokość kliku, jeśli jest równoważna klasie grafów wolnych od (H_1, H_2) , gdzie spełniony jest jeden z następujących warunków:
 - (i) $H_1 \notin S$ i $H_2 \notin S$
 - (ii) $H_1 \notin S$ i $H_2 \notin \overline{S}$
 - (iii) $H_1 \supseteq_i K_3 + P_1$ i $H_2 \supseteq_i 4P_1$ lub $2P_2$
 - (iv) $H_1 \supseteq_i \text{diamond}$ i $H_2 \supseteq_i K_{1,3}, 5P_1$ lub $P_2 + P_4$
 - (v) $H_1 \supseteq_i K_3$ i $H_2 \supseteq_i 2P_1 + 2P_2, 2P_1 + P_4, 4P_1 + P_2, 3P_2$ lub $2P_3$
 - (vi) $H_1 \supseteq_i K_4$ i $H_2 \supseteq_i P_1 + P_4, 3P_1 + P_2$ lub $2P_2$
 - (vii) $H_1 \supseteq_i \text{gem}$ i $H_2 \supseteq_i P_1 + 2P_2$
2. Klasa atomów w G ma nieograniczoną szerokość kliku, jeśli zawiera klasę grafów wolnych od (H_1, H_2) , gdzie spełniony jest jeden z następujących warunków:
 - (i) $H_1 \supseteq_i \text{diamond}$ i $H_2 \supseteq_i P_1 + P_6$
 - (ii) $H_1 \supseteq_i 2P_1 + P_2$ i $H_2 \supseteq_i P_6$
 - (iii) $H_1 \supseteq_i \text{gem}$ i $H_2 \supseteq_i P_6$
 - (iv) $H_1 \supseteq_i P_1 + 2P_2$ lub P_6 i $H_2 \supseteq_i \overline{P_1 + 2P_2}$ lub $\overline{P_2 + P_3}$
 - (v) $H_1 \supseteq_i 2P_2$ i $H_2 \supseteq_i \overline{P_2 + P_4}, 3P_2$ lub $\overline{P_5}$

Czy klasa atomów wolnych od (H_1, H_2) ma ograniczoną szerokość kliku, jeśli:

- (i) $H_1 = \text{diamond}$ i $H_2 = P_6$
- (ii) $H_1 = C_4$ i $H_2 \in \{P_1 + 2P_2, P_2 + P_4, 3P_2\}$
- (iii) $H_1 = \overline{P_1 + 2P_2}$ i $H_2 \in \{2P_2, P_2 + P_3, P_5\}$
- (iv) $H_1 = \overline{P_2 + P_3}$ i $H_2 \in \{P_2 + P_3, P_5\}$
- (v) $H_1 = K_3$ i $H_2 \in \{P_1 + S_{1,1,3}, S_{1,2,3}\}^*$
- (vi) $H_1 = 3P_1$ i $H_2 = \overline{P_1 + S_{1,1,3}}^*$
- (vii) $H_1 = \text{diamond}$ i $H_2 \in \{P_1 + P_2 + P_3, P_1 + P_5\}^*$
- (viii) $H_1 = 2P_1 + P_2$ i $H_2 \in \{\overline{P_1 + P_2 + P_3}, \overline{P_1 + P_5}\}^*$
- (ix) $H_1 = \text{gem}$ i $H_2 = P_2 + P_3^*$
- (x) $H_1 = P_1 + P_4$ i $H_2 = \overline{P_2 + P_3}^*$

Przypadki oznaczone gwiazdką (*) oznaczają, że nie jest znana ograniczoność szerokości kliku dla całej klasy grafów wolnych od (H_1, H_2)



Dan Cocks.

Minimal classes of graphs of unbounded tree-width and clique-width.
Journal of Graph Theory.



Konrad K. Dabrowski, Tomáš Masařík, Jana Novotná, Daniël Paulusma, and Paweł Rzążewski.

Clique-width: Harnessing the power of atoms.
arXiv preprint, (arXiv:2006.03578), 2020.



Jana Novotná.

Clique-width of atoms and coloring for hereditary graphs.
<https://www.youtube.com/watch?v=iT9uIHE9-vw>.



Daniël Paulusma.

Clique-width and graph colouring for hereditary graph classes.
<https://www.youtube.com/watch?v=qO-IWNnuFYE>.

Dziękuję za uwagę!