



FORMICPROTECT – to pierwszy lek weterynaryjnym w Polsce, który zwalcza roztocza także pod zasklepem (informacja w karcie charakterystyki, punkt 5.1).

WSKAZANIA LECZNICZE: leczenie warrozy wywołanej przez Varroa destructor u pszczoły miodnej.

PRZECIWWSKAZANIA: nie stosować, jeśli temperatury nie mieszczą się w zakresie 10 –29,5°C.

SKŁAD: każdy pasek zawiera substancję czynną: kwas mrówkowy: 68,2 g.

DAWKOWANIE: 1 saszetka (tj. 2 paski) na 1 ul, przez 7 dni.


Jeśli zamierzamy powtórzyć kurację należy zachować co najmniej miesiąc przerwy między podaniami.



ZUŻYTE PASKI MOŻNA PODDAĆ KOMPOSTOWANIU.

OKRES KARENCJI: miód - zero dni.

INSTRUKCJE OGÓLNE: w przypadku uli z dwoma korpusami gniazdowymi należy wyłożyć dwa paski, układając je naprzemiennie tak, aby leżały płasko i na całej szerokości dolnego korpusu, pośrodku strefy wychowu czerwiu, z zachowaniem odległości około 5 cm między paskami oraz 10 cm między granicą gniazda, a zewnętrznymi krawędziami pasków. W przypadku uli z jednym korpusem gniazdowym należy wyłożyć dwa paski na płasko w poprzek ramek, bezpośrednio nad strefą wychowu czerwiu. Przez cały czas trwania leczenia wylot musi być otwarty na całą szerokość, przy wysokości minimum 12,5 mm, z nieograniczonym dostępem do części gniazdowej. W ulach z wylotami zwężonymi na stałe należy zapewnić dodatkowe szczeliny wentylacyjne.



OPAKOWANIE: 10 saszetek dla 10 rodzin pszczelich.

LEK PODLEGA REFUNDACJI PRZEZ KOWR.

WSZYSTKIE INFORMACJE ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE NA OPAKOWANIU PRODUKTU ORAZ W KARCIE CHARAKTERYSTYKI. PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ULOTKĄ "PRZYLEKOWĄ".

