Exercice 1

1.1 Question de cours

1) Définition d'un champ de force centrale conservatif.
2) Application du théorème du moment cinétique : le moment cinétique est constant, mouvement plan, loi des aires.

1.0 Mise en orbite d'une sonde spatiale

On souhaite mettre en orbite une sonde spatiale (s) autour de Mars. Ce véhicule possède au point A la vitesse $\overrightarrow{v_A}$ et présente un « paramètre d'impact » b.

Données :

- $v_A = 2,5\ \mathrm{km \cdot s^{-1}}$;
- rayon de Mars : $r_M = 3397$ km ;
- masse de Mars : $M_M = 6,39 \cdot 10^{23}$ kg.



1) Au point A, on suppose que le véhicule est assez éloigné de Mars pour pouvoir négliger l'énergie gravitationnelle. En déduire l'expression de l'énergie mécanique et la nature de la trajectoire de (S). Montrer que le moment cinétique se conserve et définir la constante des aires C. Calculer C en fonction de v_A et b. Sachant que la trajectoire d'approche est tangente au cercle de rayon $\alpha \cdot r_M$ en B, calculer v_B (vitesse en C) en fonction de v_A, r_M, α et b.
2) Exprimer le paramètre d'impact b, en fonction de r_M, v_A, M_M et α. Application numérique pour $\alpha = 3$.
3) Déterminer la distance minimale b_m pour que le véhicule évite la surface de Mars.
4) Déterminer la vitesse v_c d'un objet sur l'orbite circulaire de rayon $3r_M$ ainsi que sa période de révolution en fonction des données. Effectuer l'application numérique.
5) Au point C (avec $\alpha = 3$), on veut que le véhicule passe sur l'orbite circulaire de rayon $3r_M$. Déterminer la variation de vitesse Δv_c à communiquer au véhicule en fonction des données. Application numérique.

Exercice 2

2.1 Question de cours

1) Mouvement d'une particule dans champ électrique $\vec{E}$ uniforme et stationnaire.
2) Idem dans $\vec{B}$.

2.0 Chute d'un satellite Starlink

Les satellites Starlink sont lancés régulièrement à des orbites basses, d'altitude $H = 600$ km, dans le but de déployer un réseau internet mondial. Un satellite Starlink de masse m est en orbite autour de la Terre de masse M. Le référentiel géocentrique est supposé galiléen. On note G la constante de gravitation.

1) Montrer que $C = r^2\dot{\theta}$ est une constante à partir du théorème du moment cinétique (2e loi de Képler).
2) On donne l'accélération en coordonnées polaires, $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e_r} + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{e_\theta}$. Donner l'expression de la force de gravitation qui s'exerce sur le satellite, puis projeter le PFD. Dans l'hypothèse d'une trajectoire circulaire de rayon r, montrer que la vitesse du satellite sur son orbite a pour expression

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}.$$

Sur cet orbite circulaire, on constate que l'altitude du satellite diminue à chaque période d'une hauteur $h \ll r$ en raison des frottements fluides avec l'atmosphère terrestre. On décrit ces frottements par une force quadratique $\vec{F} = -\alpha m v\, \vec{v}$. Le coefficient α est une constante.

3) Montrer que la variation d'énergie mécanique induite par les frottements au cours d'une période a pour expression $\Delta E_\mathrm{m} = -2\pi\alpha G m M$.
4) Déterminer l'expression de l'énergie mécanique E_m. En déduire l'altitude h perdue par période en fonction de α, de l'altitude du satellite H et du rayon terrestre R_T. Application numérique.

Données :

constante de gravitation	: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \mathrm{m^3 \cdot kg^{-1} \cdot s^{-2}}$
coefficient de frottement	: $\alpha = 1{,}5 \times 10^{-15}\ \mathrm{m^{-1}}$
rayon terrestre	: $R_\mathrm{T} = 6\,360$ km

Exercice 3

3.1 Question de cours

1) Définition moment cinétique.
2) Théorème du moment cinétique par rapport à un point, à un axe. Notion de bras de levier.

3.0 Moment cinétique et pendule simple amorti

Un objet ponctuel A de masse m est suspendu à l'extrémité P d'un fil inextensible de masse négligeable et de longueur $L = OP$. Il peut effectuer des mouvements de rotation dans le plan vertical (Oxy), autour de l'axe horizontal (Oz). La position de l'objet A est repérée par l'angle θ que fait le fil avec la verticale.



L'étude est menée dans le référentiel terrestre considéré comme galiléen.L'ensemble ainsi décrit se trouve dans le champ de pesanteur terrestre d'accélération $\vec{g} = g\vec{e_x}$.

1) Exprimer les moments des forces en O qui s'appliquent sur la masse m en négligeant les frottements.
2) On rappelle l'expression de la vitesse $\vec{v} = L\dot{\theta}\vec{e_\theta}$ en coordonnées polaires. Calculer le moment cinétique $\vec{L}_O$ et appliquer le théorème du moment cinétique.
3) En déduire l'équation différentielle vérifiée par $\theta(t)$ en supposant $\theta \ll 1$. Quelle est le nom de l'équation ainsi obtenue ? Exprimer la période T des petites oscillations. *Application numérique* pour $L = 20\,\text{cm}$.
4) L'air exerce une force de frottement fluide $\vec{F} = -\lambda\vec{v}$. Appliquer le théorème du moment cinétique et déterminer l'équation différentielle vérifiée par $\theta(t)$.