


气体训练 2

高考中的变质量

1. (2020 高考) 为方便抽取密封药瓶里的药液，护士一般先用注射器注入少量气体到药瓶里后再抽取药液，如图所示，某种药瓶的容积为 0.9mL ，内装有 0.5mL 的药液，瓶内气体压强为 $1.0 \times 10^5 \text{Pa}$ ，护士把注射器内横截面积为 0.3cm^2 、长度为 0.4cm 、压强为 $1.0 \times 10^5 \text{Pa}$ 的气体注入药瓶，若瓶内外温度相同且保持不变，气体视为理想气体，求此时药瓶内气体的压强。




2. (2020 高考) 甲、乙两个储气罐储存有同种气体（可视为理想气体）。甲罐的容积为 V ，罐中气体的压强为 p ；乙罐的容积为 $2V$ ，罐中气体的压强为 $\frac{p}{2}$ 。现通过连接两罐的细管把甲罐中的部分气体调配到乙罐中去，两罐中气体温度相同且在调配过程中保持不变，调配后两罐中气体的压强相等。求调配后：

- (1) 两罐中气体的压强
- (2) 甲罐中气体的质量与甲罐中原有气体的质量之比

3. (2020 高考) 潜水钟是一种水下救生设备，它是一个底部开口、上部封闭的容器，外形与钟相似。潜水钟在水下时其内部上方空间里存有空气，以满足潜水员水下避险的需要。为计算方便，将潜水钟简化为截面积为 S 、高度为 h 、开口向下的圆筒；工作母船将潜水钟由水面上方开口向下吊放至深度为 H 的水下，如图所示。已知水的密度为 ρ ，重力加速度大小为 g ，大气压强为 p_0 ， $H \gg h$ ，忽略温度的变化和水密度随深度的变化。

- (1) 求进入圆筒内水的高度 l
- (2) 保持 H 不变，压入空气使筒内水全部排出，求压入的空气在其压强为 p_0 时的体积。



4. (2020 高考) 中医拔罐的物理原理是利用玻璃罐内外的气压差使罐吸附在人体穴位上, 进而治疗某些疾病。常见拔罐有两种, 如图所示, 左侧为火罐, 下端开口; 右侧为抽气拔罐, 下端开口, 上端留有抽气阀门。使用火罐时, 先加热罐中气体, 然后迅速按到皮肤上, 自然降温后火罐内部气压低于外部大气压, 使火罐紧紧吸附在皮肤上。抽气拔罐是先把罐体按在皮肤上, 再通过抽气降低罐内气体压强。某次使用火罐时, 罐内气体初始压强与外部大气压相同, 温度为 450 K , 最终降到 300 K , 因皮肤凸起, 内部气体体积变为罐容积的 $\frac{20}{21}$ 。若换用抽气拔罐, 抽气后罐内剩余气体体积变为抽气拔罐容积的 $\frac{20}{21}$, 罐内气压与火罐降温后的内部气压相同。罐内气体均可视为理想气体, 忽略抽气过程中气体温度的变化。求应抽出气体的质量与抽气前罐内气体质量的比值。




5. (2021 高考) 某双层玻璃保温杯夹层中有少量空气, 温度为 27°C 时, 压强为 $3 \times 10^3\text{ Pa}$ 。
- (1) 当夹层中空气的温度升至 37°C , 求此时夹层中空气的压强;
 - (2) 当保温杯外层出现裂隙, 静置足够长时间, 求夹层中增加的空气质量与原有空气质量的比值, 设环境温度为 27°C , 大气压强为 $1 \times 10^5\text{ Pa}$ 。

高考中的气缸与液柱

6. (2021 高考) 如图, 一汽缸中由活塞封闭有一定量的理想气体, 中间的隔板将气体分为 A、B 两部分; 初始时, A、B 的体积均为 V , 压强均等于大气压 p_0 , 隔板上装有压力传感器和控制装置, 当隔板两边压强差超过 $0.5p_0$ 时隔板就会滑动, 否则隔板停止运动。气体温度始终保持不变。向右缓慢推动活塞, 使 B 的体积减小为 $\frac{V}{2}$ 。

- (1) 求 A 的体积和 B 的压强
- (2) 再使活塞向左缓慢回到初始位置, 求此时 A 的体积和 B 的压强。



7. (2021 高考) 如图，一玻璃装置放在水平桌面上，竖直玻璃管 A、B、C 粗细均匀，A、B 两管的上端封闭，C 管上端开口，三管的下端在同一水平面内且相互连通。A、B 两管的长度分别为 $l_1 = 13.5\text{cm}$, $l_2 = 32\text{cm}$ 。将水银从 C 管缓慢注入，直至 B、C 两管内水银柱的高度差 $h = 5\text{cm}$ 。已知外界大气压为 $p_0 = 75\text{cmHg}$ 。求 A、B 两管内水银柱的高度差。

