

Task 4: ДППГ. Маневр Еплі(ok)

Відповідальний підрозділ: Кафедра неврології та нейрохірургії
Автори:

- 1. Солодовнікова Юлія Олександрівна — розробка завдання , внутрішнє рецензування (відносна частка участі — 50%)
- 2. Ярова Ксенія Олександрівна — розробка завдання , введення в електронну систему (відносна частка участі — 50%)

Компетенції:
Мета завдання: Оцінити навички виконання лікувального маневру при ДППГ
Обладнання:

- 1. Кушетка

Витратні матеріали:
Не потрібно
Брифінг

Ви лікар-невропатолог у поліклініці. До Вас звернулась жінка 45-ти років, зі скаргами на головокружіння, яке почало турбувати вночі після того, як вона вирішила перевернутись з одного боку на інший. Також будь-які рухи головою викликали відчуття «як на атракціоні».

ok

Текст завдання

Ви лікар-невропатолог у поліклініці. До Вас звернулась жінка 45-ти років, зі скаргами на головокружіння, яке почало турбувати вночі після того, як вона вирішила перевернутись з одного боку на інший. Також будь-які рухи головою викликали відчуття «як на атракціоні».

- 1. Встановіть попередній діагноз.
- 2. Проінформуйте про необхідність проведення маневру Еплі.

ok

Чеклист

1. -Привітатися з пацієнтом, представитися, запитати як може звертатись до пацієнта Значення: 2%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
2. -Запитати що вас турбує, виділити провідні скарги Значення: 5%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
3. -Уточнити характер головокружіння, тривалість, що провокує, супутні симптоми Значення: 5%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
4. -Зібрати анамнез життя Значення: 5%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
5. -Встановити попередній діагноз, пояснити характер захворювання Значення: 5%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
6. -Пояснити що один з методів лікування це маневр Еплі, пояснити як проводиться маневр Значення: 5%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
7. -Запитати чи пацієнт не проти проведення маневру Значення: 5%	

☐ Не виконано	☐ Виконано
8. -Попросити пацієнта сісти на кушетку, так щоб коли він ляже на спину голова звисала Значення: 10%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
9. -Попросити повернути голову на 45 градусів в сторону хворого вуха і лягти в такому положенні на спину, щоб голова трохи звисала. Значення: 10%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
10. -Попросити залишатись в такому положенні 30 секунд Значення: 10%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
11. - Попросити повернути голову в іншу сторону на 90 градусів, залишаєсь в такому положенні 30 секунд. Значення: 10%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
12. -Попросити повернути тулуб в напрямленні нахилу голови і побути так 30 секунд Значення: 10%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
13. -Повернутись у вихідне положення сидячи. Значення: 10%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
14. -Запитати як себе почуває пацієнт Значення: 2%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
15. -Надати рекомендації що до подальшого лікування та профілактики Значення: 6%	
☐ Не виконано	☐ Виконано

Інструкції для актора

№ п/п	Лікар	Пацієнт
1.	Доброго дня, я лікар-невропатолог. Мене звати ... Як я можу до Вас звертатись? Що вас турбує на даний момент?	Доброго дня, мене звати Інна. Турбує головокружіння, особливо при рухах головою.
2.	Коли з'явилося головокружіння?	Вночі, після того як перевернулася на праву сторону
3.	Крім головокружіння ще щось турбує?	Ще під час головокружіння нудить
4.	Зараз головокружіння турбує менше чи більше?	Менше, але при повороті голови посилюється.
5.	Ваш ймовірний діагноз: Доброякісне позиційне пароксизмальне головокружіння, яке виникає, коли отоліти (крихкі кристали карбонату кальцію) – відокремлюються від отолітової мембрани, а потім переміщуються в півкružні канали. Внаслідок цього і виникає головокружіння.	Зрозуміло, як потрібно лікувати?
6.	Лікується за допомогою маневру Еплі, який змінює місце розташування отоліту і головокружіння не виникає. Під час маневру Ви можете відчувати головокружіння. З Вашого дозволу я проведу його зараз.	Так, звичайно
7.	Маневр Еплі виконується на кушетці. Необхідно повернути голову на 45 градусів в сторону хворого вуха і лягти в такому положенні на спину, щоб голова трохи звисала. Залишатись в такому положенні 30 секунд, потім повернути голову в іншу сторону на 90 градусів, залишаєсь в такому положенні 30 секунд. Далі повернути тулуб в напрямленні нахил голови так, щоб ніс дивився вниз, залишатись в такому положенні 30 секунд. Повернутись у вихідне положення сидячи. Цей маневр проводити тричі.	
8.	Як Ви себе почуваєтесь?	Набагато краще, дуже вам дякую.
9.	Вдома Ви можете також виконувати самостійно вправи брандта дароффа.	Дякую лікарю, до побачення.

pk