

Task 3: Альтернуючий синдром (ok)

Відповідальний підрозділ: Кафедра неврології та нейрохірургії
Автори:

- 1. Солодовнікова Юлія Олександрівна — розробка завдання , внутрішнє рецензування (відносна частка участі — 50%)
- 2. Саражина Катерина Святославівна — розробка завдання , введення в електронну систему (відносна частка участі — 50%)

Компетенції:
Мета завдання: Встановлення топичного діагнозу
Обладнання:
Не потрібно
Витратні матеріали:
Не потрібно
Брифінг

До вас доставлено чоловіка 68 років, який раптово відчув слабкість у лівій руці та нозі, утруднення ходи та двоїння в очах. Оточуючі помітили, що в нього «з'їхало» праве віко та око «дивиться назовні». Пацієнт скаржиться на затруднення фокусування зору та погане орієнтування в просторі. У минулому — гіпертонічна хвороба, миготлива аритмія.

ok

Текст завдання

До вас доставлено чоловіка 68 років, який після пробудження відчув слабкість у лівій руці та нозі, утруднення ходи та двоїння в очах. Оточуючі помітили, що в нього «з'їхало» праве віко та око «дивиться назовні». Пацієнт скаржиться на затруднення фокусування зору та погане орієнтування в просторі. У минулому — гіпертонічна хвороба, миготлива аритмія. При огляді виявлено: птоз правої повіки, правосторонній мідріаз, око фіксоване назовні та вниз, відсутність реакції правої зіниці на світло, центральний лівобічний геміпарез.

- 1. Встановіть попередній діагноз, топичний діагноз. Назвіть альтернуючий синдром. Який черепний нерв уражено?З якого боку?
- 2. Вкажіть в якому судинному басейні стався інсульт?
- 3. Вкажіть необхідний метод нейровізуалізації. Яка тактика лікування?

ok

Чеклист

1. -Встановити попередній діагноз ішемічний інсульт Значення: 5%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
2. -Визначити топіку ураження — середній мозок (ніжка мозку, вентральна частина) Значення: 5%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
3. -Назвати синдром Вебера Значення: 10%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
4. -Зазначити ураження ІІІ пари ЧН (n. oculomotorius) Значення: 15%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
5. -Зазначити ураження ядра ІІІ пари Значення: 10%	

☐ Не виконано	☐ Виконано
6. -Визначити наявність птозу, мідріазу, офтальмоплегії — праворуч (іпсілатерально) Значення: 15%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
7. -Вказати, що геміпарез лівобічний — через ураження кортико-спінального шляху (контралатерально) Значення: 15%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
8. -вказати в басейні якої артерії стався інсульт Значення: 15%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
9. -Призначити МРТ головного мозку Значення: 5%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
10. -Госпіталізувати пацієнта в інсультне відділення Значення: 5%	
☐ Не виконано	☐ Виконано

Інструкції для актора
