

Esercizi – algoritmi, su carta

Lezione coperta: L03 – algoritmi, linguaggi e programmazione

Non serve il calcolatore. Servono carta e penna. Qui non si scrive codice: si scrivono **passi numerati in italiano**, e si eseguono a mano. È l'esercizio che rende possibile tutto il resto del corso, ed è anche l'unico che si può fare in treno.

I dati sono veri. Sono le temperature registrate a Milano nel gennaio 2011, dal file che useremo tutto l'anno. Le massime dal 9 al 15:

9 gen	10	11	12	13	14	15
5	6	8	9	10	3	3

e le minime dal 1° al 6:

1 gen	2	3	4	5	6
-4	-5	-3	-1	-2	-3

Come si lavora. Gli esercizi salgono di difficoltà in tre gradini: prima **seguire** un algoritmo già scritto, poi **trovare** l'errore in uno che quasi funziona, infine **scriverne** uno tu. Le soluzioni sono sotto ogni esercizio: aprile dopo aver provato, perché la difficoltà qui non è capire la risposta, è arrivarci.

Primo gradino – seguire

Esercizio 1 – La somma (difficoltà: •)

Esegui questo algoritmo sulle **massime** (5, 6, 8, 9, 10, 3, 3):

1. totale vale 0
2. prendi il primo valore dell'elenco
3. aggiungi il valore che hai in mano a totale
4. se ci sono ancora valori, prendi il successivo e torna al passo 3
5. scrivi totale

Rispondi a due domande: **quanto vale totale** alla fine, e **quante volte** viene eseguito il passo 3.

Soluzione

Mostra la soluzione

totale vale **44**, e il passo 3 viene eseguito **7 volte**, una per valore.

Se hai seguito i passi scrivendo il valore di totale dopo ognuno — 0, 5, 11, 19, 28, 38, 41, 44 — hai fatto la cosa che conviene fare sempre: tenere traccia di come cambia ciò che cambia.

Esercizio 2 — Contare con una condizione (difficoltà: •)

Sempre sulle massime:

1. quanti vale 0
2. prendi il primo valore
3. se il valore è **maggiore di 5**, aumenta quanti di 1
4. se ci sono ancora valori, prendi il successivo e torna al passo 3
5. scrivi quanti

Quanto vale quanti? E quante volte viene eseguito il **confronto** del passo 3?

Soluzione

Mostra la soluzione

quanti vale **4**: superano il 5 i giorni con 6, 8, 9 e 10.

Il confronto viene eseguito **7 volte**, una per valore — anche quando la risposta è no. È una distinzione che tornerà: *quante volte guardo* e *quante volte agisco* sono due conteggi diversi.

Esercizio 3 — Il più grande (difficoltà: •)

1. massimo vale il **primo** valore dell'elenco
2. prendi il valore successivo
3. se il valore che hai in mano è maggiore di massimo, allora massimo prende quel valore
4. se ci sono ancora valori, prendi il successivo e torna al passo 3
5. scrivi massimo

Sulle massime: quanto vale massimo alla fine, e **quante volte** viene eseguito il passo 3 — cioè quante volte massimo cambia davvero?

Soluzione

Mostra la soluzione

massimo vale **10**, e cambia **4 volte**: 5 diventa 6, poi 8, poi 9, poi 10. Gli ultimi due giorni, a 3 gradi, non lo cambiano.

Nota il passo 1: massimo parte dal **primo valore dell'elenco**, non da zero. Il perché è l'esercizio 6.

Secondo gradino – trovare l'errore

Ogni algoritmo di questa sezione **quasi** funziona. Per ciascuno: esegilo sui dati indicati, scrivi cosa produce, e di' **quale passo cambieresti e come**.

Esercizio 4 – La media che non torna (difficoltà: ••)

Sulle **otto** caselle dal 9 al 16 gennaio, dove il 16 è vuoto – quindi 5, 6, 8, 9, 10, 3, 3 e una casella senza misura:

1. totale vale 0, quante vale 8
2. prendi la prima casella
3. se la casella contiene una misura, aggiungi la misura a totale
4. se ci sono ancora caselle, prendi la successiva e torna al passo 3
5. scrivi totale diviso quante

Cosa produce? E cosa dovrebbe produrre?

Soluzione

Mostra la soluzione

Produce **$44 / 8 = 5,5$** . Dovrebbe produrre **$44 / 7 = 6,29$** .

L'algoritmo è attento a non sommare le caselle vuote, ma poi divide per **quante caselle ci sono** invece che per **quanti valori ha sommato**.

Il passo da cambiare è il **primo**: quante non deve valere 8 in partenza, deve valere 0 e crescere di 1 ogni volta che il passo 3 somma qualcosa.

È l'errore più insidioso della sezione perché il risultato è **plausibile**: 5,5 gradi a gennaio non fa sospettare niente.

Esercizio 5 – Il massimo che parte male (difficoltà: ••)

Sulle **minime** (-4, -5, -3, -1, -2, -3):

1. massimo vale 0

2. prendi il primo valore
3. se il valore è maggiore di `massimo`, allora `massimo` prende quel valore
4. se ci sono ancora valori, prendi il successivo e torna al passo 3
5. scrivi `massimo`

Soluzione

Mostra la soluzione

Produce **0**, che non è nessuno dei valori dell'elenco. La risposta giusta è **-1**, il 4 gennaio.

`massimo` parte da 0, e nessuna temperatura negativa riesce a superarlo: la condizione del passo 3 è sempre falsa e il valore iniziale sopravvive fino in fondo.

Il passo da cambiare è il **primo**: `massimo` deve partire dal **primo valore dell'elenco**, come nell'esercizio 3. Chi sceglie «parto da un numero molto piccolo» risolve il caso di oggi e ne prepara un altro per il giorno in cui i dati saranno più piccoli di quel numero.

Esercizio 6 – L'azzeramento di troppo (difficoltà: ••)

Sulle massime:

1. prendi il primo valore
2. `totale` vale 0
3. aggiungi il valore a `totale`
4. se ci sono ancora valori, prendi il successivo e torna al passo 2
5. scrivi `totale`

Soluzione

Mostra la soluzione

Produce **3**, cioè l'ultimo valore, e non 44.

Il passo 2 sta **dentro** il giro: `totale` viene azzerato prima di ogni somma, quindi alla fine contiene solo l'ultimo valore aggiunto.

Non c'è un passo da riscrivere, c'è un passo da **spostare**: l'azzeramento va prima del passo 1, cioè prima che il giro cominci. Confronta con l'esercizio 1, dove l'ordine è giusto.

Esercizio 7 – Un valore di troppo, o uno di meno (difficoltà: ••)

Vogliamo contare i giorni in cui la massima è stata **almeno 3 gradi**. Sulle massime:

1. quanti vale 0
2. prendi il primo valore
3. se il valore è **maggiore di 3**, aumenta quanti di 1
4. se ci sono ancora valori, prendi il successivo e torna al passo 3
5. scrivi quanti

Soluzione

Mostra la soluzione

Produce **5**, ma la risposta giusta è **7**: tutti e sette i giorni hanno almeno 3 gradi, compresi i due giorni a 3 esatti.

«Almeno 3» significa «**maggiore o uguale** a 3», e il passo 3 dice solo «maggiore». I due giorni a 3 gradi cadono esattamente sul confine e vengono esclusi.

È un errore che non si vede mai sui dati di mezzo e si vede sempre sui casi al bordo — ed è il motivo per cui, quando si prova un algoritmo, conviene scegliere apposta un dato che stia **esattamente** sulla soglia.

Esercizio 8 — Il caso che non c'è (difficoltà: ••)

L'algoritmo della media, questa volta scritto bene:

1. totale vale 0, quanti vale 0
2. prendi la prima casella
3. se la casella contiene una misura: aggiungi la misura a totale e aumenta quanti di 1
4. se ci sono ancora caselle, prendi la successiva e torna al passo 3
5. scrivi totale diviso quanti

Esegui su una settimana in cui **il sensore è rimasto spento**: sette caselle, tutte vuote. Cosa succede?

Soluzione

Mostra la soluzione

Al passo 5 si divide 0 per **0**, che non è un numero.

L'algoritmo non è sbagliato: è **incompleto**. Non dice cosa fare quando non c'è nessuna misura, e quel caso non è impossibile — un sensore guasto, un file troncato, un mese non ancora cominciato.

La correzione è un passo in più prima del 5: *se quanti vale 0, scrivi «non ci sono misure» e fermati*. Qualunque cosa si decida va bene, purché sia **deciso**: il problema non è la risposta, è il silenzio.

Terzo gradino — scrivere

Qui non c'è un algoritmo da seguire: c'è un problema in italiano, e devi produrre tu i passi numerati. Scrivi anche, in testa, **cosa serve in ingresso** e **cosa si ottiene alla fine**.

Esercizio 9 — Sopra la media (difficoltà: ...)

Data una serie di temperature, scrivi l'algoritmo che dice **quanti giorni** hanno avuto una massima superiore alla media del periodo.

Provalo sulle massime e verifica il risultato a mano.

Soluzione

Mostra la soluzione

Ingresso: un elenco di temperature. **Uscita:** un numero.

1. calcola la media dell'elenco (è l'algoritmo dell'esercizio 8)
2. `quanti` vale 0
3. prendi il primo valore
4. se il valore è maggiore della media, aumenta `quanti` di 1
5. se ci sono ancora valori, prendi il successivo e torna al passo 4
6. scrivi `quanti`

Sulle massime la media è 6,29 e la risposta è **3**: i giorni da 8, 9 e 10 gradi.

La cosa da notare, e che quasi tutti scoprono sbagliando: **l'elenco va percorso due volte**. La prima per sapere la media, la seconda per contare — perché al primo giro la media non esiste ancora, e confrontare un valore con una media che sta ancora crescendo non significa niente.

Esercizio 10 — È già ordinato? (difficoltà: ...)

Dato un elenco di numeri, scrivi l'algoritmo che risponde **sì** o **no** alla domanda: i valori sono in ordine crescente?

Non devi ordinarli. Devi solo dire se lo sono già.

Soluzione

Mostra la soluzione

Ingresso: un elenco di numeri. **Uscita:** sì oppure no.

1. prendi il primo valore e chiamalo precedente

2. prendi il valore successivo e chiamalo corrente
3. se corrente è minore di precedente, scrivi «no» e **fermati**
4. precedente prende il valore di corrente
5. se ci sono ancora valori, prendi il successivo come corrente e torna al passo 3
6. scrivi «sì»

Sulle massime la risposta è **no**, e l'algoritmo se ne accorge al sesto valore: dopo il 10 arriva il 3.

Due cose meritano attenzione. La prima è il passo 3: si può **uscire prima** della fine, appena la risposta è certa — non serve guardare il resto. La seconda è il passo 6: il «sì» si scrive solo se il giro è finito senza mai fermarsi, cioè *dopo* aver guardato tutti. Chi mette il «sì» dentro il giro lo scrive a ogni coppia in ordine, e risponde sette volte a una domanda sola.

Esercizio 11 — Togliere i buchi (difficoltà: •••)

Data una serie di **caselle** in cui alcune contengono una misura e altre sono vuote, scrivi l'algoritmo che produce un **nuovo elenco** con le sole misure presenti, nello stesso ordine.

È il passo che, nell'attività di gruppo, il programma principale si è tenuto per sé.

Soluzione

Mostra la soluzione

Ingresso: una serie di caselle. **Uscita:** un elenco di numeri.

1. risultato è un elenco vuoto
2. prendi la prima casella
3. se la casella contiene una misura, aggiungi quella misura in fondo a risultato
4. se ci sono ancora caselle, prendi la successiva e torna al passo 3
5. scrivi risultato

Sulle otto caselle dal 9 al 16 gennaio il risultato ha **7** valori.

La differenza rispetto a tutti gli algoritmi precedenti è cosa si accumula: là era un numero che cresceva, qui è un **elenco** che si allunga. È la stessa idea — si parte da niente e si aggiunge un pezzo alla volta — applicata a una cosa diversa da un numero.