

Sakady i supresja sakadyczna: co to jest i kiedy do lekarza?



Sakady to szybkie skoki oczu między punktami: z litery na literę, z lusterka na drogę, z twarzy rozmówcy na jego gest. Wykonujesz ich zwykle 40 000-150 000 dziennie, ale nie widzisz rozmazania, bo działa supresja sakadyczna. Mózg na ułamek sekundy wycisza obraz w czasie ruchu oka i skleja stabilny kadr. Po 50-tce wolniejsza reakcja bywa normalna, ale nagle podwójne widzenie, oczopląs albo utrata precyzji spojrzenia wymagają kontroli.

Szybka odpowiedź

Sakady to krótkie, bardzo szybkie ruchy oczu. Supresja sakadyczna oznacza, że mózg chwilowo przycisza obraz podczas takiego ruchu, żebyś nie widział smug i skakania świata. Dlatego nie zobaczysz własnych oczu w ruchu w lustrze. Po 50-tce stopniowe spowolnienie może być normalne, ale nagle podwójne widzenie, oczopląs lub trudność z utrzymaniem spojrzenia to powód do konsultacji.

Kluczowe wnioski

Sakady są niewidoczne w codziennym życiu, ale bez nich nie da się czytać, prowadzić auta ani szybko przenosić uwagi. Najważniejsze jest rozróżnienie: normalne spowolnienie po 50-tce to jedno, a nagle podwójne widzenie lub oczopląs to sygnał do lekarza.

- Wykonujesz od 40 000 do 150 000 sakad dziennie — to więcej niż uderzeń twojego serca w ciągu doby.
- Supresja sakadyczna zaczyna się 50–100 ms przed ruchem oka — mózg wyłącza obraz zanim oko jeszcze ruszyło.
- Podczas czytania twoje oczy cofają się do tyłu w ok. 10–15% ruchów — i nic z tego nie zauważasz.
- Po 50. roku życia latencja sakad wydłuża się o 20–30 ms, ale regularna aktywność fizyczna spowalnia ten proces.

Czym są sakady i dlaczego nigdy ich nie widzisz?

Sakada to bardzo szybki, balistyczny ruch gałki ocznej, który przenosi punkt fiksacji wzroku z jednego miejsca na drugie. Nazwa pochodzi od starofrancuskiego słowa saccade oznaczającego gwałtowne szarpnięcie. Pojedyncza sakada trwa od 20 do 200 milisekund, a gałka oczna osiąga podczas niej prędkość kątową nawet 700 stopni na sekundę.


Kluczowe słowo to **balistyczny**. Gdy mózg raz zaprogramuje sakadę i ją wystrzeli, nie możesz jej już zmienić

ani zatrzymać — jak strzała po wypuszczeniu z łuku. To odróżnia sakadę od płynnych ruchów śledzenia (ang. *smooth pursuit*), którymi podążasz wzrokiem za poruszającym się obiektem. Sakady robisz cały czas: czytając tekst, rozglądając się po pokoju, oglądając mecz czy prowadząc samochód. Zobacz też [markery krwi i zdrowie mózgu](#).

Nie widzisz sakad z prostego powodu: mózg je przed tobą ukrywa. W czasie każdego skoku obraz na siatkówce jest silnie rozmazany. Gdybyś to widział, świat wyglądałby jak film kręcony przez kogoś, kto nigdy nie słyszał o statywie. Evolucja znalazła na to eleganckie rozwiązanie: aktywne wygaszenie wrażliwości wzrokowej w czasie ruchu, znane jako supresja sakadyczna.

- Czas trwania sakady: 20–200 ms w zależności od kąta obrotu
- Prędkość szczytowa: do 700 stopni kątowych na sekundę
- Charakter ruchu: balistyczny — nie do zatrzymania po wystrzeleniu
- Częstość: 3–5 sakad na sekundę podczas aktywnego patrzenia

Sakada w jednym zdaniu To krótki skok oka z jednego punktu na drugi. Nie widzisz samego skoku, bo mózg wycisza rozmazany obraz i skleja poprzedni kadr z następnym.



Jedna sakada o kącie 10 stopni trwa ok. 45 ms i osiąga prędkość szczytową ok. 300 stopni/s w połowie drogi. Jej trajektorie nie można zmienić po rozpoczęciu.

Ile sakad wykonujesz dziennie? Liczby, które zaskoczą?

Wykonujesz od 40 000 do 150 000 sakad dziennie — a niektóre szacunki uwzględniające mikrosakkady mówią nawet o 250 000. Dla porównania: twoje serce bije ok. 100 000 razy na dobę. Sakady są jednym z najczęściej wykonywanych ruchów w twoim ciele — i niemal nigdy się o nich nie mówi.

Skąd tak duże rozbieżności w szacunkach? Zależy od metodologii i tego, co liczymy. Przy aktywnym czytaniu wykonujesz 4–5 sakad na sekundę. Przy swobodnym rozglądaniu się po pokoju — ok. 3. Podczas snu w fazie REM gałki oczne wykonują intensywne sakadopodobne ruchy. Jeśli przyjmiesz 16 godzin aktywności wzrokowej dziennie przy średnio 3 sakadach na sekundę, wychodzi ok. 172 000 sakad — nie licząc mikrosakkad. Zobacz też [trening 3x30 po 50](#).

Mikrosakkady to osobna kategoria: miniaturowe, mimowolne skoki o kącie poniżej 1 stopnia, które oko wykonuje nawet podczas pozornie nieruchomej fiksacji. Badania Rolfsa opublikowane w 2009 roku w *Vision Research* wykazały, że mikrosakkady pojawiają się 1–2 razy na sekundę podczas każdej fiksacji i pełnią istotną funkcję: przeciwdziałają adaptacji siatkówki, która zachodziłaby przy absolutnie nieruchomym obrazie.

- Sakady standardowe: 40 000–150 000 dziennie przy 16 h aktywności
- Mikrosakkady: 1–2 na sekundę podczas każdej fiksacji
- Sakady w fazie REM: intensywne serie przez całą noc
- Sakady korekcyjne: dodatkowe drobne korekty po niedokładnym pierwszym skoku

Ile razy dziennie oczy robią taki skok? Najczęściej podaje się zakres 40 000–150 000 sakad dziennie przy około 16 godzinach aktywności. To dlatego oczy mogą się męczyć nawet wtedy, gdy „tylko czytasz” albo

pracujesz przy ekranie.



Porównanie częstości najważniejszych automatycznych czynności ciała w ciągu doby. Sakady są najczęstsze — i najbardziej niewidoczne.

Co widzi twoja siatkówka podczas sakady? Rozmazany film?


Siatkówka jest uczciwa — rejestruje wszystko, co pada na nią w czasie ekspozycji. Podczas sakady oko porusza się błyskawicznie, więc obraz na siatkówce rozmywa się dokładnie tak samo jak przy długim czasie naświetlania w fotografii. Każdy fotoreceptor w centralnej plamce żółtej, która ma rozdzielczość rzędu 1 minuty kątowej, zamiast punktu rejestruje ciągłą smugę rozciągniętą wzdłuż toru ruchu oka.

Gdyby mózg wiernie odtwarzał ten sygnał siatkówkowy, każda sakada wyglądałaby jak gwałtowne szarpnięcie kadru w telewizorze. Przy 3–5 sakadach na sekundę cały dzień byłby jednym wielkim migotaniem. Ewolucja uznała to za kompletnie nieakceptowalne i znalazła eleganckie rozwiązanie. Zobacz też [sen po 50 i regeneracja układu nerwowego](#).

Supresja sakadyczna, opisana po raz pierwszy przez Whatmore i Kohutsa w 1961 roku i szczegółowo zbadana przez Martina Matina w klasycznym przeglądzie z 1974 roku w *Psychological Bulletin*, to aktywny mechanizm tłumienia sygnału wzrokowego w czasie okna sakadycznego. Supresja nie jest równomierna: tłumiony jest głównie kontrast i ruch, a kolor znacznie słabiej — mózg precyzyjnie kasuje dane mylące, zachowując użyteczne.

- Rozdzielczość plamki żółtej: 1 minuta kątowa — bezskuteczna podczas ruchu
- Efekt na siatkówce: ciągła smuga zamiast ostrych punktów
- Reakcja mózgu: aktywne wygaszenie sygnału, nie pasywna ślepota
- Selektywność: tłumiony jest głównie kontrast i ruch, kolor słabiej

Co dzieje się z obrazem w czasie skoku oka? Na siatkówce powstaje krótka smuga, ale do świadomości trafia stabilny obraz. Supresja sakadyczna tłumi przede wszystkim ruch i kontrast, czyli to, co najbardziej przeszkadzałoby w widzeniu.



Lewy panel: scena widziana podczas fiksacji. Prawy panel: co faktycznie rejestruje siatkówka w czasie sakady. Mózg kasuje prawy panel zanim dotrze do świadomości.

Co to jest supresja sakadyczna i dlaczego jej nie zauważasz?


Supresja sakadyczna (ang. saccadic suppression) to aktywne obniżenie czułości wzrokowej przez mózg w oknie czasowym tuż przed, w trakcie i krótko po sakadzie. Neurony w obszarach wzrokowych kory mózgu — szczególnie w pierwszorzędowej korze wzrokowej V1, obszarze V2 oraz obszarze MT odpowiedzialnym za percepcję ruchu — wykazują wyraźnie obniżoną odpowiedź na bodźce pojawiające się w tym oknie.

Supresja nie jest równomierna. Badania Burra, Morrone i Rossa opublikowane w 1994 roku w *Nature* wykazały, że tłumiona jest przede wszystkim droga wielkokomorową (ang. *magnocellular pathway*), odpowiedzialna za percepcję kontrastu i ruchu. Droga drobnokomórkowa (ang. *parvocellular pathway*), obsługująca kolory i drobne szczegóły, jest tłumiona znacznie słabiej. To ewolucyjna precyzja: kasowane są dane mylące, zachowywane użyteczne. Zobacz też [mobilność i sprawność po 50](#).

Mierzalnym dowodem supresji jest efekt saccadic omission: jeśli podczas sakady przez 10 milisekund zmienisz pozycję wyświetlanego obrazu, badany nie zauważy tej zmiany. Ten eksperyment, powtarzany w dziesiątkach laboratoriów od lat 70., daje wyniki konsekwentne: bodziec prezentowany w czasie sakady jest wykrywany 3–5 razy rzadziej niż ten sam bodziec przy nieruchomym oku.

- Obszary mózgu objęte supresją: V1, V2, MT (obszar ruchu)
- Co jest tłumione: kontrast, ruch — droga wielkokomórkowa
- Co jest mniej tłumione: kolor, szczegóły — droga drobnokomórkowa
- Mierzalny efekt: bodziec 3–5x rzadziej wykrywany podczas sakady

Supresja sakadyczna bez żargonu Mózg na moment przycisza sygnał z oczu tuż przed skokiem i w trakcie skoku. Nie robi czarnego ekranu; podtrzymuje poprzedni obraz, a potem płynnie podmienia go na nowy.



Czułość wzrokowa (oś Y) w funkcji czasu względem początku sakady (oś X). Supresja zaczyna się ok. 80 ms przed ruchem i trwa do ok. 100 ms po jego zakończeniu. Źródło: Ross i wsp. 2001.

Skąd mózg wie, że za chwilę ruszy oko? Efferencja kopii?


Supresja sakadyczna zaczyna się 50–100 milisekund przed fizycznym ruchem gałki ocznej. Oko jeszcze stoi w miejscu, a mózg już wygasza wrażliwość wzrokową. Oznacza to, że supresja nie może być pasywną odpowiedzią na rozmazanie siatkówkowe — musi być sterowana z góry, z wyprzedzeniem. Mechanizm, który to umożliwia, nazywa się efferencją kopii (ang. corollary discharge).

Efferencja kopii działa następująco: gdy obszary ruchowe mózgu — ciało czworacznego górnego (ang. *superior colliculus*) i pola czołowe wzroku (ang. *frontal eye fields*) — planują sakadę, jednocześnie wysyłają kopię tego rozkazu do wzgórza (ang. *mediodorsal thalamus*). Wzgórze pełni rolę przekaźnika i informuje korę wzrokową: za chwilę ruszamy — wygasimy czułość. Ten mechanizm szczegółowo opisał Roy Wurtz w przeglądzie opublikowanym w *Vision Research* w 2008 roku.

Co jeszcze bardziej fascynujące: mózg nie tylko wygasza obraz, ale aktywnie **wypełnia lukę**. Tuż przed sakadą zapamiętuje ostatni wyraźny obraz i podtrzymuje go w pamięci krótkotrwałej przez cały czas ruchu. Efektem jest subiektywne poczucie ciągłości i stabilności świata — mimo że co sekundę kilka razy dosłownie nic nie widzisz. To nie błąd systemu — to jego najważniejsza funkcja.

- Kiedy zaczyna się supresja: 50–100 ms przed fizycznym ruchem oka
- Kluczowe struktury: superior colliculus, FEF, mediodorsal thalamus, V1
- Mechanizm: kopia rozkazu ruchowego trafia do kory wzrokowej z wyprzedzeniem
- Efekt dodatkowy: mózg podtrzymuje ostatni wyraźny obraz przez czas sakady

Dlaczego mózg zdąża przed okiem? Plan ruchu oka powstaje wcześniej niż sam ruch. Kopia tego planu trafia do układu wzrokowego około 50-100 ms przed sakadą, dlatego wyciszenie obrazu zaczyna się, zanim oko ruszy.



Schemat eferencji kopii: kopia rozkazu ruchowego trafia do wzgórza, które wyprzedzająco tłumii korę wzrokową. Oko jeszcze nie ruszyło — obraz już wygaszony.

Jak wyglądają sakady podczas czytania? Eye tracking odsłania chaos?

Podczas czytania oczy nie przesuwają się płynnie wzdłuż linii tekstu. Wykonują serię skoków do przodu (sakady progresywne, obejmujące zwykle 6–9 znaków) i zatrzymań (fiksacje trwające ok. 200–250 ms). Ale prawdziwą niespodzianką są regresje: w ok. 10–15% wszystkich ruchów oko cofa się do już przeczytanego fragmentu. Czytasz ten artykuł i twoje oczy kilkukrotnie wróciły do wcześniejszych zdań — bez twojej wiedzy i woli.

Badania eye-trackingowe, których przegląd opublikował Keith Rayner w *Psychological Bulletin* w 1998 roku po 20 latach badań, ujawniły kolejny zaskakujący fakt: przestrzeń obejrzana w jednej fiksacji (ang. *perceptual span*) jest asymetryczna. U czytelników od lewej do prawej rozciąga się ona ok. 3–4 znaki w lewo od punktu fiksacji i aż 14–15 znaków w prawo. Mózg zbiera informacje z tekstu, który jeszcze nie był czytany, żeby zaplanować kolejną sakadę.

U osób z dysleksją odsetek regresji wzrasta do 20–30%, a fiksacje są dłuższe i mniej przewidywalne. Eye-tracking stał się dziś narzędziem diagnostycznym: neurolodzy używają wzorca sakad do wczesnego wykrywania choroby Alzheimera i Parkinsona — zmiany pojawiają się na lata przed klinicznymi objawami tych chorób.

- Sakady progresywne: 6–9 znaków do przodu — standard przy czytaniu
- Fiksacje: ok. 200–250 ms — tu odbywa się właściwe czytanie
- Regresje: 10–15% ruchów u zdrowych, do 30% przy dysleksji
- Zastosowanie kliniczne: diagnostyka dysleksji, Alzheimera, Parkinsona

Jak oczy czytają tekst naprawdę? Nie jadą po zdaniu jak po linijce. Robią krótkie skoki, zatrzymują się na ułamki sekund i czasem cofają. Regresje, czyli powroty wzroku, to zwykle około 10-15% ruchów podczas czytania.



Typowy wzorzec eye-trackingu podczas czytania. Niebieskie linie: sakady progresywne. Czerwone linie: regresje. Kołka: fiksacje — im większe, tym dłuższe. Dane z badań Rayner 1998.

Sakady a kino: dlaczego twój mózg działa jak projektor filmowy?


Kino działa na zasadzie iluzji: projektor wyświetla 24 nieruchome klatki na sekundę, między każdą klatką pojawia się ułamek sekundy ciemności — a mimo to widzisz płynny ruch. Mózg interpoluje ciągłość tam, gdzie jej fizycznie nie ma. To zjawisko opisał już w 1912 roku Max Wertheimer jako phi phenomenon — percepcję pozornego ruchu.

Supresja sakadyczna działa identycznie, tyle że odwrotnie. Kino ukrywa przerwy między klatkami — twój mózg ukrywa przerwy między fiksacjami. W obu przypadkach efektem jest poczucie ciągłości i płynności, której fizycznie nie ma w sygnale wejściowym. Twój wzrok przetwarza 3–5 wyraźnych fiksacji na sekundę; kino gęściej — 24 klatki. Ale mechanizm psychologiczny jest identyczny: wypełnianie luk na życzenie odbiorcy.

Jest jednak istotna różnica. W kinie ciemne przerwy między klatkami naprawdę istnieją. W przypadku sakad **mózg sam produkuje iluzję ciągłości**, aktywnie podtrzymując ostatni obraz i bezszwowo łącząc go z następnym. Każdy twój widok świata jest w pewnym sensie filmem zmontowanym przez mózg w czasie rzeczywistym, ze starannymi ukrytymi cięciami.

- Kino: 24 klatki/s + ciemność między nimi = wrażenie ruchu
- Wzrok: 3–5 fiksacji/s + supresja między nimi = wrażenie stabilności
- Wspólna zasada: mózg wypełnia luki lepiej niż myślisz
- Kluczowa różnica: w sakadach mózg sam konstruuje ciągłość — to aktywny proces

Dlaczego świat nie skacze jak źle nagrany film? Mózg nie pokazuje każdej przerwy w sygnale. Buduje ciągłość z krótkich fiksacji i sakad, podobnie jak film daje wrażenie ruchu z wielu pojedynczych klatek.



24 klatki na sekundę z przerwami ciemności dają wrażenie płynnego ruchu. Twoje sakady działają na tej samej zasadzie — 3–5 razy na sekundę.

Cztery mity o sakadach, które właśnie obalamy?

Wokół sakad i supresji sakadycznej narasta kilka popularnych nieporozumień — powtarzanych nawet w artykułach popularnonaukowych. Czas je rozliczyć z danymi w ręku. roku życia. Ta sekcja porządkuje temat "Cztery mity o sakadach, które właśnie obalamy?" w prosty sposób: najpierw najważniejsze zasady, potem bezpieczne wdrożenie i na końcu sygnały, które warto monitorować. Taki układ pomaga działać spokojnie, utrzymać regularność i szybciej odróżnić dobre wskazówki od przypadkowych porad z internetu.

MIT 1: Podczas sakady widzisz czarny ekran. Nieprawda. Mózg wygasa sygnał wzrokowy, ale nie zastępuje go czernią — zamiast tego podtrzymuje ostatni wyraźny obraz i bezszwowo łączy go z następnym. Nie doświadczasz żadnej subiektywnej przerwy.


MIT 2: Supresja to bierny efekt rozmazania siatkówkowego. Fałsz. Supresja zaczyna się 50–100 ms przed ruchem oka — na długo przed jakimkolwiek rozmazaniem. To aktywny, zaplanowany proces neurologiczny sterowany z wyższych pięter mózgu przez mechanizm efferencji kopii.

MIT 3: Widzisz świat bez przerw, non-stop. Technicznie nieprawda. Masz dziesiątki tysięcy mikroślepót dziennie. Mózg zakrywa je wszystkie tak sprawnie, że nie masz o nich pojęcia — ale są mierzalne. Bodziec podczas sakady jest wykrywany 3–5 razy rzadziej niż przy nieruchomym oku.

MIT 4: Nie możesz zobaczyć własnych oczu w ruchu w lustrze. To akurat prawda — ale warto wiedzieć dlaczego. Supresja kasuje moment ruchu tylko dla ciebie. Inna osoba patrząca na ciebie z zewnątrz widzi ruch bez problemu.

- Supresja nie oznacza czarnego ekranu: mózg podtrzymuje ostatni obraz
- Supresja zaczyna się przed ruchem: to aktywny, zaplanowany mechanizm
- Ciągłość wzrokowa jest aktywnie konstruowana przez mózg
- Własne oczy w lustrze w ruchu — niewidoczne tylko dla ciebie

Najważniejszy mit: nie ma czarnego ekranu. Podczas sakady mózg nie pokazuje czerni. Raczej ukrywa rozmazanie, podtrzymuje ostatni sensowny obraz i dlatego przerwa w widzeniu nie jest odczuwalna.



Cztery najczęstsze nieporozumienia dotyczące sakad. Wszystkie podane fakty mają potwierdzenie w recenzowanej literaturze naukowej.

Co zmienia się w sakadach po 50. roku życia?


Układ sakadyczny zmienia się wraz z wiekiem w sposób mierzalny i mający realne konsekwencje. Badanie Abela, Troosta i Dell'Osso opublikowane w *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology* w 1983 roku pokazało konsekwentny wzorec: po 50. roku życia latencja sakad wydłuża się o ok. 20–30 ms. Prędkość szczytowa spada nieco. Wzrasta odsetek hipometrycznych sakad korekcyjnych — oko nie trafia w cel za pierwszym razem i musi wykonać dodatkowy drobny skok.

Te zmiany mają praktyczne konsekwencje: czytanie staje się nieco wolniejsze, reakcja na ruch w polu widzenia opóźniona, a jazda samochodem przy złej widoczności wymaga większego skupienia. To normalna, fizjologiczna zmiana — nie choroba. Warto ją jednak znać, bo pozwala świadomie kompensować: więcej czasu na czytanie ważnych dokumentów, większa ostrożność za kierownicą po zmroku.

Mechanizm supresji sakadycznej pozostaje sprawny przez całe życie. Co ważniejsze — regularna aktywność fizyczna działa neuroprotektoryjnie na układ sakadyczny. Aktywni fizycznie 60-latkowie mają parametry sakad porównywalne z siedzącymi 45-latkami. To bardzo konkretny powód, żeby się ruszać.

- Latencja sakad po 50.: wydłuża się o 20–30 ms — mierzalnie, ale kompensacyjnie
- Sakady korekcyjne: częstsze — oko rzadziej trafia za pierwszym razem
- Supresja sakadyczna: pozostaje sprawna przez całe życie
- Aktywność fizyczna: spowalnia zmiany — aktywni 60-latkowie jak siedzący 45-latkowie

Co jest normalne po 50-tce? W badaniach latencja sakad wydłuża się zwykle o około 20-30 ms. To może spowolnić czytanie albo reakcję na ruch, ale samo w sobie nie oznacza choroby.



Latencja sakad rośnie z wiekiem (linia niebieska), ale aktywność fizyczna znacząco spowalnia ten proces (linia zielona). Dane na podstawie badań z lat 1983–2011.

Jak dbać o układ sakadyczny po pięćdziesiątce?

Układ sakadyczny można trenować — w pewnym zakresie. Sport, szczególnie gry zespołowe (tenis, siatkówka, koszykówka) i sporty walki, trenuje szybkość i precyzję sakad przez intensywne śledzenie szybko poruszających się obiektów. Badania opublikowane w *Journal of Sport and Exercise Psychology* pokazały, że zawodowi gracze w tenisa mają latencję sakad o ok. 15–20 ms krótszą niż osoby nieuprawiające sportu w tym samym wieku.

Istnieją również specjalistyczne ćwiczenia okulomotoryczne stosowane w terapii dysleksji i rehabilitacji neurologicznej po udarze. Obejmują m. in. ćwiczenia antysakkadyczne (spojrzenie w kierunku przeciwnym do bodźca), seryjne skoki między punktami fiksacji i ćwiczenia płynnego śledzenia. Ich efekty są mieralne u osób z deficytami — u zdrowych dorosłych skromniejsze, ale obecne.

Sygnaty alarmowe wymagające konsultacji okulistycznej lub neurologicznej: nagłe pogorszenie precyzji ruchów oczu, podwójne widzenie przy sakadach, niemożność utrzymania fiksacji, drżenie gałek ocznych (oczopląs). Zmiany wzorca sakad mogą być wczesnym objawem chorób neurodegeneracyjnych — dlatego regularne badania okulistyczne po 50. powinny obejmować ocenę ruchomości gałek ocznych.

- Najlepszy trening: sport z szybkimi obiektami — tenis, squash, gry zespołowe
- Ćwiczenia okulomotoryczne: skuteczne przy deficytach, dostępne w terapii dysleksji
- Badania kontrolne: po 50. co roku — ocena ruchomości gałek ocznych
- Sygnaty alarmowe: nagłe pogorszenie, podwójne widzenie, oczopląs — natychmiast do lekarza

Kiedy nie zwlekać z konsultacją? Nagłe podwójne widzenie, oczopląs, trudność z utrzymaniem wzroku na jednym punkcie albo gwałtowna utrata precyzji spojrzenia wymagają kontroli okulistycznej lub neurologicznej.



Sporty z szybkimi obiektami — tenis, squash, siatkówka — to naturalny trening układu sakadycznego. Zawodowi gracze w tenisa mają latencję sakad o 15–20 ms krótszą niż nieaktywni rówieśnicy.

Najczęściej zadawane pytania

Co to są sakady i supresja sakadyczna?

Sakady to szybkie skoki gałek ocznych między punktami fiksacji. Supresja sakadyczna to aktywne wyciszenie sygnału wzrokowego przez mózg tuż przed i podczas skoku oka. Dzięki temu nie widzisz rozmazania obrazu, mimo że siatkówka rejestruje ruch.

Dlaczego nie widzę swoich oczu w ruchu w lustrze?

Gdy przenosisz wzrok z jednego oka na drugie w lustrze, mózg wygasa obraz na czas sakady. Osoba stojąca obok zobaczy ruch twoich oczu, ale ty go nie zobaczysz, bo supresja działa tylko dla twojego

własnego sygnału wzrokowego.

Ile sakad wykonuje człowiek dziennie?

Najczęstsze szacunki mówią o 40 000-150 000 sakad dziennie przy około 16 godzinach aktywności wzrokowej. Liczba rośnie, jeśli doliczyć mikrosakkady i ruchy oczu w fazie REM, dlatego w badaniach pojawiają się różne zakresy.

Czy sakady zmieniają się po 50. roku życia?

Tak. Po 50. roku życia latencja sakad zwykle wydłuża się o około 20-30 ms, a sakady korekcyjne mogą być częstsze. Sam mechanizm supresji sakadycznej pozostaje jednak sprawny. Nagłe podwójne widzenie, oczopląs albo utrata precyzji ruchów oczu wymagają konsultacji.

Jak można trenować układ sakadyczny?

Najbardziej naturalnym treningiem są aktywności z szybkimi obiektami, np. tenis, squash albo gry zespołowe. Specjalistyczne ćwiczenia okulomotoryczne stosuje się w rehabilitacji neurologicznej i terapii wybranych deficytów, ale u zdrowych dorosłych efekt bywa skromniejszy.

Supresja co to znaczy w ruchu oka?

W tym artykule supresja oznacza krótkie wyciszenie sygnału wzrokowego podczas sakady. Mózg nie pokazuje czarnego ekranu, tylko podtrzymuje stabilny obraz i tłumi rozmazanie powstające w czasie skoku oka.

Sakady co to jest w prostych słowach?

To błyskawiczne przeskoki wzroku z jednego punktu na drugi. Robisz je przy czytaniu, prowadzeniu auta i rozglądaniu się po pokoju. Bez sakad widzenie byłoby wolniejsze, a uwaga trudniejsza do przenoszenia.

Więcej o pracy oka podczas czytania znajdziesz w poradniku o [akomodacji wzroku po 50-tce](#).

Udostępnij artykuł

Wyślij ten materiał przyjacielowi albo opublikuj u siebie. Jednym kliknięciem podasz aktualny link i tytuł artykułu.

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Mail

Kopiuj link

Źródła

1. [Matin E. \(1974\). Saccadic suppression: A review and an analysis. Psychological Bulletin, 81\(12\), 899–917.](#)
2. [Burr D.C., Morrone M.C., Ross J. \(1994\). Selective suppression of the magnocellular visual pathway during saccadic eye movements. Nature, 371, 511–513.](#)

3. [Wurtz R.H. \(2008\). Neuronal mechanisms of visual stability. Vision Research, 48\(20\), 2070–2089.](#)
4. [Rayner K. \(1998\). Eye movements in reading and information processing: 20 years of research. Psychological Bulletin, 124\(3\), 372–422.](#)
5. [Ross J., Morrone M.C., Goldberg M.E., Burr D.C. \(2001\). Changes in visual perception at the time of saccades. Trends in Neurosciences, 24\(2\), 113–121.](#)
6. [Abel L.A., Troost B.T., Dell'Osso L.F. \(1983\). The effects of age on normal saccadic characteristics. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 54\(1\), 111–114.](#)
7. [Rolfs M. \(2009\). Microsaccades: Small steps on a long way. Vision Research, 49\(20\), 2415–2441.](#)
8. [Leigh R.J., Zee D.S. \(2015\). The Neurology of Eye Movements \(5th ed.\). Oxford University Press.](#)
9. [Bridgeman B., Hendry D., Stark L. \(1975\). Failure to detect displacement of the visual world during saccadic eye movements. Vision Research, 15\(6\), 719–722.](#)

Uwaga: Artykuł ma charakter informacyjny i edukacyjny. Nie zastępuje konsultacji lekarskiej, diagnozy ani leczenia.