

Keto a cholesterol po 50-tce: kiedy sprawdzić LDL i ApoB?



Szybka odpowiedź


Dieta ketogeniczna nie poprawia każdego elementu lipidogramu. W badaniach średnio obniżała trójglicerydy i podnosiła HDL, ale jednocześnie zwiększała LDL; u szczupłych dorosłych wzrastało także ApoB. Zbadaj lipidogram przed zmianą i ponownie po 8-12 tygodniach. Wyraźny wzrost LDL lub ApoB omów z lekarzem zamiast tłumaczyć samym „dobrym HDL”.

Kluczowe wnioski

- Spadek trójglicerydów nie unieważnia wzrostu LDL ani liczby cząstek aterogennych ocenianej przez ApoB.
- Metaanaliza u dorosłych z BMI poniżej 25 wykazała wzrost LDL-C i ApoB na diecie bardzo niskowęglowodanowej.
- Kontrola po 8-12 tygodniach jest praktycznym punktem oceny reakcji, a nie gwarantowanym terminem stabilizacji.
- Rodzaj tłuszczu, błonnik, masa ciała, genetyka i leki mogą zmieniać odpowiedź lipidową.

Jak dieta keto zmienia LDL, HDL i trójglicerydy?

Średnia z badań randomizowanych nie opisuje każdego uczestnika. Nowsze metaanalizy wykazują spadek trójglicerydów oraz niewielki wzrost HDL, ale także przeciętny wzrost LDL i cholesterolu całkowitego. U części osób odpowiedź LDL jest znacznie większa, dlatego obserwacja samej masy ciała nie wystarcza.



Metaanaliza AJCN 2024

Średnia z badań randomizowanych nie opisuje każdego uczestnika.

Znaczenie poszczególnych parametrów wyjaśnia [Centrum Cholesterolu po 50-tce](#).

Dlaczego ApoB jest ważne przy wzroście LDL?

ApoB przybliża liczbę cząstek aterogennych, ponieważ każda cząstka LDL i inne cząstki zawierające ApoB mają po jednej jego kopii. HDL nie „anuluje” mechanicznie ich obecności. Gdy LDL rośnie po zmianie diety, ApoB pomaga ocenić, czy wzrosła także liczba cząstek związanych z ryzykiem.



ApoB przybliża liczbę cząstek aterogennych, ponieważ każda cząstka LDL i inne cząstki zawierające ApoB mają po jednej jego kopii.

Sposób odczytania wyniku znajdziesz w [poradniku norm i interpretacji ApoB](#).

Jak to zastosować?

„HDL wzrosło” nie jest wystarczającą odpowiedzią na duży wzrost LDL lub ApoB.

Co zbadać przed keto i po 8-12 tygodniach?

Przed startem zapisz lipidogram, najlepiej ApoB, ciśnienie, masę oraz przyjmowane leki; przy cukrzycy i chorobach nerek plan wymaga konsultacji. Powtórz porównywalne oznaczenia po 8-12 tygodniach. Ten odstęp służy wczesnej kontroli reakcji, a nie samodzielnemu rozpoznaniu ryzyka na całe życie.




Przed startem zapisz lipidogram, najlepiej ApoB, ciśnienie, masę oraz przyjmowane leki; przy cukrzycy i chorobach nerek plan wymaga konsultacji.

Częstotliwość dalszych kontroli dopasuj według [zasad planowania badań krwi](#).

Co zrobić, gdy LDL lub ApoB wyraźnie wzrośnie?

Nie zakładaj, że wzrost jest nieszkodliwy, bo trójglicerydy spadły. Omów wynik z lekarzem, porównaj warunki pobrania i oceń całe ryzyko. Korekta może obejmować ograniczenie tłuszczów nasyconych, więcej nienasyconych źródeł tłuszczu i błonnika albo odejście od keto; leki zmienia się wyłącznie z prowadzącym.



Nie zakładaj, że wzrost jest nieszkodliwy, bo trójglicerydy spadły.

Mniej restrykcyjną strukturę posiłków przedstawia [poradnik diety po 50-tce](#).

Warunek bezpieczeństwa

Przy lekach przeciwcukrzycowych, ciąży, chorobie nerek, wątroby lub trzustki nie rozpoczynaj keto bez oceny klinicznej.

Kontrola lipidów przy diecie keto

Moment	Co sprawdzić?	Decyzja
Przed startem	Lipidogram, ApoB, ryzyko i leki	Czy plan jest właściwy
Po 8-12 tygodniach	Te same parametry w podobnych warunkach	Kontynuacja lub korekta
Duży wzrost LDL/ApoB	Pełna ocena ryzyka	Zmiana diety lub leczenia z lekarzem
Stabilne wyniki	Dalszy termin według ryzyka	Nie rezygnuj z kontroli

O tolerancji keto nie świadczy nazwa diety ani spadek masy, lecz konkretna reakcja organizmu i wyniki porównane z punktem wyjścia.

Najczęściej zadawane pytania

Czy keto zawsze podnosi LDL?

Nie u każdego, ale metaanalizy wykazują średni wzrost, a indywidualna odpowiedź może być znaczna.

Czy wysokie HDL chroni przed wysokim ApoB?

Nie można tak wnioskować. HDL i ApoB opisują inne elementy profilu lipidowego i trzeba oceniać je osobno.

Kiedy zbadać cholesterol po rozpoczęciu keto?

Praktycznym pierwszym punktem jest 8-12 tygodni, a dalszy termin zależy od wyniku, ryzyka i leczenia.

Czy przy LDL 190 mg/dl wystarczy zmienić tłuszcze?

Taki wynik wymaga szybkiej oceny lekarskiej i przyczyn, a sama samodzielna korekta jadłospisu może być niewystarczająca.

Źródła

1. [Ketogenic diets and lipids in normal-weight adults - meta-analysis](#)
2. [Ketogenic diet and lipid profile - meta-analysis of RCTs](#)
3. [Ketogenic diet and multiple health outcomes - umbrella review](#)
4. [ESC guidelines on cardiovascular prevention](#)

Uwaga: Artykuł ma charakter informacyjny i edukacyjny. Nie zastępuje konsultacji, diagnozy ani indywidualnego leczenia.