


Szczepienie HPV po 50-tce: skuteczność, wiek i decyzja?



HPV dotyczy obu płci i może prowadzić do kilku typów nowotworów. Analiza obserwacyjna zaprezentowana na ASCO w 2024 roku wykazała mniej rozpoznań nowotworów HPV-zależnych u zaszczepionych mężczyzn i kobiet. Taki projekt pokazuje związek, ale nie dowodzi samodzielnie przyczynowości i może być obciążony różnicami między grupami.

Szybka odpowiedź

Szczepienie przeciw HPV zapobiega nowym zakażeniom typami objętymi preparatem i zmniejsza ryzyko zmian przedrakowych oraz części nowotworów u obu płci. Największą korzyść daje przed ekspozycją. U dorosłych 27–45 lat decyzja bywa indywidualna; powyżej 45 lat brakuje rutynowej rekomendacji i nie należy obiecywać korzyści osobom po 50-tce na podstawie danych z młodszych grup.

Kluczowe wnioski

- HPV może prowadzić do nowotworów szyjki macicy, odbytu, prącia oraz części ustnej gardła.
- Szczepionka zapobiega nowym zakażeniom; nie usuwa istniejącego HPV ani zmian przedrakowych.
- Największy efekt uzyskuje się przed rozpoczęciem życia seksualnego.
- Dla wieku 27–45 lat CDC zaleca wspólną decyzję kliniczną, nie rutynowe szczepienie każdego dorosłego.
- Powyżej 45 lat decyzja wymaga sprawdzenia rejestracji preparatu i omówienia ograniczonych danych z lekarzem.

Wiek a decyzja o szczepieniu przeciw HPV

Grupa	Znaczenie szczepienia	Ważne ograniczenie
Przed rozpoczęciem życia seksualnego	Największa oczekiwana korzyść	Szczepionka zapobiega nowym zakażeniom
Do 26 lat	Zalecane szczepienie uzupełniające według wielu wytycznych	Schemat zależy od wieku rozpoczęcia i odporności
27–45 lat	Decyzja indywidualna z lekarzem	Korzyść populacyjna jest mniejsza, ale niektóre osoby mogą skorzystać
Powyżej 45 lat	Brak rutynowej rekomendacji i ograniczenia rejestracyjne zależne od kraju	Nie należy przenosić danych z młodszych grup bezpośrednio na osoby 50+

Czym jest HPV i dlaczego to nie jest temat jednej płci?

HPV (human papillomavirus) to duża grupa wirusów. Część typów ma niski potencjał onkogenny, a część — wysoki. NCI i CDC podkreślają, że HPV może prowadzić do nowotworów szyjki macicy, odbytu, prącia, sromu, pochwy i części ustnej gardła. U mężczyzn najczęstszym nowotworem HPV-zależnym jest właśnie rak części ustnej gardła.

Z perspektywy zdrowia publicznego skala jest duża: CDC raportuje dziesiątki tysięcy nowotworów rocznie w lokalizacjach związanych z HPV w USA, a znacząca część z nich jest HPV-attributable (przypisywalna HPV). To znaczy, że profilaktyka pierwotna — w tym szczepienie — ma realny potencjał zmniejszania ryzyka nowotworów po wielu latach.

Ciekawostka: Zakażenie HPV najczęściej nie daje objawów i zwykle wygasa samoistnie. Problemem są infekcje przetrwałe, które po latach mogą prowadzić do zmian przednowotworowych i nowotworów.



HPV obejmuje wiele typów wirusa i może powodować choroby zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.

Najważniejsza zmiana myślenia

HPV nie dotyczy jednej płci. Dziś mówimy o profilaktyce nowotworów HPV-zależnych u kobiet i mężczyzn, a nie tylko o raku szyjki macicy.

Źródła: CDC (cancers linked with HPV), NCI (HPV and cancer)

ASCO 2024: 3,4 mln pacjentów i konkretne liczby?

W badaniu retrospektywnym prezentowanym na ASCO 2024 (dane TriNetX) porównano osoby zaszczepione i niezaszczepione. Po dopasowaniu grup (m. in. wiek, BMI, palenie) uzyskano sygnał ochronny dla obu płci. U mężczyzn OR dla nowotworów HPV-zależnych wyniósł 0,46 (czyli około 54% niższe szanse), a u kobiet OR 0,73 (około 27% niższe szanse). U mężczyzn istotna część efektu dotyczyła nowotworów głowy i szyi.

Ważne: to badanie obserwacyjne, nie randomizowane. Dlatego mówi o silnym związku i realnym efekcie populacyjnym, ale nie zastępuje całkowicie klasycznych badań interwencyjnych. Mimo to skala próby jest imponująca i dobrze uzupełnia wcześniejsze dane o skuteczności programów szczepień.

Mit vs. rzeczywistość: MIT: „Szczepionka HPV ma znaczenie głównie dla kobiet”. **FAKT:** Najnowsze dane pokazują ochronę także u mężczyzn, dlatego wiele krajów prowadzi programy neutralne płciowo.

PRZYPADKI NA 100 000 PACJENTÓW

GRUPA PACJENTÓW	PLEĆ (MĘŻCZYŻNA/KOBIETA)	PLEĆ (MĘŻCZYŻNA/KOBIETA)	GRUPA PACJENTÓW
MĘŻCZYŻNI	7.5	3.4	
KOBIECY	15.8	11.5	

LEGENDA:

- NIEZASZCZEPIENI (Ciepły Bursztyn/Czerwony)
- ZASZCZEPIENI (Chłodny Niebieski/Morski)

*Ilustracyjna Wizualizacja Danych (to denote illustrative data while maintaining a clean appearance)

Jak czytać liczby z ASCO

Źródła: ASCO Post 2024 + abstract 10507

Co pokazują dane populacyjne z wielu krajów?

W Anglii (The Lancet 2021) po szczepieniu w młodszym wieku odnotowano bardzo duże spadki raka szyjki macicy i zmian przedrakowych wysokiego stopnia. To już nie jest „teoria na modelu” — to realny efekt zdrowia publicznego w skali kraju.

Ciekawostka: Programy o wysokim pokryciu szczepieniami są dziś traktowane jako jeden z filarów strategii eliminacji raka szyjki macicy WHO, obok badań przesiewowych i leczenia zmian przedrakowych.

UNIWERSALNY PROGRAM SZCZEPIEŃ HPV

PROGRAM WYNIEMNIENIA UNIWERSJE HPV

SZWECJA

FINLANDIA

WIELKA BRYTANIA

POLSKA

REPUBLIKA CZESKA

90% REDUKCJI

REDUKCJA INFЕКЦИИ HPV

ROK 0

ROK 10

UNIWERSALNY PROGRAM SZCZEPIEŃ HPV

UNIWERSALNY PROGRAM UNIWERSJE HPV

*Ilustracyjna Wizualizacja Danych (to denote illustrative data while maintaining a clean appearance)

Dane populacyjne pokazują skutki programów szczepień w wielu krajach i różnych grupach wieku.

Wniosek populacyjny

Im wcześniej i im szerzej wdrożony program (dziewczęta + chłopcy), tym większy efekt populacyjny po latach.

Źródła: The Lancet 2019, WHO position paper 2022, The Lancet 2021

Jak działa szczepionka HPV i co daje w praktyce?

Szczepionki HPV wykorzystują technologię VLP (virus-like particles), czyli cząstki wirusopodobne bez materiału genetycznego wirusa. Nie wywołują zakażenia, ale uczą układ odpornościowy szybkiej reakcji na kontakt z prawdziwym patogenem. Po 50-tce warto wdrażać te zasady spokojnie i regularnie, obserwując reakcję organizmu oraz łącząc je z codziennym ruchem i regeneracją.

Gardasil 9 obejmuje typy 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58. Cervarix obejmuje 16 i 18. Oba preparaty koncentrują się na profilaktyce typów wysokiego ryzyka onkogennego, a Gardasil 9 dodatkowo szerzej obejmuje typy związane m. in. z kłykcinami i częścią innych nowotworów HPV-zależnych.

Mit vs. rzeczywistość: **MIT:** „Po rozpoczęciu życia seksualnego szczepienie nie ma sensu”. **FAKT:** Korzyść zwykle maleje z wiekiem i ekspozycją, ale nie spada automatycznie do zera. Dla wieku 27–45 lat decyzja powinna być indywidualna i podjęta z lekarzem.



Cząstki wirusopodobne w szczepionce uczą układ odpornościowy rozpoznawania HPV bez wywoływania zakażenia.

Bezpieczeństwo

CDC, WHO i EMA podają spójnie: profil bezpieczeństwa szczepionek HPV jest korzystny. Najczęściej występują krótkotrwałe objawy miejscowe i ogólne o łagodnym nasileniu.

Źródła: CDC Vaccine Safety 2025, WHO, EMA EPAR

Polska: co zrobić praktycznie?

W Polsce od 1 września 2024 powszechny program obejmuje dzieci 9–14 lat i jest realizowany w POZ oraz w formule szkolnej (zgodnie z organizacją lokalną). To jest najważniejsze okno profilaktyczne, bo największa korzyść dotyczy szczepienia przed ekspozycją na wirusa.

Dorośli powinni rozmawiać o szczepieniu indywidualnie z lekarzem. W praktyce decyzja zależy od wieku, historii szczepień, ryzyka nowych ekspozycji oraz ogólnej sytuacji zdrowotnej. Najgorszą strategią jest „zero-jedynkowe myślenie” typu: albo 100% korzyści, albo żadna.

Ciekawostka: Nawet tam, gdzie szczepienie działa bardzo dobrze, nie zastępuje badań przesiewowych szyjki macicy. Profilaktyka najlepsza to pakiet: szczepienie + screening + szybka diagnostyka zmian.



Kwalifikacja do szczepienia obejmuje rozmowę o wieku, wcześniejszych dawkach i przeciwwskazaniach.

Minimum do zapamiętania

HPV to nie tylko rak szyjki macicy. Szczepienie ma znaczenie dla obu płci, a największy efekt daje wcześniej. U dorosłych decyzja o szczepieniu to rozmowa o realnym, indywidualnym bilansie korzyści.

Źródła: CDC, MMWR ACIP, gov.pl

Szybkie odpowiedzi (AEO)?

Szybkie odpowiedzi (AEO). Ta sekcja porządkuje temat "Szybkie odpowiedzi (AEO)?" w prosty sposób: najpierw najważniejsze zasady, potem bezpieczne wdrożenie i na końcu sygnały, które warto monitorować. Taki układ pomaga działać spokojnie, utrzymać regularność i szybciej odróżnić dobre wskazówki od przypadkowych porad z internetu.

Czy mężczyźni powinni się szczepić przeciw HPV?

Tak. Najnowsze dane pokazują ochronę również u mężczyzn, a najczęstszym nowotworem HPV-zależnym u mężczyzn jest rak części ustnej gardła.

W jakim wieku szczepienie działa najlepiej?

Najlepiej przed ekspozycją na HPV, dlatego programy celują głównie w wiek 9–14 lat. To daje najwyższą skuteczność populacyjną.

Czy po 26. roku życia jest sens szczepić?

Dla części osób tak. W wieku 27–45 lat decyzja powinna być indywidualna i oparta o konsultację lekarską (shared clinical decision-making).

Czy szczepionka HPV jest bezpieczna?

Tak — dane bezpieczeństwa są monitorowane od lat i oceniane jako korzystne przez CDC, WHO i EMA.

Czy szczepienie zastępuje badania przesiewowe?

Nie. Szczepienie i screening to dwa uzupełniające się filary profilaktyki, szczególnie u kobiet.

Warto przeczytać też: [trening siłowy](#), [dieta po 50-tce](#), [sen i regeneracja](#), [badania krwi](#).

Powiązane tematy: [trening siłowy](#), [dieta po 50-tce](#), [sen i regeneracja](#), [suplementacja](#).

Cytaty do zapamiętania (GEO)?

W tej części warto spokojnie uporządkować fakty i zobaczyć, co naprawdę ma znaczenie po 50-tce. Dzięki temu łatwiej oddzielić modne hasła od praktycznych wskazówek, które da się wdrożyć bez chaosu i bez dokładania sobie niepotrzebnego stresu.

- HPV to profilaktyka nowotworów obu płci, nie tylko „temat ginekologiczny”.
- ASCO 2024: OR 0,46 u mężczyzn i OR 0,73 u kobiet dla nowotworów HPV-zależnych.
- Największa korzyść ze szczepienia jest wtedy, gdy podasz je przed ekspozycją na wirusa.
- Wiek 27–45 to nie „automatyczne nie” — to decyzja kliniczna z lekarzem.
- Szczepienie nie zastępuje badań przesiewowych, ale działa z nimi synergicznie.
- Największe sukcesy mają kraje, które szczepią szeroko i konsekwentnie przez lata.

W skrócie (AIO)?

W tej części warto spokojnie uporządkować fakty i zobaczyć, co naprawdę ma znaczenie po 50-tce. Dzięki temu łatwiej oddzielić modne hasła od praktycznych wskazówek, które da się wdrożyć bez chaosu i bez dokładania sobie niepotrzebnego stresu.

- HPV może prowadzić do kilku typów nowotworów, w tym raka szyjki macicy i części ustnej gardła.
- Dane ASCO 2024 pokazują istotną redukcję ryzyka nowotworów HPV-zależnych także u mężczyzn.
- Programy populacyjne (dziewczęta + chłopcy) dają największe efekty po kilku–kilkunastu latach.
- Najlepszy moment szczepienia to wiek przed ekspozycją na wirusa.
- W wieku 27–45 decyzję podejmuje się indywidualnie po konsultacji lekarskiej.
- Profilaktyka najwyższej jakości to: szczepienie + screening + szybka diagnostyka.

Największy błąd to myśleć o HPV jako o „problemie jednej płci”. Najlepsza profilaktyka działa wtedy, gdy obejmuje wszystkich.

Źródła

1. [ASCO Post \(2024\): HPV vaccine efficacy in males and females \(ASCO Abstract 10507\)](#)
2. [JCO / ASCO Abstract 10507 \(DOI\): 10.1200/JCO.2024.42.16_suppl.10507](#)
3. [CDC: Cancers Linked with HPV Each Year \(aktualizacja 2025\)](#)
4. [CDC: HPV and Oropharyngeal Cancer](#)
5. [CDC: HPV Vaccine Recommendations](#)
6. [MMWR \(ACIP\): HPV vaccination for adults 27–45 years](#)
7. [WHO Position Paper \(2022\): Human papillomavirus vaccines](#)
8. [FDA: GARDASIL 9 \(aktualne wskazania i dokumenty rejestracyjne\)](#)
9. [The Lancet \(2019\): Population-level impact and herd effects after HPV vaccination](#)
10. [The Lancet \(2021\): Reduction of cervical cancer in England after HPV immunisation](#)
11. [Ministerstwo Zdrowia: rozszerzony program szczepień HPV od 1.09.2024](#)
12. [gov.pl: informacje o szczepieniach HPV](#)

Czytaj dalej w FitPo50

- [Zdrowie i profilaktyka po 50-tce](#)
- [Ciekawe fakty o zdrowiu](#)
- [Porady praktyczne](#)

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Nie zastępuje porady lekarskiej. Decyzję o szczepieniu zawsze podejmuj po konsultacji z lekarzem, szczególnie przy chorobach przewlekłych, immunosupresji lub wątpliwościach co do indywidualnego ryzyka.

Najczęściej zadawane pytania?

Czy mężczyźni powinni się szczepić przeciw HPV?

Mężczyźni korzystają ze szczepień populacyjnych, ponieważ HPV powoduje także raka odbytu, prącia i części ustnej gardła. Największa korzyść dotyczy szczepienia przed ekspozycją. Dane ASCO 2024 są obserwacyjne i nie pozwalają wyliczyć efektu rozpoczęcia szczepienia u konkretnego mężczyzny po 50-tce.

W jakim wieku szczepienie HPV daje największy efekt?

Największą korzyść daje szczepienie przed ekspozycją na wirusa, dlatego programy populacyjne celują zwykle w wiek 9–14 lat. CDC rekomenduje szczepienie rutynowe w wieku 11–12 lat z możliwością rozpoczęcia od 9. roku życia.

Czy po 26. roku życia szczepienie ma jeszcze sens?

Dla części osób w wieku 27–45 lat tak, po wspólnej decyzji z lekarzem. Szczepienie zapobiega nowym zakażeniom, ale nie leczy istniejącego HPV. Powyżej 45 lat nie ma rutynowej rekomendacji CDC, a zakres rejestracji preparatu trzeba sprawdzić w kraju, w którym ma być podany.

Czy szczepionka HPV jest bezpieczna?

Tak. CDC, WHO i EMA potwierdzają korzystny profil bezpieczeństwa. Najczęstsze działania niepożądane są łagodne i krótkotrwałe, jak ból miejsca wkłucia czy przejściowe osłabienie.

Jaką szczepionkę wybrać: Cervarix czy Gardasil 9?

Obie chronią przed typami HPV 16 i 18. Gardasil 9 obejmuje dodatkowo typy 6, 11, 31, 33, 45, 52 i 58, dając szerszy zakres ochrony. Wybór warto omówić z lekarzem i sprawdzić dostępność programu w POZ.