

Lp(a) po 50-tce: norma, cena badania i wynik bez paniki



Lp(a), czyli lipoproteina(a), to badanie, o które prawie nikt nie pyta, a które warto zrobić raz w życiu. W przeciwieństwie do LDL jej poziom zależy głównie od genów, nie od diety czy ruchu. Po 50-tce, gdy w rodzinie zdarzały się zawały albo udary, ten jeden wynik potrafi zmienić sposób, w jaki lekarz patrzy na Twoje ryzyko sercowe.

Szybka odpowiedź

Lipoproteina a Lp(a) to głównie genetyczny marker ryzyka zawału, udaru i zwężenia zastawki aortalnej, który warto zbadać przynajmniej raz w życiu po 50-tce lub przy rodzinnych zawałach przed 60 rokiem życia, a wynik czytać razem z LDL, ApoB, ciśnieniem, cukrem, paleniem papierosów i historią rodzinną.

Kluczowe wnioski

- Lp(a) to osobny, w około 90% genetyczny czynnik ryzyka miażdżycy - nie da się go ocenić na podstawie samego LDL.
- Wynik powyżej ok. 50 mg/dl (125 nmol/l) traktuje się jako podwyższone ryzyko według konsensusu EAS z 2022 roku.
- W Polsce badanie kosztuje zwykle ok. 70-150 zł, zależnie od laboratorium, miasta i ewentualnej opłaty za pobranie.
- Wytyczne ACC/AHA z 2026 roku zalecają zbadanie Lp(a) przynajmniej raz w życiu u każdego dorosłego - to nowa, mocna rekomendacja.


Lp(a) w skrócie: co warto wiedzieć przed badaniem?

Lp(a), czyli lipoproteina(a), to w około 90% genetyczny czynnik ryzyka zawału, udaru i zwężenia zastawki aortalnej. Dieta ani ruch nie obniżają jej poziomu tak, jak wpływają na LDL. Wystarczy zbadać ją raz w życiu, najlepiej po 50-tce lub gdy w rodzinie był zawał albo udar przed 60. rokiem życia. Wysoki wynik nie jest wyrokiem - to raczej punkt wyjścia do rozmowy o LDL, ApoB, ciśnieniu i cukrze.

To jedno z niewielu badań krwi, które w praktyce wykonuje się jednorazowo, a jego wynik zostaje aktualny na długie lata - właśnie dlatego, że w dużej mierze zależy od genów odziedziczonych po rodzicach.

Najważniejsze: Lp(a) w skrócie: co warto wiedzieć przed badaniem Lp(a), czyli lipoproteina(a), to w około

90% genetyczny czynnik ryzyka zawału, udaru i zwężenia zastawki aortalnej.



Lp(a) bada się zwykle raz w życiu - wynik warto po prostu zachować.

Czym jest Lp(a) i skąd się bierze?

Lipoproteina(a), w skrócie Lp(a), to cząsteczka LDL, do której doczepia się dodatkowe białko - apolipoproteina(a). To dodatkowe białko sprawia, że cząstka mocniej wiąże się ze ścianą naczyń krwionośnych i sprzyja tworzeniu zakrzepów. W około 90% jej stężenie zależy od genów, a nie od tego, co jesz czy ile się ruszasz.

Wielkość cząstki apo(a) jest odwrotnie proporcjonalna do stężenia Lp(a) we krwi - im mniejsza cząstka, tym wyższy zwykle wynik. Poziom Lp(a) u kobiet bywa średnio o około 10% wyższy niż u mężczyzn, a różnice między ludźmi mogą sięgać nawet tysiąckrotności.

Najważniejsze: Czym jest Lp(a) i skąd się bierze Lipoproteina(a), w skrócie Lp(a), to cząsteczka LDL, do której doczepia się dodatkowe białko - apolipoproteina(a).



Poziom Lp(a) zależy głównie od genów, nie od codziennej aktywności.

Czym różni się Lp(a) od LDL-C i ApoB?

LDL-cholesterol (LDL-C) mierzy, ile cholesterolu niosą cząstki LDL we krwi. ApoB liczy wszystkie aterogenne cząstki - LDL, VLDL, IDL i Lp(a) - niezależnie od tego, ile cholesterolu w nich jest. Lp(a) to osobna, dodatkowo aterogenna cząstka, która nie mieści się w standardowym pomiarze LDL-C.


Badania porównujące te wskaźniki pokazują, że [ApoB przewidywał ryzyko sercowo-naczyniowe dokładniej](#)

niż LDL-C. Na poziomie pojedynczej cząstki Lp(a) uznaje się za nawet około sześciokrotnie bardziej aterogenną niż LDL - dlatego niskie LDL-C, zwłaszcza u kobiet, czasem maskuje realne ryzyko wynikające z wysokiej Lp(a).

Ważne rozróżnienie SEO i zdrowotne: ten artykuł dotyczy Lp(a), czyli genetycznego markera ryzyka. Jeśli szukasz norm, ceny i interpretacji samego ApoB, przejdź do osobnego poradnika o ApoB - tutaj ApoB pojawia się tylko jako punkt porównania przy czytaniu wyniku Lp(a).

Najważniejsze: Czym różni się Lp(a) od LDL-C i ApoB LDL-cholesterol (LDL-C) mierzy, ile cholesterolu niosą cząstki LDL we krwi.

PORÓWNANIE MARKERÓW LIPIDOWYCH: LDL, APOB I LP(A)



LDL, ApoB i Lp(a) mierzą różne rzeczy - dlatego warto znać wszystkie trzy.

Dlaczego zwykły lipidogram może nie wystarczyć?

Standardowy lipidogram pokazuje cholesterol całkowity, HDL, LDL-C i trójglicerydy. Nie obejmuje domyślnie ani Lp(a), ani ApoB. Można więc mieć wynik LDL w normie i wciąż nosić w sobie podwyższone, genetyczne ryzyko sercowo-naczyniowe, o którym standardowy pakiet badań nic nie mówi.

To jeden z powodów, dla którego towarzystwa kardiologiczne i lipidologiczne, w tym Polskie Towarzystwo Kardiologiczne i Polskie Towarzystwo Lipidologiczne, zalecają rozszerzenie profilu lipidowego o Lp(a) przynajmniej raz w życiu - szczególnie przy niejasnym obrazie ryzyka.

Najważniejsze: Dlaczego zwykły lipidogram może nie wystarczyć Standardowy lipidogram pokazuje cholesterol całkowity, HDL, LDL-C i trójglicerydy.



Zwykły lipidogram nie pokazuje Lp(a) - trzeba zlecić je osobno.

Jakie są normy Lp(a) w mg/dl i nmol/l?

Konsensus Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego (EAS) z 2022 roku podaje pragmatyczne progi: poniżej 30 mg/dl (poniżej 75 nmol/l) to zakres niskiego ryzyka, 30-50 mg/dl (75-125 nmol/l) to strefa pośrednia, a powyżej 50 mg/dl (powyżej 125 nmol/l) to zakres podwyższonego ryzyka. U około 80% osób pochodzenia europejskiego wynik mieści się poniżej 40 mg/dl (90 nmol/l).

Ważne zastrzeżenie: jednostek mg/dl i nmol/l nie da się prosto przeliczyć 1:1. Orientacyjnie przyjmuje się przelicznik około 1 nmol/l = 0,4 mg/dl, ale ze względu na różną wielkość cząstek apo(a) i różne metody pomiaru, dokładna konwersja bywa niepewna. Dlatego czytaj wynik w jednostce, w jakiej podało go laboratorium, i nie przeliczaj go samodzielnie na potrzeby decyzji klinicznych.

- Poniżej 30 mg/dl (poniżej 75 nmol/l) - zakres niskiego ryzyka
- 30-50 mg/dl (75-125 nmol/l) - strefa pośrednia
- Powyżej 50 mg/dl (powyżej 125 nmol/l) - zakres podwyższonego ryzyka

Najważniejsze: Jakie są normy Lp(a) w mg/dl i nmol/l Konsensus Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego (EAS) z 2022 roku podaje pragmatyczne progi: poniżej 30 mg/dl (poniżej 75 nmol/l) to zakres niskiego ryzyka, 30-50 mg/dl (75-125 nmol/l) to strefa pośrednia, a powyżej...



Normy Lp(a) według konsensusu EAS z 2022 roku.

Od jakiego poziomu Lp(a) rośnie ryzyko?

Za granicę podwyższonego ryzyka przyjmuje się zwykle około 50 mg/dl lub 125 nmol/l - taki próg wskazują zarówno konsensus EAS z 2022 roku, jak i wytyczne American Heart Association i American College of Cardiology. Wysoki wynik (co najmniej 125 nmol/l lub 50 mg/dl) wiąże się z około 1,4-krotnie wyższym długoterminowym ryzykiem zawału serca lub udaru mózgu.

Warto pamiętać, że zależność między poziomem Lp(a) a ryzykiem sercowo-naczyniowym jest ciągła, a nie skokowa - im wyższy wynik, tym wyższe ryzyko, bez ostrego progu odcięcia. Dlatego lekarz zawsze patrzy na wynik Lp(a) razem z całym obrazem ryzyka: wiekiem, ciśnieniem, LDL, cukrzycą i paleniem.

Najważniejsze: Od jakiego poziomu Lp(a) rośnie ryzyko Za granicę podwyższonego ryzyka przyjmuje się zwykle około 50 mg/dl lub 125 nmol/l - taki próg wskazują zarówno konsensus EAS z 2022 roku, jak i wytyczne American Heart Association i American College of Cardiology.



Ryzyko rośnie stopniowo wraz z poziomem Lp(a), bez jednego sztywnego progu.

Ile kosztuje badanie Lp(a) w Polsce?

Cena samego badania Lp(a) w polskich laboratoriach zwykle mieści się w przedziale około 70-150 zł, w zależności od laboratorium, miasta i tego, czy dolicza się osobną opłatę za pobranie krwi. Przykładowo w cenniku online jednego z ogólnopolskich laboratoriów badanie figurowało od około 70,30 zł, a w innym - w podobnym przedziale, plus opłata za pobranie.

Ceny zmieniają się i różnią między miastami oraz promocjami, więc nie ma jednej sztywnej kwoty - przed wizytą warto sprawdzić aktualny cennik wybranego laboratorium. Badanie bywa też tańsze w przeliczeniu, jeśli zamawia się je razem z [ApoB i ApoA1](#) w pakiecie rozszerzonego lipidogramu.

Najważniejsze: Ile kosztuje badanie Lp(a) w Polsce Cena samego badania Lp(a) w polskich laboratoriach zwykle mieści się w przedziale około 70-150 zł, w zależności od laboratorium, miasta i tego, czy dolicza się osobną opłatę za pobranie krwi.



Badanie Lp(a) to zwykle niewielki, jednorazowy wydatek.

Czy Lp(a) bada się tylko raz w życiu?

Tak - to obecnie dominujące podejście. Ponieważ stężenie Lp(a) w około 90% zależy od genów i tradycyjnie uznawano je za stabilne przez całe życie, wytyczne ESC/EAS oraz zaktualizowane w 2026 roku wytyczne ACC/AHA zalecają zmierzenie Lp(a) przynajmniej raz u każdego dorosłego - to nowa, mocna rekomendacja pierwszej klasy.

Warto jednak być uczciwym: badanie STAR-Lp(a), opublikowane w 2026 roku, przyjrzało się 1263 osobom badanym dwukrotnie w odstępie 1-3 lat i wykazało, że u 64,7% z nich wynik zmienił się o co najmniej 10%, a u 14% - o co najmniej 50%. Autorzy tego badania kwestionują założenie, że jeden pomiar zawsze wystarcza na całe życie. To rodząca się dyskusja naukowa, a nie jeszcze oficjalna zmiana głównych wytycznych - jeśli masz wątpliwości co do swojego wyniku, zapytaj lekarza, czy w Twojej sytuacji warto go powtórzyć.

Najważniejsze: Czy Lp(a) bada się tylko raz w życiu Tak - to obecnie dominujące podejście.



Większość wytycznych zaleca jedno badanie Lp(a) w życiu, choć trwa naukowa dyskusja na ten temat.

Kto szczególnie powinien zrobić badanie Lp(a)?

Badanie Lp(a) ma największy sens dla osób z podwyższonym lub niejasnym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Nie trzeba mieć żadnych objawów, żeby warto było je zrobić - u części osób wysoka Lp(a) to jedyny sygnał podwyższonego ryzyka, jaki w ogóle udaje się wychwycić.

Najmocniejszym wskazaniem jest wywiad rodzinny: zawał, udar, miażdżyca lub nagła śmierć sercowa u bliskiego krewnego przed 60. rokiem życia. Lp(a) warto też rozważyć, gdy LDL wygląda dobrze, ale ryzyko sercowe w rodzinie nie pasuje do zwykłego lipidogramu.

- Zawał serca lub udar mózgu w rodzinie przed 60. rokiem życia
- Wysoki poziom LDL-C, mimo zdrowego stylu życia
- Rozpoznana choroba wieńcowa lub miażdżyca
- Wysoki poziom ApoB
- Niejasny lub niespójny profil lipidowy (np. dobry LDL przy innych sygnałach ryzyka)
- Osobisty epizod sercowo-naczyniowy w młodszy wieku bez oczywistej przyczyny

Najważniejsze: Kto szczególnie powinien zrobić badanie Lp(a) Badanie Lp(a) ma największy sens dla osób z podwyższonym lub niejasnym ryzykiem sercowo-naczyniowym.



Wywiad rodzinny to jeden z najważniejszych sygnałów, by rozważyć badanie.

Co oznacza połączenie wyników LDL, ApoB i Lp(a)?

Same liczby nabierają sensu dopiero wtedy, gdy spojrzysz na nie razem. Wysokie LDL przy niskiej Lp(a) to co innego niż normalne LDL przy wysokiej Lp(a), a jeszcze inaczej wygląda sytuacja, gdy podwyższone są wszystkie trzy wskaźniki naraz. Poniższa tabela pokazuje, jak zwykle interpretuje się takie kombinacje wyników - to uproszczenie pomocne w rozmowie z lekarzem, a nie samodzielna diagnoza.

Wynik	Co to zwykle oznacza
LDL wysokie, Lp(a) niskie	Ryzyko napędzane głównie przez LDL - zwykle dobrze reaguje na leczenie obniżające LDL i zmiany stylu życia
LDL w normie, Lp(a) wysokie	Ukryte, genetyczne ryzyko, które umyka standardowemu lipidogramowi - wymaga osobnej rozmowy o profilaktyce
ApoB wysokie, Lp(a) wysokie	Nałożone ryzyko związane z liczbą aterogennych cząstek - często wskazanie do intensywniejszego leczenia LDL
LDL, ApoB i Lp(a) wysokie	Najwyższa kategoria ryzyka w tym zestawieniu - zwykle wymaga pilniejszej i bardziej kompleksowej opieki kardiologicznej

Najważniejsze: Co oznacza połączenie wyników LDL, ApoB i Lp(a) Same liczby nabierają sensu dopiero wtedy, gdy spojrzysz na nie razem.




Wynik Lp(a) czyta się zawsze razem z LDL i ApoB, nigdy w oderwaniu.

Kiedy nie czekać i porozmawiać z lekarzem?

Ból w klatce piersiowej, nagła duszność, osłabienie jednej strony ciała albo zaburzenia mowy to objawy, przy których nie czeka się na żadne badanie - trzeba od razu wezwać pomoc pod numerem 112. Wynik Lp(a) nigdy nie jest pilniejszy niż ostre objawy.

Jeśli masz już rozpoznaną chorobę wieńcową lub miażdżycę i wyszła Ci wysoka Lp(a), porozmawiaj z lekarzem o intensyfikacji leczenia obniżającego LDL - to nie jest sytuacja na samodzielne eksperymenty z suplementami. Podobnie, jeśli w rodzinie były zawały lub udary przed 60. rokiem życia, a Ty jeszcze nie miałeś rozszerzonego profilu lipidowego, warto umówić się na wizytę i zapytać o Lp(a) i ApoB, zamiast czekać na kolejne rutynowe badania.

Najważniejsze: Kiedy nie czekać i porozmawiać z lekarzem Ból w klatce piersiowej, nagła duszność, osłabienie jednej strony ciała albo zaburzenia mowy to objawy, przy których nie czeka się na żadne badanie - trzeba od razu wezwać pomoc pod numerem 112.



Ostre objawy sercowe zawsze mają pierwszeństwo przed wynikiem jakiegokolwiek badania.

Co zrobić, jeśli Lp(a) jest wysoka?

Dieta i ruch mają niewielki wpływ na sam poziom Lp(a) - nie obiecuj sobie, że dietą sprowadzisz wysoki wynik do normy. Niacyna obniża Lp(a) o około 20-25%, ale nie jest rutynowo zalecana, bo w dużych badaniach nie przełożyła się na mniej zawałów i udarów, a często daje skutki uboczne. Statyny mają ograniczony wpływ na samo Lp(a), choć pozostają podstawą leczenia LDL.

Inhibitory PCSK9 obniżają Lp(a) w umiarkowanym stopniu, obok znacznego obniżenia LDL - to jednak leczenie zarezerwowane dla konkretnych wskazań, a nie samodzielny wybór pacjenta.

Ponieważ samej Lp(a) nie da się łatwo obniżyć, sensowną strategią jest mocniejsza kontrola tego, na co masz wpływ: LDL, ApoB, ciśnienie krwi, poziom cukru, masa ciała, aktywność fizyczna i rzucenie palenia. Jeśli chcesz ułożyć szerszy przegląd wyników, zobacz też [badania krwi po 50-tce](#). To właśnie te elementy, razem z wynikiem Lp(a), lekarz bierze pod uwagę, planując z Tobą dalsze postępowanie.

Najważniejsze: Co zrobić, jeśli Lp(a) jest wysoka Dieta i ruch mają niewielki wpływ na sam poziom Lp(a) - nie obiecuj sobie, że dietą sprowadzisz wysoki wynik do normy.



Wysoka Lp(a) to zachęta, by mocniej popilnować tego, na co realnie masz wpływ.

Zobacz też: [ai w medycynie czy naprawdę pomagają pacjentom fakty badania.](#)

Najczęściej zadawane pytania

Czy Lp(a) to to samo co LDL?

Nie. Lp(a) to zmodyfikowana cząstka LDL połączona z dodatkowym białkiem, apolipoproteina(a). Ma odrębne, w około 90% genetyczne pochodzenie i jest mierzona osobno od standardowego LDL-cholesterolu, dlatego dobry wynik LDL nie wyklucza podwyższonej Lp(a).

Czy Lp(a) można obniżyć dietą?

W istotnym stopniu nie. Poziom Lp(a) zależy w około 90% od genów, a dieta i aktywność fizyczna mają na niego ograniczony wpływ. Zamiast liczyć na dietę, lepiej skupić się na kontroli LDL, ApoB, ciśnienia i cukru - to elementy, na które faktycznie masz wpływ.

Czy badanie Lp(a) trzeba robić na czczo?

Zwykle nie jest to konieczne, bo Lp(a) nie zmienia się istotnie po posiłku, w przeciwieństwie do trójglicerydów. Niektóre laboratoria proszą jednak o standardowe przygotowanie jak do lipidogramu, dlatego warto sprawdzić zasady konkretnej placówki przed pobraniem.

Ile kosztuje badanie Lp(a)?

W Polsce cena badania Lp(a) mieści się zwykle w przedziale około 70-150 zł, zależnie od laboratorium, miasta i ewentualnej opłaty za pobranie krwi. Ceny zmieniają się i różnią między placówkami, więc warto sprawdzić aktualny cennik przed wizytą.

Czy wysokie Lp(a) oznacza, że będę mieć zawał?

Nie, wysoka Lp(a) to sygnał podwyższonego ryzyka, a nie wyrok. Wynik na poziomie co najmniej 50 mg/dl (125 nmol/l) wiąże się z około 1,4-krotnie wyższym długoterminowym ryzykiem zawału lub udaru, ale ostateczne ryzyko zależy od całego obrazu klinicznego, nie tylko od tej jednej liczby.

Czy Lp(a) warto badać razem z ApoB?

Tak, te dwa badania dobrze się uzupełniają. ApoB pokazuje liczbę wszystkich aterogennych cząstek we krwi, a Lp(a) dodaje informację o dodatkowym, silnie aterogennym i w dużej mierze genetycznym komponencie, którego ApoB samo w sobie nie rozróżnia od pozostałych cząstek.

Udostępnij artykuł

Wyślij ten materiał przyjacielowi albo opublikuj u siebie. Jednym kliknięciem podasz aktualny link i tytuł artykułu.

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Mail

Kopiuj link

Źródła

1. [NCBI Bookshelf Endotext: Lipoprotein\(a\)](#)
2. [PubMed: European Atherosclerosis Society lipoprotein\(a\) consensus statement](#)
3. [PubMed: Lipoprotein\(a\) testing and cardiovascular risk](#)
4. [PubMed: STAR-Lp\(a\) single lifetime measurement study](#)
5. [PMC: Lipoprotein\(a\) is markedly more atherogenic than LDL](#)
6. [PMC: Apolipoprotein B and LDL cholesterol as cardiovascular risk markers](#)
7. [ESC: Dyslipidaemia guideline and lipoprotein\(a\) risk context](#)
8. [ACC: Update on Lipoprotein\(a\) testing, treatment and guideline recommendations](#)
9. [MedlinePlus NIH: Lipoprotein\(a\) blood test](#)
10. [Diagnostyka: Lipoproteina\(a\) Lp\(a\), opis badania i cena](#)
11. [ALAB: Lipoproteina A Lp\(a\), opis badania z krwi](#)

Uwaga: Artykuł ma charakter informacyjny i edukacyjny. Nie zastępuje konsultacji lekarskiej, diagnozy ani leczenia.