

Independent-seed confirmation
Final $\langle X \rangle$
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Fitted Lindblad A=B
Colored A (1 MC SE)
Colored B (1 MC SE)
$T = 3200$ $\tau_c = 3000$ $\sigma = 0.001$
$T = 3200$ $\tau_c = 10000$ $\sigma = 0.002$
$T = 3200$ $\tau_c = 10000$ $\sigma = 0.004$
$T = 1600$ $\tau_c = 10000$ $\sigma = 0.008$
$T = 1600$ Mix12 $\sigma = 0.002$
$T = 200$ Mix12 $\sigma = 0.004$
$T = 1600$ Mix12 $\sigma = 0.004$
$T = 3200$ Mix12 $\sigma = 0.004$
T, τ_c in ns; σ in rad/ns
Timing contrast, not model-fit error
$\Delta X = X_A - X_B$
0.175
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
Instantaneous-pulse analytic reference
Lindblad
Finite pulses (1 paired MC SE)
$T = 3200$ $\tau_c = 3000$ $\sigma = 0.001$
$T = 3200$ $\tau_c = 10000$ $\sigma = 0.002$
$T = 3200$ $\tau_c = 10000$ $\sigma = 0.004$
$T = 1600$ $\tau_c = 10000$ $\sigma = 0.008$
$T = 1600$ Mix12 $\sigma = 0.002$
$T = 200$ Mix12 $\sigma = 0.004$
$T = 1600$ Mix12 $\sigma = 0.004$
$T = 3200$ Mix12 $\sigma = 0.004$
T, τ_c in ns; σ in rad/ns