Synthetic OU scan: finite X_π pulses (20 ns)
Lindblad: $\Delta X = 0$; * means $|\Delta X| < 3$ Monte Carlo SE

$\sigma = 0.001$ rad/ns

τ_c (ns) \ T (ns)	200	400	800	1600	3200
10000	0.000	0.000	0.001	0.006	0.042
3000	0.000	0.000	0.002	0.017	0.065
1000	0.000	0.001	0.006	0.025	0.068
300	0.000	0.002	0.005	0.021	0.011*
100	0.000	0.001	0.002*	0.003*	0.003*
30	0.000	0.000*	-0.000*	0.000*	0.002*
10	0.000*	-0.000*	-0.000*	-0.000*	0.001*

$\sigma = 0.002$ rad/ns

τ_c (ns) \ T (ns)	200	400	800	1600	3200
10000	0.000	0.000	0.003	0.024	0.108
3000	0.000	0.001	0.010	0.057	0.120
1000	0.000	0.004	0.020	0.089	0.045*
300	0.001	0.007	0.031	0.036*	0.016*
100	0.002	0.006	0.009*	0.012*	0.018*
30	0.001	0.002*	-0.000*	-0.000*	-0.012*
10	0.000*	-0.000*	-0.001*	-0.002*	0.008*

$\sigma = 0.004$ rad/ns

τ_c (ns) \ T (ns)	200	400	800	1600	3200
10000	0.000	0.002	0.013	0.075	0.199
3000	0.001	0.005	0.035	0.160	0.017*
1000	0.002	0.014	0.071	0.121	0.009*
300	0.005	0.026	0.066	0.042*	-0.029*
100	0.008	0.021	0.028*	-0.025*	0.006*
30	0.007	0.006*	0.009*	0.021*	-0.046*
10	0.001*	-0.002*	0.005*	-0.005*	0.013*

$\sigma = 0.008$ rad/ns

τ_c (ns) \ T (ns)	200	400	800	1600	3200
10000	0.002	0.012	0.049	0.178	-0.010*
3000	0.003	0.026	0.108	0.105	-0.004*
1000	0.008	0.051	0.132	0.040*	-0.015*
300	0.022	0.100	0.055*	-0.033*	-0.003*
100	0.031	0.063	0.006*	-0.004*	0.034*
30	0.017	0.013*	0.021*	-0.004*	-0.013*
10	0.000*	0.006*	-0.011*	-0.014*	0.004*

OU correlation time τ_c (ns)
Total duration T (ns)
Paired contrast $\Delta X = X_A - X_B$
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−0.15