

首届中国大学生数学竞赛决赛试卷参考答案及评分标准

(非数学类, 2010)

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分.

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
满 分	20	10	10	10	12	14	12	12	100
得 分									

一、 计算下列各题 (共 20 分, 每小题各 5 分, 要求写出重要步骤, 如本面空白不够可写在本面背面, 并标明题号, 以下同.)

1) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} (1 + \frac{k}{n}) \sin \frac{k\pi}{n^2}$.

2) 计算 $\iint_{\Sigma} \frac{axdydz + (z+a)^2 dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$, 其中 Σ 为下半球面 $z = -\sqrt{a^2 - y^2 - x^2}$ 的上侧, a 为大于 0 的常数.

3) 现要设计一个容积为 V 的一个圆柱体的容器. 已知上下两底的材料费为单位面积 a 元, 而侧面的材料费为单位面积 b 元. 试给出最节省的设计方案: 即高与上下底的直径之比为何值时所需费用最少?

4) 已知 $f(x)$ 在 $(\frac{1}{4}, \frac{1}{2})$ 内满足 $f'(x) = \frac{1}{\sin^3 x + \cos^3 x}$, 求 $f(x)$.

解 1) 记 $S_n = \sum_{k=1}^{n-1} (1 + \frac{k}{n}) \sin \frac{k\pi}{n^2}$, 则

$$S_n = \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n}\right) \left(\frac{k\pi}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right). \quad \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$= \frac{\pi}{n^2} \sum_{k=1}^{n-1} k + \frac{\pi}{n^3} \sum_{k=1}^{n-1} k^2 + o\left(\frac{1}{n}\right) \quad \dots\dots\dots (3 \text{ 分})$$

$$\rightarrow \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{6} \quad \dots\dots\dots (5 \text{ 分})$$

2) 将 Σ (或分片后) 投影到相应坐标平面上化为二重积分逐块计算.

$$I_1 = \frac{1}{a} \iint_{\Sigma} ax dy dz = -2 \iint_{D_{yz}} \sqrt{a^2 - (y^2 + z^2)} dy dz$$

其中 D_{yz} 为 $yo z$ 平面上的半圆 $y^2 + z^2 \leq a^2, z \leq 0$. 利用极坐标, 得

$$I_1 = -2 \int_{\pi}^{2\pi} d\theta \int_0^a \sqrt{a^2 - r^2} r dr = -\frac{2}{3} \pi a^3. \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

$$I_2 = \frac{1}{a} \iint_{\Sigma} (z+a)^2 dx dy = \frac{1}{a} \iint_{D_{xy}} [a - \sqrt{a^2 - (x^2 + y^2)}]^2 dx dy,$$

其中 D_{xy} 为 xoy 平面上的圆域 $x^2 + y^2 \leq a^2$ 。利用极坐标, 得

$$I_2 = \frac{1}{a} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a (2a^2 - 2a\sqrt{a^2 - r^2} - r^2) r dr = \frac{\pi}{6} a^3. \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

$$\text{因此, } I = I_1 + I_2 = -\frac{\pi}{2} a^3. \dots\dots\dots (5 \text{ 分})$$

3) 设圆柱容器的高为 h , 上下底的径为 r , 则有

$$\pi r^2 h = V, \text{ 或 } h = \frac{V}{\pi r^2}.$$

$$\text{所需费用为 } F(r) = 2a\pi r^2 + 2b\pi r h = 2a\pi r^2 + \frac{2bV}{r} \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

$$\text{显然, } F'(r) = 4a\pi r - \frac{2bV}{r^2}.$$

$$\text{那么, 费用最少意味着 } F'(r) = 0, \text{ 也即 } r^3 = \frac{bV}{2a\pi} \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

$$\text{这时高与底的直径之比为 } \frac{h}{2r} = \frac{V}{2\pi r^3} = \frac{a}{b}. \dots\dots\dots (5 \text{ 分})$$

$$4) \text{ 由 } \sin^3 x + \cos^3 x = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos(\frac{\pi}{4} - x) [1 + 2 \sin^2(\frac{\pi}{4} - x)] \text{ 得}$$

$$I = \sqrt{2} \int \frac{dx}{\cos(\frac{\pi}{4} - x) [1 + 2 \sin^2(\frac{\pi}{4} - x)]}, \text{ 令 } u = \frac{\pi}{4} - x, \text{ 得}$$

$$I = -\sqrt{2} \int \frac{du}{\cos u (1 + 2 \sin^2 u)} = -\sqrt{2} \int \frac{d \sin u}{\cos^2 u (1 + 2 \sin^2 u)} \dots\dots\dots (3 \text{ 分})$$

$$\underline{\underline{\text{令 } t = \sin u}} \quad -\sqrt{2} \int \frac{dt}{(1-t^2)(1+2t^2)} = -\frac{\sqrt{2}}{3} \left[\int \frac{dt}{1-t^2} + \int \frac{2dt}{1+2t^2} \right]$$

$$= -\frac{\sqrt{2}}{3} \left[\frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+t}{1-t} \right| + \sqrt{2} \arctan \sqrt{2} t \right] + C$$

$$= -\frac{\sqrt{2}}{6} \ln \left| \frac{1 + \sin(\frac{\pi}{4} - x)}{1 - \sin(\frac{\pi}{4} - x)} \right| - \frac{2}{3} \arctan(\sqrt{2} \sin(\frac{\pi}{4} - x)) + C. \dots\dots\dots (5 \text{ 分})$$

二、(共 10 分, 第 (1) 小题 4 分, 第 (2) 小题 6 分) 求下列极限

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} n[(1 + \frac{1}{n})^n - e]; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a^{\frac{1}{n}} + b^{\frac{1}{n}} + c^{\frac{1}{n}}}{3} \right)^n, \text{ 其中 } a > 0, b > 0, c > 0.$$

解 (1) 我们有

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - e = e^{1 - \frac{1}{2n} + o(\frac{1}{n})} - e = e \left[e^{-\frac{1}{2n} + o(\frac{1}{n})} - 1 \right] = e \left[\left\{1 - \frac{1}{2n} + o(\frac{1}{n})\right\} - 1 \right] = e \left[-\frac{1}{2n} + o(\frac{1}{n}) \right]$$

$$\text{因此, } \lim_{n \rightarrow \infty} n[(1 + \frac{1}{n})^n - e] = -\frac{e}{2}. \quad \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

(2) 由泰劳公式有

$$a^{\frac{1}{n}} = e^{\frac{\ln a}{n}} = 1 + \frac{1}{n} \ln a + o(\frac{1}{n}) \quad (n \rightarrow +\infty),$$

$$b^{\frac{1}{n}} = e^{\frac{\ln b}{n}} = 1 + \frac{1}{n} \ln b + o(\frac{1}{n}) \quad (n \rightarrow +\infty)$$

$$c^{\frac{1}{n}} = e^{\frac{\ln c}{n}} = 1 + \frac{1}{n} \ln c + o(\frac{1}{n}) \quad (n \rightarrow +\infty)$$

因此,

$$\frac{1}{3}(a^{\frac{1}{n}} + b^{\frac{1}{n}} + c^{\frac{1}{n}}) = 1 + \frac{1}{n} \ln \sqrt[3]{abc} + o(\frac{1}{n}) \quad (n \rightarrow +\infty), \quad \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

$$\left(\frac{a^{\frac{1}{n}} + b^{\frac{1}{n}} + c^{\frac{1}{n}}}{3} \right)^n = \left[1 + \frac{1}{n} \ln \sqrt[3]{abc} + o(\frac{1}{n}) \right]^n.$$

$$\text{令 } \alpha_n = \frac{1}{n} \ln \sqrt[3]{abc} + o(\frac{1}{n}), \text{ 上式可改写成}$$

$$\left(\frac{a^{\frac{1}{n}} + b^{\frac{1}{n}} + c^{\frac{1}{n}}}{3} \right)^n = \left[(1 + \alpha_n)^{\frac{1}{\alpha_n}} \right]^{n\alpha_n}$$

$$\text{显然, } (1 + \alpha_n)^{\frac{1}{\alpha_n}} \rightarrow e \quad (n \rightarrow +\infty), \quad n\alpha_n \rightarrow \ln \sqrt[3]{abc} \quad (n \rightarrow +\infty)$$

所以,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a^{\frac{1}{n}} + b^{\frac{1}{n}} + c^{\frac{1}{n}}}{3} \right)^n = \sqrt[3]{abc}. \quad \dots\dots\dots (6 \text{ 分})$$

三、(10 分) 设 $f(x)$ 在 $x=1$ 点附近有定义, 且在 $x=1$ 点可导, 并已知 $f(1)=0, f'(1)=2$. 求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin^2 x + \cos x)}{x^2 + x \tan x}.$$

解 由题设可知:

$$\lim_{y \rightarrow 1} \frac{f(y) - f(1)}{y - 1} = \lim_{y \rightarrow 1} \frac{f'(y)}{1} = f'(1) = 2. \quad (2 \text{ 分})$$

令 $y = \sin^2 x + \cos x$, 那么当 $x \rightarrow 0$ 时, $y = \sin^2 x + \cos x \rightarrow 1$, (4 分)

故由上式有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin^2 x + \cos x)}{\sin^2 x + \cos x - 1} = 2 \quad (6 \text{ 分})$$

可见,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin^2 x + \cos x)}{x^2 + x \tan x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(\sin^2 x + \cos x)}{\sin^2 x + \cos x - 1} \times \frac{\sin^2 x + \cos x - 1}{x^2 + x \tan x} \right) \\ &= 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x + \cos x - 1}{x^2 + x \tan x} = \frac{1}{2} \quad (10 \text{ 分}) \end{aligned}$$

最后一步的极限可用常规的办法---洛比达法则或泰劳展开---求出。

四、(10 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 并且无穷积分 $\int_0^{\infty} f(x) dx$ 收敛. 求 $\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{y} \int_0^y xf(x) dx$.

解 设 $\int_0^{+\infty} f(x) dx = l$, 并令 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$.

这时, $F'(x) = f(x)$, 并有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = l$. (2 分)

对于任意的 $y > 0$, 我们有

$$\frac{1}{y} \int_0^y xf(x) dx = \frac{1}{y} \int_0^y x dF(x) = \frac{1}{y} xF(x) \Big|_{x=0}^{x=y} - \frac{1}{y} \int_0^y F(x) dx = F(y) - \frac{1}{y} \int_0^y F(x) dx \quad (6 \text{ 分})$$

根据洛比达法则和变上限积分的求导公式, 不难看出

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{y} \int_0^y F(x) dx = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(y) = l$$

因此, $\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{y} \int_0^y xf(x) dx = l - l = 0$. (10 分)

五、(共 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可微, 且 $f(0) = f(1) = 0, f(\frac{1}{2}) = 1$. 证明:

(1) 存在一个 $\xi \in (\frac{1}{2}, 1)$ 使得 $f(\xi) = \xi$; (2) 存在一个 $\eta \in (0, \xi)$ 使得 $f'(\eta) = f(\eta) - \eta + 1$.

证明 (1) 令 $F(x) = f(x) - x$, 则 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且有

$$F\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} > 0, F(1) = -1 < 0 \quad \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

所以, 存在一个 $\xi \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 使得 $F(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) = \xi$. $\dots\dots\dots (5 \text{ 分})$

(2) 令 $G(x) = e^{-x}[f(x) - x]$, 那么 $G(0) = G(\xi) = 0$. $\dots\dots\dots (8 \text{ 分})$

这样, 存在一个 $\eta \in (0, \xi)$, 使得 $G'(\eta) = 0$, 即

$$G'(\eta) = e^{-\eta}[f'(\eta) - 1] - e^{-\eta}[f(\eta) - \eta] = 0.$$

也即 $f'(\eta) = f(\eta) - \eta + 1$. 证毕. $\dots\dots\dots (12 \text{ 分})$

六、(14 分) 设 $n > 1$ 为整数,

$$F(x) = \int_0^x e^{-t} \left(1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \dots + \frac{t^n}{n!}\right) dt.$$

证明: 方程 $F(x) = \frac{n}{2}$ 在 $\left(\frac{n}{2}, n\right)$ 内至少有一个根.

证明: 因为

$$e^{-t} \left(1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \dots + \frac{t^n}{n!}\right) < 1, \quad \forall t > 0,$$

故有

$$F\left(\frac{n}{2}\right) = \int_0^{\frac{n}{2}} e^{-t} \left(1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \dots + \frac{t^n}{n!}\right) dt < \frac{n}{2} \quad \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

下面只需证明 $F(n) > \frac{n}{2}$ 即可. 我们有

$$\begin{aligned} F(n) &= \int_0^n e^{-t} \left(1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \dots + \frac{t^n}{n!}\right) dt = -\int_0^n \left(1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \dots + \frac{t^n}{n!}\right) de^{-t} \\ &= 1 - e^{-n} \left(1 + \frac{n}{1!} + \frac{n^2}{2!} + \dots + \frac{n^n}{n!}\right) + \int_0^n e^{-t} \left(1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \dots + \frac{t^{n-1}}{(n-1)!}\right) dt \quad \dots\dots\dots (7 \text{ 分}) \end{aligned}$$

由此推出

$$\begin{aligned}
 F(n) &= \int_0^n e^{-t} \left(1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \dots + \frac{t^n}{n!} \right) dt \\
 &= 1 - e^{-n} \left(1 + \frac{n}{1!} + \frac{n^2}{2!} + \dots + \frac{n^n}{n!} \right) \\
 &\quad + 1 - e^{-n} \left(1 + \frac{n}{1!} + \frac{n^2}{2!} + \dots + \frac{n^{n-1}}{(n-1)!} \right) \\
 &\quad + \dots + 1 - e^{-n} \left(1 + \frac{n}{1!} \right) + 1 - e^{-n} \dots \dots \dots (10 \text{ 分})
 \end{aligned}$$

记 $a_i = \frac{n^i}{i!}$, 那么 $a_0 = 1 < a_1 < a_2 < \dots < a_n$ 。我们观察下面的方阵

$$\begin{pmatrix} a_0 & 0 & 0 \\ a_0 & a_1 & 0 \\ & & 0 \\ a_0 & a_1 & a_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_n \\ 0 & a_1 & a_n \\ 0 & & \\ 0 & 0 & 0 & a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a_0 & a_1 & a_n \\ a_0 & 2a_1 & a_n \\ & & \\ a_0 & a_1 & 2a_n \end{pmatrix}$$

整个矩阵的所有元素之和为

$$(n+2)(1 + a_1 + a_2 + \dots + a_n) = (n+2) \left(1 + \frac{n}{1!} + \frac{n^2}{2!} + \dots + \frac{n^n}{n!} \right)$$

基于上述观察, 由 (*) 式我们便得到

$$\begin{aligned}
 F(n) &> n+1 - \frac{(2+n)}{2} e^{-n} \left(1 + \frac{n}{1!} + \frac{n^2}{2!} + \dots + \frac{n^n}{n!} \right) \\
 &> n+1 - \frac{n+2}{2} = \frac{n}{2}, \text{证毕.} \dots \dots \dots (14 \text{ 分})
 \end{aligned}$$

七、(12 分) 是否存在 \mathbf{R}^{11} 中的可微函数 $f(x)$ 使得

$$f(f(x)) = 1 + x^2 + x^4 - x^3 - x^5 ?$$

若存在, 请给出一个例子; 若不存在, 请给出证明.

解 不存在. $\dots \dots \dots (2 \text{ 分})$

假设存在 \mathbf{R}^{11} 中的可微函数 $f(x)$ 使得

$$f(f(x)) = 1 + x^2 + x^4 - x^3 - x^5.$$

考虑方程 $f(f(x)) = x$,

$$\text{即 } 1+x^2+x^4-x^3-x^5=x,$$

$$\text{或 } (x-1)(x^4+x^2+1)=0.$$

此方程有惟一实数根 $x=1$, 即 $f(f(x))$ 有惟一不动点 $x=1$ (6分)

下面说明 $x=1$ 也是 $f(x)$ 的不动点。

事实上, 令 $f(1)=t$, 则 $f(t)=f(f(1))=1$, $f(f(t))=f(1)=t$, 因此 $t=1$. 如所需. ... (8分)

记 $g(x)=f(f(x))$, 则一方面, $[g(x)]=[f(f(x))]\Rightarrow g'(1)=(f'(1))^2\geq 0$;

另一方面, $g'(x)=(1+x^2+x^4-x^3-x^5)'=2x+4x^3-3x^2-5x^4$, 从而 $g'(1)=-2$. 矛盾。

所以, 不存在 \mathbf{R}^1 中的可微函数 $f(x)$ 使得 $f(f(x))=1+x^2+x^4-x^3-x^5$. 证毕. (12分)

解法二: 满足条件的函数不存在. (2分)

理由如下

首先, 不存在 $x_k \rightarrow +\infty$, 使 $f(x_k)$ 有界, 否则 $f(f(x_k))=1+x_k^2+x_k^4-x_k^3-x_k^5$ 有界, 矛盾. .. (5分)

因此

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \infty$. 从而由连续函数的介值性有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ (7分)

若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(f(x)) = \lim_{y \rightarrow +\infty} f(y) = -\infty$, 矛盾.

若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(f(x)) = \lim_{y \rightarrow -\infty} f(y) = +\infty$, 矛盾.

因此, 无论哪种情况都不可能. (12分)

八、(12分) 设 $f(x)$ 在 $[0, \infty)$ 上一致连续, 且对于固定的 $x \in [0, \infty)$, 当自然数 $n \rightarrow \infty$ 时 $f(x+n) \rightarrow 0$.

证明函数序列 $\{f(x+n): n=1, 2, \dots\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 0

证: 由于 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 故对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在一个 $\delta > 0$ 使得

$$|f(x_1)-f(x_2)| < \frac{\varepsilon}{2}, \text{ 只要 } |x_1-x_2| < \delta \quad (x_1 \geq 0, x_2 \geq 0) \quad \dots\dots\dots (3分)$$

取一个充分大的自然数 m , 使得 $m > \delta^{-1}$, 并在 $[0, 1]$ 中取 m 个点:

$$x_1 = 0 < x_2 < \dots < x_m = 1,$$

其中 $x_j = \frac{j}{m}$ ($j=1,2,\dots,m$)。这样, 对于每一个 j ,

$$|x_{j+1} - x_j| = \frac{1}{m} < \delta. \quad \dots\dots\dots (5 \text{ 分})$$

又由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x+n) = 0$, 故对于每一个 x_j , 存在一个 N_j 使得

$$|f(x_j + n)| < \frac{\varepsilon}{2}, \text{ 只要 } n > N_j,$$

这里的 ε 是前面给定的。 $\dots\dots\dots (7 \text{ 分})$

令 $N = \max\{N_1, \dots, N_m\}$, 那么

$$|f(x_j + n)| < \frac{\varepsilon}{2}, \text{ 只要 } n > N,$$

其中 $j=1,2,\dots,m$ 。设 $x \in [0,1]$ 是任意一点, 这时总有一个 x_j 使得 $x \in [x_j, x_{j+1}]$ 。

由 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续性及 $|x - x_j| < \delta$ 可知,

$$|f(x_j + n) - f(x + n)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (\forall n=1,2,\dots) \quad \dots\dots\dots (9 \text{ 分})$$

另一方面, 我们已经知道

$$|f(x_j + n)| < \frac{\varepsilon}{2}, \text{ 只要 } n > N$$

这样, 由后面证得的两个式子就得到

$$|f(x + n)| < \varepsilon, \text{ 只要 } n > N, x \in [0,1]$$

注意到这里的 N 的选取与点 x 无关, 这就证实了函数序列 $\{f(x+n): n=1,2,\dots\}$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛于 0. $\dots\dots\dots (12 \text{ 分})$

数学家