

首届全国大学生数学竞赛预赛(2009 年非数学类)

试 题

一、填空题(本题共 4 个小题,每题 5 分,共 20 分)

(1) 计算 $\iint_D \frac{(x+y)\ln\left(1+\frac{y}{x}\right)}{\sqrt{1-x-y}} dx dy =$ _____, 其中区域 D 是由直线 $x+y=1$ 与两坐标轴所围三角形区域.

(2) 设 $f(x)$ 是连续函数, 且满足 $f(x) = 3x^2 - \int_0^2 f(x) dx - 2$, 则 $f(x) =$ _____.

(3) 曲面 $z = \frac{x^2}{2} + y^2 - 2$ 平行平面 $2x+2y-z=0$ 的切平面方程是 _____.

(4) 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $xe^{f(y)} = e^y \ln 29$ 确定, 其中 f 具有二阶导数, 且 $f' \neq 1$, 则 $\frac{d^2 y}{dx^2} =$ _____.

二、(5 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{1}{x}}$, 其中 n 是给定的正整数.

三、(15 分) 设函数 $f(x)$ 连续, $g(x) = \int_0^1 f(xt) dt$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$, A 为常数, 求 $g'(x)$ 并讨论 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

四、(15 分) 已知平面区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi\}$, L 为 D 的正向边界, 试证:

$$(1) \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx;$$

$$(2) \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx \geq \frac{5}{2} \pi^2.$$

五、(10 分) 已知

$$y_1 = x e^x + e^{2x}, \quad y_2 = x e^x + e^{-x}, \quad y_3 = x e^x + e^{2x} - e^{-x}$$

是某二阶常系数线性非齐次微分方程的三个解, 试求此微分方程.

六、(10 分) 设抛物线 $y = ax^2 + bx + 2 \ln c$ 过原点, 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $y \geq 0$, 又已知该抛物线与 x 轴及直线 $x=1$ 所围图形的面积为 $\frac{1}{3}$. 试确定 a, b, c , 使此图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积 V 最小.

七、(15 分) 已知 $u_n(x)$ 满足

$$u'_n(x) = u_n(x) + x^{n-1} e^x, \quad n = 1, 2, \cdots,$$

且 $u_n(1) = \frac{e}{n}$, 求函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 之和.

八、(10 分) 求 $x \rightarrow 1^-$ 时, 与 $\sum_{n=0}^{\infty} x^{n^2}$ 等价的无穷大量.

参 考 答 案

一、(1) $\frac{16}{15}$. (2) $3x^2 - \frac{10}{3}$. (3) $2x + 2y - z - 5 = 0$. (4) $-\frac{[1-f'(y)]^2 - f''(y)}{x^2 [1-f'(y)]^3}$.

二、解

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \exp \left\{ \frac{e}{x} \ln \left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right) \right\} = \exp \left\{ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e(\ln(e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}) - \ln n)}{x} \right\},$$

其中大括号内的极限是 $\frac{0}{0}$ 型未定式, 由洛必达法则, 有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e(\ln(e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}) - \ln n)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e(e^x + 2e^{2x} + \cdots + ne^{nx})}{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}} \\ &= \frac{e(1 + 2 + \cdots + n)}{n} = \left(\frac{n+1}{2} \right) e, \end{aligned}$$

于是

$$\text{原式} = e^{\left(\frac{n+1}{2} \right) e}.$$

三、解 由题设, 知 $f(0)=0, g(0)=0$. 令 $u=xt$, 得

$$g(x) = \frac{\int_0^x f(u) du}{x}, x \neq 0.$$

而

$$g'(x) = \frac{xf(x) - \int_0^x f(u) du}{x^2}, x \neq 0.$$

由导数的定义有

$$g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(u) du}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{2x} = \frac{A}{2}.$$

另外

$$\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - \int_0^x f(u) du}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(u) du}{x^2} = A - \frac{A}{2} = \frac{A}{2} = g'(0).$$

从而知 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

四、证法 1 由于区域 D 为一正方形, 可以直接用对坐标曲线积分的计算法计算.

$$(1) \text{左边} = \int_0^\pi \pi e^{\sin y} dy - \int_\pi^0 \pi e^{-\sin x} dx = \pi \int_0^\pi (e^{\sin x} + e^{-\sin x}) dx,$$

$$\text{右边} = \int_0^\pi \pi e^{-\sin y} dy - \int_\pi^0 \pi e^{\sin x} dx = \pi \int_0^\pi (e^{\sin x} + e^{-\sin x}) dx,$$

所以

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx.$$

(2) 由泰勒公式得 $e^{\sin x} + e^{-\sin x} \geq 2 + \sin^2 x$, 故

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \pi \int_0^\pi (e^{\sin x} + e^{-\sin x}) dx \geq \pi \int_0^\pi (2 + \sin^2 x) dx = \frac{5}{2} \pi^2.$$

证法 2 (1) 根据格林公式, 将曲线积分化为区域 D 上的二重积分

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \iint_D (e^{\sin y} + e^{-\sin x}) d\sigma,$$

$$\oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx = \iint_D (e^{-\sin y} + e^{\sin x}) d\sigma.$$

因为关于 $y=x$ 对称, 所以

$$\iint_D (e^{\sin y} + e^{-\sin x}) d\sigma = \iint_D (e^{-\sin y} + e^{\sin x}) d\sigma,$$

故

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx.$$

(2) 由 $e^t + e^{-t} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n}}{(2n)!} \geq 2 + t^2$, 有

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \iint_D (e^{\sin y} + e^{-\sin x}) d\sigma = \iint_D (e^{\sin x} + e^{-\sin x}) d\sigma \geq \frac{5}{2} \pi^2.$$

五、解 根据二阶线性非齐次微分方程解的结构有关知识, 由题设可知 $2y_1 - y_2 - y_3 = e^{2x}$ 与 $y_1 - y_3 = e^{-x}$ 是相应齐次方程两个线性无关的解, 且 xe^x 是非齐次方程的一个特解, 因此可以用下述两种解法.

解法 1 设此方程式为

$$y'' - y' - 2y = f(x).$$

将 $y = xe^x$ 代入上式, 得

$$f(x) = (xe^x)'' - (xe^x)' - 2xe^x = 2e^x + xe^x - e^x - xe^x - 2xe^x = e^x - 2xe^x,$$

因此所求方程为 $y'' - y' - 2y = e^x - 2xe^x$.

解法 2 设 $y = xe^x + c_1 e^{2x} + c_2 e^{-x}$ 是所求方程的通解, 由

$$y' = e^x + xe^x + 2c_1 e^{2x} - c_2 e^{-x}, \quad y'' = 2e^x + xe^x + 4c_1 e^{2x} + c_2 e^{-x},$$

消去 c_1, c_2 得所求方程为 $y'' - y' - 2y = e^x - 2xe^x$.

六、解 因抛物线过原点, 故 $c=1$. 由题设有

$$\int_0^1 (ax^2 + bx) dx = \frac{a}{3} + \frac{b}{2} = \frac{1}{3},$$

即 $b = \frac{2}{3}(1-a)$, 而

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^1 (ax^2 + bx)^2 dx = \pi \left(\frac{1}{5} a^2 + \frac{1}{2} ab + \frac{1}{3} b^2 \right) \\ &= \pi \left[\frac{1}{5} a^2 + \frac{1}{3} a(1-a) + \frac{1}{3} \times \frac{4}{9} (1-a)^2 \right]. \end{aligned}$$

令

$$\frac{dV}{da} = \pi \left[\frac{2}{5} a + \frac{1}{3} - \frac{2}{3} a - \frac{8}{27} (1-a) \right] = 0,$$

得 $a = -\frac{5}{4}$, 代入 b 的表达式得 $b = \frac{3}{2}$, 所以 $y \geq 0$.

又因 $\left. \frac{d^2 V}{da^2} \right|_{a=-\frac{5}{4}} = \pi \left(\frac{2}{5} - \frac{2}{3} + \frac{8}{27} \right) = \frac{4}{135} \pi > 0$ 及实际情况, 当 $a = -\frac{5}{4}, b = \frac{3}{2}, c = 1$ 时, 体积最小.

七、解 先解一阶常系数微分方程, 求出 $u_n(x)$ 的表达式, 然后再求 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的和.

由已知条件可知 $u'_n(x) - u_n(x) = x^{n-1} e^x$ 是关于 $u_n(x)$ 的一个一阶常系数线性微分方程, 故其通解为

$$u_n(x) = e^{\int dx} \left(\int x^{n-1} e^x e^{-\int dx} dx + c \right) = e^x \left(\frac{x^n}{n} + c \right).$$

由条件 $u_n(1) = \frac{e}{n}$, 得 $c=0$, 故 $u_n(x) = \frac{x^n e^x}{n}$, 从而

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n e^x}{n} = e^x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}.$$

$s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$, 其收敛域为 $[-1, 1)$, 当 $x \in (-1, 1)$ 时, 有

$$s'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x},$$

故

$$s(x) = \int_0^x \frac{1}{1-t} dt = -\ln(1-x).$$

当 $x = -1$ 时

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = -e^{-1} \ln 2.$$

于是, 当 $-1 \leq x < 1$ 时, 有

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = -e^x \ln(1-x).$$

八、解 $\int_0^{+\infty} x^{t^2} dt \leq \sum_{n=0}^{\infty} x^{n^2} \leq 1 + \int_0^{+\infty} x^{t^2} dt$, 故有

$$\int_0^{+\infty} x^{t^2} dt = \int_0^{+\infty} e^{-t^2 \ln \frac{1}{x}} dt = \frac{1}{\sqrt{\ln \frac{1}{x}}} \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\ln \frac{1}{x}}} \sim \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{1-x}}.$$