

Statistiques : Proportions, Évolutions

Seconde 3

1 Proportions et pourcentages

1.1 Populations

Définition 1. *En statistiques, on étudie des **populations**, c'est-à-dire des ensembles d'éléments appelés **individus**.*

Exemple. *Les ensembles suivants sont des populations pouvant faire l'objet d'études statistiques.*

- *Le sport préféré des habitants de Villeneuve-Le-Roi ;*
- *Les initiales des élèves d'un lycée ;*
- *Le poids de pièces de métal fabriquées par une machine.*
-
-

Définition 2. *On appelle **sous-population** d'une population P une partie des individus de P .*

Exemple. *On donne des exemples de sous-population correspondant aux populations données ci-dessus :*

- *Les sports collectifs ;*
- *Les initiales commençant par des voyelles ;*
- *Les pièces pesant plus de 3.8 kg ;*
-
-

1.2 Proportions

Définition 3. On considère une population P de N individus et une sous-population S de P de n individus. Alors la **proportion** de S par rapport à P , notée p , est donné par

$$p = \frac{n}{N}$$

Remarque.

$$\text{Proportion} = \frac{\text{Cas Particuliers}}{\text{Population Totale}}$$

Exercice. On vide une trousse de tous ses stylos (il y en a 15), et on compte le nombre de stylos rouges (il y en a 3).

- a) Quelle est la population étudiée ? Et la sous-population ?
- b) Quelle est la proportion de stylos rouges dans cette trousse ?

Remarque. Une proportion p peut-être exprimée sous la forme de **pourcentage**, il suffit de la multiplier par 100.

Exemple. On considère les 56 animaux d'un zoo : il y a 28 lions, 12 zèbres et 16 alligators.

- a) Quelle est la population étudiée ?
- b) Quelles sont les différentes sous-populations à l'étude ?
- c) Donner la proportion de lions (p_L), de zèbres (p_Z) et d'alligators (p_A) **en pourcentage**.

1.3 Proportions de proportions


Exercice. Dans un stade de 1600 spectateurs, 40% sont venus supporter l'équipe bleue. Parmi les supporters de l'équipe bleue, seul 60% d'entre eux ont acheté une boisson. Combien de spectateurs sont à la fois supporteur de l'équipe bleue et ont acheté une boisson ?

Proposition 1. Soit P une population, S_1 une sous-population de P , et S_2 une sous-population de S_1 . Alors, S_2 est une sous-population de P .


De plus, si on note p_1 la proportion de S_1 par rapport à P et p_2 la proportion de S_2 par rapport à S_1 , alors la proportion de S_2 par rapport à P est donnée par

$$p = p_1 \times p_2$$


Remarque. a) La situation peut-être schématisée ainsi :



Proportion = p_1



Proportion = p_2



Proportion = $p_1 \times p_2$

b) **Attention si les proportions sont données en pourcentages !** Dans ce cas, si l'on a $p_1\%$ et $p_2\%$, la proportion de proportions correspondante est

$$\frac{p_1}{100} \times \frac{p_2}{100}$$

Exemple. Dans un autre stade (dont on ignore le nombre de spectateurs), 40% sont venus supporter l'équipe bleue. Parmi les supporters de l'équipe bleue, seul 60% d'entre eux ont acheté une boisson. Quelle est la proportion de spectateurs étant à la fois supporteur de l'équipe bleue et ayant acheté une boisson ?

2 Évolution

2.1 Variation absolue, variation relative

On considère une quantité qui varie entre V_d sa valeur de départ et V_f sa valeur finale.

Définition 4.

- La **variation absolue** de la quantité est donnée par $V_f - V_d$.
- La **variation relative** de la quantité, aussi appelée **taux d'évolution**, est donnée par $\frac{V_f - V_d}{V_d}$.

Remarque.

- La variation absolue possède la même unité que la quantité étudiée, tandis que la variation relative ne possède pas d'unité.
- Quand la variation absolue ou relative est positive, c'est que la quantité a augmenté. Quand la variation absolue ou relative est négative, c'est que la quantité a diminué.
- Le **taux d'évolution** peut être donné en pourcentage : il suffit de multiplier le taux d'évolution par 100.

Exemple. Je possédais $V_d = 50$ ce mois-ci, et je possèderai $V_f = 75$ le mois prochain. Donner la variation absolue et le taux d'évolution concernant ce changement de budget.


Proposition 2. Soit $t = \frac{V_f - V_d}{V_d}$ le taux d'évolution. Alors $V_f = (1 + t)V_d$.
Autrement dit, il faut multiplier V_d par $(1 + t)$ pour faire évoluer cette quantité vers V_f .

Définition 5. Le nombre $1 + t$, où t est le taux d'évolution, est appelé **Coefficient Multiplicateur**.

Exemple. La température de la classe est initialement $V_d = 20^\circ\text{C}$. Elle augmente de 25%. Calculer le coefficient multiplicateur associé et donner la température finale.

2.2 Évolutions successives

Exemple. Le prix de l'électricité augmente de 5% tous les ans pendant deux ans. De quel pourcentage a augmenté le prix de l'électricité après deux ans ?



Proposition 3. La succession de deux évolutions, respectivement de taux t_1 et t_2 , a pour coefficient multiplicateur :

$$CM_t = CM_1 \times CM_2 = (1 + t_1) \times (1 + t_2)$$


Alors, le taux d'évolution **global** associé à cette succession est donné par $t = CM_t - 1$.

Exemple. Le prix du gaz, quant à lui, a augmenté de $t_1 = 20\%$ la première année puis a diminué de $t_2 = -40\%$ la deuxième année.

- Donner les coefficients multiplicateurs CM_1 et CM_2 associés à t_1 et à t_2 .
- En déduire le coefficient multiplicateur CM_t de la succession d'évolutions.
- En déduire le taux d'évolution global t .

2.3 Évolution réciproque

Exemple. Un article est soldé de 33% en 2024. Mais, en 2025, on souhaite augmenter son prix d'un certain pourcentage afin d'obtenir son prix initial. Quel est ce pourcentage ?



Proposition 4. Soit un taux d'évolution t , décrivant l'évolution depuis une valeur V_d vers une valeur V_f . Son coefficient multiplicateur est noté CM .

Alors, pour calculer le taux de l'évolution de V_f vers V_d , on calcule son coefficient multiplicateur

$$CM_r = \frac{1}{CM}$$

Alors le taux d'évolution **réciproque** est donné par

$$t_r = CM_r - 1$$

Exemple. Un autre article est augmenté de $t = +60\%$. On se demande par quel pourcentage solder cet article pour qu'il retrouve son prix d'origine.

- Calculer le coefficient multiplicateur CM associé à ce taux d'évolution.
- En déduire le coefficient multiplicateur **réciproque** CM_r .
- En déduire le taux d'évolution réciproque t_r .