


2 Représentation d'expérience aléatoire

2.1 Arbres pondérés

Exemple. Soit une expérience aléatoire d'univers Ω , et deux événements A et B d' Ω . Alors, l'arbre pondéré suivant permet de calculer certaines probabilités.



Proposition 2.

- Une branche de la racine à une extrémité correspond à l'intersection des événements correspondants. Pour calculer la probabilité de cette intersection, il faut multiplier les probabilités sur la branche.
- La somme de toutes les probabilités issues d'un même nœud vaut 1.
- La probabilité d'un événement est égale à la somme des probabilités de toutes les branches contenant cet événement.

2.2 Tableau

Certaines expériences aléatoires se prêtent bien à l'utilisation de tableaux à double entrée.

Exemple. La somme du résultat du lancer de deux dés est un bon exemple, car il peut être résumé comme ceci :

	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Puisque toutes les cases correspondent à des situations équiprobables, il devient très facile de calculer la probabilité d'obtenir la somme de votre choix.

3 Théorie des probabilités

Nous allons chercher à comprendre les règles de calculs donnés par l'arbre pondéré.

3.1 Probabilités conditionnelles

Définition 7. Soit une expérience aléatoire d'univers Ω , et A et B deux événements de Ω . On suppose de plus que $P(A) \neq 0$.
Alors, la **probabilité de A sachant B** , notée $P_A(B)$, est la probabilité que B se réalise **sachant** que A s'est déjà réalisé.

Exemple. Une usine produit des vis et des clous. Certaines pièces ont un défaut de fabrication. On prend une pièce produite par cette usine au hasard.

On note V « La pièce choisie est une vis » et D « La pièce choisie a un défaut de fabrication ». Dans chacune des situations suivantes, donner la probabilité correspondante (en choisissant bien la bonne notation)

- Il y a 4% de vis présentant un défaut de fabrication parmi toutes les pièces produites par l'usine.
- Il y a 2% de vis présentant un défaut de fabrication parmi les vis produites par l'usine.

Proposition 3 (Formule des probabilités composées). Soit A et B deux événements de Ω tels que $P(A) \neq 0$. Alors

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$$

Remarque. Il s'agit de la règle de calcul de la probabilité d'une branche dans un arbre pondéré.

Proposition 4. Soit A et B deux événements de Ω tels que $P(A) \neq 0$. Alors

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Exemple. On tire une bille au hasard dans un sac. Chaque bille est grosse ou petite, et chaque bille est rouge ou verte. On note R « La bille est rouge », et G « la bille est grosse ». Alors le tableau suivant donne la répartition du sac.

	R	\bar{R}	Total
G	12	8	20
\bar{G}	7	13	20
Total	19	21	40

- Quelle est la probabilité d'obtenir une grosse bille rouge ?
- Quelle est la probabilité d'obtenir une petite bille, sachant que la bille tirée est verte ?

3.2 Partition de l'univers

Définition 8. Soit une expérience aléatoire d'univers Ω . On dit que des événements A_1, A_2, \dots, A_n forment une **partition** de Ω si et seulement si

$$\begin{cases} A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega \\ A_1, A_2, \dots, A_n \text{ sont disjoints deux à deux} \end{cases}$$

Remarque.


- Créer une partition de Ω , c'est regrouper chaque issue de Ω dans un unique paquet.
- Soit A un événement de Ω , alors A et \bar{A} forment une partition de Ω .

Exemple. On considère le lancer d'un seul dé équilibré. Alors si A « le résultat est pair », B « le résultat est 1 » et C « le résultat est impair supérieur ou égal à 3 », on en déduit que A, B et C forment une partition de l'univers de l'expérience.

Proposition 5 (formule des probabilités totales). Soit B un événement, et A_1, A_2, \dots, A_n une partition de Ω . Alors,

$$P(B) = P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + \dots + P(B \cap A_n)$$

Remarque. Le schéma suivant permet de visualiser la situation.



Remarque. La formule des probabilité totale correspond à la méthode de calcul de la probabilité de plusieurs branches d'un arbre pondéré.

À chaque hauteur de l'arbre, il faut donc s'assurer que tous les événements originaires d'une même branche forment une partition de l'univers Ω .