

學號：B06942098 系級： 電信碩一 姓名：曾柏偉

請實做以下兩種不同 feature 的模型，回答第 (1) ~ (3) 題：

1. 抽全部 9 小時內的污染源 feature 的一次項(加 bias)
2. 抽全部 9 小時內 pm2.5 的一次項當作 feature(加 bias)

備註：

- a. NR 請皆設為 0，其他的數值不要做任何更動
- b. 所有 advanced 的 gradient descent 技術(如: adam, adagrad 等) 都是可以用的

1.(2%)記錄誤差值 (RMSE)(根據 kaggle public+private 分數)，討論兩種 feature 的影響 9 小時 18 個天氣因子： 6.51401

9 小時 只考慮 PM2.5： 6.59624

考量的 18 個氣候因子,RMSE 比較小


2. (1%)將 feature 從抽前 9 小時改成抽前 5 小時，討論其變化

五小時 18 個天氣因子： 6.6261

五小時只考慮 PM2.5： 6.744909

考量 18 個天氣因子的 RMS 仍然比較小。

3. (1%)Regularization on all the weight with $\lambda=0.1$ 、 0.01 、 0.001 、 0.0001 ，並作圖



4. (1%)在線性回歸問題中，假設有 N 筆訓練資料，每筆訓練資料的特徵 (feature) 為一向量 x^n ，其標註(label)為一存量 y^n ，模型參數為一向量 w (此處忽

略偏權值 b ），則線性回歸的損失函數(loss function)為 $\sum_{n=1}^N (y_n - x_n^T w)^2$ 。若將所有訓練資料的特徵值以矩陣 $X = [x^1 \ x^2 \ \dots \ x^N]^T$ 表示，所有訓練資料的標註以向量 $y = [y^1 \ y^2 \ \dots \ y^N]^T$ 表示，請問如何以 X 和 y 表示可以最小化損失函數的向量 w ？請寫下算式並選出正確答案。(其中 $X^T X$ 為 invertible)

- a. $(X^T X) X^T y$
- b. $(X^T X)^0 X^T y$
- c. $(X^T X)^{-1} X^T y$
- d. $(X^T X)^2 X^T y$

$$Ax \sim b$$

For normal equation : $A^T A x = A^T b$

If $A^T A$ is inverse:

So the Best close form solution : $x = (A^T A)^{-1} A^T b$

故答案為 C