

පටුන

හැඳින්වීම	04
නිර්දේශිත පොල් ප්‍රභේද සහ වගා පිළිවෙත්	09
පොල් වගාවක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා සුදුසු පොල් ප්‍රභේද තෝරා ගැනීම	12
පොල් පැළ සිටුවීම	14
පොහොර නිර්දේශ සහ පොහොර යෙදීමේ ක්‍රම	15
පැළ සිටුවීමේදී පොහොර යෙදීම සඳහා නිර්දේශය	16
පොල් පැළ සඳහා පොහොර නිර්දේශය	16
ඵල දරන ගස් සඳහා පොහොර නිර්දේශය	19
තැඹිලි සඳහා පොහොර නිර්දේශය	21
ආන්තරික පොහොර නිර්දේශය (DFR)	23
පොල් ඉඩම්වල පාංශු තෙතමන සංරක්ෂණය	
පොල් පැළ සඳහා තෙතමනය සංරක්ෂණ ක්‍රම	24
පරිණත ගස් සඳහා තෙතමනය සංරක්ෂණ ක්‍රම	25
නිරසාර පොල් වගාවක් සඳහා පීච අඟුරු	30
පොල් වගාව සඳහා වාර්ෂාංගික ජල සැපයුම	33
පොල් වගාවේ පළිබෝධකයන් හා රෝග පාලනය	
පොල් වගාවන්හි ප්‍රධාන පළිබෝධකයන්	39
පොල් වගාවන්හි සුළු පළිබෝධකයන්	56
පොල් වගාවේ රෝග සහ කළමනාකරණය	60
පොල් ඉඩම් වල වල් පැළෑටි කළමනාකරණය	65
අතුරු බෝග වගාව, සත්ව පාලනය සහ ඒකාබද්ධ ගොවිතැන තුළින් පොල් ඉඩම් වල ලාභය ඉහළ නංවා ගැනීම	
අතුරු බෝග වගා කිරීමේ මූලධර්ම	68
පොල් ඉඩම් සඳහා තෝරා ගත හැකි අතුරු බෝග.....	69
සත්ව පාලනය	78
ඒකාබද්ධ ගොවිතැන් ක්‍රමය	80
ශ්‍රී ලංකාවේ පොල් අස්වනු නෙලීම	85
බෝග වගා පද්ධතිවල මුදල් ප්‍රවාහ	
ඇමුණුම 1: පොල් වගාව	88
ඇමුණුම 2: පොල් යටතේ ඉඟුරු වගාව	90
ඇමුණුම 3: පොල් යටතේ කහ වගාව	91
ඇමුණුම 4: පොල් යටතේ මඤ්ඤාක්කා වගාව	92
ඇමුණුම 5: පොල් යටතේ පැපොල් වගාව	93
ඇමුණුම 6: පොල් යටතේ ගම්මිරිස් වගාව	95
ඇමුණුම 7: පොල් යටතේ අන්නාසි වගාව	98
ඇමුණුම 8: පොල් යටතේ කෙසෙල් වගාව	100
ඇමුණුම 9: පොල් යටතේ අනෝදා වගාව	103
ඇමුණුම 10: පොල් යටතේ කජු වගාව	106
ඇමුණුම 11: පොල් යටතේ අඹ වගාව	108
ඇමුණුම 12: පොල් යටතේ කුරුඳු වගාව	110

ඉලක්කගත පාඨකයන්

- සියලු පරිමාණයේ පොල් වගාකරුවන්
- කෘෂි ව්‍යාප්ති නිලධාරීන්
- තාක්ෂණවේදීන්
- පර්යේෂකයන්
- අධ්‍යාපනඥයින්
- සිසුන්
- පොල් කර්මාන්තයේ පාර්ශවකරුවන්
- ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයින්

ඉලක්කගත පාඨකයන් සඳහා මෙම ග්‍රන්ථය වැදගත් වන්නේ ඇයි?

මෙම ග්‍රන්ථය සෑම පාර්ශවයකටම වැදගත් වන්නේ එය ප්‍රායෝගික සහ පර්යේෂණ මත පදනම් වූ පොල් නිෂ්පාදන මාර්ගෝපදේශ සපයන අතර එය ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා සඳහා සෘජුවම යොදා ගත හැකි බැවිනි. මෙම ග්‍රන්ථය භාවිතයෙන්, වගාකරුවන්ට ක්ෂේත්‍ර කළමනාකරණය සහ ඵලදායීතාව වැඩිදියුණු කළ හැකි අතර, කෘෂි ව්‍යාප්ති නිලධාරීන්ට පොල් වගාකරුවන්ට විශ්වාසදායක නිර්දේශ ලබා දිය හැකිය. තාක්ෂණවේදීන් හට තාක්ෂණික සහාය සහ ගැටළු විසඳීම සඳහා එය භාවිතා කළ හැකි අතර, පර්යේෂකයන්ට එය වැඩිදුර අධ්‍යයනය සඳහා පරිශීලකයක් ලෙස භාවිතා කළ හැක. අධ්‍යාපනඥයින්ට නිරවද්‍ය වගා පිළිවෙත් ඉගැන්වීමට එය භාවිතා කළ හැකි අතර, සිසුන්ට මෙම ග්‍රන්ථය පරිශීලනය කිරීමෙන් පොල් කර්මාන්තය පිළිබඳව හොඳ දැනුමක් ලබා ගත හැකිය. පොල් කර්මාන්තයේ පාර්ශවකරුවන්ට නිෂ්පාදනය සහ අගය දාම කෙරෙහි ඇති අවශ්‍යතා වඩා හොඳින් තේරුම් ගත හැකි වන අතර, ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයින්ට පොල් ක්ෂේත්‍රය සංවර්ධනය සඳහා වඩාත් දැනුවත් තීරණ ගත හැකිය.

හැඳින්වීම

වසර සිය ගණනක් තිස්සේ, පොල් ගස (*Cocos nucifera* L.) බහුකාර්යතාවයේ විශිෂ්ට සංකේතයක් වී ඇත. එය ආහාර, පාන වර්ග සහ නවාතැන් මෙන්ම එහි නිෂ්පාදන වලින් ආදායම ද සපයයි. එහි අඛණ්ඩ නිෂ්පාදනය හේතුවෙන්, වසර පුරා පොල් අස්වැන්න පහසුවෙන් ලබා ගත හැකිය. සෑම පොල් වල්ලකම ගෙඩි පහේ සිට දොළහ දක්වා අඩංගු විය හැකිය. වර්තමානයේ, ලෝකයේ ප්‍රධාන පොල් නිෂ්පාදකයින් වන්නේ ඉන්දුනීසියාව, පිලිපීනය සහ ඉන්දියාවය.

පොල් යනු ආහාර, තෙල්, පොල් වතුර, පොල් කිරි සහ ඖෂධ ප්‍රභවයකි. එය සියවස් ගණනාවක් තිස්සේ මිනිසුන් විසින් භාවිතා කර ඇති බව පෙනේ. අද වන විට, පොල් සෞඛ්‍යය හා යහපැවැත්මේ සංකේතයක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇති අතර, එය සෞඛ්‍යය ගැන සැලකිලිමත් වන ආහාර සහ ජීවන රටාවන්හි එහි වර්ධනය වන හුම්කාව පිළිබිඹු කරයි. ආසියානු නිවර්තන කලාපයේ සිට දකුණු ඇමරිකාව දක්වා, මහාද්වීප හරහා සංක්‍රමණය වී වෙළඳාම් කරන මුහුදු ගමන් කරන්නන් හරහා පොල් ලොව පුරා ව්‍යාප්ත වී ඇත. සැහැල්ලු හා පාවෙන සුලු බව හේතුවෙන්, පොල් වලට සාගර ධාරා මත විශාල දුරක් පාවී යා හැකිය. නිවර්තන කලාපයෙන් බොහෝ දුරින් පිහිටා ඇති නෝර්වේ මුහුදේ ද පොල් සොයා ගන්නා බවට වාර්තා වී තිබේ. මෙම ප්‍රකාශනයේ අරමුණ වන්නේ පොල් වගාකරුවන්ට මග පෙන්වීම සහ ඉහළ අස්වැන්නක් ලබා දෙන පොල් ප්‍රභේද භාවිතා කිරීම, නිවැරදි ලෙස පොහොර සහ කාබනික පොහොර යෙදීම, පස හා තෙතමනය සංරක්ෂණය කිරීම, වාරිමාර්ග සැපයීම සහ ශාක සෞඛ්‍යය කළමනාකරණය කිරීම වැනි නිර්දේශිත අනුගමනය කිරීමෙන් සාමාන්‍ය පොල් අස්වැන්න හෝ සාමාන්‍ය පොල් අස්වැන්න වසරකට ගසකට ගෙඩි 45-55 සිට ගෙඩි 80-100 දක්වා වැඩි කළ හැකි බවට දැනුවත් කිරීමය.

නිර්දේශිත පොල් ප්‍රභේද සහ වගා පිළිවෙත්

පොල් වගාවක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා සුදුසු පොල් ප්‍රභේද තෝරා ගැනීම.

පොල් ගස යනු දශක ගණනාවක් තිස්සේ වගා කරනු ලබන බහු වාර්ෂික වැවිලි බෝගයකි. එබැවින්, නව වගාවක් ආරම්භ කිරීමේදී, පස, දේශගුණය සහ වගා කිරීම සඳහා පවතින ඉඩ ප්‍රමාණය සැලකිල්ලට ගනිමින් වඩාත් සුදුසු ප්‍රභේදය තෝරා ගැනීම සහ හොඳ තත්ත්වයේ රෝපණ ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීම වැදගත් වේ.

මීට අමතරව, රෝපණ ද්‍රව්‍ය තෝරා ගැනීම, නිසි ආකාරයට සිටුවීම සහ සිටුවීමෙන් පසු නිවැරදි ලෙස නඩත්තු කිරීම අනුගමනය කළ යුතුය. එසේම යෝග්‍ය පැළ ඝනත්වය පවත්වා ගැනීම, තනි හෝ අතුරු බෝග වගාව සඳහා සුදුසු පරතරයක් අනුගමනය කිරීම සහ අනෙකුත් නිර්දේශිත වගා පිළිවෙත් අනුගමනය කිරීමද අත්‍යවශ්‍ය වේ.

ශ්‍රී ලංකා පොල් පර්යේෂණ ආයතනය මගින් පහත සඳහන් පොල් ප්‍රභේද නිර්දේශ කර ඇත.

CRIC 60 (උස × උස)

- මෙම ප්‍රභේදය උසස් ලක්ෂණ සහිත උස ගස් අතර මුහුමකින් නිෂ්පාදනය කරයි.
- සියලුම පොල් වගා කරන ප්‍රදේශවල සහ මහා පරිමාණ වගාවන් සඳහා වගා කිරීම සඳහා නිර්දේශ කෙරේ.
- සාමාන්‍ය කළමනාකරණ තත්ත්වයන් යටතේ වසර 5-6 කින් එල දරයි.
- එලදා විභවය වසරකට හෙක්ටයාරයකට ගෙඩි 12,000-15,000 ක් පමණ වේ.
- තද නිල් පැහැති ස්ටිකරයකින් සහතික කර ඇත.
- පොල් පර්යේෂණ ආයතනයට සහ පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලයට අයත් තවාන් වලින් හා පොල් පර්යේෂණ ආයතනයේ ලියාපදිංචි පෞද්ගලික පොල් පැළ තවාන් වලින් වගාකරුවන්ට ලබා ගත හැකිය.

CRISL 98 (උස × සැන්රාමන්)

- ශ්‍රී ලංකාවේ උස ප්‍රභේදය හා පිලිපීනයේ සැන්රාමන් උස ප්‍රභේදය අතර දෙමුහුමකි.
- ශ්‍රී ලංකාවේ තෙත් සහ අතරමැදි කලාපවල සහ මහා පරිමාණ වගාවන් සඳහා වගා කිරීමට නිර්දේශ කෙරේ.
- සාමාන්‍ය කළමනාකරණ තත්ත්ව යටතේ අවුරුදු 4-5 අතර කාලයක දී එල දරයි.
- එලදා විභවය වසරකට හෙක්ටයාරයකට ගෙඩි 12,000-15,000 ක් පමණ වේ.
- ගෙඩියක විශාලත්වය වැඩිවීම හා මදයේ ඝනකම වැඩිවීම හේතුවෙන් ඉහළ කොප්පරා අස්වැන්නක් ලබා දෙයි.
- තද රතු පැහැති ස්ටිකරයකින් සහතික කර ඇත.

CRIC 65 (කහ/කොළ කුන්දිරා × උස)

- ශ්‍රී ලංකා කහ/කොළ කුන්දිරා හා ශ්‍රී ලංකා උස ප්‍රභේදය අතර දෙමුහුමකි.
- එලදා විභවය වසරකට හෙක්ටයාරයකට ගෙඩි 20,000-22,000 ක් පමණ වේ.
- සාමාන්‍ය කළමනාකරණ තත්ත්ව යටතේ අවුරුදු 3-4 අතර කාලයක දී එල දරයි.
- තද කොළ පැහැති ස්ටිකරයකින් සහතික කර ඇත.



කපිරුවන/CRISL 2004 (කොළ කුන්දිරා * සැන්රාමන්)

- ශ්‍රී ලංකා කොළ කුන්දිරා ප්‍රභේදය හා පිලිපීනයේ සැන්රාමන් උස ප්‍රභේදය අතර දෙමුහුමකි.
- ඵලදා විභවය වසරකට හෙක්ටයාරයකට ගෙඩි 20,000-22,000
- ක් පමණ වේ.
- සාමාන්‍ය කළමනාකරණ තත්ත්ව යටතේ අවුරුදු 3-4 අතර කාලයක දී ඵල දරයි.
- තද තැඹිලි පැහැති ස්ටිකරයකින් සහතික කර ඇත.



කපීසුවය/CRISL 2012 (දුඹුරු කුන්දිරා * උස)

- ශ්‍රී ලංකා දුඹුරු කුන්දිරා ප්‍රභේදය හා ශ්‍රී ලංකා උස ප්‍රභේදය අතර දෙමුහුමකි.
- ඵලදා විභවය වසරකට හෙක්ටයාරයකට ගෙඩි 20,000-22,000 ක් පමණ වේ.
- සාමාන්‍ය කළමනාකරණ තත්ත්ව යටතේ අවුරුදු 3-4 අතර කාලයක දී ඵල දරයි.
- තද රෝස පැහැති ස්ටිකරයකින් සහතික කර ඇත.



කපීසෙත/CRISL 2013 (දුඹුරු කුන්දිරා * සැන්රාමන්)

- ශ්‍රී ලංකා දුඹුරු කුන්දිරා හා පිලිපීනයේ සැන්රාමන් උස ප්‍රභේදය අතර දෙමුහුමකි.
- ඵලදා විභවය වසරකට හෙක්ටයාරයකට ගෙඩි 20,000-22,000 ක් පමණ වේ.
- සාමාන්‍ය කළමනාකරණ තත්ත්ව යටතේ අවුරුදු 3-4 අතර කාලයක දී ඵල දරයි.
- කළු පැහැති ස්ටිකරයකින් සහතික කර ඇත.



CRISL 2020 (ශ්‍රී ලංකා උස x මලයානු රතු කුන්දිරා)

- ශ්‍රී ලංකා උස හා මලයානු රතු කුන්දිරා අතර දෙමුහුමකි.
- ඵලදා විභවය වසරකට හෙක්ටයාරයකට ගෙඩි 22,000 ක් පමණ වේ.
- සාමාන්‍ය කළමනාකරණ තත්ත්ව යටතේ අවුරුදු 3-4 අතර කාලයක දී ඵල දරයි.
- ළා දැමී පාට ස්ටිකරයකින් සහතික කර ඇත



දෙමුහුන් පොල් ප්‍රභේද ගෙවතු වල මෙන්ම තෙත් සහ අතරමැදි කලාප සඳහා මහා පරිමාණ වගාවන්හි වගා කිරීම සඳහා නිර්දේශ කෙරේ. වාරිමාර්ග සඳහා ස්ථිර ජල සැපයුමක් සහිත, ඉහළ කළමනාකරණ තත්ත්ව යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ අනෙකුත් ප්‍රදේශවල ද මෙම පොල් ප්‍රභේද වගා කළ හැකිය.


උසස් ශාක පොල් පැළ

- ඉහළ අස්වැන්නක් ලබා ගත හැකි උස ප්‍රභේදයේ තෝරාගත් මව් ශාක වලින් බීජ පොල් එකතු කරනු ලැබේ.
- එලදා විභවය වසරකට හෙක්ටයාරයකට ගෙඩි 10,000-12,000 ක් පමණ වේ.
- සාමාන්‍ය කළමනාකරණ තත්ත්වයන් යටතේ අවුරුදු 5-6 අතර කාලයක දී එල දරයි.
- පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලයේ තවත් වලින් ලබා ගත හැකිය.

මෝරොක් උස

- මාවතගම පිහිටි මොරොක් වත්ත නම් ඉඩමෙන් තෝරාගත් ප්‍රභේදයයි.
- ශ්‍රී ලංකාවේ තෙත් හා අතරමැදි කලාපයේ වගාකිරීමට නිර්දේශ කර ඇත. එලදා විභවය වසරකට හෙක්ටයාරයකට ගෙඩි 11,000 ක් පමණ වේ.
- සාමාන්‍ය කළමනාකරණ තත්ත්ව යටතේ අවුරුදු 5-6 අතර කාලයක දී එල දරයි.
- සුදු පැහැති ස්ථිකරයකින් සහතික කර ඇත.
- පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලයේ පැළ තවත් වලින් ලබා ගත හැකිය.

විවිධ දේශගුණික කලාප සඳහා සුදුසු පොල් ප්‍රභේද

CRIC 60 / උසස් ශාක මෙම උස ප්‍රභේද ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම පොල් වගා කරන ප්‍රදේශ සඳහා නිර්දේශ කෙරේ.	 සී. ආර්. අයි. සී 60 ඒ. ආර්. ඔ. ඒ 60 CRIC 60 
CRISL 98 / මෝරොක් උස මෙම ප්‍රභේද ශ්‍රී ලංකාවේ තෙත් සහ අතරමැදි කලාපවල මහා පරිමාණ වගාවන් සඳහා නිර්දේශ කෙරේ.	 සී. ආර්. අයි. එස්. එල්. 98 ඒ. ආර්. ඔ. ඔ. ඔ. 98 CRISL 98 
CRIC 65 / කප්රුවන / කප්සෙත / කප්සුවය / CRISL 2020 මෙම දෙමුහුම් ප්‍රභේද ගෙවතු වගා සඳහා සහ තෙත් සහ අතරමැදි කලාපවල මහා පරිමාණ වගාවන් සඳහා නිර්දේශ කෙරේ. වාර්ෂික සඳහා ස්ථිර ජල සැපයුමක් සහිත ඉහළ කළමනාකරණ තත්ත්වයන් යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ අනෙකුත් ප්‍රදේශ සඳහා ද මෙම ප්‍රභේද නිර්දේශ කෙරේ.	 සී. ආර්. අයි. සී 65 ඒ. ආර්. ඔ. ඒ 65 CRIC 65  කප්රුවන கப்ருவன KAPRUWANA  කප්සෙත கப்செத KAPSETHA  කප්සුවය கப்சுவய KAPSUWAYA  සී. ආර්. අයි. එස්. එල්. 2020 ඒ. ආර්. ඔ. ඔ. ඔ. 2020 CRISL 2020
උසස් පොල් පැළයක ලක්ෂණ • මහත කඳක් තිබීම. • තද කොළ පැහැති අතු තිබීම. • පත්‍ර උත්තල වීම. • පත්‍ර දාර තියුණු ලෙස පිහිටීම. • අතු කඳට සම්බන්ධ කරන පොල් බිඩංග කෙටි වීම. • පළිබෝධ සහ රෝග හානි වලින් තොර වීම.	

පොල් පැළ සිටුවීම

පොල් වගාව සඳහා යෝග්‍ය පැළ ඝනත්වය

නව වගාවක් ලෙස පොල් සිටුවීමේදී, මීටර් 8 × මීටර් 8 (අඩි 26 × අඩි 26) (හෙක්ටයාරයකට පැළ 158) ක පැළ අතර පරතරයක් පවත්වා ගැනීම නිර්දේශ කෙරේ.

1. සමවතුරසාකාර ක්‍රමය

පැළ අතර පරතරය		පැළ සංඛ්‍යාව	
මීටර්	අඩි	හෙක්ටයාරයකට	අක්කරයකට
8.0 × 8.0	26 × 26	158	64

ඉහත පරතරයන් සහිත පොල් වගාවන් වාර්ෂික බෝග සමග හෝ තරගකාරීත්වය අවම බහු වාර්ෂික බෝග සමග අතුරු බෝග වගා කිරීම සඳහා නිර්දේශ කෙරේ.

2. පළල් පේළි ක්‍රමය

පැළ අතර පරතරය		පැළ සංඛ්‍යාව	
මීටර්	අඩි	හෙක්ටයාරයකට	අක්කරයකට
8.0 × 10.0	26 × 32	128	52

3. විශේෂ පළල් පේළි ක්‍රමය

පැළ අතර පරතරය		පැළ සංඛ්‍යාව	
මීටර්	අඩි	හෙක්ටයාරයකට	අක්කරයකට
8.0 × 12.0	26 × 40	102	42

අමතර ආදායමක් උපයා ගැනීම සඳහා පොල් යටතේ තේ හෝ උක් අතුරු බෝගයක් ලෙස වගා කිරීමේදී ඉහත පරතරය නිර්දේශ කෙරේ.

යටි වගාව සහ නැවත වගාව

යටි වගාව හෝ නැවත වගාව සිදු කළ යුත්තේ;

- පොල් වගාවක ඇති පොල් ගස් බහුතරයක් අවුරුදු 60 ට වඩා පැරණි වන විට හෝ වගාව ආර්ථික අස්වැන්නක් ලබා නොදෙන අවස්ථාවන් හිදී ය.

- අස්වැන්න සාමාන්‍ය තත්ත්ව යටතේ අක්කරයකට/අවුරුද්දකට/ගෙඩි 1000 ට අඩුවීම.
- ගස් ඉතා උසට වැඩී, අස්වනු නෙලීම සහ අනෙකුත් වගා කටයුතු දුෂ්කර වී තිබීම, සහ අක්කරයකට ඇති ගස් ප්‍රමාණය 500 අඩු වීම.

1. යටි වගාව

යටි වගාව යනු, පැරණි වගාවේ පේළි අතර නව පැළ සිටුවීම හා වසර 5 - 6 ක කාලයක් තුළ ක්‍රමයෙන් පැරණි වගාව ඉවත් කිරීමයි. පළමුව, පැරණි ගස් පේළි අතර නව පොල් වළවල් සලකුණු කළයුතුය. ඉන්පසු, ඉතා අඩු අස්වැන්නක් ලබා දෙන සහ නව පොල් වළවල් අසල (අඩි 8 ක රවුම තුළ) ඇති පැරණි ගස් ඉවත් කර ශ්‍රී ලංකා පොල් පර්යේෂණ ආයතනයේ නිර්දේශයන්ට අනුව නව පැළ සිටුවිය යුතුය.



යටි වගා කළ ඉඩමක්

මෙහිදී පැළ සිටුවා මුල් අවුරුදු 5 වන විට පැරණි වගාවේ සියලු ගස් පහත පරිදි ඉවත් කළ යුතුය.

- 1 වන වසර - 15%
- 2 වන වසර - 15%
- 3 වන වසර - 20%
- 4 වන වසර - 20%
- 5 වන වසර - ඉතිරි සියල්ල හෝ
- 2 වන වසර - 30%
- 4 වන වසර - 40%
- 5 වන වසර - ඉතිරි සියල්ල

2. නැවත වගාව

නැවත වගාව යනු පවතින වගාව සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කර නව වගාවක් ඇති කිරීමයි.



නැවත වගා කළ ඉඩමක්

- පර්යේෂණ වල ප්‍රතිඵල වලට අනුව යටි වගා ක්‍රමයට වඩා නැවත වගාව සිදු කළ විට ගස පිදෙන වයස, වර්ධනය හා ගෙඩි නිෂ්පාදනය යන කරුණු වලින් වඩාත් ඉදිරියෙන් සිටී.
- ඒ අනුව උසස් කළමනාකාරිත්වයක් සහිත මහා පරිමාණ වගාවන් සඳහා නැවත වගා ක්‍රමය නිර්දේශ කෙරේ.
- සුළු පරිමාණ වගාකරුවන් සඳහා නැවත වගාවේදී සිදුවන ආර්ථික අපහසුතා සමනය කිරීම අපහසු බැවින් එම ඉඩම් වල වගාවන් අලුත් කර ගැනීමේදී යටි වගා ක්‍රමය නිර්දේශ කෙරේ.

3. පුරප්පාඩු පිරවීම

වගාව ඒකාකාරව තබා ගැනීම සඳහා, සිටුවීමෙන් වසරකට පසු, සියලුම දුර්වල පොල් පැළ ඉවත් කර, ඒ වෙනුවට නිරෝගි පැළ ආදේශ කළ යුතුය. මෙම ක්‍රියාවලිය සිටුවීමේ පළමු දිනයේ සිට වසර 3-5ක් ඇතුළත අවසන් කළ යුතුය. ඉන්පසු පුරප්පාඩු පිරවීම සුදුසු නොවේ. නමුත් ඉහළ පුරප්පාඩු පැළ සංඛ්‍යාවක් සහ ප්‍රමාණවත් ඉඩ ප්‍රමාණයක් තිබේ නම්, එම කාල සීමාවෙන් පසුව වුවද පුරප්පාඩු පිරවීම නිර්දේශ කෙරේ.

පැළයක් සිටුවිය යුතු ආකාරය

- a. පොල් වළෙහි ප්‍රමාණය, ඉඩමේ ඇති පස් වර්ගය මත රඳා පවතී. වැලි ලෝම පස් සහිත ඉඩමක් සඳහා මීටර් 0.9 m × 0.9 m × 0.9 m වළක් ද, බොරළි, කබොක් සහිත ඉඩමක් සඳහා මීටර් 1.2 m × 1.2 m × 1.2 m වළක් ද කපා ගත යුතුය.
- b. පොල් වළ කපන අවස්ථාවේ දී පළමුවෙන් ම ඉවත් කරන අඩි 1 ක පමණ ගැඹුර දක්වා වූ මතුපිට පස් වෙනම ද, ඉතිරි යටි පස වළේ අනික් පැත්තෙන් ද ගොඩගසා ගත යුතු ය.
- c. මෙහි දී පළමු පොල් ලෙලි තට්ටුව යොදා එය වැසියන සේ මතුපිට පස් යෙදිය යුතු අතර, දෙවන පොල් ලෙලි තට්ටුව යෙදීමෙන් පසුව ද, එයද වැසියන පරිදි මතුපිට පස් යෙදිය යුතු ය. පොල් ලෙලි දැමීමේ දී කොහු පැත්ත ඉහළට සිටින සේ යෙදිය යුතු අතර මේ සඳහා එක් වළකට පොල් ලෙලි 30-35 ක් පමණ අවශ්‍ය වේ. පොල් ලෙල්ලකට එහි බර මෙන් 6-7 ගුණයක් ප්‍රයෝජන දරා තබා ගත හැකි අතර, එය වියළි කාල වල දී උරාගත් ප්‍රයෝජන සෙමින් පසට මුදා හරින නිසා මුල් මගින් අවශෝෂණය කර ගසට ලබා ගත හැකිය.
- d. ඉන් පසුව වළෙහි ඉතිරි කොටස පුරවා ගැනීම සඳහා ගැඹුරු පස් මිශ්‍රණය සකසා ගත යුතුය. එහි දී ඉතිරි කර ගත් යටි පස් (ගැඹුරු පස්) සමඟ කාබනික පොහොර (වියළි ගොම කිලෝ ග්‍රෑම් 10 ක් හෝ එළු පොහොර කිලෝ ග්‍රෑම් 5 ක්) ඩොලමයිට් කිලෝ ග්‍රෑම් 1 ක් හා දේශගුණික කලාපයට අනුව පැළ පොල් පොහොර මිශ්‍රණය ද මිශ්‍ර කර ඒ මිශ්‍රණයෙන් වළ පුරවා ගත යුතුය. පැළ පොල් පොහොර මිශ්‍රණ වෙනුවට අමිශ්‍ර පොහොර භාවිතා කරන්නේ නම් වගු අංක 1 හා 2 හි පරිදි පොහොර භාවිතා කළ හැකිය.



පොල් පැළයක් සිටුවීම සහ කළමනාකරණය

පොහොර නිර්දේශ සහ පොහොර යෙදීමේ ක්‍රම

මිනිස් පරිභෝජනය සඳහා පොල් ගසෙහි විවිධ කොටස් වන පොල් ගෙඩි, පොල් අතු සහ හනසු වැනි දෑ පොල් වගා කරන ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉවත් කිරීම නිසා පොල් වගා කරන පසෙහි පෝෂක තත්ත්වය වාර්ෂිකව හීන වී යයි. මීට අමතරව වල් පැළෑටි මගින් උරාගැනීම, පාංශු බාදනය මගින් සෝදා යෑම, සහ පස තුළින් කාන්දුවීම වැනි හේතු නිසා තවදුරටත් පාංශු පෝෂක අඩුවීම සිදුවේ. මෙලෙස පසෙහි අත්‍යාවශ්‍ය පෝෂ්‍ය පදාර්ථ අඩුවීම නිසා පොල් අස්වැන්න ක්‍රමයෙන් අඩුවේ. නිරසාර පොල් අස්වැන්නක් ලබාගැනීම සඳහා පැළ සිටුවීමේ සිට පරිණත අවධිය දක්වා අත්‍යාවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ අඛණ්ඩව සැපයීම අනිවාර්ය වේ. පොල් වගාව සඳහා නයිට්‍රජන් පෝෂකය සැපයීමට යූරියා (රසායනික පොහොර) හෝ ගොම පොහොර, එළු පොහොර, පදම් කළ කුකුල් පොහොර වැනි කාබනික පොහොර හෝ ග්ලිරිසිඩියා වැනි කොළ පොහොර හෝ කොම්පෝස්ට් භාවිතා කළ හැකිය.

- පොස්පරස් (P) පෝෂකය ලබා දීම සඳහා තෙත් සහ අතරමැදි කලාප සඳහා එස්පාවල රොක් පොස්පේට් (ERP) සහ වියළි කලාප සඳහා ට්‍රිපල් සුපර් පොස්පේට් (TSP) භාවිතා කළ හැකිය.
- පොටෑසියම් (K) පෝෂකය ලබා දීම සඳහා පොල් ලෙලි, වල් සුරියකාන්ත, කෙසෙල් කඳුන් සහ සත්ව පොහොර මගින් පොටෑසියම් පෝෂකය යම් ප්‍රමාණයකට ලබා දිය හැකි වුවද, පොල් ගසෙහි වර්ධනයට සහ නිසි අස්වැන්නක් සඳහා එය ප්‍රමාණවත් නොවේ. එබැවින් K පෝෂකය ලබා දීම සඳහා පොටෑසියම් පොහොරක් (Muriate of Potash-MOP) යොදන්න.
- මැග්නීසියම් (Mg) පෝෂකය ලබාදීම සඳහා ඩොලමයිට් නිර්දේශ කෙරේ.

පොල් ගසක පෝෂක අවශ්‍යතා එහි වර්ධන අවධිය අනුව වෙනස් වේ. පොල් පැළ වල වර්ධක වර්ධනය සඳහා ඉහළ නයිට්‍රජන් සහ පොස්පරස් පෝෂක ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වේ. එල දරන ගස් සඳහා ඉහළ අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමට ඉහළ පොටෑසියම් සහ මැග්නීසියම් ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වේ.

තෙත් සහ අතරමැදි කලාපවල, පොස්පරස් ප්‍රභවය ලෙස එස්පාවල රොක් පොස්පේට් භාවිතා කරන්න. වියළි කලාපයේ, පොස්පරස් ප්‍රභවය ලෙස ට්‍රිපල් සුපර් පොස්පේට් භාවිතා කරන්න.

පොල් පැළයක පෝෂක අවශ්‍යතා අනුපිළිවෙල **(high to low)**

$N > P > K > Mg$

එල දරණ ගසක පෝෂක අවශ්‍යතා අනුපිළිවෙල **(high to low)**

$K > Mg > N > P$

Remove the highlighted section which is in English

ඒ අනුව, පොල් පර්යේෂණ ආයතනය විසින් පොල් පැළ සිටුවීමේ දී, පොල් පැළ සඳහා සහ එල දරණ ගස් සඳහා අකාබනික පොහොර, කාබනික පොහොර සහ කාබනික හා අකාබනික පොහොර මිශ්‍රණ නිර්දේශ කර ඇත. අකාබනික පොහොර සෘජු පොහොර ආකාරයෙන් හෝ පොහොර මිශ්‍රණ ආකාරයෙන් යෙදිය හැකිය.

පැළ සිටුවීමේදී පොහොර යෙදීම සඳහා නිර්දේශය

පොහොර මිශ්‍රණ යෙදීම

තෙත් සහ අතරමැදි කලාප සඳහා		වියළි කලාපය සඳහා	
පොහොර වර්ගය	ප්‍රමාණය	පොහොර වර්ගය	ප්‍රමාණය
පැළ පොල් පොහොර මිශ්‍රණය - W (YPM - W)	1250 g	පැළ පොල් පොහොර මිශ්‍රණය - D (YPM - D)	850 g
ඩොලමයිට්	1000 g	ඩොලමයිට්	1000 g
එළු පොහොර හෝ ගොම පොහොර	10 kg	එළු පොහොර හෝ ගොම පොහොර	10 kg

YPM-W සංයුතිය(%)

N - P₂O₅-K₂O → 11-16-14

YPM-D සංයුතිය(%)

N - P₂O₅-K₂O → 15-15-20

අමිශ්‍ර පොහොර (සෘජු පොහොර) යෙදීම

තෙත් සහ අතරමැදි කලාප සඳහා		වියළි කලාපය සඳහා	
පොහොර වර්ගය	ප්‍රමාණය	පොහොර වර්ගය	ප්‍රමාණය
යූරියා	250 g	යූරියා	250 g
එප්පාවල රොක් පොස්පේට්	750 g	ට්‍රිපල් සුපර් පොස්පේට්	350 g
මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ්	250 g	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ්	250 g
එළු පොහොර හෝ ගොම පොහොර	10 kg	එළු පොහොර හෝ ගොම පොහොර	10 kg

පැළ සිටුවීමේදී කාබනික පොහොර පමණක් යොදන විට, ගැඹුරු පස, ගව පොහොර කිලෝග්‍රෑම් 20 ක් හෝ එළු පොහොර කිලෝග්‍රෑම් 15 ක්, එප්පාවල රොක් පොස්පේට් කිලෝග්‍රෑම් 1 ක් සහ ඩොලමයිට් කිලෝග්‍රෑම් 1 ක් සමඟ මිශ්‍ර කළ යුතුය.

පොල් පැළ සඳහා පොහොර නිර්දේශය

පොල් පැළයේ වයස අනුව යෙදිය යුතු අමිශ්‍ර පොහොර ප්‍රමාණයන් පහත පරිදි වේ.

අකාබනික පොහොර

i. අමිශ්‍ර පොහොර (සෘජු පොහොර) යෙදීම

a) තෙත් සහ අතරමැදි කලාප සඳහා

පොල් පැළයේ වයස	මාස 6	වසර 1	වසර 1½	වසර 2	වසර 2½	වසර 3	වසර 3½	වසර 4 සිට එල දරණ තෙත් (මාස 6 කට වරක්)
පොහොර වර්ගය	ප්‍රමාණය (ග්‍රෑම් / ගසකට)							
යූරියා	190	235	235	305	305	375	375	470
එප්පාවල රොක් පොස්පේට්	420	530	530	690	690	850	850	1060
මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ්	190	235	235	305	305	375	375	470
ඩොලමයිට්	500	500	500	500	500	500	500	500

b) වියළි කලාපය සඳහා

පොල් පැළයේ වයස	මාස 6	වසර 1	වසර 1½	වසර 2	වසර 2½	වසර 3	වසර 3½	වසර 4 සිට එළ දරණ තෙක් (මාස 6 කට වරක්)
පොහොර වර්ගය	ප්‍රමාණය (ග්‍රෑම්/ගසකට)							
යූරියා	190	235	235	305	305	375	375	470
එප්පාවල රොක් පොස්පේට්	160	200	200	300	300	360	360	400
මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ්	190	235	235	305	305	375	375	470
ඩොලමයිට්	500	500	500	500	500	500	500	500

ii. පොහොර මිශ්‍රණ යෙදීම

a) පැළ පොල් පොහොර මිශ්‍රණය

පොල් පැළයේ වයස	ප්‍රමාණය (ග්‍රෑම්/ගසකට)		
	YPM-W (තෙත් සහ අතරමැදි කලාප සඳහා)	YPM-D (වියළි කලාපය සඳහා)	ඩොලමයිට්
මාස 6	800	540	500
මාස 12 (වසර 1)	1000	670	500
මාස 18 (වසර 1½)	1000	670	500
මාස 24 (වසර 2)	1300	905	500
මාස 30 (වසර 2½)	1300	905	500
මාස 36 (වසර 3)	1600	1110	500
මාස 42 (වසර 3½)	1600	1110	500
වසර 4 සිට එළ දරණ තෙක්	2000	1340	500

පොල් වගාව සඳහා කාබනික පොහොර සහ රසායනික පොහොර සංකලන යෙදීම

1. ගව පොහොර සමඟ අනෙකුත් පොහොර යෙදීම

පෝෂකය	පොහොර ප්‍රභවය	පොල් පැළයේ වයස				
		මාස 6	වසර 1	වසර 2	වසර 3	වසර 4 සිට එළ දරණ තෙක්
N	ගව පොහොර (kg) (තෙතමනය 20% - 30%)	5	12	16	20	25
P	එප්පාවල රොක් පොස්පේට් (ERP) (g)	200	450	600	750	1000
Mg	ඩොලමයිට් (g)	250	250	250	250	250
K	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් (MOP) (g) or	30	200	250	325	400
	ස්වාභාවික පොටෑසියම් සල්ෆේට් (K_2SO_4) (g)	50	240	300	390	480

2. එළි පොහොර සමග අනෙකුත් පොහොර යෙදීම

පෝෂකය	පොහොර ප්‍රභවය	පොල් පැළයේ වයස				
		මාස 6	වසර 1	වසර 2	වසර 3	වසර 4 සිට එල දරණ තෙක්
N	එළි පොහොර (kg)(තෙතමනය 20% - 30%)	3	7	9	11	13
P	එජ්ජාවල රොක් පොස්පේට් (ERP)(g)	220	500	670	850	1150
Mg	ඩොලමයිට් (g)	500	500	500	500	500
K	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෂ් (MOP) (g) or	50	130	170	230	300
	ස්වාභාවික පොටෂියම් සල්ෆේට් (K_2SO_4)(g)	60	150	200	270	370

3. පදම් කළ කුකුල් පොහොර සමග අනෙකුත් පොහොර යෙදීම

පෝෂකය	පොහොර ප්‍රභවය	පොල් පැළයේ වයස				
		මාස 6	වසර 1	වසර 2	වසර 3	වසර 4 සිට එල දරණ තෙක්
N	පදම් කළ කුකුල් පොහොර (kg)(තෙතමනය 20% - 30%)	5	12	15	20	23
P	එජ්ජාවල රොක් පොස්පේට් (ERP)(g)	100	225	300	400	600
Mg	ඩොලමයිට් (g)	250	250	250	250	250
K	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෂ් (MOP)(g) or	50	125	150	190	240
	ස්වාභාවික පොටෂියම් සල්ෆේට් (K_2SO_4)(g)	60	150	180	230	290

4. ග්ලිරිසිඩියා සමග අනෙකුත් පොහොර යෙදීම

පෝෂකය	පොහොර ප්‍රභවය	පොල් පැළයේ වයස				
		මාස 6	වසර 1	වසර 2	වසර 3	වසර 4 සිට එල දරණ තෙක්
N	ග්ලිරිසිඩියා (kg)(තෙතමනය 60% - 70%)	5	12	16	20	25
P	එජ්ජාවල රොක් පොස්පේට් (ERP)(g)	275	630	830	1040	1375
Mg	ඩොලමයිට් (g)	250	250	250	250	250
K	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෂ් (MOP)(g) දුර	60	150	200	250	270
	ස්වාභාවික පොටෂියම් සල්ෆේට් (K_2SO_4)(g)	75	180	250	300	375

5. කෘෂිකාර්මික කොම්පෝස්ට් සමග අනෙකුත් පොහොර යෙදීම (N:P:K - 1:0.5:1)

පෝෂකය	පොහොර ප්‍රභවය	පොල් පැළයේ වයස				
		මාස 6	වසර 1	වසර 2	වසර 3	වසර 4 සිට එල දරණ තෙක්
N	කෘෂිකාර්මික කොම්පෝස්ට් (kg)* (තෙතමනය 25%)	8	19	25	31	39
P	එප්පාවල රොක් පොස්පේට් (ERP)(g)	200	460	600	770	1000
Mg	ඩොලමයිට් (g)	250	250	250	250	250
K	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෂ් (MOP)(g) or	-	100	125	125	200
	ස්වාභාවික පොටෂියම් සල්ෆේට් (K_2SO_4)(g)	-	130	150	150	250

එල දරණ ගස් සඳහා පොහොර නිර්දේශය

එල දරණ පොල් ගසකට වසරකට යෙදිය යුතු පොහොර ප්‍රමාණය පහත දැක්වේ.

අකාබනික පොහොර

i. අමිශ්‍ර පොහොර (සෘජු පොහොර) යෙදීම

පොහොර වර්ගය	ප්‍රමාණය (ගසකට/ග්‍රෑම්)	
	තෙත් සහ අතරමැදි කලාප සඳහා	වියළි කලාපය සඳහා
යූරියා	800	800
එප්පාවල රොක් පොස්පේට් (ERP)	900	-
ට්‍රිපල් සුපර් පොස්පේට්	-	400
මියුරියේට් ඔෆ් පොටෂ් (MOP)	1600	1600
ඩොලමයිට්	1000	1000

ii. පොහොර මිශ්‍රණ

එල දරණ ගසකට යොදන වැඩිමුණු පොල් පොහොර මිශ්‍රණ ප්‍රමාණ (කිලෝ ග්‍රෑම්/ගසකට/වසරකට)		
APM-W(තෙත් සහ අතරමැදි කලාප සඳහා)	APM-D(වියළි කලාපය සඳහා)	ඩොලමයිට්
3.3	2.8	1

APM-W සංයුතිය(%)

N - P_2O_5 - K_2O → 11-8-29

YPM-D සංයුතිය(%)

N - P_2O_5 - K_2O → 13-7-34

CRIC 60, CRIC 65, CRISL 98, කප්රුවන, කප්පුවය, කප්පෙන වැනි වැඩි දියුණු කළ පොල් ප්‍රභේද සහ වසරකට ගෙඩි 75කට වඩා ඉහළ අස්වැන්නක් ලබා දෙන ගස් සඳහා ඉහත පොහොර අනුපාතයන්ගෙන් 1½ ගුණයක් යෙදීම නිර්දේශ කෙරේ.

එල දරණ පොල් ගස් සඳහා කාබනික පොහොර සහිත නිර්දේශිත පොහොර පැකේජ

කාබනික පොහොර සහ අනෙකුත් ප්‍රභවයන්		ප්‍රමාණය (kg)	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් (g)	ස්වාභාවික පොටෑසියම් සල්ෆේට් (g)
1	ගව පොහොර (තෙතමනය 20% - 30%)	30	1250	1500
2	එළු පොහොර (තෙතමනය 20% - 30%)	25	800	1250
3	පදම් කළ කුකුල් පොහොර (තෙතමනය 20% - 30%)	30	750	1000
4	ග්ලිරිසිඩියා (ග්ලිරිසිඩියා 60% - 70%)	30	1000	1350
	එප්පාවල රොක් පොස්ෆේට් (ERP)	0.7		
	ඩොලමයිට්	0.5		

- කුකුළු ගොවිපලවලින් ඉවත් කරන ලද කුකුළු පොහොර පොල් ගස්වලට යෙදිය යුත්තේ ඒවා මාස 2-3ක් ක්ෂේත්‍රයේ පදම් කිරීමෙන් පසුව පමණි.
- කාබනික පොහොර ලබා ගැනීමේ හැකියාව අනුව, ඉහත මිශ්‍රණ පහෙන් ඕනෑම එකක් එල දරණ පොල් ගස් සඳහා භාවිතා කළ හැකිය.
- කාබනික ගොවිතැන සඳහා, මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් වෙනුවට ස්වාභාවික පොටෑසියම් **සල්ෆේට්** භාවිතා කළ යුතුය.

Should be $i, f * U$

එල දරණ පොල් ගස් සඳහා කාබනික පොහොර සහ අකාබනික පොහොර මිශ්‍රණ යෙදීම

කාබනික පොහොර	යුරියා (ගසකට / ග්‍රෑම්)	(i) ERP හෝ (ii) TSP (ගසකට/ග්‍රෑම්)	MOP (ගසකට / ග්‍රෑම්)	ඩොලමයිට් (ගසකට/ග්‍රෑම්)
ගව පොහොර (15 kg)	400	i) - 450	1400	500
(තෙතමනය 20% - 30%)		ii) - 200		
එළු පොහොර (13 kg)	400	i) - 450	1200	500
(තෙතමනය 20% - 30%)		ii) - 200		
පදම් කළ කුකුල් පොහොර (15 kg)	400	i) - 450	1175	500
(තෙතමනය 20% - 30%)		ii) - 200		
ග්ලිරිසිඩියා (15 kg)	400	i) - 700	1300	750
(තෙතමනය 60% - 70%)		ii) - 350		

දිගුකාලීන බලපෑම් සහ පසෙහි පෝෂණය හොඳින් රඳවා ගැනීම සඳහා කාබනික පොහොර සහ රසායනික පොහොර සංයෝගයක් භාවිතා කිරීම වඩාත් සුදුසු බවට නිර්දේශ කෙරේ.

තැඹිලි සඳහා පොහොර නිර්දේශ

ඉහත දක්වා ඇති පොහොර නිර්දේශයන්ම තැඹිලි පැළ සිටුවීමේදී, පැළ සඳහා සහ එල දරණ ගස් සඳහා භාවිතා කළ හැකිය.

රා මදින ගස් සඳහා අමිශ්‍ර පොහොර (සෘජු පොහොර) නිර්දේශ

පොහොර වර්ගය	ප්‍රමාණය (ගසකට/ග්‍රෑම්)	
	තෙත් සහ අතරමැදි කලාප සඳහා	වියළි කලාපය සඳහා
යූරියා	1500	1500
එප්පාවල රොක් පොස්ෆේට්	2100	-
ට්‍රිපල් සුපර් පොස්ෆේට්	-	950
මියුරියේට් ඔෆ් පොටෂ්	4800	4800
ඩොලමයිට්	1000	1000

Both should be
fmd i fmd

පොහොර යෙදීමේ ක්‍රම

1. පොල් පැළ සඳහා පොහොර යෙදීම

- පොල් පැළයේ වයස අනුව නිර්දේශිත පොහොර ප්‍රමාණය පහත දක්වා ඇති දුරට පොහොර කවය වටා විසුරුවන්න.
උදාහරණ: අවුරුද්දක් වයසැති පොල් පැළයක් සඳහා නිර්දේශිත පොහොර ප්‍රමාණය පැළයේ පාමුල සිට සෙන්ටිමීටර 60ක් ඇතුළත පැළය වටා විසුරුවන්න.
- පස හරවා පොහොර යෙදූ ප්‍රදේශය වල් පැළෑටි, පොල් අතු හෝ පොල් ලෙලි වැනි ඕනෑම ද්‍රව්‍යයකින් සෙන්ටිමීටර 10-15 ක් පමණ ගැඹුරට ආවරණය කරන්න.

පොල් ගසේ පාමුල සිට පොහොර යෙදිය යුතු දුර

ගසේ වයස	ගසේ පාමුල සිට දුර (cm)
මාස 6	30
අවුරුදු 1-1½	60
අවුරුදු 2-2½	90
අවුරුදු 3	120
අවුරුදු 4 සිට එල දරණ තෙක්	150
එල දරණ ගස් සඳහා	180

2. එල දරණ ගස් සඳහා පොහොර යෙදීම

- පසේ තෙතමනය ඇති විට පොහොර යෙදිය යුතුය.
- එල දරණ ගස් සඳහා වාර්ෂිකව පොහොර යෙදිය යුතුය. වැලි සහිත පස් සඳහා, සම්පූර්ණ පොහොර ප්‍රමාණය එකවර යෙදීමට වඩා, නිර්දේශිත පොහොර මාත්‍රාවෙන් අඩක් බැගින් සෑම මාස 6 කට වරක් යෙදීම වඩාත් සුදුසුය.

- i) එල දරණ පොල් ගස් සඳහා පොහොර යෙදීම ක්‍රම දෙකකින් කළ හැකිය: මතුපිට යෙදීම හෝ කාණු කපා යෙදීම. එල දරණ පොල් ගසක පාමුල සිට මීටර් 1.8 (අඩි 6) ක අරයක් තුළ ඇති ප්‍රදේශය පොහොර කවය වේ. මෙම ප්‍රදේශය තුළ ඇති වල් පැළෑටි කපා දැමිය යුතු අතර, උදැල්ල භාවිතයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කිරීමෙන් වැළකිය යුතුය. පොල් අතු සහ පොල් ලෙලි වැනි වසුන් ද්‍රව්‍ය තිබේ නම්, මතුපිට පස් ඉවත් නොකර, වසුන් ද්‍රව්‍ය පමණක් පොහොර කවයෙන් ඉවත් කරන්න. ගසෙහි පාමුල සිට සෙන්ටිමීටර් 15 ක දුරක් අත්හැර, පොහොර කවය තුළ නිර්දේශිත පොහොර ප්‍රමාණය විසුරුවන්න. උදැල්ලක් භාවිතයෙන් සෙන්ටිමීටර් 10-15 ක් පමණ ගැඹුරට භාරා පොහොර සහ පස හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න. ඉන් පසු පොහොර දැමූ ප්‍රදේශය වසුන් වලින් ආවරණය කරන්න.



පොහොර කවය තුළ පොහොර විසුරුවා හැරීම



විසුරුවා ගත් පොහොර පස සමඟ කලවම් කර ගැනීම



වසුනක් යොදා පොහොර යෙදූ කවය සම්පූර්ණයෙන් වසා දැමීම

- ගසෙහි පාමුල සිට සෙන්ටිමීටර් 90 ක් දුරින් සෙන්ටිමීටර් 90 ක් පළල සහ සෙන්ටිමීටර් 15 ක් ගැඹුරු කාණුවක් සකස් කර, නිර්දේශිත පොහොර ප්‍රමාණය එම කාණුවට යොදන්න. යොදන ලද පොහොර පස සමඟ මිශ්‍ර කර කාණුව සකස් කිරීමේදී ඉවත් කරන ලද පසෙන් ආවරණය කරන්න. ඉන්පසු, ගසේ පාමුල සිට සෙන්ටිමීටර් 15 ක අරයක් ඉතිරි කර, පොහොර කවය පොල් අතු, පොල් ලෙලි වැනි ඕනෑම වසුන් ද්‍රව්‍යයකින් ආවරණය කළ යුතු වේ.
- බෑවුම් සහිත වගාවන්හි මතුපිට අධික ජල ප්‍රවාහයක් ඇති බැවින්, බෑවුමේ ඉහළ පැත්තේ සෙන්ටිමීටර් 10 ක් පමණ ගැඹුරට අර්ධ වෘත්තාකාර කාණු සකස් කිරීමෙන් පොහොර යෙදිය යුතුය.
- කාණුවේ අභ්‍යන්තර කවයේ අරය මීටර් 0.5 ක් විය යුතු අතර පිටත කවයේ අරය මීටර් 1.5 ක් පමණ විය යුතුය. කාණුවේ ඇතුළත පොහොර යෙදීමෙන් පසු, එය කාණුවේ පස සමඟ මිශ්‍ර කර, පසෙන් හොඳින් ආවරණය කර, පසුව වසුන් යෙදිය යුතුය.

ආන්තරික පොහොර නිර්දේශය (DFR)

එක් එක් වගාවේ පෝෂක තත්ත්වයන් පත්‍ර විශ්ලේෂණය කිරීම මගින් හඳුනාගෙන එම වගාවට අනුකූල වන සේ පොහොර නිර්දේශ කිරීම ආන්තරික පොහොර නිර්දේශය නමින් හැඳින් වේ. මෙහිදී පොල් ගසේ 14 වන අත්තේ පොල් කොළ නියැදි ලබා ගැනීම සිදු කරයි. අදාළ පොල් ගසේ පෝෂණ තත්ත්වයන්, පොල් ගසේ ප්‍රගස්ට පෝෂණ මට්ටම් පරාසයන් සමග සංසන්දනය කරන බැවින්, පසේ පෝෂණ උපායවේදයේ ප්‍රමාණය සහ සැලවුණු පෝෂණ උපායවේදයන් පිළිබඳ නිවැරදි තොරතුරු සපයයි. මෙමගින් ගස්වල පෝෂක උපායවේදය මුල් අවධියේදීම නිවැරදි කිරීමට හැකියාව ලැබේ. මීට අමතරව, මෙය අනවශ්‍ය පොහොර යෙදීම් වළක්වන අතර **අදාළ** වගා භූමිය සඳහා වඩාත්ම සුදුසු පොහොර නිර්දේශය ලබා දෙයි.

Should be wod<

පත්‍ර නියැදි ලබා ගැනීම සඳහා ක්ෂේත්‍රය නියෝජ්‍යය වන පරිදි ගස් තෝරා ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. ගස් තෝරා ගැනීමට පෙර, ක්ෂේත්‍රය හොඳින් නිරීක්ෂණය කර එකම තත්ත්වයන් සහිත ක්ෂේත්‍ර හඳුනා ගැනීම කළ යුතුය. ගසේ වයස, වගාව, පාංශු වර්ගය, භූමියේ හැඩය, අතුරු බෝග පැවතීම, සත්ව පාලනය, වගාවේ ආර්ථික වටිනාකම (එය සාර්ථකව යටි වගාවක් නම්), ජල සම්පාදනය සහ පෝෂක උපායවේදයන් වැනි ලක්ෂණවල වෙනස්කම් අනුව ක්ෂේත්‍රය කොටස් කළ යුතුය. ඉන්පසු, කොටස් කරන ලද ක්ෂේත්‍රයන් හි පත්‍ර නියැදි ලබා ගැනීම සඳහා ගස් තෝරා ගනු ලැබේ. තෝරාගත් ක්ෂේත්‍ර කොටසක අවම වශයෙන් ගස් තුනකින් පත්‍ර නියැදි ලබා ගත යුතුය. පත්‍ර නියැදි ලබා ගැනීම සඳහා තෝරාගත් ගස්වල පහත ලක්ෂණ තිබීම වැදගත් වේ.

- සම්පූර්ණ පොහොර කවයක් තිබීම
- විකෘති වලින් තොරවීම
- හුඹස් වලින් තොර පොහොර කවයක් තිබීම
- පොල් ගස වටා වෙනත් ශාක බහුලව නොතිබීම
- පොහොර කවයේ වල් පැලෑටි නොමැතිවීම
- පොල් කොළ මත කෘමි හානි නොමැතිවීම
- ගසකින් වසරකට ගෙඩි 50 ක පමණ අස්වැන්නක් ලබාදීම

Should be me<Eá

14 වන අත්ත තෝරා ගැනීමේදී, සම්පූර්ණයෙන්ම විවෘත වූ පත්‍රය පළමු පත්‍රය ලෙස සලකා සර්පිලාකාරව අතු ගණන් කරනු ලැබේ. ඊට අමතරව, 14 වන අත්ත පහසුවෙන් හඳුනා ගැනීම සඳහා පහත ලක්ෂණ ද සලකා බැලිය හැකිය.

1. එය බිමට සමාන්තරව පිහිටා ඇත.
2. එහි මීට මෙලවූ අතක ප්‍රමාණයේ ගෙඩි ඇත (ප්‍රභේදය අනුව ප්‍රමාණය තරමක් වෙනස් විය හැකිය)
3. එය විවෘත වීමට යාබදව ඇති මලට වහාම පහළින් පිහිටා ඇත.

වැදගත් කරුණු: දැඩි නියගයක් හෝ වැසි සහිත කාලගුණයක් තුළ පත්‍ර නියැදි ලබා ගැනීම සිදු නොකළ යුතුය.

14 වන අත්ත තෝරා ගැනීමෙන් පසු, මල නොබැඳෙන වානේ පිහියක් භාවිතා කරමින්, අත්තේ නාරටියේ මැද ප්‍රදේශයෙන් එක් පැත්තකින් පත්‍ර තුන බැගින්, දෙපැත්තෙන් පත්‍ර හයක් ගෙන ඉරටු ඉවත් කළ යුතුය. ඉන්පසු පත්‍ර මිටියක් ලෙස තබා පත්‍රවල මැද ප්‍රදේශයෙන් සෙන්ටිමීටර් 20 ක ප්‍රමාණයේ කොටසක් කපා ගත යුතුය.

ලබා ගන්නා ලද පොල් කොළ නියැදි, විශ්ලේෂණය සඳහා රසායනාගාරයට ගෙන ඒමට පෙර නියැදි ලබාගත් දිනය, වතුයායේ නම, ක්ෂේත්‍ර කොටසේ අංකය, නියැදි අංකය, නියැදි ලබාගත් ගස් අංකය වැනි තොරතුරු නිවැරදිව සටහන් කර ඇති කඩදාසි බැග්වල බහාලන්න. සාම්පල වෙනත් බාහිර ද්‍රව්‍යයන් හා ගැටීම වැළැක්වීම සඳහා, සාම්පල ගබඩා කිරීම සඳහා මුද්‍රිත බැග් භාවිතා නොකළ යුතුය.



14 වන අත්ත



අතු වලින් සුදුසු පත්‍රිකා තෝරා ගැනීම.




ඉරටු ඉවත් කිරීමෙන් පසු පත්‍රිකා කැපීම.

පොල් ඉඩම්වල පාංශු තෙතමන සංරක්ෂණය

පොල් ගසකින් මුළු වසර පුරාම ස්ථිර ගෙඩි නිෂ්පාදනයක් ලබාගැනීමට නම් අඛණ්ඩ ජල සැපයුමක් තිබීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණකි. පොල් පැළයක් සඳහා දිනකට ජලය ලීටර් 10-30 ක් අවශ්‍ය වන අතර, එම දරණ පොල් ගසක් සඳහා දිනකට ජලය ලීටර් 40-60 ක් පමණ අවශ්‍ය වේ.

පොල් ගසේ මූල පද්ධතිය මුදුන් මූලක් රහිත නොදිගු මූල පද්ධතියකි. පොල් ගසේ මූල පද්ධතියේ විශාල මුල් ප්‍රමාණයක් තිබුණද එයින් වැඩි ප්‍රමාණයක් විහිදී ඇත්තේ පස මට්ටමේ සිට මීටරයක් ගැඹුරට හා මීටර 2ක අරය සහිත කවාකාර ප්‍රදේශයක වේ. සෑම මූලකම කෙලවරහි, එහි වර්ධක ප්‍රදේශය පිහිටා ඇති අතර ඊට ආසන්නයේම සුදු පැහැති මි.මී 2 සිට මි.මී 5 පමණ දිග ජලය උරා ගැනීමේ ප්‍රදේශය පිහිටා ඇත. පොල් මුල්වල වයස්ගත කොටස් ජලය උරාගත නොහැකි ආකාරයට ඝණ ආරක්ෂිත ස්ථරයකින් ආවරණය වී ඇත. පසේ තෙතමනය රහිත වියළි ස්වභාවයක් බොහෝ කලක් පැවතුනහොත් මුල්වල ජලය උරාගන්නා ප්‍රදේශයේ ද ඉහත සඳහන් ඝණ ආරක්ෂිත ස්ථරය වර්ධනය වී මුල්වල ජලය උරාගැනීමේ හැකියාව නැති වී යයි.

එබැවින්, වර්ෂාපතනය මගින් ලැබෙන ජලය රඳවා තබා ගැනීම සහ වාෂ්පීකරණය අඩු කිරීම මගින් පාංශු තෙතමනය සංරක්ෂණය කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

පොල් පැළ සඳහා තෙතමනය සංරක්ෂණ ක්‍රම

පොල් ගස් වර්ධනයේ සෑම අවධියක්ම නියතයට ලක් වුවහොත් සැලකිය යුතු හානියක් සිදුවිය හැකිය. මෙය වළක්වා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් පිළිවෙත් අනුගමනය කළ යුතුය:

1. පොහොර කවය වසුන් කිරීම

පොල් පැළ වගාවන් හි පොහොර කවයන් පොල් අතු, පොල් ලෙලි හෝ ඊට සමාන කාබනික ද්‍රව්‍ය වලින් වසුන් කළ යුතුය.

2. පොල් ලෙලි වැළඳීම

- මෙය සිටුවීමෙන් පසු වසර 2-5ක් අඛණ්ඩව සිදු කළ යුතුය.
- අවුරුදු දෙකක් වයසැති පැළ සඳහා, සෙන්ටිමීටර් 60ක් පළල සහ සෙන්ටිමීටර් 60 සිට සෙන්ටිමීටර් 75 දක්වා ගැඹුරකින් යුත් අර්ධ වෘත්තාකාර කාණු පැළයේ සිට සෙන්ටිමීටර් 90ක් දුරින් ස්ථාපනය කර, එම කාණු තුළ පොල් ලෙලි වළලන්න.

පොල් පැළවල පාමුල සිට කාණුව දක්වා නිබිය යුතු දුර, පොල් පැළයේ වයස අනුව පහත දක්වා ඇත.

පැළයේ වයස	පැළයේ සිට කාණුවට ඇති දුර
වසර 2	මීටර 0.9 (අඩි 3)
වසර 3	මීටර 1.2 (අඩි 4)
වසර 4	මීටර 1.5 (අඩි 5)
වසර 5	මීටර 1.8 (අඩි 6)

3. වල් පැළෑටි සහ ආවරණ බෝග පාලනය

- නියත කාලවලදී, ආවරණ බෝග, තෘණ සහ අනෙකුත් වල් පැළෑටි පාංශු තෙතමනය සඳහා පොල් ගස් සමඟ තරඟ කරනු ඇත.
- එවැනි අවස්ථාවන්හිදී, වගාවට සිදුවන හානිය සාපේක්ෂව ඉහළ ය.

- පොල් වගාවක ආවරණ බෝග, තෘණ සහ අනෙකුත් වල් පැළෑටි, සතුන් මගින් ලෑටි ගැමට සැලැස්වීමෙන් හෝ ස්ලැෂර් කිරීම වැනි ඒකාබද්ධ පාලන ක්‍රමයක් මගින් නිසි ලෙස කළමනාකරණය කළ යුතුය.

පරිණාත ගස් සඳහා තෙතමනය සංරක්ෂණ ක්‍රම

1. කාණු පද්ධති ස්ථාපිත කිරීම

- සමෝච්ච කාණු
- ජලය බැස යන කාණු

i. සමෝච්ච කාණු

- පොල් ඉඩමේ බෑවුමට ලම්බකව පිහිටුවා ඇති කාණු සමෝච්ච කාණු ලෙස හැඳින්වේ.
- පොල් ඉඩමේ බෑවුම 3% ට වඩා වැඩි විට පමණක් සමෝච්ච කාණු නිර්දේශ කෙරේ.
- බෑවුමේ නිව්‍යතාවය අනුව සමෝච්ච කාණු අතර පරතරය වෙනස් විය යුතු ආකාරය වගුවේ දක්වා ඇත.

බෑවුම	බෑවුමේ නිව්‍යතාවය	පරතරය
5%	1:20	මීටර් 40 m (අඩි 133)
10%	1:10	මීටර් 20 m (අඩි 66)
15%	1:7	මීටර් 15 m (අඩි 50)
20%	1:5	මීටර් 10 m (අඩි 33)

- කාණුව තුළට ජලය ගලා යාමේ වේගය අඩු කිරීම සඳහා කාණු කැපීමේ දී ඉවත් කරන පස් මීටර් 35 සිට 50 දක්වා දුරින් කාණුව තුළ තැබිය යුතුය.



පොල් ඉඩම් වල සමෝච්ච කාණු ස්ථාපිත කිරීම.

ii. ජලය බැස යන කාණු

- පොල් වගාවන්හි පහත් බිම් ප්‍රදේශ දිගු කාලීනව ජලයෙන් යටවීම හේතුවෙන්, පොල් පැළ වල වර්ධනය සහ පරිණාත ගස්වල ඵලදායීතාව අඩු වේ.
- පොල් පේළි අතර ජලය බැස යන කාණු ස්ථාපිත කිරීම සහ ඒවා සම්බන්ධ කිරීම මගින් අතිරික්ත ජලය භූමියෙන් කාර්යක්ෂමව ඉවත් කිරීමට ඉඩ සැලසේ.



පොල් ඉඩම් වල ජලය බැස යන කාණු ස්ථාපිත කිරීම.

2. පොල් ලෙලි වැළඳීම

- පොල් ලෙලි වලට ඒවායේ බර මෙන් 6-7 ගුණයක් දක්වා ජලය අවශෝෂණය කර ගැනීමේ විශේෂ හැකියාවක් ඇත.
- පොල් ලෙලි වැළඳීම සඳහා අලුත් පොල් ලෙලි භාවිතා කරන්න.
- වළලන ලද පොල් ලෙලි වැසි සමයේදී ජලය අවශෝෂණය කර වියළි කාලයේදී ගස් සඳහා සෙමින් මුදා හරිනු ලැබේ.
- නියමය හේතුවෙන් පොල් ගස් වලට සිදුවන හානිය මෙම ක්‍රමය මගින් අවම කර ගත හැකිය.
- පොල් ලෙලි තට්ටු සහ පස් තට්ටු මාරුවෙන් මාරුවට පිහිටන පරිදි පස මතුපිට මට්ටම තෙක් වළවල් පිරවිය යුතු අතර ඉතිරිව ඇති පස් වලින් වළ මත උසට කන්ද දැමීම කළ යුතුය. මේ ආකාරයට වළ පිරවීමෙන්, කළු කුරුමිණියන් බෝ වීම වළක්වා ගත හැක.
- එක් වරක් වළලන ලද ලෙලි මගින් වසර 5-6 ක් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගත හැකිය.




පොල් ලෙලි වළලන ලද වළක හරස්කඩක්

පොල් ලෙලි වැළඳීමේ ක්‍රම


i). පොල් පේළියේ ගස් දෙකකට එක පොල් ලෙලි වළක් බැගින්

- මීටර් 2.4 ක් දිග මීටර් 1.2 ක් පළල සහ මීටර් 1.0 ක් ගැඹුරු වළවල් පොල් ගස් 2 ක් අතර (එකක් හැර එකක් ලෙස) කැපිය යුතුය.
- මෙම වළේ විශාල පරිමාව නිසා තනි වළවල් වලට වඩා ලෙලි වැසි ප්‍රමාණයක් තැබිය හැකිය.
- එක් වළකට පොල් ලෙලි 350 - 400 ක් පමණ අවශ්‍ය වේ.
- පොල් ලෙලි වැළඳීම සඳහා මෙම ක්‍රමය වඩාත් සුදුසුය.



ii). එක් එක් ගස සඳහා තනි පොල් ලෙලි වළවල් කැපීම

- සෑම ගසකම පොහොර කවයට පිටින් එනම් ගසේ සිට මීටර් 2ක් දුරින් පොල් ලෙලි වළවල් කැපීම කළ හැකිය.
- වළෙහි දිග, පළල සහ ගැඹුර පිළිවෙලින් මීටර් 1.2, මීටර් 1.2 සහ මීටර් 1.0 පමණ විය යුතුය.
- මෙවැනි වළවල් පිරවීම සඳහා එක් වළකට පොල් ලෙලි 150 - 200 ක් පමණ අවශ්‍ය වේ.



iii). පොල් ගස් පේළි අතර කපන ලද විශාල අගල් තුළ පොල් ලෙලි වැළඹීම

- පොල් ගසේ සිට මීටර් 2.0 ක් දුරින් පොල් පේළිය දිගේ මීටර් 0.9 (පළල) x මීටර් 0.9 (ගැඹුර) දිග කාණු සකසා පොල් ලෙලි වළ දැමිය හැකිය.
- පොල් ලෙලි අතිරික්තයක් සහ ඉහළ පොල් අස්වැන්නක් ඇති ඉඩම් සඳහා සුදුසු වේ. කාණු බෑවුමට ලම්භකව ස්ථානගත කළ යුතුය.



3. කොහුබත් වළ දැමීම

- කොහුබත් වළවල් සකස් කිරීම පොල් ලෙලි වළවල් වලට සමාන වේ.
- වළ පිරවීම සඳහා කොහුබත් සහ පස් ස්ථර විකල්ප ලෙස භාවිතා කළ යුතුය.
- කළු කුරුමිණියන් බෝවීම වැළැක්වීම සඳහා කොහුබත් වළ පස් තට්ටුවකින් ආවරණය කර බිම් මට්ටමේ සිට ඉහළට ඔසවා තැබිය යුතුය.
- මෙම වළේ දිග, පළල සහ ගැඹුර පිළිවෙලින් මීටර් $2.4 \times 1.2 \times 0.9$ විය යුතුය.

4. පොහොර කවය ආවරණය කිරීම / වසුන් යෙදීම

- පොල් ගසේ පාමුල සිට සෙන්ටිමීටර් 15 ක පරතරයක් ඉතිරි කරමින් පොහොර කව ප්‍රදේශය ආවරණය වන පරිදි වසුන් යෙදිය යුතුය.
- වසුන් යෙදීම;
 - ✓ පාංශු බාදනය අඩු කරයි.
 - ✓ පොහොර කවයේ තෙතමනය ආරක්ෂා කරයි.
 - ✓ පාංශු උෂ්ණත්වය අඩු කරයි.

වසුන් ලෙස ඔහුලව භාවිතා කරන ද්‍රව්‍ය

- පොල් ලෙලි
- පොල් අතු
- කප්පාදු කරන ලද කොළ, අතු සහ කැසු වල් පැළෑටි
- පිදුරු

i. පොල් ලෙලි භාවිතයෙන් වසුන් යෙදීම



පොල් ලෙලි භාවිතයෙන් වසුන් යෙදීම

- පොල් ලෙලි ස්ථර දෙකක් පමණක් වසුන් ලෙස යොදන්න.
- වඩාත් හොඳ ප්‍රතිඵල සඳහා පොල් ලෙලිලේ කොහු පැත්ත පහළට මුහුණලා තබන්න.
- වසුන පොල් ගසේ සිට මීටර් 2 ක අරයක් සහිත කවාකාර ප්‍රදේශයක දැමිය යුතු අතර පොල් ගස පාමුල සිට සෙ.මී. 15ක් පමණ තෙක් ප්‍රදේශයේ වසුන් කිරීමෙන් වැළකී සිටිය යුතුය.
- එක් ගසක් සඳහා පොල් ලෙලි 200 - 250ක් පමණ අවශ්‍ය වේ.

ii. පොල් අතු මගින් වසුන් යෙදීම



පොල් අතු භාවිතයෙන් වසුන් යෙදීම

- වැටුණු පොල් අතු කැබලි 2-3 කට කපා පොහොර කවය හොඳින් ආවරණය කරන්න.
- පොල් බිඩංග ඉන්ධන දැව ලෙස භාවිතා කළ හැකිය.
- පොල් අතු පොල් ලෙලි වලට වඩා වේගයෙන් දිරාපත් වේ.

iii. කපන ලද කොළ, අතු සහ වල් පැළෑටි භාවිතයෙන් වසුන් කිරීම



කපන ලද ග්ලිරිසිඩියා අතු භාවිතයෙන් වසුන් යෙදීම

- ග්ලිරිසිඩියා කොළ ඉක්මනින් දිරාපත් වන නිසා, ඒවා වසුන් ලෙස නොව කොළ පොහොර ලෙස භාවිතා කරයි. ඇකේමියා කොළ ද වසුන් ලෙස භාවිතා කළ හැකිය.
- අනෙකුත් ගස්වල අතු, කැපූ වල් පැළෑටි, තණකොළ, සැල්විනියා, ජපන් ජබර වැනි ජලජ වල් පැළෑටි ද වසුන් ලෙස භාවිතා කළ හැකිය.

iv. පිදුරු භාවිතයෙන් වසුන් කිරීම

- අස්වැන්න නෙළන කාලය තුළ ඉතිරි වන වී පිදුරු වසුන් ලෙස භාවිතා කළ හැකිය.
- වේයන් පහසුවෙන් බෝ විය හැකි බැවින්, පොල් පැළ සඳහා මෙය වසුන් ලෙස භාවිතා කිරීම සුදුසු නොවේ.

5. කාබනික පොහොර යෙදීම

- රසායනික පොහොර වෙනුවට කාබනික පොහොර යෙදීමෙන් පසෙහි නියුමස් ප්‍රමාණය වැඩි වේ.
- මෙය පසෙහි තෙතමනය සහ පෝෂක රඳවා ගැනීමේ ධාරිතාව, වාතනය, ව්‍යුහය සහ ක්ෂුද්‍රජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි දියුණු කරයි.

උදා: එළු පොහොර, ගව ගොම, කුකුළු පොහොර සහ කොම්පෝස්ට්

6. සමෝච්ච වැටවල් සකස් කිරීම

- ඉඩමේ බැවුමට එරෙහිව එකම උන්නතාංශ දිගේ සමෝච්ච වැටවල් ස්ථාපිත කරන්න.
- මේ සඳහා ඉඩමේ ඇති ගල් භාවිතා කළ හැකිය.
- වැටේ මුදුන සෙන්ටිමීටර 60 ක් පමණ පළල් කිරීමෙන් එහි ස්ථායීතාව වැඩි කළ හැකිය.

7. විවිධ වගා ක්‍රම භාවිතය

- පොල් ගස් අතර පරතරය පුළුල් වීම නිසා, වැසි සමයේදී පස බාදනයට ලක්වීමට සහ නියං කාලයේ දී වියළීමට ඉඩ ඇත.
- පොල් ගස් නොමැති ඉඩෙහි බෝග එකක් හෝ කිහිපයක් වගා කිරීමෙන්, පාංශු තෙතමනය සංරක්ෂණය සහ ගලා යන ජලයේ වේගය අඩු කළ හැක.

උදා: අතුරු බෝග, මිශ්‍ර බෝග SALT ක්‍රමයට අනුව පොල් සහ අනෙකුත් බෝග සිටුවීම.

8. ජීව වැට් ඉඳි කිරීම (SALT ක්‍රමය)

- පාංශු බාදනය වැළැක්වීම සඳහා කාණු පමණක් ප්‍රමාණවත් නොවන ඉඩම් සඳහා මෙම ක්‍රමය භාවිතා වේ.
- මෙමගින් බැවුම් සහිත ඉඩම් වල ආරක්ෂිතව බෝගවගා කිරීමට ඉඩ සලසයි.



SALT ක්‍රමයට අනුව පොල් සහ අනෙකුත් බෝග සිටුවීම

පීච වැටි ස්ථාපිත කිරීම සහ ඒවායේ නඩත්තුව:

1. අවශ්‍ය ස්ථානවල ගල් වැටි ස්ථාපිත කරන්න.
2. ගස් අතර පරතරය සෙන්ටිමීටර 30 ක් වන සේ, ග්ලිරිසිඩියා සහ අනෙකුත් නයිට්‍රජන් තිර කරන ගස් සමෝච්ච පේළි දෙකක සිටුවන්න.
3. ග්ලිරිසිඩියා වැටවල් ස්ථාපිත කර ඇති ක්ෂේත්‍රවල පොල් සමඟ අතුරු බෝග වගා කරන්න (උදා: කොකෝවා, රබූටන්, කළු ගම්මිරිස්)
4. බෝග මාරුව අනුගමනය කරමින් අතුරු බෝග වගා කරන්න.
5. ග්ලිරිසිඩියා අතු කප්පාදු කර, ඒවා කොළ පොහොරක් ලෙස පොල් වගාවට යොදා ගන්න
6. අතු, ගල් සහ අනෙකුත් ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් ග්ලිරිසිඩියා වැට ශක්තිමත් කරන්න.

9. පස මූරුල් කිරීම (සතුන්ගේ කුර සහ බර යන්ත්‍රෝපකරණ භාවිතය නිසා තද වීමට ලක් වූ)

- අක්‍රමවත් සත්ත්ව කළමනාකරණය පස තද වීමට හේතු වන අතර, මේ නිසා පසෙහි සිදුරු අවකාශයන් අඩු වී පසට ජලය අවශෝෂණය වීම අඩු කරයි.
- පස මතුපිටින් ජල ප්‍රවාහ වැඩි වන විට මතුපිට ඇති සාරවත් පස සෝදා හරිනු ලැබේ.
- එවැනි ඉඩම්වල, වැසි සමයට පෙර පස ලිහිල් කිරීමෙන් පසට ජලය අවශෝෂණය වීම වැඩි වේ.

පොල් වගාවන්ට නියතයෙන් සිදුවන හානිය වැළැක්වීම සඳහා වැදගත් අනුගමනය කළයුතු ක්‍රියාමාර්ග:

1. ඉඩමේ ජල සම්පත් සංරක්ෂණය කරන්න (කාණු අවහිර කිරීමෙන්)
2. උපරිම කාර්යක්ෂමතාව සඳහා වාර්මාර්ග භාවිතා කරන්න
3. වසුන් ඉවත් කිරීමෙන් වළකින්න
4. නියත කාලයේදී පොල් පැළ සිටුවීමෙන් වළකින්න
5. නියත කාලයේදී රසායනික පොහොර යෙදීමෙන් වළකින්න
6. නියත කාලයේදී භූමියට හානි කිරීමෙන් වළකින්න.
7. නියත කාලයේදී ආවරණ බෝග සහ වල් පැළෑටි වර්ධනය අඩු කරන්න
8. පොල් ඉඩම් වල ගිනි ඇතිවීම වළක්වන්න
9. පොල් ඉඩමේ සතුන් නිදහසේ ලැටි ගෑම කළමනාකරණය කරන්න
10. වියළි පොල් අතු භාවිතා කිරීමෙන් හැකි සෑම විටම පොහොර කවය ආවරණය කරන්න
11. නියත කාලයේදී පොල් පැළ වල අතු ගැට ගසා තබා වැසි කාලයේදී ඒවා මුදා හරින්න
12. නාවකාලික සෙවන ලබා දෙන්න
13. නියතයට ඔරොත්තු දෙන පොල් වර්ග සිටුවන්න

තිරසාර පොල් වගාවක් සඳහා ජීව අගුරු

ජීව අගුරු යනු ශාක හෝ සත්ත්ව මූලද්‍රව්‍ය ඔක්සිජන් රහිත හෝ ඉතා අඩු ඔක්සිජන් සහිත පරිසරයක අධික උෂ්ණත්වයට ලක් කර නිපදවන ස්ථාවර කාබනික ද්‍රව්‍යයකි. එය සියුම් සිදුරු සහිත ව්‍යුහයක් වන බැවින් ජලය හා පෝෂක ද්‍රව්‍ය රඳවා ගැනීමේ හැකියාව ඉහළ වන අතර, අනෙකුත් කාබනික ද්‍රව්‍ය මෙන් පහසුවෙන් දිරාපත් නොවේ.



එම හේතුවෙන් ජීව අගුරු දිගු කාලයක් පුරා පසෙහි සක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක වන අතර, පොල් ගසේ ආයු කාලය සඳහා එක් වරක් පමණක් යෙදිය හැකි කාර්යක්ෂම පාංශු සත්කාරකයක් ලෙස සැලකේ.


ජීව අගුරු පසට යෙදීම තුළින්

- ✓ පාංශු තෙතමනය රඳවා ගැනීමේ හැකියාව වැඩි කරයි.
- ✓ හිතකර පාංශු ක්ෂුද්‍රජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි කරයි.
- ✓ පාංශු පෝෂක රඳවා ගැනීමේ හැකියාව වැඩි කරයි.
- ✓ ශාක වර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය අනෙකුත් පාංශු ගුණාංග හිතකර ලෙස වෙනස් කරයි.


ජීව අගුරු නිෂ්පාදනය සඳහා ඉහළ කාබන් සංචිතයක් සහිත විවිධ කාබනික අමුද්‍රව්‍ය විශාල ප්‍රමාණයක් භාවිත කළ හැක. බහුල ව භාවිත වන අමුද්‍රව්‍ය ලෙස තැඹිලි කෝමිබ, ග්ලිරිසිඩියා ශාක දඩු කොටස්, පොල් වගාවේ ඉවතලන පොල් පිති සහ පොල් අතු වැනි විවිධ ශාක කොටස්, ඉලුක්, මාහ හා ගිණි තෘණ වැනි තෘණ වර්ග, මෙන්ම දහයිසා, ලී පතුරු, ලී කුඩු, යතු රැල් සහ විවිධ බෝග අවශේෂයන් ද සඳහන් කළ හැක. මෙම සියලුම ද්‍රව්‍ය තිරසාර ලෙස භාවිත කර ජීව අගුරු නිෂ්පාදනය කළ හැකි අතර, එය කෘෂිකාර්මික අපද්‍රව්‍යයන්ට වටිනාකම එක් කරන පරිසර හිතකාමී විසඳුමක් වේ.

අතීතයේ ගොවීන් ජීව අගුරු නිෂ්පාදනය සඳහා විවිධ සම්ප්‍රදායික ක්‍රම භාවිත කර තිබුණද, ඒවායේ පවතින කාර්යක්ෂමතා අඩුපාඩු සහ පාරිසරික සීමා මගහැරීමට වර්තමානයේදී තිරසාර තාක්ෂණික විසඳුම් හඳුන්වා දී ඇත. ඒ අනුව ජීව අගුරු නිෂ්පාදනය සඳහා, ශ්‍රී ලංකා පොල් පර්යේෂණ ආයතනය විසින් ද්විත්ව කුටීර තාප විච්ඡේදකය වැඩි දියුණු කර ඇත. මෙම ක්‍රමය මගින් දිනෙන් දින ඉහළ යන ඉල්ලුමට සරිලන පරිදි, පරිසර හිතකාමී ලෙස හා වඩාත් ඒකාකාර ගුණාත්මකභාවයෙන් යුතු ජීව අගුරු නිෂ්පාදනය සිදු කළ හැක.


මෙය ඉතා සරල ඇටවුමක් වන අතර, ජීව අගුරු නිෂ්පාදන උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 450-600ක් පමණ වේ. මෙහි විශාල පිටත බැරලයක්, ඇතුළත කුඩා බැරලයක් සහ විමිනියක් ලෙස ප්‍රධාන කොටස් තුනක් හඳුනා ගත හැකිය.



a) විශාල පිටත බැරලය



b) ඇතුළත කුඩා බැරලය



c) විමිනිය

ද්විත්ව කුටීර විවිච්ඡේදකයේ කොටස්

පළමුවෙන්ම ජීව ඇතුරු සෑදීම සඳහා යොදා ගන්නා අමුද්‍රව්‍ය කුඩා කොටස් වලට කපා තෙතමනය 30-35%ක් පමණ වන තෙක් හොඳින් වේලා ගත යුතුය. ඉහළ තෙතමනයක් සහිත අමුද්‍රව්‍ය දහනය සඳහා යොදා ගත් විට අර්ධ දහනයක් සිදුවන බැවින් ලැබෙන ජීව ඇතුරු වල ගුණාත්මය අඩු වේ. වියළින අමුද්‍රව්‍ය, ඇතුළත බැරලය තුළට පුරවා ගත යුතුය. මෙය පුරවා ගැනීමේදී බැරලය තුළ වායු අවකාශ අවම වන පරිදි ක්‍රමවත්ව අසුරා ගැනීම මගින් පූර්ණ දහනයක් සඳහා අවශ්‍ය ඔක්සිජන් රහිත හෝ ඉතා අඩු තත්ත්වයක් නිර්මාණය කිරීමට හේතු වේ. අමුද්‍රව්‍ය අසුරා ගැනීමෙන් අනතුරුව හොඳින් වැසෙන සේ ඇතුළත බැරලය පියනෙන් වසා වායු රෝධක කරගත යුතුය. ඉන් පසුව අමුද්‍රව්‍ය පිරවූ ඇතුළත බැරලය ගෙන එය විශාල පිටත බැරලය ඇතුළතින් තැබිය යුතුය. අනතුරුව ඇතුළත බැරලය සහ පිටත බැරලය අතර, පවතින හිස් අවකාශය තුළට දහන ද්‍රව්‍ය හොඳින් අසුරා ගැනීම සිදු කළ යුතුය.

Should be we ; < ; k

මෙහිදී දහන ද්‍රව්‍ය ලෙස වියළි තැඹිලි කෝමිබ, විවිධ දැව කැබලි වර්ග, පොල් ලී පතුරු වැනි ද්‍රව්‍යයන් යොදා ගත හැකිය. ඉන් පසුව මෙම දහන ද්‍රව්‍ය වලට ගිනි තබා මදක් ඇවිලී යාම සිදුවූ පසු පිටත බැරලය විමිනියෙන් වැසීම සිදුකළ යුතුය. එසේ දහනය වීමේදී නිපදවන තාපය ඇතුළත බැරලයේ ඇති කුඩා සිදුරු තුළින් ඇතුළත බැරලය වෙතට ගමන් කරනු ලබයි. ඉහත ක්‍රියාවලිය සඳහා පැය 1-2ක් පමණ ගත වේ. පැය කිහිපයක් සිසිල් වීමට හැරීමෙන් පසුව ඇතුළත බැරලයේ ඇති ගුණාත්මක ජීව ඇතුරු වගාවට යෙදීම සඳහා භාවිතා කළ හැකිය.

Should be we ; < ;

පොල් පැළ සිටුවීමේ දී ජීව අඟුරු යෙදීම

පැළ සිටුවීමේ දී, පැළය සිටුවීමට පෙර ජීව අඟුරු කිලෝග්‍රෑම් 30ක ප්‍රමාණයක් (20% තෙතමනයක් සහිත) පැළය සිටුවන වළට යොදා වළෙහි ඇති පස් සමඟ මිශ්‍ර කිරීම සිදුකළ යුතුය.



පොල් පැළ සිටුවීමේ දී ජීව අඟුරු යෙදීම

පොල් වගාව සඳහා ජීව අඟුරු යෙදීම

ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවා ඇති පරිණාත පොල් ගස් සඳහා, ගසේ පාදස්ථයේ සිට මීටර 1 ක සීමාවක් හැර, පොහොර කවය තුළ පළල මීටර 1 ක් වූ සෙන්ටිමීටර් 15ක ගැඹුරක පාත්තියක් කපා ජීව අඟුරු කිලෝග්‍රෑම් 30ක ප්‍රමාණයක් (20% තෙතමනයක් සහිත) යොදා පස් සමඟ මිශ්‍ර කිරීම සිදුකළ හැකිය.

මෙම ප්‍රමාණය එකවර යෙදීමට අපහසු නම් එය කොටස් වශයෙන් වසර කිහිපයක් තුළ හෝ එකම වසරේ අවස්ථා කිහිපයකදී වුවද යෙදීම සිදුකළ හැකිය. පළමු අවස්ථාවේදී ගසේ පාදස්ථයේ සිට අඩි 3ක සීමාවක් හැර, පොහොර කවය තුළ පළල මීටර 1 ක් වූ සෙන්ටිමීටර් 15 ක ගැඹුරක පාත්තියක් කපා ජීව අඟුරු කිලෝග්‍රෑම් 6 ක් යෙදීම සිදුකළ හැකිය. ඉන් පසු එක් වරකට ජීව අඟුරු කිලෝග්‍රෑම් 6 බැගින් අවස්ථා 4 කදී ජීව අඟුරු යෙදීම සිදු කළ හැකිය.

Should be i y l <

මෙම සියලු අවස්ථා වලදී, නිර්දේශිත අනෙකුත් සියළු ශෂ්‍ය විද්‍යාත්මක ක්‍රම (උදා: පොහොර යෙදීම හා පොහොර කවය වසුන් කිරීම වැනි) අනුගමනය කිරීම සිදුකළ යුතුය.



පොල් වගාව සඳහා ජීව අඟුරු යෙදීම

පොල් වගාව සඳහා ජල සම්පාදනය

පොල් වගාව සඳහා සුදුසු ජල සම්පාදනයක් තෝරා ගැනීමේදී සලකා බැලිය යුතු සාධක

1. ජල සම්පාදන ක්‍රමයක් අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි?
2. කොපමණ ජල ප්‍රමාණයක් සැපයිය යුතුද?
3. ජලය සැපයිය යුත්තේ කෙසේද?

ජල සම්පාදන අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි?

- පොල් ගස්වල වර්ධක වර්ධනයට සහ ගෙඩි නිෂ්පාදනය සඳහා ජලය අත්‍යවශ්‍ය වේ.
- වියළි කාලවලදී, පසෙහි තෙතමනය අඩු වීම, ගෙඩි අස්වැන්න, ගෙඩියේ ප්‍රමාණය සහ කොප්පරා වල ගුණාත්මකභාවය අඩු කරයි.
- එබැවින්, පොල් ගසේ ප්‍රශස්ත වර්ධනය සහ ඵලදායීතාව පවත්වා ගැනීම සඳහා වියළි කාලයේදී ජල සම්පාදනය කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

පොල් ගසක ජල අවශ්‍යතාවය

- පරිණත පොල් ගසකට දිනකට ජලය ලීටර් 40ත් 60ත් අතර ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වේ. පවතින පාරිසරික තත්ත්වයන් අනුව මෙය බෙහෙවින් වෙනස් විය හැක.
- උදා: අධික පරිසර උෂ්ණත්ව තත්ත්වයන් යටතේදී වාෂ්පීකරණය වැඩි වීම හේතුවෙන් පරිණත පොල් ගසක මෙම අගය දිනකට ජලය ලීටර් 100 දක්වා වැඩි විය හැක.

පොල් පැළවල ජල අවශ්‍යතාවය වයස අනුව වෙනස් වේ.

වයස අනුව පොල් පැළවල ජල අවශ්‍යතාවය

වයස	ජල අවශ්‍යතාවය (දිනකට ලීටර)
අවුරුද්දට අඩු	12
අවුරුදු 1	18
අවුරුදු 2	28
අවුරුදු 3	32
අවුරුදු 4	36
අවුරුදු 5	40-60

දේශගුණික කලාප අනුව ජල අවශ්‍යතාවය වෙනස් වේ.

- අතරමැදි කලාපය : වාර්ෂික වර්ෂාපතනය, වාර්ෂික ජල අවශ්‍යතාවයට වඩා අඩුය.
- වියළි කලාපය : වාර්ෂික වර්ෂාපතනය, වාර්ෂික ජල අවශ්‍යතාවයට වඩා අඩුය.
- තෙත් කලාපය : වාර්ෂික වර්ෂාපතනය, වාර්ෂික ජල අවශ්‍යතාවය සඳහා ප්‍රමාණවත් වේ.

සටහන: පොල් වගාව සඳහා, වසර පුරා පැතිරෙන ඒකාකාරී වර්ෂාපතනයක් අත්‍යවශ්‍ය වේ. තෙත් කලාපයේ වුවද වර්ෂාපතනය අඩු නම් හෝ දීර්ඝ වියළි කාලයක් ඇති වුවහොත්, පොල් අස්වැන්න හොඳින් පවත්වා ගැනීම සඳහා ජල සැපයුම අවශ්‍ය වේ.

පොල් වගාව සඳහා ජල සම්පාදන ක්‍රමයක් තෝරා ගැනීමේදී සැලකිය යුතු ප්‍රධාන සාධක

1. ජල ප්‍රභවය සහ ගුණාත්මකභාවය
2. පාංශු සාධක
3. පාංශු වයනය
4. පාංශු සවිවර්තාවය
5. ක්ෂේත්‍ර ධාරිතාව
6. පසෙහි ජලය රඳවා ගැනීමේ හැකියාව
7. ජලය බැස යාම
8. පොල් ගස්වල ක්‍රියාකාරී මූල කලාපය
9. ආර්ථික සාධක
10. අතුරු බෝග වගාව
11. ශ්‍රම අවශ්‍යතාවය
12. ඉඩමේ ස්වභාවය



පතස් (කුඩා පොකුණු)

සුදුසු ජල සම්පාදන ක්‍රම: සාම්ප්‍රදායික සහ වැඩිදියුණු කළ ක්‍රම

සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම

1. **පතස් (පොල් වගාවල ඇති කුඩා පොකුණු) භාවිතා කිරීම**
 - මෙම ක්‍රමයේදී, බාල්දි හෝ ඒ හා සමාන බහාලුම් භාවිතා කරමින් ක්ෂේත්‍රයේ කුඩා පොකුණු වලින් අතින් ජලය ලබා ගෙන යෙදීම සිදු කරයි.
 - මෙය ඉතා සරල ක්‍රමයකි.
2. **බඳුන් ජල සම්පාදනය (කළ මගින් ජල සම්පාදනය)**
 - බඳුන් ජල සම්පාදනයේදී පැළයේ දෙපස වළලා ඇති ඔප නොදැමූ මැටි කළ හරහා පොල් පැළවලට ජලය මුද්‍රා හරී.
 - එම කළවල පසට ජලය කාන්දු වීමට ඉඩ සලසන කුඩා සිදුරු ඇති අතර, පොල් පැළයෙන් ඉවතට මුහුණලා ඇති පැත්තේ ජල හානිය අවම කිරීම සඳහා තිත්ත ආලේප කර ඇත. ජල භාවිත කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා බඳුනේ පතුලේ සිදුරක් විදු මීටර් 1 ක් දිග කොහු ලණුවක් සවි කර මූල කලාපය දෙසට වළලනු ලැබේ.
 - වැලි සහිත පසෙහි සිටුවා ඇති පොල් පැළ සඳහා මෙම ක්‍රමය විශේෂයෙන් සුදුසු වන අතර කළ පිරවීම සඳහා මිනිස් ශ්‍රමය අවශ්‍ය වේ.
 - නිශ්චිත කලාපයකට පමණක් ජලය යෙදීම හේතුවෙන් වල් පැළෑටි වර්ධනය අවම වේ.



පොල් පැළ සඳහා බඳුන් ජල සම්පාදනය



බඳුන් ජල සම්පාදනය සඳහා වැඩි දියුණු කරන ලද කළයක්

3. බේසම් ජල සම්පාදනය

- මෙහිදී, එක් එක් ගස වටා ඉදිකර ඇති නොගැඹුරු, වටකුරු, බේසම් මගින් පොල් ගස්වලට ජලය සැපයීම සිදු කරයි.
- වැලි සහිත පස්වලදී හැර, අනෙකුත් පස්වලදී මෙම බේසම් කාණු මගින් එකිනෙකට සම්බන්ධ කරනු ලැබේ.
- එක් කෙළවරක ඇති ජල ප්‍රභවයකින් කාණු පද්ධතියට ජලය මුදා හරින අතර එමගින් එය බේසම් දෙසට ගලා යාමට ඉඩ සලසයි.
- පරිණත පොල් ගස්වලට ජලය සැපයීම සඳහා පමණක් මෙම ක්‍රමය සුදුසු වේ.
- තැනිතලා හෝ බෑවුම් අඩු භූමියක යෙදීම වඩාත් සුදුසු වේ.
- ජල නාස්තිය ඉහළ බැවින් විශාල ජල ප්‍රභවයක් අවශ්‍ය වේ.
- බේසම් ජල සම්පාදනය ස්ථාපනය කර ඇති ක්ෂේත්‍රවල යන්ත්‍රෝපකරණ භාවිතය අපහසු වේ.



පොල් ඉඩම් වල බේසම් ජල සම්පාදනය

වැඩි දියුණු කළ ක්‍රම

1. විසුරුම් ජල සම්පාදනය

- විසුරුම් ජල සම්පාදන ක්‍රමයේදී භූමිය පුරා ඒකාකාරව ජලය බෙදා හැරීම සඳහා පොම්ප, නළ පද්ධතියක් සහ විසුරුම් හිස් භාවිතා කරයි.
- මෙම ක්‍රමය අතුරු බෝග වගා කර ඇති පොල් වගාවන් සහ බීජ පැළ තවත් සඳහා ජලය සැපයීමට වඩාත් සුදුසු වේ.
- සාපේක්ෂව අඩු කම්කරු ශ්‍රමයක් අවශ්‍ය වේ.
- තද සුළං ඇති ප්‍රදේශ සඳහා සුදුසු නොවේ.
- ස්ථාපනය සහ නඩත්තුව සඳහා සැලකිය යුතු ප්‍රාග්ධනයක් අවශ්‍ය වේ.



විසුරුම් ජල සම්පාදනය

2. හෝස් ජල සම්පාදනය


- හෝස් ජල සම්පාදන ක්‍රමයේදී පොල් ගස්වලට ජලය යෙදීම සඳහා භූගත නළ පද්ධතියකින් ආරම්භ වන කරාම සහිත රයිසර් **නළවල** සවිකළ රබර් නළයක් භාවිතා කරයි.
- සාමාන්‍යයෙන් මීටර් 8 x 8 පරතරයෙන් චතුරස්‍රාකාර ලෙස සිටුවා ඇති වගාවක පොල් ගස් 16ක් සඳහා එක් රයිසර් **නළයක්** භාවිතා කරන අතර, එමගින් ජල සම්පාදනය සඳහා දිග මීටර් 30ක් සහිත විශ්කම්භය මිලි මීටර් 32-63 අතර රබර් නළයක් භාවිතා කරයි.
- මෙහිදී, හෝස් මගින් ජලය සැපයීමට කම්කරු ශ්‍රමය අවශ්‍ය වේ.
- සරල ක්‍රමයක් වන අතර භාවිතය සඳහා විශේෂ තාක්ෂණික දැනුමක් අවශ්‍ය නොවේ.
- අනෙකුත් ක්‍රම හා සසඳන විට නඩත්තු කිරීම සඳහා අඩු පිරිවැයක් වැය වේ.
- නඩත්තු කිරීම පහසුය.



හෝස් ජල සම්පාදනය

Two words


Should be
k < h l



සමචතුරස්‍රාකාර වගා පද්ධතියක හෝස් ජල සම්පාදන පද්ධතියක සැකැස්ම

3. ක්ෂුද්‍ර ජල සම්පාදනය

- ක්ෂුද්‍ර ජල සම්පාදනයේදී පොහොර කවය තුළ ස්ථාන කිහිපයක ස්ථාපිත කර ඇති බිංදු විමෝචක හරහා කුඩා ප්‍රමාණවලින් ජලය සපයයි.
- මෙම ක්‍රමය යටතේ අවම ජල භාස්තියක් සිදුවන බැවින් ඉහළ ජල භාවිත කාර්යක්ෂමතාවයක් පවතී.
- ස්ථාපනය සහ නඩත්තුව සඳහා සැලකිය යුතු ප්‍රාග්ධන ආයෝජනයක් අවශ්‍ය වේ.
- මෙම ක්‍රමය සඳහා සාපේක්ෂව අඩු කම්කරු ශ්‍රමයක් අවශ්‍ය වේ.
- අවහිර වීම වැළැක්වීමට සහ දිගුකාලීනව පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය සහතික කිරීමට, අපද්‍රව්‍ය වලින් තොර පිරිසිදු ජලය භාවිතා කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.
- ක්ෂුද්‍ර ජල සම්පාදන ක්‍රම දෙකක් පවතී. මතුපිට ක්ෂුද්‍ර ජල සම්පාදනය සහ භූගත ක්ෂුද්‍ර ජල සම්පාදනය.
- පස තෙත් කිරීමේ රටාව, පසෙහි වයනය සහ විමෝචක වලින් ජලය පිටවන වේගය අනුව වෙනස් වේ.
- ඒ අනුව, බිංදු විමෝචක සවි කිරීමට වඩාත් සුදුසු ක්‍රමය, විවිධ පස් සඳහා විමෝචක වලින් ජලය පිට වන වේගය, ජලය මුදා හැරිය යුතු කාලය සහ ජලය සැපයිය යුතු කාල අන්තරය හඳුන්වා දී ඇත.



පොල් ගස වටා බිංදු විමෝචක ස්ථාපනය කිරීම

පරිණාත ගස් සඳහා හඳුන්වා දී ඇති ජල සම්පාදන කාලසටහන

පස් වර්ගය	විමෝචකයකින් ජලය පිට වන වේගය (ලීටර්/පැය)	ජල සම්පාදනය සිදු කරන කාලය (පැය)	ජල සම්පාදනය සිදු කරන කාල අන්තරය (දින)
බොරළු සහිත වැලිමය මැටි ලෝම පස	30	2	4-6
	15	4	4-6
	8	8	4-6
ගැඹුරු වැලිමය ලෝම පස	15	4	4-6
	8	8	4-6
	4	8	2-3
මධ්‍යස්ථ ගැඹුරු සිට ගැඹුරු වැලි පස	4	8	2-3
	2	8	දිනපතා

පොල් පැළ සඳහා හඳුන්වා දී ඇති ජල සම්පාදන කාලසටහන

පැළගේ වයස	විමෝචකයකින් ජලය පිට වන වේගය (ලීටර්/පැය)	ජල සම්පාදනය සිදු කරන කාලය (පැය)	ජල සම්පාදනය සිදු කරන කාල අන්තරය (දින)
අවුරුදු 1 ට අඩු	30	0.5	5
	15	1	5
	8	2	5
අවුරුදු 1	30	1	6
	15	2	6
	8	4	6
අවුරුදු 2	30	1.5	6-7
	15	3	6-7
	8	6	6-7
අවුරුදු 3	30	1.75	6-7
	15	3.5	6-7
	8	7	6-7
අවුරුදු 4	30	1.9	6
	15	3.7	6
	8	7.5	6
අවුරුදු 5	30	2	6
	15	4	6
	8	8	6

මතුපිට ක්ෂුද්‍ර ජල සම්පාදනය

- මෙහිදී, පොල් ගස වටා පස මතුපිට තබා ඇති කුඩා නළ හෝ විමෝචක හරහා ජලය සපයයි.



මතුපිට ක්ෂුද්‍ර ජල සම්පාදනය

භූගත ක්ෂුද්‍ර ජල සම්පාදනය

- භූගත ක්ෂුද්‍ර ජල සම්පාදනයේදී පොළොව යටින් වළලුනු ලැබූ නළ සහ විමෝචක භාවිතයෙන් පොල් ගසේ මූල පද්ධතියට කෙළින්ම ජලය සපයයි.
- මෙම ක්‍රමය භාවිතයේදී යන්ත්‍රෝපකරණ මගින් නළ පද්ධතියට සිදුවන හානිය වළක්වා ගත හැකිය.



භූගත ක්ෂුද්‍ර ජල සම්පාදනය

4. ගර්ඞ්‍ර ජල සම්පාදනය

- ගර්ඞ්‍ර ජල සම්පාදනයේදී ගස වටා සිදුරු සහිත කුඩා නළයක් ඔතන අතර (ගර්ඞ්‍ර නළය), එමගින් සෙමින් ගසට ජලය සපයනු ලබයි.
- මෙම ගර්ඞ්‍ර නළය භූගත නළ පද්ධතියකට සම්බන්ධ කර ඇත.
- මෙම ක්‍රමය සාම්ප්‍රදායික බිංදු ජල සම්පාදන පද්ධතිවලට සාපේක්ෂව ප්‍රායෝගික දූෂිතරතා කිහිපයකින් යුක්ත වේ.
- බිංදු ජල සම්පාදනයට සාපේක්ෂව ප්‍රාග්ධන පිරිවැය අඩුය.
- මෙම පද්ධතියේ ජල භාවිත කාර්යක්ෂමතාව 75 - 85% පමණ වේ.



ගර්ඞ්‍ර ජල සම්පාදනය

පොල් වගාවේ පළිබෝධකයන් හා රෝග පාලනය

පොල් වගාවන්හි ප්‍රධාන පළිබෝධකයන්

- පොල් වගාවන්හි පළිබෝධ සහ රෝග වගාවට දරුණු ලෙස හානි කරන අතර, බෝග අස්වැන්න සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කරමින් සමහර අවස්ථාවල ගස් මිය යාමට පවා හේතු විය හැක.
- කඩිනම් විසඳුම් ලබා නොදුන්නොත්, මෙම ගැටළු නවත් උග්‍ර විය හැකි අතර, එය ඵලදායිතාවයට සහ දිගුකාලීනව වගාවේ සෞඛ්‍යයට බලපායි.
- එබැවින්, පොල් වගාවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා කාලෝචිත හා ඵලදායී කළමනාකරණ පිළිවෙත් අත්‍යවශ්‍ය වේ.
- ඒකාබද්ධ පළිබෝධ සහ රෝග කළමනාකරණය යනු බහු පාලන ක්‍රමවල උපායමාර්ගික සංයෝජනය හරහා පළිබෝධ සහ රෝග වල බලපෑම අවම කිරීම මගින් ශාක සෞඛ්‍යය පවත්වා ගැනීම සඳහා වන පුළුල් ප්‍රවේශයකි.
- නිරසාර පළිබෝධ සහ රෝග කළමනාකරණය සඳහා සාම්ප්‍රදායික, ජීව විද්‍යාත්මක, යාන්ත්‍රික සහ රසායනික පාලන ක්‍රම ඒකාබද්ධ කිරීම මෙයට ඇතුළත් වේ.
- මෙම ප්‍රවේශයේ ඵලදායිතාවය රඳා පවතින්නේ කළමනාකරණ ක්‍රම දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් එකවර භාවිතා කිරීම මත ය.
- මෙම ප්‍රවේශය පොල් ගස්වල ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කරන අතර පළිබෝධ සහ රෝග ඇති කරන ජීවීන් තුළ ප්‍රතිරෝධය වර්ධනය වීමේ අවදානම අඩු කරන අතර අනිත්‍ය පාරිසරික බලපෑම් අවම කරයි.

1. රතු කුරුමිණියා (*Rhynchophorus ferrugineus* Olivier)

- පොල් පැළයක කඳ බේරෙන කාලයේ සිට අවුරුදු 15 දක්වා ගස්වලට ඇඬව හානි කරයි.
- හානි සිදුවන්නේ කීටයන් මගිනි.

පළිබෝධකයාගේ ජීවන චක්‍රය



රතු කුරුමිණියාගේ ජීවන චක්‍රය අදියර 4 කින් සමන්විත වේ; එනම් බිත්තර, කීටයන්, පිළවුන් සහ වැඩුණු කුරුමිණියන්ය. ගෑහැනු කුරුමිණියා පොල් ගස් වල කරටියේ,පිතිවල, කඳේ හා පිටතට නිරාවරණය වූ අලුත් මුල්වල ඇති තුවාල මත බිත්තර දමයි. බිත්තර මි.මි. 2.5 ක් පමණ දිගටි සහ සුදු ක්‍රීම් පැහැයෙන් යුක්ත වේ. බිත්තර වලින් එළියට එන කීටයන් පාද රහිත, සුදු හෝ කහ පැහැයෙන් යුක්ත, විශාල තද දුඹුරු හිසක් සහිත කීටයන් වේ. බිත්තර වලින් පිටවන කීටයන් කඳ තුළට හෝ ගොඩය ප්‍රදේශයට ඇතුළු වී කීට අවධි කිහිපයක් ගත කරයි. කීටයින්ගේ ප්‍රමාණය මි.මි. 2 සිට සම්පූර්ණ වර්ධනයේදී (දිගින්) සෙන්ටිමීටර 5 දක්වා පරාසයක පවතී. වැඩුණු කීටයන් කඳේ පොත්ත යටින් කෝෂ ගත වේ. එය පිළා අවස්ථාවයි. මෙම පිළා කෝෂ කඳේ හෝ පොල් බිඩංගයේ පොත්ත යට සාදයි. කෝෂ තුළ සිටින පිළවුන් වලනය නොවන අතර, තවදුරටත් ගසට හානි සිදු නොකරයි. පිළා කෝෂයෙන් බිහිවන වැඩුණු කුරුමිණියන් කඳේ හෝ පිතිවල සිදුරක් සාදා ගෙන ඉවත් වී යයි. මොවුන් රතු පැහැයට හුරු දුඹුරු පැහැයක් ගන්නා අතර උරස මත කළු පැහැති ලප දක්නට ලැබේ.

හානියේ ලක්ෂණ

- කඳේ සෙ.මි. 1 - 2 විෂ්කම්භය සහිත සිදුරු තිබීම, එම සිදුරු වලින් කෙඳි පිටතට පැමිණා තිබීම හෝ දුඹුරු පැහැති දියරයක් ගැලීම.
- අතු කහපාට වීම, ගොඩයේ මලානික බව සහ පැත්තකට ඇලවීම.
- පොල් පිති මත හෝ පිති පාමුල කෙඳිමය පිළා කෝෂ දැකිය හැකි වීම.
- කඳට කන තැබූ විට කීටයන් පටක කොටස් ආහාරයට ගන්නා ශබ්දය ශ්‍රවණය වීම.
- පොල් පිති වල බිඩංග කැපූ ස්ථානවල කීටයන් ඇතුළු වූ කුඩා සිදුරු (සෙ.මි. 0.5 - 1 විෂ්කම්භයෙන් යුත්) දක්නට ලැබීම.
- මෙම පළිබෝධ හානිය නිසි ලෙස කළමනාකරණය නොකළහොත්, පොල් ගසෙහි කරටිය කඩා වැටීම සිදු වේ.



රතු කුරුමිණි හානිය හේතුවෙන් කරටිය කඩා වැටුණු පොල් ගසක්

මර්දන ක්‍රම

- මේ සඳහා ඒකාබද්ධ පළිබෝධ මර්දන ක්‍රමයක් අත්‍යවශ්‍ය වේ.

1. ශෂ්‍ය විද්‍යාත්මක ක්‍රම

- හානිය ඇති වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා, පැළ ගස්වලට කිසිදු තුවාලයක් ඇති නොවීමට වග බලා ගතයුතුය.
- හානියට පාත්‍ර විය හැකි වයසේ ගස් සති 2-3 කට වරක් හොඳින් පරීක්ෂා කිරීම. මේ සඳහා ගසේ වියළි අතු හා මට්ටු ඉවත් කර කඳ හොඳින් නිරාවරණය වන සේ තැබිය යුතුය.
- ගසේ කඳට (යාන්ත්‍රික හානි, ගවයින්ගෙන් ඇති වන හානි, ජල මට්ටම ඉහළ ප්‍රදේශ වල කඳ මහත්ව වැඩීම නිසා සිදු වන ස්වභාවික පැළුම්), කරටියට (කළු කුරුමිණි හානි), පිතිවලට (නියගයට සිදුවන පැළීම), මුල් වලට (නිරාවරණය වූ මුල් වලට යාන්ත්‍රික හානි හෝ සත්ත්වයින්ගෙන් වන හානි) සිදු වූ තුවාලවල දියනාර හෝ දැව්තෙල් (වාහන වලින් ඉවත් කරන එන්ජින් තෙල්) ආලේප කරන්න.
- නියග කාලයේදී/ගවයින් ඇදීම නිසා ගස් වල අතු පහත් වූ විට මුවහත් පිතියකින් අතු බිඩංග මුලින් කපා දමා බිඩංගය කඳට සවි වන ස්ථානයේ ඇති වන තුවාල මත දියනාර හෝ දැව්තෙල් ආලේප කරන්න.
- වගාවේ අලුතින් කපා දමන ලද පොල් ගස්වල කරටි, කිතුල් කොට ආදී කඳන් ද්‍රව්‍ය ඇත්නම් කැබලි වලට කපා පුළුස්සා දමන්න.
- රතු කුරුමිණි හානිය නිසා විනාශ වූ ගස් හැකි ඉක්මනින් කැබලි වලට පලා, ගස්වල පොළව යට මට්ටමෙන් වූ කොටස්ද උදුරා පලා දමා පුළුස්සා දමන්න.
- රතු කුරුමිණි හානිය හඳුනා ගැනීමේ උපකරණය (Red Weevil Detector) මගින් කඳ තුළ සිටින රතු කුරුමිණි කීටයන් පිටත ආහාරයට ගන්නා ශබ්දය පැහැදිලිව හඳුනා ගත හැක.

2. රසායනික මර්දන ක්‍රම

- හානිය මුලින් හඳුනාගත් ගසට මොනොක්‍රොටොපෝස් 600g/L එස්. එල්. වැනි සංස්ථානික කෘමිනාශකයක් හෝ ක්ලෝරන්ට්‍රැනිලිප්‍රෝල් 20% + තයෝමෙතොක්සාම් 20% ඩබ්.පී. මිශ්‍රණයක් අඩංගු කෘමිනාශකයක් එන්නත් කිරීම.

i. ක්ලෝරන්ට්‍රැනිලිප්‍රෝල් 20% + තයෝමෙතොක්සාම් 20% ඩබ්.පී. මිශ්‍රණය යෙදීම.

- කෘමිනාශකයෙන් ග්‍රෑම් 4ක් වතුර මිලි ලීටර් 250ක දියකර ද්‍රාවණයක් සාදා කඳට එන්නත් කරන්න. එන්නත් කිරීමේදී,
 - ✓ මීටර් 1.5 ක් හෝ ඊට අඩු උසකින් යුත් කඳක් සහිත සෑම ගසකටම ඉහත ද්‍රාවණයෙන් මිලි ලීටර් 60 ක් එන්නත් කළ යුතුය.
 - ✓ මීටර් 1.5 ට වැඩි උසකින් යුත් සෑම ගසකටම (මට්ටම් දෙකකින්) ඉහත ද්‍රාවණයෙන් මිලි ලීටර් 120 ක් එන්නත් කළ යුතුය.

කෘමිනාශකය යොදන ආකාරය


- මෙම කෘමිනාශකය කුඩු ආකාරයෙන් පවතී.
- පළමුව කෘමිනාශකය ග්‍රෑම් 4 පැකැට්ටුවේ වූ කුඩු ප්‍රමාණය බෝතලයකට දමා, එයට ජලය මිලි ලීටර් 250 ක් දමා හොඳින් සොලවමින් දිය කර ගන්න.
- ගසේ උස මට්ටමට අනුව සෙ.මී. 10 ක් ගැඹුර මිලි මීටර් 13 ක් විෂ්කම්භය සහිත සිදුරු පහතට අංශක 45 කෝණයක හැඩයට යවකාරයක් හෝ විදුලි විදිනයක් ආධාරයෙන් සිදුරු කර ගන්න.
- ගසේ උස අඩි 5 ක් හෝ ඊට අඩු නම්, පළමු සිදුරු පොළව මට්ටමේ සිට අඩි 1-2 ක් උසින් ද දෙවන සිදුරු පොළව මට්ටමේ සිට අඩි 4 ක් පමණ උසින්ද සකස් කර ගන්න. එක් සිදුරකට මිලි ලීටර් 30 බැගින් යොදන්න.
- ගසේ උස අඩි 5 ට වඩා වැඩි නම්, ඉහත අයුරින් ප්‍රතිකාර කර ඊට අමතරව අඩි 5 සීමාවට ඉහළින් දෙපැත්තෙන් තවත් සිදුරු 2 ක් සාදා එම සිදුරුවලටද කෘමිනාශක මිලි ලීටර් 30 බැගින් එන්නත් කරන්න.
- සිරිත්පයක් භාවිත කර කෘමිනාශක යොදන්න.
- කෘමිනාශක යොදා සතියකින් පමණ පසුව කෘමිනාශක යෙදූ සිදුරු සහ රතු කුරුමිණි හානිය නිසා ඇති වූ සිදුරු වැලි, සිමෙන්ති මිශ්‍රණයකින් වසා දමන්න.
- කෘමිනාශක යෙදවූ ඕපස් ගැලිම් වැනි ලක්ෂණ පවතී නම් නැවත සති දෙකකින් පමණ අලුත් සිදුරු සාදා පෙර සඳහන් කළ ආකාරයටම ප්‍රතිකාර කරන්න.
- කෘමිනාශක විෂ සහිත බැටින් ඒවා පරිහරණයේදී ආරක්ෂක විධි අනුගමනය කරන්න.

ii. සංස්ථානික කෘමිනාශකයක් වන මොනොක්ලොපොස් 600 g/L එස්. එල් එන්හත් කිරීම.

- මොනොක්ලොපොස් 600 g/L එස්. එල්. නිර්දේශිත ප්‍රමාණ
 - ✓ කඳ නොබේරුණු ගසක් සඳහා මි.ලී. 10
 - ✓ සිහින් කඳක් (කඳ පාමුල වට ප්‍රමාණය සෙ.මි. 100 ට අඩු) සහිත ගසක් සඳහා මි.ලී. 30
 - ✓ කඳ මහත්ව වැඩුණු ගස් සඳහා (වට ප්‍රමාණය සෙ.මි.100 ට වැඩි) මි.ලී. 40
- වැඩුණු ගස් සඳහා, කෘමිනාශක කඳට එන්නත් කිරීම හෝ මුල් මගින් යෙදීම කළ හැක.
- කඳ බේරී නොමැති පැළ ගස් සඳහා කෘමිනාශකය මි.ලී. 10 ක ප්‍රමාණයක් ජලය මි.ලී. 500 ක් සමඟ මිශ්‍රකර ගසේ ගොඩය ප්‍රදේශය හොඳින් තෙත්වන ලෙස ඉහළින් කරටියට දමන්න.
- කෘමිනාශකය යෙදීමට පෙර හානියට පත් වූ ගසේ මේරූ පොල්වල 2ක් ඉවත් කිරීම කළ යුතු අතර කෘමිනාශක යොදා මාස 2ක් යනතෙක් එම ගස්වල පොල් පරිභෝජනයට නොගත යුතුය.

කඳට එන්නත් කිරීම

- විදුලි ඩ්‍රිල් යන්ත්‍රයක් හෝ යවකාරයක ආධාරයෙන් ගසේ පොළව මට්ටමේ සිට මීටර් ½ - 1 ක් පමණ ඉහළින් 45 කෝණයකට කඳේ විරුද්ධ දිශා වලින් මි.මි. 12 ක පමණ විෂ්කම්භයෙන් යුත් සෙ.මි. 10ක් පමණ ගැඹුරු සිදුරු 2 ක් විදු ගැනීම හා එම සිදුරු තුළ ඇති කෙඳි කොටස් ඉවත් කරන්න.
- ප්‍රතිලයක් හෝ සිරින්නයක් ආධාරයෙන් එක් සිදුරකට නිර්දේශිත කෘමිනාශක ප්‍රමාණයෙන් 1/2 බැගින් සාන්ද්‍ර ද්‍රාවණයක් සේ (ජලය එක් නොකර) යෙදීම. මුළු ප්‍රමාණය එකවර දැමිය නොහැකි නම් උරා ගැනීමට ඉඩ හැර පැයකින් පමණ පසුව ඉතිරිය යෙදීම කළ හැක.
- ප්‍රතිකාර කර සහියකින් පසු එම සිදුර තුළට හොඳින් කාවදින සේ සිමෙන්ති වැලි මිශ්‍රණයක් යොදා වසා දමා ඒ මත දියතාර ආලේප කරන්න.
- එම ගසට කෘමිනාශක යොදා ඇති බවට හඳුනා ගැනීම සඳහා සලකුණු කරන්න.



එන්නත් කිරීම

මුල් මගින් කෘමිනාශකය යෙදීම

- කඳ පාමුල පස් ප්‍රවේශමෙන් හාරා පැන්සලක පමණ ඝනකම සහිත ප්‍රා දුමුරු පැහැති නිරෝගී මුලක් පාද ගැනීම.
- මොනොක්ලොපොස් 600 g/L එස්. එල්. නියමිත මාත්‍රාව ඊට සමාන ජල පරිමාවක මිශ්‍ර කර එම මිශ්‍රණයෙන් හාගයක් ඝන පොලිතින් වලින් සෑදූ පොලිතින් බෑගයකට (සෙ.මි. 6 × 15 පමණ) හෝ විදුරු බටයකට හෝ කුඩා බෝතලයකට දමන්න.
- පාද ගත් මුලෙහි අග කෙළවර ඉතා නියුණු පිහියකින් හැඩයට කපා එලෙස කැපූ කෙළවර මොනොක්ලොපොස් මිශ්‍රණය දමා ඇති බඳුනේ පතුල තෙක් ඇතුළු කොට බෑගයේ විවෘත පැත්ත මුලට තදවන සේ හොඳින් බඳින්න.
- එම මුල තරමක් හැඩයකට නිබේන සේ තද කර හෝ වෙනත් ආවරණයකින් වසන්න. මෙසේ තවත් මුලකට ඉතිරි කෘමිනාශක යොදන්න.
- එම ගසට කෘමිනාශක යොදා ඇති බවට හඳුනා ගැනීම සඳහා සලකුණු කරන්න.
- කෘමිනාශකය යෙදීමට පෙර හානියට පත් වූ ගසේ මේරූ පොල්වල 2ක් ඉවත් කිරීම කළ යුතු අතර කෘමිනාශක යොදා මාස 2ක් යනතෙක් එම ගස්වල පොල් පරිභෝජනයට නොගත යුතුය.



මුල් මගින් කෘමිනාශකය යෙදීම

පෙරමෝන උගුල භාවිතය

- වැඩුණු රතු කුරුමිණියන් ක්ෂේත්‍රයේ දක්නට ලැබෙන අවස්ථාවේදී පෙරමෝන උගුල භාවිතා කළ හැක.
- අක්කර 5 හෝ 5 ට වැඩි පොල් වගාවන් සඳහා පෙරමෝන උගුල භාවිතය නිර්දේශ කෙරේ.
- පෙරමෝන උගුලට අයත් වන කොටස්:
 - ✓ ලීටර් 5 - 6 ක ප්ලාස්ටික් බඳුනක්
 - ✓ පෙරමෝන නළයක් හෝ පේලිමය පෙරමෝනය
 - ✓ ඇම සහිත කුඩා භාජනයක් (පෙරමෝන නළ භාවිතයේදී පමණි)



උස් කොට සවි කරන ලද පියන

පෙරමෝන නළය


බාල්දිය (1/4 ක් සබන් වතුරෙන් පුරවා ඇත)

රතු කුරුමිණි පෙරමෝන උගුල් කොටස්

- ශ්‍රී ලංකා පොල් පර්යේෂණ ආයතනය පෙරමෝන උගුල් වර්ග දෙකක් හඳුන්වා දී ඇත.
 - ✓ පේලිමය පෙරමෝනය
 - ✓ පෙරමෝන නළ



පේලිමය පෙරමෝනය



පෙරමෝන නළ

1. පේලිමය පෙරමෝනය

- මෙය ඇමක් අවශ්‍ය නොවන වැඩි දියුණු කළ පෙරමෝන ඇමකි.
- උගුල ස්ථාපනය කරන විට, පේල් පෙරමෝන පැකට්ටුව පිටත කවරයෙන් ඉවත් කර බාල්දියේ ඉහළ දාරයට සවි කර ඇති ආධාරකයට බැඳ තබන්න.
- ප්ලාස්ටික් බාල්දියේ පතුලට සෙන්ටිමීටර් 7.5 ක් පමණ සබන් ද්‍රාවණයක් වත් කරන්න. සබන් ද්‍රාවණය වියළී ගිය පසු එය නැවත පුරවා පල මට්ටම පවත්වා ගැනීමට වග බලා ගන්න.

2. පෙරමෝන නළ

- පෙරමෝන නළ භාවිතයේදී ප්ලාස්ටික් බඳුනේ පතුලට සෙන්ටිමීටර් 7.5 ක් පමණ ගැඹුරකින් යුත් සබන් ද්‍රාවණයක් දමන්න.
- අවශ්‍ය පරිදි සබන් ද්‍රාවණය නැවත පුරවන්න.
- ඇම සහිත භාජනය එම බඳුනේ ඉහළ කට ආසන්නයේ රඳවන්න.
- ඇම වශයෙන් රා හෝ ශීෂ්ටි සිනි ද්‍රාවණය මි.ලී. 100 ක් යොදා ගන්න. ශීෂ්ටි සිනි ද්‍රාවණය: (සිනි ග්‍රෑම් 150 + ශීෂ්ටි ග්‍රෑම් 02 + පලය)
- පෙරමෝන නළයේ උඩ කොටස (සිනින් පැත්ත) ඉතා ප්‍රවේශමෙන් කඩා දමා බඳුනේ ඉහළ කට කොටසේ සවි කර ඇති ආධාරකයේ ගැටගසන්න.
- සාර්ථක රතු කුරුමිණි මර්දනයක් සඳහා හෙක්ටයාරයකට පෙරමෝන උගුල් 5 ක් යෙදිය යුතුය. (අක්කර භාගයකට එකක්)

මෙම උගුල් ඉඩමේ විවිධ ස්ථානවල සවි කළ යුතුය.

- වගාවේ කෙළවරක සවි කර ගත් ලියක සුළඟට නොපැද්දෙන සේ උගුල සවි කරන්න.
- සති දෙකකට වරක් උගුල ගුද්ධ කිරීම හා සබන් ද්‍රාවණය හා ඇම නැවත පුරවන්න. **උගුල් වලට අසු වන කුරුමිණි**
- **Two words** ගණන **ඉතා අඩුවන** තෙක් (මාසයකට 3 ට අඩු) උගුල් ක්ෂේත්‍රයේ තබන්න.
- පෙරමෝන නළයේ/පේලිය පෙරමෝනයේ රසායනික ද්‍රව්‍ය අවසන් වන විට නැවත අලුත් නළයක්/පේලිය පෙරමෝනයක් එල්ලන්න.
- පෙරමෝන උගුල් යෙදීමෙන් වඩා සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගත හැකි වන්නේ, එම උගුල් විශාල ප්‍රදේශයක (ගම් මට්ටමින්) එකවර යෙදීමෙනි.
- පෙරමෝන උගුල රතු කුරුමිණි උවදුරට ලක් වූ ඉඩමට යාබද පරිණාත වගාවක හෝ ක්ෂේත්‍රයේ කෙළවරේ සවි කළ යුතුය.

New bullet



පොල් වගාවක සවිකරන ලද පෙරමෝන උගුලක්

2. පොල් මයිටාවා (*Aceria guerreronis* Keifer)

පළිබෝධකයා හඳුනා ගැනීම

- පියවි ඇසට නොපෙනේ (අන්වීක්ෂීයයි).
- පොල් ගෙඩියේ තැරිය යට පීවත් වෙමින් පොත්තේ මෘදු පටකවලින් යුෂ උරා බොයි.
- සෑම වයසකම ගෙඩි මයිටා හානියට ලක් වේ.
- මාස 3-7 අතර කුඩා ගෙඩිවල වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් මයිටාවන් පීවත් වේ.
- සුළඟ, සතුන්, කෘමීන්, මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් මගින් ඉතා සිඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වේ.



පොල් මයිටාවා (අන්වීක්ෂීය දර්ශනය)

මයිටා හානියේ ලක්ෂණ

- පළමුව තැරියට පහළින් කුඩා කහ - සුදු පැහැති ත්‍රිකෝණාකාර ලපයක් ඇති වේ.
- දිගින් දිගට යුෂ උරා බීම නිසා ගෙඩියේ වර්ධනයත් සමඟ මෙම ලපය ක්‍රමයෙන් විශාල වී දුඹුරු පැහැය වේ.
- ගෙඩියේ මතුපිට ඉරිතැලි වියළි යාම නිසා ගෙඩියේ වර්ධනයට බාධා වී ගෙඩිය කුඩා වීම, විකෘති වීම හා පැලි යාම දැකිය හැක.
- හානි රහිත වෙනත් මයිටා වර්ග 2ක් හඳුනාගෙන ඇත. (ඩොලිකෝ හා කොලිමරස් මයිටා)
 1. ගෙඩිය වටා දුඹුරු පැහැය පළල් වලයක් දක්නට ලැබීම - *Dolichotetranychus* mite
 2. ගෙඩියේ දික් අතට වැඩුණු දුඹුරු පැහැති හතරැස්, සිහින් පටියක් වැනි පැල්ලම් පෙත්තූම් කිරීම - **Colomerus mite**



පළිබෝධකයන් විසින් හානි කරන ලද පරිණාත පොල්

Should be
Colomerus mite



පොල් මයිටා හානියේ ලක්ෂණ වල විවිධ අවස්ථා

මර්දන ක්‍රම

මුළුමනින්ම ක්ෂේත්‍රයෙන් තුරන් කිරීම අපහසුය.

- නමුත්, පහත සඳහන් පාලන ක්‍රම අනුගමනය කිරීමෙන් හානිය අවම කර ගත හැකිය.

i. රසායනික මර්දනය

- පාම් හෝ එළවළු තෙල් ගෙන්දුගම් මිශ්‍රණය ඉසීම
මිශ්‍රණය එක් ලීටරයක් සඳීමට, පහත අනුපාත වලින් අමුද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර කරන්න.
 - පාම්/එළවළු තෙල් මි.ලී. 200 (අඩු කෝප්ප 1)
 - චතුර මි.ලී. 800 (අඩු කෝප්ප 4)
 - සබන් කුඩු ග්‍රෑම් 12 (පුරවන ලද මේස හැඳි 2)
 - ගෙන්දුගම් කුඩු ග්‍රෑම් 5 (පුරවන ලද මේස හැඳි 1)
- පළමුව චතුරට සබන් කුඩු සහ ගෙන්දුගම් දියකර ඉන්පසු එම මිශ්‍රණයට පාම්/එළවළු තෙල් එක්කර හොඳින් කලවම් කරන්න.
- මෙම මිශ්‍රණය නැප්සැක් දියර ඉසිනයකට දිග ප්ලාස්ටික් බටයක් සවි කිරීමෙන් මීටර 12 ක් පමණ උස ගසකට වුවද දියර ටැංකිය බිම තබා ඉසිය හැකි වේ. එසේ නොමැති නම් බලවේග දියර ඉසිනයක් ද භාවිතා කළ හැක. එමගින් 90% කට වැඩියෙන් මයිටාවන් විනාශ කළ හැක.
- මයිටා ආසාදිත ගසේ කරට්ටේ සියලුම වලු හොඳින් තෙමෙන සේ මිශ්‍රණය යෙදිය යුතුය.
- එක් ගසකට මිශ්‍රණය ලීටර් 01 ක් පමණ සෑහේ.
- මෙම මිශ්‍රණය වසරකට දෙවරක්, විශේෂයෙන් පෙබරවාරි සහ ජූලි - අගෝස්තු කාල වලදී ඉසීම නිර්දේශ කෙරේ.
- මෙය ඉසීමෙන් පසු හානියට පත් ගෙඩිවල පැල්ලම් තැරයෙන් වෙන්වී හානිය නවතින අතර, අලුතින් වර්ධනය වන බැට්ටා වල හානිය අවම වේ.
- මෙම මිශ්‍රණය මගින් ඇසේරියා මයිටාවන් විනාශ වුවද, විලෝපික මයිටාවන්ට හානියක් නොවේ.



පොල් මයිටා හානිය පවතින පොල් වලට නැප්සැක් ඉසිනයක් මගින් පාම්/එළවළු තෙල් සහ ගෙන්දුගම් මිශ්‍රණය ඉසීම

ii. පෙළුම් විද්‍යාත්මක මර්දනය

- පොල් මයිටා පාලනයට විලෝපික මයිටාවෙකු (*Neoseiulus baraki*) ශ්‍රී ලංකා පොල් පර්යේෂණ ආයතනය විසින් නිර්දේශ කර ඇත.
- විලෝපික මයිටාවා දේශීයව සොයා ගන්නා ලද මයිටාවෙකි.
- පොල් මයිටාවා 100% ක්ම මර්දනය කළ නොහැකි වුවත්, අස්වනු හානිය සැලකිය යුතු මට්ටමකින් අඩු කළ හැක.
- විලෝපික මයිටාවා එක් ආසාදිත ගසකට 5000 ක් බැගින් තම වගාවේ අසාදිත ගස් වලින් 1/4 ප්‍රමාණයකට වසරකට තුන්වරක් එම පැකට් යෙදූ ගස් වලටම නිදහස් කිරීම කළ යුතුය.
- මෙය අවුරුදු 2 ක්වත් අඛණ්ඩවම කළ යුතුය.
- වගාකරුවන්ට අවශ්‍ය විලෝපික මයිටාවන් නිකුත් කිරීම පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලය මගින් සිදු කෙරේ.
- විලෝපික මයිටාවන් පොලිප්‍රොපිලින්වලින් සෑදූ කුඩා පැකට්ටු ආකාරයෙන් මිලදී ගත හැකිය.
- ඒවායේ විලෝපික මයිටාවන් අඩංගු වන අතර ඒවා තුළ ඔවුන් සඳහා ආහාර ප්‍රභවයක් සහ පැකට්ටුව ඇතුළත ඉහළ සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා තෙතමනය සහිත කඩදාසි අඩංගු වේ.
- මෙම මයිටාවන් ක්ෂේත්‍රයට මුද්‍රා හැරීමේ දී, කඩදාසියට ප්‍රතිවිරුද්ධ කෙළවර කපා, නොමේරූ බැට්ටා ඉති අතර පැකට්ටුව ප්‍රවේශමෙන් රඳවන්න.
- දින 2 කට පමණ පසු, සියලුම විලෝපික මයිටාවන් පැකට්ටුවෙන් ඉවත් වී ගෙඩි වල තැරය යට ස්ථානගත වනු ඇත.




නොමේරූ පොල් ඉති මත ලියක් භාවිතයෙන් විලෝපික මයිටාවන් සහිත පැකට්ටුවක් තැබීම.

3. කළු කුරුමිණියා (*Oryctes rhinoceros* Linnaeus)

- කළු කුරුමිණි හානිය දිවයිනේ සෑම ප්‍රදේශයකම පාහේ දක්නට ලැබේ.
- පොල් වගාවේ සියලුම අවධීන් කළු කුරුමිණි හානියට ගොදුරු වේ.
- හානිය හේතුවෙන් පැළ වගාවේ වර්ධනය බාලවන අතර, හානිය දරුණු වූ විට පැළ මිය යා හැක.
- වැඩුණු කුරුමිණියා මගින් හානිය සිදු වේ.

පළිබෝධකයාගේ ජීවන චක්‍රය

කළු කුරුමිණියාගේ ජීවන චක්‍රය අදියර හතරකින් සමන්විත වේ: බිත්තර, කීටයන්, පිළවුන් සහ සුහුඹුලන්. සුහුඹුල් ගැහැණු සතා දිරාපත් වන කාබනික ද්‍රව්‍ය මත බිත්තර දමයි. මෙම බිත්තර ගෝලාකාර හැඩයෙන් සහ සුදු පැහැයෙන් යුක්ත වේ. බිත්තර වලින් එළියට එන කීටයන් ක්‍රීම් සුදු පැහැයෙන් යුක්ත වන අතර ලාක්ෂණික I හැඩයක් ඇත. ඔවුන් දිරාපත් වන කාබනික ද්‍රව්‍ය මත පෝෂණය වේ. අවස්ථා කිහිපයකට පසු, කීටයන් පිළවුන් බවට පත් වන අතර පසුව සුහුඹුලන් බවට පත්වේ. සුහුඹුලන් කළු පැහැයෙන් යුක්ත වන අතර කුරුමිණියාගේ හිසෙහි ඉදිරිපස කෙළවරේ අගක් වැනි ව්‍යුහයක් ඇත.



කළු කුරුමිණියා බෝවන ස්ථාන

දිරායමින් පවතින පොල් කඳුන් සහ කපන ලද පොල් ගස්වල පාදස්ථ කොටස්, ගොම, කොහුබන්, පිදුරු, පොල් පරාල සකසන ස්ථානවල ඉවත්වී යන කොටස් සහ කාබනික පොහොර මත

හානිය හඳුනා ගැනීම

- මෙම කුරුමිණියා පොල් ගස්වල ගොබයේ පාමුලින් හා කුඩා පොල් පැළවල ගොබය පාමුල පොළව මට්ටමට කිරීටුවෙන් හාරා ගොබයේ ළපටි කොටස් ආහාරයට ගනී.
- ගොබය පාමුල හෝ කුරුමිණි ඇතුළු වූ සිදුරු වටා ඉවතට දමා ඇති කෙඳිමය හප නිසා අලුත් හානිය පහසුවෙන් හඳුනාගත හැක.
- මේ හේතුවෙන් දිග නොඇරුණු පොල් කොළ හා එම පිතිවලට හානි සිදුවේ.
- මෙම අතු දිග හැරුණු විට 'V' හැඩැති රටාවකට කතුරකින් කැපූ ආකාරයට පෙනේ.
- පොල් පිත්තකට හානි සිදු වූ විට ගොක් අත්ත කඩා වැටේ.
- කුඩා පැළවල විකෘති අතු ඇතිවිය හැකි අතර, වැඩෙන අංකුරයට හානි සිදුවුවහොත් පැළ මිය යයි.



කළු කුරුමිණි හානියට ලක් වූ පොල් පැලයක්



කළු කුරුමිණි හානියේ ලක්ෂණ

මර්දන ක්‍රම

- කළු කුරුමිණි මර්දනය සඳහා ඒකාබද්ධ පළිබෝධ මර්දන පිළිවෙතක් අනුගමනය කළ යුතුය.

i. ශෂ්‍ය විද්‍යාත්මක ක්‍රම

- කම්බි කණු හෝ වෙනත් භාවිතයන් සඳහා පොල් කොටන් යොදා ගන්නේ නම්, ඒවාහි කළු තෙල් ආලේප කරන්න.
- වගාවේ කපා ඉවත් කරන ලද පොල් කොටන් හා ගස්වල පාදස්ථ කොටස් හැකි තාක් දුරට කපා ඉවත්කර පුළුස්සා දමන්න.
- කොහුබත්, ලී ඉරා ඉවත් කරන ලී කුඩු ගොඩවල් ඉවත් කරන්න. මේවා අනවශ්‍ය නම් විනාශ කිරීම හෝ අවශ්‍ය නම් තුනිකර දැමීම (සෙ. මි. 5 කට අඩු තට්ටුවකට) සිදු කරන්න.
- මාස 6ට වැඩි කාලයක් වගාවේ ගොම ගොඩ ගසා නොතබන්න.
- කාබනික ද්‍රව්‍ය පොහොර ලෙස යොදා ගන්නා විට පස සමඟ හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න.
- පැළ වටා වසුන් ලෙස කොහුබත් යොදා ගන්නා විට එය ඉතා තුනි තට්ටුවකට පමණක් සීමා කරන්න.
- වසුන් ලෙස පොල් අතු යොදා ගන්නා අවස්ථා වලදී, එම අතු දිරායන විට එම ස්ථානවල කළු කුරුමිණි කීටයන් බෝවී ඇති දැයි පරීක්ෂා කරන්න. එවිට එම අතු කැබලි විනාශ කිරීම හෝ පසට යට කර තැබීම කළ යුතුය.
- සැමවිටම වගාවේ තෙතමන සංරක්ෂණය සඳහා යොදා ගන්නා පොල් ලෙලි හෝ කොහුබත් වළවල් මතුපිට සෙ.මි. 15 ට වැඩි පස් තට්ටුවක් නඩත්තු කරන්න.
- පොලි බෑග් පැළ සිටුවීමේදී උරය සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් නොකර පැළයේ පාදස්ථ කොටස් වැසෙන පරිදි බඳින්න. වාතාශ්‍රය ලැබීම සඳහා එහි සිදුරු කිහිපයක් ඇති කිරීම සුදුසුය.

ii. යාන්ත්‍රික ක්‍රම

කම්බියක් මගින් ඉවත් කිරීම (කුරුමිණි කටුව)

- ඊතලයක් ලෙසට අග සකස් කර ගත් කම්බියක් කළු කුරුමිණි ඇතුළු වූ සිදුර තුළට ඇතුළු කර කුරුමිණියාට ඇත පිටතට ගත හැක.
- ඉන්පසුව මෙම සිදුර වටා දියතාර හෝ දැවි තෙල් ආලේප කරන්න.



කුරුමිණි කටුව මගින්
කුරුමිණියන් ඉවත් කිරීම

මාළු දැල් භාවිතා කිරීම

සෙ. මී 30 - 90 ක් පමණ දිග, කුඩා සිදුරු සහිත මාළු දැල් කැබැල්ලක් පැළයේ ගොඩයට කළු කුරුමිණියන් ඇතුළු වන ප්‍රදේශය ආවරණය වන පරිදි ඔතන්න. මාස 2 කට පමණ වරක් පැළයේ වර්ධනයත් සමඟ දැල් කැබැල්ල නැවත උඩට සකස් කරන්න. මෙය කුරුමිණියන්ගෙන් ගස ආරක්ෂා වන යාන්ත්‍රික බාධකයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. පිති අතරටද දැල් කැබැල්ලක් තිර කරන්න. පැළයේ වයස අවුරුදු 3-4 දක්වා සාර්ථකව භාවිතා කළ හැක.



කළු කුරුමිණියා ගොඩයට ඇතුළුවීම වැළැක්වීම සඳහා මාළු දැල් කැබැල්ලක් භාවිතයෙන් ගොඩය ප්‍රදේශය ඔතා තැබීම.

iii. රසායනික මර්දන ක්‍රම

- සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් ද්‍රව්‍ය මසකට වරක් යෙදීම වැදගත්ය.
 - ✓ ගොඩය වටා ඇති පොල් පිතිවල දියතාර හෝ දැවුණු එන්පීන් තෙල් ආලේප කරන්න.
 - ✓ පොල් පැළ වල ගොඩය වටා ඇති කුඩා පිති මදක් දුරස් කොට ඒ තුළට කපුරු බෝල 2 බැගින් වන සේ පැළයකට/ගසකට කපුරු බෝල 6 ක් දැමීම.

පෙරමෝන උගුල භාවිතය

- අක්කර පහක භූමි ප්‍රමාණයක් සඳහා එක පෙරමෝන උගුලක් ප්‍රමාණවත් වේ.
- සුහුඹුල් කුරුමිණින් ආකර්ෂණය කරන පෙරමෝනයකි. (Aggregation Pheromone)
- පළිබෝධ හානිය ඉතා අධික ප්‍රදේශ වලට වඩාත් උචිතයි.

පෙරමෝන උගුල සකසන ආකාරය:

- මේ සඳහා උස මීටර 1.8 - 2.0 ක්, සෙ. මී. 10 - 12.5 ක් වන PVC බටයක් (Down pipe) අවශ්‍ය වේ.
- එහි රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි එකිනෙක විරුද්ධ අතට කවුළු දෙකක් සකසා ගත යුතුය. (කුරුමිණි ඇතුළු වීම සඳහා)
- මෙම බටයේ එක් කවුළුවකට සෙ. මී. 1.5 ක් ඉහළින් සිදුරක් විදින්න. (පෙරමෝනය එල්ලීම සඳහා)
- බටයේ පහළ කෙළවරේ සිදුරු 4 ක් දෙපසට විදින්න. (වැසි ජලය බැස යාමට)
- සිදුරු විදූ ගත් පහළ කෙළවරේ සිදුරු හොඳින් වැසෙන පියනක් (End Cap) හෝ කිරි හට්ටියක්/ ජ්‍යෙෂ්ඨ පෝගුවක් සවි කරන්න.
- මෙම බටයට කොහුවත් (කිලෝ ග්‍රෑම් 2 - කිලෝ ග්‍රෑම් 3) පුරවන්න. (අසුවන කුරුමිණියන්ට සිටීමට මාධ්‍යක් ලෙස)

පෙරමෝන උගුල ක්ෂේත්‍රයේ යොදන ආකාරය:

- ඉහත උගුල ක්ෂේත්‍රයේ කුකුළුකු හෝ ග්ලිරිසිඩියා කෝටු ආධාරයෙන් සිටුවීම කළ හැක. නැතිනම් වැඩුණු ගසක කඳට තබා ගැට ගැසීම සිදු කළ හැක.
- ඉඩමේ හානිය පවතින කොටසට යාබදව ඇති වැඩුණු වගාවක නැතහොත් ක්ෂේත්‍රයේ මායිමක පෙරමෝන උගුල සවි කළ යුතුය.



ක්ෂේත්‍රයේ සවිකරන ලද පෙරමෝන උගුලක්

පෙරමෝන උගුල නඩත්තු කරන අයුරු:

- පෙරමෝන යෙදීමෙන් දින 7 - 10 ක් යන විට කුරුමිණියන් බටයට එකතු වේ. එලෙස එකතුවන සතුන් සති 10 ක් ඇතුළත දී පියන ගලවා ඉවත් කර ගත යුතුය.
- ඉවත් කරන ලද කොහුවෙන් නැවත බටයට පුරවන්න.
- ඉවත් කරන කුරුමිණියන් නැවත ක්ෂේත්‍රයට නිදහස් නොකර විනාශ කරන්න.
- සාමාන්‍යයෙන් පෙරමෝනය මාස 2 - 3 ක් පමණ ක්ෂේත්‍රයේ පවතී. (නමුත් දේශගුණික තත්ත්ව මත මෙම කාලසීමාව වෙනස් විය හැක). පළිබෝධ හානිය තව දුරටත් පවතී නම් නැවත පෙරමෝන ක්ෂේත්‍රයේ යෙදිය යුතුය.

4. පොල් කොළ නාශක දළඹුවා (*Opisina arenosella* Walker)

- මැයි - ඔක්තෝබර් කාලයේදී වසංගත තත්ත්වයක් පෙන්වුම කළ හැක.
- හානිකර අවධිය දළඹුවන් වේ.




Adjust the image. Content is too closer to the image.

පොල් කොළ නාශක දළඹුවාගේ කීට අවධිය සහ ඔවුන්ගේ කැදලි

පළිබෝධකයාගේ ජීවන චක්‍රය

පොල් කොළ නාශක දළඹුවාගේ ජීවන චක්‍රය අදියර 4 කින් සමන්විත වේ. එනම්, බිත්තර, කීටයන්, පිළවුන් සහ සුහුඹුලන්. ගැහැණු සලඹයා ගසේ පහත මාරයේ පොල් අතු වල යට පැත්තේ බිත්තර දමයි. බිත්තර වලින් එළියට එන දළඹුවන් හානිය ඇති කරයි. කීටයන් පැටවුන් බිහි වූ විට රෝස පැහැයට හුරු වන අතර ක්‍රමයෙන් වර්ධනයත් සමඟ කොළ පැහැති දුඹුරු පැහැයට හැරේ. නිස දුඹුරු පැහැති කළු පැහැයෙන් යුක්ත වන අතර පෘෂ්ඨය මතුපිට තද දුඹුරු පැහැති දිගු ඉරි ඇත. ඔවුන් කැදලි සාදා, ඒ ඇතුළත ජීවත් වේ. පසුව කීටයන් පිළා කෝෂයකින් ආවරණය වූ පිළවුන් බවට වර්ධනය වේ. පිළවුන්ගෙන් මතුවන සුහුඹුලා දුඹුරු පැහැති සලබයෙකි.



හානියේ ලක්ෂණ

- දළඹුවන් පොල් කොළවල යට පැත්තේ කොළ පාට පටක කොටස් ආහාරයට ගනී.
- එම ස්ථාන පළමුව ආ කොළ පැහැති වී පසුව දුඹුරු පැහැ වේ.
- තැනින් තැන වියළී ගිය පැල්ලම් වලින් උවදුර හඳුනා ගත හැක.
- මෙම උවදුර පොල් ගසේ පහත මාලයේ අතු වලින් පළමුව ආරම්භ වේ. උවදුරට ලක්වූ අත්තක, පොල් කොළවල යට පැත්තේ කුඩා පත්‍ර කැබලි වලින් හා අපද්‍රව්‍ය වලින් දළඹුවා සාදා ගත් කැඳලි දැකිය හැක.
- මෙම කැඳලි ඉවත් කළ විට ජීවී දළඹුවන් හෝ පිලා කෝෂ දැකිය හැක.
- උවදුර දරුණු අවස්ථාවක, ගසේ ගොඩය හා ඊට යාබද අතු 4 - 5 හැර ඉතිරි සියලුම අතු දුඹුරු පැහැ වී වියළී යයි.

මර්දන ක්‍රම

- දළඹු සංඛ්‍යාව අඩු මට්ටමක පවති නම්, ක්ෂේත්‍රයේ සිටින ස්වභාවික සතුරන් (පරපෝෂිත කෘමීන්) මගින් උවදුර ස්වභාවිකව පාලනය වේ.

i. යාන්ත්‍රික ක්‍රම

- සුළු ගස් සංඛ්‍යාවක (ගස් 30ක පමණ) උවදුර ඇරඹෙන විට එක ගසක අතු පහකට වැඩි නොවන සේ උවදුර සහිත අතු හෝ අතු වල අගිසි කොටස් පමණක් කපා පුළුස්සා දැමීම.

ii. ජීව විද්‍යාත්මක ක්‍රම

ක්ෂේත්‍රයේ පරපෝෂිත ගහණය ප්‍රමාණවත් නොවේ නම් පරපෝෂිතයන් මුදා හරින්න. මේ සඳහා, වගාකරුවන්ට තම ප්‍රදේශවල පොල් සංවර්ධන නිලධාරී හරහා උපදෙස් දෙනු ලැබේ. ඔවුන් පැමිණ ආසාදිත ඉඩම් පරීක්ෂා කර පළිබෝධකයන්ගේ සහ පරපෝෂිතයන්ගේ ගහනය ගණනය කරනු ඇත. මෙම දත්ත පොල් පර්යේෂණ ආයතනයට යොමු කරනු ලබන අතර, ආසාදනයේ මට්ටම, පළිබෝධකයාගේ ජීවන අවධිය සහ පරපෝෂිතයන්ගේ පැවැත්ම/නොපැවතීම මත පදනම්ව, පොල් පර්යේෂණ ආයතනය පරපෝෂිතයා මුදා හැරීම ආරම්භ කරනු ඇත. පරපෝෂිතයන් සාමාන්‍ය තැපැලෙන් වගාකරුවන්ට යවනු ලැබේ, නැතහොත් වගාකරුවන්ට පූර්ව හමුවීමක් සමඟ වගා සංරක්ෂණ අංශයෙන් පැමිණ ඒවා එකතු කර ගත හැකිය. පරපෝෂිතයන්ට පමණක් පාලනය කළ නොහැකි තරමට ගහනය ඉහළ නම්, පළමුව පළිබෝධනාශක යොදනු ලබන අතර, පසුව පරපෝෂිතයන් මුදා හරිනු ලැබේ. කෙසේ වෙතත්, ආසාදිත ගස්වල පළිබෝධ සහ පරපෝෂිත ගහනය අධ්‍යයනය කිරීමෙන් පසුව පමණක් පොල් පර්යේෂණ ආයතනය විසින් මෙම නිර්දේශය ලබා දෙනු ඇත.

iii. රසායනික මර්දන ක්‍රම

- පැළ ගස් සඳහා කාබොසල්ෆාන් 200 g/L අඩංගු (උදා- මාෂල් 20 එස්.සී.) කෘමිනාශකයක් මිලි ලීටර් 4 ක් ජලය ලීටර් 1 ක අනුපාතයට දියකර හානියට පත් අතු හොඳින් තෙමෙන සේ ඉසීම.
- වසංගත තත්ත්වයක දී මොනොක්‍රොටොපොස් 600 g/L එස්.එල්. එන්නත් කිරීම සලකා බැලේ (ගසකට මිලි ලීටර් 8 ක්).




පොල් කොළ නාශක දළඹුවාගේ හානිය

5. ප්ලෙසිස්පා කුරුමිණියා (*Plesispa reichei* Chapuis) (Coconut Hispid)

- තවාන් වල හා අලුතෙන් ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවන ලද පොල් පැළ වලට හානි කරයි.
- කීට සහ සුහුඹුල් යන අවස්ථා දෙකම මගින් හානි සිදු කරයි.

පළිබෝධකයාගේ ජීවන චක්‍රය

ප්ලෙසිස්පා කුරුමිණියාගේ ජීවන චක්‍රය අඳියර 4 කින් සමන්විත වේ. එනම්, බිත්තර, කීටයන්, පිළවුන් සහ සුහුඹුලන්ය. සුහුඹුල් ගැහැණු සහා ගොබය ප්‍රදේශයේ සහ දිග හැරුණු පත්‍ර මත බිත්තර දමයි. කීටයන් බිත්තර වලින් එළියට පැමිණ, පත්‍ර පටක සුරා කමින් විවිධ අවධීන් කිහිපයක් හරහා වර්ධනය වේ. අවසාන අවධියේ කීටයන් පිළවුන් බවට පත් වී පසුව සුහුඹුලන් බවට වර්ධනය වේ. සුහුඹුලන්ට දුඹුරු පැහැති උරසක් සහ කළු පැහැති පියාපත් ඇත.



හානියේ ලක්ෂණ

- ගොබය ප්‍රදේශයේ ජීවත් වන සුහුඹුලා සහ කීටයා පත්‍ර පටක සුරා කා දමයි.
- හානි කරන ලද ප්‍රදේශ දුඹුරු පැහැ වී වියළී යයි.
- හානිය නිසා පැළ වල වර්ධනය බාල වීම හා හානිය දරුණු අවස්ථාවේ දී පැළ මිය යෑම සිදු වේ.
- හානි වූ පත්‍ර දරුණු සුළඟකදී ඉරි යා හැකිය.

මර්දන ක්‍රම

- කාබොසල්ෆාන් 200 g/L අඩංගු කෘමිනාශකයක් (උදා-මාෂල් 20 එස්.සී.) මිලි ලීටර් 3 - 4 ක් ජලය ලීටර් 1 ක දියකර ගොබය ප්‍රදේශය හොඳින් තෙමෙන සේ ඉසීම.
- නැවතත් කෘමි උවදුර දක්නට ලැබුනහොත්, නිර්දේශයට අනුව සති 2 කට පසු නැවත වරක් කෘමිනාශක ඉසීම.


6. සුදු මැස්සා

- ශ්‍රී ලංකාවේ පොල් ආශ්‍රිත සුදු මැස්සන් විශේෂ පහක් හඳුනාගෙන ඇත. මෙම සුදු මැස්සන් විශේෂ *Aleurodicus rugioperculatus*, *Paraleyrodes minei*, *Aleurotrachelus atratus*, *Aleurodicus disperses* සහ *Paraleyrodes bondari* වේ. විවිධ වයස් කාණ්ඩවල පොල් සහ තැඹිලි ගස්වල සුදු මැස්සන්ගේ හානිය නිරීක්ෂණය වී ඇත. පොල් සහ තැඹිලි ගස් වලට අමතරව, කෙසෙල්, මිරිස්, පැපොල්, පේරා, කළුගම්මිරිස්, පිපිඤ්ඤා, කරපිංචා, අඹ, කොට්ටම්බා සහ කොස් වැනි තවත් බොහෝ බෝග ද මෙම පළිබෝධකයන්ගේ හානියට ලක් විය හැක.



සුදු මැස්සන් සහ පොල් කොළ වල යටි පැත්තේ සුදු පැහැති පුළුන් වැනි ස්වභාවයෙන් යුත් කැඳුලි

සුදු මැස්සාගේ ජීවන චක්‍රය



පොල් ගස්වල සුදු මැස්සන් විශේෂ පහක් සිටියද, ඒ සියල්ලන්ටම ජීවන චක්‍රයේ එකම අවධීන් ඇත; බිත්තර, ගිණුවන් සහ ව්‍යාප්ත පිළා අවධිය (නොමේරූ අවධීන්) සහ සුනුබුලන්. බිත්තර දැමීමේ රටාව, බිත්තරවල වර්ණය, හැඩය සහ බිත්තරවල ප්‍රමාණය විශේෂය අනුව වෙනස් වේ. මොවුන්ගේ ව්‍යාප්ත පිළා අවස්ථාව සුදු මැස්සන් විශේෂ හඳුනා ගැනීමට යොදා ගනී. බිත්තර වලින් මතුවන ගිණුවන් විනිවිද පෙනෙන අතර ඔවුන්ට චලනය වීමේ හැකියාව ඇත. පියාපත් මත වර්ණක ප්‍රමාණය, හැඩය සහ රටාව විශේෂ අතර වෙනස් වේ.

සුදු මැස්සාගේ හානියට පත් පොල් හෝ තැඹිලි ගස් වල පොල් පත්‍රිකා වල යටි පැත්තේ සුදු පැහැති පුළුන් වැනි ස්වභාවයක් දක්නට ලැබේ. පත්‍ර හොඳින් පරීක්ෂා කිරීමේ දී සුදු මැස්සන්ගේ සුහුඹුලන් සහ ශිෂුවන් දැකගත හැකිය.



ප්‍රභාසංස්ලේෂණය අඩු කරන / අවහිර කරන කළු පැහැති දිලීර වර්ධනය

සුදු මැස්සන්ගේ පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලියන්ගේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස උකු පැණි වැනි ස්‍රාවයක් නිකුත් කරයි. මෙම බිංදු සුදු මැස්සන් පීචන් වන පොල් හෝ තැඹිලි ගස්වල පත්‍රිකා වලට පහළින් ඇති පත්‍ර වලයේ වූ පත්‍රිකා මතුපිට තැන්පත් වීමෙන් පසු ඒ මත කළු පැහැති දිලීරයක් වර්ධනය වේ. මෙම පැණි වැනි ස්‍රාවය පොල් හෝ තැඹිලි ගස් යට ඇති වෙනත් ශාක මතද තැන්පත් වීමෙන් එම ශාක මතද මේ ආකාරයට කළු පැහැති දිලීරය වර්ධනය විය හැක. සුදු මැස්සන් ගහනය අධික අවස්ථාවන්හිදී පොල් පිති මත මෙන්ම පොල් ගෙඩි මතද සුදු මැස්සාගේ ගනාවාස දැකගත හැක.

මර්දන ක්‍රම


- සුදු මැස්සා මර්දනය කිරීම සඳහා පොල් පර්යේෂණ ආයතනය විසින් පහත සඳහන් කෘෂිභාගක අන්තර් නිර්දේශ වශයෙන් නිකුත් කර ඇත.
- පහත රසායනික නිර්දේශයන් අලුතින් සුදු මැස්සා පැතිරී යන ප්‍රදේශ වලට හා නවතන් වලට නිර්දේශ කෙරේ.
 - තයෝමෙතොක්සාම් 25 ඩබ්.පී. ග්‍රෑම් 03 ක් ජලය ලීටර් 10 ක දියකර ඉසීම.
 - කාබොසල්ෆාන් 200 g/L එස්.සී. මි.ලී. 20 ක් ජලය ලීටර් 10 ක දියකර ඉසීම.
 - ක්ලෝරන්ට්‍රිනිලිප්‍රෝල් 20% + තයෝමෙතොක්සාම් 20% ඩබ්.පී. ග්‍රෑම් 2.5 ක් ජලය ලීටර් 10 ක දියකර ඉසීම.
- මීට අමතරව දිවයිනේ ඕනෑම පොල් වගා කරන ප්‍රදේශයකට පහත මිශ්‍රණය සුදු මැස්සා මර්දනයට නිර්දේශ කර ඇත.
 - ජලය ලීටරයකට කොහොඹ තෙල් මිලි ලීටර් 10 ක්, සබන් කුඩු ග්‍රෑම් 5 ක් මිශ්‍ර කර සුදු මැස්සන් සහිත පත්‍රවල යටි පැත්ත හොඳින් තෙමෙන සේ ඉසින්න. සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට නම් මෙම මිශ්‍රණය සති 2 කට වරක් අවම වශයෙන් මාස 2 ක්වත් ඉසීම සිදු කළ යුතුය. තම ප්‍රදේශයේ පොල් සංවර්ධන නිලධාරී ඇමතිම මගින් වගාකරුවන්ට රසායනික ද්‍රව්‍ය ඉසීම සඳහා බල ඉසින යන්ත්‍ර සඳහා සහාය ලබා ගැනීම හැකියාව ඇත.
- ක්ෂේත්‍රයේ සිටින පරපෝෂිතයන් සහ විලෝපිකයන් මගින් මෙම හානිය ස්වාභාවිකව පාලනය වේ. අධික වර්ෂාවකට පසු හානිය අඩු වේ. තවද, පොල් වතු වලට ගින්නෙන් හානි නොවන පරිදි ඒවායෙහි ඇති කසළ පුළුස්සා දමී ගොඩවල් ගැසීම මගින් සුදු මැස්සාගේ හානිය අවම කර ගත හැකිය. මීට අමතරව, කහ පැහැති පොලිතින් කොළයකට ග්‍රීස් ආලේප කර පොල් හෝ තැඹිලි කඳ වටා එතිමෙන් සුදු මැස්සාගේ වැඩුණු සතුන් යම්තාක් දුරකට මර්දනය කරගත හැක.

7. බ්‍රොන්ටිස්පා කුරුමිණියා (*Brontispa longissima* Gestro)

- පොල් වගාවේ අලුතින් හඳුනා ගත් ආක්‍රමණශීලී පළිබෝධකයෙකි.
- දකුණු පළාතේ ගාල්ල, මාතර සහ හම්බන්තොට යන දිස්ත්‍රික්ක 3 න්ම මෙම උවදුර වාර්තා වේ.
- වසංගත තත්ත්වයක දී පොල් වගාවට අධික හානියක් සිදු වේ.



බොන්ටිස්සා කුරුමිණියාගේ ජීවන චක්‍රය



බොන්ටිස්සා කුරුමිණියාගේ ජීවන චක්‍රය අදියර 4 කින් සමන්විත වේ: බිත්තර, කිටයන්, පිළවුන් සහ සුහුඹුලන්. සුහුඹුල් ගැහැණු සතා ගොඩය ප්‍රදේශයේ, පොල් ගසේ ගොඩයේ විවෘත නොවූ පත්‍ර මත රතු-දුඹුරු බිත්තර දමයි. ලා කහ පැහැති කිටයන් බිත්තර වලින් එළියට පැමිණ, නොමේරූ පටක ආහාරයට ගනිමින් පත්‍ර වලට හානි කරමින් අවධීන් කිහිපයක් හරහා වර්ධනය වේ. අවසාන කිට අවධිය තද කහ පැහැති පිළවුන් බවට පත් වී පසුව සුහුඹුලන් බවට වර්ධනය වේ. සුහුඹුලන්ට කළු පැහැති නිසක් සහ පියාපත්ද, තැඹිලි පැහැති ලාක්ෂණික චතුරස්‍රාකාර හැඩයක් ඇත. ඔවුන් ද ගොඩය ප්‍රදේශය ආහාරයට ගනිමින් ජීවත් වෙති.

බොන්ටිස්සා කුරුමිණියා හඳුනා ගැනීම

- කළු පැහැති නිස සහ පියාපත්ද, තැඹිලි පැහැති චතුරස්‍රාකාර උරස හා එහි ලාක්ෂණික චතුරස්‍රාකාර හැඩය මගින්ද මෙම කුරුමිණියා හඳුනාගත හැක.
- මොවුන් පොල් වගාවේ සිටින ප්ලෙසිස්සා කුරුමිණියාට බොහෝ සෙයින් රූප විද්‍යාත්මකව සමාන කමක් පෙන්වයි.
- නමුත්, ප්ලෙසිස්සා කුරුමිණියාට සාපේක්ෂව ඉතා දුරුණු හානියක් පොල් වගාවට මොවුන් මගින් සිදු වේ.
- මෙම ප්ලෙසිස්සා පොල් වගාවේ ඕනෑම අවධියකට හානි සිදු කරන අතර පරිණත පොල් ගස් වලට වැඩි හානියක් සිදු කරයි.
- මෙම කෘමියාගේ සුහුඹුල් හා කිට අවධි පොල් ගසේ ගොඩයේ විවෘත නොවූ පත්‍ර වල නොමේරූ පටක ආහාරයට ගනියි. පත්‍ර දිග හැරුණු පසු පත්‍ර වියළී ගිය ස්වභාවයක් දිස් වේ.
- මේ නිසා ගසේ වර්ධනය අඩාල වී එලදාව අඩු වේ.




මර්දන ක්‍රම

- කඳ බේරී ඇති ගස් සඳහා කඳ විද මොනොක්‍රොපොස් 600 g/L එස්. එල් මිලි ලීටර් 10 ක් එන්නත් කිරීම.
- පරපෝෂිතයන් ක්ෂේත්‍රයට මුදා හැරීම මගින් ජීව විද්‍යාත්මකව පාලනය කළ හැක

පොල් වගාවන්හි අපළුබෝධකයන්

1. කොරපොතු කෘමියා (*Aspidiotus destructor* Signoret)

- විනිවිද පෙනෙන ආවරණයකින් වට වූ මැද කහ පාටින් පෙනෙන මි.මි. 2-3 පමණ වූ කුඩා කෘමියෙකි.
- පොල් වගා කරන සෑම ප්‍රදේශයකම දක්නට ලැබේ.
- අගෝස්තු - පෙබරවාරි කාලයේ දී මෙම හානිය උග්‍ර වේ.



කොරපොතු කෘමීන්

හානියේ ලක්ෂණ

- මෙම කෘමියාගේ ගැහැණු හා නොවැඩුණු පිරිමි අවස්ථා පොල් කොළයේ යටි පැත්තේ කොළයට සවි වී ඉන් යුෂ උරා බොයි.
- පළමුව හානි වූ ස්ථානය කහ පැහැති ලප ලෙස පෙනෙන අතර, කෘමීන්ගේ සංඛ්‍යාව අධික වූ විට සම්පූර්ණ කොළයම කහ පැහැ වේ.
- ක්‍රමයෙන් පොල් ගසේ අතු රාශියක් කහ පැහැ වී විසළී යයි.
- කෘමි ගහනය ඉතා අධික අවස්ථා වලදී පොල් මල් හා ගෙඩිද හානියට ලක් වේ.
- පොල් කොළය යටි පැත්තේ වෙසෙන කොරපොතු කෘමීන් පීචි නම් ඇඟිල්ලෙන් පිරිමදින විට තෙත ගතියක් දැනෙන අතර, අපීචි නම් විසළී කුඩු ස්වභාවයක් දැනේ.

මර්දන ක්‍රම

i. යාන්ත්‍රික ක්‍රම

- පොල් පැළ වල සුළු වශයෙන් හානිය ඇත්නම් පීචි සතුන් අතින් සුරා ඉවත් කිරීම හෝ එම පත්‍ර කොටස් කපා ඉවත් කිරීම.
- වැඩුණු ගස් කිහිපයක යට මාලයේ අතු 4-5 ක පමණක් හානිය ඇත්නම් එම අතු කපා පුළුස්සා දැමීම.

ii. පීචි විද්‍යාත්මක ක්‍රම

- පරිසරයේ ස්වභාවිකව පීචින් වන විලෝපික කුරුමිණි විශේෂ වර්ග 2ක් කොරපොතු කෘමීන් ආහාරයට ගනී.
 1. *Chilocorus nigritus* Fabricius
 2. *Pullus xerampelinus*

iii. රසායනික මර්දන ක්‍රම

පේචි පාලන ක්‍රම මගින් උවදුර පාලනය නොවුනහොත්,

- පොල් පැළ වලට : කාබොසල්ෆාන් 200 g/L එස්.සී. කෘමි නාශකයෙන් මිලි ලීටර් 2-4 වතුර ලීටර් 1 ක මිශ්‍ර කර සාදා ගත් ද්‍රාවණයෙන් පැළ හොඳින් තෙමෙන සේ ඉසීම.



Chilocorus nigritus නම් කුරුමිණි විශේෂය

2. වේයන්

- පොල් වලට හානි කරන වේයන් වර්ග අනුව කරනු ලබන හානිය වෙනස් වේ.

හානියේ ලක්ෂණ

- *Odontotermis* නම් වූ වේයන් විශේෂය තවත් පැළ වලට හා ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවන ලද කුඩා පැළ වලට ප්‍රබලව හානි සිදු කරයි.
- පැළ වල පාදස්ථය තුළින් හෝ කඳෙන් ඇතුළු වී ගොබය විනාශ කරයි.
- හානි වූ පැළ වල ගොබය කහ පැහැ වී මලානික වන අතර ගොබය පහසුවෙන් පිටතට ඇදී එයි.
- මැටි සහිත පසෙහි හානිය අධිකය.
- තවත් වේයන් විශේෂයක් වැඩුණු ගස් වල මුල්වලට හා පාදස්ථයට හානි කරයි.
- පාදස්ථය අසල පිට පොත්ත හානිය නිසා ක්‍රමයෙන් ගැලවී යන අතර, ගස් ඉක්මනින් පරිහානියට පත් වේ.



වේයන්

මර්දන ක්‍රම

- ඉඩමේ ඇති වේ හුඹස් කඩා දමා ඉවත් කිරීම.
- දිරාපත් වන පොල් අතු, අනවශ්‍ය ගෙඩි පුළුස්සා දමා ඉඩම පිරිසිදුව තබා ගැනීම.
- කාබොසල්ෆාන් 200 g/L කෘමි හානිකරයන් මිලි ලීටර් 3-5 ක් ජලය ලීටර් 1 ක මිශ්‍ර කර භාණ්ඩ ඇති තට්ටු වලට හා පැළ වලට යෙදීම.
- බීජ පොල් ගෙඩි සිටුවීමට පෙර, ඉහත මිශ්‍රණයේ විනාඩි 3 ක් ගිල්වා තැබීම.

3. කහ තිත් පළඟැටියා (*Aularches miliaris* Linnaeus)

- තෙත් කලාපයේ කැලෑ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල බහුල පළබෝධකයෙකි.
- වැඩුණු පළඟැටියා විශාල සතෙකි.
- ගැහැණු සතා පස තුළ කරල් වශයෙන් බිත්තර දමයි.



හානියේ ලක්ෂණ

- පළබෝධකයා පොල් පත්‍රිකාවල ඉරටුව ඉතිරි වන සේ කෘ දමයි.
- මෙම සතුන් ඉතා විශාල වශයෙන් බෝ වී සමූහ වශයෙන් ඉතා දරුණු හානියක් සිදු කරයි.

මර්දන ක්‍රම

- බිම සකස් කිරීම මගින් පසේ ඇති බිත්තර විනාශ කිරීම.
- දහවල් කාලයේ වල් ගස් අතර සැඟවී සිටින සතුන් වල් මර්දන ක්‍රම අනුගමනය කිරීමෙන් විනාශ කිරීම.
- නූළු එළියක් මගින් සැඟෑ කාලයේදී සතුන් එක්කාසු කර විනාශ කිරීම.

4. කුසිත දළඹුවා (*Parasa lepida* Cramer)

- කිට අවස්ථාව හෙවත් දළඹුවා මගින් හානිය සිදු කරයි.

හානියේ ලක්ෂණ

- දළඹුවන් පොල් පත්‍රිකාවල ඉරටුව ඉතිරි වන සේ පත්‍ර කොටස් කෘ දමයි.



කුසිත දළඹුවා

මර්දන ක්‍රම

- කිට පරපෝෂිතයන්, පිලා පරපෝෂිතයන් හා විලෝපික කෘමීන් මගින් ස්වභාවිකව මර්දනය වේ.
- හානිය දරුණු නම් රසායනික ද්‍රව්‍ය යෙදිය යුතු වේ.
- පැළ වගාවන් සඳහා කාබොසල්ෆාන් 200 g/L අඩංගු කෘමිනාශකයකින් (උදා-මාෂල් 20 එස්.සී.) මිලි ලීටර් 3-4 ක් ජලය ලීටර් 1 ක දිය කර ඉසීම.
- වැඩුණු ගස් සඳහා මොනොක්‍රොටොසස් 600 g/L එස්.එල් කෘමිනාශකය මිලි ලීටර් 5-10 ක් කඳු විදු එන්නත් කිරීම.

5. එළිමිනියස් දළඹුවා (*Elymnias hypermnestra* Linnaeus)

- දළඹුවා තවත් පැළ වලට හා ක්ෂේත්‍රයේ සිට වූ පොල් පැළ වලට හානි කරයි.

හානියේ ලක්ෂණ

- සමහරයාගේ ගැහැණු සතා පොල් හෝ වෙනත් තාල කුලයේ ශාක පත්‍රිකා මත බිත්තර දමන අතර ඉන් පිටවන දළඹුවන් පොල් පත්‍ර ආහාරයට ගනී.
- පොල් පැළවල පත්‍රිකා කොටස් සම්පූර්ණයෙන්ම කතුරකින් කැපූ ආකාරයට ආහාරයට ගැනීම සිදු කරයි.

මර්දන ක්‍රම

- අතින් එකතු කර විනාශ කිරීම.
- කාබොසල්ෆාන් 200 g/L අඩංගු කෘමිනාශකයකින් (උදා- මාෂල් 20 එස්.සී.) මිලි ලීටර් 3-4 ක් ප්‍රමාණයේ 1ක මිශ්‍ර කර පත්‍ර හොඳින් තෙත් වන සේ ඉසීම.



6. පොල් කොළ හකුළන දළඹුවා (*Telicota palmarum*)

- දළඹුවන් තවත් පැළ වලට හා ක්ෂේත්‍රයේ සිට වූ පැළ වලට හානි කිරීම නිසා වර්ධනය බාල වේ.

හානියේ ලක්ෂණ

- සුහුඹුල් ගැහැණු සතා පොල් හෝ වෙනත් තාල කුලයේ ශාක පත්‍රිකා මත බිත්තර දමයි.
- ඉන් පිටවන දළඹුවන් පත්‍රිකා කොටස් එකට ගෙන රෝල් කර හකුළුවා එය තුළට වී පත්‍රිකා කොටස් ආහාරයට ගනී.

මර්දන ක්‍රම

- අතින් එකතු කර විනාශ කිරීම.

7. කෂීරපායී පළිබෝධකයන්

- ප්‍රධාන වශයෙන් මීයන්, ඌරු මීයන්, ඉත්තෑවන්, වඳුරන්, ඊළවුන්, දඬුලේනුන්, වල් ඌරන් හා වවුලන් පොල් වගාවට හානි කරයි.

මීයා

- පොල් ගස් හා පොල් පැළ වලට හානිකරය.



මීයන්ගේ හානිය

හානියේ ලක්ෂණ

- පොල් පැළ වල පාදස්ථ කොටස හාරා ළපටි පටක කොටස් ආහාරයට ගැනීම නිසා ගොබය මැලවී/ මැරී යයි.
- පැළය කුමන අවස්ථාවක ඇති එකක් වුවද ගොබයට හානි වූ විට මිය යයි.
- මීයන්, එළ දරන ගස් වල ඇති ළපටි ගෙඩි සපා කා ඇතුළු වී මදය කා දමා ගෙඩියේ ඇති වතුර ද පානය කරයි.
- නවසි හා තැඹිලි වැනි වර්ග වලට වැඩිපුර හානි සිදු කරයි.

මර්දන ක්‍රම

- වගාව පිහිටි ඉඩම පිරිසිදුව තබා ගැනීම. (වල් මර්දනය හා ගස්වල කරට් පිරිසිදු කිරීම මගින්)
- වගාවේ මී නාශක සහිත ඇම තැබීම/පොල් ගසේ කරට් මත තබන මී උගුල්/බිම් මට්ටමේ තබන බිම් උගුල් මගින්.
- ගස්වල කඳේ ගේජ් 500 ක හෝ වැඩි ඝනකම සහිත සෙ.මී. 30 ක් පළල පොලිතින් පටියක් බැඳීම.
- සෙ.මී. 30 ක් පළල, ගස වටේ එනීමට තරම් ප්‍රමාණවත් දිගකින් යුතු මතු පිට සිහින් ඇළුමිනියම් / ගැල්වනයිස් තහඩුවක් බිම් මට්ටමේ සිට මීටර් 1 ක් පමණ උඩින් ගසේ කඳෙහි කම්බියකින් බැඳීම.



ගැල්වනයිස් තහඩුවක් ගසේ කඳෙහි බැඳීම

උග්‍ර මියා

- නවත් වල ඇති පොල් පැළ වල හා ක්ෂේත්‍රයේ සිට වූ පොල් පැළ වල කඳ පාමුල කා දමයි.

හානියේ ලක්ෂණ

- ගොඩය මැල වී වියළී යාම.

මර්දන ක්‍රම

- ඉඩම පිරිසිදුව නඩා ගැනීම.
- බිම් උගුල්, බිම් ඇම තැබීම.
- කුඩා පැළ වල, පැළය පාමුල හොඳින් වැසෙන සේ කුකුල් දැල් වලින් හෝ මුදුන් උළු කැට වලින් ආවරණය කිරීම.



උග්‍ර මියාගෙන් සිදුවන හානි වැළැක්වීම සඳහා පොල් පැළ වල පාදස්ථය කොටස කුකුල් දැලකින් ආවරණය කිරීම.

ඉත්තෘවා

- පැළ වගාවල පොල් පැළ හා වැඩුණු පැළ ගස්වල කඳ පාමුල කා දමා පොල් පැළවලට හානි කරයි.

මර්දන ක්‍රම

- එක් එක් පැළය වටේ වැටක් සෑදීම/කැලෑවෙන් ඉඩම වෙන් කෙරෙන මායිම දිගේ වැටක් සෑදීම.
- පැළ පාමුල ආරක්ෂා කිරීමට සෑම පැළයකම මුල වටේම කොටු දැල් ගැසීම/බැරල් බාග යෙදීම.



පැළ පාමුල ආරක්ෂා කිරීමට බැරල් බාග යෙදීම

වවුලා

- වැඩිපුර හානි කරන්නේ ඔවුන් ලැගුම් ගන්නා/ ගැවසෙන ස්ථාන අසල ඇති ඉඩම්වල පොල් ගස් වලටයි.
- විශේෂයෙන් වියළි කාලවලදී හානිය දරණු වේ.

හානියේ ලක්ෂණ

- බැට්ට කා දමයි, කා දැමූ බැට්ට වැටේ.
- යම් යම් අවස්ථා වලදී කරටිය උඩ කොටසේ පොල් අතු සපා කෑ විට එම පොල් කොළ ඉරි වියළී මැල වී යයි.

මර්දන ක්‍රම

- ගස්වල ලැගුම් ගෙන සිටින ස්ථාන වලට දිවා කාලයේදී රත්තැන් පත්තු කර දමා පලවා හැරීම.
- මෙසේ බිය ගැන්වූ විට කෙටි කාලයකට වුවද ඔවුන් එම පැත්තට සේන්ද්‍ර වීම වැළැක්වේ.

දඩු ලේනා

- කැලෑ ආශ්‍රිත පොල් ඉඩම් වලට බහුලව හානි කරයි

හානියේ ලක්ෂණ

- වැඩුණු පොල් ගස්වල ළපටි බැට්ටා කා විනාශ කර දැමීම

මර්දන ක්‍රම

- නිරතුරුව වගාව පරීක්ෂා කර බලා ඔවුන් වගාවෙන් පළවා හැරීම.

වළුරන්ගේ සහ රිලවුන්ගේ හානිය

- මොවුන් පොල් ගෙඩි වල පොල් වතුර හා පොල් මදය ආහාරයට ගනියි. මීට අමතරව ළපටි පොල් බැට්ටා සහ පොල් මල් වලටද හානි කරයි.

මර්දන ක්‍රම

- වායු රයිපල සහ රනිඤ්ඤ දැල්වීම මගින් පලවා හැරීම.
- මීට අමතරව අධි සංඛ්‍යාත ශබ්ද තරංග භාවිතයෙන් වළුරන් හා රිලවුන් පලවා හැරීම සඳහා පොල් පර්යේෂණ ආයතනය මගින් පර්යේෂණ සිදු කරමින් පවතී.
- ඒ සඳහා අධි සංඛ්‍යාත ශබ්ද තරංග නිපදවන උපකරණයක් අත්හදා බලමින් පවතී.

පොල් වගාවේ රෝග සහ කළමනාකරණය

1. ගොබ කුණු වීමේ රෝගය

- *Phytophthora palmivora* දිලීරය මගින් ඇති කරන මාරාන්තික රෝගයකි.
- දිලීරයේ වර්ධනයට අධික ආර්ද්‍රතාවය, ජලය රඳා පැවතීම, අදුරු කාලගුණය හිතකරය.
- එබැවින්, රබර් ඉඩම්, ගංගා නිම්න ආසන්න පොල් ඉඩම්වල සහ ජලය රඳා පවතින ප්‍රදේශවල මෙම රෝගය බහුලව දක්නට ලැබේ.
- තෙත් කලාපයේ හා වියළි කලාපයේ පොල් වගා වලට ද රබර්, කොකෝවා, පුවක් හා තල් ගස් වලටද මෙම දිලීරය ආසාදනය වේ.

රෝග ලක්ෂණ

- පළමුව ගොබය ළා පැහැ වී මැළවුණු ස්වභාවයක් ගනී.
- ක්‍රමයෙන් ගොබය දුම්රු පැහැ වී වියළී යයි. ගොබයේ පාමුල කුණු වේ.
- ගොබය හා අවට වියළුණු අතු කිහිපයක් කඩා වැටේ.
- ඉතිරි අතු නිරෝගී කොළ පැහැයෙන් යුක්ත වන අතර, පසුව ඒවා ද එකිනෙක වියළී යයි.
- පොල් මල් වියළී නොමේරූ ගෙඩි වැටේ.
- නොමේරූ පටක කුණු වී අධික දුගඳක් වහනය වේ.
- කුණු වූ කොටස් ජලයෙන් පෙරැණු ස්වභාවයක් ගනී.
- අවසානයේ කරටිය රහිත කඳක් ඉතිරි වේ.



ගොබ කුණු වීමේ රෝගය වැළඳුන පොල් ගසක්

මර්දන ක්‍රම

- දිලීරයේ බීජානු, ජලය, සුළඟ හා කෘමීන් මගින් ව්‍යාප්ත වන නිසා රෝගයෙන් මියගිය ගස් කපා කරටිය කොටස හොඳින් පුළුස්සා දමන්න.
- රෝගය මුල් අවධියේ දී හඳුනා ගත හොත්, කුණු වූ කොටස් කපා දමා මැන්කොසේබ් 80% ඩබ්.පී. සහ මෙටලැක්සිල් 8% ඩබ්.පී. අඩංගු දිලීර නාශකයකින්, ග්‍රෑම් 4-5 ක් වතුර ලීටර් 1 ක දියකර ද්‍රාවණයක් සාදා එම ද්‍රාවණයෙන් හෝ ටෙබ්‍රියකොනසෝල් 250 g/L ටී.ඩබ්. අඩංගු දිලීර නාශකයකින් මිලි ලීටර් 4 ක් වතුර ලීටර් 1 කට මිශ්‍ර කර සාදා ගත් ද්‍රාවණයෙන් ගොබය හොඳින් තෙමෙන සේ වක් කිරීමෙන් රෝගය වළක්වා ගත හැකිය.
- ආරක්ෂාකාරී පිළිවෙතක් ලෙස රෝගයෙන් මිය ගිය ගස අවට ගස්වල ගොබය සති 2 කට වරක් හොඳින් තෙමීමෙන් රෝගය වැළැඳීම වළක්වා ගත හැකිය. ඒ සඳහා බෝඩෝ මිශ්‍රණය හෝ ඉහත සඳහන් දිලීර නාශක වලින් එක් ද්‍රාවණයක් යොදා ගත හැකිය.

2. කඳින් ඕපස් ගැලීමේ රෝගය

- *Ceratocystis paradoxa* නම් දිලීරය මගින් ඇති වේ.
- මෙම දිලීරය දුර්වල පරපෝෂිතයෙකු නිසා කඳේ ඇතිවන තුවාල/පැලීම් තුළින් පමණක් කඳට ඇතුළු වේ.
- සාමාන්‍යයෙන් නොමේරූ ගස් වල මෙම රෝගය වැඩිපුර දැකිය හැකිය.

රෝග ලක්ෂණ

- පොත්තේ දික් අතට ඇති වූ පැලීම් වලින් රතු දුඹුරු පැහැ තරලයක් ශ්‍රාවය වීම.
- එම තරලය කඳ මතුපිට කළු පැහැයට වියළී යයි.
- කඳේ පොත්තේ අභ්‍යන්තර පටක දීර්ඝ ආරම්භ වූ මුල් අවධියේදී කහ පැහැයක් ගන්නා අතර, පසුව කළු දුඹුරු පැහැයට හැරී තන්තු කොටස් පමණක් ඉතිරි වේ.



කඳින් ඕපස් ගැලීමේ රෝගයේ ලක්ෂණ

මර්දන ක්‍රම

- මුවහත් ආයුධයකින් රෝගී පටක, නිරෝගී පටක කොටසකුත් සමඟ කපා ඉවත් කරන්න.
- 1% නම් දිලීර නාශක ද්‍රාවණයක්/බෝඩෝ මිශ්‍රණය/ඩයිනෝස් කාබමේට් ද්‍රාවණයක් ආලේප කරන්න.
- ටෙබියුකොනසෝල් අඩංගු දිලීර නාශකයකින් මිලි ලීටර් 4 ක් වතුර ලීටර් 1 කට මිශ්‍ර කර ආලේප කරන්න.
- දින 10 කට පසු අලුතින් ඕපස් ගලන්නේ නැතිනම් පමණක් දියතාර/දැව්තෙල් ආලේප කරන්න.
- තුවාලය කඳ තුළට විශාලව පැතිරී ඇත්නම් එම කුහරය සීමෙන්, වැලි බදාමයකින් වසා දමන්න.
- කපා ඉවත් කළ රෝගී පටක කොටස් පුළුස්සා දමන්න.
- දිලීරය ඇතුළුවීම වැළැක්වීම සඳහා කඳ මතුපිට ඇති තුවාලවල දියතාර/දැව්තෙල් ආලේප කරන්න.
- කඳට තුවාල සිදු කිරීමෙන් වළකින්න.

3. කොළ පුල්ලි රෝගය

- පොල් වවන සෑම ප්‍රදේශයකම සුලභ රෝගයකි.
- *Pestalotiopsis palmarum* සහ *Bipolaris incurvata* නම් වූ දිලීර විශේෂ 2ක් නිසා ඇති වේ.
- ඕනෑම වයසක පොල් ගසකට රෝගය ඇති වේ. පොල් පැළ වලට වන හානිය දරුණුය.
- මෙම රෝගයෙන් පොල් ගස මිය නොගියත් ගස දුර්වල වේ.
- අධික ආර්ද්‍රතාවය, දුර්වල ජලවහනය, වියළි කාලගුණය, පොටෑසියම් ඌනතාවය හා අධිකව නයිට්‍රජන් පොහොර යෙදීම මගින් මෙම රෝගයට ගොදුරු වීමේ හැකියාව වැඩි වේ.

රෝග ලක්ෂණ

- පොල් කොළ වල ඇති වන කුඩා කහපාට පුල්ලි ක්‍රමයෙන් විශාල වී, පුල්ලියේ මැද දුඹුරු පැහැ වී අළු පැහැයට හැරේ.
- ළඟින් පිහිටි පුල්ලි කිහිපයක් එකතු වී විශාල දුඹුරු පැහැ ප්‍රදේශ ඇති වේ.
- පහත මාලයේ අතු වල මුලින්ම රෝග ලක්ෂණ ඇති වේ.
- වසංගත තත්ත්වයක දී පුල්ලි ගොක් අත්ත දක්වා ව්‍යාප්ත වේ. එය "කොළ අංගමාරය" නම් වේ.
- රෝගය දරුණු වූ විට පොල් කොළ සමඟ අතු වියළී යයි.
- ඇතැම් විට මෙම දිලීරය පොල් පිහි වලට ආසාදනය වීමෙන් අතු වල පිත්ත දිගට අභ්‍යන්තර පටක දුර්වර්ණ වී වියළී යයි.



කොළ පුල්ලි රෝගයේ ලක්ෂණ

මර්දන ක්‍රම

රෝගය ඇති වීම වැළැක්වීමට,

- වගාවන් නිසි ලෙස පාලනය කිරීම
- ජලවහනය දියුණු කිරීම
- වියළි කාලයේ ජල සම්පාදනය කිරීම
- අධික සෙවණ ඉවත් කිරීම
- නිසි කල නිසි ප්‍රමාණ වලින් පොහොර යෙදීම සිදුකළ යුතුය.

- පොහොර යොදන ඉඩමක රෝගය පවතී නම් අමතර පොරොසියම් පොහොර ප්‍රමාණයක් මාස 06කට වරක් රෝග ලක්ෂණ නැතිවන තෙක් යොදන්න.

	මිශුරියේට් ඔෆ් පොරොසි (MOP)(g)	මුළුතැන්ගෙයින් ලබාගන්නා අළු (kg)
පොල් පැළයකට	250	5
වැඩුණු ගසකට	500	10

- තවත් වල ඇතිවන වසංගත තත්ත්වයකදී ටෙබ්‍රියකොනසෝල් අඩංගු දිලීර නාශකයකින් මිලි ලීටර් 4 ක් ජලය ලීටර් 1 ක දියකර ගත් ද්‍රාවණයක් ඉසීම.
- වැඩුණු ගස් වල රෝගය වසංගත තත්ත්වයක ඇත්නම්, ටෙබ්‍රියකොනසෝල් අඩංගු දිලීර නාශක ද්‍රාවණයක් ඉසීම.
- ගසේ පහළ මාලයේ අතු මෙම දිලීර රෝගයට පාත්‍ර වී වියළී ගොස් ඇත්නම් එම අතු කපා ඉවත් කර දිලීර නාශක ඉසීම වඩාත් යෝග්‍ය වේ.

4. කරටිය පාමුල කුණු වීම

- කුඩා පැළ වලට තව්‍යේදී හා සිටවූ අලුත රෝගය ඇති වේ.
- පාංශු බැක්ටීරියා වර්ධක අග්‍රයට ඇතුළු වීමෙන් රෝගය වැළඳේ.
- කළු කුරුමිණි භාතිය, අධික තෙතමනය පොල් පැළ රෝගයට ගොදුරු වීමට හේතු වේ.

රෝග ලක්ෂණ

- පොල් පැළයේ ගොබය මැල වී දුර්වර්ණ වී වියළී යාම.
- ගොබය හා කරටිය පාමුල කොටස් කුණු වීම.
- ගොබය අතින් ඇද්ද විට පහසුවෙන් ගැලවී එන අතර කුණු වූ කොටස් වලින් දුගඳක් වහනය වීම.

මර්දන ක්‍රම

- අධික තෙතමනය ඉවත් කිරීම සඳහා වැසි කාලයේදී වසුන් ඉවත් කිරීම, ජල සම්පාදනය හතර කිරීම සහ අධික සෙවණ ඉවත් කිරීම.
- කරටිය නිරාවරණය වන ලෙස පැළ සිටුවීම.
- රෝගයෙන් විනාශ වූ පැළ ගලවා පුළුස්සා දැමීම.
- ජලවහනය දියුණු කිරීම.

5. ගැනෝඩර්මා මුල් හා කඳ පාමුල කුණු වීමේ රෝගය

- මෙම රෝගය මුලින්ම දකුණු පළාතේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා විය.
- Ganoderma boninense* දිලීරය මගින් ඇති වේ.
- රෝගය වැඩිපුරම දක්නට ඇත්තේ වයස අවුරුදු 15 ට වැඩි ගස් වලය.
- රෝගය පැතිරීම ඉතා සෙමින් සිදු වන අතර, රෝගය නිසා මුල් හා කඳ පාමුල කොටස දිරීම සිදු වේ.
- රෝගය වැළඳී අවුරුදු 3-6 කදී ගස මිය යයි.
- රෝගය මුලිකව පැතිරීම සිදු වන්නේ රෝගී මුල් නිරෝගී මුල් හා ගැටීමෙනි.
- පොල් වලට අමතරව, මෙම දිලීරය පුවක්, තල් සහ අනෙකුත් තාල කුලයේ ගස් වලටද ආසාදනය කරයි.

රෝග ලක්ෂණ

- පළමුව කඳේ පාමුල දික් අතට ඇති වූ පැලිම් තුළින් රතු දුඹුරු උකු තරලයක් ශ්‍රාවය වේ.
- මෙම තරලය ශ්‍රාවය වීම ක්‍රමයෙන් කඳ දිගේ ඉහළට පැතිරේ.
- පහත මාලයෙන් පටන් ගන්නා වූ පරිණත පත්‍ර වියළීම ඉහළ අතු කරා පැතිරේ.
- හට ගන්නා වූ ගැහැණු මල් හා ගෙඩි සංඛ්‍යාව අඩු වීමට පටන් ගනී.
- අතු කෙටි වන අතර, කරටිය සිහින් වේ. මුල් හා කඳ පාමුල දිරීම කඳ දක්වා ක්‍රමයෙන් පැතිරේ.
- නිරාවරණය වූ මුල් හා කඳ පාමුල රතු දුඹුරු පැහැ මතුපිටක් සහ සුදු පැහැ කුඩා සිදුරු සහිත යටි පසක් ඇති හතු ඇති වේ.
- අවසානයේදී ගස පාමුලින් කඩා වැටීම හෝ නියඟයට හසු වූ කළ මෙන් මිය යාම සිදු වේ.



ගැහේබර්මා මුල් හා කඳ පාමුල කුණු වීමේ රෝගයේ ලක්ෂණ

මර්දන ක්‍රම

- නිරෝගි ගස් සඳහා රෝගය සෑදීම වැළැක්වීමට, රෝගී ගස් මුල් කොටසත් සමගම උදුරා කඳ පාමුල කොටස් හොඳින් පිළිස්සීම.
- රෝගී ගස් වටා ගසේ මුල සිට මීටර් 4 ක් ඇතින් මීටර් 1 ක් ගැඹුර සෙ.මී. 30ක් පළල අගලක් කැපීම මගින් රෝගී ගසේ මුල් නිරෝගි ගස්වල මුල් හා ගැටීම වැළැක්වීම.
- ගස් වටා කාබනික පොහොර දමා මෘතෝපජීවීන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩිකර පරපෝෂී දිලීරයේ ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු කිරීම.
- පොහොර යෙදීම, වියළි කාලයේදී ජල සම්පාදනය හා ජල වහන තත්ත්වය දියුණු කිරීම මගින් පොල් ගස් රෝග යට ගොදුරු වීම අඩු කළ හැක.
- පොල් පැළ සිටුවීමේදී පොල් වළ තුළට බොඩෝ මිශ්‍රණය ලීටර් 5 ක් යොදා සිටුවීම.

6. පොල් පැළවල පත්‍ර වියළී යාම (පත්‍ර පසු මැරීමේ රෝගය)

- *Curvularia lunata* නම් දිලීරය නිසා රෝගය වැළඳේ.
- කුඩා පැළ වලට තවදුරටත් හා ක්ෂේත්‍රයේදී සිට වූ අලුත ඇති වේ.
- පොල් පැළ දුර්වල වීමෙන් රෝග පාත්‍රිතාවය වැඩි කරයි.

රෝග ලක්ෂණ

- පොල් පැළ වල අතු/පත්‍ර අග්‍රිස්සේ සිට වියළීම.
- වයස්ගත පත්‍ර වලින් පටන් ගන්නා මෙම වියළීම ළපටි පත්‍ර කරා පැතිරේ.
- මෙමගින් පැළ ඉතා දුර්වල වන අතර ප්‍රතිකාර නොකළහොත් පැළය මිය යා හැකිය.

මර්දන ක්‍රම

- රෝගය වළක්වා ගැනීම සඳහා,
 - ✓ වල් මර්දනය
 - ✓ ජල වහනය දියුණු කිරීම
 - ✓ වියළි කාලයේදී ජල සම්පාදනය
 - ✓ සමතුලිත පොහොර මිශ්‍රණයක් යෙදීම
- වසංගත තත්ත්වයකින් රෝගය පැතිරේ නම් 1% නම් අඩංගු දිලීර නාශක ද්‍රාවණයකින් / ටෙබියුකොනසෝල් අඩංගු දිලීර නාශකයකින් (මිලි ලීටර් 4 ක් ජලය ලීටර් 1 ක දියකර) පත්‍ර හොඳින් තෙමෙන සේ ඉසින්න.
- ජල සම්පාදනයේදී පත්‍ර නොතෙමෙන සේ ජල සම්පාදනය කිරීම.

7. වැලිගම පොල් කොළ මැලවීමේ රෝගය (WCLWD)

- පැළ ගස් මෙන්ම සෑම වයස්කම පොල් ගස් රෝගයට පාත්‍ර වේ.
- “පයිටොප්ලාස්මා” නම් රෝග කාරකයක් (ව්‍යාධිජනකයෙකු) මගින් රෝගය ඇති වන අතර යුෂ උරා බොන කෘමි විශේෂ කිහිපයක් මගින් රෝගය ව්‍යාප්ත කෙරේ.
- රෝගී ගස් මිය යන තෙක්ම රෝග කාරකය ගස තුළ පවතින හෙයින් එම මුළු කාලය තුළම රෝගය බෝකිරීමේ හැකියාව ඇත.

රෝග ලක්ෂණ

- පොල් පත්‍රිකාවල ඇති කෝණාකාර ස්වභාවය නැති වී පත්‍ර තලය පැතලි වීම සහ පත්‍රිකා ඉළ ඇට ආකාරයට වක්‍රාකාරව නැවීම.
- පහත මාලයේ සිට මැද මාලය දක්වා පොල් අතු 10-12 ක් නිවු කහ පාටට හැරීම.
- මෙම කහ වීම අසමාකාරව සිදු වේ. එනම් එකම අත්තක සියලුම පොල් කොළ ඒකාකාරීව කහ පැහැ නොවන අතර සමහර පත්‍රිකා නිරෝගී කොළ පැහැයෙන් දිස් වේ.
- කහ පැහැ වූ පත්‍රිකා දාරයේ සිට ඇතුළට වියළීම.
- සමහර ගස් වල මැද මාලයේ සහ ඉහළ පොල් අතු වල අගිසි කැඩී යාම.
- අලුතින් ඇතිවන මුල් වල මූලාග්‍ර කොපුවට පිටුපසින් අභ්‍යන්තර කොටස් කුණු වීම සිදු වේ.
- මුල් අධික ලෙස අතු බෙදීම සිදු වේ.
- රෝගය නිසා අස්වැන්න ක්‍රමයෙන් අඩු වීම සිදු වේ.

රෝග පාලනය

- රෝගය හේතුවෙන් ගස් මිය යාම සිදු නොවුවත් ගස් දිරිය හා ඵලදාව ක්‍රමයෙන් අඩු වේ. නවද, එවැනි ගස් දෙවනුව කොළ කුණුවීමේ රෝගයට ගොදුරු වේ.
- “පයිටොජ්ලාස්මා” මගින් ඇති කරනු ලබන රෝග මර්දනයට ලොව මෙතෙක් කිසිදු ප්‍රතිකාරයක් සොයා ගෙන නොමැත.
- රෝගී ගස් විනාශ කිරීම මගින් පමණක් රෝගය පැතිරීම පාලනය කෙරේ. ඒ සඳහා,
 - ✓ රෝගී ගස් කපා ඒවායේ කරටි කොටස විනාශ කර දැමීම.
 - ✓ රෝගී ප්‍රදේශයෙන් පිටතට තාල වර්ගයට අයත් ගස් වර්ග හා සජීවී කොටස් රැගෙන නොයාම.
 - ✓ රෝගී ප්‍රදේශයේ නිපදවන ලද තාල (පාම්) වර්ගයට අයත් කිසිදු පැළයක් සිටුවීමෙන් වැළකීම.
 - ✓ රෝගී කලාපය තුළ රෝගය සඳහා ඔරොත්තු දෙන පොල් ප්‍රභේද පමණක් සිටුවීම.

උදා:- කොළ කුන්දිරා



වැලිගම පොල් කොළ මැලවීමේ රෝගයට ගොදුරු වූ පොල් ගසක්

8. කොළ කුණු වීමේ රෝගය

- වැලිගම පොල් කොළ මැලවීමේ රෝගයෙන් දුර්වල වන ගස් වලට ද්විතීකව වැළඳේ.
- දිලීර වර්ග කිහිපයක් දිග හැරුණු නැති ළපටි ගොක් අතු ආසාදනය කිරීමෙන් රෝගය වැළඳේ.

රෝග ලක්ෂණ

- පළමුව ගොඩයේ සුදු පැහැ ළපටි පත්‍රිකාවල ප්ලයේ පෙණුණු ස්වභාවයක් ගන්නා විවිධ හැඩැති කුඩා දුඹුරු පැහැ ලප ඇති වේ.
- මේවා විශාල වීමේ දී එකිනෙක සම්බන්ධ වී විශාල කුණු වූ ප්‍රදේශ ඇති වේ.
- කුණු වීම ළපටි පත්‍රවලට සීමා වුවද සමහර අවස්ථාවල දී වර්ධක අග්‍රය දක්වා පැතිර යා හැක.
- ළපටි පත්‍ර මේරීමේදී කුණු වූ කොටස් කළු පැහැයට හැරේ
- පත්‍රිකා අග කොටස් සහ අත්තේ නාරටිය කළු පැහැයට හැරී හැකිළී යයි.
- අත්ත මේරීමත් සමඟ කුණු වීම නතරවන අතර දිග හැරීමේදී කොළ කුණු වූ අතු වල මැද නාරටිය බිලි පිත්තක ආකාරයට දිස් වේ.
- රෝගය තදින් වැළඳුන විට අතු කඩා වැටීම, කරටිය සිහින් වීම, මල් හා ගෙඩි හටගැනීම ඇණ නිටීම සිදු වේ.



කොළ කුණු වීමේ රෝගයට ගොදුරු වූ පොල් ගසක් පොල්

රෝග පාලනය

- රෝගී ගස් කපා කරටිය කොටස පුළුස්සා දැමීම.

පොල් ඉඩම්වල වල් පැළෑටි කළමනාකරණය

පොල් වගාවක වල් පැළෑටි පාලනය ඉතා වැදගත් වේ. අනෙකුත් බෝග හා සසඳන විට වල් පැළෑටි මගින් පොල් ගසට සිදුවන හානිය අඩු වුවද, පැළ හා එල දරණ වතු වලට වල් පැළෑටි මගින් ආර්ථික හානියක් සිදු විය හැකිය. පසෙහි පෝෂ්‍ය පදාර්ථ, පසෙහි තෙතමනය, හිරු එළිය සහ ඉඩ සඳහා වල් පැළෑටි පොල් ගස් සමඟ තරඟ කරන අතර එමඟින් පොල් ගස්වල වර්ධනය හා අස්වැන්න අඩු වේ. පොල් වගාවන්හි වල් පැළෑටි ගහනය ඉහළ යාම, පොහොර යෙදීම, පොල් අස්වැන්න නෙළීම සහ ගෙඩි එකතු කිරීම ඇතුළත් සියලු කළමනාකරණ පිළිවෙත් සඳහා බාධා ඇති කරයි. මෙම අවස්ථාවේ දී, වල් පැළෑටි පාලනය සඳහා අමතර වියදමක් දැරීමට සිදුවන අතර, එම නිසා පොල් නිෂ්පාදන පිරිවැය වැඩි වන අතර අවසානයේ වගාකරුවන්ට ලැබෙන ලාභය අඩු වේ. වල් පැළෑටි කළමනාකරණයේ දී, පොල් වගාවන්ගෙන් සම්පූර්ණ වල් පැළෑටි මුළුනුපුටා දැමීමක් අපේක්ෂා නොකරන අතර, පොල් වගාවට ආර්ථික හානියක් සිදු නොවන මට්ටමකට වල් පැළෑටි ගහනය පාලනය කිරීම ප්‍රමාණවත් වේ.

බහුලව භාවිතා වන වල් පැළෑටි පාලන ක්‍රම වන්නේ:

1. යාන්ත්‍රික ක්‍රම
2. ශෂ්‍ය විද්‍යාත්මක ක්‍රම
3. ජීව විද්‍යාත්මක ක්‍රම
4. රසායනික ක්‍රම
5. සමෝධානික වල් පැළෑටි කළමනාකරණය

1. යාන්ත්‍රික ක්‍රම

- කුඩා පරිමාණ වගාවන් සඳහා අතින් උදුරා දැමීම, අතින් කැපීම සහ උදුලු ගෑම වැනි යාන්ත්‍රික ක්‍රම භාවිතා කිරීම ලාභදායී වේ.
- මහා පරිමාණ වගාවන් සඳහා, ට්‍රැක්ටර් භාවිතා කර වල් පැළෑටි ස්ලේෂ් සහ හැරෝ කිරීම මගින් සාර්ථකව පාලනය කරගත හැකිය.
- තණකොළ කපන යන්ත්‍ර භාවිතයෙන් වල් පැළෑටි ඉවත් කිරීම සම්පූර්ණ වල් පැළෑටි පාලනයක් නොවන අතර එය වල් පැළෑටි තාවකාලිකව පාලනය කරයි.
- මල් පිපීමට පෙර යාන්ත්‍රික වල් පැළෑටි පාලනය සිදුකළ යුතුය.
- පොඩ්සිංකේටොරය, ගඳපාන වැනි පළල් පත්‍ර සහිත වල් පැළෑටි සහ ඉලක්, ගිණිතෘණ, මාන, ඇටෝරා වැනි තෘණ වර්ග, මූල පද්ධතිය සමඟ මුළුනුපුටා දැමීමෙන් සාර්ථකව පාලනය කළ හැකිය.
- ශාකයේ පාදස්ථ කොටස් සහ මූල පද්ධතිය නිෂීම හේතුවෙන් මෙවැනි වල් පැළෑටි පැළවීම අඛණ්ඩව සිදුවන බැවින්, එවැනි වල් පැළෑටි වල භූගත කොටස් ඉවත් නොකර, පසෙන් ඉහළ කොටස පමණක් ඉවත් කිරීම ඒවා පාලනය කිරීමට ප්‍රමාණවත් නොවේ.

2. ශෂ්‍ය විද්‍යාත්මක ක්‍රම

- i. ආවරණ බෝග වගාව
- ii. අතුරු බෝග වගාව
- iii. සත්ත්ව පාලනය

i. ආවරණ බෝග වගාව

- සම්පූර්ණයෙන් පාහේ ආවරණ බෝගයන්හි මුල් පොළොව මතුපිට විහිදී යන බැවින් සාමාන්‍යයෙන් ගැඹුරු මුල් සහිත වැවිලි බෝග සමඟ තෙතමනය සඳහා තරගයක් ඇති නොකෙරේ.
- ආවරණ බෝග මගින්, මතුපිට පස සෝදා යාම හා වැසි බිංදු එක එල්ලේ පොළව මත පතිතවීම වළකා එමගින් සිදුවන පාංශු බාදනය ද අවම කෙරේ.
- පසට කොළ රොඩු හා කාබනික ද්‍රව්‍ය විශාල ප්‍රමාණයක් සැපයේ.
- පසෙහි ව්‍යුහය හා ජලය උරාගැනීමේ හැකියාව වැඩිකර තෙතමනය සංරක්ෂණය කර ගැනීමටද ආධාර වේ.
- පසෙහි පෝෂක සෝදායාම, පසෙහි උෂ්ණත්වය හා වල් පැළෑටි වැඩිමද මර්දනය කෙරේ.
- රනිල කුලයට අයත් ආවරණ බෝග පසට හයිට්‍රජන් පෝෂකය ලබාදේ.
- වැල් ආවරණ බෝග - පියුරේරියා, කැලොපොගෝනියම්, සිරාට්‍රෝ සහ සෙන්ට්‍රෝසීමා
- පඳුරු ආවරණ බෝග - ග්ලිරිසිඩියා, ඇකේමියා, ඉපිල් ඉපිල්
- පොල් ගස්වල පොහොර කවය ආවරණය කිරීම සඳහා වසුන් ලෙස ද ඉහත ආවරණ බෝග භාවිතා කළ හැකිය.

ii. අතුරු බෝග වගාව

- පොල් වගාවේ වයස අවුරුදු 5 ට අඩු සහ අවුරුදු 20 ට වැඩි වූ විට, හිරු එළිය ප්‍රමාණවත් ලෙස බිමට ළඟා වන අතර, වල් පැළෑටි වර්ධනය වීමේ හැකියාව වැඩි වේ.
- එමනිසා, මෙම අවධීන් තුළ වතුයායේ සුදුසු අතුරු බෝග වගා කිරීමෙන් වල් පැළෑටි වර්ධනය අවම කළ හැකිය.
- ගම්මිරිස්, කෝපි, කොකෝවා, අන්තාසි සහ කෙසෙල් වැනි බෝග වගා කිරීම වල් පැළෑටි මර්දනය කිරීමට, පාංශු බාදනය අඩු කිරීමට සහ පාංශු සාරවත් බව වැඩි කිරීමට හේතු වේ.

iii. සත්ත්ව පාලනය

- මී හරකුන් සහ ගවයින් නිදැලි කර උලා කෑමට සලස්වන විට අක්කර 3 - 4 කට එක් සතෙකු නිර්දේශ කෙරේ.
- එළවළු සහ බැටළුවන් අක්කරයකට සතුන් හය දෙනෙකු නිර්දේශ කෙරේ.
- ඉලක් සහ ගිණිතෘණ මී හරකුන් විසින් සාර්ථකව පාලනය කළ හැකිය.
- එළවළු පොල් පැළ වලට හානි කරන බැවින්, ඔවුන් ඇති කළ යුත්තේ පරිණත පොල් වගාවල පමණි.
- කෙසේ වෙතත්, පොල් පැළ වගාවන් හි බැටළුවන් ඇති කළ හැකිය.

3. ජීව විද්‍යාත්මක ක්‍රම

- වල් පැළෑටි පාලනය කිරීම සඳහා කෘමීන් භාවිතා කරයි.
- වර්තමානයේ මෙම ප්‍රවේශය බහුලව භාවිතා නොවුනත්, වල් පැළෑටි කිහිපයක් පාලනය කිරීම සඳහා මෙම ක්‍රමය සාර්ථකව භාවිතා කර ඇත **Full stop?**
- උදා: *Amelo insulata* පාලනය කිරීම සඳහා *Chromolaena odorata* නම් දළඹුවා භාවිතා කළ හැකිය. මෙම දළඹුවා ශාකයේ කොළ අනුභව කරන අතර ක්‍රමයෙන් ශාකය දුර්වල වී මිය යයි. මෙය ලාභදායී වන අතර පාරිසරික හානිය අවම කරයි.

4. රසායනික ක්‍රම

- මෙම ක්‍රමයේදී, වල් පැළෑටි පාලනය කරනු ලබන්නේ වල් නාශක මගිනි.
- වඩාත් ඵලදායී ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම සඳහා වල් නාශක යෙදීමේදී පසෙහි තෙතමනය සහ වල් පැළෑටි වර්ධනයේ අවධිය සලකා බැලිය යුතුය.
- වල් නාශක අධික ලෙස භාවිතා කිරීම පරිසරයට අහිතකර බලපෑමක් ඇති කරයි.
- වඩාත් සාර්ථක ප්‍රතිඵල සඳහා, පරිණත වල් පැළෑටි මතුපිටින් ඉවත් කර, සති දෙකේ සිට හතර දක්වා අලුතෙන් වර්ධනය වීමට ඉඩහැර, වල් පැළෑටි වලට ළපටි කොටස් / දළ වලට වල් නාශක යොදන්න.

ගිණිතෘණ පාලනය සඳහා නිර්දේශය

i. පරිණත වල් පැළෑටි සඳහා

ග්ලූෆොසිනේට් ඇමෝනියම් මිලි ලීටර් 100 ක් ජලය ලීටර් 16 ක් සමඟ මිශ්‍ර කර (හැප්සැක් ඉසිනයක් භාවිතා කර) අක්කරයකට ටැංකි 8 - 10 ක් යොදන්න.

ii. මල් පිපීමට පෙර (ස්ලෑෂ් හෝ හැරෝ කිරීමෙන් පසු) නොමේරූ වල් පැළෑටි සඳහා

ග්ලූෆොසිනේට් ඇමෝනියම් මිලි ලීටර් 80 ක් ජලය ලීටර් 16 ක් සමඟ මිශ්‍ර කර (හැප්සැක් ඉසිනයක් භාවිතා කර) අක්කරයකට ටැංකි 8 - 10 ක් යොදන්න.

5. සමෝධානික වල් පැළෑටි කළමනාකරණය

- සමෝධානික වල් පැළෑටි පාලනය යනු එක් වල් පැළෑටි පාලන ක්‍රමයක් භාවිතා කිරීම වෙනුවට ක්‍රම දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් එක්වර භාවිතා කිරීමයි.

උදා: පොහොර කවය වසුන් කිරීම සහ ඉතිරි ඉඩමේ අතුරු බෝග වගා කිරීම.

පොහොර කවයේ වල් නාශක යෙදීම සහ යාන්ත්‍රික ක්‍රම භාවිතා කරමින් ඉතිරි ප්‍රදේශයේ වල් පැළෑටි ඉවත් කිරීම.



තණකොළ කපන යන්ත්‍රයක් භාවිතයෙන් වල් පැළෑටි පාලනය කිරීම

අතුරු බෝග වගාව, සත්ව පාලනය සහ ඒකාබද්ධ ගොවිතැන තුළින් පොල් ඉඩම් වල ලාභය ඉහළ නංවා ගැනීම

පොල් වගාවක, සාමාන්‍යයෙන් භූමියෙන් හතරෙන් තුනක්ම භාවිතයට නොගෙන පවතින අතර, එම ඉඩෙහි පොල් ගස් වලට අමතරව වෙනත් අතුරු බෝග වගා කළ හැකිය. පොල් සමඟ වෙනත් අතුරු බෝග වගා කිරීමෙන් කුඩා කෘෂි වන වගා පද්ධතියක් නිර්මාණය වන අතර ජෛව විවිධත්වය වැඩි වේ.

අතුරු බෝග වගා කිරීමේ මූලධර්ම

- ආදායම සහ ලාභය වැඩි කරයි
- ඉඩමේ සම්පත් උපරිම ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගත හැකි වේ (භූමිය, පාංශු ජලය, නිරු එළිය සහ ශාක පෝෂක)
- පස තුළින් ජලය ගමන් කිරීම සහ වාතනය වැඩි දියුණු කරයි
- පාංශු බාදනය අවම කිරීම සහ පසෙහි සාරවත් බව වැඩි කිරීම
- පොල් නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම
- වල් පැළ වර්ධනය පාලනය වීම
- ආදායම සඳහා එක් බෝගයක් (පොල්) මත පමණක් යැපීමේ අවදානම අඩු කරයි
- ආහාර සුරක්ෂිතභාවය වැඩි කරයි
- වැඩි රැකියා අවස්ථා ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය කිරීම

අතුරු බෝග වගා කිරීමේ දී සැලකිය යුතු කරුණු

1. පොහොර යෙදීම

- ශාක පෝෂක සඳහා තරගකාරීත්වය වළක්වා ගැනීම සඳහා පොල් සහ අතුරු බෝග යන දෙකම සඳහා නිර්දේශිත පොහොර ප්‍රමාණයන් වෙත වෙනම යෙදිය යුතුය.

2. ආලෝකය

- පොල් වගාවක, වයස අවුරුදු 5 දක්වා සහ අවුරුදු 20 න් පසු ආලෝකයට ප්‍රිය කරන බෝග වගා කිරීම සුදුසුය.

3. පාංශු තෙතමනය

- පොල් ගසෙන් මීටර් 1.8 (අඩි 6) ට වඩා දුරින් අතුරු බෝග සිටුවීමෙන් තෙතමනය සඳහා පොල් ගස සහ අතුරු බෝග අතර තරගය අඩු කළ හැකිය.
- පාංශු තෙතමනය සීමාකාරී සාධකයක් වන අවස්ථාවන්හිදී (වැලි සහිත පස වැනි) එවැනි තත්වයන්ට ඔරොත්තු දීමට හැකි අතුරු බෝග පමණක් තෝරා ගත යුතුය.

4. භූමියේ පිහිටීම

5. පාංශු ලක්ෂණ

- බෑවුම් සහිත පොල් ඉඩම්වල පාංශු බාදනය අඩු කිරීමට සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය.
- විවිධ දේශගුණික කලාපවල විවිධ පස් වර්ග දක්නට ලැබේ.
- පොල් ගස්වල වර්ධනය ද පස් වර්ග අනුව වෙනස් වේ.
- S1 පාංශු යෝග්‍යතා පන්තියට අයත් පස අනෙකුත් පාංශු යෝග්‍යතා පන්තිවලට වඩා ඉහළ අස්වැන්නක් ලබා දෙයි.
- S1 පාංශු යෝග්‍යතා පන්තියට අයත් ප්‍රදේශවල ආලෝකය සීමිත නිසා S1 පසෙහි අතුරු බෝග වගා කිරීම අභියෝගාත්මකය.
- නොගැඹුරු, බොරළු පස් සහිත ඉඩම්වල පොල් එළඳායීතාව අඩු වන අතර අතුරු බෝග වගාවට සුදුසු වේ.

6. වෙළඳපොළ ඉල්ලුම

- අතුරු බෝග තෝරාගැනීමේදී, ප්‍රදේශයේ පවතින අලෙවිකරණ පහසුකම් ද සැලකිල්ලට ගත යුතුය.
- අතුරු බෝග කිහිපයක් වගා කිරීමෙන්, මිලෙහි උච්චාවචනයන්ට මුහුණ දිය හැකිය.

7. සමාජ සාධක සහ අනෙකුත් පහසුකම්

- අතුරු බෝග වගා කිරීමට පෙර පොහොර ලබා ගැනීමේ හැකියාව, වගාකරුවන්ගේ කැමැත්ත/දැනුම සහ රජයේ සහනාධාර වැනි සාධක ද සලකා බැලිය යුතුය.

පොල් ඉඩම් සඳහා තෝරා ගත හැකි අතුරු බෝග

1. වාර්ෂික බෝග (කාල සීමාව වසරකට නොවැඩි)

- රනිල කුලයට අයත් බෝග - කවිපි, මුං ඇට, සෝයා බෝංචි, මෑ
- අල වර්ග - බතල, මඤ්ඤාකකා, කිරි අල, වැල් අල
- කුළුබඩු - මිරිස්, ඉගුරු, කහ
- විවිධ ඵලවළු වර්ග

2. අර්ධ බහු වාර්ෂික බෝග (කාල සීමාව වසර 2-5)

- පලතුරු - කෙසෙල්, අන්නාසි, දොඩම්, පැපෝල්
- සුළු අපනයන බෝග - බුලත්
- ඖෂධීය පැළෑටි - කෝමාරිකා, නිප්පිලි, ඉගුරු පියලි

3. බහු වාර්ෂික බෝග (කාල සීමාව වසර 10 ට වැඩි)

- කොකෝවා, කෝපි, ගම්මිරිස්, කරාබුනැටි, කුරුඳු, රුබ්‍රින්, ලෙමන්, හාරං, සාදික්කා, තේ සහ තෘණ වර්ග සුදුසු වේ.
- ඊට අමතරව, කපු, දෙහි සහ අඹ වැනි බෝග අතරමැදි සහ වියළි කලාප සඳහා සුදුසු වේ.

පොල් ඉඩම් සඳහා නිර්දේශිත අතුරු බෝග This is a main topic. Keep a suitable space.

පොල් ගස් සමග අතුරු බෝග කිහිපයක් වගාකළ හැකි අතර එමඟින් වගාකරුවන්ට වගාවෙන් ලැබෙන වියදම සහ ආදායම සමතුලිත කිරීම සඳහා අමතර ආදායමක් ලබා ගත හැකිය.

පොල් ඉඩම් වල අතුරු බෝගයක් ලෙස ගම්මිරිස් වගා කිරීම


ගම්මිරිස් යනු ලොව බහුලවම භාවිතා වන කුළුබඩු වර්ගය වන අතර එය 'කුළුබඩු වල රජු' ලෙස හැඳින්වේ. ගම්මිරිස් දකුණු ආසියාවට ආවේණික වන අතර ඓතිහාසික වාර්තා වලින් හෙළි වන්නේ එය පළමුවෙන්ම දකුණු ඉන්දියාවේ වගා කරන ලද බවයි. මෙය තෙත් කලාපයේ පොල් වගාවන් සඳහා වඩාත්ම ලාභදායී අතුරු බෝග වලින් එකකි. ගම්මිරිස් යනු වසර (20) කට වැඩි ආයු කාලයක් සහිත බහු වාර්ෂික කුළුබඩු බෝගයක් වන බැවින්, ක්ෂේත්‍රයේ ස්ථාපිත වූ පසු එය පහසුවෙන් නඩත්තු කළ හැකිය.



ප්‍රභේද - පැනියර්-1, කුවින්, සිංගි රාල, කොනුකුඹුරේ රාල, සහ බුරුවේ රාල.

පරතරය - පේළි අතර (මීටර් 2) x පැළ අතර (මීටර් 2)

පැළ සිටුවීමේ ක්‍රමය - වයස වසර 15 ඉක්මවූ සහ වසර 50 නොඉක්ම වූ පොල් ඉඩම් ගම්මිරිස් වගාව සඳහා සුදුසු වේ. ඒවා ප්‍රධාන වශයෙන් ම දිවිත්ව පේළි ක්‍රමයට වගා කෙරේ. මෙම ක්‍රමයේ දී පොල් පේළි දෙකක් අතර ගම්මිරිස් පැළ පේළි දෙකක් සිටුවනු ලැබේ. යාබද ගම්මිරිස් පැළ පේළි දෙකක් අතර සහ එක් ගම්මිරිස් පැළ පේළියක යාබද පැළ 02 ක් අතර පරතරය මීටර් 2 ක් විය යුතු අතර ත්‍රිකෝණාකාර ක්‍රමයට ඒවා සිටුවිය යුතුයි.



ගම්මිරිස් වැල් පුහුණු කිරීම සහ කප්පාදුව

ගම්මිරිස් පැළයේ පත්‍ර සංඛ්‍යාව 8-10 තෙක් වර්ධනය වූ පසු ඉන් පහතින්ම පිහිටි පත්‍ර 03 හැර අනෙක් පත්‍ර සියල්ල ඉවත් කරන්න. සතියකට පසු පත්‍ර නොමැති කඳ කොටස කප්පාදු කරන්න. මෙමගින් අලුතෙන් වර්ධක කඳන් 2 ක් හෝ 3 ක් ඇති වීම ඉක්මන් කරයි. මෙලෙස අලුතින් හටගන්නා වර්ධක කඳන් වල ද පත්‍ර සංඛ්‍යාව 8-10 තෙක් වර්ධනය වූ පසු පෙර පරිදිම පහළින් පිහිටි පත්‍ර 3 ක් හැර ඉතිරි සියල්ල ඉවත් කරන්න. සතියකට පසු නව වර්ධක කඳන් වල පත්‍ර රහිත කඳ කොටස් කප්පාදු කරන්න. මෙමගින් නවදුරටත් පාර්ශ්වික වර්ධක කඳන් හට ගැනීම සිදු වේ. අවසානයේ එක් ගම්මිරිස් වැලක අතු සංඛ්‍යාව 7-9 ක් තෙක් වර්ධනය වූ පසු ට්‍රවයින් නූලක් හෝ කෙසෙල් පට්ටයක් ආධාරයෙන් ගම්මිරිස් වැල ආධාරකයට බැඳ තැබිය යුතුය. ගම්මිරිස් වැල් මීටර් 3 ක් පමණ උසට වැඩුණු පසු සිරස් අතට වැඩීම පාලනය කිරීම සඳහා අග්‍රස්ථ අංකුරය ඉවත් කළ යුතුය. පොහොර යොදන අවස්ථාවේ දී බිම දිගේ දූවන ධාවක වැල් ද ඉවත් කළ යුතුය.

Should be j

අස්වැන්න - හොඳින් නඩත්තු කරනු ලබන වසර 5 ක් වයසැති ගම්මිරිස් වැලකින් වසරකට සැකසූ ගම්මිරිස් කි.ග්‍රෑම් 2- 3 ක් දක්වා අස්වැන්නක් ලබා ගත හැකිය.

පොල් ඉඩම් වල අන්තෘසි වගා කිරීම

අන්තෘසි යනු ශ්‍රී ලංකාවේ වගා කරන ප්‍රධාන වාණිජ පලතුරු බෝග වලින් එකක් වන අතර අපනයන වෙළඳපොළේ ද ඉහළ ඉල්ලුමක් පවතින බෝගයකි. කෙසෙල් වලට පමණක් දෙවැනි වන අන්තෘසි, පොල් ඉඩම් වල අතුරු බෝගයක් ලෙස වගා කරන ඉතා ජනප්‍රිය, ලාභදායී සහ රසවත් පලතුරු බෝගයකි. තෙත් හා අතරමැදි කලාපයේ පවතින හිතකර දේශගුණය, පාරිභෝගික ඉල්ලුම, අතිරේක ආදායමක් ලබාගත හැකිවීම සහ අන්තෘසි වැවීමට යෝග්‍ය පසක් සහිත ඉඩම් පැවතීම අන්තෘසි වගාව ප්‍රචලිත වීමට හේතු වී ඇත.




ප්‍රභේද - මුරැසි, කිවි

පරතරය -


තනි ජේලි ක්‍රමය - ජේලි අතර පරතරය මීටර් 1.8 x ජේලියක පැළ දෙකක් අතර පරතරය මීටර් 0.45

ද්විත්ව ජේලි ක්‍රමය

ජේලි අතර පරතරය මීටර් 0.6 x ජේලියක පැළ දෙකක් අතර පරතරය මීටර් 0.45



තනි ජේලි



ද්විත්ව ජේලි

පැළ සිටුවීමේ ක්‍රමය - අවුරුදු 5 ට අඩු සහ අවුරුදු 30 ට වැඩි පොල් වගාවන් සුදුසු වේ. ප්‍රධාන සිටුවීමේ ක්‍රම වන්නේ තනි ජේලි සහ ද්විත්ව ජේලි ක්‍රමයි. අන්තෘසි සිටුවීම සඳහා සෙන්ටිමීටර් 20 ක් පළල සහ සෙන්ටිමීටර් 20 ක් ගැඹුරට අගල් සකස් කරන්න. බෑවුම් සහිත ඉඩම්වල, සමෝච්චි පද්ධතියක් සකස් කරන්න. සමතලා ඉඩම්වල, නැගෙනහිර සහ බටහිර දිශාවලට ජේලි සකස් කරන්න. සිටුවීමට සුදුසු මොරෙයියන් අගල්වල තබා, මොරෙයියන්ගේ පාදස්ථයේ සිට සෙන්ටිමීටර් 10-15 ක් ආවරණය වන පරිදි පස එකතු කරන්න.

මල් හට ගැනීම උත්තේජනය කිරීම - වාණිජ වගාවන්හි දී, ඒකාකාර නොවන ස්වභාවික මල් හට ගැනීම වළක්වා, මල් හට ගැනීම කෘතීමව උත්තේජනය කිරීම බහුලව දක්නට ලැබේ. මේ සඳහා නැප්තලින්, ඇසිටික් අම්ලය හෝ එතෙතෝන් භාවිතා කළ හැකිය. මල් හට ගැනීම උත්තේජනය කිරීම සඳහා වඩාත්ම සුදුසු අවධිය කොළ 35-40 ක් පළුරෙහි පවත්නා අවධියයි. හෝමෝන යෙදීමට මාසයකට පෙර සිට රසායනික පොහොර සහ වල්නාශක භාවිතා නැවැත්විය යුතුය.

අස්වනු නෙළීම - ගෙඩි ඉදුණු විට එහි ඇස් හොඳින් පළල්වී පිහිටන අතර, එම නිසා ඇස් පැහැදිලිව දැකිය හැකි වේ. නටුව අසල ඇති ඇස් වලින් 25% ක් පමණ කහපැහැ වූ විට නෙළා ගැනීම සුදුසුය. මෙහිදී නටුවේ සෙ.මි. 10-15 ක් ඉතිරි කළ යුතුය. මුරැසි ප්‍රභේදයේ බර කි.ග්‍රෑම් 2 ක් වන විට හොඳින් වැඩුණු කිවි ප්‍රභේදයේ ගෙඩියක බර කි.ග්‍රෑම් 4-5 ක් පමණ වේ.

පොල් ඉඩම් වල අතුරු බෝගයක් ලෙස කෙසෙල් වගා කිරීම


මිල අඩු වීම සහ පෝෂණ ගුණය ඉහළ වීම නිසා, කෙසෙල් යනු ඉතා ජනප්‍රිය පලතුරකි. එය ඉදුණු විට නැවුම් ආකාරයෙන් හෝ අමු විට පිසූ ආකාරයෙන් පරිභෝජනය කරයි. පොල් ඉඩම් වල අතුරු බෝග වගා කරන්නන් අතර අනෙකුත් අතුරු බෝග හා සසඳන විට, වඩාත්ම ප්‍රචලිත වන අතුරු බෝගය ද මෙයයි. එහි ජනප්‍රියතාවයට හේතු වන්නේ රෝපණ ද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීමේ පහසුව, ඉක්මන් වර්ධනය, හොඳ වෙළඳ පොළක් පැවතීම සහ වැඩි ලාභ ඉපයීමේ හැකියාව යනු කරුණු නිසයි.



ප්‍රභේද - නදී (ඇඹුල්), කණ්ඩුල (නැවුම් හා පිසූ යන ආකාර දෙකටම සුදුසු), පුලතිසි (පිසීම සඳහා), ප්‍රසාද් (අළු කෙසෙල්), අග්‍රා (කෝලිකුටු), පැරකුම් (සීනි කෙසෙල්), මිල්ලෑව සුවදැල් (සුවදැල්), ගන්නොරුව සීනි 1 (සීනි කෙසෙල්), ගන්නොරුව රෙඩ් ඩනානා (රන් කෙසෙල්)

පරතරය - පේළි අතර පරතරය මීටර 2.4 x පේළියක පැළ දෙකක් අතර පරතරය මීටර 3


පැළ සිටුවීමේ ක්‍රමය - අවුරුදු 30 ට වැඩි පොල් ඉඩම් කෙසෙල් අතුරු බෝග ලෙස වගා කිරීම සඳහා සුදුසු වේ. සෙන්ටිමීටර 60 x සෙන්ටිමීටර 60 x සෙන්ටිමීටර 60 ප්‍රමාණයේ වළවල් කැපීම ප්‍රමාණවත් වේ. සිටුවීමට පෙර වළවල්, මතුපිට පස් සහ කාබනික පොහොර මිශ්‍රණයකින් පිරවිය යුතුය. ඊට අමතරව මෙම මිශ්‍රණයට රොක් පොස්පේට් ග්‍රෑම් 500 ක් හා ඩොලමයිට් කිලෝ 1.0 ක් මිශ්‍ර කිරීම කළ යුතුය.



අස්වනු නෙළීම - කෙසෙල් වල මල් හට ගැනීම පැළ සිටුවා මාස 10-12 කට පසුව ආරම්භ වේ. පරිණත වීම සඳහා ගත වන කාලය කෙසෙල් වල ප්‍රභේදය මත තීරණය වේ. ඇඹුල් ප්‍රභේද පරිණත වීම සඳහා සති 13 ක කාලයක් ගත වන අතර කෝලිකුටු ප්‍රභේදයට සති 16 ක කාලයක් ගතවේ.

පොල් ඉඩම් වල අතුරු බෝගයක් ලෙස කුරුඳු වගා කිරීම

කුරුඳු යනු ශ්‍රී ලංකාවට ආවේණික ශාකයකි. කුරුඳු මූලින් වගා කර ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාවේ උඩරට ප්‍රදේශයේ වනගතවය. කුරුඳු වල ඉතිහාසය ක්‍රි.පූ. 2800 පමණ අතට දිව යන අතර, චීන ලේඛනවල එය “ක්වායි” ලෙස සඳහන්වේ. මහනුවර, මාතලේ, බෙලිහල්මය, හපුතලේ, හෝර්ටන් නැන්හ සහ සිංහරාජ වනාන්තරය යන ප්‍රදේශයන් හි වල් කුරුඳු විශේෂ හතක් දක්නට ලැබේ. වර්තමානයේ කුරුඳු වගාව මිගමුව සිට මාතර දක්වා වෙරළබඩ තීරය ඔස්සේ කේන්ද්‍රස්ථාන වී ඇති අතර, එය කළුතර සහ රත්නපුර ප්‍රදේශයන් හිද වගා කෙරේ.



(a) පොල් ඉඩම් වල කුරුඳු වගා කිරීම




(b) කුරුඳු සැකසීම

ප්‍රභේද - “පැණි-මිරිස් කුරුඳු” යනු පැණි රස සහ නියුණු රසයක් සහිත හොඳම ප්‍රභේදය වන අතර “මිරිස් කුරුඳු”, “සෙවෙල් කුරුඳු” සහ “තිත්ත කුරුඳු” අනෙක් ඒවා වේ. අස්වැන්න සහ ගුණාත්මක ක්‍රියාකාරීත්වය මත පදනම්ව දැනට කුරුඳු ප්‍රභේද දහයක් හඳුනාගෙන ඇති අතර, හොඳම ප්‍රභේද දෙක “ශ්‍රී විජය” සහ “ශ්‍රී ගැමුණු” ලෙස නම් කර ඇත. අනෙකුත් ප්‍රභේද විවිධ කෘෂි දේශගුණික කලාපවල ඇගයීමට ලක් කෙරෙමින් පවතී.

පරතරය - පේළි අතර පරතරය මීටර 1.2 m x පේළියක පැළ දෙකක් අතර පරතරය මීටර 0.6

පැළ සිටුවීමේ ක්‍රමය - අවුරුදු 25 - 45 අතර පොල් වගාවන් කුරුඳු සිටුවීම සඳහා සුදුසු වේ. හොඳින් ඉදුණු බීජ තෝරාගෙන, හොඳින් සෝදා, පිට පොත්ත ඉවත් කර, මතුපිට පස්, ගොම, වැලි සහ කොකුබත් සමාන කොටස් වලින් පුරවා ඇති සෙ.මී. 12.5 x සෙ.මී. 20 පොලි බෑග්වල සිටුවනු ලැබේ. බීජ පහක් හෝ අටක් බෑගයක සිටුවනු ලැබේ. නමුත් මාස දෙකකට පමණ පසු සරු පැළ 4-5ක් තබා ගෙන ඉතිරි පැළ ඉවත් කිරීම සිදු කෙරේ. මෝසම් වැසි ආරම්භ වීමත් සමග සිටුවීම සිදු කෙරේ. නිරෝගී, රෝගවලින් තොර, මාස හතරක් වයසැති බීජ පැළ සෙ.මී. 30 x සෙ.මී. 30 x සෙ.මී. 30 වළවල් වල සිටුවනු ලැබේ. සිටුවන වළ මතුපිට පස් සහ ගොම හෝ කොම්පෝස්ට් වලින් පුරවා, බීජ පැළ 4-5 ක් සහිත එක් බෑගයක් එක් වළක සිටුවනු ලැබේ. දඩු කැබලි මගින් වර්ධක ප්‍රචාරණය ද සිදු කළ හැක.



කප්පාදු කිරීම - කුරුඳු තැලීමට දඩු කපා ගත් පසු කුඩා කුරුඳු අතු රාශියක් එකවර හට ගනී. ඒවායින් සරු කෙලින් වැඩෙන අතු කිහිපයක තබාගෙන ඉතිරි නිසරු අතු මුළුමනින්ම කපා දමන්න. මෙය “නුතරු පැහීම” නමින් හැඳින්වේ. එමඟින් කුරුඳු අස්වැන්න වැඩි වේ.

අස්වනු නෙළීම - කුරුඳු වගාවෙන් වසර තුනකට පසු පළමු අස්වැන්න ලබා ගත හැකි අතර, වසරකට දෙවරක් අස්වැන්න නෙළා ගත හැකිය. කඳේ පොත්ත දුඹුරු පැහැයට හැරෙන විට සහ කඳේ විෂ්කම්භය සෙන්ටිමීටර 3-5 ක් පමණ වන විට අස්වනු නෙළීම සිදු කෙරේ. පොත්ත ඉවත් කිරීමට පෙර අස්වනු නෙළන ලද දඩු වලින්, අතු සහ කොළ ඉවත් කර, අස්වැන්න නෙළන ලද දඩු එදිනම පොතු ඉවත් කිරීම සඳහා භාවිතා කළ යුතුය. කුරුඳු අතුරු බෝගයක් ලෙස වගා කරන ලද පොල් අක්කරයකින් වාර්ෂිකව කුරුඳු කිලෝග්‍රෑම් 200-250 ක් පමණ අස්වැන්නක් ලබා ගත හැකිය.

පොල් ඉඩම් වල අතුරු බෝගයක් ලෙස ඉඟුරු වගා කිරීම

ඉඟුරු යනු පොල් ඉඩම්වල පහසුවෙන් අතුරු බෝග ලෙස වගා කළ හැකි ජනප්‍රිය කුළුබඩු බෝගයකි. දේශීය ඉඟුරු නිෂ්පාදනයෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් පොල් ඉඩම්වල වගා කරන ඉඟුරු වලින් ලැබේ. දේශීය සහ හඳුන්වා දුන් ප්‍රභේද කිහිපයක් ශ්‍රී ලංකාවේ මහා පරිමාණයෙන් වගා කෙරේ. ඉඟුරු දිවයින පුරා වගා කෙරෙන නමුත් තෙත් සහ අතරමැදි කලාප වල ප්‍රධාන වශයෙන් වගා කෙරේ. කුරුණෑගල, මහනුවර, ගම්පහ, කොළඹ සහ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්ක ඉඟුරු වගා කරන ප්‍රධාන ප්‍රදේශ වේ. ඉඟුරු ප්‍රධානවම පොල් සමඟ අතුරු බෝගයක් ලෙස සහ ගෙවතු වගාවක් ලෙස වගා කෙරේ.




ප්‍රභේද

දේශීය ඉඟුරු - රයිසෝම කුඩා වන අතර රයිසෝමය අළු සුදු පැහැයෙන් යුක්ත වේ. අනෙකුත් ඉඟුරු ප්‍රභේදවලට වඩා සැර බව සහ සුවඳ සාපේක්ෂව ඉහළ ය. පාන වර්ග සඳහා බහුලව භාවිතා වේ.

චීන ඉඟුරු - රයිසෝමය විශාල වන අතර මාංශල බව සාපේක්ෂව වැඩිය. රයිසෝමය සුදු කහ පැහැයෙන් යුක්ත වේ. සැර බව සහ සුවඳ අඩුය. අවිචාරු සඳහා බහුලව භාවිතා වේ.

රැන්ගුන් ඉඟුරු - රයිසෝම මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ වන අතර හොඳින් වර්ධනය වූ ඇඟිලි ඇත.



පැළ සිටුවීමේ ක්‍රමය - අවුරුදු 20 ට වැඩි පොල් වගාවන් මේ සඳහා සුදුසු වේ. ක්ෂේත්‍රය සෙන්ටිමීටර 35-40 ක් ගැඹුරට සීසා පස සකස් කර ගත යුතුය. පාත්ති වල දිග සහ පළල සෙන්ටිමීටර 105 ක් හෝ තිබෙන ඉඩ ප්‍රමාණය අනුව වෙනස් කරගත හැක. කෙසේ වෙතත්, පොල් සමඟ අතුරු බෝගයක් ලෙස වගා කරන විට දිග සහ පළල ලබා ගත හැකි ඉඩ ප්‍රමාණය අනුව වෙනස් කළ හැකිය. පාත්තිවල උස සෙන්ටිමීටර 22 ක් විය යුතු අතර පාත්ති අතර සෙන්ටිමීටර 45 ක ගැඹුරකින් යුත් කාණුවක් සකස් කළ යුතුය. පැළ අතර මීටර් 0.25 x මීටර් 0.25 ක පරතරයක් සුදුසු වේ. පොල් අක්කරයක වගා කිරීම සඳහා බීජ ඉඟුරු කිලෝග්‍රෑම් 600 - 800 ක් පමණ අවශ්‍ය වේ.

පොල් ඉඩම් වල අතුරු බෝගයක් ලෙස කහ වගා කිරීම


කහ ඉන්දියාවේ වසර 5,000 කට වඩා වැඩි කාලයක් තිස්සේ භාවිතා කර ඇත. මුලදී, එහි දිප්තිමත් කහ පැහැය නිසා එය සායම් ලබා ගැනීමට වගා කරන ලද අතර එය විශිෂ්ට වර්ණක කාරකයක් ලෙස සලකන ලදී. කාලයත් සමඟ එහි බහුකාර්ය යෙදීම් සොයා ගත් අතර, එය රූපලාවන්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා භාවිතා කිරීමටත්, අවසානයේ ඖෂධයක් ලෙසත් භාවිතා කරන ලදී. ශ්‍රී ලංකාවේ තෙත් සහ අතරමැදි කලාපවල කහ තනි බෝගයක් ලෙස මෙන්ම පොල් වගාව යටතේ අතුරු බෝගයක් ලෙස ද වගා කෙරේ. ප්‍රධාන වශයෙන් කහ වගා කරන දිස්ත්‍රික්ක වන්නේ කුරුණෑගල, ගම්පහ, කළුතර, මහනුවර, මාතලේ සහ අම්පාරය.



ප්‍රභේද - දේශීයව වගා කරන ලද ප්‍රභේද ගණනාවක් තිබුණද, ඒවා හඳුනාගෙන නොමැත. ආනයනික ප්‍රභේද වන ගන්ටර්, පූනා සහ මදුරාසි මජල් ලබා ගත හැකි අතර ඒවා දේශීය ප්‍රභේද සමඟ මිශ්‍ර කර ඇත.

කහ වල රයිසෝම වර්ග දෙකකට වර්ගීකරණය කර ඇත. මව් රයිසෝම සහ ඇඟිලි රයිසෝම ලෙස රයිසෝම වර්ග දෙකක් කහ වල දක්නට ලැබේ. මෙරූ ඇඟිලි රයිසෝම සුදුසු රෝපණ ද්‍රව්‍යවේ. රයිසෝම කැල්ලක බර ග්‍රෑම් (30-35) ක් විය යුතු අතර අංකුර 1-2 ක් තිබිය යුතුය.

පැළ සිටුවීමේ ක්‍රමය - කහ අතුරු බෝගයක් ලෙස වගා කිරීම සඳහා අවුරුදු 20 ට වැඩි පොල් ඉඩම් සුදුසු වේ. ක්ෂේත්‍රය සෙන්ටිමීටර 35-40 ක් ගැඹුරට සීසා පස සකස් කළ යුතුය. පාත්ති වල පළල සෙන්ටිමීටර 120 ක් සහ දිග මීටර් 3.0 ක් විය යුතුය. කෙසේ වෙතත්, පොල් සමඟ අතුරු බෝග වගා කරන විට, දිග සහ පළල ලබා ගත හැකි ඉඩ ප්‍රමාණය අනුව වෙනස් කළ හැකිය. පාත්ති වල උස සෙන්ටිමීටර 20 ක් පමණ වන අතර, පාත්ති අතර සෙන්ටිමීටර 30 ක් ගැඹුරකින් යුත් කාණු සකස් කළ යුතුය. පැළ අතර මීටර් 0.3 x මීටර් 0.3 ක පරතරයක් සුදුසු වේ. අක්කරයක පොල් වගාවක් සඳහා බීජ කහ කිලෝග්‍රෑම් 600 - 800 ක් පමණ අවශ්‍ය වේ.




පොල් ඉඩම් වල අතුරු බෝගයක් ලෙස කජු වගා කිරීම

නියඟයට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව සහ අඩු නිෂ්පාදන පිරිවැය හේතුවෙන් කජු ඉතා ජනප්‍රිය වාණිජ බෝගයකි. කජු සඳහා සාරවත් පසක් අවශ්‍ය නොවන අතර ආන්තික ඉඩම් මේ සඳහා සුදුසු වේ. එබැවින්, ශ්‍රී ලංකාවේ කජු වගාව තව දුරටත් ව්‍යාප්ත කිරීමේ වැඩි විභවයක් පවතී. වර්තමානයේ එය පුත්තලම, වනාතවිල්ලුව, මන්නාරම සහ මඩකලපුව යන ප්‍රදේශවල වගා කෙරේ.



ප්‍රභේද - ශ්‍රී ලංකා කජු සංස්ථාව හා වයඹ විශ්ව විද්‍යාලය මගින් එක්ව දියුණු කළ "WUCC" කාණ්ඩවල ප්‍රභේද (WUCC 05, WUCC 08, WUCC 09, WUCC 13, WUCC 19 and WUCC 21) කජු සංස්ථාවෙන් ලබා ගැනීමට නිර්දේශ කරනු ලැබේ.

පරතරය - පොල් අල්ලිය මැද එක් කජු පැළයක් සිටුවීම නිර්දේශ කරයි




පැළ සිටුවීමේ ක්‍රමය - අතරමැදි සහ වියළි කලාපීය ප්‍රදේශ වල පිහිටා ඇති ඵලදාව අඩු පොල් ඉඩම් කජු වගා කිරීමට යෝග්‍ය වේ. කජු අතුරු බෝගයක් ලෙස වගා කිරීම සඳහා පුළුල් පරතරයක් ඇති පොල් ඉඩම් වඩාත් සුදුසු වේ. පොල් අල්ලිය මැද සෙ.මී. 60 x 60 x 60 වළක් කපා එයට පොල් ලෙලි තට්ටුවක් හා කොම්පෝස්ට් යෙදීම මගින් කජු පැළයේ වර්ධනය ඉක්මන් වේ.

අස්වනු නෙළීම - සාමාන්‍යයෙන් කජු මල් හට ගන්නේ ජනවාරි මාසයේදීය. ගම්පහ වැනි ප්‍රදේශ වල ඵලදා කාලය පෙබරවාරි සිට මැයි දක්වා වේ. පුත්තලම වැනි ප්‍රදේශ වල එය මාර්තු සිට ජුනි දක්වා වේ. එක් කජු ගසකින් සාමාන්‍යයෙන් ලැබෙන ඵලදාව වසරකට කිලෝ 5 ක් පමණ වේ. වැඩි දියුණු කරන ලද වගා ක්‍රම යටතේ ගසකින් කිලෝ 10 ට වඩා ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබේ.

පොල් ඉඩම් වල අතුරු බෝගයක් ලෙස මඤ්ඤාක්කා වගා කිරීම

මඤ්ඤාක්කා යනු ලොව පුරා මිලියන (500) කට අධික ජනතාවකට පරිභෝජනය කරන ප්‍රධාන ආහාර බෝගයකි. එය අඛණ්ඩ අස්වැන්නක් ලබා දෙන හා මිල අඩු ආහාර ප්‍රභවයක් වන අතර, විශේෂයෙන් අඩු ආදායම්ලාභී රටවල ජනතාවගේ ආහාර කාබෝහයිඩ්‍රේට් අවශ්‍යතා සපුරාලීමෙන් ගෝලීය ආහාර සුරක්ෂිතතාව සහතික කරයි. තෙත්, අතරමැදි සහ වියළි කලාපවල පොල් ඉඩම් මඤ්ඤාක්කා වගා කිරීම සඳහා සුදුසු වේ. මෙම බෝගය ගම්පහ, ඇඹිලිපිටිය සහ මොණරාගල ප්‍රදේශවල වාණිජමය වශයෙන් වගා කරන අතර, මහා පරිමාණ වගාකරුවන් එකම භූමියක අඛණ්ඩව මඤ්ඤාක්කා වගා කරයි.



ප්‍රභේද - MU-51, කිරි කවඬි, CAR 5555, සුරනිමල, ස්වර්ණ, ශානි, HORDI-MU-1, HORDI 06


පරතරය - අතු හොඳෙහි ප්‍රභේද සඳහා පැළ අතර පරතරය - මීටර් 0.9 x මීටර් 0.9 ; අතු බෙදෙන ප්‍රභේද සඳහා පැළ අතර පරතරය මීටර් 1.2 x මීටර් 1.2

පැළ සිටුවීමේ ක්‍රමය - අවුරුදු 5 ට අඩු පැළ සහිත පොල් ඉඩම් සහ අවුරුදු 30 ට වැඩි පොල් ඉඩම් මේ සඳහා සුදුසු වේ. රෝපණ ද්‍රව්‍ය ලෙස සෙන්ටිමීටර් 10-15 ක දඬු කැබලි භාවිතා කරනු ලැබේ. ශක්තිමත් වගාවක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ඒවා වියළීමට පෙර සිටුවිය යුතුය. පසෙහි තෙතමනය ඇති විට සිටුවීම සිදු කළ යුතුය. වඩාත් ජනප්‍රිය ක්‍රමය වන්නේ දඬු කැබලි අංශක 45 ක කෝණයකින් සිටුවීමයි.

අස්වනු නෙළීම - සිටුවන වර්ගය අනුව අල මේරීමට ගතවන කාලය මාස 6-12 දක්වා වෙනස් වේ. අල මෝරා ඇති බව හඳුනා ගැනීමේ ලක්ෂණ වන්නේ පත්‍ර හැලි යාම, කඳ දුඹුරු වර්ණයට හැරීම, සහ සමහර අවස්ථාවන් වල දී අල මේරීම නිසා පසේ ඉරි තැලීම ඇතිවීමයි. සාමාන්‍යයෙන්, එක් මඤ්ඤාක්කා ගසකින් කිලෝග්‍රෑම් 3-10 ත් අතර අස්වැන්නක් ලබා ගත හැකිය.

පොල් ඉඩම් වල අතුරු බෝගයක් ලෙස අනෝදා වගා කිරීම

අනෝදා යනු අනෝනාසියේ කුලයට අයත් නිවර්තන පලතුරක් වන අතර එයට විශේෂ 119 ක් පමණ ඇතුළත් වේ. වඩාත් ජනප්‍රිය විශේෂය වන්නේ කටු අනෝදා *Annona muricata* යි. බටහිර ඉන්දීය කොදෙව්, ඇමරිකාව, අප්‍රිකාවේ පහත්බිම් ප්‍රදේශ, පැසිෆික් දූපත් සහ අග්නිදිග ආසියාව ඇතුළු නිවර්තන සහ සමහර උපනිවර්තන ප්‍රදේශවල කටු අනෝදා බහුලව ව්‍යාප්ත වේ. එසේ නිබිදීමත්, කටු අනෝදා පලතුර සහ එම ශාකයෙහි අනෙකුත් කොටස් භාවිතය ඉතාමත් අවම වේ. මෙම ගස සෘජුව පිහිටා, අතු බෙදී ඇති අතර සාමාන්‍යයෙන් මීටර් 8 සිට 10 දක්වා උසකට වර්ධනය වේ.



Annona muricata L. ශාකය

ප්‍රභේද - දේශීය ප්‍රභේද වඩාත් සුදුසු වේ.


පරතරය - පැළ දෙකක් අතර මීටර් 2.5 ක පරතරයක් සහිතව නව පේළි ලෙස සිටුවන්න.

පැළ සිටුවීමේ ක්‍රමය - සෙන්ටිමීටර් 60 x සෙන්ටිමීටර් 60 x සෙන්ටිමීටර් 60 ප්‍රමාණයේ වළවල් සකස් කර මතුපිට පස් හා ගොම/කොම්පොස්ට් සම ප්‍රමාණයෙන් මිශ්‍ර කර සකසාගත් මාධ්‍යයෙන් පුරවා සතියකට පමණ පසු තෝරාගත් නිරෝගි පැළ සිටුවිය යුතුය.

කප්පාදු කිරීම - සිට වූ පැළය මීටර් 1 පමණ උසට වැඩුණු පසු සෙ.මී 80-90 පමණ උසකින් කපා දැමීම කළ යුතුයි. විවිධ දිශා වලට යොමු වූ අතු 3-4 ක් පමණක් වැඩීමට සලස්වන්න. අතු එකිනෙක අතර අඩියක් පමණ පරතරයක් පවත්වා ගන්න. ගස මැදට නිරූපිලිය හොඳින් වැටෙන පරිදි වියන සකසන්න. ප්‍රාථමික අතු සෙ.මී. 40 ක් පමණ දුරින් නැවත කපා ද්විතියික අතු වර්ධනයට සලස්වන්න. ද්විතියික අතු සෙ.මී. 30 ක් පමණ දුරින් නැවත කපන්න. තෘතියික අතු සෙ.මී. 20 ක් පමණ දුරින් නැවත කපන්න. මෙලෙස සෑම දිශාවකටම සමබරව ගසේ අතු විහිදීමට සලස්වන්න.

ගස මීටර් 3-3.5 ක් පමණ උසට පවත්වා ගන්න.

අස්වනු නෙළීම - අනෝදා වල රසය නිසි ලෙස විඳීමට නම් නිවැරදි පරිණාත අවධියේදී එල නෙළාගැනීම සිදුකළ යුතුය. ඒ සඳහා එලාවරණයේ පැහැය හා නෙර්මි වල ස්වභාවය වෙනස් වීම හඳුනා ගැනීම වැදගත් වේ. මෙහිදී කටු අනෝදා එලයේ පිරුණු බවත්, එලාවරණය තද කොළ පැහැයේ සිට ලා කහ කොළ පැහැයට වෙනස්වීමත්, නෙර්මි/කටු අඟවීම සිදුවී එලාවරණය තරමක සුමුදු තත්ත්වයකට පත්වීමත් දැක්විය හැකිය. එල නෙළීම පෙ.ව. 10 ට පෙර හා ප.ව. 3.00 න් පසු සිදු කළ යුතු අතර වැසි සහිත දින මග හැරිය යුතුයි. අස්වැන්න නෙළීමෙන් දින 3-5 කට පසුව ගෙඩි ඉඳීම සිදුවේ.



පොල් ඉඩම් වල අතුරු බෝගයක් ලෙස පැපෝල් වගා කිරීම

පැපෝල් ඉතා ජනප්‍රිය හා පෝෂ්‍යදායී පලතුරකි. එය වසර පුරා අස්වැන්න ලබා දෙන බැවින් ගොවීන්ට ක්ෂණික ආදායමක් ලබා දෙන පලතුරකි. පැපෝල් වෙළඳපොළේ බහුලව ලබා ගත හැකි, පාරිභෝගිකයින් විසින් බෙහෙවින් ප්‍රිය කරන පලතුරකි. තෙත්, අතරමැදි, හා වියළි යන කලාප තුනෙහිම පැපෝල් වගා කළ හැකිය. ජල සම්පාදන තත්ත්ව යටතේ වියළි කලාපවල ඉහළ අස්වැන්නක් ලබා දෙයි.




ප්‍රභේද - රන්න, රෙඩ් ලේඩ්, හොරණ පපායා හයිබ්‍රිඩ් - 1

පරතරය - පැළ දෙකක් අතර මීටර් 3 ක පරතරයක් සහිතව දෙපේළි ලෙස සිටුවන්න

පැළ සිටුවීමේ ක්‍රමය - නැවත හෝ නව පොල් වගාව සමග සහ හොඳින් හිරු එළිය ලැබෙන පොල් ඉඩම් සුදුසු වේ. බොරළු වැනි තද පසක් ඇති බිමක, සෙ.මී 60 x 60 x 60 වළවල් කැපීය යුතු අතර, වැලි පසක නම් සෙ.මී 30 x 30 x 30 වළක් කැපීය යුතුය. සිටුවන වළ කොම්පෝස්ට් වලින් පුරවා පැළ සිටුවිය යුතුය. සිටුවන විට එක් වළක පැළ 02 ක් පමණ සිටුවන්න. මල් පිපීම සමග නුසුදුසු පැළ ඉවත් කළ හැකිය.

අස්වනු නෙළීම - හොඳ ඵලදාවක් ලබාදීමට මාස 10-12 ක කාලයක් ගතවේ. එක ගසකට ගෙඩි 30-40 ක් ලබා ගත හැකියි. අවුරුදු 3 පමණ කාලයක් අස්වැන්න නෙළිය හැකිය.



පොල් ඉඩම් වල අතුරු බෝගයක් ලෙස අඹ වගා කිරීම

අඹ යනු ලෝකයේ වඩාත්ම වැදගත් සහ බහුලව වගා කරනු ලබන නිවර්තන පලතුරකි. බොහෝ විට “පලතුරු වල රජු” ලෙස හඳුන්වනු ලබන එය ඇතකාඩියේසී කුලයට අයත් වන අතර වසර 5,000 කට පෙර ඉන්දු-චීනයේ කලාපයේ පළමුව වගා කරන ලදී. විටමින් A and C, වලින් පොහොසත් අඹ, ලොව පුරා ප්‍රමුඛ පලතුරු බෝගයක් ලෙස ස්ථාපිත වී ඇත. අඹ නියගයට ඔරොත්තු දෙන ශාකයක් වන අතර එහි නඩත්තු වියදම් අඩු වීම නිසා පොල් ඉඩම් වල අතුරු බෝගයක් ලෙස ජනප්‍රිය වී ඇත. පළිබෝධ සහ රෝග හානි අවම වන අතර, ඉහළ වෙළඳපොළ ඉල්ලුමක් පවතී. වගාකරුවන් සාමාන්‍යයෙන් තම ගෙවතු වල ද අඹ ගස් වගා කිරීමට පුරුදු වී ඇත.




ප්‍රභේද - විවිධ දේශගුණික තත්ත්ව යටතේ ඒවායේ අනුවර්තනය වීමේ හැකියාව අනුව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අඹ ප්‍රභේද හඳුන්වා දෙන ලදී. ඉහළ අස්වැන්න, රසය සහ කල් පවත්නා ගුණය යන සාධක පදනම් කොට ගෙන ප්‍රභේද තෝරා ගෙන ඇත. විවිධ කලාප සඳහා නිර්දේශිත අඹ ප්‍රභේද පහත පරිදි වේ.

- තෙත් කලාපය** - හොරණ හිරු, වෙල්ලෙයිකොලොම්බන්, දම්පාර, ගිරා අඹ
- අතරමැදි කලාපය** - කර්තකොලොම්බන්, වෙල්ලෙයිකොලොම්බන්, මල්වාන
- වියළි කලාපය** - කර්තකොලොම්බන්, විලාඩ්, TOM EJC, මල්වාන

මෑතකදී ජනප්‍රිය වී ඇති කර්තකොලොම්බන් සහ TOM EJC, සඳහා ඉහළ වෙළඳපොළ ඉල්ලුමක් පවතී. TOM EJC අඹ විශාල, කහ පැහැති සහ ඉතා රසවත් ය. මෙම බීජ පැළ සඳහා ඉහළ ඉල්ලුමක් ඇති අතර බද්ධ කරන ලද ඒවා සිටුවීමට වඩාත් සුදුසු වේ. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සහතික කරන ලද බීජ පැළ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ හි අනුමත තවත් වලින් ලබා ගත යුතුය.

පරතරය - පොල් අල්ලිය මැද එක් අඹ පැළයක් සිටුවීම නිර්දේශ කරයි.

බිම් සකස් කිරීම - පොල් අල්ලිය මැද මීටර් 1 x 1 x1 ප්‍රමාණයේ වළක් කපා පොල් ලෙලි හා ගොම හෝ කොම්පෝස්ට් පොහොර යොදා පැළය සිටුවීමට වළ සකස් කළ යුතුය.



රෝපණ ද්‍රව්‍ය - කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සහතික කරන ලද බද්ධ පැළ සිටුවීම නිර්දේශ කෙරේ. පැළය අයත් ප්‍රභේදයේ නම සහ අංකයක් සඳහන් ලේඛනයක් සහිතව එවැනි පැළ අලෙවි කරනු ලැබේ.

Should be me<

ගස් පුහුණු කිරීම: මෙහිදී පළමුවෙන් කළ යුතු වන්නේ සිටුවන අඹ පැළය පොළව මට්ටමේ සිට සෙන්ටිමීටර් 50 ක් පමණ උසක් දක්වා තනි කඳක් වශයෙන් වැඩිමට ඉඩ හැරීමයි. ඉන්පසු, බද්ධ පැළ වල අග්‍රස්ථය ඉවත් කිරීම මගින් හරස් රිකිලි ලබා ගන්න. හරස් රිකිලි පරිණත වූ පසු, ඒවායේ ද අග්‍රස්ථය ඉවත් කිරීම මගින් හරස් රිකිලි ලබා ගන්න. මෙසේ ප්‍රධාන කඳේ සිට තවත් අතු 3-4 ක් පමණ සංඛ්‍යාවක් වැඩිමට සලස්වන්න. ඊට අමතරව, අයෝග්‍ය ,සෙවණ වැටෙන අතු, එකිනෙකට ගැටෙන, රෝගී මැරුණු අතු ඉවත් කරන්න.

සත්ත්ව පාලනය

ඒකාබද්ධ කුකුළු පාලනය

පොල් වගාව සමග කුකුළු පාලනය ඒකාබද්ධ කිරීම මගින් පොල් වගා භූමිය කාර්යක්ෂම සහ නිරසාර අන්දමින් භාවිතා කළ හැක. පොල් ගස් වලින් ලැබෙන ස්වභාවික සෙවණ, සතුන්ට කටුක කාලගුණික තත්ත්වයන්, අධික උෂ්ණත්වය සහ විලෝපිකයන්ගෙන් ආරක්ෂාව සැපයීමට උපකාරී වේ. මෙම ක්‍රමය යටතේ බිත්තර නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිතා කරන ලේයර් කුකුළු විශේෂය හෝ මස් නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිතා කරන බ්‍රොයිලර් කුකුළු විශේෂය යන ඕනෑම විශේෂයක් සාර්ථකව ඇති කළ හැක. කුකුළු පාලනය සඳහා නිදැලි ක්‍රමය හෝ අර්ධ සුක්ෂම ක්‍රමය භාවිතා කළ හැකි අතර, එමගින් පොල් වගා පද්ධතියට අතිරේක ආදායම් මාර්ගයක්ද සපයයි.



පොල් ඉඩම් වල කුකුළු පාලනය

කුකුළන් නිදැල්ලේ ඇති කිරීම මගින් වගා භූමියේ වල් පැළෑටි පාලනය ස්වභාවිකව සිදු වන අතර, ඔවුන්ගේ මළ ද්‍රව්‍ය පසට එකතු වීමෙන් පසෙහි පෝෂක මට්ටම වැඩිවී පසෙහි සාරවත්භාවය වැඩි දියුණු වේ.

එක් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයකට පහසුවෙන් මාරු කළ හැකි ස්ථීර නොවන (mobile) කුකුළු නිවාස භාවිතා කිරීමෙන්, සතුන් වගා භූමිය පුරා ක්‍රමවත් ලෙස ස්ථානගත කළ හැකි අතර, එමගින් කුකුළු මළ ද්‍රව්‍ය (කුකුළු පොහොර) සමාන ලෙස වගා භූමිය පුරා බෙදාහැරීම සිදු වේ. මෙම ක්‍රමය මගින් පොහොර සඳහා වන වියදම් මෙන්ම වල් පැළෑටි පාලනය සඳහා වන වියදම්ද සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කරගත හැක. පොල් ගස් යට ඇති සෙවණ සහිත පරිසරයේ උෂ්ණත්වය සාමාන්‍ය විවෘත පරිසරයට වඩා අඩු බැවින්, සතුන් දැඩි නිරු රක්ෂයෙන් ආරක්ෂා වන අතර, එය ඔවුන්ගේ වර්ධනය, බිත්තර නිෂ්පාදනය සහ මස් නිෂ්පාදනය වැඩි වීම සඳහා දායක වේ.

දිවා කාලයේදී කුකුළන් පොල් වගා භූමිය තුළ නිදැල්ලේ ඇති කළ හැකි අතර, එහි ඇති තණකොළ, කෘමීන් සහ අනෙකුත් ස්වභාවික දෑ ආහාරයට ගැනීම මගින් දිනපතා ලබා දිය යුතු සාන්ද්‍ර ආහාර ප්‍රමාණයද අඩු කළ හැක. කෙසේ වෙතත්, සාර්ථක ඒකාබද්ධ ගොවිපොළ පාලනය සඳහා ක්‍රමවත් ලෙස කුකුළු නිවාස ඉදි කිරීම හා පිරිසිදු කිරීම, රෝග නිවාරණ ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කිරීම, විලෝපික සතුන්ගෙන් ආරක්ෂාව සැපයීම, පෝෂ්‍යදායී ආහාර සහ පිරිසිදු ජලය සැපයීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

ඒකාබද්ධ එළු පාලනය

පොල් වගාව යටතේ එළු පාලනය ද සාර්ථක සහ නිරසාර ඒකාබද්ධ ගොවිතැන් ක්‍රමයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කළ හැක. එළුවන් පුළුල් පරාසයක ශාක වර්ග ආහාර ලෙස භාවිතා කරන බැවින්, පොල් වගා භූමිය තුළ ස්වභාවික වල් පැළෑටි පාලනයක් සිදු වේ. ඒ හේතුවෙන් වල් නාශක භාවිතය සඳහා වන වියදම් මෙන්ම එයට අදාළ කම්කරු වියදම් ද සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කර ගත හැක. පැළ පොල් වගාවන්හිදී එළුවන්ගෙන් පැළ වලට සිදුවිය හැකි හානිය අවම කර ගැනීම සඳහා නිසි පරිදි ඉඳි කරන ලද ආරක්ෂක වැටක් අත්‍යවශ්‍ය වේ.

තවද, නිරසාර තෘණ කළමනාකරණයක් සඳහා පොල් වගා භූමිය කොටස් කිහිපයකට වෙන් කර, එක් කොටසකින් පසු අනෙක් කොටසට එළුවන් උලා කෑමට සැලැස්වීම (Rotational Grazing) මගින් තෘණ වර්ධනය වැඩි දියුණු කළ හැකි අතර, අධික උලාකෑම හේතුවෙන් පසට සිදුවන හානියද අවම කර ගත හැක.

කිරි, මස් සහ පැටවුන් විකිණීම මගින් ලැබෙන ආදායමට අමතරව, අතිප්‍රභව කටයුතු සඳහා උසස් ගුණාත්මක එළුවන් විකිණීම මගින්ද අමතර ආදායමක් ලබා ගත හැක. එළුවන්ගෙන් ලැබෙන ඉහළ ගුණාත්මකයෙන් යුතු මළ ද්‍රව්‍ය වගා භූමිය තුළම එකතු කර, සෘජු කාබනික පොහොරක් ලෙස හෝ කොම්පෝස්ට් බවට පත් කර පොල් වගාව සඳහා යොදා ගත හැක.



පොල් ඉඩම් වල එළු පාලනය

පොල් ගස් යට ඇති ස්වභාවික සෙවණ සතුන් දැඩි හිරු රශ්මියෙන් ආරක්ෂා කරමින් නිදැල්ලේ ගැවසීමට සහ විවේක ගැනීමට සුදුසු පරිසරයක් සපයයි. කෙසේ වෙතත්, සාර්ථක එළු පාලනයක් සඳහා නිවැරදිව ඉදි කරන ලද නිවාස, ප්‍රමාණවත් සහ පෝෂ්‍යදායී ආහාර සැපයීම, නියමිත ඖෂධ ලබා දීම සහ රෝග නිවාරණ ක්‍රියාමාර්ග, ගහණ පාලනය සහ නිසි වාර්තා තබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. දේශීය එළු විශේෂයන් සහ දෙමුහුම් එළු විශේෂයන් අඩු ආහාර අවශ්‍යතාවය සහ දේශීය පාරිසරික තත්ත්වයන්ට හොඳින් අනුගත වීමේ හැකියාව ඇති බැවින්, පොල් වගාව සමග ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ. තවද, නිසි ගහණ පාලනයක් මගින් ගහණයේ සතුන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය සහ නිෂ්පාදන කාර්යක්ෂමතාවය මනා ලෙස පාලනය කළ හැකි වේ.

ඒකාබද්ධ ගව පාලනය

පොල් වගාව යටතේ ගව පාලනය ඒකාබද්ධ කිරීම මගින්, පොල් වගා භූමිය තුළ එළු ගවයින් සහ මී ගවයින් සාර්ථකව ඇති කළ හැක. ගවයින් පොල් වගා භූමියේ ඇති වල් පැළෑටි සහ තෘණ මත යැපෙමින් ස්වභාවික වල් මර්දනයක් සිදු කරන බැවින්, වල් පාලනය සඳහා වන වියදම් සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කර ගත හැක. මෙම ඒකාබද්ධ පාලන ක්‍රමය මගින් කිරි, මස්, පැටවුන් සහ ගොම පොහොර ලබා ගත හැකි අතර, ඒ හරහා වගාකරුවාට අමතර සහ ස්ථායී ආදායම් මාර්ගයක්ද සපයයි. තවද, ගව ගොම භාවිතා කර පීච වායු (Biogas) නිපදවීමේ හැකියාවද මෙම පද්ධතිය යටතේ පවතී, එය ගොවිපොළේ ශක්ති අවශ්‍යතා සපුරාලීමටද දායක වේ. කෙසේ වෙතත්, සතුන්ගේ කුර මගින් පස තද වීමේ (Soil Compaction) අවදානම පවතින බැවින්, එමගින් ශාක වර්ධනයට හිතකර පාංශු භෞතික ගුණාංග පිරිහීම වැළැක්වීම සඳහා සතුන් ක්‍රමානුකූලව කළමනාකරණය කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. ඒ සඳහා වගා භූමිය කොටස් කිහිපයකට වෙන් කර, සතුන් එක් කොටසකින් පසු අනෙක් කොටසට මාරු කරමින් තණ උලා කෑමට සැලැස්වීම (controlled/rotational grazing) වැදගත් වේ.



පොල් ඉඩම් වල ගව පාලනය

පොල් ගස් යට ඇති ස්වභාවික සෙවණ සහ සිසිල් පරිසරය, සතුන් දැඩි හිරු රශ්මියෙන් ආරක්ෂා කරමින් නිදැල්ලේ ගැවසීමට සහ විවේක ගැනීමට සුදුසු පරිසරයක් සපයයි. දිවා කාලයේදී සතුන් නිදැල්ලේ තණ උලා කෑම සඳහා යැවිය හැකි අතර, එවැනි ස්ථානවල ප්‍රමාණවත් පරිදි පිරිසිදු ජලය සැපයීම අනිවාර්ය වේ. රාත්‍රී කාලයේදී සහ කටුක පාරිසරික තත්ත්වයන්ගෙන් සතුන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා නිසි පරිදි ඉදි කරන ලද ගව නිවාස, නියමිත ඖෂධ ලබා දීම සහ රෝග නිවාරණ ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කිරීම ඉතා වැදගත් වේ. නිසි සෞඛ්‍ය කළමනාකරණය, නිතිපතා පරීක්ෂණ සහ වාර්තා තබා ගැනීම මගින් රෝග පැතිරීම වැළැක්විය හැකි අතර, සතුන්ගේ නිෂ්පාදන කාර්යක්ෂමතාවය පවත්වා ගත හැක. අධික වැසි කාල වලදී සහ වියළි කාලගුණික තත්ත්වයන් යටතේ තෘණ හා අනෙකුත් ආහාර හිඟ වන අවස්ථා වලදී, සතුන් නිදැල්ලේ තණ උලා කෑමට නොයවා, තෘණ සහ අනෙකුත් ශාක කොටස් කපා ගෙන ගොස් ගාල තුළදී (Cut-And-Carry System) ලබා දීම මගින්, සතුන්ගේ සෞඛ්‍යය ආරක්ෂා කර ගැනීමටත්, තෘණ අස්වැන්න තිරසාර ලෙස පවත්වා ගැනීමටත් හැකි වේ. අධික වැසි කාලවල අතිරේක තෘණ අස්වැන්න සයිලේජ් (Silage) හෝ වියළි තෘණ (Hay) ලෙස සකස් කර තබා ගැනීම මගින්, වියළි කාලවලදී ගව ආහාර හිඟය අවම කර ගත හැක. නියමිත ලෙස ගහණය පාලනය කිරීම මගින් සතුන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය, නිෂ්පාදන කාර්යක්ෂමතාවය සහ පොල් වගා භූමියේ පාංශු තත්ත්වය මනා ලෙස පාලනය කළ හැකි වේ.

ඒකාබද්ධ බැටළු පාලනය

පොල් වගාව යටතේ බැටළු පාලනයේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ මස් නිෂ්පාදනයයි. ඒ සමඟම, අතිපහන කටයුතු සඳහා සතුන් විකිණීම, පැටව් විකිණීම සහ වූල් විකිණීම මගින්ද වගා කරුවාට අමතර සහ විවිධ ආදායම් මාර්ග ලබා ගත හැක. බැටළුවන් පොල් වගා භූමියේ ඇති වල් පැළෑටි සහ අනෙකුත් ශාක කොටස් ආහාර ලෙස භාවිතා කරන බැවින්, ස්වභාවික වල් මර්දනයක් සිදු වන අතර, වල් පාලනය සඳහා වන වියදම්ද අවම කර ගත හැක. තවද, බැටළුවන්ගෙන් ලැබෙන ගොම පසට එකතු වීම මගින් පාංශු ජෛව ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය සහ පෝෂක මට්ටම වැඩි දියුණු වී, පසෙහි ගුණාත්මකභාවය වැඩි වේ. කෙසේ වෙතත්, වගා භූමිය අධික උලාකෑමට (Overgrazing) ලක් වීම වැළැක්වීමට සහ තෘණ අස්වැන්න තිරසාර ලෙස පවත්වා ගැනීමට, සතුන්ගේ ගහණ ඝණත්වය නිසි ලෙස පාලනය කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

ඒ සඳහා වගා භූමිය කොටස් කිහිපයකට වෙන් කර, සතුන් එක් කොටසකින් පසු අනෙක් කොටසට මාරු කරමින් උලා කෑමට සැලැස්වීම (Rotational Grazing) වඩාත් යෝග්‍ය වේ. පොල් ගස් වලින් ලැබෙන



පොල් ඉඩම් වල බැටළු පාලනය

ස්වභාවික සෙවණ, බැටළුවන්ට නිදහස ලේ හැසිරීමට, විවේක ගැනීමට සහ දැඩි හිරු රශ්මියෙන් ආරක්ෂා වීමට සුදුසු පරිසරයක් සපයයි. සාර්ථක බැටළු පාලනයක් සඳහා, සතුන්ට ප්‍රමාණවත් ලෙස ඉඳි කරන ලද නිවාස, ආරක්ෂක වැටවල්, පෝෂ්‍යදායී ආහාර සහ පිරිසිදු ජලය සැපයීම අනිවාර්ය වේ. තවද, අවශ්‍ය අවස්ථා වලදී ප්‍රතිජීවක සහ අනෙකුත් රෝග නිවාරණ ප්‍රතිකාර ලබා දීම, නීතිපතා සෞඛ්‍ය පරීක්ෂණ සහ වාර්තා තබා ගැනීමද වැදගත් වේ. දේශීය මෙන්ම දෙමුහුම් බැටළු විශේෂ, අඩු ආහාර අවශ්‍යතාවය, ඉහළ ප්‍රතිශක්තිය සහ දේශීය පාරිසරික තත්ත්වයන්ට හොඳින් අනුකූල වීම හේතුවෙන්, පොල් වගාව සමග ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා විදේශීය බැටළු විශේෂ වලට වඩා වඩාත් සුදුසු වේ.

පොල් වගාව සමග මත්ස්‍ය පාලනය

පොල් වගාව සමග මත්ස්‍ය පාලනය ඒකාබද්ධ කිරීම මගින්, වගා භූමියේ පවතින ජල සම්පත් කාර්යක්ෂම සහ නිරසාර අන්දමින් භාවිතා කළ හැක. මේ සඳහා ස්වභාවිකව පවතින පොකුණු, දිය අගල් මෙන්ම කෘත්‍රිමව සකස් කරන ලද පොකුණුද භාවිතා කළ හැක. ජලයේ ගුණාත්මකභාවය, ජල ගැඹුර සහ පාරිසරික තත්ත්ව සලකා බැලීමෙන්, ඒ සඳහා සුදුසු මත්ස්‍ය විශේෂ තෝරා ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. පොල් ගස් වලින් ලැබෙන ස්වභාවික සෙවණ ජලයේ උෂ්ණත්වය ස්ථායී ලෙස පවත්වා ගැනීමට උපකාරී වන අතර, අනවශ්‍ය ඇල්ගී වර්ධනය අවම කරමින් මසුන්ට ජීවත් වීමට සුදුසු පරිසරයක් නිර්මාණය කරයි. මත්ස්‍යයන් ජලයේ පවතින ස්වභාවික ආහාර මත ප්‍රධාන වශයෙන් යැපෙන බැවින්, අමතර ආහාර සඳහා වන වියදම්ද අවම කර ගත හැක. මත්ස්‍යයන්ගෙන් ලැබෙන අපද්‍රව්‍ය ජලයට එකතු වීම මගින් ජලයේ පෝෂක මට්ටම ඉහළ යන අතර, එම ජලය පොල් වගාව සඳහා භාවිතා කරන විට, එම පෝෂක ද්‍රව්‍ය ගස්වලට ස්වභාවික පොහොරක් ලෙස ලැබේ. එමගින් රසායනික පොහොර භාවිතය අවම කර ගත හැකි වේ.



පොල් ඉඩම් වල මත්ස්‍ය පාලනය

වඩා සාර්ථක මත්ස්‍ය-පොල් ඒකාබද්ධ ගොවිපලක් සඳහා, නීතිපතා ජලයේ ගුණාත්මකභාවය පරීක්ෂා කිරීම, මත්ස්‍ය ගහණ ස්ථානවල නිසි ලෙස පාලනය කිරීම සහ නිවැරදි ආහාර කළමනාකරණය අත්‍යවශ්‍ය වේ. එක පොකුණක් තුළ මත්ස්‍ය විශේෂ කිහිපයක් එක්කොට ඇති කිරීම (Polyculture) මගින් පවතින සම්පත් වලින් උපරිම ප්‍රයෝජනය ලබා ගත හැකි අතර, අවදානම් සහ හානිද අවම කර ගත හැක. තවද, මෙම පද්ධතිය සමග තාරාවන් පාලනය ඒකාබද්ධ කිරීම මගින්, ජල පෘෂ්ඨය පිරිසිදුව පවත්වා ගැනීම, අමතර ආදායම් මාර්ගයක් සැපයීම සහ සමස්ත ගොවිපල කාර්යක්ෂමතාවය තවත් වැඩි දියුණු කිරීම ද සිදු කළ හැක.

ඒකාබද්ධ ගොවිතැන් ක්‍රමය

මෙම ඒකාබද්ධ ගොවිපල ක්‍රමය මගින් සම්පත් කාර්යක්ෂමව කළමනාකරණය කරමින් පොල් වගාව නිරසාර අන්දමින් පවත්වාගෙන යාමට අවස්ථාව සලසා දෙයි. මෙහිදී පොල් ගස ප්‍රධාන බෝගය ලෙස ක්‍රියා කරමින්, අනෙකුත් අතුරු බෝග වර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය ක්ෂුද්‍ර පාරිසරික තත්ත්ව සපයයි. අතුරු බෝග ලෙස වාර්ෂික සහ බහු වාර්ෂික බෝග වගා කළ හැකි අතර, ඒ සඳහා ලැබෙන හිරු එළිය, පසේ පෝෂක මට්ටම, පසේ තෙතමනය සහ අනෙකුත් පාංශු භෞතික හා රසායනික ගුණාංග පිළිබඳ සැලකිලිමත් වීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

වගා භූමියේ මායිම් ප්‍රදේශ සඳහා දැව ලබා ගැනීමේ අරමුණින් තේක්ක, මහෝගනි සහ ඇකේෂියා වැනි බහු වාර්ෂික විශාල ගස් වගා කිරීම සුදුසු වේ. එමගින් දැව විකිණීමෙන් අමතර ආදායමක් ලැබීම පමණක් නොව, පස සෝදා යාම වැළැක්වීම, ජෛව විවිධත්වය ඉහළ නැංවීම, කාබන් නිර කිරීම, වායු දූෂණය පාලනය කිරීම සහ දැඩි සුළං බලපෑම් වලින් වගාව ආරක්ෂා කිරීම ද සිදු වේ. එමෙන්ම ඉන්ධන දැව ලබා ගැනීමේ හැකියාවද පවතී.

මෙම පද්ධතිය යටතේ සත්ව ආහාර සඳහා තෘණ සහ රනිල ශාක වගා කරමින්, පොල් සමග ගව, එළු සහ බැටළු පාලනය ඒකාබද්ධ කළ හැක. තවද, පොල් වගාව සමග මී මැසි පාලනය ඒකාබද්ධ කිරීම මගින්, පොල් ඇතුළු අනෙකුත් බෝගවල පරාගන ක්‍රියාවලිය කාර්යක්ෂම වීමෙන් අස්වැන්න ඉහළ යාමට දායක වේ.

සමස්තයක් ලෙස, මෙවැනි ගොවිපල පද්ධතියක් ශෂ්‍ය විද්‍යාත්මක වශයෙන් පසෙහි ජල අවශෝෂණ හැකියාව වැඩි කරයි, පාංශු බාදනය අවම කරයි, පසෙහි සාරවත්තාවය ඉහළ නංවයි සහ වල් පැළෑටි පාලනය ස්වභාවිකව සිදු කරයි. එමෙන්ම සෙවන ප්‍රිය කරන අතුරු බෝග සඳහා ප්‍රමාණවත් සෙවණක් සපයයි. සාමාජ-ආර්ථික වශයෙන්, මෙවැනි පද්ධතියක් මගින් වැඩි රැකියා අවස්ථා සෑදූ වන අතර, ගෘහස්ථ ආහාර සුරක්ෂිතභාවය ඉහළ නැංවීමද සිදු වේ. විවිධ ආදායම් මාර්ග නිර්මාණය වීම හේතුවෙන්, පොල් වගා ඉඩමෙන් ගොවියාට ලැබෙන සමස්ත ආදායම වැඩි කර ගත හැකි වේ.

කෘෂි වන වගාව

පොල් ආශ්‍රිත දැවමය ශාක සහ ඉන්ධන ශාක යොදා ගනිමින් ක්‍රියාත්මක කරන කෘෂි වන වගා පද්ධතිවල ප්‍රධාන අරමුණු වන්නේ කාර්යක්ෂම සම්පත් කළමනාකරණය, උපරිම ආර්ථික වාසි ලබා ගැනීම සහ පාරිසරික වශයෙන් තිරසාර ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමයි. මෙහිදී පොල් ශාකය ප්‍රධාන බෝගය ලෙස වර්ධනය වෙමින් ඉහළම ශාක ස්ථරය නිර්මාණය කරයි. වගා භූමියේ මායිම් ප්‍රදේශවල දැව නිෂ්පාදනය සඳහා තේක්ක, මහෝගනී සහ ඇකේෂියා වැනි බහු වාර්ෂික විශාල ගස් වගා කිරීම සුදුසු වේ. මීට අමතරව, වේගවත් වර්ධනයක් පෙන්වන ග්ලිරිසිඩියා සහ ඉපිල්-ඉපිල් වැනි ශාක ඉන්ධන දැව සහ හරිත පොහොර ලෙස වගා කළ හැක. රනිල කුලයට අයත් මෙම ශාක වායුගෝලයේ ඇති නයිට්‍රජන් තිර කර පසට එක් කරන බැවින්, ශාකවලට අවශේෂණය කළ හැකි නයිට්‍රජන් පෝෂක මට්ටම ඉහළ නංවයි.

මෙවැනි විවිධාංගීකරණය වූ ඒකාබද්ධ පද්ධතියක් තුළ විවිධ නිෂ්පාදන හරහා ආදායම් මාර්ග රැසක් නිර්මාණය වන බැවින්, පොල් තනි වගාවක් ලෙස පවත්වාගෙන යාමේදී ඇතිවන ආර්ථික අවදානම සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වේ. එමෙන්ම පාංශු තත්ත්වයන් වැඩි දියුණු වීම, ජෛව විවිධත්වය ඉහළ යාම සහ දේශගුණික විපර්යාසයන්ට අනුගත වීමේ හැකියාව වැඩි වීමද මෙවැනි පද්ධතියක ප්‍රධාන වාසි වේ. සුදුසු බෝග විශේෂ තෝරා ගැනීමේදී, වෙළඳපොළ ඉල්ලුම සහ ලාභදායීතාව, ඉඩම පිහිටි ප්‍රදේශයේ දේශගුණික තත්ත්ව (තෙත් / අතරමැදි / වියළි කලාප), වගාවේ වයස සහ පරතරය අනුව පොළව මතට ලැබෙන සූර්යාලෝක ප්‍රමාණය, ශාක අතර තරඟය අවම කිරීම, පස් වර්ගය සහ එහි ගුණාංග, මෙන්ම වගාකරුවන්ගේ පළපුරුද්ද යන කරුණු සැලකිල්ලට ගත යුතු ය. එමෙන්ම, පද්ධතිය නිරන්තරයෙන් අධීක්ෂණය කරමින් අවශ්‍ය කළමනාකරණ ක්‍රියාමාර්ග යටාකාලින ව ක්‍රියාත්මක කිරීම තිරසාර කෘෂි වන වගාවක් සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වේ.



පොල් ඉඩම් වල ග්ලිරිසිඩියා වගා කිරීම

මී මැසි පාලනය

පොල් වගා භූමිය තුළ මී මැසි පාලනය සිදු කිරීම මගින් මී පැණි සහ මී ඉටි වැනි නිෂ්පාදන විකිණීමෙන් අමතර ආදායමක් ලබා ගත හැකි අතර, පරාගනය වැඩිදියුණු වීම හේතුවෙන් පොල් අස්වැන්න ද 30-40% කින් පමණ ඉහළ යා හැක. පොල් ගස් යට ඇති ස්වභාවික සෙවණ සහ සිසිල් පරිසරය මී මැස්සන් දැඩි හිරු රශ්මියෙන් ආරක්ෂා කරමින් ඔවුන්ට ජීවත් වීමට සුදුසු වාසස්ථානයක් සපයයි. මී මැස්සන් අඳුරු හා සිසිල් ස්ථානවල වාසයට ප්‍රිය බැවින්, තද හිරු එළිය සෘජුව නොවැටෙන ස්ථානවල මී මැසි පෙට්ටි ස්ථානගත කිරීම වැදගත් වේ.

මෙම ක්‍රියාකාරකම් සඳහා අවශ්‍ය ඉඩ ප්‍රමාණය අඩු බැවින්, අනෙකුත් වගා කළමනාකරණ කටයුතු සඳහා විශාල බාධාවක් නොවේ. එමෙන්ම, පොල් වගාව සමඟ මල් පිපෙන අතුරු බෝග හෝ ආවරණ බෝග වගා කිරීම මගින් මී මැස්සන්ට වසර පුරාම ආහාර මූලාශ්‍ර සපයා දිය හැකි අතර, එය මී පැණි නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීමටද උපකාරී වේ. වගා භූමියේ පිරිසිදුභාවය පවත්වා ගැනීම, විලෝපික සතුන් සහ කෘමීන්ගෙන් මී මැස්සන් ආරක්ෂා කිරීම.



පොල් ඉඩම් වල මී මැසි පාලනය

රසායනික කෘමිනාශක භාවිතය අවම කිරීම හෝ නිසි ලෙස කළමනාකරණය කිරීම ඉතා වැදගත් වේ. විශේෂයෙන්ම, පරාගනයේ උපරිම ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමට සහ ජනපද ශක්තිමත් කර තබා ගැනීමට නිසි පරිදි මී මැසි පෙට්ටි පරීක්ෂා කිරීම, රෝග පාලනය, සහ ජනපද වර්ධනය කළමනාකරණය කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. මෙලෙස, පොල් වගාව සමඟ ඒකාබද්ධව මී මැසි පාලනය ක්‍රියාත්මක කිරීම ආර්ථික වශයෙන් මෙන්ම පාරිසරික වශයෙන් ද වාසි රැසක් ලබා ගත හැකි තිරසාර වගා ක්‍රමයක් ලෙස හඳුනා ගත හැක.

පාංශු සාරවත් බව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා බිම්පණු පොහොර නිෂ්පාදනය

පොල් වගාව තුළ බිම් පණු පොහොර නිෂ්පාදනය කිරීම අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය සහ පාංශු සාරවත් බව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ප්‍රායෝගික සහ තිරසාර ප්‍රවේශයකි. මෙහිදී, පොල් අතු, පොල් ලෙලි, වල් පැළෑටි, සහ සත්ව පොහොර භාවිතා කරමින් අයිසීනියා ෆෙටිඩා (*Eisenia fetida*) නැමති බිම් පණුවන්ගේ ජීව විද්‍යාත්මක ක්‍රියාකාරකම් හරහා උසස් තත්ත්වයේ කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය කරයි.

පොල් වගාවන් ස්වභාවිකවම බිම් පණුවන්ගේ පැවැත්මට සහ ප්‍රජනනයට සුදුසු සෙවණ සහිත සහ තෙතමනය සහිත පරිසරයක් ලබා දෙයි. එබැවින්, අවම යෙදවුම් යටතේ වැඩි වටිනාකමකින් යුතු පාරිසරික හා කෘෂි විද්‍යාත්මක ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන බිම්පණු පොහොර නිෂ්පාදන ඒකකයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා පොල් වගාවන් ඉතාමත් සුදුසු වේ.

බිම් පණු පොහොර නිෂ්පාදනයේ පියවර

1. සුදුසු ස්ථානයක් තෝරා ගැනීම සහ බිම් පණු පොහොර නිෂ්පාදන ඒකකය සකස් කර ගැනීම:

මෙහිදී, වහලය සහිත ගොඩනැගිල්ලක් අවශ්‍ය වන අතර, එය තුළ, මීටර් 1.8 ක් පමණ පළල, මීටර් 0.9 ක් පමණ උස සහ අවශ්‍යතාවයට සරිලන පරිදි දිගකින් යුතු, ටැංකි ඉදිකර ගත යුතුය. සාදා ගනු ලබන ටැංකියේ පතුලෙන්, ගැඩවිල් පණුවන් පස තුළට ගමන් කිරීම සහ පෝෂක පස තුළ කාන්දු වීම වැළැක්වීමට, ටැංකියේ පතුල කොන්ක්‍රීට් හෝ සිමෙන්ති යොදා ආස්ථිරණය කර ගත යුතුය.

2. අමුද්‍රව්‍ය සකස් කර ගැනීම:

බිම් පණු පොහොර සෑදීම සඳහා යොදා ගන්නා කාබනික අපද්‍රව්‍ය දින 10-15ක් අතර කාලයක්, පළමුව ක්ෂුද්‍රජීවී ක්‍රියාකාරකම් යටතේ දිරාපත් වීමට ඉඩ හරින්න. මේ සඳහා කැබලි කරගන්නා ලද පොල් ලෙලි, ආවරණ බෝග වල කොටස්, සහ ගව පොහොර වැනි දෑ භාවිතා කළ හැක. මෙම මිශ්‍රණයේ සමතුලිත C:N අනුපාතයක් (20:1), මධ්‍යස්ථ තෙතමනයක් සහ උදාසීන pH අගයක් තිබිය යුතුය.

3. අමුද්‍රව්‍ය යෙදීම:

සකස් කළ ටැංකියේ, වාතනය සඳහා විශුලි ශාක ද්‍රව්‍ය සෙන්ටිමීටර් 15 ක ස්ථරයක් පළමුව තබන්න. ඉන්පසු ගව පොහොර සහ ශාක අපද්‍රව්‍ය විකල්ප ස්ථර වලින් අපේක්ෂිත උස දක්වා යොදන්න.

4. බිම් පණුවන් එක් කිරීම:

වර්ග මීටරයකට බිම් පණුවන් කිලෝග්‍රෑම් 2.5 - 5 න් යන අනුපාතයෙන් දිරාපත් වීමට පටන් ගෙන ඇති අමු ද්‍රව්‍ය මතට විසුරුවා හරින්න. අයිසීනියා ෆෙටිඩා බිම් පණු විශේෂය වේගවත් ප්‍රජනන ක්‍රියාවලියකින් සහ ඉහළ කාබනික ද්‍රව්‍ය පරිවර්තන කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුක්ත වේ.

5. තෙතමනය සහ උෂ්ණත්ව කළමනාකරණය කිරීම:

60-75% තෙතමනයක් සහ සෙල්සියස් අංශක 20-30 අතර උෂ්ණත්වයක් පවත්වා ගත යුතු වේ. නිතර ජලය ඉසිය යුතු අතර වාතාශ්‍රය සැපයීම කළ යුතුය. ජලයෙන් යටවීම සහ අධික උෂ්ණත්වය වළක්වා ගත යුතු වේ.

6. කාබනික ද්‍රව්‍ය සැපයීම සහ හැරවීම (අවශ්‍ය නම්):

බිම් පණුවන් කාබනික ද්‍රව්‍ය මත අඛණ්ඩව පෝෂණය වන බැවින් කාබනික ද්‍රව්‍ය අඛණ්ඩව සැපයිය යුතුය. කාබනික ද්‍රව්‍ය හැරවීම අත්‍යාවශ්‍ය විටක දී පමණක් සිදු කළ යුතු අතර, අවම බාධාවන් යටතේ බිම් පණුවන් හොඳින් ක්‍රියාකාරී වේ. කාබනික ද්‍රව්‍ය මිශ්‍රණයේ උෂ්ණත්වය ඉහළ නංවන, ඉහළ තෙතමනයක් හා ඉහළ නයිට්‍රජන් ප්‍රමාණයක් ඇති ද්‍රව්‍ය එක් කිරීමෙන් වළකින්න.

7. බිම් පණු පොහොර ලබා ගැනීම:

මාස 2-5 කට පසු, බිම් පණු පොහොර භාවිතය සඳහා සුදුසු වේ. පණුවන් පොහොර වලින් ඉවත් කර ගැනීම සඳහා අලුත් කාබනික ද්‍රව්‍ය ටැංකියේ එක් කෙළවරකට ගොඩ ගසන්න. අනෙක් පැත්තට දිරාපත් වීම අවසන් වූ බිම් පණු පොහොර ගොඩගසන්න. අලුත් කාබනික ද්‍රව්‍ය එකතු කළ පැත්ත අවශ්‍ය පරිදි තෙත් කර සෙවණ හා වාතාශ්‍රය ලබා දෙන්න. මෙසේ සතියකට පමණ පසු දිරාපත් වූ බිම් පණු පොහොර ගොඩෙහි සිටි පණුවන් අලුත් කාබනික ද්‍රව්‍ය එකතු කළ පැත්තට ගමන් කරයි. මෙසේ සාදාගත් පොහොර වල N, P, K, ක්ෂුද්‍ර පෝෂක, එන්සයිම සහ හිතකර ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් අඩංගු වේ.

8. අඛණ්ඩ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය:

අමුද්‍රව්‍ය නොකඩවා සැපයීම මගින් ක්‍රියාවලිය අඛණ්ඩව සිදුවීමට ඉඩ හරින්න. නිතරම තත්ත්වයන් යටතේ පණුවන් ගහනය වේගයෙන් ගුණනය වන අතර, මෙමගින් මහා පරිමාණයෙන් සහ අඛණ්ඩ බිම් පණු පොහොර නිෂ්පාදනයට ඉඩ සලසයි.

බිම් පණු පොහොර නිෂ්පාදනය තුළින් පොල් වගාවට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ

1. පසෙහි ගුණාංග වැඩි දියුණු කිරීම: බිම් පණු පොහොර පසෙහි වයනය, වාතනය සහ ජලය රඳවා තබා ගැනීම වැඩි දියුණු කරයි.
2. පසෙහි සාරවත් බව වැඩි කිරීම: අත්‍යවශ්‍ය පෝෂ්‍ය පදාර්ථ (N, P, K, Ca, Mg) සහ නිතකර ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් සපයයි.
3. පළිබෝධ සහ රෝග ප්‍රතිරෝධය: නිරෝගී මූල පද්ධතියක් සහ ස්වභාවික ශාක ආරක්ෂාව වර්ධනය කරයි.
4. ආර්ථික ශක්‍යතාව: පොහොර සඳහා යන වියදම අඩු කරන අතර බිම් පණු පොහොර දියර සහ පණුවන් විකිණීම හරහා අමතර ආදායම් මාර්ගයක් නිර්මාණය කරයි.
5. පාරිසරික නිරසාරභාවය: අපද්‍රව්‍ය අඩු කරයි, කාබන් නිර කිරීම සහ පොල් ඉඩම් තුළ පෝෂ්‍ය පදාර්ථ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය සිදුකරයි.

Should be I I u



අයිසිනියා ගෙට්ටා බිම් පණුවන් මගින් පොහොර නිෂ්පාදනය කිරීම

පෛච විවිධත්වය සඳහා ස්වභාවික විලෝපිකයන්ගේ වර්ධනය වැඩි දියුණු කිරීම

ස්වභාවික විලෝපිකයන් පළිබෝධ ගහනය පාලනය කිරීමෙන් සහ සමස්ත පෛච විවිධත්වයට දායක වීමෙන් නිරෝගී පොල් පරිසර පද්ධති පවත්වා ගැනීම සඳහා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. මෙම ප්‍රයෝජනවත් ජීවීන් වැඩි කිරීම සඳහා උපාය මාර්ග ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් රසායනික පළිබෝධනාශක සඳහා ඇති අවශ්‍යතාවය අඩු වන අතර වඩාත් නිරසාර හා ඵලදායී පොල් වගාවක් ලබා දෙයි.

පොල් පරිසර පද්ධති වල ප්‍රධාන ස්වභාවික විලෝපිකයන් අතරට බකමුණන් සහ කොට්ටෝරුවන් වැනි පක්ෂීන් ඇතුළත් වන අතර, ඔවුන් පොල් පැළ සහ බීජ පැළ වලට හානි කරන මීයන් ගහනය පාලනය කරයි. ලේඩ්බර්ඩ්ස් සහ වන්දන් වැනි කෘමීන් විනාශකාරී පළිබෝධ සහ කොරපොතු කෘමීන් කළමනාකරණය කිරීමට උපකාරී වේ. මකුළුවන් සහ විලෝපික මයිටාවන් ද පළිබෝධ පාලනය සඳහා සැලකිය යුතු දායකත්වයක් සපයයි.

ස්වභාවික විලෝපික ගහනය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා පොල් වගාකරුවන්ට ක්‍රම කිහිපයක් අනුගමනය කළ හැකිය. යටි වගාව නඩත්තු කිරීම සහ අතුරු බෝග වගා කිරීම මගින් විවිධ වාසස්ථාන නිර්මාණය කිරීම, විලෝපික කෘමීන් සහ පක්ෂීන් සඳහා නවාතැන් සහ විකල්ප ආහාර ප්‍රභවයන් සැපයීම, කුඩු ස්ථාපනය කිරීම මගින් පක්ෂීන්ට ඉඩමේ ස්ථිරව ලැබුම් ගැනීමට දිරිමත් කිරීම, පඳුරු වැටවල් සහ පොල් පේළි අතර ස්වභාවිකව වැඩෙන ශාක නඩත්තු කිරීම මගින් පරිසරයේ සිටින විලෝපිකයන්ට ඉඩම පුරා නිදහසේ ගමන් කිරීමට ඉඩ සැලැස්වීම සිදුකරයි. මෙමගින්, පරාග වාහකයන් වැනි අනෙකුත් ප්‍රයෝජනවත් ජීවීන්ගේ පැවැත්මට ද සහාය වේ.

රසායනික පළිබෝධනාශක අවම කිරීම හෝ ඉවත් කිරීම වැදගත් වන්නේ ඒවා ඉලක්කගත පළිබෝධකයන්ට වඩා බොහෝ විට නිතකර විලෝපිකයන්ට හානි කරන බැවිනි. ඒ වෙනුවට, සමෝධානික පළිබෝධ කළමනාකරණ ක්‍රම අනුගමනය කිරීමෙන් ස්වභාවික විලෝපික ගහනය වර්ධනය වීමට සහ නිරසාර පළිබෝධ පාලනයක් ස්ථාපිත කිරීමට ඉඩ සලසයි. කාබනික වසුන් එකතු කිරීම සහ පසෙහි සෞඛ්‍යය පවත්වා ගැනීම, කුරුමිණියන් සහ මකුළුවන් වැනි භූගත විලෝපිකයන්ගේ පැවැත්මට සහාය වේ. මෙම ක්‍රම අනුගමනය කිරීම ස්වභාවික පළිබෝධ පාලනය වැඩි දියුණු කරන අතර පුළුල් පරිසර පද්ධති සේවාවන්ට දායක වේ. ඉහළ පෛච විවිධත්වය වඩාත් ඔරොත්තු දෙන කෘමිකාර්මික පද්ධතියක් නිර්මාණය කිරීමට, පසෙහි සෞඛ්‍යය වැඩි දියුණු කිරීමට, පරාගණය වැඩි දියුණු කිරීමට සහ පොල් නිෂ්පාදනය පවත්වා ගැනීමට හෝ වැඩිදියුණු කිරීමට උපකාරී වන අතරම අතිරේක පාරිසරික ප්‍රතිලාභ ද ලබා දෙයි.

ජීව වායුව නිපදවීමෙන් ශක්තිය ලබා ගැනීම

පොල් වගාව සමඟ ජීව වායු ඒකකයක් ඒකාබද්ධ කිරීම නිර්සාර මෙන්ම කාර්යක්ෂම ක්‍රියාවලියකි. පොල් ඉඩම් වල ඇති ස්වභාවික තෘණ සහ පොල් ගස් මගින් ලැබෙන සෙවණ, පොල් ඉඩම් වල සත්ත්ව පාලනය සඳහා, විශේෂයෙන් ගවයන්, එළවන් සහ කුකුළන් සඳහා සුදුසු පරිසරයක් සපයයි. එමෙන්ම, සත්ත්ව පාලනය සිදු කිරීම නිසා වල් පැළෑටි පාලනයක් සිදු වන අතර, සතුන්ගේ මළ ද්‍රව්‍ය මගින් පසෙහි සරු භාවය ද වැඩි වේ.

සත්ව අපද්‍රව්‍ය නිර්වායු තත්ත්ව යටතේ පීරිණය වීමට ඉඩ හැරීමෙන් ජීව වායුව සෑදිය හැකිය. මෙය යන්ත්‍ර ඔක්සිජන් නොමැතිව කාබනික ද්‍රව්‍ය බිඳ දැමීමට ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් භාවිතා කරයි. එමගින් ජීව වායුව නිපදවන අතර එය බොහෝ දුරට මිනේන් (50-70%) සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් (30-50%) වලින් සමන්විත වේ. නිර්වායු පීරිණය සඳහා (මුළු සහ ද්‍රව්‍ය 8-10%) සුදුසු තෙතමනයක් ඇති දියරයක් සෑදීම සඳහා සත්ව ගොම ජලය සමඟ මිශ්‍ර කරනු ලැබේ. ජීව වායු නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ පළමු පියවර මෙයයි.

නිර්වායු පීරිණ ක්‍රියාවලියේ පියවර කිහිපයකි. පළමුව, සංකීර්ණ කාබනික සංයෝග අණු බවට බිඳ දමනු ලැබේ. මිළඟට, මෙම අණු ඇසිටික් අම්ලය, හයිඩ්‍රජන් සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් බවට පරිවර්තනය වේ. අවසාන වශයෙන්, මිනේන් නිපදවන බැක්ටීරියා මෙම සංයෝග ජීව වායුව බවට පත් කරයි. ජනනය කරන ලද ජීව වායුව ආහාර පිසීම, ආලෝකකරණය හෝ ජීව වායු බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වන ජනක යන්ත්‍ර භාවිතයෙන් විදුලිය නිෂ්පාදනය සඳහා සෘජුවම භාවිතා කළ හැකි අතර, එමගින් අවට ගොවිපල කටයුතු සඳහා පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයක් ලබා ගත හැකිය. මීට අමතරව, ජීව වායුව නිපදවීමෙන් පසු ඉතිරි වන පීරිණය වූ සත්ත්ව අපද්‍රව්‍ය, පොල් වගාව සඳහා භාවිතා කළ හැකි කාබනික පොහොරක් වේ. මෙමගින්, පසේ සාරවත් බව වැඩි කරන අතර කෘතීම පොහොර සඳහා ඇති අවශ්‍යතාවය අඩු කරයි.

මෙම ඒකාබද්ධ ක්‍රියාවලිය මගින් ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ද ඇත. ඒවා අතර අඩු බලශක්ති පිරිවැය, අතිරේක ජීව වායුව හෝ විදුලිබල අලෙවියෙන් ලැබිය හැකි ආදායම සහ වැඩිදියුණු කළ පාංශු කළමනාකරණය සහ කාබනික පොහොර භාවිතය හේතුවෙන් පොල් ඵලදාව සහ සත්ත්ව නිෂ්පාදනය වැඩි වීම ඇතුළත් වේ.

සත්ත්ව අපද්‍රව්‍ය පීරිණය වන කුටියේ අභ්‍යන්තර උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 35 සහ 37 අතර පරාසයක තබාගැනීම, සහ කාබනික ද්‍රව්‍ය සම්පූර්ණයෙන් පීරිණය වීමට අවශ්‍ය තත්ත්ව සැපයීම වැනි ක්‍රම භාවිතා කිරීමෙන් පද්ධතියේ කාර්යක්ෂමතාව තවදුරටත් වැඩි කළ හැකිය.

පොල් වගාවන්හි සත්ත්ව පාලනය සහ ජීව වායු නිෂ්පාදනය ඒකාබද්ධ කිරීම මගින් ප්‍රතිරෝධී සහ නිර්සාර කෘෂිකාර්මික පද්ධතියක් නිර්මාණය කරයි. මෙම ක්‍රමය සම්පත් භාවිතය උපරිම කරන අතර පුනර්ජනනීය බලශක්ති නිෂ්පාදනය සහ පෝෂ්‍ය පදාර්ථ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීම හරහා පාරිසරික බලපෑම අවම කරයි.

පොල් වගාව බහුලව පවතින නිවර්තන සහ උපනිවර්තන කලාපවල සඳහා මෙම ආකෘතිය සුදුසු වේ. මෙම ආකෘතිය මගින් පොල් ඉඩම් වල ඵල දායිතාව, බලශක්ති ආරක්ෂාව සහ පාරිසරික නිර්සාරභාවය වැඩි දියුණු කළ හැකි අතර විවිධාංගීකරණය වූ නිෂ්පාදන සහ අඩු යෙදවුම් පිරිවැය හරහා අමතර ආදායමක් ලබා දිය හැකිය. මෙම පද්ධතියේ සාර්ථකත්වය රදා පවතින්නේ සැලසුම් කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම මතය. මෙහිදී, පවතින සත්ත්ව අපද්‍රව්‍ය මත පදනම්ව ජීව වායු පීරිණක කුටිය නිසි ලෙස ප්‍රමාණය කිරීම, පොල් වගාවේ ඵලදායීතාවයට හානි නොවන මට්ටමේ සත්ව ගහණයක් පවත්වා ගැනීම, සහ සත්ව අපද්‍රව්‍ය ඵලදායී ලෙස හැසිරවීම යන කරුණු වැදගත් වේ.



ජීව වායු නිෂ්පාදන ඒකකයේ ආකෘතියක්

ශ්‍රී ලංකාවේ පොල් අස්වනු නෙළීම

පොල් අස්වනු නෙළීම සඳහා ප්‍රශස්ත කාලය

පොල් ගස යනු වසර ගණනාවක් පුරා අඛණ්ඩව අස්වැන්න සපයන දිගු ආයු කාලයක් සහිත ඛනු වාර්ෂික බෝගයකි. පොල් ගස සම්පූර්ණ ඵල දරණ අවධියට පැමිණි පසු, එය වාර්ෂිකව පොල් වල 12 සිට 14 දක්වා නිපදවයි. එබැවින්, වසර පුරා සෑම මසකම අවම වශයෙන් එක් පොල් වල්ලක් හෝ පරිණත වේ.

පොල් වල්ලක වර්ධන චක්‍රය මාස 38 ක් පවතින අතර, පුෂ්ප මංජරියෙහි ප්‍රාථමික අවධියේ සිට පොල් ගෙඩි සම්පූර්ණයෙන් පරිණත වීම දක්වා එය සිදු වේ. සම්පූර්ණ කාලය තුළ,

- මල විවෘත වීමට පෙර මාස 27 ක් ගත වන අතර
- මල විවෘත වීමෙන් පසු මාස 10-11 ත් තුළදී හොඳින් පැසුණු පොල් ගෙඩි ඇතිවේ.

එබැවින්, පොල් අස්වැන්න නෙළීම සඳහා නිවැරදි අවධිය වන්නේ පොල් මල විවෘත වී මාස 10-11 කට පසුවය. මෙම අවධියේදී, පොල් ගෙඩි සම්පූර්ණයෙන්ම අස්වැන්න නෙළීමට සුදුසු තත්ත්වයේ පවතින අතර, ඒවායේ ගුණාත්මකභාවය විවිධ භාවිතයන් සඳහා සුදුසු වේ.

අස්වැන්න නෙළීමට සුදුසු මේරූ පොල් වල ලක්ෂණ

අස්වැන්න නෙළීමට සුදුසු මේරූ පොල් ගෙඩියක් හඳුනා ගැනීමට උපකාරී වන ලක්ෂණ කිහිපයක් තිබේ.

- පිටත ලෙල්ල දුඹුරු හෝ කහ-දුඹුරු පැහැයෙන් යුක්ත වන අතර, නොමේරූ පොල් වලට සාපේක්ෂව දැඩි හා තන්තුමය වේ.
- ඇතුළත මේරීමත් සමඟ පොල් වතුර ප්‍රමාණය අඩු වන බැවින්, තට්ටු කරන විට, හිස් හඬක් නිකුත් කරයි.
- මදය තද, සුදු සහ තෙල් සහිත වන අතර පහසුවෙන් කටුවෙන් වෙන් වේ.

පොල් අස්වනු නෙළීමේ වාර ගණන

පහත සඳහන් සාධක මත පදනම්ව, ශ්‍රී ලංකාවේ, පොල් අස්වනු නෙළීම විවිධ කාල පරාසයන් තුළ සිදුවේ.

- පොල් ප්‍රභේදය
- වගා කළමනාකරණය
- දේශගුණික තත්ත්වයන්

ඛනුලවම භාවිතා වන අස්වනු නෙළීමේ කාලාන්තර වන්නේ:

- මාසකට (දින 30) වරක්
- මාස දෙකකට (දින 60) වරක්
- දින 45 කට වරක්

අස්වනු නෙළීමේ කාලය අනුව, ඒ ඒ කාල පරාසයන්ට අදාළ වූ වාසි සහ අවාසි ඇත:

- පිරිවැය
- ගොවිපල කළමනාකරණය
- ශ්‍රමය ලබා ගැනීමේ හැකියාව
- වෙළඳපල ඉල්ලුම

මාසිකව පොල් අස්වැන්න නෙළීමේ දී, බැට්ටා වැටීම අඩු වීම සහ වැටුණු ගෙඩි සොරකම් කිරීම අඩු වීම හේතුවෙන්, අස්වැන්න වැඩි වන බව අධ්‍යයන වලින් පෙන්වා දී ඇත. කෙසේ වෙතත්, අස්වනු නෙළන්නන්ගේ හිඟය සහ අතිරේක අස්වනු නෙළීමේ වාර හය සඳහා දැරීමට සිදුවන අමතර පිරිවැය හේතුවෙන් වගාකරුවන් මෙම ක්‍රමය අනුගමනය කිරීමට මැලි වෙති. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ශ්‍රී ලාංකාවේ බොහෝ පොල් වගාකරුවන් ද්විමාසික අස්වනු නෙළීම සිදු කරනු ලබයි.

මාස දෙකකට වරක් අස්වනු නෙළීමේ ප්‍රධාන අවාසිය වන්නේ අස්වනු දෙකක් අතර කාල සීමාව තුළ ගසේ අමතර පොල් වල්ලක් රඳවා තබා ගැනීමයි. මෙම මේරූ පොල් වල්ල, ප්‍රභාසංස්ලේෂණ නිෂ්පාදන සහ පෝෂ්‍ය පදාර්ථ සඳහා වර්ධනය වන බැට්ටා සමඟ තරඟ කිරීම නිසා, සමස්ත ඵලදායිතාව අඩුවීමට හැකිය. තවද, මේරූ පොල් වල්ලක් අමතර මාසයක් ගසෙහි තැබීම හේතුවෙන්, ගෙඩි වැටීම, ප්‍රරෝහණය සහ සොරකම් කිරීම හේතුවෙන් අස්වැන්න අඩු විය හැක. කෙසේ වෙතත්, ශ්‍රම පිරිවැය සලකා බැලීමේදී, මාස දෙකකට වරක් අස්වැන්න නෙළීම වඩාත් ලාභදායී වේ.

දින 45 කට වරක් පොල් අස්වනු නෙළීමේදී, එක් පොල් වල්ලක් සම්පූර්ණයෙන්ම මෝරා තිබියදී තවත් ඉන්නක් නොමේරූ තත්ත්වයේ තිබිය හැක. එමනිසා, මෙහි දී මේරූ පොල් ඉති පමණක් නෙළා ගැනීම සඳහා අවධානය යොමු කළ යුතු වේ. මෙම ක්‍රමයේදී, අස්වැන්න නෙළීම සඳහා වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීම අවශ්‍ය වුවද, මසකට වරක් අස්වනු නෙළීමේ ක්‍රමයට සාපේක්ෂව අඩු ශ්‍රම පිරිවැයක් වැය වේ.

එබැවින්, පහත කරුණු මත පදනම්ව ගොවීන්ට අස්වනු නෙළීමේ වාර ගණන තීරණය කළ හැක.

- ඉඩමේ ප්‍රමාණය
- නෙළීමේ ක්‍රමය
- ගෙඩියක මිල
- ප්‍රවාහනය සහ පොල් එකතු කිරීම වැනි වෙනත් පිරිවැය

පොල් අස්වනු නෙළීමේ ක්‍රම

පොල් ගස්වල උස ස්වභාවය නිසා, ශ්‍රී ලංකාවේ පොල් අස්වනු නෙළීම ප්‍රධාන වශයෙන් සිදු කරනු ලබන්නේ මිනිස් ශ්‍රමය භාවිතයෙනි. පොල් අස්වනු නෙළීමේ ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකකි.

- කෙකි භාවිතයෙන් අස්වනු නෙළීම
- ගස් නඟින්නන් යොදා ගෙන අස්වනු නෙළීම

ගස් නඟින්නන් යොදා ගෙන අස්වනු නෙළීම සිදු කරන විට, ඔවුන් ලණු භාවිතා කර, බිම සිට මීටර් 9 සිට 24 ක් පමණ උසක් දක්වා ගස් වලට නැගීම සිදු කරයි. පොල් අස්වැන්න නෙළීම සඳහා මෙය බහුලව භාවිතා වන ක්‍රමයකි. මීට අමතරව, සාපේක්ෂව උස අඩු ගස් සඳහා, පොල් අස්වනු නෙළන පුද්ගලයන්, පිහියක් සවි කර ඇති දිගු උණ ලී භාවිතා කරයි. මෙම ක්‍රමය, ගස් නඟින්නන් යොදා ගෙන අස්වනු නෙළීමේ ක්‍රමයට සාපේක්ෂව වේගවත්බව සහ කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ අතර, අවධානම අඩුය.

මෑත කාලයේ දී, අස්වනු නෙළීමේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම සහ අස්වනු නෙළන්නන්ගේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා විවිධ නවෝත්පාදනයන් හඳුන්වා දී ඇත. පොල් ගස් නැගීමේ උපකරණය ඉන් එකකි. අස්වනු නෙළන්නන්ට වඩාත් පහසුවෙන් සහ ආරක්ෂිතව ගස් නැගීමට සහාය වීම සඳහා මෙම උපකරණ නිර්මාණය කර ඇත. මේවා පටි සහ පාද සහ අත් ග්‍රහණයන්ගෙන් සමන්විත වන අතර එමඟින් භාවිතා කරන පුද්ගලයාට අවම උත්සාහයකින් ගසට නැගීමට ඉඩ සලසයි.

සමහර රටවල, පොල් අස්වැන්න නෙළීම සඳහා පුහුණු වෑයම් යොදා ගනු ලබන අතර, මෙමඟින් මිනිස් අස්වනු නෙළන්නන්ට ඇති අවදානම සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කිරීම අපේක්ෂා කරයි. එසේම, පොල් වගා කරන රටවල් වල, ප්‍රධාන ගැටලුවක් වන්නේ, පොල් අස්වැන්න නෙළීම සඳහා පුහුණු සේවකයින්ගේ හිඟයයි.

මීට විසඳුමක් ලෙස, සමහර දියුණු රටවල් ඩ්‍රෝන සහ රොබෝ තාක්ෂණයන් වැනි විවිධ වර්ගයේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය සහිත යන්ත්‍ර භාවිතා කර ඇත. උදාහරණයක් ලෙස, ස්වයංක්‍රීය පොල් ගස් නැගීමේ රොබෝවක් නිර්මාණය කර ඇති අතර එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට පහසු, තැනින් තැනට රැගෙන යා හැකි අතර විශාල වගාවන් සඳහා භාවිතා කළ හැක.

ගෙඩි වැටීම

පොල් ගසේ ගෙඩි වැටීම ස්වභාවිකවම පරිණත වීමේදී සිදුවන අතර ඇතැම් අවස්ථාවල විවිධ කායික, පෝෂණ හෝ පාරිසරික ආතතීන් හේතුවෙන් අසාමාන්‍ය ලෙස සිදු වේ.

නොමේරූ ගෙඩි වැටීම යනු සාමාන්‍යයෙන් පරාගනයෙන් මාස 2-7 කට පසු ගෙඩි පරිණත වීමට පෙර වැටීමයි. මෙය පොල් අස්වැන්න සහ ආර්ථික කෙරෙහි බලපාන බරපතල ගැටළුවකි.

නොමේරු ගෙඩි වැටීමට හේතු:

- පෝෂක උග්‍රතාවයන්:
 - ✓ පොටෑසියම් (K) උග්‍රතාවය
- තෙතමනය අඩු වීම නිසා ඇති වන ආතතිය:
 - ✓ නියත තත්වයන් හෝ නිසි ආකාරයෙන් ජල සැපයුම සිදු නොවීම (විශේෂයෙන් වැලි සහිත හෝ නොගැඹුරු පසෙහි)
- නිවැරදි ලෙස පරාගනය සිදු නොවී තිබීම:
 - ✓ දුර්වල පරාග තිබීම, අධික වර්ෂාව හෝ අධික උෂ්ණත්වය හේතුවෙන් නිවැරදි ලෙස පරාගනය සිදු නොවී තිබීම
- පළිබෝධ උවදුරු සහ රෝග
- හෝමෝන අසමතුලිතතාවය:
 - ✓ ආතතිය නිසා ඇතිවන හෝමෝන වෙනස්කම් (විශේෂයෙන් එතිලීන් සහ ඔක්සීන් හෝර්මෝන මට්ටම් වල වන වෙනස්කම්)

කළමනාකරණය සහ අභිතකර බලපෑම් අවම කිරීම

- නිවැරදි ලෙස පොහොර යෙදීම:
 - ✓ ප්‍රමාණවත් පරිදි පොටෑසියම් සහ බෝරෝන් යොදන්න
- ජල කළමනාකරණය:
 - ✓ විශේෂයෙන් වියළි කාලවලදී අවශ්‍ය පරිදි ජල සැපයුම පවත්වා ගන්න.
- පාංශු තෙතමනය සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා වසුන් යෙදීම සහ ආවරණ බෝග වගා කිරීම සිදු කරන්න
- පළිබෝධ සහ රෝග පාලනය:
 - ✓ නිතිපතා අධීක්ෂණය සහ සමෝධානික ශාක සෞඛ්‍ය කළමනාකරණ උපාය මාර්ග භාවිතා කිරීම සිදු කරන්න
- යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත්:
 - ✓ නිවැරදි කාලයේදී අස්වනු නෙළීම සිදු කරන්න.
 - ✓ අස්වැන්න නෙළීමේදී ගසට සිදුවිය හැකි යාන්ත්‍රික හානි වළක්වා ගන්න.

ඇමුණුම 1: පොල් වගාව

සටහන්:

- අ) මෙම ඇමුණුමේ ඇති සියලුම පරතරයන් විස්තර "අතුරු බෝග වගාව, සත්ව පාලනය සහ ඒකාබද්ධ ගොවිතැන හරහා ලාභය උපරිම කිරීම" කොටසේ සපයා ඇති මාර්ගෝපදේශ මත පදනම් වේ.
- ආ) අතුරු බෝග වගා කරන ලද පොල් ඉඩම්වල පොල් අස්වැන්න වැඩිවීම සැලකිල්ලට ගෙන නොමැත.
- ඇ) අතුරු බෝග මුදල් ප්‍රවාහයන්ට පොල් වල පිරිවැය සහ ප්‍රතිලාභ ද ඇතුළත් වේ.
- ඈ) md මගින් මිනිස් දින දක්වයි
- ඉ) වැට්ටිම නිසා ගණනය කිරීම් වල දෝෂ සිදුවිය හැක.

පොල් වගාවේ ප්‍රතිලාභ පිරිවැය (රු./අක්කර)

උපකල්පන:

පරිණත පොල් වගාව

සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම භාවිතයන් හි සම්මත මට්ටම අනුගමනය කිරීම

- පොල් ගසක වාර්ෂික ගෙඩි නිෂ්පාදනය : 60
- අක්කරයකට පොල් ගස් ගණන : 64
- වාර්ෂික පොල් අස්වැන්න : 3,840

ක්‍රියාකාරකම	ඒකකය	ඒකකයක මිල (රු.)	සම්පූර්ණ මිල (රු.)
යෙදවුම්			
පොහොර යෙදීම			
ඒ.පී.එම්. (පොල් ගසකට කිලෝග්‍රෑම් 3.3)	211.20	190.00	40,128.00
ඩොලමයිට් (ගසකට කිලෝග්‍රෑම් 1)	64.00	26.00	1,664.00
පොහොර ප්‍රවාහනය	1.00	750.00	750.00
පැරණි වසුන් ඉවත් කිරීම (ගස් 40 කට මිනිස් දින 1)	1.60	2,500.00	4,000.00
පොහොර යෙදීම (ගස් 140 කට මිනිස් දින 1)	0.50	2,500.00	1,143.00
පස සමග පොහොර මිශ්‍ර කිරීම (ගස් 35 කට මිනිස් දින 1)	1.80	2,500.00	4,571.00
වසුන් හැවෙන සැකසීම (ගස් 50 ක් සඳහා මිනිස් දින 1)	1.30	2,500.00	3,200.00
පොහොර යෙදීම සඳහා වියදම			55,456.00
අස්වනු නෙළීම			
කෙක්කෙන් අස්වනු නෙළීම (මුරයකට අක්කරයකට රු.1,200 බැගින් මුර 8)	8.00	1,200.00	9,600.00
ගෙඩි එකතු කිරීම (ගෙඩි 500 කට මිනිස් පැය 1)	0.96	2,500.00	2,400.00
එක් ස්ථානයකට ප්‍රවාහනය කිරීමට (ගෙඩි 1,000 කට රු. 1,250.00)	3,840.00	1.00	4,800.00
ගෙඩි ගණන් කිරීම (ගෙඩි 8,000 කට මිනිස් දින 1)	0.48	2,500.00	1,200.00
ගෙඩි ගොඩ ගැසීම (ගෙඩි 1,500 කට මිනිස් පැය 1)	0.32	2,500.00	800.00
ට්‍රැක්ටරයට ගෙඩි පැටවීම (ගෙඩි 500 කට මිනිස් පැය 1)	0.96	2,500.00	2,400.00
අස්වනු නෙළීම සඳහා වියදම			21,200.00

ක්‍රියාකාරකම	ඒකකය	ඒකකයක මිල (රු.)	සම්පූර්ණ මිල (රු.)
කෘෂි කාර්මික ක්‍රම			
ඉඩම ඵලි කිරීම (පොල් අල්ලි 15 ට මිනිස් දින 1) වසරකට දෙවතාවක්	6.50	2,500.00	16,333.00
පොල් ලෙලි වැළලීම (අවුරුදු 5 කට වරක්)			
පොල් ලෙලි වැළලීම සඳහා වළවල් කැපීම	7.00	500.00	3,500.00
වළකට පොල් ලෙලි 500 බැගින් වළවල් 7 ක් සඳහා	3,500.00	5.00	17,500.00
පොල් ලෙලි දමා වළවල් වැසීම	7.00	750.00	5,250.00
වැටවල් නඩත්තුව - ශ්‍රමය	5.00	2,500.00	12,500.00
පලබෝධ හා රෝග මර්දනය			9,132.00
වැටවල් නඩත්තුව - ද්‍රව්‍ය	1.00	5,000.00	5,000.00
කෘෂි කාර්මික ක්‍රම සඳහා වියදම			69,216.00
වෙනත් වියදම්			
කළමනාකරණය සහ අධීක්ෂණය	1.00	20,000.00	20,000.00
කාර්යාලය, වතු නිවාස සහ මාර්ග නඩත්තුව	1.00	1,500.00	1,500.00
විදුලිය	1.00	4,000.00	4,000.00
බදු, ගොඩනැගිලි නඩත්තුව සහ උපකරණ	1.00	5,000.00	5,000.00
පරිපාලනය	1.00	10,000.00	10,000.00
වෙනත් වියදම් සඳහා එකතුව			40,500.00
සම්පූර්ණ පිරිවැය			186,372.00
පොල් ගෙඩියක නිෂ්පාදන වියදම			48.53
ප්‍රතිඵල			
පොල් (ගෙඩි)	3,840.00	80.62	318,720.00
දළ ආදායම	318,720.00		
ශුද්ධ ආදායම	132,348.00		
ප්‍රතිලාභ-පිරිවැය අනුපාතය	1.71		

ඇමුණුම 2: පොල් යටතේ ඉඟුරු වගාව

ඉඟුරු වල දළ ලාභය (අක්කරයකට රු.) (ප්‍රභේදය: රැන්ගුන්)

ක්‍රියාකාරකම	පළමු වසර
ප්‍රතිදාන	
ඉඟුරු (අක්කරයකින් කිලෝග්‍රෑම්)	2,340.00
සාමාන්‍ය මිල (කිලෝග්‍රෑමයක මිල රු.)	500.00
ඉඟුරු වලින් ලැබෙන ආදායම	1,170,000.00
පොල් නිෂ්පාදනය (අක්කරයට ගෙඩි)	3,840.00
සාමාන්‍ය මිල (ගෙඩියක මිල රු.)	80.62
පොල් වලින් ලැබෙන ආදායම (අක්කරයකින් රු.)	309,580.00
මුළු ආදායම	1,479,580.00
යෙදවුම්	
ශ්‍රම පිරිවැය (අක්කරයට රු.)	
ඉඩම් ඵලිපෙහෙළි කිරීම, සිටුවීම සහ පාත්ති සකස් කිරීම	7.00
බීජ සකස් කිරීම, සිටුවීම සහ මූලික පොහොර මිශ්‍රණය යෙදීම	4.00
වසුන් යෙදීම සඳහා පොල් අතු එකතු කිරීම	11.00
ගස් වටා සහ කාණු පිරිසිදු කිරීම (2 වතාවක්)	12.00
වල් මර්දනය (3 වතාවක්)	38.00
රසායනික පොහොර යෙදීම (2 වතාවක්)	3.00
දිලීර නාශක සහ පළිබෝධනාශක යෙදීම	1.00
අස්වනු හෙළීම සහ සැකසීම	25.00
වෙනත්	7.00
මුළු ශ්‍රම භාවිතය (අක්කරයට මිනිස් දින)	108.00
වැටුප් අනුපාතය (මිනිස් දිනකට රු.)	2,500.00
ශ්‍රම පිරිවැය (අක්කරයකට රු.)	270,000.00

ද්‍රව්‍ය පිරිවැය (අක්කරයකට රු.)	පළමු වසර
රෝපණ ද්‍රව්‍ය (කිලෝග්‍රෑම්)	390.00
රෝපණ ද්‍රව්‍යවල මිල (කිලෝග්‍රෑම් එකක මිල රු.)	800.00
රෝපණ ද්‍රව්‍ය සඳහා පිරිවැය	312,000
අකාබනික පොහොර	10,171
එක් පාත්තියක් සඳහා කෘමිනාශක සහ දිලීර නාශක සඳහා වන පිරිවැය	150
පාත්ති ගණන	75
කෘමිනාශක සහ දිලීර නාශක සඳහා පිරිවැය	11,250
ද්‍රව්‍ය සඳහා මුළු පිරිවැය	333,421
ප්‍රවාහන වියදම (අක්කරයකට රු.)	පළමු වසර
රෝපණ ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය	1,500
පොහොර ප්‍රවාහනය	1,500
සම්පූර්ණ ප්‍රවාහන පිරිවැය	3,000
යන්ත්‍රෝපකරණ සඳහා පිරිවැය (අක්කරයකට රු.)	
තැටි නගුල භාවිතයෙන් බිම් සකස් කිරීම (අක්කරයකට රු.)	5,043
කොකු නගුල භාවිතයෙන් බිම් සැකසීම (අක්කරයකට රු.)	3,104
යන්ත්‍රෝපකරණ සඳහා සම්පූර්ණ පිරිවැය	8,147
ඉඟුරු වගාව සඳහා වැය වූ මුළු මුදල (අක්කරයකට රු.)	614,569
පොල් සඳහා පිරිවැය	186,372
මුළු පිරිවැය (පොල් ඇතුළුව)	800,941
දළ ආන්තිකය (අක්කරයකට රු.)	678,640
ප්‍රතිලාභ-පිරිවැය අනුපාතය	1.85

ඇමුණුම 3: පොල් යටතේ කහ වගාව

කහ වල දළ ලාභය (අක්කරයකට රු.)

ක්‍රියාකාරකම	පළමු වසර
ප්‍රතිදාන	
කහ (අක්කරයකට කිලෝග්‍රෑම්)	3,120
සාමාන්‍ය මිල (කිලෝග්‍රෑම් එකක මිල රු.)	320
කහ වලින් ලැබෙන ආදායම (අක්කරයකට රු.)	998,400
පොල් අස්වැන්න (අක්කරයකට ගෙඩි)	3,840
සාමාන්‍ය මිල (ගෙඩියක මිල රු.)	80.62
පොල් වලින් ලැබෙන ආදායම(අක්කරයකට රු.)	309,580
මුළු ආදායම (අක්කරයකට රු.)	1,307,981
යෙදවුම්	
ශ්‍රම පිරිවැය (අක්කරයකට රු.)	
බිම් ඵලි පෙහෙළි කිරීම සහ තවාන් සකස් කිරීම	7
බීජ සකස් කිරීම, සිටුවීම සහ මූලික පොහොර යෙදීම	7
කාණු පිරිසිදු කිරීම සහ ගස් වටා ඇති පස් එකතු කිරීම (2 වතාවක්)	12
පොල් අතු එකතු කිරීම සහ වසුන් යෙදීම	6
පොහොර යෙදීම	2
වල් මර්දනය (3 වතාවක්)	32
දිලිර නාශක සහ පළිබෝධනාශක යෙදීම	1
අස්වනු හෙළීම සහ සැකසීම	19
වෙනත්	7
මුළු ශ්‍රම භාවිතය (අක්කරයට මිනිස් දින)	93
වැටුප් අනුපාතය (මිනිස් දිනකට රු.)	2,500

මුළු ශ්‍රම පිරිවැය	232,500.00
ද්‍රව්‍ය පිරිවැය (අක්කරයකට රු.)	පළමු වසර
රෝපණ ද්‍රව්‍ය (කිලෝ ග්රෑම්)	312
රෝපණ ද්‍රව්‍යවල මිල (කිලෝග්‍රෑම් එකක මිල රු.)	400
රෝපණ ද්‍රව්‍ය සඳහා පිරිවැය (රු.)	124,800
පොහොර සඳහා පිරිවැය (රු.)	13,264
කෘමිනාශක සහ දිලිර නාශක සඳහා පිරිවැය (රු.)	11,250
සම්පූර්ණ ද්‍රව්‍ය පිරිවැය	149,314
ප්‍රවාහන වියදම (අක්කරයකට රු.)	
රෝපණ ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය	1,000.00
පොහොර ප්‍රවාහනය	500.00
සම්පූර්ණ ප්‍රවාහන පිරිවැය	1,500.00
යන්ත්‍රෝපකරණ සඳහා පිරිවැය (අක්කරයකට රු.)	පළමු වසර
තැටි නතුල භාවිතයෙන් බිම් සකස් කිරීම (අක්කරයකට රු.)	2,522.00
කොකු නතුල භාවිතයෙන් බිම් සැකසීම (අක්කරයකට රු.)	1,552.00
යන්ත්‍රෝපකරණ සඳහා පිරිවැය	4,074.00
මුළු පිරිවැය (අක්කරයකට රු.)	386,579.00
පොල් සඳහා පිරිවැය	186,372.00
මුළු පිරිවැය (පොල් ඇතුළුව)	5,729,511.00
දළ ආන්තිකය (අක්කරයකට රු.)	735,030.00
ප්‍රතිලාභ - පිරිවැය අනුපාතය	2.3

ඇමුණුම 4: පොල් යටතේ මඤ්ඤාක්කා වගාව
මඤ්ඤාක්කා වල දළ ලාභය (අක්කරයට රු.)
 (ප්‍රභේදය: කිරිකාවඩි)

ක්‍රියාකාරකම	පළමු වසර
ප්‍රතිදාන	
මඤ්ඤාක්කා (අක්කරයකට කිලෝග්‍රෑම්) ගසකින් සාමාන්‍යයෙන් කිලෝග්‍රෑම් 3	3,948.00
සාමාන්‍ය මිල (කිලෝග්‍රෑම් එකක මිල රු.)	80.00
මඤ්ඤාක්කා වලින් ලැබෙන ආදායම මාස 6 කට වරක්	315,840.00
පොල් අස්වැන්න (අක්කරයකට ගෙඩි)	3,840.00
පොල් ගෙඩියක මිල (රු.)	80.62
පොල් වලින් ලැබෙන ආදායම (අක්කරයකට රු.)	309,580.00
මුළු ආදායම (පොල් ඇතුළුව)	625,420.00
යෙදවුම්	
ශ්‍රම පිරිවැය (අක්කරයට රු.)	
බිම් සකස් කිරීම	1.00
සිටුවීම	2.00
පොහොර යෙදීම	1.00
වල් මර්දනය සහ පස් එක් කිරීම (2 වතාවක්)	26.00
පළිබෝධ සහ රෝග පාලනය	1.00
අස්වනු නෙළීම සහ සැකසීම	17.00
මුළු ශ්‍රම භාවිතය (අක්කරයට මිනිස් දින)	48.00
වැටුප් අනුපාතය (මිනිස් දිනකට රු.)	2,500.00
මුළු ශ්‍රම පිරිවැය	120,000.00

ද්‍රව්‍ය පිරිවැය (අක්කරයට රු.)	පළමු වසර
දඬු කැබලි සඳහා පිරිවැය (රු. 8 බැගින් දඬු කැබලි 1316 ක් සඳහා)	10,528.00
අකාබනික පොහොර සඳහා පිරිවැය	19,203.00
ශාක ආරක්ෂණ ද්‍රව්‍ය සඳහා පිරිවැය	3,509.00
ද්‍රව්‍ය සඳහා මුළු පිරිවැය	33,240.00
ප්‍රවාහන වියදම (අක්කරයට රු.)	
රෝපණ ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය සඳහා වියදම	2,000.00
පොහොර ප්‍රවාහනය සඳහා වියදම	1,000.00
ප්‍රවාහනය සඳහා මුළු පිරිවැය	3,000.00
යන්ත්‍රෝපකරණ සඳහා පිරිවැය	
4WT තැටි නගුලක් භාවිතයෙන් බිම් සකස් කිරීම (අක්කරයකට රු.)	3,381.00
කොකු නගුලක් භාවිතයෙන් බිම් සකස් කිරීම	2,080.00
එකතුව	5,461.00
මුළු පිරිවැය (මාස 6 කට අක්කරයකට රු.)	161,701.00
පොල් ගෙඩියක මිල	186,372.00
මුළු පිරිවැය (පොල් ඇතුළුව) (අක්කරයකට රු.)	277,347.00
දළ ආන්තිකය (අක්කරයකට රු.)	277,347.00
ප්‍රතිලාභ-පිරිවැය අනුපාතය	2.25

ඇමුණුම 5: පොල් යටතේ පැපොල් වගාව

පැපොල් වල දළ ලාභය (අක්කරයකට රු.) (ප්‍රභේදය: රෙඩ් ලේඩ්)

ක්‍රියාකාරකම	වසර		
	1	2	3
ප්‍රතිදාන			
පළතුරු (අක්කරයකට කිලෝග්‍රෑම්)	12,768.00	21,280.00	8,512.00
සාමාන්‍ය මිල (කිලෝග්‍රෑම් එකක මිල රු.)	80.00	80.00	80.00
පැපොල් වලින් ලැබෙන ආදායම (අක්කරයකට රු.)	1,021,440.00	1,702,400.00	680,960.00
පොල් අස්වැන්න (අක්කරයකට ගෙඩි)	3,840.00	3,840.00	3,840.00
පොල් ගෙඩියක මිල (රු.)	80.62	80.62	80.62
පොල් වලින් ලැබෙන ආදායම (අක්කරයකට රු.)	309,580.00	309,580.00	309,580.00
මුළු ආදායම (අක්කරයකට රු.)	1,331,020.00	201,980.00	990,540.00
යෙදවුම්			
ශ්‍රම පිරිවැය (අක්කරයකට රු.)			
වළවල් කැපීම	12.00		
සකස් කිරීම සහ සිටුවීම	11.00		
වසුන් යෙදීම	11.00	10.00	10.00
පොහොර යෙදීම	15.00	15.00	15.00
වල් මර්දනය (වසරකට 2 වතාවක්)	5.00	5.00	5.00
ජල සම්පාදනය	42.00	42.00	42.00
පළිබෝධ සහ රෝග පාලනය	5.00	5.00	5.00
අස්වනු නෙළීම	85.00	142.00	58.00
මුළු ශ්‍රම භාවිතය (අක්කරයකට මිනිස් දින)	186.00	220.00	135.00
වැටුප් අනුපාතය	2,500.00	2,500.00	2,500.00
සම්පූර්ණ ශ්‍රම පිරිවැය (අක්කරයකට රු.)	465.00	547,500.00	337,500.00
ද්‍රව්‍ය පිරිවැය (අක්කරයකට රු.)			
පැළ ගණන	266.00		
පැළයක මිල (රු.)	50.00		
පැළ සඳහා පිරිවැය	13,300.00		
පොහොර සඳහා පිරිවැය	265,016.00	189,020.00	189,020.00

ක්‍රියාකාරකම	වසර		
	1	2	3
යෙදවුම්			
ප්‍රවාහන වියදම (අක්කරයකට රු.)			
හෝස් ජල සම්පාදනය සඳහා පිරිවැය	80,000.00		
පළිබෝධනාශක සහ දිලීර නාශක සඳහා පිරිවැය	11,970.00	11,970.00	11,970.00
ද්‍රව්‍ය සඳහා මුළු පිරිවැය	370,286.00	200,990.00	200,990.00
ප්‍රතිදාන			
ප්‍රවාහන වියදම (අක්කරයකට රු.)			
රෝපණ ද්‍රව්‍ය	1,500.00		
පොහොර	1,500.00	1,500.00	1,500.00
ප්‍රවාහනය සඳහා මුළු පිරිවැය	3,000.00	1,500.00	1,500.00
යන්ත්‍රෝපකරණ පිරිවැය (අක්කරයකට රු.)			
වල් මර්දනය සඳහා පිරිවැය	4,000.00		
සම්පූර්ණ විචල්‍ය පිරිවැය	842,286.00	749,990.00	539,990.00
පොල් සඳහා පිරිවැය	186,372.00	186,372.00	186,372.00
පොල් ඇතුළුව පිරිවැය	1,028,657.00	936,362.00	726,362.00
දළ ආන්තිකය (අක්කරයකට රු.)	302,363.00	1,075,619.00	264,179.00

10% වට්ටම් අනුපාතයකට

ශුද්ධ වර්තමාන වටිනාකම (අක්කරයකට රු.) 1,498,528.00

ප්‍රතිලාභ-පිරිවැය අනුපාතය 1.6

ඇමුණුම 6: පොල් යටතේ ගම්මිරිස් වගාව ගම්මිරිස් වල දළ ලාභය (අක්කරයකට රු.)

ක්‍රියාකාරකම		වසර									
ප්‍රතිදාන		1	2	3	4	5	6	7	8 to 19	20 to 40	
අපේක්ෂිත සාමාන්‍ය අස්වැන්න (වසරකට වැලකින් කිලෝග්‍රෑම් - විශළ බර)				0.05	0.30	0.50	0.60	0.80	1.00	1.50	
	හොඳින් ඵල දරණ වැල් ගණන (සිටුවා ඇති වැල් ගණනින් උපරිම 90%)			255.00	332.00	391.00	391.00	391.00	391.00	260.00	
	සාමාන්‍ය අස්වැන්න (අක්කරයකට කිලෝග්‍රෑම් - විශළ බර)			13.00	100.00	195.00	234.00	312.00	391.00	391.00	
	කිලෝග්‍රෑම් ඒකක මිල (රු. 1850)										
දළ ආදායම				23,615.00	184,195.00	361,305.00	433,566.00	578,088.00	722,610.00	722,610.00	
පොල් අස්වැන්න (අක්කරයකට ගෙඩි)		3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	
පොල් ගෙඩියක මිල (රු.)		80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	
පොල් වලින් ලැබෙන ආදායම (අක්කරයකට රු.)		309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	
මුළු ආදායම		309,580.00	309,580.00	333,195.00	493,775.00	670,885.00	743,146.00	887,668.00	1,032,190.00	1,032,190.00	
යෙදවුම්											
ශ්‍රම පිරිවැය (අක්කරයකට රු.)											
වළවල් කැපීම	18.00										
ග්ලිෆිසිඩා සිටුවීම	9.00										
සකස් කිරීම සහ සිටුවීම	26.00										
චක්‍රුත් යෙදීම සහ නාවකාලික සෙවණ සැපයීම	9.00										

ක්‍රියාකාරකම		වසර									
යෙදවුම්	1	2	3	4	5	6	7	8 to 19	20 to 40		
පැළ සඳහා පිරිවැය	13,020.00										
ගිවිසිසියා කණු වල මිල	30.00										
ගිවිසිසියා කණු සඳහා පිරිවැය	13,020.00										
පළිබෝධනාශක සහ දිලීර නාශක සඳහා පිරිවැය	10,850.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00		
පොහොර සඳහා පිරිවැය	75,828.00	20,736.00	29,030.00	29,030.00	29,030.00	29,030.00	29,030.00	29,030.00	29,030.00		
එකතුව	112,718.00	31,586.00	39,880.00	9,880.00	39,880.00	50,730.00	50,730.00	50,730.00	50,730.00		
යන්ත්‍රෝපකරණ සඳහා පිරිවැය (රු.)											
ස්ප්‍රේ කිරීම සඳහා පිරිවැය	2,000.00										
පොහොර ප්‍රවාහනය සඳහා පිරිවැය	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
රෝපණ ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය සඳහා පිරිවැය	5,000.00										
එකතුව	8,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
මුළු විවලය පිරිවැය (අක්කරයකට රු.)	460,718.00	232,586.00	253,380.00	260,880.00	305,880.00	339,230.00	369,230.00	401,730.00	402,511.00		
ප්‍රතිදාන	1	2	3	4	5	6	7	8 to 19	20 to 40		
පොල් සඳහා පිරිවැය	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00		
මුළු පිරිවැය (පොල් ඇතුළුව)	647,090.00	418,958.00	439,752.00	447,252.00	492,252.00	525,602.00	555,602.00	588,102.00	588,883.00		
දළ ආන්තිකය (අක්කරයකට රු.)	-337,509.00	-109,377.00	-106,556.00	46,524.00	178,634.00	217,545.00	332,067.00	444,089.00	443,308.00		

10% වරිටම් අනුපාතයකට
ශුද්ධ වර්තමාන වටිනාකම (අක්කරයකට රු.) 11,876,943.00
ප්‍රතිලාභ-පිරිවැය අනුපාතය 1.6
අභ්‍යන්තර ප්‍රතිලාභ අනුපාතය (%) = 31

ඇමුණුම 7: පොල් යටතේ අන්තාසි වගාව

අන්තාසි වල දළ ලාභය (අක්කරයකට රු.)

ක්‍රියාකාරකම	වසර				
	1	2	3	4	5
ප්‍රතිදාන					
අස්වැන්න (කිලෝග්‍රෑම්)		4,441.00	4,441.00	6,832.00	5,466.00
කිලෝග්‍රෑම් එකක මිල (රු.)		350.00	350.00	270.00	200.00
අන්තාසි වලින් ලැබෙන ආදායම (අක්කරයකට රු.)		1,554,280.00	1,554,280.00	1,844,640.00	1,093,120.00
මොරෙයියන්		6,832.00	6,832.00	6,832.00	6,832.00
මොරෙයියන් එකක මිල (රු.)		45.00	45.00	45.00	45.00
මොරෙයියන්ගෙන් ලැබෙන ආදායම (අක්කරයකට රු.)		307,440.00	307,440.00	307,440.00	307,440.00
අන්තාසි වලින් ලැබෙන ආදායම		1,861,720.00	1,861,720.00	2,152,080.00	1,400,560.00
පොල් අස්වැන්න (අක්කරයකට ගෙඩි)	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00
පොල් ගෙඩියක මිල (රු.)	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62
පොල් වලින් ලැබෙන ආදායම (අක්කරයකට රු.)	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00
මුළු ආදායම (පොල් ඇතුළුව)	309,580.00	2,171,300.00	2,171,300.00	2,461,660.00	1,710,140.00
ශ්‍රම භාවිතය (අක්කරයකට මිනිස් දින)					
ඉඩම පිරිසිදු කිරීම	2.00				
මොරෙයියන් රසායනික ද්‍රව්‍යවල ගිල්වීම	2.00				
සිටුවීම	6.00				
පොහොර යෙදීම සහ පස් එකතු කිරීම	27.00	27.00	27.00	27.00	
අතින් වල් හෙළීම (වසරට 2 වතාවක්)	34.00	34.00	34.00	34.00	
කෘමිනාශක සහ වල්නාශක යෙදීම	3.00	3.00	3.00	3.00	
හෝමෝන යෙදීම	2.00	4.00	4.00	4.00	
අස්වනු හෙළීම		10.00	20.00	20.00	
මොරෙයියන් ඉවත් කිරීම		11.00	11.00	11.00	
කොළ ඉවත් කිරීම		4.00	4.00	4.00	
මුළු ශ්‍රම භාවිතය (මිනිස් දින)	76.00	93.00	103.00	103.00	
වැටුප් අනුපාතය (මිනිස් දිනකට රු.)	2,500.00				
මුළු ශ්‍රම පිරිවැය (අක්කරයකට රු.)	190,000.00	232,500.00	257,500.00	257,500.00	87,500.00

ක්‍රියාකාරකම	වසර				
ප්‍රතිඵල	1	2	3	4	5
ද්‍රව්‍ය පිරිවැය (අක්කරයකට රු.)					
මොරෙයියන් ගණන	3,416.00				
මොරෙයියන් එකක මිල (රු.)	45.00				
මොරෙයියන් සඳහා පිරිවැය	153,720.00				
පොහොර සඳහා පිරිවැය	112,728.00	88,133.00	88,133.00	88,133.00	
පළිබෝධනාශක සඳහා පිරිවැය	8,540.00	8,540.00	17,080.00	17,080.00	17,080.00
එනුල් සඳහා පිරිවැය	1,281.00	1,281.00	1,281.00	2,562.00	2,562.00
වල්නාශක සඳහා පිරිවැය	25,620.00	25,620.00	25,620.00	25,620.00	25,620.00
මුළු ද්‍රව්‍ය පිරිවැය	301,889.00	123,574.00	132,114.00	133,395.00	45,262.00
ප්‍රවාහන වියදම (අක්කරයකට රු.)					
රෝපණ ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය සඳහා පිරිවැය	6,000.00				
පොහොර ප්‍රවාහනය සඳහා පිරිවැය	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
මුළු ප්‍රවාහන පිරිවැය	7,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
යන්ත්‍රෝපකරණ සඳහා පිරිවැය (අක්කරයකට රු.)					
සීසෑම සඳහා පිරිවැය	6,500.00				
හැරෝ කිරීම සඳහා පිරිවැය	4,000.00				
එකතුව	10,500.00				
මුළු විචල්‍ය පිරිවැය (අක්කරයකට රු.)	508,389.00	357,074.00	390,614.00	391,895.00	133,762.00
පොල් සඳහා පිරිවැය	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00
මුළු පිරිවැය (පොල් ඇතුළුව)	694,705.00	542,713.00	576,873.00	578,154.00	319,742.00
දළ ආන්තිකය (අක්කරයකට රු.)	-386,180.00	1,627,855.00	1,594,315.00	1,883,394.00	1,390,007.00

10% වට්ටම් අනුපාතයකට

ශුද්ධ වර්තමාන වටිනාකම (අක්කරයකට රු.) 3,341,228.00

ප්‍රතිලාභ-පිරිවැය අනුපාතය 2.4

අභ්‍යන්තර ප්‍රතිලාභ අනුපාතය (%) = 5.2

ඇමුණුම 8: පොල් යටතේ කෙසෙල් වගාව

කෙසෙල් වල දළ ලාභය (අක්කරයකට රු.)

ක්‍රියාකාරකම	වසර				
ප්‍රතිඵල	1	2	3	4	5
ඇඹුල් අස්වැන්න (අක්කරයකට කිලෝග්‍රෑම්)		1,553.00	2,330.00	1,747.00	1,035.00
සීනි අස්වැන්න (අක්කරයකට කිලෝග්‍රෑම්)		1,206.00	1,535.00	1,450.00	1,157.00
කෝලිකුට්ටු අස්වැන්න (අක්කරයකට කිලෝග්‍රෑම්)		1,980.00	2,475.00	2,475.00	1,716.00
ඇඹුල් කිලෝග්‍රෑම් එකක සාමාන්‍ය මිල (රු.)	100.00				
සීනි කිලෝග්‍රෑම් එකක සාමාන්‍ය මිල (රු.)	120.00				
කෝලිකුට්ටු කිලෝග්‍රෑම් එකක සාමාන්‍ය මිල (රු.)	80.00				
කෙසෙල් වලින් ලැබෙන ආදායම		854,438.00	1,110,166.00	1,041,638.00	722,898.00
ඇඹුල් මොරෙයියන්		134.00	134.00	134.00	134.00
සීනි මොරෙයියන්		134.00	134.00	134.00	134.00
කෝලිකුට්ටු මොරෙයියන්		300.00	300.00	300.00	300.00
මොරෙයියන්ගෙන් ලැබෙන ආදායම (අක්කරයකට රු.)		61,080.00	61,080.00	61,080.00	61,080.00
කෙසෙල් වලින් ලැබෙන ආදායම		915,518.00	1,171,246.00	1,102,718.00	783,978.00
පොල් නිෂ්පාදනය (අක්කරයකට ගෙඩි)		3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00
පොල් ගෙඩියක මිල (රු.)		80.62	80.62	80.62	80.62
පොල් වලින් ලැබෙන ආදායම	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	390,580.00
මුළු ආදායම	309,580.00	1,225,098.00	1,480,827.00	1,412,298.00	1,093,559.00
යෙදවුම්					
ශ්‍රම පිරිවැය (අක්කරයකට මිනිස් දින)					
වළවල් කැපීම	12.00				
වසරකට පොහොර යෙදීම	15.00	13.00	13.00	13.00	13.00
මොරෙයියන් රසායනික ද්‍රව්‍යවල ගිල්වීම	1.00				
සකස් කිරීම සහ සිටුවීම	11.00				
මොරෙයියන් ඉවත් කිරීම		6.00	6.00	6.00	6.00
වල් හෙළීම (අතින්, වසරකට 2 වතාවක්)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
කෘමිනාශක සහ පළිබෝධනාශක යෙදීම	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00

ක්‍රියාකාරකම	වසර				
ප්‍රතිඵල	1	2	3	4	5
පැරණි කෙසෙල් කඳුන් සහ කොළ ඉවත් කිරීම	5.00	27.00	27.00	27.00	27.00
අස්වනු නෙළීම		7.00	7.00	7.00	10.00
වෙනත් ක්‍රියාකාරකම්	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
මුළු ශ්‍රම භාවිතය (අක්කරයකට මිනිස් දින)	52.00	61.00	61.00	61.00	64.00
වැටුප් අනුපාතය	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
එකතුව	128,138.00	152,500.00	152,500.00	152,500.00	160,000.00
ද්‍රව්‍ය පිරිවැය (අක්කරයකට රු.)					
මොරෙයින් ගණන (කෝලිකුට්ටු)	132.00				
මොරෙයින් ගණන (ඇමුල්)	67.00				
මොරෙයින් ගණන (සීනි)	67.00				
මොරෙයින් එකක මිල (කෝලිකුට්ටු) (රු./සකර්)	150.00				
මොරෙයින් එකක මිල (සීනි + ඇමුල්) (රු./සකර්)	60.00				
මොරෙයින් සඳහා පිරිවැය	27,840.00				
පොහොර සඳහා පිරිවැය	320,237.00	167,420.00	167,420.00	167,420.00	167,420.00
පළිබෝධනාශක සඳහා පිරිවැය	6,650.00	3,990.00	390.00	3,990.00	3,990.00
එකතුව	354,727.00	171,410.00	171,410.00	171,410.00	171,410.00
ප්‍රවාහන වියදම (අක්කරයකට රු.)					
රෝපණ ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය සඳහා පිරිවැය	3,500.00				
පොහොර ප්‍රවාහනය සඳහා පිරිවැය	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
එකතුව	7,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
යන්ත්‍රෝපකරණ සඳහා පිරිවැය (අක්කරයකට රු.)					
ස්ලෑස් කිරීම සඳහා පිරිවැය	6,500.00				
එකතුව	6,500.00				
මුළු පිරිවැය (අක්කරයකට රු.)	498,865.00	325,910.00	325,910.00	325,910.00	333,410.00

ක්‍රියාකාරකම	වසර				
ප්‍රතිදාන	1	2	3	4	5
පොල් මිල	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00
මුළු පිරිවැය (පොල් ඇතුළුව)	683,237.00	12,282.00	12,282.00	12,282.00	19,782.00
දළ ආන්තිකය (අක්කරයකට රු.)	-373,657.00	712,817.00	968,545.00	900,016.00	573,777.00

10% වට්ටම් අනුපාතයකට

ශුද්ධ වර්තමාන වටිනාකම (අක්කරයකට රු.) 1,637,605.00

ප්‍රතිලාභ-පිරිවැය අනුපාතය 2.07

අභ්‍යන්තර ප්‍රතිලාභ අනුපාතය (%) = 20.6

ඇමුණුම 9: පොල් යටතේ අනෝදා වගාව
අනෝදා වල දළ ලාභය (අක්කරයකට රු.)

ක්‍රියාකාරකම		වසර											
ප්‍රතිදාන		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-15	16-20	
අනෝදා අස්වැන්න (අක්කරයකට කිලෝග්‍රෑම්)		-	787.58	1,260.00	2,362.58	3,937.58	5,315.65	5,315.65	5,315.65	5,315.65	5,512.50	4,567.52	
කිලෝග්‍රෑම් එකක මිල (රු.)			90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	
අනෝදා වලින් ලැබෙන ආදායම		-	708.86	113,400.00	212,632.00	354,382.00	478,408.00	478,408.00	478,408.00	478,408.00	496,125.00	411,076.00	
පොල් අස්වැන්න (අක්කරයකට ගෙඩි)		3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	
පොල් ගෙඩියක මිල (රු.)		80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	
පොල් වලින් ලැබෙන ආදායම (අක්කරයකට රු.)		309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	
මුළු ආදායම (පොල් ඇතුළුව)		309,580.00	380,463.00	422,980.00	522,213.00	663,963.00	787,988.00	787,988.00	787,988.00	787,988.00	805,705.00	720,657.00	
යෙදවුම්													
ශ්‍රම පිරිවැය (අක්කරයකට රු.)													
වළවල් කැපීම සහ සිටුවීම		5.00											
පොහොර යෙදීම		7.00	9.00	12.00	12.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	
සකස් කිරීම සහ සිටුවීම		7.00											
වල් නෙළීම (අතින්, වසරකට 2 වතාවක්)		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
වසුන් යෙදීම (වසරකට 2 වතාවක්)		3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
පළිබෝධ සහ රෝග පාලනය		2.00	2.00	3.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	7.00	9.00	
පරාගනය			2.00	2.00	4.00	4.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	11.00	
පුහුණු කිරීම සහ කප්පාදු කිරීම		2.00	2.00	4.00	5.00	5.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	

ක්‍රියාකාරකම		වසර										
ප්‍රතිඵල	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-15	16-20	
තණකොළ කැපීම සඳහා පිරිවැය	4,000.00											
එකතුව	4,000.00											
අනෙක් දෑ වගාව සඳහා පිරිවැය	166,053.00	139,933.00	186,061.00	234,257.00	288,770.00	364,600.00	364,484.00	367,110.00	367,110.00	379,725.00	369,725.00	
පොල් සඳහා පිරිවැය	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	
මුළු පිරිවැය (පොල් ඇතුළුව)	352,425.00	326,305.00	372,433.00	420,629.00	475,142.00	550,972.00	550,856.00	553,481.00	563,482.00	556,097.00	556,097.00	
දළ ආන්තිකය (අක්කරයකට රු.)	42,845.00	54,158.00	50,548.00	101,585.00	188,821.00	237,017.00	237,132.00	234,507.00	234,507.00	239,609.00	164,004.00	

10% වරිටම් අනුපාතයකට
ශුද්ධ වර්තමාන වටිනාකම (අක්කරයකට රු.) 141,677.00
ප්‍රතිලාභ-පිරිවැය අනුපාතය 1.3
අභ්‍යන්තර ප්‍රතිලාභ අනුපාතය (%) = 199

ඇමුණුම 10: පොල් යටතේ කපු වගාව
කපු වල දළ ලාභය (අක්කරයකට රු.)

ක්‍රියාකාරකම		වසර									
ප්‍රතිදානය		1	2	3	4	5	6-10	11-15	16-20	21-25	
කපු අස්වැන්න (අක්කරයකට කිලෝග්‍රෑම්)	-	-	-	24.50	49.00	98.00	313.60	539.00	588.00	612.50	
කපු කිලෝග්‍රෑම් එකක සාමාන්‍ය මිල (රු.)				600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	
පොල් අස්වැන්න (අක්කරයකට ගෙඩි)	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	
පොල් ගෙඩියක සාමාන්‍ය මිල (රු.)	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	
පොල් වලින් ලැබෙන ආදායම (අක්කරයකට රු.)	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	
මුළු ආදායම (පොල් ඇතුළුව)	309,580.00	309,580.00	324,280.00	339,980.00	368,380.00	497,740.00	632,980.00	662,380.00	677,080.00		
යෙදවුම්											
ශ්‍රම භාවිතය (මිනිස් දින)											
වළවල් කැපීම	2.00										
සකස් කිරීම සහ සිටුවීම	5.00										
පොහොර යෙදීම	1.00		2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
වල් නෙළීම (අතින්)	4.00		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
වසුන් යෙදීම	2.00		2.00	2.00	2.00						
පළිබෝධ සහ රෝග පාලනය	3.00		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
කප්පාදු කිරීම			1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	
අස්වනු නෙළීම සහ වියළීම			2.00	3.00	6.00	20.00	35.00	38.00	39.00		
මුළු ශ්‍රම භාවිතය (මිනිස් දින)	17.00		12.00	14.00	16.00	18.00	32.00	48.00	51.00	52.00	
වැරදුප් අනුපාතය (මිනිස් දිනකට රු.)	2,500.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
මුළු ශ්‍රම පිරවැය	42,500.00		30.00	35,000.00	40,000.00	45,000.00	80,000.00	120,000.00	127,500.00	130,000.00	

ක්‍රියාකාරකම		වසර									
යෙදවුම්		1	2	3	4	5	6-10	11-15	16-20	21-25	
ද්‍රව්‍ය පිරිවැය (අක්කරයකට රු.)											
පැළ සඳහා පිරිවැය	9,800.00										
පොහොර සඳහා පිරිවැය	13,286.00	2,429.00	3,481.00	3,731.00	5,570.00	8,271.00	12,407.00	16,542.00	20,678.00		
දිලීර නාශක සහ පළිබෝධනාශක සඳහා පිරිවැය	3,267.00	3,267.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	6,533.00	9,800.00	13,067.00	16,333.00		
මුළු ද්‍රව්‍ය පිරිවැය	26,353.00	5,695.00	8,381.00	8,631.00	10,470.00	14,805.00	22,207.00	29,609.00	37,011.00		
ප්‍රවාහන වියදම (අක්කරයකට රු.)											
රෝපණ ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය සඳහා පිරිවැය (අක්කරයකට රු.)	3,000.00										
පොහොර ප්‍රවාහනය සඳහා පිරිවැය	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
ඒකතුව	7,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
යන්ත්‍රෝපකරණ පිරිවැය (අක්කරයකට රු.)											
වල් මර්දනය සඳහා පිරිවැය	4,000.00										
ඒකතුව (අක්කරයකට රු.)	4,000.00										
සම්පූර්ණ විවලය පිරිවැය	79,853.00	39,695.00	47,381.00	52,630.00	59,470.00	98,805.00	99,503.00	146,207.00	161,109.00		
පොල් සඳහා පිරිවැය	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	
මුළු පිරිවැය (පොල් ඇතුළුව)	266,225.00	226,067.00	233,753.00	239,003.00	245,842.00	285,177.00	285,875.00	322,578.00	347,481.00		
දළ ආන්තිකය (අක්කරයකට රු.)	43,356.00	85,513.00	90,527.00	99,978.00	122,538.00	212,564.00	211,866.00	300,402.00	314,900.00		

10% වරිටම් අනුපාතයකට
ශුද්ධ වර්ගමාන වර්ගකම (අක්කරයකට රු.) 1,827,004.00
ප්‍රතිලාභ-පිරිවැය අනුපාතය 1.66
අභ්‍යන්තර ප්‍රතිලාභ අනුපාතය (%) = 29

ඇමුණුම 11: පොල් යටතේ අඹ වගාව
අඹ වල දළ ලාභය (අක්කරයකට රු.)

ක්‍රියාකාරකම්		වසර									
ප්‍රතිදානය		1	2	3	4	5	6-9	10-15			
අඹ අස්වැන්න (අක්කරයකට කිලෝග්‍රෑම්)						7,350.00	8,779.00	19,192.00			
කිලෝග්‍රෑම් එකක සාමාන්‍ය මිල (රු.)						100.00	100.00	100.00			
අඹ වලින් ලැබෙන ආදායම						735,000.00	877,921.00	1,919,167.00			
පොල් අස්වැන්න (අක්කරයකට ගෙඩි)	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00			
පොල් ගෙඩියක මිල (රු.)	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62			
පොල් වලින් ලැබෙන ආදායම (අක්කරයකට රු.)	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00			
මුළු ආදායම (පොල් ඇතුළුව)	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	1,044,581.00	1,187,502.00	2,228,747.00			
යෙදවුම්											
ශ්‍රම භාවිතය (මිනිස් දින)											
වළවල් කැපීම	2.00										
සකස් කිරීම සහ සිටුවීම	5.00										
පොහොර යෙදීම	6.00	7.00	9.00	9.00	9.00	10.00	7.00	7.00			
වල් හෙළීම (අතින්, වසරකට 3 වතාවක්)	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00			
වසුන් යෙදීම (පළමු වසර දෙක තුළ වසරකට 2 වතාවක්)	5.00	5.00									
පළිබෝධ සහ රෝග පාලනය	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00			
කප්පාදු කිරීම		2.00	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00			
අස්වනු හෙළීම						17.00	20.00	43.00			
මුළු ශ්‍රම භාවිතය (මිනිස් දින)	26.00	22.00	22.00	22.00	22.00	42.00	42.00	65.00			
වැටුප් අනුපාතය (මිනිස් දිනකට රු.)	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			

ක්‍රියාකාරකම		වසර						
යෙදවුම්		1	2	3	4	5	6-9	10-15
ශ්‍රම පිරිවය (අක්කරයකට රු.)		65,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	105,000	105,000.00	162,500.00
ද්‍රව්‍ය පිරිවය (අක්කරයකට රු.)								
පැළ ගණන		49.00						
පැළයක සාමාන්‍ය මිල (බද්ධ කළ පැළ)		200.00						
පැළ සඳහා පිරිවය		9,800.00						
පොහොර සඳහා පිරිවය		23,741.00	19,825.00	23,353.00	26,470.00	29,851.00	23,794.00	48,255.00
දිලීර නාශක සහ පළිබෝධ නාශක වල සඳහා පිරිවය		4,900.00	4,900.00	7,350.00	7,350.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00
සම්පූර්ණ ද්‍රව්‍ය පිරිවය		38,441.00	24,725.00	30,703.00	33,820.00	44,551.00	38,494.00	62,955.00
ප්‍රවාහන වියදම (අක්කරයකට රු.)								
රෝපණ ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය සඳහා පිරිවය (අක්කරයකට රු)		2,000.00						
පොහොර ප්‍රවාහනය සඳහා පිරිවය		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
සම්පූර්ණ ප්‍රවාහන පිරිවය		3,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
යන්ත්‍රෝපකරණ සඳහා පිරිවය								
වල් මර්දනය සඳහා පිරිවය		4,000.00						
චිකතුව		4,000.00						
අඹ වගාව සඳහා පිරිවය		110,941.00	81,225.00	87,203.00	90,320.00	151,050.00	162,289.00	226,955.00
පොල් සඳහා පිරිවය (අක්කරයකට රු.)		186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00
මුළු පිරිවය (පොල් ඇතුළුව)		297,312.00	267,597.00	273,575.00	276,692.00	337,423.00	348,661.00	413,327.00
දළ ආන්තිකය (අක්කරයකට රු.)		12,268.00	41,983.00	36,005.00	32,889.00	707,158.00	838,840.00	1,815,420.00

10% වට්ටම් අනුපාතයකට
 ශුද්ධ වර්තමාන වටිනාකම (අක්කරයකට රු.) 6,109,542.00
 ප්‍රතිලාභ-පිරිවැය අනුපාතය 3.2
 අභ්‍යන්තර ප්‍රතිලාභ අනුපාතය (%) = 71

ඇමුණුම 12: පොල් යටතේ කුරුඳු වගාව
කුරුඳු වල දළ ලාභය (අක්කරයකට රු.)

ක්‍රියාකාරකම		වසර										
ප්‍රතිදාන	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11to20	
අස්වැන්න (පඳුරකින් වසරකට කිලෝග්‍රෑම් - විශ්ලී බර)			0.04	0.05	0.08	0.11	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	
අස්වැන්න නෙළන පඳුරු ගණන (උපරිම 95%)			1,254.00	1,447.00	1,562.00	1,649.00	1,649.00	1,649.00	1,649.00	1,649.00	1,649.00	
රෝපණ සම්මතය			50.00	72.00	125.00	181.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	
සම්පූර්ණ විශ්ලී අස්වැන්න			25.00	36.00	62.00	91.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	
සැකසුම් පිරිවැය			25.00	36.00	62.00	91.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	
වගාකරුවාට ලැබෙන ශුද්ධ අස්වැන්න												
සාමාන්‍ය මිල - රු.4,000												
කුරුඳු වලින් ලැබෙන ආදායම			100,302.00	144,667.00	249,984.00	362,824.00	412,300.00	412,300.00	412,300.00	412,300.00	4,123,300.00	
කුරුඳු කෝටු වලින් ලැබෙන ආදායම			12,538.00	14,467.00	15,624.00	16,492.00	16,492.00	16,492.00	16,492.00	16,492.00	16,492.00	
පොල් අස්වැන්න (අක්කරයකට ගෙඩි)	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	
පොල් ගෙඩියක මිල (රු.)	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	
පොල් වලින් ලැබෙන ආදායම	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,680.00	309,580.00	309,580.00	
පොල් ඇතුළුව මුළු ආදායම	309,580.00	309,580.00	422,420.00	468,714.00	575,189.00	688,897.00	738,373.00	738,373.00	738,373.00	738,373.00	738,373.00	
ශ්‍රම භාජිතය (අක්කරයකට මිනිස් දින)												
වළවල් කැපීම	35.00											
වළවල් පිරවීම සහ සිටුවීම	29.00											

ක්‍රියාකාරකම		වසර										
යෙදවුම්		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11to20	
පසු රැකවරණය සහ පුරප්පාඩු පිරවීම	6.00	3.00	2.00	1.00								
	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	
	21.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	
පඳුරු කප්පාදු කිරීම සහ පිරිසිදු කිරීම		2.00	3.00	5.00	7.00	7.00	7.00	9.00	9.00	10.00	10.00	
	1.00	1.00	1.00	2.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	
වෙනත් ක්‍රියාකාරකම්	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
මුළු කම්කරු ඒකක ගණන	109.00	65.00	66.00	68.00	71.00	71.00	71.00	72.00	72.00	74.00	74.00	
වැටුප් අනුපාතය	2,500.00											
එකතුව	272,500.00	162,500.00	165,000.00	170,000.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	180,000.00	180,000.00	185,000.00	185,000.00	
දව්‍ය පිරවැය												
පැළ ගණන	1,736.00											
එක් පැළයක් සඳහා පිරවැය	18.00											
පැළ සඳහා මුළු පිරවැය	31,248.00											
පළිබෝධනාශක සහ දිලීර නාශක සඳහා පිරවැය	4,133.00	4,133.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	8,267.00	8,267.00	8,267.00	8,267.00	8,267.00		
පොහොර සඳහා පිරවැය	5,653.00	9,744.00	14,616.00	14,616.00	14,616.00	14,616.00	14,616.00	14,616.00	14,616.00	14,616.00		
එකතුව	41,035.00	13,878.00	20,816.00	20,816.00	20,816.00	22,883.00	22,883.00	22,883.00	22,883.00	22,883.00		

ක්‍රියාකාරකම		වසර										
ප්‍රතිදාන		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11to20	
යන්ත්‍රෝපකරණ සඳහා පිරිවැය (අක්කරයකට රු.)												
තණකොළ කැපීම සඳහා පිරිවැය	2,000.00											
පොහොර ප්‍රමාණය සඳහා වියදම	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
රෝපණ ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය සඳහා වියදම	4,000.00											
එකතුව	7,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
මුළු පිරිවැය (අක්කරයකට රු.)	321,034.00	177,878.00	187,316.00	192,316.00	199,816.00	201,882.00	201,882.00	204,383.00	204,383.00	209,383.00	186,500.00	
පොල් සඳහා පිරිවැය	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	
මුළු පිරිවැය (පොල් ඇතුළුව)	507,258.00	363,431.00	373,987.00	377,603.00	386,042.00	388,109.00	388,109.00	391,726.00	391,726.00	396,548.00	372,872.00	
දළ ආන්තිකය (අක්කරයකට රු.)	197,826.00	54,669.00	48,732.00	90,026.00	189,000.00	300,642.00	350,118.00	347,618.00	347,618.00	342,618.00	365,500.00	

10% වරිටම් අනුපාතයකට
 ශුද්ධ වර්තමාන වටිනාකම (අක්කරයකට රු.) 4,796, 366.00
 ප්‍රතිලාභ-පිරිවැය අනුපාතය 1.68
 අත්‍යන්තර ප්‍රතිලාභ අනුපාතය (%) = 48

