



# Math-Net.Ru

Общероссийский математический портал

Ю. Р. Агачев, Об одном приближенном методе решения дифференциальных уравнений, *Констр. теор. функц. и функц. анал.*, 1992, выпуск 8, 3–14

Использование Общероссийского математического портала Math-Net.Ru подразумевает, что вы прочитали и согласны с пользовательским соглашением

<http://www.mathnet.ru/rus/agreement>

Параметры загрузки:

IP: 178.205.19.235

7 июня 2024 г., 16:30:22



Ю.Р.Агачев

ОБ ОДНОМ ПРИБЛИЖЕННОМ МЕТОДЕ РЕШЕНИЯ  
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

К настоящему времени разработаны достаточно эффективные прямые методы решения дифференциальных уравнений с непрерывными, в том числе и гладкими, коэффициентами (см., например, [1 - 4] и др.). Однако в случае уравнений с разрывными коэффициентами остаются еще задачи, связанные, с одной стороны, с вопросами обоснования известных методов и, с другой - с разработкой новых, более простых, прямых методов, учитывающих особенности коэффициентов уравнения. Следует отметить, что в последние годы появился ряд работ (см., например, [5 - 7]), в которых дано обоснование полиномиального и сплайнового методов под областей решения дифференциальных уравнений в пространствах  $L_p$ , суммируемых с  $0$ -й степенью ( $1 \leq p < \infty$ ) или существенно ограниченных ( $p = \infty$ ) функций.

В данной работе для приближенного решения обыкновенных дифференциальных уравнений произвольного порядка предлагается прямой метод, который достаточно прост в применении и в то же время применим и к уравнениям с произвольными суммируемыми коэффициентами.

§ 1. Вычислительная схема метода

Рассмотрим краевую задачу

$$R_n(x) = 0, \quad n = \overline{0, m-1} \quad (1)$$

для дифференциального уравнения

$$Kx = x^{(m)}(t) + \sum_{\kappa=1}^m g_{\kappa}(t)x^{(m-\kappa)}(t) = y(t), \quad a \leq t \leq b; \quad (2)$$

где  $g_{\kappa}(t)$ ,  $\kappa = \overline{1, m}$  и  $y(t)$  - известные функции, а  $R_n$ ,

$\nu = \overline{0, m-1}$ , — линейно независимые непрерывные функционалы на пространстве  $C^{(m-1)}[a, b]$  непрерывно дифференцируемых  $(m-1)$  раз на  $[a, b]$  функций. Зададим в промежутке  $[a, b]$  сетку узлов

$$\Delta_n: a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b, \quad (3)$$

удовлетворяющую условию

$$\|\Delta_n\| = \max_k (t_k - t_{k-1}) \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

I.1. Приближенное решение задачи (I), (2) будем искать в виде сплайна (см. [8, 9])  $x_n(t) \equiv x_{n,m}(t)$  степени  $m$  дефекта I на сетке (3). Ясно, что  $x_n(t)$  имеет  $(n+m)$ -неизвестных коэффициентов. Определим их из следующих условий:

$$x_n^{(m)}(t_j) + \sum_{k=1}^m \frac{1}{t_j - t_{j-1}} \int_{t_{j-1}}^{t_j} g_k(t) dt \cdot x_n^{(m-k)}(t_j) = \frac{1}{t_j - t_{j-1}} \int_{t_{j-1}}^{t_j} y(t) dt, \quad j = \overline{1, n}, \quad (4)$$

$$R_\nu(x_n) = 0, \quad \nu = \overline{0, m-1}. \quad (5)$$

Очевидно, метод (4), (5) представляет собой прямой метод, т.е. условия (4), (5) дают систему  $(n+m)$ -линейных алгебраических уравнений (кратко: СЛАУ) относительно  $(n+m)$ -неизвестных. Заметим, что схема метода (4), (5) имеет смысл, как и схема хорошо известного метода подобластей, и в случае лишь суммируемых коэффициентов исходного уравнения (2). С другой стороны, схема метода (4), (5), использующего усреднение коэффициентов на частных промежутках, значительно проще схемы метода подобластей.

I.2. Теперь будем решать задачу (I), (2) приближенно с помощью сплайна  $x_n(t) \equiv x_{n,m+1}(t)$  степени  $m+1$  дефекта I на сетке (3), определив его неизвестные коэффициенты из СЛАУ

$$\left. \begin{aligned} x_n^{(m)}(t_j) + \sum_{k=1}^m \varphi_j(g_k) x_n^{(m-k)}(t_j) &= \varphi_j(y), \quad j = \overline{0, n}, \\ R_\nu(x_n) &= 0, \quad \nu = \overline{0, m-1}, \end{aligned} \right\} \quad (6)$$

где  $\varphi_j(x) = \frac{1}{t_j - t_{j-1}} \int_{t_{j-1}}^{t_j} x(t) dt, \quad j = \overline{1, n}$ , — суть средние значения функции

$x(t)$  на частичных промежутках,  $\varphi_0 = \varphi_1$  - в непериодическом случае и  $\varphi_0 = \varphi_n$  - в периодическом.

## § 2. Обоснование метода

Относительно вычислительной схемы (4), (5) справедлива

**Т е о р е м а** I. Пусть функции  $g_\kappa \in L_p(a, b)$ ,  $\kappa = \overline{1, m}$ , и задача (I), (2) однозначно разрешима при любой правой части  $y \in L_p(a, b)$ ,  $1 \leq p \leq \infty$ . Тогда, начиная с некоторого номера  $n$ , система (4), (5), также однозначно разрешима и соответствующие решения  $x_n^*(t) \equiv x_{n,m}^*(t)$  сходятся к точному решению  $x^*(t)$  задачи (I), (2) с быстротой

$$\begin{aligned} \|x^* - x_n^*\|_{W_p^{(m)}(a, b)} &\equiv \sum_{\kappa=0}^{m-1} \|x^{*(\kappa)} - x_n^{*(\kappa)}\|_{C[a, b]} + \\ &+ \|x^{*(m)} - x_n^{*(m)}\|_{L_p(a, b)} = O \left\{ E_n^o(y)_p + \sum_{\kappa=1}^m E_n^o(g_\kappa)_p + \right. \\ &\left. + \|\Delta_n\|^{(1-1/p)} \cdot \max_t \|g_1(t+\cdot)\|_{L_p(0, \|\Delta_n\|)} + \|\Delta_n\| \right\}, \quad 1 \leq p \leq \infty; \end{aligned} \quad (7)$$

здесь  $E_n^o(x)_p$  означает наилучшее приближение функции  $x \in L_p(a, b)$  сплайнами нулевой степени дефекта I с узлами (3).

**С л е д с т в и е.** Пусть сетка  $\Delta_n$  узлов (3) удовлетворяет условию

$$\|\Delta_n\| / \min_{\kappa} (t_\kappa - t_{\kappa-1}) \leq \beta < \infty, \quad (8)$$

где  $\beta > 0$  - абсолютная постоянная. Тогда для погрешности приближенных решений верна оценка<sup>I</sup>

$$\begin{aligned} \|x^* - x_n^*\|_{W_p^{(m)}(a, b)} &= O \left\{ \omega(y; \frac{1}{n})_p + \sum_{\kappa=1}^m \omega(g_\kappa; \frac{1}{n})_p + \right. \\ &\left. + \max_t \|g_1(t+\cdot)\|_{L_p(0, \|\Delta_n\|)} \cdot n^{-(1-1/p)} + n^{-1} \right\}, \quad 1 \leq p \leq \infty; \end{aligned} \quad (7')$$

<sup>I</sup> Здесь и далее  $\omega(x; \delta)_p$  означает интегральный модуль непрерывности функции  $x \in L_p(a, b)$ , вычисленный в точке  $\delta$ .

в частности, если  $g_i \in L_\infty(a, b)$ , то

$$\|x^* - x_n^*\|_{W_p^{(m)}(a, b)} = O\left\{\omega\left(y; \frac{1}{n}\right)_p + \sum_{k=1}^m \omega\left(g_k; \frac{1}{n}\right)_p + n^{-1}\right\}, \quad 1 \leq p \leq \infty.$$

Доказательство. Обозначим через  $Y$  пространство  $L_p(a, b)$  с обычной нормой, а через  $X$  — пространство  $W_p^{(m)}(a, b)$  функций, имеющих  $(m-1)$ -ю абсолютно непрерывную производную,  $m$ -ю производную из  $L_p(a, b)$  и удовлетворяющих краевым условиям (I). Норму в  $X$  зададим следующим образом:

$$\|x\|_X = \sum_{k=0}^{m-1} \|x^{(k)}\|_C + \|x^{(m)}\|_{L_p} \quad (x \in X).$$

Тогда задачу (I), (2) можно записать в виде операторного уравнения

$$Kx = Gx + Tx = y, \quad Gx = x^{(m)} \quad (x \in X, y \in Y), \quad (9)$$

где  $T: X \rightarrow Y$  — вполне непрерывный оператор, определяемый соотношением

$$(Tx)(t) = \sum_{k=1}^m g_k(t) x^{(m-k)}(t), \quad x \in X.$$

Поскольку уравнение (9) — приводящееся к уравнению II рода с вполне непрерывным оператором, то в условиях теоремы существует линейный обратный  $K^{-1}: Y \rightarrow X$ ,  $\|K^{-1}\| < \infty$ .

Запишем теперь систему (4), (5) в виде эквивалентного ей операторного уравнения. С этой целью перепишем условия (4) с помощью введенных выше функционалов  $\varphi_k$ ,  $k = \overline{1, n}$ , в виде

$$x_n^{(m)}(t_j) + \sum_{k=1}^m \varphi_j(g_k) x_n^{(m-k)}(t_j) = \varphi_j(y), \quad j = \overline{1, n}. \quad (4')$$

Далее введем  $X_n \subset X$  и  $Y_n \subset Y$  — подпространства сплайнов степени  $m$  дефекта I и сплайнов нулевой степени дефекта I соответственно на сетке узлов (3). Ясно, что  $\dim X_n = \dim Y_n$ . Рассмотрим два оператора  $P_n$  и  $Q_n$ , действующие из  $Y$  в  $Y_n$ : оператор  $P_n$  любой функции ставит в соответствие интерполяционный сплайн нулевой степени, а  $Q_n$  — "усредненный" интерполяционный сплайн нулевой степени (см. [7]), т.е.

$$(p_n y)(t) = \sum_{i=1}^n y(t_i) \varphi_i(t), \quad (Q_n y)(t) = \sum_{i=1}^n \varphi_i(y) \varphi_i(t),$$

$$\varphi_i(t) = \begin{cases} 1, & t_0 \leq t \leq t_i \\ 0, & t > t_i \end{cases}, \quad \varphi_i(t) = \begin{cases} 1, & t_{i-1} < t \leq t_i \\ 0, & t \leq t_{i-1} \text{ и } t > t_i \end{cases} \quad (i = \overline{2, n}).$$

Тогда схема (4'), (5) или, что то же, (4), (5) эквивалентна операторному уравнению

$$K_n x_n = x_n^{(m)} + p_n \sum_{k=1}^m (Q_n g_k) x_n^{(m-k)} = Q_n y \quad (x_n \in X_n). \quad (10)$$

Действительно, так как  $x_n^{(m)} \in Y_n$  и  $Q_n y \in Y_n$ , а оператор  $p_n$  обладает свойством  $p_n^2 = p_n$ , то (10) можно переписать в виде

$$p_n x_n = p_n \left[ x_n^{(m)} + \sum_{k=1}^m (Q_n g_k) x_n^{(m-k)} \right] = p_n Q_n y.$$

Отсюда непосредственно следует равенство функций  $x_n$  и  $Q_n y$  в узлах  $t_1, t_2, \dots, t_n$ , т.е. (4'). Обратно, пусть выполнены (4'). Тогда верно равенство

$$\sum_{j=1}^n \left[ x_n^{(m)}(t_j) + \sum_{k=1}^m \varphi_j(g_k) x_n^{(m-k)}(t_j) \right] \varphi_j(t) = \sum_{j=1}^n \varphi_j(y) \varphi_j(t). \quad (11)$$

Ясно, что правая часть (11) есть функция  $(Q_n y)(t)$ . Преобразуем теперь левую часть (11). Имеем

$$\begin{aligned} & \sum_{j=1}^n \left[ x_n^{(m)}(t_j) + \sum_{k=1}^m \varphi_j(g_k) x_n^{(m-k)}(t_j) \right] \varphi_j(t) = \\ &= \sum_{j=1}^n x_n^{(m)}(t_j) \varphi_j(t) + \sum_{k=1}^m \sum_{j=1}^n \varphi_j(g_k) x_n^{(m-k)}(t_j) \varphi_j(t) = \\ &= (p_n x_n^{(m)})(t) + \sum_{k=1}^m \sum_{j=1}^n \left( \sum_{\ell=1}^n \varphi_\ell(g_k) \varphi_\ell(t) \right) x_n^{(m-k)}(t_j) \varphi_j(t) = \\ &= x_n^{(m)}(t) + \sum_{k=1}^m (Q_n g_k)(t) (p_n x_n^{(m-k)})(t), \end{aligned} \quad (12)$$

так как  $\varphi_\ell(t) \varphi_j(t) = 0$ ,  $\ell \neq j$ .

Но  $Q_n g_k \in Y_n$ ,  $\rho_n x_n^{(m-k)} \in Y_n$ ,  $k=1, 2, \dots, m$ . Поэтому

$$(Q_n g_k) \rho_n x_n^{(m-k)} = \rho_n [(Q_n g_k) x_n^{(m-k)}] \quad (I3)$$

и, следовательно, соотношение (I2) можно переписать в виде

$$x_n^{(m)}(t) = \rho_n \left\{ \sum_{k=1}^m (Q_n g_k)(t) x_n^{(m-k)}(t) \right\}.$$

Таким образом, из равенств (4') с учетом (5) следует (I0).

Докажем теперь, что уравнение (I0) при достаточно больших  $n$  однозначно разрешимо. Для этого достаточно по теореме 7 из гл. I [3] показать близость операторов  $K$  и  $K_n$  на подпространстве  $X_n$ . Для произвольного элемента  $x_n \in X_n$ , учитывая равенство (I3) и используя неравенство Минковского, имеем

$$\begin{aligned} \|Kx_n - K_n x_n\|_Y &= \left\| \sum_{k=1}^m g_k x_n^{(m-k)} - \sum_{k=1}^m (Q_n g_k) \rho_n x_n^{(m-k)} \right\|_Y \leq \\ &\leq \sum_{k=1}^m \|g_k - Q_n g_k\|_Y \cdot \|x_n^{(m-k)}\|_C + \sum_{k=2}^m \|Q_n g_k\|_Y \cdot \|x_n^{(m-k)} - \rho_n x_n^{(m-k)}\|_{L_\infty} + \\ &+ \|(Q_n g_1)(x_n^{(m-1)} - \rho_n x_n^{(m-1)})\|_Y = \\ &= J_1 + J_2 + J_3. \end{aligned} \quad (I4)$$

Первое слагаемое  $J_1$  в (I4) оценивается просто:

$$J_1 \leq 2 \sum_{k=1}^m E_n^o(g_k)_\rho \|x_n^{(m-k)}\|_C = O \left\{ \sum_{k=1}^m E_n^o(g_k)_\rho \right\} \|x_n\|_X. \quad (I5)$$

Далее, так как  $Q_n: Y \rightarrow Y$  ограничен, то  $\|Q_n g_k\|_Y = O(1)$ , и следовательно,

$$\begin{aligned} J_2 &= O \left\{ \sum_{k=2}^m \|x_n^{(m-k)} - \rho_n x_n^{(m-k)}\|_{L_\infty} \right\} = \\ &= O \left\{ \sum_{k=2}^m \omega(x_n^{(m-k)}; \|A_n\|)_C \right\} = O \left\{ \|A_n\| \right\} \|x_n\|_X. \end{aligned} \quad (I6)$$

Займемся теперь оценкой в (I4) третьего слагаемого. Имеем

$$J_3^p = \sum_{k=1}^n \int_{t_{k-1}}^{t_k} |(Q_n g_1)(t) [x_n^{(m-1)}(t) - (p_n x_n^{(m-1)})(t)]|^\rho dt =$$

$$= \sum_{k=1}^n \left| \frac{1}{t_k - t_{k-1}} \int_{t_{k-1}}^{t_k} g_1(\tau) d\tau \right|^\rho \int_{t_{k-1}}^{t_k} |x_n^{(m-1)}(t) - x_n^{(m-1)}(t_k)|^\rho dt,$$

откуда с помощью неравенства Гельдера находим

$$J_3^p \leq \sum_{k=1}^n (t_k - t_{k-1})^{\rho-1} \int_{t_{k-1}}^{t_k} |g_1(\tau)|^\rho d\tau \int_{t_{k-1}}^{t_k} |x_n^{(m)}(\tau)|^\rho d\tau \leq$$

$$\leq \| \Delta_n \|^{(\rho-1)} \cdot \max_k \int_0^{t_k - t_{k-1}} |g_1(\tau + t_{k-1})|^\rho d\tau \| x_n^{(m)} \|_{L_p}^\rho.$$

Таким образом,

$$J_3 \leq \| \Delta_n \|^{(1-1/\rho)} \max_t \| g_1(t+\cdot) \|_{L_p(0, \| \Delta_n \|)} \cdot \| x_n \|_X. \quad (I7)$$

Неравенства (I5) - (I7) позволяют продолжить оценку (I4) и получить

$$\| K - K_n \|_{X_n \rightarrow Y} = O \left\{ \sum_{k=1}^m E_n^\circ(g_k)_p + \right.$$

$$\left. + \| \Delta_n \|^{(1-1/\rho)} \cdot \max_t \| g_1(t+\cdot) \|_{L_p(0, \| \Delta_n \|)} + \| \Delta_n \| \right\} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

Тогда утверждения теоремы непосредственно следуют из теоремы 7 главы I монографии [3].

Теперь перейдем к обоснованию вычислительной схемы (6). Для этого нам понадобится следующий результат (см., например, в [10]).

**Л е м м а.** Пусть  $x(t)$  - произвольная функция, для которой существует производная  $x' \in L_p(a, b)$ ,  $-\infty < a < b < +\infty$ ,  $1 \leq p \leq \infty$ . Если  $\mathcal{L}_1(x, t)$  есть интерполяционный полином первой степени для  $x(t)$  с узлами  $a$  и  $b$ , т.е.

$$(\mathcal{L}_1 x)(t) \equiv \mathcal{L}_1(x; t) = x(a) \frac{b-t}{b-a} + x(b) \frac{t-a}{b-a},$$

то



$$\int_a^b |\dot{x}(t) - \dot{x}_n^*(t)|^p dt \leq 2 \left( \frac{b-a}{2} \right)^{p-1} \int_0^{b-a} du \int_a^{b-u} |\dot{x}'(t+u) - \dot{x}'(t)|^p dt, \quad 1 \leq p \leq \infty.$$

Для вычислительной схемы (6) верна

**Т е о р е м а 2.** Пусть узлы сетки (3) удовлетворяют условию (8) и выполнены предположения теоремы I. Тогда система (6) имеет единственное решение, хотя бы при всех достаточно больших  $n$ , и соответствующие приближенные решения  $x_n^*(t)$  сходятся к точному решению  $x^*(t)$  со скоростью (7').

Действительно, как и при доказательстве теоремы I, обозначив через  $X_n \subset X$  и  $Y_n \subset Y$  подпространства сплайнов  $(m+1)$ -й и первой степени на сетке узлов (3) соответственно, систему (6) можно записать в виде эквивалентного ей операторного уравнения (10). Здесь через  $P_n$  и  $Q_n$  обозначены соответственно интерполяционный и "усредненный" интерполяционный (см. [7]) сплайны первой степени на сетке (3). Однако при доказательстве близости операторов  $K$  и  $K_n$  уравнений (9) и (10) на подпространстве  $X_n$  равенство (13) уже не выполняется. Поэтому для произвольного  $x_n \in X_n$  оценку величины  $\|Kx_n - K_n x_n\|_Y$  проведем следующим образом:

$$\begin{aligned} \|Kx_n - K_n x_n\| &\leq \sum_{\kappa=1}^m \|g_\kappa x_n^{(m-\kappa)} - (Q_n g_\kappa) P_n x_n^{(m-\kappa)}\|_{L_p} + \\ &+ \sum_{\kappa=1}^m \|(Q_n g_\kappa) P_n x_n^{(m-\kappa)} - P_n [(Q_n g_\kappa) x_n^{(m-\kappa)}]\|_{L_p} = J_1 + J_2. \end{aligned} \quad (18)$$

Первое слагаемое в (18) с помощью леммы 2 [7] оценивается так же, как и при доказательстве теоремы I:

$$\begin{aligned} J_1 &= O \left\{ \sum_{\kappa=1}^m \omega(g_\kappa; 1/n)_p + n^{(1/p-1)} \cdot \max_t \|g_1(t+\cdot)\|_{L_p(0, \|A_n\|)} + \right. \\ &\quad \left. + n^{-1} \right\} \|x_n\|_X. \end{aligned} \quad (19)$$

Перейдем теперь к оценке второго слагаемого  $J_2$ . Для этого прежде всего заметим, что имеют место равенства

$$P_n g_\kappa = P_n [(Q_n g_\kappa) x_n^{(m-\kappa)}] = P_n [(Q_n g_\kappa) P_n x_n^{(m-\kappa)}], \quad \kappa = 1, 2, \dots, m.$$

Поэтому, используя приведенную выше лемму,  $J_2$  можно оценить так:

$$\begin{aligned}
 J_2 &= \sum_{\kappa=1}^m \| (Q_n g_\kappa)^{p_n} x_n^{(m-\kappa)} - p_n [(Q_n g_\kappa)^{p_n} x_n^{(m-\kappa)}] \|_{L_p} = \\
 &= \sum_{\kappa=1}^m \left\{ \sum_{i=1}^n \int_{t_{i-1}}^{t_i} | (Q_n g_\kappa)(t) (p_n x_n^{(m-\kappa)})(t) - \right. \\
 &\quad \left. - p_n [(Q_n g_\kappa)(t) (p_n x_n^{(m-\kappa)})(t)]^p dt \right\}^{1/p} = \\
 &= O \left\{ \sum_{\kappa=1}^m \left[ \sum_{i=1}^n \int_0^{\pi_i} p_i^{p-1} du \int_{t_{i-1}}^{t_i-u} | \dot{x}_\kappa'(t+u) - \dot{x}_\kappa'(t) |^p dt \right]^{1/p} \right\}, \\
 \pi_i &\equiv t_i - t_{i-1}.
 \end{aligned} \tag{20}$$

Рассмотрим для произвольно фиксированных  $i$  и  $\kappa$  ( $i=1, 2, \dots, n; \kappa=1, 2, \dots, m$ ) интеграл

$$J_i(\dot{x}_\kappa) = \int_0^{\pi_i} du \int_{t_{i-1}}^{t_i-u} | \dot{x}_\kappa'(t+u) - \dot{x}_\kappa'(t) |^p dt.$$

Очевидно,

$$\begin{aligned}
 \dot{x}_\kappa'(t) &= (Q_n g_\kappa)'(t) (p_n x_n^{(m-\kappa)})(t) + \\
 &+ (Q_n g_\kappa)(t) (p_n x_n^{(m-\kappa)})'(t),
 \end{aligned}$$

причем функции  $(Q_n g_\kappa)'(t)$  и  $(p_n x_n^{(m-\kappa)})'(t)$  постоянны в промежутке  $(t_{i-1}, t_i)$ . Поэтому

$$\begin{aligned}
 J_i(\dot{x}_\kappa) &= \int_0^{\pi_i} du \left\{ \int_{t_{i-1}}^{t_i-u} | (Q_n g_\kappa)'(t) |^p | (p_n x_n^{(m-\kappa)})(t+u) - \right. \\
 &\quad \left. - (p_n x_n^{(m-\kappa)})(t) |^p dt + \int_{t_{i-1}}^{t_i-u} | (Q_n g_\kappa)(t+u) - \right.
 \end{aligned}$$

$$-(q_n g_K)(t) \Big|^\rho \Big| (p_n x_n^{(m-K)})'(t) \Big|^\rho dt \Big\} = \frac{2}{\pi_i^{2\rho}} |x_n^{(m-K)}(t_i) - x_n^{(m-K)}(t_{i-1})|^\rho \int_0^{\pi_i} u^\rho du \int_{t_{i-1}}^{t_i} |\varphi_i(g_K) - \varphi_{i-1}(g_K)|^\rho dt. \quad (21)$$

По неравенству Гельдера имеем

$$|x_n^{(m-K)}(t_i) - x_n^{(m-K)}(t_{i-1})|^\rho = \left| \int_{t_{i-1}}^{t_i} x_n^{(m-K+1)}(\tau) d\tau \right|^\rho \leq \pi_i^{\rho-1} \int_{t_{i-1}}^{t_i} |x_n^{(m-K+1)}(\tau)|^\rho d\tau. \quad (22)$$

Далее, вычитая и прибавляя функцию  $g_K(t)$ , а затем используя известное неравенство  $(c+d)^\rho \leq 2^{\rho-1}(c^\rho + d^\rho)$ ,  $c \geq 0, d \geq 0, \rho \geq 1$  и неравенство Гельдера, последовательно находим

$$\begin{aligned} \delta_i(g_K) &\equiv \int_{t_{i-1}}^{t_i} |\varphi_i(g_K) - \varphi_{i-1}(g_K)|^\rho dt = 0 \left\{ \int_{t_{i-1}}^{t_i} |\varphi_i(g_K) - \right. \\ &\quad \left. - g_K(t) \right|^\rho dt + \int_{t_{i-1}}^{t_i} |\varphi_{i-1}(g_K) - g_K(t)|^\rho dt \Big\} = \\ &= 0 \left\{ \int_{t_{i-1}}^{t_i} \left| \frac{1}{\pi_i} \int_{t_{i-1}}^{t_i} [g_K(\tau) - g_K(t)] d\tau \right|^\rho dt + \int_{t_{i-1}}^{t_i} \left| \frac{1}{\pi_{i-1}} \int_{t_{i-2}}^{t_{i-1}} [g_K(\tau) - \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - g_K(t)] d\tau \right|^\rho dt \right\} = 0 \left\{ \frac{1}{\pi_i} \int_{t_{i-1}}^{t_i} \int_{t_{i-1}}^{t_i} |g_K(\tau) - g_K(t)|^\rho d\tau dt + \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{\pi_{i-1}} \int_{t_{i-1}}^{t_i} \int_{t_{i-2}}^{t_{i-1}} |g_K(\tau) - g_K(t)|^\rho d\tau dt \right\}; \end{aligned} \quad (23)$$

здесь нужно иметь в виду, что при  $i=1$

$$\delta_i \equiv \frac{1}{\pi_{i-1}} \int_{t_{i-1}}^{t_i} \int_{t_{i-2}}^{t_{i-1}} |g_K(\tau) - g_K(t)|^\rho d\tau dt = \frac{1}{\pi_i} \int_{t_{i-1}}^{t_i} \int_{t_{i-1}}^{t_i} |g_K(\tau) - g_K(t)|^\rho d\tau dt$$

в случае непериодическом и

$$\alpha_i = \frac{1}{\pi_n} \int_{t_{i-1}}^{t_i} \int_{t_{n-1}}^{t_n} |g_\kappa(\tau) - g_\kappa(t)|^p d\tau dt$$

в случае периодическом. Поэтому, учитывая соотношение [II]

$$\iint_{cc}^{dd} |f(t) - f(x)|^p dt dx = 0 \left\{ \int_0^{d-c} \omega(f; \tau)_\rho^p d\tau \right\}, f \in L_\rho(c, d), -\infty \leq c < d \leq +\infty,$$

оценку (23) можно продолжить (см. также доказательство леммы 2 [7]):

$$\begin{aligned} \delta_i(g_\kappa) &= 0 \left\{ \frac{1}{\pi_i} \int_0^{\pi_i} \omega(g_\kappa; \tau)_\rho^p d\tau + \right. \\ &+ \left. \frac{1}{\pi_{i-1}} \int_0^{\pi_{i-1} + \pi_i} \omega(g_\kappa; \tau)_\rho^p d\tau \right\} = 0 \left\{ \omega(g_\kappa; 1/n)_\rho^p \right\}. \end{aligned} \quad (24)$$

Объединяя (22), (24) вместе с (21), получим

$$\delta_i(x_\kappa) = 0 \left\{ \omega(g_\kappa; 1/n)_\rho^p \right\} \int_{t_{i-1}}^{t_i} |x_n^{(m-\kappa+1)}(\tau)|^p d\tau. \quad (25)$$

Отметим, что оценка (25) справедлива при каждом фиксированном  $i$ ,  $i = \overline{1, n}$ , и  $\kappa$ ,  $\kappa = \overline{1, m}$ . Следовательно, подстановка (25) в соотношение (20) позволяет для  $J_2$  вывести оценку:

$$J_2 = 0 \left\{ n^{(1/p-1)} \cdot \sum_{\kappa=1}^m \omega(g_\kappa; 1/n)_\rho \right\} \|x_n\|_X.$$

Из (18), (19) и последней оценки в свою очередь вытекает

$$\begin{aligned} \|K - K_n\|_{X_n \rightarrow Y} &= 0 \left\{ \sum_{\kappa=1}^m \omega(g_\kappa; 1/n)_\rho + \right. \\ &+ \left. n^{(1/p-1)} \cdot \max_t \|g_1(t+\cdot)\|_{L_\rho(0, \|\Delta_n\|)} + n^{-1} \right\} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Остальное очевидно.

З а м е ч а н и е. При  $\rho = \infty$ , в частности в случае непрерывных коэффициентов уравнения (2), на сетку (3) не нужно накладывать условие (8).

В заключение отметим, что вопросы построения по данному методу полиномиальных приближений для дифференциальных уравнений могут быть рассмотрены аналогично.

#### Л и т е р а т у р а

1. Канторович Л. В., Акилов Г. П. Функциональный анализ. - М.: Наука, 1977. - 744 с.

2. Марчук Г. И., Агошков В. И. Введение в проекционно-сеточные методы. - М.: Наука, 1981. - 416 с.

3. Габдулхаев Б. Г. Оптимальные аппроксимации решений линейных задач. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1980. - 232 с.

4. Лучка А. Ю. Проекционно-итеративные методы решения дифференциальных и интегральных уравнений. - Киев: Наукова думка, 1980. - 264 с.

5. Керге Р. М. К оценке погрешности метода подобластей // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. - 1978. - Т. 18. - № 3. - С. 628 - 633.

6. Ермолаева Л. Б. Аппроксимативные свойства полиномиальных операторов и решение интегральных и интегродифференциальных уравнений методом подобластей: Дисс. ... канд. физ.-мат. наук. - Казань, 1987. - 154 с.

7. Агачев Ю. Р. Сходимость метода подобластей и одного "смешанного" метода для интегральных и дифференциальных уравнений. - Казань, 1986. - 49 с. - Рукопись представлена Казан. ун-том. Деп. в ВИНТИ 22 дек. 1986, № 9039 - В86.

8. Стечкин С. Б., Субботин Ю. Н. Сплайны в вычислительной математике. - М.: Наука, 1976. - 248 с.

9. Завьялов Ю. С., Квасов Б. И., Мирошников В. Л. Методы сплайн-функций. - М.: Наука, 1980. - 352 с.

10. Агачев Ю. Р. Сплайновые приближения решений интегральных и дифференциальных уравнений: Дисс. ... канд. физ.-мат. наук. - Казань, 1987. - 144 с.

11. Ульянов П. Л. О рядах по системе Хаара // Матем. сб. - 1964. - Т. 63. - № 3. - С. 356 - 391.