



Math-Net.Ru

Общероссийский математический портал

Л. А. Сурай, Метод механических кубатур для многомерных слабо сингулярных интегральных уравнений первого рода, *Констр. теор. функц. и функц. анал.*, 1992, выпуск 8, 68–76

Использование Общероссийского математического портала Math-Net.Ru подразумевает, что вы прочитали и согласны с пользовательским соглашением

<http://www.mathnet.ru/rus/agreement>

Параметры загрузки:

IP: 178.205.19.235

7 июня 2024 г., 16:30:51



2. Gudder S. P. An extension of classical measure theory // SIAM Review. - 1984. - Vol.26. - No I. - P.71 - 89.

3. Gudder S. P. Stochastic Methods in Quantum Mechanics. - North - Holland, New York, 1979.

4. Овчинников П. Т. Строение мер на квантовых логиках: Автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук. - Казань, 1985.

Л.А.Сурай

МЕТОД МЕХАНИЧЕСКИХ КУБАТУР ДЛЯ МНОГОМЕРНЫХ СЛАБО СИНГУЛЯРНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ПЕРВОГО РОДА

Рассмотрим двумерное слабо сингулярное интегральное уравнение (с.с.и.у.) вида¹

$$Ax = \frac{1}{4\pi^2} \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \ln \left| \sin \frac{\theta-s}{2} \right| \ln \left| \sin \frac{\tau-t}{2} \right| x(\theta, \tau) d\theta d\tau + \\ + \frac{1}{4\pi^2} \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} h(s, t, \theta, \tau) x(\theta, \tau) d\theta d\tau = y(s, t), \quad (I)$$

где $x(s, t)$ - неизвестная функция, которая ищется в пространстве $X = L_2[0, 2\pi] \times L_2[0, 2\pi]$ с обычной нормой

$$\|x\|_{L_2[0, 2\pi]^2} = \|x\|_2 = \left(\frac{1}{4\pi^2} \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} |x(s, t)|^2 ds dt \right)^{1/2},$$

$h(s, t, \theta, \tau)$, $y(s, t)$ - известные непрерывные 2π -периодические функции по каждой из переменных, а слабо сингулярный интеграл понимается как несобственный.

Приближенные методы решения одномерных интегральных уравнений такого типа достаточно хорошо разработаны (см., например,

¹ Двумерный случай рассматривается для простоты выкладок; распространение всех полученных ниже результатов на уравнение с κ ($\kappa \geq 3$) - переменными не представляет труда.

[1, 2, 3, 9]). Ниже рассматривается метод механических кубатур (м.м.к.) для указанного двумерного уравнения и предлагается его теоретическое обоснование в смысле [4, гл. I] с помощью ряда результатов общей теории приближенных методов и теории функций.

§ I. Вспомогательные результаты

Введем пространство $\mathcal{Y} = W_2^{1,1,2}$:

$$W_2^{1,1,2} = \left\{ y(s, t) \in L_2[0, 2\pi]^2 : y'_s, y'_t, y''_{st} \in L_2[0, 2\pi]^2 \right\}$$

с нормой

$$\|y\|_{W_2^{1,1,2}} = \|y\|_2 + \|y'_s\|_2 + \|y'_t\|_2 + \|y''_{st}\|_2. \quad (2)$$

Тогда с.с.и.у. (I) эквивалентно следующему операторному уравнению:

$$Ax = S_{12}x + \tau h x = y \quad (x \in X, y \in \mathcal{Y}), \quad (3)$$

где

$$S_{12}x = \frac{1}{4\pi^2} \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \ln \left| \sin \frac{b-s}{2} \right| \ln \left| \sin \frac{t-\tau}{2} \right| x(b, \tau) db d\tau, \quad (4)$$

$$\tau h x = \frac{1}{4\pi^2} \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} h(s, t, b, \tau) x(b, \tau) db d\tau. \quad (5)$$

Аналогично одномерному случаю (см. гл. I [3]) можно показать, что оператор $S_{12}: X \rightarrow \mathcal{Y}$ непрерывно обратим и справедливо соотношение

$$\|S_{12}^{-1}\| \leq 4, \quad S_{12}^{-1}: \mathcal{Y} \rightarrow X. \quad (6)$$

Воспользуемся ниже следующими обозначениями: $C_{2\pi}^2 = C_{2\pi}^2[0, 2\pi]^2$ — пространство дважды непрерывно дифференцируемых 2π -периодических функций с нормой

$$\|x\|_{C_{2\pi}^2} = \|x\|_{C_{2\pi}} + \|x'_{ss}\|_{C_{2\pi}} + \|x'_{tt}\|_{C_{2\pi}} + \|x''_{st}\|_{C_{2\pi}};$$

$E_{nm}(\varphi)_\infty$ — наилучшее равномерное приближение функции $\varphi(s, t) \in C_{2\pi}^2$ тригонометрическими полиномами порядка n, m ; $E_n^s(\varphi)_\infty$ — частное наилучшее равномерное приближение функции $\varphi(s, t) \in C_{2\pi}$

тригонометрическими полиномами порядка n по переменной s равномерно относительно переменной t [5], т.е.

$$E_n^s(\varphi)_\infty = \sup_{0 \leq t \leq 2\pi} \left[\inf_{\{a_j\}} \sup_{0 \leq s \leq 2\pi} \left| \varphi(s, t) - \sum_{j=-n}^n a_j(t) e^{ijs} \right| \right], \quad (7)$$

где нижняя грань берется по всевозможным функциям $a_j(t)$, принадлежащим пространству $C_{2\pi}[0, 2\pi]$; $E_n^s(\varphi)_\infty$ определяется аналогично.

Обозначим через \mathcal{L}_{nm} оператор, который любой 2π -периодической функции $\varphi(s, t) \in C_{2\pi}[0, 2\pi]^2$ ставит в соответствие ее тригонометрический полином Лагранжа

$$\mathcal{L}_{nm} \varphi = \mathcal{L}_{nm}(\varphi; s, t) = \frac{1}{(2n+1)(2m+1)} \sum_{k=-n}^n \sum_{j=-m}^m \varphi(s_k, t_j) D_k(s) D_j(t) \quad (8)$$

по узлам

$$s_\kappa = s_\kappa^{(n)} = \frac{2\kappa\pi}{2n+1}, \quad \kappa = \overline{-n, n}; \quad t_j = t_j^{(m)} = \frac{2j\pi}{2m+1}, \quad j = \overline{-m, m}; \quad (9)$$

где

$$D_\ell(\varphi) = \sin\left(\ell + \frac{1}{2}\right) \varphi / 2 \sin \frac{\varphi}{2} = \frac{1}{2} + \sum_{p=1}^{\ell} \cos p\varphi \quad (10)$$

— ядро Дирихле ℓ -го порядка.

Для оператора Лагранжа (8) справедливо соотношение [6]:

$$\|\mathcal{L}_{nm}\| = 1, \quad \mathcal{L}_{nm}: C[0, 2\pi]^2 \rightarrow L_2[0, 2\pi]^2, \quad n, m \in \mathbb{N}. \quad (8')$$

Существенную роль в дальнейшем играет следующая

Л е м м а. Для любой функции $\varphi(s, t) \in C_{2\pi}^2$ при $\forall n, m \in \mathbb{N}$ справедлива оценка

$$\|\varphi - \mathcal{L}_{nm} \varphi\|_{W_2^{1,1,2}} \leq \left(1 + \frac{\pi^2}{2}\right) E_{nm}(\varphi_{st})_\infty + E_{nm}(\varphi'_s)_\infty + E_{nm}(\varphi'_t)_\infty. \quad (II)$$

Доказательство. Для выражения в квадратных скобках в (7) при фиксированном t можем использовать неравенство [7]

$$E_n(\varphi)_\infty \leq \frac{\pi}{2(n+1)} E_n(\varphi')_\infty,$$

где $E_n(\varphi)_\infty$ — наилучшее равномерное приближение функции $\varphi(s) \in C_{2\pi}^1[0, 2\pi]$ тригонометрическими полиномами порядка n . Тогда

$$E_n^s(\varphi)_\infty \leq \frac{\pi}{2(n+1)} E_n^s(\varphi_s')_\infty; E_m^t(\varphi)_\infty \leq \frac{\pi}{2(m+1)} E_m^t(\varphi_t')_\infty. \quad (I2)$$

Аналогично получаем

$$E_{nm}(\varphi)_\infty \leq \frac{\pi^2}{4(n+1)(m+1)} E_{nm}(\varphi_{st}'')_\infty. \quad (I3)$$

Для оператора Лагранжа (8) справедливо соотношение [6]:

$$\|\varphi - \mathcal{L}_{nm}\varphi\|_2 \leq 2E_{nm}(\varphi)_\infty. \quad (I4)$$

Введем кратный оператор Фурье φ_{nm} порядка n, m :

$$\varphi_{nm}\varphi = \varphi_{nm}(\varphi; s, t) = \sum_{\kappa=-n}^n \sum_{j=-m}^m c_{\kappa j}(\varphi) e^{i(\kappa s + jt)}, \quad (I5)$$

$$\text{где } c_{\kappa j}(\varphi) = \frac{1}{4\pi^2} \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \varphi(b, \tau) e^{-i(\kappa b + j\tau)} db d\tau. \quad (I6)$$

Для $\forall \varphi(s, t) \in W_2^{1,1,2}$ справедливы тождества

$$\begin{aligned} \frac{\partial \varphi_{nm}(\varphi; s, t)}{\partial s} &= \varphi_{nm}(\varphi_s'; s, t); \quad \frac{\partial \varphi_{nm}(\varphi; s, t)}{\partial t} = \varphi_{nm}(\varphi_t'; s, t); \\ \frac{\partial^2 \varphi_{nm}(\varphi; s, t)}{\partial s \partial t} &= \varphi_{nm}(\varphi_{st}''; s, t). \end{aligned} \quad (I7)$$

С помощью (I4), (I7), следуя методу, предложенному в [3, 6], для $\forall \varphi(s, t) \in C_{2\pi}^2$ последовательно находим

$$\begin{aligned} \|\varphi - \mathcal{L}_{nm}\varphi\|_{W_2^{1,1,2}} &= \|\varphi - \mathcal{L}_{nm}\varphi\|_2 + \|(\varphi - \mathcal{L}_{nm}\varphi)_s'\|_2 + \|(\varphi - \mathcal{L}_{nm}\varphi)_t'\|_2 + \\ &+ \|(\varphi - \mathcal{L}_{nm}\varphi)_{st}''\|_2 \leq 2E_{nm}(\varphi)_\infty + \|(\varphi - \varphi_{nm}\varphi)_s'\|_2 + \\ &+ \|[\varphi_{nm}(\varphi - \mathcal{L}_{nm}\varphi)]_s'\|_2 + \|(\varphi - \varphi_{nm}\varphi)_t'\|_2 + \|[\varphi_{nm}(\varphi - \mathcal{L}_{nm}\varphi)]_t'\|_2 + \\ &+ \|(\varphi - \varphi_{nm}\varphi)_{st}''\|_2 + \|[\varphi_{nm}(\varphi - \mathcal{L}_{nm}\varphi)]_{st}''\|_2 \leq 2E_{nm}(\varphi)_\infty + \\ &+ \|\varphi_s' - \varphi_{nm}(\varphi_s')\|_2 + n \|\varphi_{nm}(\varphi - \mathcal{L}_{nm}\varphi)\|_2 + \|\varphi_t' - \varphi_{nm}(\varphi_t')\|_2 + \\ &+ m \|\varphi_{nm}(\varphi - \mathcal{L}_{nm}\varphi)\|_2 + \|\varphi_{st}'' - \varphi_{nm}(\varphi_{st}'')\|_2 + nm \|\varphi_{nm}(\varphi - \mathcal{L}_{nm}\varphi)\|_2. \end{aligned} \quad (I8)$$

Заметим, что здесь использовалось также обобщенное неравенство Бернштейна для функций двух переменных [8]. Используя (I3), (I4), продолжим (I8) с учетом того, что $\| \varphi_{nm} \| = 1$, $\varphi_{nm} : L_2[0, 2\pi] \rightarrow L_2[0, 2\pi]^2$ и

$$E_{nm}(\varphi)_2 \leq E_{nm}(\varphi)_\infty ;$$

$$E_{nm}(\varphi'_s)_2 \leq E_{nm}(\varphi''_{st})_2 / (n+1) ; E_{nm}(\varphi'_t)_2 \leq E_{nm}(\varphi''_{st})_2 / (n+1) ;$$

где $E_{nm}(\varphi)_2$ - наилучшее среднеквадратическое приближение функции $\varphi(s, t)$ тригонометрическими полиномами порядка n, m . Тогда окончательно получим

$$\| \varphi - \mathcal{L}_{nm} \varphi \|_{W_2^{1,1,2}} \leq \left(1 + \frac{\pi^2}{2} \right) E_{nm}(\varphi''_{st})_\infty + E_{nm}(\varphi'_s)_\infty + E_{nm}(\varphi'_t)_\infty .$$

Лемма доказана.

§ 2. Метод механических кубатур

Рассмотрим следующую вычислительную схему м.м.к., которая часто используется в ряде приложений. Приближенное решение уравнения (I) будем искать в виде полинома:

$$x_{nm}(s, t) = \frac{4}{(2n+1)(2m+1)} \sum_{\ell=0}^{2n} \sum_{r=0}^{2m} \alpha_{\ell r} \mathcal{Q}_n(s-s_\ell) \mathcal{Q}_m(t-t_r) . \quad (I9)$$

При этом коэффициенты $\{ \alpha_{\ell r} \}_{\ell=0, 2n, r=0, 2m}$ определяются из системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ):

$$\begin{aligned} & \frac{1}{(2n+1)(2m+1)} \sum_{\ell=0}^{2n} \sum_{r=0}^{2m} \alpha_{\ell r} \left\{ \ln^2 2 + \ln 2 \sum_{p=1}^n \frac{\cos p(s_\kappa - s_\ell)}{p} + \right. \\ & + \ln 2 \sum_{q=1}^m \frac{\cos q(t_j - t_r)}{q} - \sum_{p=1}^n \sum_{q=1}^m \frac{\cos p(s_\kappa - s_\ell) \cos q(t_j - t_r)}{pq} + \\ & \left. + h(s_\kappa, t_j, s_\ell, t_r) \right\} = y(s_\kappa, t_j) , \quad \kappa = \overline{0, 2n} , j = \overline{0, 2m} . \quad (20) \end{aligned}$$

Поясним, что для получения СЛАУ (20) обе части уравнения (I) приравняются в узлах $\{ s_\kappa, t_j \}_{\kappa=\overline{0, 2n}, j=\overline{0, 2m}}$, вместо $x(s, t)$ подставляется $x_{nm}(s, t)$ из (I9). Затем интегралы $S_{12}(x_{nm}; s_\kappa, t_j)$ вычисляются точно с учетом (I0) свойств оператора S_{12} :

$$S_{12}(\cos ns \cos mt) = \begin{cases} \ln 2, & n=m=0; \\ \frac{\ln 2}{2|m|} \cos mt, & n=0, m \neq 0; \\ \frac{\ln 2}{2|n|} \cos ns, & n \neq 0, m=0; \\ \frac{\cos ns \cos mt}{4|n||m|}, & n \neq 0, m \neq 0. \end{cases} \quad (21)$$

А интегралы $v h x_{nm}(s, t)$ вычисляются приближенно по кубатурной формуле наивысшей тригонометрической степени точности.

Сходимость м.м.к. в $L_2[0, 2\pi]^2$ и оценку погрешности устанавливает следующая

Т е о р е м а. Пусть с.с.и.у. (I) однозначно разрешимо в $L_2[0, 2\pi]^2$ при любой правой части из $W_2^{1,1,2}$. Пусть функции $y(s, t)$ и $h(s, t, \sigma, \tau)$ имеют вторые смешанные непрерывные производные y_{st}'' , h_{st}'' , $h_{\sigma\tau}''$. Тогда при всех $n \geq n_0$, $m \geq m_0$ (числа n_0 , m_0 определяются свойствами функции $h(s, t, \sigma, \tau)$) СЛАУ (20) имеет единственное решение $\{\alpha_{\ell\tau}^*\}_{\ell=0, 2n, \tau=0, 2m}$, и приближенные решения

$$x_{nm}^*(s, t) = \frac{4}{(2n+1)(2m+1)} \sum_{\ell=0}^{2n} \sum_{\tau=0}^{2m} \alpha_{\ell\tau}^* D_n(s-s_\ell) D_m(t-t_\tau)$$

сходятся к точному решению $x^*(s, t)$ в среднем со скоростью

$$\|x^* - x_{nm}^*\|_2 = O \left\{ E_{nm}(y_{st}'')_\infty + E_{nm}^{st}(h_{st}'')_\infty + E_{nm}^{\sigma\tau}(h_{\sigma\tau}'')_\infty \right\}. \quad (22)$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. Через $X_{nm} \subset X$ и $Y_{nm} \subset Y$ будем обозначать множество всех тригонометрических полиномов степени n, m , наделенное нормами пространств соответственно X и Y . Используя оператор \mathcal{L}_{nm} с учетом свойств оператора S_{12} и тригонометрической точности применяемой нами кубатурной формулы, не сложно показать (см., например, [10]), что СЛАУ (20) эквивалентна следующему операторному уравнению:

$$A_{nm} x_{nm} = S_{12} x_{nm} + \mathcal{L}_{nm} v(\mathcal{L}_{nm}^{\sigma\tau} h) x_{nm} = \mathcal{L}_{nm} y, \quad (x_{nm} \in X_{nm}, \mathcal{L}_{nm} y \in Y_{nm}), \quad (23)$$

где $\mathcal{L}_{nm}^{\sigma\tau}$ означает, что оператор \mathcal{L}_{nm} применен по переменным σ и τ .

Для $\forall x_{nm} \in X_{nm}$ из уравнений (3), (23) с учетом (II) полу-

ЧЗМ

$$\begin{aligned} \|Ax_{nm} - A_{nm}x_{nm}\|_{W_2^{1,1,2}} &\leq \|vhx_{nm} - \mathcal{L}_{nm}vhx_{nm}\|_{W_2^{1,1,2}} + \\ &+ \|\mathcal{L}_{nm}v(h - \mathcal{L}_{nm}^{6\tau}h)x_{nm}\|_{W_2^{1,1,2}} \leq \left(1 + \frac{\pi^2}{2}\right) E_{nm}(vh_{st}''x_{nm})_{\infty} + \\ &+ E_{nm}(vh_s'x_{nm})_{\infty} + E_{nm}(vh_6'x_{nm})_{\infty} + \\ &+ \|\mathcal{L}_{nm}v(h - \mathcal{L}_{nm}^{6\tau}h)x_{nm}\|_{W_2^{1,1,2}}. \end{aligned} \quad (24)$$

С помощью неравенства Гельдера, неравенства Бернштейна, оценок (14), (8') имеем по аналогии с [10]

$$\begin{aligned} \|\mathcal{L}_{nm}v(h - \mathcal{L}_{nm}^{6\tau}h)x_{nm}\|_2 &\leq 2E_{nm}(h)_{\infty} \|x_{nm}\|_2, \\ \|[\mathcal{L}_{nm}v(h - \mathcal{L}_{nm}^{6\tau}h)x_{nm}]_s'\|_2 &\leq 2nE_{nm}(h)_{\infty} \|x_{nm}\|_2, \\ \|[\mathcal{L}_{nm}v(h - \mathcal{L}_{nm}^{6\tau}h)x_{nm}]_t'\|_2 &\leq 2mE_{nm}(h)_{\infty} \|x_{nm}\|_2, \\ \|[\mathcal{L}_{nm}v(h - \mathcal{L}_{nm}^{6\tau}h)x_{nm}]_{st}''\|_2 &\leq 2nmE_{nm}(h)_{\infty} \|x_{nm}\|_2. \end{aligned}$$

Тогда, продолжая (24) с помощью (II), (I3) и легко доказываемых неравенств

$$\begin{aligned} E_{nm}(vh_{st}''x_{nm})_{\infty} &\leq E_{nm}^{st}(h_{st}'')_{\infty} \|x_{nm}\|_2, \\ E_{nm}(vh_s'x_{nm})_{\infty} &\leq E_{nm}^{st}(h_s')_{\infty} \|x_{nm}\|_2, E_{nm}(vh_6'x_{nm})_{\infty} \leq E_{nm}^{st}(h_6')_{\infty} \|x_{nm}\|_2, \end{aligned}$$

получаем

$$\begin{aligned} \|Ax_{nm} - A_{nm}x_{nm}\|_{W_2^{1,1,2}} &\leq \left(1 + \frac{\pi^2}{2}\right) E_{nm}^{st}(h_{st}'')_{\infty} + E_{nm}^{st}(h_s')_{\infty} + \\ &+ E_{nm}^{st}(h_6')_{\infty} + \frac{\pi^2}{2} E_{nm}^{6\tau}(h_{6\tau}'')_{\infty}, \quad x_{nm} \in \chi_{nm}. \end{aligned}$$

Аналогично неравенствам (I2) получаем следующие оценки:

$$E_{nm}^{st}(h_s')_{\infty} \leq \frac{\pi}{2(m+1)} E_{nm}^{st}(h_{st}'')_{\infty};$$

$$E_{nm}^{st}(\kappa'_t)_\infty \leq \frac{\sqrt{n}}{2(n+1)} E_{nm}^{st}(\kappa''_{st})_\infty.$$

Следовательно, для $\forall n, m \in \mathbb{N}$ имеем

$$\varepsilon_{nm} = \|A - A_{nm}\|_{X_{nm} \rightarrow Y} = O\left\{E_{nm}^{st}(\kappa''_{st})_\infty + E_{nm}^{st}(\kappa''_{st})_\infty\right\}. \quad (25)$$

С другой стороны, в силу (II) для правых частей уравнений (3), (23) справедливо соотношение

$$\delta_{nm} = \|y - \mathcal{L}_{nm} y\|_{W_2^{1,1,2}} = O\left\{E_{nm}(y''_{st})_\infty\right\}.$$

Таким образом, для уравнений (3) и (23) выполнены все условия теоремы 7 гл. I [4], из которой и следуют утверждения доказываемой теоремы, в том числе оценка (22).

Л и т е р а т у р а

1. Г а б д у л х а е в Б. Г. Оптимизация прямых методов решения интегральных уравнений I рода // Интегральные уравнения в прикладном моделировании: Тез. докл. научной конференции. Киев, 1986. - Т. I. - С. 22 - 23.
2. Г а б д у л х а е в Б. Г. Оптимальные проекционные методы решения слабо сингулярных интегральных уравнений I рода // Метод дискретных особенностей в задачах математической физики: Тез. докл. Всесоюзн. симпозиума. Харьков, 1985. - С. 46 - 47.
3. Г а б д у л х а е в Б. Г. Прямые методы решения сингулярных интегральных уравнений I рода. - Казань: Казанск. ун-т, 1990. - 290 с.
4. Г а б д у л х а е в Б. Г. Оптимальные аппроксимации решений линейных задач. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1980. - 232 с.
5. Т и м а н А. Ф. Теория приближения функций действительного переменного. - М.: Физматгиз, 1960. - 624 с.
6. Г а б д у л х а е в Б. Г. Кубатурные формулы для многомерных сингулярных интегралов, I, II // Известия на математическия ин-т при БАН. София, 1970. - Т. II. - С. 181 - 196; Изв. вузов. Математика. - 1975. - № 4. - С. 3 - 13.
7. Д а у г а в е т И. К. Введение в теорию приближения функций. - Л.: Ленингр. ун-т, 1976. - 184 с.

8. Никольский С. М. Приближение функций многих переменных и теоремы вложения. — М.: Наука, 1977. — 456 с.

9. Панасюк В. В., Саврук М. П., Назарчук З. П. Метод сингулярных интегральных уравнений в двумерных задачах дифракции. — Киев: Наукова думка, 1984. — 344 с.

10. Габдулхаев Б. Г. Приближенное решение многомерных сингулярных уравнений, I, II // Изв. вузов. Математика. — 1975. — № 7. — С.30 — 41; 1976. — № I. — С.30 — 41.

О.Е.Тихонов

СПЕКТРАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ДЛЯ ПРОСТРАНСТВ С БАЗОВОЙ НОРМОЙ

В работе продолжены исследования, начатые в [3]. В рамках некоммутативной спектральной теории Альфсена и Шульца [7],[8] для элементов пространства с базовой нормой (\mathcal{U}, K) , обладающего точным следом, доказана единственность "спектрального разложения" относительно следа (теорема 4.5). Предварительно исследованы свойства "проективных следов" из \mathcal{U} и интегралов по \mathcal{U}^+ -значной мере. В теореме 5.2 доказано свойство экстремальности спектральных мер в связи с выпуклыми функциями и на этой основе введен некоторый аналог пространств $L_p (1 \leq p < \infty)$.

Насколько возможно используются терминология и обозначения работ [7], [8] и [3].

§ I. Обозначения и предварительные сведения

Пусть (\mathcal{U}, K) — пространство с базовой нормой, т.е. \mathcal{U} — вещественное упорядоченное нормированное пространство с порождающим конусом \mathcal{U}^+ и выделенной в нем базой K , причем множество $\text{conv}(KU - K)$ радиально компактно, а норма задается функционалом Минковского этого множества [6; гл. 2, § I]. Сопряженным к (\mathcal{U}, K) является пространство с порядковой единицей (\mathcal{A}, e) — упорядоченное банахово пространство, причем конус \mathcal{A}^+ положительных элементов двойственен к \mathcal{U}^+ , порядковая единица e определяется условием $\langle e, \rho \rangle = 1$ для любого $\rho \in K$, а норма на \mathcal{A} удов —