

Hemtentamen - Fourieranalys

Matematiska institutionen
Anders Israelsson
2021-01-13

5 högskolepoäng
1MA211
KandFy, KandMa, Fristående

Skrivtid: 08:00-13:00 (Obs: GMT + 1 Stockholm). Ytterligare 20 minuter ges för inlämningen. När du är klar scannar du dina svar och lämnar in **en** pdf-fil. Spara dina originallösningar, åtminstone tills tentamen är färdigrättad och resultatet rapporterat. Obs! Endast tentamenslösningar i pdf-format mottages. Ett sätt är att använda sig av en scanner-app på en telefon (det finns gratisversioner att ladda ned). Skriv anonymitetskod och sidnummer på varje sida. Eventuella frågor skickas till `anders.israelsson@math.uu.se`.

Tillåtna hjälpmedel: skrivdon, innehållet i Studium och lärobok. **Observera att du inte får samarbeta med andra eller söka på internet efter andra källor!**

Tentamen består av 8 problem, där varje problem ger maximalt 5 poäng. Gränserna är 18, 25 och 37 för betyg 3, 4 respektive 5 (inklusive bonuspoäng). Du måste motivera varje steg i din lösning för att få full poäng på en uppgift. Under frågorna finns formelsamlingen.

1. Använd Laplacetransformen för att lösa ODE:n

$$\begin{cases} y''(x) - y'(x) - 2y(x) = 16e^{-2x} \\ y(0) = 2, y'(0) = 3. \end{cases}$$

2. Låt f vara 2π -periodisk med

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -2\pi < x < -\pi \\ 1, & -\pi < x < 0 \end{cases}$$

- (a) Beräkna f 's Fourierserie på trigonometrisk form.
- (b) Är Fourierserien likformigt konvergent? Motivera!
- (c) Använd resultatet i (a) för att beräkna serien

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1}$$

3. (a) Beräkna Fouriertransformen av $\chi_{[-1,1]}(x)(1 - |x|)$.
(b) Använd resultatet i (a) för att beräkna Fouriertransformen av $\frac{\sin^2(x)}{x^2}$.

4. Lös värmeledningsekvationen

$$\begin{cases} u_t = \kappa u_{xx}, & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = e^{-x^2}, & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

där $u(x, t)$ är begränsad och $\kappa > 0$ är en konstant.

5. Lös integralekvationen

$$-4 \int_0^x \cos(\sqrt{3}y) f(x-y) dy = f(x) + 2\sqrt{3} \sin(\sqrt{3}x).$$

6. Tillämpa Gram-Schmidtalgoritmen på $\{1-x, x^2-2\}$ för att hitta en ortonormal mängd i rummet $L^2((0, \infty), e^{-x})$.

7. Låt $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$ definieras genom

$$T(\varphi) := \left(\text{p. v. } \frac{1}{x} \right)' (\varphi)$$

(a) **Visa att $xT' = CT$ för något tal $C \in \mathbb{R}$. Beräkna även detta tal C .**

(b) **Beräkna \hat{T} .**

8. I nedanstående uppgift kan du anta att alla involverade integraler är konvergenta.

(a) För en funktion g , **beräkna**

$$\iint_{\mathbb{R}^2} e^{i(x-y)\xi} g(y) dy d\xi.$$

(b) Definiera operatorn $T_a^\varphi : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R})$ genom

$$T_a^\varphi f(x) := \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{ix\xi + i\varphi(\xi)} a(x, \xi) \hat{f}(\xi) d\xi,$$

där a och φ är "lämpliga" funktioner (dvs så att allt blir konvergent). **Visa att $T_a^\varphi = T_a^0 T_1^\varphi$.** Ledtråd: lösningen kräver (minst) tre integraler.

Lycka till!

Table of Formulæ

Let $\Omega \subseteq \mathbb{R}$ below.

Triangle inequalities

Let $x, y \in \mathbb{R}$ and f, g be functions. Then

- $||x| - |y|| \leq |x \pm y| \leq |x| + |y|$
- $||f| - |g|| \leq \|f \pm g\| \leq \|f\| + \|g\|$
- $|\int_{\Omega} f(x) dx| \leq \int_{\Omega} |f(x)| dx$.
- $\|\int_{\Omega} f(\cdot, y) dy\| \leq \int_{\Omega} \|f(\cdot, y)\| dy$, where the norm is taken in the first variable of f (Minkowski's integral inequality).

Useful Integrals

- $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$
- $\int_{\mathbb{R}} x^n e^{-x^2/2} dx = \begin{cases} \sqrt{2\pi}(n-1)(n-3)\dots 5 \cdot 3 \cdot 1, & n \text{ even} \\ 0, & n \text{ odd} \end{cases}$

Lebesgue Dominated Convergence Theorem

Let $\{f_n\}$ be a sequence of functions with $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ for almost every x and let $g \in L^1(\Omega)$, such that $|f_n(x)| \leq |g(x)|$ for almost every x . Then

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n(x) dx = \int_{\Omega} f(x) dx$$

Gram-Schmidt orthogonalisation

Let V be an inner product space and $\{v_1, \dots, v_k\} \subset V$ be a linearly independent set of vectors. Then the Gram-Schmidt orthogonalisation is given by

$$\begin{aligned} u_1 &= v_1, & e_1 &= \frac{u_1}{\|u_1\|} \\ u_2 &= v_2 - \frac{\langle u_1, v_2 \rangle}{\langle u_1, u_1 \rangle} u_1, & e_2 &= \frac{u_2}{\|u_2\|} \\ u_3 &= v_3 - \frac{\langle u_1, v_3 \rangle}{\langle u_1, u_1 \rangle} u_1 - \frac{\langle u_2, v_3 \rangle}{\langle u_2, u_2 \rangle} u_2, & e_3 &= \frac{u_3}{\|u_3\|} \\ &\vdots & &\vdots \\ u_k &= v_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle u_j, v_k \rangle}{\langle u_j, u_j \rangle} u_j, & e_k &= \frac{u_k}{\|u_k\|}. \end{aligned}$$

Laplacetransformen

$f(t)$	$\tilde{f}(s) = F(s) = \mathcal{L}[f](s) = \int_0^\infty f(t)e^{-st} dt$	
Allmänna regler		
$\alpha f(t) + \beta g(t)$	$\alpha F(s) + \beta G(s)$	(L.1)
$e^{at} f(t)$	$F(s - a)$	(L.2)
$f(at), \quad a > 0$	$\frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right)$	(L.3)
$f(t - a)H(t - a), \quad a > 0$	$e^{-as} F(s)$	(L.4)
$t^n f(t)$	$(-1)^n F^{(n)}(s)$	(L.5)
$f'(t)$	$sF(s) - f(0)$	(L.6)
$f^{(n)}(t)$	$s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$	(L.7)
$\int_0^t f(u) du$	$s^{-1} F(s)$	(L.8)
$f * g(t) = \int_0^t f(u)g(t - u) du$	$F(s)G(s)$	(L.9)
Speciella funktioner		
$\delta(t)$	1	(L.10)
$H(t)$	$\frac{1}{s}$	(L.11)
$t^n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	(L.12)
e^{at}	$\frac{1}{s - a}$	(L.13)
$t^n e^{at}$	$\frac{n!}{(s - a)^{n+1}}$	(L.14)
$\cos at$	$\frac{s}{s^2 + a^2}$	(L.15)
$\sin at$	$\frac{a}{s^2 + a^2}$	(L.16)
$t \cos at$	$\frac{s^2 - a^2}{(s^2 + a^2)^2}$	(L.17)
$t \sin at$	$\frac{2as}{(s^2 + a^2)^2}$	(L.18)

Fouriertransformen

$f(t)$	$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt$	
Allmänna regler		
$\alpha f(t) + \beta g(t)$	$\alpha \hat{f}(\omega) + \beta \hat{g}(\omega)$	(F.1)
$e^{i\alpha t} f(t)$	$\hat{f}(\omega - \alpha)$	(F.2)
$f(t - t_0)$	$e^{-it_0\omega} \hat{f}(\omega)$	(F.3)
$f(-t)$	$\hat{f}(-\omega)$	(F.4)
$f(at) \quad (a \neq 0)$	$\frac{1}{ a } \hat{f}\left(\frac{\omega}{a}\right)$	(F.5)
$tf(t)$	$i \frac{d\hat{f}}{d\omega}$	(F.6)
$f'(t)$	$i\omega \hat{f}(\omega)$	(F.7)
$\hat{f}(t)$	$2\pi f(-\omega)$	(F.8)
$f * g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(u)g(t-u) du$	$\hat{f}(\omega)\hat{g}(\omega)$	(F.9)
Speciella funktioner		
$\chi_{[-a,a]}$	$\frac{2 \sin a\omega}{\omega}$	(F.10)
$e^{- t }$	$\frac{2}{1 + \omega^2}$	(F.11)
$\frac{1}{1 + t^2}$	$\pi e^{- \omega }$	(F.12)
$e^{-t^2/2}$	$\sqrt{2\pi} e^{-\omega^2/2}$	(F.13)

Plancherels formler:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{f}(\omega)|^2 d\omega$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \overline{g(t)} dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) \overline{\hat{g}(\omega)} d\omega$$

Fourierserier

Funktioner med period 2π

$$f(t) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{int} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nt + b_n \sin nt),$$

där

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-int} dt \\ a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos nt dt, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin nt dt \\ a_n &= c_n + c_{-n}, \quad b_n = i(c_n - c_{-n}) \end{aligned}$$

Parsevals formel:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(t)|^2 dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2 = \frac{|a_0|^2}{4} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (|a_n|^2 + |b_n|^2).$$

Funktioner med period T

Sätt $\Omega = 2\pi/T$

$$f(t) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\Omega t} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\Omega t + b_n \sin n\Omega t),$$

där

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-in\Omega t} dt \\ a_n &= \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos n\Omega t dt, \quad b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \sin n\Omega t dt. \end{aligned}$$

Parsevals formel:

$$\frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |f(t)|^2 dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2 = \frac{|a_0|^2}{4} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (|a_n|^2 + |b_n|^2).$$

Några trigonometriska formler

$$\begin{aligned} 2 \sin a \sin b &= \cos(a-b) - \cos(a+b) \\ 2 \sin a \cos b &= \sin(a-b) + \sin(a+b) \\ 2 \cos a \cos b &= \cos(a-b) + \cos(a+b) \\ 2 \sin^2 t &= 1 - \cos 2t, \quad 2 \cos^2 t = 1 + \cos 2t \end{aligned}$$