about : 약, 예) 49.5 는 약 50

absolute value : 절대값, '원점에서 어떤 점 사이의 거리', -3 과 +3 의 절대값은 3

acute angle : 예각

acute triangle : 예각 삼각형

addition : 덧셈

alternate (or interior) angle : 엇각, (서로) 어긋나게 놓여진 각

angle : 각

angle of cimcumference : 원주각, 원주위의 한점 P에서 그은 두 개의 현 PA, PB 가

이루는 각이 호 AB 에 대한 원주각

angle of intersection : 교각 angular measure : 각도

approximate value : 근사값

arbitrariness : 임의 (~뜻에 맡기다), 임의로, 자기 뜻대로 하다, 영어의 any 와 같은뜻

arc : 호, '나무로 만든 활', 원주위의 두 점 사이의 부분

are: 아르, 100 m2 가 1 아르 (한변이 10 m 인 정사각형의 넓이), 기호는 a

area : 넓이

associative law : 결합법칙, 예) 덧셈의 결합법칙 a + (b + c) = (a + b) + c

assumption : 가정, p -> q, 즉 "p 이면 q 이다" 에서 p 는 가정이다. conclusion 의 반대

augend: 피가수, 더해지는수, 덧셈에서

average : 평균, 어떤 손해를 보았을 때 그 손해를 여러 소유주가 똑같이 분담한 그

양을 의미한다.

axis : 축

axis of coordinate : 좌표축, x 축과 y 축

axis of rotation : 회전축

band graph : 띠 그래프, 전체에 대한 각 부분의 비율을 띠의 길이로 나타낸 그래프

bar graph : 막대그래프

base : 밑, 밑변, 23 에서 2 가 base 이다.

base plane : 밑면, 각기둥이나 원기둥에서 아래있는 면이나 위에 있는 면

binary system : 이진법

body of rotation : 회전체, 한 직선을 축으로 평면도형을 회전시킬 때 생기는 입체도형

borrowing: 받아내림, 13 - 7 = (10 - 7) + 3 = 6, regrouping 이라고도 한다.

brace : 중괄호 bracket : 대괄호

calculation : 셈, 계산, 자갈 (라틴어로 calc) 을 이용하여 할 수 있는 정도의 간단한

계산

capacity : 들이 (용기의 부피), 용적, volume : 부피

carrying: 받아올림, 6 + 7 = (6 + 4) + 3 = 13, regrouping 이라고도 한다.

center : 중심

center of gravity : 무게중심, center of mass 라고도 한다. gravity : 중력, 무게 center of similarity : 닮음의 중심, 닮음의 위치에 있는 두 삼각형에서 대응하는 점을 이은 직선은 모두 한점을 지남.

central angle : 중심각, 원위에 호 AB 가 있을 때 그 호와 원의 중심 O 가 만드는 각

AOB 를 호 AB 에 대한 중심각이라 함

central line: 중심선, 두 원이 인접해 있을 때 이 두원의 중심을 지나는 직선

chord : 현, 활시위, 악기의 현 (string), 원주위의 두 점 A, B 가 있을 때 호 AB 를 의미

circle : 원

circular cone : 원뿔

circular cylinder : 원기둥 circular graph : 원그래프

circumcenter: 외심, 삼각형의 외접원의 중심

circumference : 둘레, 도형의 가장자리를 따라 한 바퀴 돈 길이, periphery : 둘레,

perimeter : 둘레

circumference: 원주 (원 둘레, 원의 가장자리의 길이)

circumscribed circle : 외접원, 다각형이 어떤 원에 내접하면 이 원은 다각형의 외접원이 된다.

circumscription : 외접 (주위에 경계선을 긋다), 어떤 원의 외부에서 그 원이 다각형의 모든 변에 접하고 있을 때

class : 계급, 예) 통계에서 변량을 나눈 구간, class interval : 계급의 크기, class mark : 계급의 중앙값

codomain : 공역, 정의역

codomain : 공역, y 가 x 의 함수일 때 변수 x 가 취할 수 있는 값의 범위 정의역 (domain), y 의 범위는 codomain (공역)

coefficient : 계수, 예) 2x 에서 2 는 문자 x 의 계수

common denominator : 공통분모

common divisor : 공약수, greatest common divisor (or factor, measure) : 최대공약수

common factor : 공통인수

common multiple : 공배수, least common multiple : 최소공배수

commutative law : 교환법칙, 예) a + b = b + a

compass : 컴퍼스, '걸음을 걸을 때 두 다리를 벌린 너비'

complement : 여집합

composite number : 합성수, 1 보다 큰 자연수 중에서 소수가 아닌수를 합성수라고 한다. compound number 와 같은뜻

computation : 셈, 계산, 함께 숙고해서 해결해야 할 정도의 복잡한 계산, 함께 (co), 가지치기를 하다 (putare)

concentration : 농도

conditions of congruence : 합동조건

congruence : 합동, 두 도형에서 한 도형을 옮겨서 다른 도형과 완전히 포개지면 두 도형은 합동

constant : 상수

construction : 작도, 자와 컴퍼스만을 이용하여 도형을 그리다.

continued ratio : 연비 (3 개 이상의 양의 비), 예) 3 : 4 : 5

coordinate : 좌표, 순서쌍 P(2, 3)에서 2 는 점 P 의 x 좌표, axis of coordinate 좌표축, coordinate plane 좌표평면

coordinate plane : 좌표평면, '모든 점의 위치가 좌표로 나타내어지는 평면'

correlation : 상관관계, 두 변량 x, y 가 있을 때 x 가 커짐에 따라 y 의 값이 커지거나 작아지는 관계

correlation diagram (or table) : 두 변량 x, y 의 상관관계를 순서쌍 (x, y) 를 이용하여 좌표평면에 그림으로 나타낸 것

correspondence : 대응, 예) 집합 X 의 한 원소 x 가 집합 Y 의 한 원소 y 와 짝지어 진다면 x 와 y 가 대응

corresponding angle : 동위각, 두 직선이 한 직선과 만나서 이루는 각 중에서 서로 같은 위치에 있는 각

cosine: 코사인, complemental sine 의 줄임말, sine 의 여각을 의미한다.

cube : 세제곱

cube: 정육면체 (regular hexahedron)

cubic meter : 세제곱미터

cumulative frequency : 누적도수

curve : 곡선

decimal : 소수, 십진법, circulating (repeating) decimal : 순환소수, to 5 places for

decimals : 소수점 5자리 까지

decimal expansion : 십진법 전개식, 예) 237 = 2 x 102 + 3 x 10 + 7 x 1

decimal fraction : 소수 (小數, 작은수), 원래의 의미는 십진분수, 소수점 (decimal

point)

decimal point : 소수점 (小數)

decimal system : 십진법, decimus (라틴어, 10)에서 나온말

decimalism : 십진법

definition: 정의

degree : 각도, '사다리에서 발을 디디는 곳' 의 의미

degree : 도, 각도

degree : 차수, '계속 이어진 횟수', 예) 5 x3 에서 지수 3 은 x 가 3 회 곱해짐, 따라서 이

단항식의 차수는 3 이다.

demonstration : 증명, proof 와 같은 의미로 사용된다. '논증하다, 설명하다' 라는 뜻도 있다.

denominator : 분모, "이름붙이는 사람" 의 의미, 3/5 를 three fifth 라고 읽는다.

determination condition : 결정조건, 예) 삼각형의 결정조건

development figure : (입체도형의) 전개도, '입체도형을 하나의 평면도형으로 만들다'

diagonal (line) : 대각선

diameter : 지름, dia 는 '~을 가로지르다' 라는 뜻이 있다. 반지름은 radius

difference : 차이, 뺄셈의 의미

difference set : 차집합, 두 집합 A, B 에서 A 의 원소로서 B 의 원소가 아닌 모든 원소의 집합

digit: 숫자, digitus (라틴어, 손가락)에서 나온말

direct measurement : 직접측정

direct proportion : 정비례

disjoint : 서로소 (서로에 대한 소수), 2 와 3, 9 와 10 과 같이 공약수가 1 뿐인 두

자연수

distribution : 분포

distributive law : 분배법칙, a(b + c) = ab + ac

dividend: 피제수, 나누어지는수, 나눗셈에서

divisible : 나누어 떨이지다

division : 나눗셈, quotient : 몫 , remainder : 나머지

divisor (or measure) : 약수 (간략히 하는 수), divisor (약수도 결국은 나누는 수), 예) 6

의 약수는 1, 2, 3, 6

divisor: 제수. 나눗셈

domain (of definition) : (변수 x 의) 정의역, y 가 x 의 함수일 때 변수 x 가 취할 수 있는 값의 범위, y 는 codomain (공역)

dotted line : 점선

dotted line : 점선

edge : 모서리

edge : 변

element : 원소

elimination : 소거

empty set : 공집합

equality : 등식

equality sign : 등호, =

equation: 방정식, 서로 똑같게 하기,

equation of a (straight) line : 직선 방정식, 일차방정식

Eratosthenes' sieve : 에라토스테네스의 체, 소수를 찾을 때 2 의 배수를 지우고, 3

의배수, 5 의 배수를 지워서 찾음

error : 오차

even number : 짝수

event : 사건

expansion : (수식의) 전개, 전개식, 단항식과 다항식의 곱을 하나의 다항식으로

나타낸 것, 입체도형의 전개 (development)

experiment (or trial) : 시행, 실험, 시도

exponent : 지수, 35에서 5 는 3 이 몇 번 곱해져 있는지를 가리킨다.

exponential law: 지수법칙, law of exponent, am x an = am+n 등등을 말한다.

expression (or formula) : 식, 표현, 공식

exterior angle : 외각, 다각형에서 한 내각의 밖에 있는 각

face : 면

factor : 인수, 예) 6 = 2 x 3에서 2 와 3 을 6 의 인수라고 한다. factorization : 인수분해

figure : 도형, 예) 평명도형, 입체도형

finite decimal : 유한 소수, 예) 1/4 는 소수로 나타내면 0.25 로 유한한 소수

finite set : 유한 집합

formula : 공식

formula: 식 (expression), 공식

four fundamental rules of arithmetics : 사칙연산

fraction : 분수, denominator : 분모, numerator : 분자

frequency: 도수, 통계에서 각 계급에 속하는 자료의 수

frequency distribution : 도수분포

frequency distribution polygon : 다각형, 도수분포를 히스토그램으로 나타낸다음 각 직사각형의 윗변의 중점을 선으로 연결

function : 함수, 기능, 작용, 수행의 의미, 각각의 값에 작용하는 일련의 연산

generating line : 모선, 예) 원뿔에서 꼭지점과 밑면을 이루는 원의 한점을 이은 선, 이 선이 움직여서 원뿔이 만들어짐

geometry: 기하

graph : 그래프, 직선, 점선, 곡선, 막대그래프, 그리스어 graphein (새기다, 긁다)에서 온 것 graph of broken lines : 꺽은선 그래프, 막대그래프에서 각 막대의 끝을 꺽은선으로 연결한 그래프

greater than : 초과, ~보다 큰

greatest common divisor : 최대공약수

hectare : 헥타르, 10,000 m2 가 1 헥타르 (한변이 100 m 인 정사각형의 넓이), 기호는

ha

height : 높이

hexahedron : 육면체 (여섯 면을 가진 입체도형)

histogram : 히스토그램, '똑바로 선 막대 그림', 계급을 가로축에 도수를 세로축으로 직사각형을 차례대로 만든 그래프

hypotenuse : (직각 삼각형의 가장 긴) 빗변, hypo 는 sub, tenuse 는 tend (내뻗치다, 쭉뻗다 는 의미)

identical : 상등, 서로 같은

identity : 항등식, 예) 3x = x + 2x 는 x 가 어떤 값을 갖더라도 항상 참이 된다. 이와같은 등식이 항등식이다.

improper fraction : 가분수, 분자가 분모보다 커진 경우

incenter or inner center: 내심, 내접원의 중심

inequality : 부등식,

inequality sign : 부등호, <, >, ≤, ≥ 등등

infinite decimal : 무한소수, 소수점 아래로 0 이 아닌 숫자가 무한히 많은 소수, 예) 1/3, 3.141592..(순환하지 않는 무한소수)

infinite set : 무한집합

inner opposite angle : 내대각, 예) 사각형에서 내각의 반대쪽에 있는 것

inscribed circle : 내접원

inscription : 내접, 예) 다각형이 원에 내접하다. inscribe : 새기다

integer: 정수, '손대지 않은', 분수처럼 손을대서 나눈 것이 아니라 그대로 둔 것,

intercept : 절편, x 절편, y 절편, 일차함수의 그래프가 x 축과 만나는 점이 x 절편

internal angle : 내각

intersection : 교집합

intersection point : 교점

inverse (number) : 역수, 예) 분수 3/4 의 역수는 4/3

inverse (or converse): 역, "p 이면 q 이다" 의 역은 "q 이면 p 이다"

inverse proportion : 반비례, reciprocal proportion

irrational number : 무리수, 두 정수의 비로 나타낼 수 없는 수

irreducible fraction : 기약분수, 약분을 다한 분수

isosceles right angle : 직각이등변삼각형, isosceles 는 '이등변'

isosceles trapezoid : 등변사다리꼴

known number : 기지수, known quantity : 수에 한정하지 않는 것....

known quantity : 기지수

lateral face : 옆면

law : 법칙

least common multiple : 최소공배수

length : 길이

less than : 미만, ~보다 작은

limit of error : 오차의 한계

line of intersection : 교선

line segment : 선분, 직선의 한 부분, 직선을 마디로 나누었을 때의 그 분절

line symmetry : 선대칭

linear : 일차, quadratic : 이차

linear equation : 일차방정식

linear expression : 일차식

linear function : 일차함수, 함수 y = f(x)에서 y 가 x 에 관한 일차식으로 나타내어지는

함수

linear inequality: 일차부등식, 예) (일차식)>0, (일차식)≥0, (일차식)<0, (일차식)≤0의

하나로 표현

lower base : 아랫변, 사다리꼴에서 아래에 있는 변

mass : 질량 (중력가속도를 감안하지 않은 무게), 수학에서의 무게는 질량을 의미

maximum : 최대값

mean : 평균, '중간의', average

measure : 측정

median line : 중선, 삼각형의 꼭지점과 그 대변의 중점을 이은 선분

mental computation (or mental arithmetic): 암산

meter: 빛이 진공에서 299,792,458 분의 1 초동안 진행한 거리

method of elimination by adding and subtracting : 가감법, 소거법, (연립방정식)에서

미지수를 소거하여 해를 구함

middle point : 중점, midpoint, 선분의 양끝으로부터 같은 거리, 즉 한가운데 있는 점

milimetre: 밀리리터, milimeter 과 같다.

minimum : 최소값

minuend: 피감수, 감해지는수, 뺄셈에서

mixed fraction: 대분수, 정수와 분수가 혼합되어 있다.

monomial: 단항식, 예) 3x, 4ab

multiple: 배수

multiple root : 중근, 이차방정식의 두 근이 중복되어 있을 때 이 근을 중근이라 한다.

multiplicand: 피승수, 곱해지는수, 곱셈에서

multiplication : 곱셈

multiplication table : 구구단

multiplication table : 구구단

natural number: 자연수, '1, 2, 3, 4,'

negative correlation : 음의 상관관계, 두 변량 x, y 가 있을 때 x 가 커짐에 따라 y 의

값이 작아지는 관계

negative number : 음수

not greater than : 이하, 또는 less than or equal to

not less than : 이상, not smaller than 도 같은 뜻이다.

number line : 수직선, 수직선은 실수에 대응되는 점들로 메워져 있으므로 실수의 직선

numbers of cases : 경우의 수

numerator: 분자, "계산하는 사람" 의 의미

oblique line : 사선, 빗금

obtuse angle : 둔각, obtuse : 무디다, 뭉툭하다

obtuse triangle : 둔각삼각형, 한각이 둔각인 삼각형

odd number : 홀수, 한자에서는 기수, 짝수는 우수 (even number)

operation : 연산 (셈을 행하다)

opposite angle : 대각

opposite side : 대변, 마주보는 변, side or edge

ordered pair: 순서쌍, 좌표평면에서 점의 위치, 순서쌍 (3, 2) 와 (2, 3) 은 같지 않다.

origin : 원점, 좌표평면에서 x 축과 y 축의 교점

orthocenter : 수심 (수직선의 중심), 삼각형의 세 꼭지점에서 각각의 대변에 내린 세

수선이 만나는 점, ortho:直

orthogonality : 직교 (수직으로 교차)

orthogonality: 직교, 두 직선이 직각으로 만나다. 수직과 같은 의미 (perpendicularity)

parabola : 포물선, para 는 '평행하다', ballein 은 '던지다' 를 의미한다.

parallel : 평행

parallel translation : 평행이동

parallelogram : 평행사변형, gram 은 '그려진 선' 을 의미한다

parenthesis : (소)괄호, brace : 중괄호, bracket : 대괄호

parenthesis : 소괄호

pentagon : 오각형

percent: 백분율, '100 에 대하여 얼마'

perfect square expression : 완전 제곱식, 다항식 전체가 완전하게 제곱의 형태, 예) 3(a + b)2, (x + 1)2

perimeter : 둘레, 도형의 가장자리를 따라 한 바퀴 돈 길이

permille: 천분율, '천에 대하여 얼마', percent 는 백분율

perpendicular : 수선 (수직인 직선), 수직, 두 직선이 서로 수직일 때 한 직선이 다른 한 직선의 수선이다.

perpendicular bisector : 수직이등분선, 수직으로 이등분하는 직선

perpendicularity : 수직

plane : 평면

plane figure : 평면도형

point : 점

point symmetry : 점대칭

polygon : 다각형

polyhedron : 다면체, 면이 많은 입체 도형, hedron : 바닥

polynomial : 다항식, 2x - 4x2 은 2x 와 -4x2 의 합으로 이루어진 다항식

position of similarity : 닮음의 위치, 두 삼각형의 대응되는 점을 이은 직선이 모두 한점을 지남

positive correlation : 양의 상관관계, 두 변량 x, y 가 있을 때 x 가 커짐에 따라 y 의 값이 커지는 관계

positive number : 양수

power: 거듭제곱, square: 제곱, cube: 세제곱

prime divisor (or factor) : 소인수 (素數 인 인수), 예) 8 의 인수는 1, 2, 4, 8 이며 소수는 2 뿐이므로 2 가 8 의 소인수 prime factorization : 소인수 분해, 소인수로 분해하기, 예) 30 = 2 x 3 x 5

prime number : 소수 (素數, 바탕이 되는수), prime (첫째의, 근본적인), 다른 어떤수의 곱으로 표현되지 않는 근본적인 수

prism: 각기둥, triangular prism: 삼각기둥

probability: 확률, probable 은 '있음직한, 그러나 확실하지는 않은' 이라는 뜻이 있다.

product : 곱

proof : 증명, 증거를 들어 어떤 것이 참인지 거짓인지 판단하는 것, demonstration 이라고 하기도 한다.

proper fraction: 진분수, 가분수와 구분되는 의미, 5/4 는 가분수

proportion : 비례, inverse proportion : 반비례

proportional distribution: 비례배분, 10 을 3:2로 비례배분하면 각각 6 과 4 가 된다.

proportional expression : 비례식, 비의 값이 같은 두 비를 등식으로 나타낸 것, 예) 2 : 3 = 4 : 6

proportional factor (or constant) : 비례상수, 정비례 y = ax, 반비례 y = a/x 에서 상수 a가 비례상수이다.

proposition : 명제

protractor : 각도기

pyramid : 각뿔, truncated pyramid : 각뿔대

Pythagorean theorem : 피타고라스의 정리, 직각삼각형의 직각을 낀 두 변의 길이가 a, b, 빗변 c 일 때 a2 + b2 = c2 이다.

quadrangle : 사각형

quadrant : 사분면, 1사분면 (first quadrant, x>0, y>0) ... 4사분면 (fourth quadrant, x>0, y<0)

quadratic : 이차

quadratic equation : 이차 방정식

quadratic expression : 이차식

quadratic function : 이차함수

quotient: 몫

qurdratic formula : (이차방정식) 근의 공식, quadratic equation : 이차방정식

radical sign : 근호, root 와 같은 의미 √

radius : 반지름

radius: 반지름, '수레바퀴의 살' 이라는 뜻이 있다.

range: 치역, 함수에서 Y 의 범위

rate : 비율

ratio : 비, 견주다

ratio of similarity : 닮음비, 닮음비가 1 이면 같은 도형

ratio of the circumference of a circle to its diameter : 원주율, 원의 지름과 원둘레의 길이의 비율

rational number : 유리수, 두 정수의 비로 나타낼 수 있는 수

rationalization : 유리화 (유리수로 만들기), 근호가 있는 형태의 무리수를 같은 무리수를 곱해서 유리수로 만드는 것

ray : 사선, 반직선, 빛이 뻗어나가는 선, 한 점에서 뻗어나가는 선

real line: 실선, 실선의 직선 또는 실수의 직선

real number : 실수, 실제로 존재하는 수

rectangle : 직사각형, 평면도형의 내각이 모두 직각인 경우 접두사 直 을 사용

rectangular parallelepiped : 직육면체, 육면체 중에서 면이 모두 직사각형

(rectangular) 인 것,

rectangular prism : 사각기둥

reduction of fraction : 약분 (약분수, 간략히 하다), 예) 분수 2/8 을 약분하면 1/4

reduction to common denominator : 통분, 공통분모, 분수를 서로 통하게 하려고

분모를 같게 만드는 것

regular polygon : 정다각형, 평면도형의 각 선분의 길이가 같고 내각의 크기가 모두

같을 때 접두사 '正' 을 사용한다.

regular polyhedron: 정다면체, 입체도형의 각 면의 모양이 합동인 도형일 때 접두사'

正'을 사용한다.

regular triangle : 정삼각형 (equiangular triangle)

relation: 관계, expression of relation: 관계식

relative frequency : 다른 것과 비교해서 나타낸 도수

relatively prime: 서로소 (서로에 대한 소수), 2 와 3, 9 와 10 과 같이 공약수가 1 뿐인

두 자연수

remainder : 나머지

repeating (or periodic, recurring) decimal : 순환소수

representative value : 대표값, 예) 평균은 대표값의 하나이다.

rhombus : 마름모

right angle : 직각

right triangle: 직각삼각형, right angled triangle

root : 근, 해 (resolution)

rounding (to the nearest whole number): 반올림

rounding off : 아래 자리의 수를 버림,

rounding up : 아래 자리의 수를 올림,

ruler: 자, rule 에는 '선을그리다' 라는 뜻이 있다.

scale : 눈금

secant line : 할선, 원과 두점에서 만나는 직선이 원을 둘로 나누는 것처럼 보이기 때문에 할선이라 한다.

section paper : 모눈종이

sector : 부채꼴

segment (of a circle) : 활꼴 (cresent : 초승달), 원의 호와 그 두끝을 연결하는 선분으로 이루어지는 평면도형

set : 집합

set builder form : 조건 제시법, 집합을 나타낼 때 각 원소를 나열하는 대신 공통성질을 제시하는 방법

significant digit : 유효숫자, 근사값을 나타내는 숫자 가운데 믿을 수 있는 숫자

similar terms : 동류항, 같은 무리에 속하는 항, 예) 3x 와 2x

similarity : 닮음, 두 도형의 닮음인 관계

simultaneity : 연립

simultaneous equations : 연립방정식

simultaneous inequalities : 연립부등식, 두 개 이상의 부등식을 함께 묶어 한쌍으로 나타낸 것

sine : 직각삼각형의 빗변 을 높이로 나눈 것

skew point : 꼬인 위치, 두 직선이 서로 만나지도 않고, 평행하지도 않은채 비스듬히 (skew) 위치함

slope: 기울기, 경사지다, gradient (도로나 철도의 기울기) 와 같은 의미

solid: 입체, 원래의 뜻인 고체는 입체적이므로,

solid figure : 입체도형, 예) 정사면체, 회전체 등과 같이 "~체" 로 끝나는 것은

입체도형이다.

solution : 해, 근

sphere : 구

square: 정사각형 (regular quadrilateral), '네모로 만들다', 제곱

square : 제곱

square meter : 제곱미터

square root : 제곱근, 평방근, 제곱근표 (table of square roots)

statistics : 통계, '합해서 셈하다 또는 합해 놓은 수'

stem and leaf plot: 줄기와 잎 그림, 자료 57, 53, 68 이 있을 때 50, 60 이 줄기, 7, 3, 8

이 잎

straight angle : 평각, '구부러지지 않고 쭉 펴 있는 각'

straight line : 직선

subset : 부분집합

substitution : 대입, 예) 수를 문자에 대입

subtraction : 뺄셈, 5 - 3 = 2에서 5 는 피감수 (minuend), 3 은 감수 (subtrand)

sum: (덧셈에서의) 합

surface : 곡면,

surface area : 겉넓이, 넓이

symmetric figure for a line : 선대칭도형

symmetric figure for a point : 점대칭 도형

symmetric transposition : 대칭이동

symmetry : 대칭

table : 표, '전체를 한눈에 쉽게 볼 수 있도록 어떤 사항들을 일정한 순서에 따라 벌여

적은 것'

table of square roots : 제곱근 표

tabular form : 원소나열법, 예) {1, 2, 3,}

tangent : 접선, 접하다, tangens (접촉하다), 원 O 의 외부의 한점 P에서 이 원에 그을

수 있는 접선은 두 개

tangent : 탄젠트, 접촉, '해시계 바늘의 그림자' 를 의미, 그림자의 길이는 바늘의

길이를 반지름으로 하는 원의 접선의 일부.

tangent point 또는 point of tangency : 접점

tangram : 칠교판, '일곱 조각으로 이루어진 재주 부리는 판'

term : 항, 예) 2x - 4x2 에서 2x, -4x2 이 항이다.

theorem: 정리, 참이라고 증명된 명제

transposition : 이항, 등식에서 등호의 왼쪽 또는 오른쪽의 항을 부호를 바꾸어

다른쪽으로 옮기다.

trapezoid : 사다리꼴, isosceles trapezoid : 등변사다리꼴

triangle : 삼각형

triangular prism : 각기둥

trigonometric ratio : 삼각비, sin A, cos A, tan A 를 각 A 의 삼각비 라고 한다. (trigon

은 triangle 과 같은 의미)

truncated cone : 원뿔대

truth value : 참값, 진가

union : 합집합, sum of sets, 두 개 이상의 집합의 원소 모두로 된 새로운 집합

unit : 단위

unit fraction : 단위분수, 분자가 1 인 분수

universal set : 전체집합

unknown : 미지수, 2x = 4 에서 x 는 미지수, unknown number 를 간단히 한 것

unknown term : 미지항, or unknown quantity

value of function : 함수값, 함수 y = f(x)에서 x=3 일 때 y=5 이면 5 가 함수값이다. 치역은 함수값 전체의 집합을 뜻한다.

variable : 변수

variate : 변량, 변수가 "수" 를 값으로 취하는 반면, 변량은 "양" 을 값으로 취한다.

Venn diagram : 벤 다이아그램

vertex : 꼭지점

vertex angle : 꼭지각

volume : 부피, 체적

weight : (중력가속도를 감안한)무게, mass : 질량 (중력가속도를 감안하지 않은 무게), 수학에서의 무게는 질량을 의미

width : 가로

출처: https://dcmru.tistory.com/152 [Everything is possible]