ARTİ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TƏHSİL İNSTİTUTU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
TƏHSİL NAZİRLİYİ

Kapital Bank

RFO
RESPUBLİKA FƏNN OLİMPİADALARI

Riyaziyyat 11

Ad_____ **Soyad**_____

* İmtahan müddəti **180** dəqiqədir.
* **4 səhv** cavab **1 düz** cavabı aparır.
* Hər sual **4 bal** ilə qiymətləndirilir.
* Nəzarətçilərə yalnız cavab kartları təqdim olunur.
* Rayon (şəhər) mərhələsinin nəticələrini **www.portal.edu.az, www.olimpiada.edu.az** saytlarından və ya təhsil aldığınız ümumtəhsil müəssisəsindən öyrənə bilərsiniz.


UĞURLAR!

22.01.2022

1. $f\left(\frac{x}{3}\right) = x^2 + x + 1$ düsturu ilə təyin olunan $f(x)$ funksiyası üçün $f(3z) = 7$ şərtini ödəyən bütün z qiymətlərinin cəmini tapın.

A) $-\frac{1}{3}$ B) $-\frac{1}{9}$ C) 0 D) $\frac{5}{9}$ E) $\frac{5}{3}$

2. A nöqtəsi mərkəzi O və radiusu 1 olan çevrə üzərindədir. AB parçası çevrəyə A nöqtəsində toxunur, $\angle AOB = \theta$ və C nöqtəsi OA üzərində, BC isə $\angle ABO$ −nun tənbölənidir. OC =?



A) $\frac{1}{cos^2\theta} - tan\theta$ B) $\frac{1}{2}$ C) $\frac{cos^2\theta}{1+sin\theta}$

D) $\frac{1}{1+sin\theta}$ E) $\frac{sin\theta}{cos^2\theta}$

3. Sıfırdan fərqli m, n, p ədədləri üçün

$x^2 + mx + n = 0$ tənliyinin kökləri

$x^2 + px + m = 0$ tənliyinin köklərindən iki dəfə böyükdür. Bu şərtləri ödəyən n və p ədədləri üçün $\frac{n}{p}$ =?

A) 1 B) 2 C) 4 D) 8 E) 16

4. Mərkəzi $(0, k)$, $k > 6$ nöqtəsində olan çevrə

$y = x$, $y = -x$ və $y = 6$ xətlərinə toxunur. Bu şərtləri ödəyən çevrənin radiusunu tapın.

A) $6\sqrt{2} - 6$ B) 6 C) $6\sqrt{2}$ D) 12 E) $6\sqrt{2} + 6$


5. $a \cdot \log_{10}2 + b \cdot \log_{10}3 + c \cdot \log_{10}5 + d \cdot log_{10}7 =$ $= 2005$ bərabərliyini ödəyən rasional ədədlərdən ibarət neçə müxtəlif (a, b, c, d) dördlüyü var?

A) 0 B) 1 C) 17 D) 1998 E) sonsuz sayda

6. Koordinat müstəvisində $|3x| + |4y| = 12$ qrafiki ilə əhatə olunmuş fiqurun sahəsi neçədir?

A) 6 B) 12 C) 16 D) 24 E) 25

7. Şəkildə $P(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$ çoxhədlisinin qrafikinin bir hissəsi göstərilib. Aşağıdakılardan hansı ən kiçikdir?



A) $P(-1)$

B) $P(x) = 0$ tənliyinin köklərinin hasili

C) $P(x) = 0$ tənliyinin sıfırdan fərqli köklərinin hasili

D) $P(x)$ çoxhədlisinin əmsallarının cəmi

E) $P(x) = 0$ tənliyinin həqiqi köklərinin cəmi

8. Bir tam ədədin kubu olan A ədədinin tam bölənlərinin sayı aşağıdakılardan hansı ola bilməz?

A) 50
B) 116
C) 238
D) 512
E) 728

9. Müsbət k tam ədədi üçün, $I_k = 10\ldots064$ ədədində 1 və 6 arasında dəqiq k sayda sıfır vardır. $N(k)$ ilə I_k ədədinin sadə vuruqlarına ayrılışında 2-nin qüvvətini işarə edək. Onda, $N(k)$ ədədinin ala biləcəyi ən böyük qiyməti tapın.

A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10

10. Neçə dənə rəqəmləri bir-birindən fərqli və 5-ə bölünən 7-rəqəmli palindrom ədəd vardır?
Qeyd: Palindrom ədədlər tərsinə oxunuşu da eyni olan ədədlərdir (məsələn, 343, 4554, 76367).

A) 336
B) 448
C) 504
D) 720
E) 1008

11. n natural ədədinin 60 müsbət tam böləni, $7n$ ədədinin isə 80 müsbət tam böləni var. Elə ən böyük k tam ədədi tapın ki, 7^k ədədi n-nin tam böləni olsun.

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

12. ABC üçbucağı diametri AB olan yarımçevrə daxilinə çəkilibsə, $AC + BC$ üçün aşağıdakılardan hansı doğru olar?

A) $AC + BC = AB$ B) $AC + BC = AB\sqrt{2}$
C) $AC + BC \geq AB\sqrt{2}$ D) $AC + BC \leq AB\sqrt{2}$
E) $AC + BC = AB^2$

13. $ABCD$ trapesiyasında AB və CD tərəfləri AD-yə perpendikulyar, $AB + CD = BC$, $AB < CD$ və $AD = 7$ olarsa, $AB \cdot CD =$?

A) 12 B) 12.25 C) 12.5 D) 12.75 E) 13

14. a, b, c, d, e artan sıra ilə verilmiş ardıcıl müsbət tam ədədlərdir. $a + c + e$ ifadəsi bir tam ədədin kvadratı və $a + b + c + d + e$ bir tam ədədin kubu olduğuna görə a-nın ala biləcəyi ən kiçik ədədin rəqəmlərinin cəmi neçədir?

A) 16 B) 18 C) 20 D) 22 E) 24

15. $x^4 - x^2 + 1 = 0$ olarsa, $2 \cdot x^{18} + x^{12} - 1 = ?$

A) –2 B) –1 C) 0 D) 1 E) 2

16. 1+(1+2)+(1+2+3)+…..+(1+2+3+……+20) cəmini hesablayın.

A) 1620 B) 1560 C) 1540 D) 1454 E) 1600

17. n-in neçə tam qiymətində $|n^3 - 6n^2 + 5|$ ədədi sadə ədəddir?

A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

18. Fəridin 24 alması var. O almaları neçə üsulla Əli və Vəli ilə bölə bilər ki, hər üçünə ən azı iki alma düşsün?

A) 105 B) 114 C) 190 D) 210 E) 380

19. $10^{93} - 93$ ədədinin rəqəmləri cəmini tapın.

A) 10 B) 93 C) 819 D) 826 E) 833

20. Sıfırdan fərqli həqiqi x və y ədədləri,

$xy = x - y$ şərtini ödəyərsə, aşağıdakı ədədlərdən hansı $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} - xy$ ifadənin mümkün qiyməti olar?

A) -2 B) -0.5 C) $\frac{1}{3}$ D) 0.5 E) 2

21. 2001-dən böyük olmayan, həmçinin, 3 və ya 4-ə bölünən, lakin 5-ə bölünməyən neçə natural ədəd var?

A) 768 B) 801 C) 934 D) 1067 E) 1167

22. *ABC* üçbucağında, *AB*=12, *AC*=7 və *BC*=10. Əgər *BC* sabit qalmaqla *AB* və *AC* tərəfləri iki dəfə artırılarsa, aşağıdakılardan hansı doğru olar?

A) Üçbucağın sahəsi iki dəfə artar


B) Üçbucağın BC tərəfinə çəkilmiş hündürlüyü iki dəfə artar

C) Üçbucağın sahəsi dörd dəfə artar

D) Üçbucağın BC tərəfinə çəkilmiş medianı iki dəfə artar

E) Fiqurun sahəsi sıfır olar

23. ABC üçbucağında, AC tərəfinin üzərində götürülmüş D nöqtəsi onu A-dan başlayaraq $1:2$ nisbətində bölür. E nöqtəsi BD tərəfinin orta nöqtəsi və F nöqtəsi BC və AE düz xətlərinin kəsişmə nöqtəsidir. ΔABC üçbucağının sahəsi 360-a bərabər olarsa, ΔEBF üçbucağının sahəsi neçə olar?



A) 24 B) 30 C) 32 D) 36 E) 40

24. Əgər sıfırdan fərqli həqiqi a, b, c ədədləri üçün $\frac{xy}{x+y} = a$, $\frac{xz}{x+z} = b$ və $\frac{yz}{y+z} = c$ olarsa, x aşağıdakılardan hansına bərabər olar?

A) $\frac{abc}{ab+bc+ac}$ B) $\frac{2abc}{ab+bc+ac}$ C) $\frac{2abc}{ab+ac-bc}$

D) $\frac{2abc}{ab+bc-ac}$ E) $\frac{2abc}{ac+bc-ab}$

25. $\{10,2,5,2,4,2,x\}$ ədədlərinin ədədi orta, median və modasını artan sırada düzdükdə hədləri eyni olmayan ədədi silsilə əmələ gətirirlər. Bu şərti ödəyən həqiqi x ədədlərinin cəmini tapın.

A) 3 B) 6 C) 9 D) 17 E) 20